




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
383/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
383/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
383/D





383

474

cc
in

A XXI Rha re





46679 (1)

*Omnia uero hæc & diligentius castigata sunt ꝯ fuerint antea,
& accuratius impressa, & instrumentis chirurgicis ab au
tore citatis exornata, quæ in fine secundi indicis
pingenda curauimus.*



Sing. Jndict. Pignori et qd emd tepameto transo Garadin

INDEX CAPITVM

INDEX CAPITVM QVAE in hoc Arculani libro habentur.

1	DE Cephalga & hemicrania.	pag. 4
2	De scotomia & uertigine.	19
3	De phrenesi	24
4	De lethargo.	32
5	De subeth sahara.	35
6	De apoplexia	35
7	De subeth	40
8	De congelatione	43
9	De paralyfi	45
10	De stupore & tremore.	50
11	De tortura oris	54
12	De spafmo	56
13	De tetano.	58
14	De epilepfia	61
15	De incubo	68
16	De melancholia	69
17	De catarrho.	81
18	De ophthalmia	87
19	De ulceribus oculorum.	96
20	De his quæ in oculis cadunt.	100.
21	De albedine oculorum.	101.
22	De scabie & pruritu a oculorum.	101
23	De sebel.	105.
24	De pruritu lachrymalium	108.
25	De ungula in oculo.	108
26	De artaphati siue sanguine effuso in oculo.	111
27	De lachrymis.	112.
28	De debilitate uisus.	115
29	De apostemate seu tumore palpebrarum	128
30	De dispositione pilorum palpebrarum.	130
31	De aqua descendente in oculo.	132
32	De nyctilope.	146
33	De dilatatione pupillæ.	150.
34	De fistula lachrymalis.	155.
35	De passionibus aurium.	158
36	De dolore auris.	160
37	De ulcere aurium & sanie.	166.
38	De sonitu & tinnitu.	170
39	De cura sonitus & tinnitus.	172.
40	De grauedine diminutione seu ablatioe auditus	173
41	De uermibus & paruis animalibus aurium.	177
42	De his quæ in aures extrinsecus cadunt.	177.
43	De ægritudinibus nasi.	178
44	De fluxu sanguinis narium.	179
45	De ulceribus narium.	182.
46	De polypo & hæmorrhoidibus.	184.
47	De nocuementis olfactus.	187
48	De passionibus dentium.	190.
49	De dolore dentium.	192.
50	De exedendis dentibus.	196.
51	De congelatione & stupore dentium.	197.
52	De anatomia oris.	198.
53	De ægritudinibus linguæ.	198.
54	De pustula linguæ.	199.
55	De exitu sanguinis gingiuarum.	201.
56	De casu uulue.	202.
57	De sanguisugis quæ bibuntur.	205.
58	De his quæ intrans guttur.	206.
59	De passionibus linguæ.	207.
60	De grauedine linguæ.	207.
61	De tumore linguæ.	211.
62	De ranula linguæ.	212
63	De his quæ nascuntur in lingua.	212.
	De anatomia gutturis.	213.

64.	De angina seu synanche.	213.
65.	De anatomia pectoris.	219.
66.	De tussi.	220.
67.	De asthma.	226.
68.	De pleuresi seu pleuritide.	232.
69.	De peripneumonia.	246.
70.	De empyimate.	249.
71.	De spuro sanguinis.	251.
72.	De phthisi & ulceribus pulmonis.	257.
73.	De passionibus cordis.	265.
74.	De tremore cordis.	272.
75.	De syncope.	274.
76.	De cura tremoris cordis 278. et syncope cura.	281.
77.	De anatomia stomachi & meri.	284.
78.	De uomitu.	285.
79.	De cholericæ passionis.	294.
80.	De nouimento digestionis.	299.
81.	De dolore stomachi.	307.
82.	De apostemate stomachi.	315.
83.	De ulceribus stomachi.	316.
84.	De singultu.	321.
85.	De cura singultus.	323.
86.	De appetitu.	325.
87.	De corruptione appetitus.	330.
88.	De appetitu canino.	331.
89.	De bulimo.	334.
90.	De siti.	335.
91.	De anatomia hepatis.	338.
92.	De debilitate hepatis.	341.
93.	De oppilatione hepatis.	345.
94.	De apostemate hepatis.	348.
95.	De dubelati hepatis.	348.
96.	De dolore hepatis.	355.
97.	De icteritia.	356.
98.	De hydropissi.	364.
99.	De anatomia splenis & dolore splenis.	375.
100.	et. 377.	
	De oppilatione splenis.	380.
	De inflatione splenis.	380.
101.	De anatomia intestinorum.	382.
	De punctione intestinorum.	385.
	De rugitu & exitu uentositatis inuoluntariæ.	386
	De colica.	387.
	Cura colicæ phlegmaticæ.	401.
	Cura colicæ melancholicæ.	402.
	Cura colicæ cholericæ.	402.
	Cura colicæ uentosæ.	402.
	Cura colicæ ex fecibus.	404.
	De colica apostemosa.	405.
	Cura colica ex torsione & ex descensu intestini in bursam testiculorum aut in aliquam rupturam mirach.	405.
	Cura reliquarum specierum colicæ.	406.
102.	De ileos.	406.
	De fluxu uentris.	408.
	Tractatus primus de fluxu uentris in generali duo continens capitula.	
	Cap. primum. De quidditate, speciebus, causis, signis & prognosticis fluxus in generali.	413.
2.	De regimine uniuersali præseruatio et curati.	415
	Tractatus secundus de speciebus fluxus sumptis à causa materiali subiectiua continens duas partes distributas in decem capita.	421
	Prim. De diarrhoea.	421.
2.	De fluxu sanguinis prouenientis a toto.	422.
3.	De fluxu diuersorum colorum.	423
4.	De fluxu liquefactio.	423.



INDEX CAPITVM

5.	De cholera passione.	424.
Secunda pars est de speciebus fluxus sumptis a membris particularibus continens capitula sex.		
6.	De fluxu cerebali	424.
7.	De lienteria siue de fluxu stomachico.	225.
8.	De fluxu intestinali	429.
4.	De tinea	433.
5.	De fluxu hepatico.	436.
	De fluxu hepatico chyloso.	437.
	De fluxu hepatico phlegmatico sub quo aquosus continetur.	439.
	De fluxu hepatico cholerico.	440.
	De fluxu hepatico melancholico.	440.
	De fluxu hepatico sanguineo	444.
	De fluxu hepatico lotio	445.
	De fluxu hepatico foetido	445.
	De fluxu hepatico uirulento	446.
	De fluxu hepatico qui est substantia hepatis aut sibi similatur.	447.
6.	De fluxu splenico	447.
Tractatus tertius de speciebus Fluxus sumptis à causa materiali obiectiua continens tria capitula.		
1.	De fluxu stercoroso.	449.
2.	De fluxu uermium.	449.
3.	De fluxu lapidum.	450.
Tractatus quartus de speciebus fluxus penes causam efficiientem tria continens capitula.		
1.	De fluxu critico & Symptomatico.	450.
2.	De fluxu oppilatio.	451.
3.	De fluxu à rebus non naturalibus & extraneis sicut morbus uenenosus & uenenosus supitio	456.
Tractatus quintus. De speciebus fluxus a causa formali capitulum unum continens. De fluxu suauis & insuauis.		
		457.
Tractatus sextus. De speciebus fluxus à causa finali		

capitulum unum continens. De fluxu laudabili & illaudabili.		457.
De anatomia renum		457.
De anatomia uesicæ.		458.
De difficultate urinæ.		459.
De lapide.		465.
De apostemate quod fit in renibus & uesica.		471.
De ardore urinæ.		476.
De mictu sanguinis & saniei		479.
De mola.		481.
De anatomia Siphac & Mirach.		405.
De eminentia & ruptura.		486.
De dolore iunctionarum.		491.
De dolore anche.		502.
De fluxu urinæ.		505.
De uermibus qui generantur in uentre.		505.
De Hæmorrhoidibus, Fistulis, & Rhagadijs que in ano fiunt.		506.
De egressionibus ani & matricis.		507.
De superfluitate menstruorum constringenda.		507.
De prouocatione menstruum.		507.
De rhagadijs uulvæ.		507.
De apostemate quod fit in matrice.		507.
De ulceribus quæ fiunt in matrice & eius cancro.		508.
De præfocatione matricis.		508.
De gibbositate.		508.
De uarietibus.		508.
De elephantiasi.		508.
De ulceratione renum quæ exterius fit in cute.		509.

FINIS.

De fluxu hepatico	436.
De fluxu hepatico chyloso	437.
De fluxu hepatico phlegmatico	439.
De fluxu hepatico cholerico	440.
De fluxu hepatico melancholico	440.
De fluxu hepatico sanguineo	444.
De fluxu hepatico lotio	445.
De fluxu hepatico foetido	445.
De fluxu hepatico uirulento	446.
De fluxu hepatico qui est substantia hepatis aut sibi similatur	447.
De fluxu splenico	447.
De fluxu stercoroso	449.
De fluxu uermium	449.
De fluxu lapidum	450.
De fluxu critico & Symptomatico	450.
De fluxu oppilatio	451.
De fluxu à rebus non naturalibus & extraneis sicut morbus uenenosus & uenenosus supitio	456.
De fluxu suauis & insuauis	457.
De fluxu hepatico	436.
De fluxu hepatico chyloso	437.
De fluxu hepatico phlegmatico	439.
De fluxu hepatico cholerico	440.
De fluxu hepatico melancholico	440.
De fluxu hepatico sanguineo	444.
De fluxu hepatico lotio	445.
De fluxu hepatico foetido	445.
De fluxu hepatico uirulento	446.
De fluxu hepatico qui est substantia hepatis aut sibi similatur	447.
De fluxu splenico	447.
De fluxu stercoroso	449.
De fluxu uermium	449.
De fluxu lapidum	450.
De fluxu critico & Symptomatico	450.
De fluxu oppilatio	451.
De fluxu à rebus non naturalibus & extraneis sicut morbus uenenosus & uenenosus supitio	456.
De fluxu suauis & insuauis	457.

INDEX RERVM VOCVMQVE OMNIVM

Scitu dignarum quæ in hoc Arculani opere habentur. Primus numerus paginam: Secundus idest a, uel b, columnam:

Tertius lineam, indicat.

A Egreditur tria sunt genera omnibus membris communia. Pagina 70 Columna a Linea 61.
Anatomia capitis humani Pagina. 2. a. 1 et Pagina 3. et 4.
Anatomia oculorum 87 b 57
Anatomia auri pagina. 158. b. 30.
Anatomia dentium 190 a 50
Anatomia oris 198 a 14
Anatomia lingue 198 a 48
Anatomia gutturis 213 a 48
Anatomia pectoris 119 a 30
Anatomia cordis 265 b 55
Anatomia meri et stom. 284 b 17
Anatomia hepatis 338 b 14
Anatomia splenis 375 b 23
Anatomia intestinorū 382 a 50
Anatomia renum 457 b 28
Anatomia uesticæ 458 b 10
Anatomia siphac 485. a 1
Ani cura. 506 a 1
Anchæ dolor quid 502 b 58
Anchæ causæ 503 a 27
Anchæ species 503. a 6
Anchæ signa 503 a 43
Anchæ prognostica. 503 a 55
Anche cura 503 b 30 & 504 et 505.
Anhelitum dilatacia. 231 b 43
Anhelitus constrictiōis cura 232 a 22
Anhelitus cura 230 b 11
Appetitus quid 325 b. 60
Appetitus est duplex 326 a 1
Appetitus quibus ex causis minuat aut deficiat 326 a 34 et 327
Appetitus diminutionis & ablationis cura. 327 a 61 et 328 et 329 et 330
Appetitus excitatio perficitur octo modis 328 b 60 et 329
Appetitus corruptus quid 330 a 50
Appetitus corruptus duplex 330 a 53
Appetitus corrupti causa 330 b 5
Appetitus corrupti signa 330 b 31
Appetitus corrupti cura. 330 b 42. et. 331.
Appetitus caninus quid 331 a 60
Appetitus caninus duplex 331 b 15
Appetitus caniniciæ 331 b 16 et 332
Appetitus canini signa 332 a 12
Appetitus canini cura. 332 b 25 et 333 et. 334.
Arthretica 493 b 44
Asthma 226 a 44
Asthma sumit dupliciter 226 b 44
Asthmatis causæ 226 b 55
Asthmatis signa 227 a 60
Asthmatis cura 228 a 1, et 229 et 230 et 231 et 232

Apoplexiæ species & causæ. 36 b 35 et. 37.
Apoplexiæ prognostica 37 a 34 et 38
Apoplexiæ urina 37 a 52
Apoplexia inchoantis signa 37 a 61
Apoplectica corpora non debent se peliri usq; ad tertiam diem 38 a 21
Apoplexiæ cura 38 a 55 et 39 et 40
Apoplexia habet quinque curatiuas intentiones 40 a 27
Apoplecticorum diæta 40 a 55
Apostema lachrymalis 155 b 60
Apostematum lachrymalium causæ. 156 a 27
Apost. lachrymalis signa 156 a 37
Apostem. sanguinei, phlegmatici, choleric, melancholici cogni. 156 a 39
Apostema lachrymalis triplex exitu regimen 157 b 26
Apostematis in canna pulmonis cura 249 a 24
Apostematum resolutio 320 a 26
Apostematis gibbi aut concaui hepatis differentia 349 a 29
Apostema hepatis triplex exitu regimen 350 a 63
Apostema sanguineum hepatis pag. 349 b 7
Apostematis sanguinei cura 352 a 16
Apostematum frigidorum emplastrum 352 b 54
Apostematum mirach & lacertorū uentris cura 353 b 28
Apostema renum et uesticæ 471 a 50
Apostematis renum & uesticæ causæ. 471 b 51
Apostematis renum & uesticæ terminatio fit tribus modis 472 a 7
Apostematum renum & uesticæ signa. 472. a 24 & 473 & 474. b 5.
Apostematum renum prognostica 473 a 46.
Apostematum renū & uesticæ cura. 473 b 58 et 474 et 475 et 476
Apostematis matricis cura 507. b. 46.
Aqua descendēs in oculum. 132 a 20
Aquæ intrantis in oculum cura. 144. a. 13.
Asclitis seu ascitis cā 366 b 50 et 336
Asclitis signa 369 b 32
Asclitis cura 369 b 49 & 370.
Asthma 226 a 44
Asthma sumit dupliciter 226 b 44
Asthmatis causæ 226 b 55
Asthmatis signa 227 a 60
Asthmatis cura 228 a 1, et 229 et 230 et 231 et 232

Aurium passiones 158 b 30
Aurium anatomia 158 b 49
Auris quid 158 b 49
Auris quare ordinata 150 b 57
Aurium situs 159 a 42
Auris regimen præseruatium & confortatium 159 b 45
Auris dolor quid 160 a 10
Auris doloris signa 160 b 14
Auris doloris causæ 160 a 41
Aurium signa causarum primitiarum 160 b 20
Aurium apostema quibus cognoscitur. 160 b 29
Apostematis signa in aure 161 b 47
Auris doloris cura 161 a 57 et 162 et. 163 et 164. et 165. et 166.
Auris quale membrum 168 a 25
Aurium cura quatuor exigit intentiones 168 a 61
Aurii sonitus & tinnitus 170 a 6
Auris ulcera quibus cognoscuntur. 167 a 9.
Auris ulcerum causæ. 167 a 1
Aurium ulcus 166 a 26
Aurium ulcerum cura. 167 a 60. & 168 et 169. et 170.
Auditus corruptio. 170 a 54.
Auditus quare aliquando nimis acutus 170 b 6
Auditus corruptiōis cā. 170 b 3
Auditus corrupti seu soni. fig. 171 a 38
Auditus corruptionis prognostica. 171 b 30.
Cura sonitus & tinnitus 172 a 40
Auditus grauedo, diminutio, ablatio. 173 b 45
Auditus grauedinis causæ. 174 a 7
Auditus grauedinis signa 174 a 49
Auditus diminutio quibus cognoscitur 174 a 62
Auditus diminut. progno. 174 b 27
Auditus grauedinis cura 175 a 5 & 176 & 177
Cura uermium in aure 177 a 14
Cura res durarū & liquidarū in aure 177 b 51
B Bolismus seu bulimos quid. 334 b. 12.
Bolismi causæ sunt duplices. 334 b 18.
Bolismi signa 334 b 52
Bolismi prognostica 334 b 59
Bolismi cura 335. a 2
C Cachexia quid 364 a 2
Cachexiæ causa. 364 a 8
Cachexiæ signa 364 a 26
Cachexiæ prognostica 364 b
Cachexiæ cura 171 a 49
✠ ij

INDEX

Cauterizatio forme & canones obseruandi in cauterizatio: diffule	500 a 34	Congelationis signa	44 a 43	Cor potest pati omne genus agri-	
Catarthus quid	81 b 30	Congelatio duplex	43 b 56	dinis	267 a 59
Catarthus sumit tripliciter	81 b 33	Congelationis prognostica	44 b 17	Cordis aggritudines, famose sunt qua-	
Catarthi cause	82 b 1	Congelationis cura	44 b 20	tuor	267 b 46
Catarthi signa	83 a 28	Cholerica passio	294 b 8	Cordis aggritudinum istarum quatuor,	
Catarthi prognostica	83 b 45	Cholerice species	294 b 27	cause.	268 12
Catarthi in cura cæ remotio est præ-		Cholerice cause	294 b 34	Cordis dispositiones octo modis si-	
mittenda	83 b 57	Cholerice signa	294 b 54	gnificantur	268 b 26
Catarthorum dicta	84 b 4	Cholerice cura	295 a 28	Cordis malarum complexionum si-	
Catarthi quæ sunt cõstringentia	86 a 22	Cholera passio quid	424 b 10	gna	269 a 25
Catarthi quæ sistant	86 b 6 230 b 8	Cholere passionis species, signa, cau-		Cordis dispositionum curatio	269.
Catarthi signa generalia	282 a 25	sa, prognostica, & cura. quere in		b. x. et. 270. et. 271	
Catarthalis tussis duas exigit res.		tractatu de passione stomachi.		Cordis tremoris descriptio, cause &	
224. 45c		Cholerice passio quid cõserat	297 b 45	signa	272 a 6
Catarthus est duplex	82 a 40	Cholere multitudinis cause	357 a 36	Cordis tremoris, prognostica	274 a 35
Catarthi cura exigit tres can.	83 b 51	Colica quid	385 a 19	Cordis tremoris cura	278 b 1 et 279
Catarthi cura.	84 a 25 & 85	Colice prognosticum	385 b 19	et 280 et 281	
& 86 & 87:		Colice cæ corpe duplices	387 b 41	Coryze cura	87 b 20
Cataracta quid & unde	138 a 45	Colice cæ p. eentia quatuor	387 b 43	Cuthubuth cura	81 a 40
Cataracta sumitur dupliciter	138 b 37	Colice cause per cõitatem	389 a 8	Chronicorum morborum observa-	
Cataractæ signa	140 b 12 & 141	Colice cause primitiue	389 b 10	tio	230 a 31
Cataractæ prognostica	141 b 33	Colice signa	390 a 37	Cystis debilitatis signa	358 b 55
Cataractæ & imaginationum cura		Colice prauæ signa	390 a 61	Chylosi fluxus signa	409 b 40
quinq; exigit intentiones	142 a 6	Colice salubris signa	390 b 55	Chylosi fluxus cura	409 12 et 410
Cataractæ modus pponendi	144 b 44	Colici doloris & renalis ex lapide dif-		Clystere phlegmatici	34 a 26
Calore innatu quæ paucificat	365 a 31	ferentia	391 a 31	Clystere lethargicæ melacholi	34 a 37
Cæci curatio	185 b 26 & 186 & 187	Colice phlegmaticæ signa	391 b 60	Clystere ad apoplex. paral.	34 a 42
Capitis confortatiua & reperculsiua		Colice phlegmaticæ, prognost.	392 a 20	D	
in phrenesi	29 b 1	Colice uentose signa	392 a 21	Dentium anatomia & quare	
Caput purgia	189 b 56	Colice uetose prognostici	392 a 56	ordinati pag.	190 a 50
Capitis cõfortatio	116 a 48 et 114 b 6	Colice ex fece signa.	392 a 58	Dentium regimen conserua-	
Capitis complexio mala quibus re-		Colice ex fece prognostici	392 b 34	tium	191 a 22
mouetur	18 b 45	Colice apostemose signa	392 b 36	Dentium dolores	192 a 5
Capitis passioib. quæ cauedu	10 b 34	Colice apostemose progn.	393 a 2	Dentium doloris causa	192 a 15
Cephalæ seu soda quid	4 a 45	Colice ex intestini cõtorsione signa.		Dentium doloris prognostica	192 b 37
Cephalæ cause & species	5 a 31	393 a 5		Dentium cura	192 b 52
Cephalæ signa	6 b 17 & 7	Colice ex intestini contorsione pro-		Dentium doloris signa	192 a 59
Cephalæ prognosticum	8 a 25	gnosticum	393 a 19	Dentium stuporis seu congelationis	
Cephalæ sanguinæ cura	8 a 44	Colicarum reliquarum quæ raro eue-		descriptio	197 a 23
Cephalæ cholerice cura	11 a 1	nium signa.	393 a 28	Dentium stuporis causa	197 a 25
Cephalæ phlegmaticæ cura	12 a 24	Colice causarum primitiuarum si-		Dentium stuporis signa	197 a 53
Cephalæ calide curationis comple-		gna	393 b 27	Dentium stuporis prognosti.	197 a 59
mentum	14 a 48	Colice phlegmaticæ & cholerice cu-		Dentium stuporis cura	197 a 16
Cephalæ frigide curationis comple-		ra	393 b 35 & 394 & 395.	Dentium doloris cura mēdosa	194 b 39
mentum	14 b 34	Colice uetose cura	393 b 12 & 396	Dentium doloris cura uera	194 b 61
Cephalæ per communitatem ad sto-		402 b 40 & 403 & 404.		Dentium cauterizationes	195 b 20
machum cura	15 a 44	Colice ex fecibus cura	404 b 12	Dentium extractio fit tribus modis	
Cephalæ cura prouenientis a causa		Colice cholerice cura	396. b 11 &	196 a 3	
primitiua	16 b 20	402 b 1.		Diaphragma quid	219 a 43
Cephalæ melacholica cura	17 a 33	Colice apostemose cura	396 b 33	Diarrhoeæ cura	410 a 43
Cephalæ p. cõitatem a toto	17 b 34	& 405 a 47		Digestionis nocumentum	299 a 25
Cephalæ critiche cura	17 b 61	Colice à causa calida cura	397 a 56.	Digestionis corruptio fit quadrupli-	
Cephalæ ex oppilatiõe cura	18 a 23	Colice phlegmatica cura in qua par-		citer	299 a 31
Cephalæ ex percussione cura	18 a 43	te multa de uetose colice cura tra-		Digestionis nocumenti cause sunt	
Cephalæ ex debilitate capitis cura.		ctat 400 b 1 & 401 & 402.		duplices	299 b 23
18 b 40		Colice melancholicæ cura	402 a 40	Digestio impedit dupliciter	300 b 42
Cephalæ ex acuitate sensus	19 a 23	Colice extorsione & ex descensu inte-		Digestionis nocumēti signa	301 a 4
Cephalæ ex uermibus existentibus		stini in burfa; testiculor; aut in ali-		Digestionis nocumēti, progn.	301 b 7
supra stricaturam narium	19 a 18	quā rupturā mirach cura	405 b 45	Digestionis debilitatis signa et cura	
Cerebri pres lesas esse signa	26 b 47	Colice reliquar; spec; cura	406 a 43	302 a 1 et 303 et 304 et 305 et 306	
Cerebri confortatio	114 b 14	Colica est causa ictericæ	359 a 14.	Digestiua humorū	312 b 50 et 328 7
Cerebrum quibus confortatur in me-		Colica unde sumpsit nomē	383 b 9	Digestiua & euacuatiua quando esse	
lancholia	80 b 30	Colica lateris sinistri facilis curatio-		mixa debent	17 b 32
Cerebrū purgatiua	189 b 36 et 305 b 10	nis.	384 a 1	Digerentia	81 a 6
Congelatio quid	43 a 58	Cõplexionis calid. frig. siccæ	6 a 1	Dysentericæ cura	410 b 37
Congelationis cause	44 a 43	Cor quid	265 b 57 et 269 b 51	Doloris cuiuscunq; causa	492 a 30
		Cordis anatomia	265 b 55	& 307 a 50c	

I N D E X

Elephantiasis cura. 508 b 55
 Epilepsia quid 61 b 15
 Epilepsia signa 61 b 59 et 63 a 9.
 Epilepsia causae 62 a 56
 Epilepsia dīa ab apoplexia 62 a 36
 Epilepsia et spasmi dīa 58 a 17
 Epilepsia & uertiginis dīa 22 b 61
 Epilepsia signa prognostica 63 a 26
 Epilepsia cura 63 a 52 et 64 et 65 et 66 et 67 et 68.
 Epilepticoꝝ diata 67 b 17
 Empyima quid 249 a 40
 Empyimatis causa 249 a 48
 Empyimatis signa 249 b 9
 Empyimatis signa salutis et mortis. 249 b 43
 Empyimatis cura 250 a 6
 Epiglottis quid 216 b 10
 Erysipelas quid 31 b 60
 Erysipelatis in cerebro cura 32 a 3

F

Famis syncopalis quid 335 a 36
 Famis syncopalis cāx 335 a 40
 Famis syncopalis signa 335 a 45
 Famis syncopalis prognostici 335 a 45
 Famis syncopalis cura 335 a 48
 Famis diminutionis et abla. causa 326 a 34.
 Famis seu appetitus diminutionis uel ablationis prognostica 327 b 51
 Famis seu appetitus diminuti uel ablati cura 327 b 62
 Fluxus quidditas, species, cā, signa et prognostica in generali 413 a 30
 Fluxus regimen uniuersale praesertim & curatiuum 415 a 41
 Fluxus uentris quē diarrhoea dīr spēs, cā, signa, prognost. et cura 421 b 10
 Fluxus sanguinis prouentis a toto spēs, cā, signa, progn. et cura 422 a 53
 Fluxus diuersoꝝ colorū, spēs, cā, & signa, et prognostica, et cura 423 a 35
 Fluxus liquefactiui spēs, cā, signa, prognostica et cura 423 b 26
 Fluxus cerebralis quidditas, spēs, signa, cā, progn. & cura 424 b 20
 Fluxus stomachici seu lieterici, quidditas species, causae, signa, prognostica et cura 425 b 56
 Fluxus intestinalis qd̄dupl. 429 a 59
 Fluxus sanguinei intestinalis, spēs, cā, signa, prognostica & cura 429 b 1
 Fluxus dylietici quidditas, spēs cā, signa, prognostica et cura 429 b 21
 Fluxus qd̄r tenefmos, spēs, signa, causae, prognostica et cura 433 a 15
 Fluxus hepaticus quid 436 b 42
 Fluxus hepaticus habet nouē spēs penes materiā distinctas 436 b 43
 Fluxus hepatici chylosi qdditas, spēs cā, signa, prognostica cura 437 b 1
 Fluxus hepatici sub quo aquosus continetur, causae, signa, prognostica, & cura. 439 a 27
 Fluxus hepatici cholerici, species, cā, signa, pronostica, & cu. 440 a 16

Flexus hepatici melancholici spēs, cā, signa, pronostica cura 440 b 42
 Fluxus hepatici sanguinei spēs, causae, signa, prognostica, & cura. 444. a 41
 Fluxus hepatici lotiui causae, signa, prognostica, & cura 445 a 1
 Fluxus hepatici, causae, signa, prognostica, cura. 445 b 55
 Fluxus hepatici uirulenti cāx, signa, prognostica & cura. 446 a 52
 Fluxus hepatici qui est substantia hepatis, aut sibi assimilatur, causae, signa, prognostica & cura 447 a 15
 Fluxus splenici, spēs, causae, signa, prognostica, et cura. 447 b 32
 Fluxus stercorosi species, causae, signa prognostica et cura 449 a 10.
 Fluxus uermiu species, causae, signa, prognostica & cura. 449 b. 18.
 Fluxus lapidum causae, prognosticū. cura. 450. a. 20
 Fluxus critici quidditas, species, causae, signa, prognostica, & cura 450. b. 8.
 Fluxus symptomatici, quidditas, species, causae, signa, prognostica & cura, 450. b. 8.
 Fluxus oppilatiui quidditas, species, causae, signa, prognostica, & cura 451. a. 40.
 Fluxus à rebus nō naturalibus & extraneis sicut uenenosoz morsus et uenenorum sumptio, prognostica & cura 456. a. 35.
 Fluxus suauis quidditas, cā, signa, prognostica, & cura. 457. a. 7.
 Fluxus insuauis qdditas, cā, signa, prognostica, & cura 457. a. 7.
 Fluxus laudabilis quidditas, causae, signa, prognostica. & cura. 457. a. 49
 Fluxus illaudabilis quidditas, cā, signa, prognostica, & cura. 457. a. 49
 Fistularum cura. 506. a. 1.
 Fistula lachrymalis quid. 156. b. 4.
 Fistulae lachrymalis causae. 156. b. 24.
 Fistulae signa & cognitio. 156. b. 26.
 Fistulae lachrymalis, progn. 156. b. 46
 Fistulae lachrymalis cura. 156. b. 55. & 157. & 158.
 Fistula sumitur dupliciter. 157. b. 9.
 Febriu cura. 265. a. 26

G

Argarismata quare fiant in ca tharro. 85. a. 41.
 Gibbositas cura. 508. b. 9.
 Gingiuarum passiones. 201. b. 10.
 Gingiuarū sanguinis exitus causa, prognostica & cura. 201. a. 53.
 Gingiuarū cura. 201. b. 49.
 Gonorrhoeae medicamen proprium, 99. b. 24.
 Guttur quid & anatomia ipsius. 213. a. 49.
 Gutturis uitia & cura. 206. 508.
 Gutta quid. 491. b. 51.
 Guttē causa, 492. a. 30.

Guttē signa. 493. a. 52.
 Guttē prognostica. 494. b. 2.
 Guttē cura. 495. a. 1. & 502.

H

Hepatis anatomia. 338. b. 12.
 Hepatis egritudinibus qui canones seruandi circa curam. 339. b. 13.
 Hepati medicinae conuenientes quae. 340. b. 26.
 Hepatis debilitatis descrip. 341. a. 20
 Hepatis debilitatis species. 341. a. 54.
 Hepatis debilitatis causa. 341. a. 61.
 Hepatis debilitatis signa. 341. b. 43.
 Hepatis debilitatis progn. 344. a. 59.
 Hepatis oppilatio quid. 345. b. 52.
 Hepatis oppilatio fit in triplici meatu. 357. b. 39.
 Hepatis oppilationis cāx. 345. b. 61.
 Hepatis oppilationis signa. 346. a. 42.
 Hepatis oppilationum prognostica. 347. a. 12.
 Hepatis oppilationū cura. 347. a. 28.
 Hepatis apostema. 348. a. 16.
 Hepatis apostematū cāx. 348. a. 41.
 Hepatis apostematū signa. 348. b. 17
 Hepatis apostematum prognostica. 350. a. 47.
 Hepatis apostematum cura. 350. 63. & 351. & 352. & 353.
 Hepatis dubelati. 349. b. 55.
 Hepatis doloris à calore signa. 353. b. 42.
 Hepatis doloris causae. 355. b. 12.
 Hepatis doloris prognostica. 355. b. 57.
 Hepatis doloris cura. 353. b. 42. & 354. & 355. & 356.
 Hepatis attractio retentio digestio expulso diminuta uel corrupta quibus cognoscatur. 343. a. 4.
 Hepatis attractio retentio digestio et expulso quibus confortet. 345. a. 13
 Hepatis confortatio qb. fiat. 345. a. 27
 Hepatis mundificatiū. 305. b. 10
 Hemibranea & eius cura. 19. a. 43.
 Hemorrhoidum cura. 506. a. 1.
 Herniae signa. 487. a. 11
 Herniarū causa. 487. a. 1.
 Herniarum species. 486. a. 37.
 Herniarum prognostica. 487. b. 7.
 Herniae cura. 487. b. 24. & 488. & 489. & 490. & 491.
 Humorū signa ex fece nariū. 6. b. 41.
 Humorū signa. 7. a. 16.
 Humorū quatuor euacuatio. 216. b. 51.
 Humorū euacuatio quando praemittenda. 15. b. 32.
 Humores quādo euacuandi: satis diffusile. 11. a. 60. & 34. b. 58.
 Humorū cognitio. 305. a. 56.
 Humores singuli quibus medicinis digerantur & quibus euacuentur 34 a 10
 Humores singuli quibus medicinis euacuentur. 279. a. 59.
 Humorū minoratio quando facienda, 106. a. 31.

INDEX

- Humiditates in pulmone quomodo
finiantur. 230. b. 53.
Homoponagie cura. 19. a. 43.
Hydropifis quid. 364. b. 11.
Hydropifis species. 364. b. 40.
Hydropis causæ. 264. b. 570. & 365
& 366. & 367.
Hydropicorum omnium signa com-
munia. 367. b. 39.
Hydropis specierum omnium propria
signa. 368. b. 14.
Hydropis specierum omnium pro-
gnostica. 269. a. 6.
Hydropum cura. 369. b. 14. & 370.
& 371. & 372. & 373. & 374.
& 375.
Hypofarcæ causæ. 367. a. 39.
Hypofarcæ signa. 368. b. 55.
Hypofarcæ prognostica. 369. 7
Hypofarcæ cura. 370. b. 30.
- I**
Icteria quid. 357. a. 4.
Icteria causatur uitio cystis fel-
lis. 356. b. 4.
Icteria est triplex. 357. a. 14.
Icterie citrine, causæ. 357. a. 26.
Icterie nigræ, causæ. 357. a. 27. &
358. a. 9.
Icterie secundum eius tres species
signa. 358. a. 45.
Icterie citrinæ, prognostica. 359. a. 32.
Icterie nigræ prognostica. 360. a. 6.
Icterie cum febre cura. 360. a. 26.
Icterie sine febre cura. 360. b. 30.
Icterie in oculis cura. 360. b. 52.
Icterie cuiusq; speciei curæ ordo.
361. a. 12.
Ileos quid. 385. a. 31.
Ileos & colicæ differentia. 406. b. 32.
Ileos causæ & signa ibidem.
Ileos prognostica. 407. b. 9.
Ileos cura. 407. b. 35.
Iliaca passio unde sumptum nomen.
383. a. 4.
Iliacæ passionis cura. 393. b. 36.
Incubus quid. 68. a. 42.
Incubus duplex. 68. b. 62.
Incubi causæ. 69. a. 2.
Incubi signa. 69. a. 18.
Incubi prognostica. 69. a. 31.
Incubus antecedit, aut epilepsia, aut
apoplexiam, aut maniam, seu me-
lancholiam. 69. a. 31.
Incubi cura. 69. a. 38.
Intestinarum anatomia. 382. a. 50.
Intestina quid. 382. a. 56.
Intestina sunt numero sex. 382. b. 6.
Intestinum duodenum. 382. b. 31.
Intestinum ieiunum. 382. b. 49.
Intestinum ileon. 383. a. 1.
Intestinum cæcū seu sacculus. 383. a. 20.
Intestinum colon. 383. a. 58.
Intestinum rectum. 384. a. 4.
Intestinarum morbi principales pag.
384. b. 23.
Intestinarum dolor duplex. 387. a. 31.
Intestinarum doloris species. 387. a. 31.
- Intestinarum doloris causa. 387. b. 7.
Intestinarum doloris cura. 393. b. 35.
Ilicis siue passio diuina quæ. 72. b. 4.
Ilicis signa. 72. b. 13.
Ilicis causa primaria. 72. b. 50.
Ilicis cura. 81. b. 1.
Iuncturarum dolor. 491. b. 49.
Iuncturarum doloris causæ. 491. a. 40.
Iuncturarum dolores habent quatuor
tempora. 493. a. 30.
Iuncturarum doloris signa. 493. a. 52.
Iuncturarum doloris, prognostica. 494. b. 11.
Iuncturarum calidarum dolorum cu-
ra. 494. a. 1.
Iuncturarum frigidarum dolorum
cura. 496. a. 6.
Iuncturæ quare debiles. 492. b. 11.
Iuncturarum doloris regimen dif-
fusæ. 497. b. 50.
Iuncturarum doloris sedatio. 501. b. 55.
Iuncturarum durities est duplex.
502. a. 16.
Iuncturæ cura: diffusissime. 495. a. 1.
- L**
Lachrymæ, distillatio oculi
quid. 112. a. 4.
Lachrymarum materiæ gene-
ratio. 112. a. 50.
Lachrymarum species sunt dupli-
ces. 112. b. 25.
Lachrymarum causæ sunt quatuor.
112. b. 51.
Lachrymarum signa. 113. a. 19.
Lachrymarum prognostica. 113. b. 6.
Lachrymarum quinq; problemata
soluntur. 113. b. 38.
Lachrymarum fluxus unde. 113. b. 25.
Lachrymarum fluxus in tristitia &
risu quare. 113. b. 38.
Lachrymarum cura. 114. a. 24.
Lac. 304. a. 61.
Lactis utilitas. 262. a. 14.
Lapidis species & causæ. 463. b. 11.
Lapidis renum signa. 466. b. 14.
Lapidis uescicæ signa. 466. b. 45.
Lapidis renum & uescicæ cura.
467. a. 35.
Lapidis renū incisionis modus pag.
470. a. 17.
Lapis renū medicamen. 420. b. 50.
Lapis renum transponitur. 470. a. 35.
Lethargia quid. 32. a. 50.
Lethargie causæ. 32. b. 59.
Lethargie signa. 33. a. 11.
Lethargie prognostica. 33. b. 43.
Lethargie cura. 33. b. 50.
Lethargie digesta. 35. a. 6.
Lētiū uētris. 294. a. 14. et 305. a. 62.
Lētiētia in passione pulmonis pag.
231. b. 14.
Lingua quid. & eius anatomia. &
qre ordinata. 198. a. 49. et 174. b. 45.
Lingue egreditur et earum curatio-
nes. 207. a. 28.
Lingue grauedo quid. 207. b. 55.
Lingue grauedinis causæ. 208. a. 54.
Lingue grauedinis signa. 208. b. 17.
- Lingue grauedinis prognostica pag.
209. a. 9.
Lingue grauedinis cura: diffuse. 209.
a. 20.
Lingue ranula. 212. a. 12.
Lingue ranulæ species. 212. a. 29.
Lingue ranulæ signa et causæ. 212. a. 34.
Lingue ranulæ, prognostica. 212. a. 40.
Lingue ranulæ cura. 212. a. 44.
Lingue apostema. 212. b. 39.
Lingue apostematis causæ & signa
212. b. 44.
Lingue apostematis cura. 212. b. 50.
Lingue pustula. 199. a. 1.
Lingue pustularum species. 199. a. 4.
Lingue pustularum signa. 199. a. 4.
Lingue pustularum causæ. 199. b. 10.
Lingue pustularum prognostica.
199. b. 20.
Lingue motus leditur tripliciter pa-
gin. 207. a. 35.
Lingue complexio quibus cogno-
scitur. 207. a. 63.
Lingue tumor. 211. a. 33.
Lingue tumoris causa. 211. a. 46.
Lingue tumoris signa. 211. a. 55.
Lingue tumoris cura. 211. b. 1.
Lienteria quid. 408. b. 18.
Lienterie signa. 408. b. 15.
Lienterie cura. 418. a. 30.
Lienterie cura à phlegmate pendē-
tis. 403. b. 51.
- M**
Mania est duplex. 71. b. 46.
Manie cura: diffuse. 79. a. 40.
Manie origo. 73. a. 2.
Matricis apostematis cura. 507. b. 45.
Matricis ulcerum cura. 508. a. 6.
Matricis præfocatio. 508. a. 30.
Melancholia quid. 69. b. 19.
Melancholia dupliciter sumitur pag.
171. b. 15.
Melancholie signa. 71. a. 59.
& 73. b. 23.
Melancholia species habet infinitas
72. a. 14.
Melancholie causæ. 72. b. 60.
Melancholie, prognostica pag. 74. b. 17.
Melancholie cura: diffuse. 74. b. 55.
Melancholico à quibus abstinē-
dum. 76. a. 24.
Melancholico obseruare necessarium
77. a. 25.
Cerebrum quibus confortandum in
melancholia. 80. b. 40.
Melancholia & manie cura: diffuse
79. a. 40.
Medicine proprie in dispositione me-
lancholica tam alterantes quam
euacuantes. 78. b. 36.
Melancholicorum debitum regimen.
77. a. 25.
Membra principalia. 40. b. 49.
Membrorum manifestorum dolo-
ris cura. 509. b. 1.
Menses prouocantia. 507. b. 1.
Menstruorum superfluum cura
507. a. 45.

Menstruorum

INDEX

Menstruorum medicamen 176. b. 1
 Membra mandantia quæ 80. b. 25
 Meri siue oesophagi anatomia pag. 284. b. 16
 Meri quid 284. b. 21
 Meri operatio 284. b. 30
 Mola quid 481. b. 34
 Mole causæ 481. b. 39
 Mola quadruplex 481. b. 44
 Molæ causæ 482. a. 48
 Molæ signa 482. b. 59
 Molæ & impregnationis ueræ signa distinctiua 483. b. 4
 Molæ prognostica 483. b. 12
 Molæ cura 483. b. 12

N

Nasi anatomia 178. b. 30
 Nasus quale membrum pag. 178. b. 33
 Nasi compositio 178. b. 53
 Narium sanguinis fluxus quid & unde 179. b. 16
 Cæ fluxus sanguinis nariū 180. a. 46
 Causæ apertionis uenarum sunt duplices 180. a. 61
 Signa prognostica 180. b. 12
 Prognostica 180. b. 46
 Cura fluxus sanguinis nariū 180. b. 55
 Narium ulcera 182. b. 56
 Cæ ulcerū er prognostica 183. a. 12
 Nariū ulcerum cura 183. a. 54
 Narium polypus quid 184. b. 55
 Nariū polypī species 185. a. 21
 Narium polypī causa 185. a. 34
 Narium polypī signa 185. a. 55
 Narium polypī prognostica 185. a. 50
 Narium polypī cura 185. b. 5
 Naso quomodo medicinæ applicandæ 179. b. 1
 Nyctilops quid 146. a. 10
 Nyctilopis & Haliar causæ 146. b. 6
 Nyctilopi & Haliarici qui 146. a. 16
 Nyctilops & Haliar sunt species debilitatis uisus
 Nyctilopis & Haliar signa 146. a. 49
 Nyctilopis & Haliar signa 147. a. 25
 Nyctilopis & Haliar prognostica. 147. a. 32
 Nyctilopis cura diffuse 149. a. 44

O

Oculi anatomia 87. b. 58
 Oculorum regimen triplex. 88. a. 40
 Oculorum cura 89. b. 26
 Oculorum ulcera 96. a. 25
 Oculorum albedo 101. a. 55
 Oculi distillatio quid 112. a. 41
 Oculi debilitatis signa 113. a. 27
 Oculorum albedinis species sunt tres 101. a. 53
 Oculorum albedinis cura 102. a. 28
 Oculorum sanitatem conferuans electuarium sublime 89. a. 11
 Oculi palpebrarum tumor 128. a. 60
 Oculi palpebrarum tumoris signa pag. 128. b. 25
 Oculi palpebrarum tumoris species 128. b. 9

Oculi palpebrarum tumoris prognostica 129. b. 13
 Oculorum palpebrarum tumoris cura 129. a. 15
 Oculi palpebrarum pilorum inuersio. 130. a. 20
 Oculi pilorū inuersiōis cura 130. b. 40
 Oculi imaginationū species sunt duplices 132. b. 17
 Oculi imaginationum species diuersificantur multipliciter 133. a. 56
 Oculorum uisionū signa 136. b. 40
 Oculorū uisionū prognostica 138. a. 33
 Oculorum uisioni quædam dubia occurrunt. 133. b. 14
 Oculorum uisionum cura 142. a. 6
 Oculi pupillæ dilatatio quid 150. b. 58
 Oculi pupillæ dilatatio duplex 151. a. 5
 Oculi pupillæ dilatationis causæ. 151. a. 20
 Oculi pupillæ dilatationis signa pag. 151. b. 45
 Oculi pupillæ dilatationis prognostica 154. b. 19
 Oculi pupillæ dilatationis cura pag. 154. b. 50
 Oculorum scabies quid. 103. a. 40
 Oculorum scabiei species sunt triplices. 103. a. 47
 Ophthalmia quid & quotuplex. pag. 89. b. 20
 Ophthalmiæ causæ. 90. a. 19
 Ophthalmia dupliciter generatur. 90. a. 34
 Ophthalmia quibus cognoscitur. pag. 90. a. 53
 Ophthalmiæ signa pag. 90. b. 16
 Ophthalmiæ prognostica 91. a. 1
 Ophthalmiæ cura 91. a. 40
 Ophthalmiæ curationis modus pag. 94. a. 20
 Ophthalmicorum diæta 95. a. 43
 Oppilationum cura 229. a. 1
 Olfactus quid 187. b. 16
 Olfactus nocumentum est triplex. pag. 187. b. 17
 Olfactus amissio & nocumentum pag. 187. b. 9
 Olfactus nocumentum quibus cognoscitur. 188. a. 27
 Olfactus nocumenti causæ 187. b. 33
 Olfactus nocumenti prognosticum. 188. b. 7
 Olfactus amissio optimum remediū. 188. b. 55
 Olfactus cura 188. b. 17
 Oris anatomia 198. a. 14
 Os quid 198. a. 17

P

Paralysis quid 45. a. 15
 Paralysis quare in una parte. 3. b. 60
 Paralysis quadruplex est 45. a. 43
 Paralysis causæ 45. b. 1
 Paralysis signa 46. a. 21
 Paralysis prognostica 46. b. 10
 Paralysis cura 46. b. 55

Peripneumonia quid 246. a. 2
 Peripneumonia duplex 246. a. 37
 Peripneumoniæ causa. 246. a. 54
 Peripneumoniæ signa 246. b. 41
 Peripneumoniæ prognost. 248. a. 2
 Peripneumoniæ cura. 248. a. 14
 Pectoris anatomia 219. a. 27
 Pectus quid 119. a. 33
 Pectoraliū partium motus siue actio nes. 221. a. 3
 Pectoris ulcera consolidantur multis causis. 257. b. 31
 Phthisis quid 257. a. 30
 Phthisis causæ 258. a. 29
 Phthisicorum complexio 258. a. 31
 Phthisicorum signa. 258. b. 56
 Phthisicorum prognostica. 259. b. 12
 Phthisis specierum notitia 257. b. 12
 Phthisicorum diæta 259. b. 44
 Phthisicorum cura. 259. b. 44
 Pleura quid. 219. a. 49
 Pleuresis quid 232. b. 57
 Pleuresis est duplex 232. b. 61
 Pleuresis causa 233. a. 17
 Pleuresis signa 233. b. 47
 Pleuresis signa prognost. 236. b. 51
 Pleuresis cura 238. a. 5
 Pleuriticorum diæta 242. a. 25
 Phrenesis quid 24. b. 34
 Phrenesis signa 25. a. 44 et 26.
 Phrenesis est duplex 25. b. 39
 Phrenesis causæ 25. b. 56
 Phrenesis prognostica 27. b. 28
 Phrenesis cura 28. b. 48 et 29 et 30 et 31 et 32.
 Pruritus lachrymalium. 118. b. 2
 Pruritus & scabies oculorum differunt. 103. a. 40
 Pruritus oculorum causæ 103. b. 8
 Pruritus signa 104. b. 42
 Pruritus prognostica 104. b. 58
 Phlebothomia in phrenesi 30. a. 54
 Phlebothomia quomodo & quando debet fieri 238. b. 45
 Phlebothomia uenarum cordis pag. 269. b. 28.
 Phlebothomia in catarrho quando necessaria 85. a. 10
 Phlebothomia in pleuresi a qua parate debet fieri. 238. b. 58
 Phlegmatici humoris euacuatio pag. 34. a. 10. & 39. a. 34.
 Pulmo quid. 219. a. 59
 Pulmonis compositio ibidem
 Pulmonis ulcerum mundificatio & absterfio 263. b. 56
 Pulmonis apost. cura 248. a. 56
 Pulmonis ulcerum causæ. 258. a. 29
 Pulmonis passio est tussis 221. b. 5
 Pulmonis diuissio. 247. b. 46
 Pulmonis apostm. signa 246. b. 42
 Pulmonis ulcera 253. b. 20
 Pulmonem confortantia 216. a. 1
 Polypus narium 184. b. 44
 Polypī species 185. a. 21
 Polypī causa 185. a. 35
 Polypī prognostica. 185. a. 60

I N D E X

Polypi cura septem exigit intentio-
nes. 186 a 20.
Polypi cancerosi cura. 187 a 25
Polypi medicamen expertū 186 b 58
Podagra uide in dictione Gutta.
Punctionis causæ. 382 a 38
Punctionis signa. 385 a 51
Punctionis cura. 385 b 26.
Pustula quid. 96 a 37.
Pustularum & ulcerum cornæ cu-
ra. 98 a 10.
Pustularum regimen curatiuum exi-
git triplex regimen. 99 b 30.
Pustularum causæ. 97 b 4.
Pustularum signa. 97 b 17
Pustularum prognostica. 97 b 62
Pustula linguae. 199 a 1
Pustularum linguae species. 199 a 9
Pustularum linguae signa. 199 a 39.
Pustularum linguae prognostica 199 b 20
Pustularum linguae cura. 199 b 27.

R
Enes quid. 457 b 31.
Renum anatomia. 457 b 31
Reni apostemata. 471 a 50.
Reni apostematū causæ. 471 b 51
Reni apostematū signa. 472 a 23.
Reni apostematum prognostica.
472 a 47.
Reni apostematum cura. 472 b 6
Rugitus & eius cura 380 b 40.

S
Anguis quomodo mundifican-
dus. 106 a 61.
Sanguinis sputum. 251 b 14.
Sanguinis sputum unde. 251 b 18
Sanguinis sputum duplex. 251 b 28
Sanguinis sputi causæ. 251 b 38
Sanguinis sputi signa. 252 a 36
Sanguinis sputi prognost. 253 b 40
Sanguinis sputi cura, diffuse 253 b 61
Sanguinis sputo notanda. 253 b 8
Sanguinem mundificantia. 256 a 16
Sanguinis mictus fit quadrupliciter.
279 b 7.
Sanguinis mictus causæ. 479 b 54.
Sanguinis mictus signa. 479 b 62
Sanguinis mictus pronost. 408 b 16
Sanguinis mictus cura. 480 b 30.
Sanguisugarum cura. 205 a 30
Sanies quid. 166 a 35.
Sanies est duplex. 166 a 37
Saniei causa. 166 b 39.
Saniei cura. 167 a 59
Sebel quid. 105 a 1
Sebel est duplex. 105 a 34.
Sebel signa. 105 a 56
Sebel causa. 105 a 44.
Sebel prognostica. 105 b 37
Sebel cura, diffuse. 105 b 40.
Sitis quid. 335 b 1
Sitis cuiusque causæ. 335 b 19
Sitis causa sitis. 322 b 57
Sitis prognostica. 336 b 1
Sitis cura. 336 b 61

Sitis sedantia sunt octo modi. pag.
336 b 53
Sitis diminutionis & ablationis cau-
sæ, & cura. 338 a 6
Sitis sedantia. 31 b 5
Singultus quid. 321 a 34
Singultus causæ. 322 b 2
Singultus signa. 322 b 57
Singultus prognostica. 223 a 41
Singultus cura. 322 b 13
Sies maturans pustulans. 99 a 60
Sies carnem generans, in ulceribus
mundificans & sigillans pag.
99 b 3
Sies ulcerum uestigia subtilians.
99 b 10.
Sies scabiei, sebel, ungulae & albedi-
ni conferens. 109 b 49
Sies scabiei, oculorum & ulceribus
conferens. 107 b 10
Siphac anatomia. 485 a 1
Scotomia & vertigo. 19 b 45
Scotomiae spēs sunt duplices. 22 a 23
Scotomiae causæ. 22 a 34.
Scotomiae signa. 22 b 561
Scotomiae prognostica. 23 a 54.
Scotomiae cura. 23 a 62.
Sciaticus siue ischiaticus dolor quis
502 b 60.
Sciaticæ species. 503 a 6
Sciaticæ causæ. 503 a 27
Sciaticæ signa. 503 a 43
Sciaticæ prognostica. 503 a 52
Sciaticæ doloris cura, diffuse 503 b 30
Spasmus quid. 56 b 29
Spasmus duplex. 56 b 56
Spasmi causæ. 57 b 56
Spasmi signa. 58 a 17
Spasmi prognostica. 58 b 1
Spasmi cura diffuse. 59 b 40
Spasmi & epilepsie signa distincti-
ua. 58 a 17
Splenis anatomia. 375 b 20
Sermo uniuersalis de ægritudinibus
splenis, ubi de spēbus, signis, cau-
sis, prognosticis & cura in genera-
liter tractata. 356 a 50
Splenis dolor. 377 a 45
Splenis apostemata. 377 b 16
Splenis apostematum & duritiei
causæ. 377 b 46
Splenis apostematis signa. 378 a 9
Splenis apostematum prognostica
378 b 38
Splenis apostematū cura. 379 a 19
Spleneticorum diæta. 380 a 60
Splenis oppilationis causæ, & cura.
380 b 33.
Splenis intiationis signa, causæ & cu-
ra. 380 b 53.
Splen quando tumidus quando non.
359 b 39.
Synanchia seu angina quid 213 b 15.
Squinantiae species. 213 b 50.
Squinantiae causæ coniunctæ antecē-
dentes & primitiue. 214 a 19.
Squinantiae signa. 214 a 27.

Squinantiae prognostica. 215 a 9.
Squinantiae cura diffuse. 215 b 6.
Stercus quid. 449 a 11
Stomachi & meri anatomia pag.
284 b 16.
Stomachus quid & quare ordinatus
pag. 285 a 21.
Stomachi solutio cōtinua quibus cor-
gnocestur. 287 b 27
Stomachum confortantia & confir-
mantia. 291 a 31. et 293 a 26. et
396 b 21.
Stomachi regimen. 293 a 21
Stomachi cibus corrumpitur per uir-
tutem digestiuam. 383 a 41
Stomachi dyscrasia quibus corrigi-
tur, diffuse. 305 a 25
Stomachi dolor. 307 a 40
Stomachi doloris causæ sunt 307 a 50
Stomachi doloris signa. 308 a 51
Stomachi doloris prognostica pag.
308 b 49.
Stomachi doloris cura diffuse.
309 a 30.
Stomachi regimen. 293 a 21
Stomachi apostematum species, si-
gna, causæ, prognostica. 315 b 25
Stomachi ulcerum species, signa, cau-
sæ & prognostica. 316 b 30
Stomachi oris confortatio. 328 b 59
Stomachi uentositatis causa est du-
plex. 310 a 68
Stomachi emplastrum confortans.
64 b 10.
Stupor quid. 50 b 36
Stuporis species. 51 a 18
Stuporis causæ. 51 a 31
Stuporis signa. 51 b 30
Stuporis prognostica. 51 b 43
Stuporis cura. 52 a 53.
Stuporis & tremoris differentia.
53 b 26.
Scirbi anatomia. 384 b 25
Scirbus quid. 384 b 25
Scirbi officium. 384 b 28.
Scabiei & pruritus oculorum species,
causæ, signa, & pronosti. 103 a 37.
Scabiei & pruritus differentia pag.
103 a 39.
Soda. uide plura in dictione cepha-
la. 6 b 16
Somnus triplex. 41 b 2
Somnifera. 125 a 51 & 265 a 30.
Somnus quid. 40 b 30
Somni causæ. 41 a 19
Subeth, Sahara, Dormitatio uigila-
tia. 35 a 25.
Subeth quid. 40 b 22.
Subeth duplex. 42 a 34.
Subeth causæ. 42 a 41.
Subeth signa. 42 b 14.
Subeth prognostica. 42 b 54.
Subeth cura. 42 b 56.
Sudorem prouocantia. 499 b 54.
Sudoris conditiones. 234 b 49.
Synopsis signa. 276 b 25.
Synopsis quid. 274 a 45.
Synopsis causæ. 275 b 1.
Synopsis

INDEX

Syncopis prognostica. 277 a 55.
Syncopis cura. 281. b 12. et. 282. et
283. et. 284.

T


Tetanus quid. 58. b. 15
Tetani species 58. b. 50.
Tetani signa. 59. a. 41
Tetani prognostica. 59. a. 55
Tetani cura. 59. b. 41
Tetanos quid. 411. b. 35
Tetanos cura. 411. a. 47
Trachea quid. 219. b. 1.
Tussis propria passio pulmonis pa-
gin. 221. b. 5.
Tussis quid. 220. b. 21.
Tussis causa est duplex. 222. a. 37
Tussis signa. 222. b. 25
Tussis prognostica. 223. a. 16
Tussis cura, diffuse. 223. a. 21
Tympanitis signa, causae & prognos-
tica. 364. b. 55
Tympanitis cura. 371. a. 1.
Tremor quid. 52. b. 1
Tremoris species. 53. b. 36
Tremoris causae. 53. b. 57
Tremoris signa. 54. a. 33.
Tremoris prognostica. 54. a. 42
Tremoris cura. 54. a. 55
Tremoris & ictigationis differen-
tia. 53. b. 20
Tortura oris quid. 54. b. 50
Torturae species. 55. a. 32.
Tortura signa. 55. a. 57.
Torturae causae. 55. a. 36
Torturae prognostica. 55. b. 40
Torturae cura. 55. b. 50.

V

Varicum cura. 508. b. 30.
Vertigo quid. 19. b. 56.
Vertigo capitur quadrupli-
citer pag. 19. b. 56.
Vertiginis species sunt duplices pag.
22. a. 24.
Vertiginis causa duplex. 22. a. 35.
Vertiginis & epilepsiae differentia. 22. b. 61.
Vertiginis signa. 22. b. 55.
Vertiginis cura diffusa. 23. a. 62
Vesicae anatomia. 458. b. 12

Vesica quid. 458. b. 12.
Ventositatis in stomacho est causa
duplex. 310. a. 63
Ventositatis causae. 310. a. 63.
Ventositatis doloris cura. 313. b. 2.
Ventositatem soluentia. 310. a. 7.
Ventositatis digestionis impedimen-
tum. 300. a. 35.
Venenositas quibus corrigitur pag.
206. a. 42.
Veneni medicamenta. 270. b. 55.
Vlcera pulmonis. 257. b. 31.
Vlcerum pulmonis mundificatio et
absterfio, diffuse. 263. a. 44.
Vlcerum cura, diffuse. 320. a. 25.
Vlcerum matricis cura. 508. a. 6.
Ventriculi fluxum retinentia. 398. b. 25
Ventriculi solutiua in cephalica. 8 b. 22.
Ventriculi solutiua. 305. a. 62. et 312. b. 25
Venter quibus soluitur. 291. b. 22.
Ventriculi fluxus curatio, per logum, p
cellum. 408. a. 30.
Vermium cura. 505. b. 35.
Visus debilitas diffuse. 25. b. 28.
Visus debilitas habet tres species.
116. a. 19.
Visus debilitatis causae duplices, dif-
fuse. 116. a. 52.
Visionis corruptae causae, diffuse.
118. b. 55.
Visus debilitatis signa, diffuse.
119. b. 2.
Visus debilitatis aut defectus pro-
gnostica. 123. b. 34.
Visus debilitatis cura, diffuse. 123.
b. 43.
Visum conseruantia. 88. b. 33.
Visio vera quid requirat. 136. b. 36
Vomitum quid. 285. b. 60.
Vomitum duplex. 285. b. 61
Vomitum causae. 286. a. 36.
Vomitum signa. 287. a. 44.
Vomitum prognostica. 288. a. 27
Vomitum medicinae propriae. 288. b. 50
Vomitum quibus morbis nocet aut
confert. 289. 25
Que obseruanda sunt regimina in vo-
mitu curando. 188. b. 48
Vomitum cibalis cura, diffuse. 290.
a. 15.
Vomitum humoralis duplex. 292 a 16
Vomitum critici cura. 292. a. 18
Vomitum symptomatici cura. 292.
a. 25.
Vomitum praegnantis causa & cura.
293. b. 21.
Vomitum sanguinis causa & cura.
294. a. 42.
Vomitua. 289. b. 50. & 231. a. 38. &
34. a. 58.
Vomituum leue. 297. b. 22. &
294. a. 16.
Vomitum retinentia, diffuse. 299. a. 12
Vlcus quid. 166. a. 25.
Vlcera pectoris consolidantur multis
de causis. 257. b. 31.
Vlcerum pulmonis causae. 258. a. 29
Vmbilici augmentum quid. 486 a 60
Vmbilici eminentia est septuplex.
486. b. 7.
Vulue rhagadiarum cura. 597. b. 26.
Vngula oculi quid. 108. b. 60.
Vngulae oculi species. 109. a. 54.
Vngulae oculi causae. 109. b. 19.
Vngulae oculi prognostica. 109. b. 31
Vngulae oculi cura. 109. b. 36
Vuluae aggritudines sunt quatuor pa-
gin. 202. a. 48
Vuluae casus. 202. a. 57.
Vuluae casus signum. 202. b. 25
Vuluae casus cura. 202. b. 55
Vuluae aggritudinum cura, diffusa.
203. a. 24.
Vrinae indicia. 234. b. 20
Vrina nuncians apoplexiam. 37 a 51
Vrinae ardor. 476. b. 59
Vrinae ardoris causae. 476. b. 63
Vrinae ardoris signa. 477. a. 26.
Vrinae ardoris prognostica. 477 b 2
Vrinae ardoris cura, diffuse. 477.
b. 14.
Vrinae fluxus cura. 505. b. 1
Vrinandi actio dupliciter impedi-
tur. 459. a. 48
Vrinam retinendi actio tripliciter im-
peditur. 459. b. 10
Vrina impeditur septem de causis.
pag. 459. b. 32
Vrinae difficultatis signa. 460. b. 5.
Vrinae difficultatis prognostica pa-
gin. 461. a. 57
Vrinae difficultatis cura, diffuse pag.
461. b. 16.


Finis.



INSTRVMENTORVM CHIRVRGICORVM

formæ, quibus auctor hic, hoc in libro passim utitur.

- a Acus argenteæ forma habetur, folio. 249. a. 43.
- b Forceps pro extrahendo res in aurē ingressā picigrola dicta. in capite de egritudi. aurī.
- c Speculum ad aperiendas nares. in capite de egritudinibus nariū.
- d Forceps pro extrahendis dentibus pulicanū dicta, folio. 196. b. 18.
- e Forcipum pro extrahendis dentibus forma, folio. 196. b. 18.
- f Forceps pro extrahendis fragmentis, quod Rostrum Ciconiæ dicunt, folio. 196. b. 18.
- g Cannula pro inflando puluere ad uuulam. 203. a. 34.
- h Speculum ad linguam comprimendam, folio. 204. b. 60.
- i Cannula pro uuula cauterio amputanda, folio eodem.
- k Incisorium aurē uel ferrū ignitū: cuius auriculæ g sint ad angulos obtusos deflexæ, fo. eodē
- l Instrumentum de plumbo, folio. 206. b. 14.
- m Cauterium à forma cuspidum triangulum constituentium, dictum triagularum, folio 500. a. 55. & folio 497. b. 46.
- n Cauterium formam rotæ habens, folio. 505. a. 9. & folio. 497. b. 43.
- o Cauterium rotæ similitudinem habens pro coxendicibus adurendis, folio. 497. a. 43.



IO. ARCVLANI VE RONENSIS IN NONVM LIBRVM ALMANSORIS EXPOSITIO.



EXPOSITVRVS nonum Almanforis reiectis superfluis in librorum principiis inquiri solitis, duo tantum nostro proposito opportuna paucis expediā. Primum quidem erit de laudibus & celebritate Rasis qui hunc librū ædedit, quem Regi Almanfo ri dedicauit. Haud enim dignum censuerim eorum, qui humanum genus sibi obnoxium perpetuoq; deuinctum ingenibus meritis æternisq; fecere beneficiis nomina in obscuro iacere finire. Ex quibus permaximè Rasm fuisse arbitror. Neminem enim pace aliorum dixerim siue Græcos aut Arabes, siue Chaldæos, aut Latinos mente reuoluo, fuisse existimo, qui tantū medicinz adiecerit, cuiusue studijs assiduusq; laboribus tantum adoleuerit, siue rerum copiam, totiusq; negocij medicinalis in uno uolumine redacti immensitatem consydero, qualis est liber, quem cōtinens apellauit, siue breuitatem, remq; medicinalem exiguo perstrictam uolumine summa cum elegantia, & uerborū uenustate, qualis est hic liber, nomine Regis Almanforis nuncupatus, quem optimis approbatissimisq; sententijs referentem cernimus. Quare nos illi, totumq; genus humanum plurimum debere profiteor. Ideo unusquisq; pro uirili, debet Rasi laudes eiusq; uoluminis celebritatē, quæ iuxta peripateticorū principem ad illius etiam defuncti gloriam ac felicitatem aliquid momenti allatura sunt, cum id in ethicis multo plus referat, quàm in tragœdijs scelera patrata narrari: ut quasi iam patrentur. Secundum est de subiecto huius libri, eiusque immensa utilitate. Totius enim huius libri subiectum est corpus humanū arte sanabile, quod totius medicinz esse subiectum perhibetur. Huius uerò noni subiectū est corpus humanum arte sanabile secundum passiones particulares singulis membris appropriatas. Ex quo huius libri immensa iam liquet utilitas: cum per eum omnium ægritudinum à capite usq; ad pedes nobis notitia salusq; afferatur. Quis est ergo qui pro huius libri scientia capefcenda labores metiri debeat, quis non omnia patientissimè ferat incommoda: Cum decus, opes, gloriam, cæteraque exteriora ornamenta, sine quibus non contingit esse felicem, per eum nobis polliceri ualeamus. Si nim pro quæstionibus Iacobi, aut Vgonis Senensis tantum ocij tēporisq; terimus summa cum animaduertentia, animique applicatione, quarum notitiam parum decoris, aut lucri nobis allaturam speramus. Quanto magis pro huius libri sciētia capefcenda inuigilare debemus, ex quo tantorum copiam bonorum assecuturos nos speramus. Credite mihi experto, credite quicquid honores, opes, gloriam, apud homines gratiam consequi desyderat, huic libro intendat: facile enim breui temporis decursu hic omnia asse-

quetur. Sed de his satis, nunc agamus quod instat.

Continuatur hic nonus ad præcedētes in hunc modum. Postquam Rasis in primo libro determinauit de iuuamentis membrorū & anatomia corporis humani. Et in secundo notificauit complexiones, & humores, & physionomiam. In tertio de uirtutibus medicinarum et ciborum. In quarto de conseruatione sanitatis. In quinto de decoratiōe. In sexto de regimine iter agētium. In septimo de aggregationibus & summis artis chirurgiæ. In octauo de uenenis eorumque sanatione. Placuit ipsi in hoc nono determinare de ægritudinibus particularibus singulis membris appropriatis à capite usq; ad pedes. Tandem in decimo determinaturus de febribus, crisi & diebus criticis, ex quibus omnibus tota medicina integratur. Ægritudines autē, de quibus hic agitur, duobus modis dicuntur particulares. Primò particularitate prædicationis ad differentiam ægritudinum, de quibus agit Auicenna in primo can. quæ dicuntur uniuersales uniuersali tate prædicationis. Secundo modo dicuntur particulares quia singulis membris appropriatæ ad differentiam febrium, apostemarum, & cæterarum ægritudinum, de quibus Auicenna agit in 4. quæ nullo membro appropriantur. Illæ enim dicuntur communes communitate indifferentiæ.

Diuiditur autē more quorundam hic liber in quinque partes. In prima agit de ægritudinibus membrorum animalium. In secunda agit de ægritudinibus membrorum spiritualium. In tertia de ægritudinibus membrorū naturalium. In quarta de ægritudinibus membrorum generatiuorum. In quinta de ægritudinibus membrorum exteriorum. Partes facile patere possunt, quanq; conformius loquendo menti Rasis, hic liber diuidendus est in nonaginta quinque partes, sicut sunt nonagintaquinque capita. Cum imple, ut patet ex ordine suo, nunquam diuiserit præsentem librum in sen. neque in tractatus.

Intentio mea in expositione præsentis libri est. Primò compēdiosè ponere anatomia membri, de cuius dispositionib. agendum est. Deinde circa unūquodq; capitulum inuestigare. Primò quid nominis & quid rei dispositionis de qua agitur, quod faciā circa rubricam, secundo species, tertio causas, quarto signa tam generalia, q; particularia, quinto prognosticum, quæ quatuor faciā circa eam partē, in qua Rasis agit theoricè de his dispositionibus, sexto ponā curā memorādo intētiōes curatiuas: necnō medicinas tam simplices, q; cōpositas illas intentiones perficientes, quod ultimum faciā circa eam partē, in qua Rasis ponit harum dispositionū curā. In quibus omnibus me conformabo Rasi, Aui. Gal. Mesue, cæterisq; authoribus & doctoribus illustribus. Et si quasi signa propria, aut medicinz experte apud me fuerint quibus confidam, has subiungam secundum oportunitatem. Ille autem sit nobis in auxiliū, à quo coelum & tota natura pendet.

DE ANATOMIA CAPITIS.

Sequendo igitur ordinem præmissum, ab anatomia capitis est incipiendum. Pro qua uidentus est primò situs capitis. Quod fuit in alto constitutum propter uisum, non propter alium sensum, non propter cerebrum, ut uoluit princeps de intentione Gal. in principio tertij can. Oculi enim qui est custos corporis debuit esse in alto constitutus, ut à longe fugienda et consequenda faciliè possit intueri. Qui oculus debuit esse coniunctus capiti, ut à cerebro per nervos opticos reciperet spiritum uisibilem: & e contrario ut ab oculo deferrentur species uisibiles per eosdem ad sensum communem, quia etià nerui optici compositionem oculi ingrediuntur, ut infra uidebitur: ut etiam oculi reciperent motum à secundo pari neruorum cerebri, quapropter oportuit caput propter oculum esse in alto constitutum. Deinde uidentur est quantitas. Fuit enim caput magnum, quia debuit magnum cerebrum contineri, et maius in homine quàm in alio animali respectu propriæ molis. Fuit autem factum figuræ sphericæ ex utraq; parte compressæ ut sit magis tutum ab extrinsecis nocentibus: & quia figura spherica est omnium capacissima. Fuit autem creatum aliquantulum oblongum ut tres uentriculi in eo conuenientius distinguerentur secundum longitudinem. Numerus autem partium eius est denarius, primò enim occurrunt capilli, secundò cutis, tertio caro, quarto panniculus dictus almochati, quinto cranium, sexto panniculi, dura mater, & pia mater, septimo substantia medullaris cerebri, octauò duo panniculi sub cerebro, nonò rete mirabile, decimò os basilare, quod est basis & fundamentum totius capitis. Capilli autem fuerunt grossi multi & longi, tum ad tutelam capitis, tum ad decorè ordinati. Cutis etiam fuit grossa, quia capilli in ea fixi debuerunt habere radices longas & grossas, ut etiam esset elypeus ossis cerebri. Caro autem reperta fuit in fronte & temporibus, non in omnibus partibus capitis, & fuit musculosa ad dandum motum illis partibus. Almochati uerò ordinata fuit ad tutelam ossis & cerebri, & etià ad suspendendum duram matrem, cum qua colligatur, & ex qua generatur, mediantibus quibusdam uillis, neruis et ligamentis, qui egrediuntur à dura matre per commissuras cranei ad constitutionem huius panniculi, & hoc ne dura mater cerebrum comprimeret. Propterea in actu pratico caueat chirurgici ne incidant hunc panniculum in locis commissurarum in quibus multum colligatur cum dura matre, & præcipue in commissura coronali. Nam nocumentum comunicatum dure matri faciliè posset esse mortale. Cranium uerò fuit ex quinque ossibus compositum, habens duplicem tabulam, superiorem & inferiorem, unum os est in fronte, alterum posterius, & duo in lateribus, & unum inferius sub cerebro dictum basilare. Fuerunt autem plura ossa, et non unum, ne nocumentum comunicatum uni parti, communicetur toti. Et etiam ut ex coniunctione quatuor ossium superiorum tres generentur commissuræ. Prima coronalis ad modum coronæ, existens in parte anteriori capitis. Secunda lambdæ literæ similis in parte posteriori existens. Tertia sagittalis penetrans rectè per mediū capitis, à commissura coronali scilicet ad lambdam secundum capitis longitudinem.

Et tres fuerunt commissuræ ueræ, quia penetrant utrinque. Sunt etià & alię duæ commissuræ non ueræ à lateribus, dicte non ueræ, quia non penetrant uidelicet os utrinque, sed solum primam tabulam. Iste autem commissuræ fuerunt ferratiles, id est ad modum dentium serræ coniunctæ ut essent firmiores. Non autem fuerunt nodales, quia motu non indiguerunt. Et ab Auicenna uocantur adorem, & fuerunt ordinatæ, ut fumi & uapores ad caput adscendentes facilius possint resolui, & ut uirtus medicinarum tempore necessitatis applicatarum capiti facilius penetrarent in profundum. Et propterea in actu pratico cum medico uolunt cerebrum alterare, aut aliquid ab eo resolui, debet ponere medicinas super commissuris. Panniculus autem dura mater immediate supponitur craneo, qui est panniculus satis durus, grossus, & foris, undique completens cerebrum non immediate. Nam immediate post ipsum sequitur pia mater, immedie undique completens cerebrum, quæ pia mater est panniculus satis mollis & subtilissimus. Hæc autem gradatio facta fuit ne mole lædatur ex contactu duri. Hi autem duo panniculi se profundant in cerebro usque ad uentriculos eius diuidentes cerebrum in duas medietates secundum longum. Diuidentes etiam cerebrum posterius ab anteriori, quod factum fuit ne nocumentum uni parti adueniens faciliè comunicetur toti. Sed profundatio pię matris ad intrinseca cerebri modo iam dicto fuit propter nutritionem cerebri. Sunt enim in pia matre disseminatæ uenæ multæ, & per ipsam sustentatæ, ordinatæ ad nutriendum cerebrum. Substantia autem medullaris cerebri fuit alba, mollis, uiscosa, per hæc ordinata in nutritionem & debitam generationem neruorum, & nuchæ inde prodeuntium, uerum cerebrum anterius est humidius & mollius quàm cerebrum posterius & minus frigidum. Hoc autem factum fuit, quia ex cerebro anteriori debent prodire nerui sensus, qui sunt molliores, ex posteriori nucha et nerui motus qui debent esse duriores. In cerebro autem sunt tres uentriculi distincti secundum longitudinem eius. In prima parte cerebri est uentriculus primus magnus diuisus in duas medietates dextram scilicet & sinistram, quarum unaquæque est maior alijs duobus uentriculis. Hic autem uentriculus primus est sedes & organum duorum sensuum interiorum, scilicet sensus communis & phantasie. Est enim sensus communis in prima medietate secundum longum, phantasia in altera, qui sensus communis habet recipere species sensibilibus exteriorum eas componendo & diuidendo, non tamen per copulam uerbalem. Phantasia uerò habet pro paruo tempore huiusmodi species referuare. Et in fine huius primi uentriculi sunt duæ substantiæ, una quæ est sicut ancha, altera sicut est uermis subterraneus, longa, subtilis, rubea, contrahibilis & elongabilis, & ideo uermis dicta est. Nam cum elongatur, clauduntur anchæ, & clauditur uentriculus secundum eius partem posteriorem, secundum quam coniungitur secundo uentriculo. Et similiter clauditur principium secundi uentriculi, ita ut species non possint transire de uno uentriculo ad alium, quod fit cum homo uult cessare à cogitatione, & operationibus sensuum exteriorum: cum autem uermis ille contrahitur, fit harum anchorarum dilatatio, ita ut species possint transire de uno uentriculo ad

lo ad alium, cum homo aggredditur cogitationem. Ventrículus autem medius est subtilis & longus, & est sicut deilim, id est, transitus de primo uentriculo ad tertium. Est enim hic uentrículus utriusque contiguus hic autem est sedes & organum duarum uirtutum, scilicet cogitativæ, quæ habet componere, diuidere, etiam cum copula uerballi, & ex uno aliud inferre, & in secunda medietate est existimatiua eliciens insensata ex sensatis. Tertius uero uentrículus est in posteriori cerebro, figuræ pyramidalis, latior secundum partem contiguam secundo uentriculo, gradatim se constringendo procedens usque ad originem nuchæ, quod factum fuit, ut secundum extremum magis latum reciperet species & intentiones. Et secundum eius strictum ipsas melius conseruaret: est enim organum uirtutis memoratiuæ, quæ est purè conseruatiua, & secundum hanc figuram, figuratur cerebrum posterius. Et hi tres uentriculi sunt distincti per medium secundum eorum longitudinem, licet hæc distinctio sit sensui manifesta solum in primo uentriculo: imò etiam nucha eodem modo est distincta per medium usque ad eius finem: hoc autem factum fuit, ne nocumētum partis communicetur toti. Sed attendendum, quod duo primi uentriculi sunt interius inuoluti panniculo subtilissimo dicto pia mater. Vltimus autem uentrículus nō, quia eius substantia est satis dura, seipsa conseruabilis, sed substantia duorum primorum, quia satis mollis, indiguit conseruante. Sub fine autem primi uentriculi, & principio secundi descendendo reperitur quoddam foramen rotundum, oblongum aliquantulum, dictum lacuna siue embotus: in cuius medio est foramen strictum, quod diagonaliter tendit ad palatum, & eidem occurrit uia directā, quæ à medio uentriculo directè descendit ad colatorium, quod est foramen in medio ossis basilaris, ordinatum ad expurgationem superfluitatum cerebri. Et circa hoc foramen sunt carnis eminentiæ magnæ, rotundæ, ordinatæ ad sustentandum uenas uel arterias ascendentes à rete mirabili ad uentriculos dictos, & ideo in basi eius apparent glandulæ, quæ sunt iuxta rete mirabile eminentes. Et per istam lacunam uentriculi anteriores, & cerebri, quantum ad modum eius, expurgant suas superfluitates, licet quantum ad partes anteriores magis purget suas superfluitates, per colatoria narium. Istud autem foramen, quia latum est superius: inferius uero strictum ab Haliaba, uocatur embotum. Caput autem rosæ est meatus quidam expulsiuus superfluitatum cerebri amplius superius, strictus inferius, ideo caput rosæ dictus est, & hic est unus ex meatibus terminatis ad lacunam. Torcular autem sunt duæ uenæ grossæ, circa principium lacunæ, à quibus rami cantur uenæ parue per lacunam. Tres autem sunt uisæ expulsiuus superfluitatum à cerebro. Vna est, ossa narium in extremitatibus suis perforata, tum ad expulsiuonem à parte anteriori cerebri, tum ad receptionem specierum rerum odorabilium, necnon fumalis euaporationis ordinata. Secunda, terminat ad finem primi uentriculi, & principium secundi. Tertia, ad finem secundi uentriculi, & principium tertij, per quas cerebrum secundum eius partes medias, suas purgat superfluitates, qui terminantur ad lacunam, iam dictam, & ideo oblonga creata fuit. Cerebrum autem

secundum eius partem anteriorem habet duo addita-
menta, quæ sunt sicut duæ papillæ mammillares, quæ
uocantur carunculæ mammillares, & sunt circumuo-
lutæ panniculo, subtili scilicet pia matre, & terminan-
tur ad ossa narium, & sunt organum olfactus. Et à
cerebro oriuntur septem paria neruorum. Primum
est nerui optici, grossiores quàm reliqui nerui, or-
tum habentes à uentriculo anteriori, & procedentes
uersus oculos, & antequàm egrediantur piā matrem,
uniuntur ad inuicem, & in loco unionis sunt perfora-
ti, & communiter tenetur quod non cruciantur, imò
post unionem dexter tendit ad dextrum, et sinister ad
sinistrum. Horum autē sunt tria iuuamenta, primum
deferre spiritus uisibiles ad oculum: secundum species
uisibiles ab oculo ad sensum communem, & ideo u-
niuntur, ut species delatæ à duobus oculis uniātur, ne
una res appareant duæ: tertium, quia ex ipsis genera-
tur retina & tela aranea, ut infra dicitur in anatomia
oculorum. Secundum autem par neruorum, quod
est post istud ueniens ad oculos, concurrat ad compo-
sitionem musculorum oculi, propterea dat oculis
motum uoluntarium. Tertium uero par, diuiditur
in plures partes, quarum una uadit ad partes faciei,
ad dandum sensum & motum illis partibus. Et huius
etiam una pars tendit ad linguam, ad dandum illi gu-
stum secundum Auic. Reliqua pars miscetur cum
quarto pari, & descendens per foramen ingressionis
uenæ subethicæ per ceruicem, ad diaphragma & sto-
machum, dat sensum uisceribus. Et inde, secundum
Mundinum, oriuntur nerui reuersiui, licet apud Auic.
à tertia parte sexti paris orientur, qui sunt proprii ner-
ui uocis. Reliqua uero pars quarti paris tendit ad pa-
latum, ad dandum ei sensum. Post quod est quin-
tum par, quod tendit ad ossa petrosa, quæ sunt pro-
pe aures, & ex ipsis in foraminibus eorum genera-
tur panniculi, qui sunt instrumenta auditus. Postea
est sextum par diuisum in tres partes, quarum una ua-
dit ad musculos gulæ, secunda ad musculos spatulæ,
tertia maior cæteris, ad uiscera descendit in ascensio-
ne uenæ subethicæ, & est illi annexa, ex qua in rectitu-
dine epiglottidis separantur rami, qui ad musculos ue-
niunt epiglottales, quorum capita sunt ad superiora,
qui epiglottim et ipsius eleuant cartilagineas. Cumq;
epiglottim pertranseunt ex eis ascendunt rami, qui
ad musculos cymbalarem fistulam claudentes ueni-
unt, & dicuntur nerui reuersiui, & sunt proprii nerui
uocis. Reliqui uero huius rami spargitur in diaphra-
gmate, pectore, corde & pulmone, & associatur ei,
quod ex parte tertia tertij paris descendit ad uiscera.
Postea est septimū par quod oritur à postremo cerebri
ueniens ad linguā, & dat illi motum uoluntarium: di-
cit autē Auic. quod oritur à termino communi inter
cerebrum & nucham hominis, & per eum prima duo
paria oriuntur à cerebro anteriori, tertium à termino
communi inter cerebri anterius & posterius, reliqua
quatuor à cerebro posteriori: sic enim in anatomia
nuchæ secundum plurimum uisum est. A posteriori
autem cerebro oritur nucha diuisa in duas medietates
per panniculum subtilissimum, ne nocumētum
unius partis comunicetur alteri, & propterea accidit
paralysis in una parte, altera non nocita. Ab hac cau-
tem descendente per foramina 30. spondilium, oriun-

tur 30. paria neruorum, & quia à cauda oritur unum impar, erunt 30. paria neruorū, & unum impar, quæ tendunt ad diuerſa membra, ad dandum ſenſum, & motum uoluntarium. Sub cerebro ſunt duo panniculi proportionati duræ matri & piæ matri, de quibus ante: ita ut hi panniculi undiq; cerebrum utrinq; inuoluant. Eleuatis autem his occurrit rete mirabile, quod eſt in medio oſis baſilaris è directo colatorij contextum textura fortiffima, & miraculoſè duplicata ex arterijs ſubtiliffimis & adinuicem cōtextis, quæ ſunt rami apoplecticarum aſcendentium, & in iſto rete, ſiue in uenis ipſius continetur ſpiritus uitalis aſcendens à corde ad cerebrum, ad hoc, ut fiat animalis, qui ut melius conuertatur, eſt hoc modo ad minima diuiſus in his arterijs ſubtiliffimis: ipſe tamen in uentriculis poſtea magis perficitur, & hæc eſt una ex cauſis, quare rete mirabile poſitum fuit ſub cerebro: eſt & alia cauſa, quia eſt dignum multa cuſtodia, quapropter natura locauit ipſum in loco tutiſſimo: eſt & tertia cauſa, ut humiditates aliquæ in cerebro condenſatæ, ex uaporibus ad ipſum aſcendentibus, & cadentes ſuper hoc rete, aliquam oppilationem cauſarent, quæ eſſet cauſa ſomni, & iſtud rete ſuſtentant duæ carnes glandoſæ factæ principaliter ad ipſum ſuſtentandum, & replendum uacuitates, & ad ſuſtentandum duas uenas aſcendentes ad cerebrum, aut duas arterias aſcendentes ad uentriculos cerebri. Ex his potes comprehendere unum modum apoplexiæ prouenientem ſcilicet ex oppilatione huius retis, & arteriarum apoplecticarum aſcendentium, præter illum, qui communiter euenit ex oppilatione uentriculorum cerebri, inter quos eſt difficile diſtinguere, ſed de his in capite de apoplexia. Poſtea ſequitur oſ baſilare, quod eſt durius cæteris, tum quia debuit alia ſuſtinere, tum ne putreſcar cum ſubmiſſum ſit humiditatibus à capite deſcendentibus. Hoc autem eſt diuiſum in oſſa petroſa, & narium, & oculorū, & duo oſſa lateralia, quæ uocantur oſſa paria. Ex his liquet caput eſſe complexionis frigide, temperatæ in paſſiuis, propter complexionem humidam cerebri, contraoperantem ſiccitati oſium & panniculorum, & quod poteſt pari omnigenus ægritudinis ſimplicis & compoſitæ. Hæc de anatomia capitis & neruorum ſufficiant. Iam reliquum abſoluamus.

DE CEPHALÆA. Cap. I.

Circa hanc rubricam primò notandum, quòd cephalæa, cephalgia, ſoda, & dolor capitis ſunt termini ſynonymi ſignificantes hanc diſpoſitionem, de qua diuerſi authores ſub his diuerſis nominibus determinant. Ab Auic. nanq; ſo. Serapione & Meſue uocatur ſoda. Ab Alexandro uocatur cephalgia. A Raſi, Haliabate, Conſtantino, Paſſio nario uocatur cephalæa, κεφαλή græcè, caput latinè. Sed præter hos ſunt termini dolorem ſpecielem capitis importantes, ſicut nux, ouum, paſſio ſcilicet galeata, ſignificantes dolorem totius, ſatis inſeparabilem, conſuetudinarium, ab omni ferè cauſa facile excitabilem. Hemicranea dicta ab hemi, quod eſt mediū & craneum, dolorem unius laterum importat conſuetudinarium. Et ſimiliter hemipagia. Homonopagia autem dolorem quartæ partis ſignificat. Clauus uerò eſt dolor fixus, inſenſus paruam occupans partem, in

profundum ad modum clauī caput penetrans. Quantum ad quid rei, dicit Auicenna, quòd ſoda eſt læſio in membris capitis, ſed intelligendum eſt quòd eſt læſio doloroſa in toto capite aut partibus eius. Eſt enim dolor triftis ſenſatio tactiua rei ſubito, & materialiter imprimētis. Et omnis talis eſt actio corrupta. Et hæc de quid nominis, & quid rei quantum ad rubricam.

Quando rubedo, & tentio, & grauedo in facie & oculis, cum dolore capitis aſſuerint, & tactus calidus ſentitur, & pulſus fuerit magnus, ex cephalica faciendū eſt phlebotomia in parte, in qua eſt dolor, uel in qua dolor magis infeſtat. Deinde aqua roſata & oleum roſ. & acetum ſumantur, & ſimul mixta agitentur donec unum fiant, & ſuper niuem inſrigidata ſuper caput fundantur. Aeger uerò à carnibus & uino abſtineat, & comedat adeſciam citrinam, id eſt, cibus qui fit de lentibus coctis, in quibus additur acetum & parum croci, & tapſil, id eſt, cibus qui fit de lentibus coctis, cum aqua & herbis frigidis & fructibus frigidis. Venter autem ſoluatur ex mirobolanis citrinis, & prunis, & tamarindis, & ſacch. albiſſimo. Quod ſi iſta non ſufficiunt, ſemina maluauiſci in acetato poſita agitentur, quouſq; ad ſpiſſitudinem perueniant, de quibus emplaſtrum capiti ſuperponatur, ex pſillio quoq; & acetato emplaſtrum fieri utile eſt.

Diuiditur hoc caput in tres partes. In prima agit de cephalæa pendente à cauſa corporea. In ſecunda de cephalæa à cauſa primitiua. In tertia ponit quoddam remedium efficax & ultimum ubi cætera non ſufficerent: ſecunda ibi prope finem cap. Si autem cephalæa contingeret propter multam, tertia ibi. Si autem adhuc ſoda perſeruauerit. Prima adhuc in duas. In prima, agit de cephalæa per eſſentiam in capite. In ſecunda, agit de cephalæa per communiter maxime à ſtomacho. ſecunda ibi. Quòd ſi cephalæa quoti die. Prima iterum in quatuor. In prima agit de cephalæa ſanguinea. In ſecunda, de cholerica. In tertia, de phlegmatica. In quarta, iterum redit ad ponendum quædam antidota conferentia, tam in ſoda calida, quàm frigida. ſecunda ibi. Si autem cum iſtis fuerit in pulſu uelocitas. tertia ibi. Quod ſi cum ſoda non fuerit aliquid eorum, quæ diximus. quarta ibi. In cephalæa uerò cauſa. Prima iterum in duas. Primò ponit ſigna

signa cephalæ sanguinæ, secundo curam. secunda ibi. Ex cephalica facienda non est phlebotomia.

EXPOSITIO LITERÆ RASIS.

Sed nunc accedendo ad expositionem literæ Rasis. Rasis in prima parte breuitati indulgens ponit quinque signa cephalæ sanguinæ innuens, quod quando dolenti caput affuerint hæc quinque signa: tunc scilicet hæc cephalæa pender à sanguine. Primum rubedo in facie & oculis supple. aliquantulum ten dens ad fuscum et purpureum: talis est enim color sanguinis. Secundum tensio in eisdem partibus & omnibus partibus dolentibus propter præsentiam sanguinis illas partes replentis & extendentis. Tertium grauedo manifesta sensata in illis partibus, pendens ab eadē causa. Quartum tactus calidus, i. manifesta caliditas in illis partibus, sensata tam ab ægro quā à medico tangente propter multitudinem sanguinis & spirituum præsentiam. Quintum pulsus magnus maxime artieriarum capitis, licet etiam de pulsu aliarum artieriarum, qui communiter sentitur uerificari possit, & hoc propter necessitatem auctam cum fortitudine uirtutis & obedientia instrumenti. Hic autem pulsus cum hoc quod est magnus, debet esse plenus ob multum sanguinis præsentiam, & ex his literæ sententia iam manifesta est. Quibus omnibus pro complemento addite, urinam rubeam, grossam, sanguini attestantem, nisi materia ad superiora moueatur, cerebrum apostematur. Item somnum longum propter multitudinem oppilationis, nisi uehementia doloris exciter: non tamen profundum, cum materia non sit frigida, uiscosa, &c.

CVASÆ CEPHALÆÆ & species.

Sequendo ordinem præmissum in hac, uel circa hanc particulam habemus inquire tria. Primum scilicet species & causas doloris capitis. Secundum signa. Et tertium prognosticum. Species enim & causas Rasis breuitati indulgens breuiter pertransit, innuit enim solam unicam distinctionem specierum dolorum capitis sumptam à causis, quia quidam dolor capitis est, pendens à causa corporea, quidam à causa primitiua, sicut à sole, igne, balneo, odoribus, ebrietate, uento & frigore, & sic de singulis. Qui uero à causa corporea, est duplex, quia quidem per essentiam in capite, id est, pendens à læsione alicuius naturarum ipsius capitis, sicut cõplexionis, compositionis, aut unitatis, aut plurimum simul, sicut est in apostemate. Et si à mala complexione, aut simplici, aut composita, cum materia, aut sine materia, licet à mala complexione humida sine materia non possit fieri dolor. Et si cum materia, aut sanguinea cholericaphlegmatica, melancholica, aquosa, uentrosa, aut uaporosa. Et si à mala compositione, aut ab una, aut pluribus specierum malæ complexionis. Et si à solutione continui, aut antiqua, aut recenti, simplici, aut composita, facta à causa intrinseca, aut extrinseca, & hæc solutio continui aliquando pender ex uermibus existentibus supra structuram narium prope carunculas mammillares. Et si est ab apostemate, aut est sanguineum, aut cholicum, aut phlegmaticum, aut melancholicum, aut aquosum, aut uentosum, aut mixtum. Et si aut in substantia cerebri, aut in panniculis, aut in uenis, aut in meatibus. Quæ uero per communem aut à toto, sicut in febribus, aut ab aliqua

corporis particula, sicut à stomacho quod frequenter accidit, de qua Rasis in litera, aut ab intestinis, aut ab epate, splene, renibus, uelica, matrice, aut à membris spiritualibus, aut mirach, aut partibus extremis. Quæ autem est per communem, quandoque est cum periodicis & paroxysmis, secundum periodos & paroxysmos causæ, quæ est in membro communicante, sicut quæ sit cum communitate stomachi, est propter effusionem materierum cholicarum, & aliarum ad ipsum cum periodicis, & sicut quæ sit cum periodicis febrium. Circa quam distinctionem pulcherrime notandum quod duplex est communitas, scilicet absoluta & non absoluta. Communitatem absolutam definit Auic. prima tertij, tractatu secundo, cap. de speciebus sordæ per communem, & est ut ad partem cerebri ex membro communicante nihil perueniat corporeum nisi ipsum nocuum. Communitas uero non absoluta est, ut ad cerebrum ex membro communicante aliquid perueniat corporeum, ut materia, uapor, uentositas, aut spiritus. Exemplum primi, sicut dolor capitis pendens ex spasmo, dolore iuncturarum, punctura, & similibus. In quibus ad caput non transit aliquid corporeum, id est, compositum ex materia & forma: ita quod neque uapores neque spiritus, sed sola qualitas manifesta, aut occulta, sicut uenositas. Aut forte solum species intentionales, secundum aliquos, quibus malè cõsentio, quia licet species intentionales doloris representent dolorem sensui cõmuni, aut uirtuti cognitiue: attamen dolorem non faciunt, ut patet ex definitione doloris, in qua sumitur quod res materialiter imprimat, aut forte nihil ad cerebrum peruenit, quod potest esse: primo, quia anima eadem existens in qualibet parte, dolens, in una parte, dolebit etiam in altera parte ualde sensibili, cuius pars læsa facillè cõmunicet, sicut etiam sentiuntur delitæ in coitu, in toto corpore solum propter causam deliciarum existentem in capite uirgæ: secundo, ut imaginemur spiritus, & membra alterari per partem, post partem, per species obiecti, seu causas doloris, dato quod nulla qualitas tangibilis in cerebro recipiatur, cui imaginationi difficulter assentio: unde stat hoc modo in membro distante fieri per communem dolorem per maximam sensibilitatem, licet non fiat in partibus intermedijs, quia forte non sunt ita sensibiles, aut ita colligatæ. Et nota quod membrum læsum per communem etiam absolutam, frequenter tandem læditur per essentiam, aut quia membrum longo dolore debilitatū facillè recipit superfluitates aliorum membrorum, aut quia per dolorem spiritibus, resolutis debilitatur digestiua & expulsiua, unde non bene conuertit nutrimentum, nec superfluitates, quæ in qualibet digestionem refecantur, debent expelli, & sic sequitur læsio alicuius suarum naturarum, & ex his inferitur esse dolorem in aliqua parte corporis, in qua non sit solutio continui, nec mala complexio. Sed circa causas notare, quod causa immediata doloris est mala complexio, aut solutio continui, aut utraq, sicut in apostemate, licet secundum Auer. 3. coll. sola mala complexio sit causa doloris: quælibet autem mala complexio, siue simplex, siue composita, est causa doloris præterquam mala complexio humida, ipsa enim non facit dolorem, nisi sit cum materia mota ad solutionem, prima tertij tract. 2. cap. 1. Causæ aut

malæ complexionis calidæ sunt sanguis, cholera, phlegma falsum, humor factus calidus per putredinem, aut ebullitionem, & vapores ab his eleuari: similiter causæ primitiue calefacientes sunt sicut sol, ignis, uinum potens, crapula & similia. Causæ autem malæ complexionis frigidæ sunt humores frigidi, & vapores inde eleuari, quibus non acciderit caliditas accidentalis. Malæ autem complexionis siccæ, sunt exiccantia, sicut dies caniculares, motus corporei & animales, exuberans coitus, fluxus uentris. Causæ autem solutæ continuitatis sunt vapores, aut uentositates sui multitudine extendentes, aut sui acuitate mordicantes: similiter materia multa replens & extendens, humor corrosiuus, percussio, aut calus, uermes generati supra stricturam narium. Item apostema in aliqua parte sensibili cerebri, siue calidum, siue frigidum, aut mixtum. Sed hic nota quod vapores qui frequenter causant dolorem capitis, quandoque ascendunt per uias amplas, sicut per meri aut cannam pulmonis: quandoque per uias strictas, sicut per uenas, arterias & nervos, unde in fine primi cap. de soda. Soda enim plurimum fit, propterea quia arteriæ afferunt capiti vapores fraudulentos. Et dolores isti per uenas deferentes vapores, facti sunt multum fortes & profundi, & magna aduertentia digni. Et notate ex Auicenna quod omnia aromata calida siue frigida faciunt sodam, licet aromata calida curent sodam frigidam, & contra, frigida, calidam cum succedunt sodæ, quod est uerum, nisi multiplicentur. Tunc enim replendo caput, & extendendo faciunt sodam. Amplius secundum nota quod modi colligatarum sunt sex sumpti ex Auicenna 2. primi cap. de complendis dispositionibus, & prima tertiij tract. 2. cap. de speciebus sodæ. Primus est ratione membri utriusque communicationis & intermediij, ut os stomachi cerebro mediantibus nervis reuerfuius. Secundus, quia est uia & transitus de uno membro ad reliquum sicut inguen ab epate in apostematibus cruris. Tertius ratione uicinitatis sicut pulmo cerebro, & mamilia cordi. Quartus quia unum est principium & radix operationis alterius, sicut diaphragma pulmonis. Quintus, quia unum seruit alteri ut nervi cerebro. Sextus, quia colligantur uni tertio, ut renes & cerebrum epati, ideo inter se colligantur, similiter matrix & diaphragma median tibus nervis, cor, epas, & splen communicant cerebro, mediantibus, nervis, uenis & arterijs, &c. Soda autem facta à causa primitiua est multiplex secundum multiplicatam & multitudinem causarum primitiuarum, sicut soda ex uentis, & ex radijs solaribus, & soda ex odoribus bonis & malis, calidis & frigidis, & soda ex ebrietate & ex percussione, &c. Secunda di. sumitur penes intensiorem doloris, quia quidam intensus: de quo dicit Auicenna quod obuians sinapiti infantis leuia habentis ossa, separat, & frangit commissuram, quidam medius, quidam paruus, ut in lethargia. Tertia sumitur à perseverantia, quia quidam continuus, quidam interpolatus. Quarta ab accidentibus, quia quidam perducit ad accidentia mala, ut apostematata, spasmodum, singultum, & quidam non.

Quinta penes locum, quia quidam in substantia cerebri, quidam in panniculis intrinsecis, quidam in almodiari, quidam in uenis, quidam in meatibus.

Sexta penes facilitatem motus ipsius aut difficulta-

tem. His enim facilius uenit soda qui habent debilitatem cerebri, & multam sensibilitatem & membra digestiua debilia, contrarijs, contra. Septima quædam est soda temporalis, id est, chronica: quædam pauci temporis. Temporalis fit propter phlegma aut melancholiam, aut debilitatem cerebri, aut apostemate incipiente indurari, aut iam indurato, & illud saepe uidi & ferè semper malè tandem terminatur. Octaua, quia quædam coniuncta cum rheumatismis, quædam non: Et ex his iam primum absolutum fit scilicet species & causæ doloris capitis, &c. Omitto dolores capitis qui sumuntur ab ipsa doloris essentia, quia de his ageitur in sequentibus capitulis, qui dolores capitis sunt secundum plurimum grauissimi, exten siui, pulsatiui, pungitiui, aut perforatiui secundum diuersitates causarum ipsos facientium.

DE SIGNIS CEPHALÆ.

Signa quædam prognostica sunt. Primum signum est urina subiugalis, aut liuida: si enim mingitur turbida, & remanet turbida, significat magnam ebullitionem à calore putredinali factam, & tunc dolor est aut fit: si uero mingitur clara, & statim turbidatur significat dolorem capitis futurum: si autem mingitur turbida & postea clara fit, minoris est malitij, imo frequenter accidit uitio renum & uesicæ, & propriè cum fecerit residuum, & fit turbida aliquando uia crisis, & est bonum signum, & maxime in pueris est signum infallibile super salutem, ut ex longa practica uidi. Hæc omnia discutienda sunt 4. aphorismorum, aphor. illo, quibus in febribus urina turbidatæ.

Secundum signum est urina alba, subtilis in feb. & maxime continuis, non quidem in principio paroxysmi, sed post augmentum & non sumpta immediate post cibum: significat enim raptum materiem ad caput, & fortasse phrenesim, & hæc, nisi sit opilatio, aut nisi materia ad aliud canale permutetur, sicut ad intestina, factura fluxum uentris, aut ad cutim, factura uariolas, aut ad aliud membrum apostemandum, sed secundum plurimum repit ad cerebrum. Vltimum signum comune omni sodæ materialis est fex inuenta in naribus diuersos humores significans secundum uarietatem coloris. Citrina quidem aut uiridis significat cholera. Alba uero, phlegma, præcipue si fuerit sine punctione & mordicatione: siccitas autem narium sine grauedine capitis significat priuationem humoris in capite superflui. Cum grauedine autem significat aut oppilationem in strictura narium, quod faciliè cognoscitur cum non possit per nares sufflare, aut raptum materierum, & sic dolorem præsentem, aut futurum, aut impotentiam expellendi. Sed ueniendo ad signa causarum. Si fuerit à causa primitiua cognoscitur per præsentiam aut præcessionem ipsarum, & per effectus uerisimiliter ab ipsis derelictos, ut prima quarti. de febribus ephemeris. Cognoscitur autem esse per essentiam in capite, quia dolor est magis continuus, & comprehenditur læsio alicuius naturarum cerebri, aut plurimum, & erit cum reliquis operationibus cerebri nocumentum & tenebrositas in oculo, & nocumentum in alijs sensibus cum bonitate dispositionis reliquorum membrorum. Cognoscitur uero esse per comunitatem, quia non ita continuus, & augetur & minuitur

minuitur secundum augmentum & decrementum nocuenti membri communicantis. In quo signo est considerandum cuius membri nocumentum primò incepit, & quod subsequutum est: primò enim incipiens egrotare uerisimiliter alteri nocumentum communicat. Cognoscitur autem pendere à mala complexione calida aut frigida sine materia, cum sentitur manifesta caliditas aut frigiditas, &c. sine aliqua capitis grauedine, & est cum siccitate scilicet narium, & si tibi est caliditas fortasse est rubedo oculi, & iuuatur frigidis. In frigida uerò res est eòtrario, & non est in faciebus eorum extenuatio neque rubedo coloris, neque dolor est multus. Siccam autem significat præcellio causarum exsiccantium & augetur cum iteratione earum. Materiae comprehenduntur per hæc signa: Si quidem fuerit sanguis in causa, sunt quinque signa in litera posita à Rasi, & superius declarata, quibus addendus est somnus, qui est longus propter uaporum multitudinem, nisi à uerementia doloris impediatur: non tamen grauis aut profundus cū uapores non sint grossi aut frigidi multum opprimentes, urina grossa, rubea, purpurea, quæ omnia intelligenda sunt sanguinis peccante magis in quanto quàm in quali &c, si uerò peccaret in quali, hæc signa essent refracta secundum inclinationem sanguinis ad aliquem aliorum humorum & frequentius erit dolor in parte anteriori. Si uerò cholera fuerit in causa, erit dolor acutus, mordacitius, punctio narium, uigiliae, color citrinus, parua grauitas, tactus calidus cum mordacitate, pulsus uelox, & non dixit magnus, quia uirtus debilior cæteris paribus, instrumentumq; magis inobediens, non in oculis aut facie erit tensio, & fitis aderit, & frequentius erit dolor in parte dextra: Si fuerit à phlegmate, erit frigiditas temporum, color albus, dolor obtusus & magis perseverans, sensus hebes, somnus profundus, pigritia, destructio appetitus uel debilitas, nauseatiua satietas, quæ omnia facit phlegma sua frigiditate, humiditate, grossitie, uiscositate, & frequentius erit dolor in parte posteriori. Si fuerit melancholica erit liuiditas faciei, siue plumbeitas, corruptio sensuum interiorum, perseverantia doloris, obtusus dolor, & frequentius erit dolor in parte sinistra. Item signa uniuersalia sumpta ab ætate, complexione, sexu, regione, temporibus anni, consuetudine, arte uel exercitio, & similibus uidentur secunda primi. In uentosa autem & uaporosa minoratur dolor, aut non est grauitas, multiplicatur extensio, & fortasse est cum punctione aut corrosione, & quandoque est cum sonitu, aut tinnitu, & fortasse crescunt cum ea quidem multum. Et quandoque multiplicatur cum ea permutatio doloris de loco ad locum, & cum multiplicatur uapor, fit pulsatio fortior capitis, & imaginatur imaginationes corruptas, & associatur ei scotomia & uertigo, & uidetur infirmo quod eleuetur ad alta, & somniabit se uolare. Si uerò sorda fit à solutione contiui, declaratur per ipsam solutionem si extrinsecus apparet, & per causam primitiuam soluentem: Si uerò non apparet exterius, declaratur per sanguinem aut saniem egredientem. Si uerò pendeat à mala compositione ipsa seipsam declarat, si exterius appareat: si uerò non, redi ad signa cuiuscunque male, compositionis, & co-

gnoscitur per exclusionem aliarum causarum: si uerò sit ab apostemate, adsunt signa carabiti, aut lethargiae, & cæterorum suo loco dicenda. Et dolor quandoque communicat usque ad radices oculorum propter motum neruorum opticorum perforantium panniculos, & intensius dolent propter motum, & si nocumentum est in panniculis intrinsecis, tunc dolor est fortior: si uerò in substantia, tunc dolor est obtusior, grauius, aut extensius: si uerò in panniculo extrinsecis, tunc magis dolet exterius. Signa autem facta ex uermibus in capite sunt corrosio fortis, & fœtor oris, & fit sorda fortior cum motu, & sedatur in quiete, erit etiam aliquando pruritus in naso propter motum uermium. Si uerò sorda fit per communitatem à toto, sicut in febribus & crisiibus, crescit ipsis excrescentibus, decrescitq; ipsis decrescen- tibus, & remouetur cum remotione earum. Facta autem cum communitate stomachi significat angustia, nausæ, paucitatem desiderij, maliciam digestionis, & cetera nocumenta stomachi, & cum est per effusio- nem materierum ad stomachum, est fortior, & cum uacuitas adest, et super somnū, et dolor stomachi si est ex cholera, excitatur cū uacuitas adest, & si est ex humore frigido est secundum plurimum minor in uacuitate, & sedat ipsum fames, humor autem peccans in stomacho distinguitur per uomitum & ructationem. Et multi quidem homines sunt, qui cum comedunt, sedatur sorda & illud significat effusionem choleræ ad stomachum cuius signum, quia si choleram euomunt sedatur dolor. Significatur etiam communitas ex parte doloris: dolor enim in ea quæ fit ex stomacho, secundum plurimum incipit ab interiori parte sincipitis, & declinat ad medium sincipitis: deinde remouetur, & quandoque est in parte posteriori propter situm meri posteriorem iuxta dorsum. Et illa quæ fit ex epate declinat ad latus dextrum, & adsunt ægritudines epatis. Et illa quæ fit ex splene declinat ad latus sinistrum. Et illa quæ fit ex mirach declinat ad anteriora capitis ualde, & quæ est causa matricis existit in margine sincipitis, & fit plurimum post partum aut post abortum, aut paucitatem menstruorum, aut retentionem, & adsunt signa ægritudinum matricis, quæ autem ex dorso aut renibus, declinat ad posteriora ualde. Et uniuersaliter quæ est ex nocumento alicuius membri excitatur & augetur cū nocumento illius membri, & decrescit cum decremento illius. Illa uerò quæ fit à debilitate capitis, significat eius excitatio cū parua uel qualibet causa, et est cū per turbationem sensuum tam interiorū q̃ exteriorū, & inuentione nocuenti in operationibus cerebri, & citò repletur caput humiditatibus. Et illam quæ fit ab acuitate sensus cerebri significat uelocitas parienti etiam à parua causa, scilicet uocibus, odoribus & reliquis, & cum hoc sensus sunt boni, & meatus mundi & operationes cerebri non læsæ, & hæc cerebra sunt communiter cholericæ aut sicca tantum. Vltimò signa uiarum per quas fit communicatio sumuntur à loco materiae & membro communicante. Nam uapores eleuati à materia existente in stomacho transeunt per meri, à membris spiritualibus per Can- nam pulmonis. Si materia contineatur in uenis, ut in febribus continuis, cōicatur per uenas & arterias: si materia sit in corde, magis per arterias, si in epate

magis per uenas, si in diaphragmate & reliquis pāniculis & membris nervosis, communicatur magis per nervos & nucham, &c. Oui, nucis siue galeatę pāisionis species & causę ex præcedentibus patere possunt, pender enim ab humore malo, calido, aut frigido frequenter apostemante; imò frequenter ab apostemate melancholico aut duro, in panniculo intrinseco aut extrinseco. Et multoties causa remotior, sunt ægritudines antecedentes, quę debilitarunt cerebrum, & uelamina intrinseca & extrinseca, ut sedatur ex omni causa, uidelicet ex motib. paruis, qui sunt ex motib. corporis, cibalibus et uaporibus, & motibus extrinsecis. Et in summa, causa dispositiua est duplex, scilicet debilitas capitis & acuitas sensus eius. Causę autē factiue sunt, quę dictę sunt. Signa eius sunt, quia præter hoc quòd dolor sit continuus, excitatur ab omni parua causa, ut motu, potatione uini, et receptione uaporũ, & cum uoce forti aut media: ita ut paties odio habeat uocem, lumen, conuersationem cum hominibus, diligat solitudinem, tenebras, quietē, & resupinationem, & cum est in panniculo extrinseco, rāgendo sentitur, sed in intrinseco rāgendo non sentitur, & cōmunicatur usq; ad oculum, quoniam panniculus ille comprehendit nervos opticos cōmunicantes oculis, cum ex ipsis generetur retina & tela aranea. Prognosticum perducit frequenter ad mortē aut cecitatē. Hemisphericę & homonopagię sunt species, causę, signa, prognostica, sicut cephalę, de qua superius actum est. Et grauitas existens infra dolorē pender ab humorib. præcipue sanguineo, phlegmatico, melancholico. Soda phlegmatica, sanguinea, colerica, melancholica, multiplicatur secundum proportionem, ad quatuor tempora anni. Quando autumnus fuerit meridionalis, pluuiosus, multiplicatur soda in hyeme. Soda continua prolongata frequenter perducit ad apostema cerebri, aut cecitatem. Soda multoties resoluitur, si contingat ut egrediatur in aurē sanies, aut materia aquosa: soda in febribus continuis, quę non alleuiatur cum alleuatione febris, minatur phrenesim. Similiter soda continua ad quam sequitur febris, cum prius non fuerit, transit in phrenesim.

DE CVRA CEPHALÆ.

Positis quid nominis & quid rei, speciebus, & causis, signis & pronosticis, &c. Iam ad quintum ueniedum est, scilicet ad curam. Rasis ergo breuitati indulgens pro cura cephalę sanguineę. Primò phlebotomat uenā cephalicam, ex parte in qua est dolor, uel in qua dolor magis infestat. Vt si dolor magis infestat in parte dextra, in manu dextra faciēda est phlebotomia, scilicet aut incuruatura brachij in parte superiori, aut inter pollicem & indicē, licet hic sit ramus uenę cōmunis & non cephalicę, ex Auic. prima primī, doctrīna quinta, c. de anatomia uenarum manuum. Et extrahuntur sex aut octo, uncie sanguinis, plures aut pauciores secundum exigentiā circumstantiarum consentiente uirtute, ætate, & ceteris huiusmodi. Si autem sit in parte sinistra capitis, phlebotometur ex cephalica sinistra. Et si in ambabus. phlebotometur ex ambabus. Secundò super parte dolente, & partibus adiacētibus docet apponi medicamen factū ex aqua rosacea, oleo rosaceo & aceto, simul optimē agitaris & concussis, ita ut inspissentur, & super niuem, id est, ualde actu infrigidatis, in qua mixtura sit aceti sub-

quadruplum ad aquam rosaceā & oleum. Ita ut exēpli gratia sit aceti 3. s. aquę rosaceę, olei rosacei an. 3. i. prius tamen capillis cum forficę abscessis applicentur petię lineę ueteres in hoc medicamine infusę, sepiusq; secundum exigentiā applicentur. Posset tamen aceti quantitas augeri, ubi queratur maior repercussio. Terriò docet debitum regimen, ut abstineatur a carne, uino, & ceteris calidis, & sanguinē multiplican- tibus & uaporantib. et comedat adestiam citrinam, id est, cibum qui fit ex lentib. coctis cum aqua, quibus additur acetum & parum croci, et tapfil, id est, cibum ex lentibus solum in aqua coctis. Ponatur autem in primo cibo acetum ad infrigidandum, & crocus ad confortandum uirtutes & spiritus, & ut uirtus huius cibi ad caput dirigatur: est enim huius materię digestiui, ita ut sit cibus & medicus, sed melius est, ut loco lentium ponatur kist ipsarum adiectis corticibus per expresionem instaminea. Et comedat olera frigida, sicut lactucam, endiuia, et spinachiam, & huiusmodi: & fructus frigidos, sicut poma, et pyra, & cidonia cocta, & propriē in fine mensę cōdita cum coriandris semiconfectis. Quarto docet uentrē soluere educendo materias cōmunes, & etiā cholera, quę posset esse causa inflāmationis sanguinis & fluxus ipsius ad cerebrum cum mirobolanis citrinis, prunis, & tamarindis, & saccharo, quę recepta sit secundum hunc modum. 3. s. prunorum numero decē, tamar. 3. i. mirob. citri. 3. i. aut. 3. i. s. bulliant tamarindi, aut pruna in una lb. aquę ad consumptionem medietatis, & coletur, in qua aqua debite colata & calida mirobolani satis subtiliter absq; tamificatione contusi, infundant per unam noctem, deinde fiat debita colatio & expressio & cum medietate 3. sacchari albi dulcoret, & in matutinis exhibeat: saccharū enim debet esse album trium coctarum, cum saccharū rub. calidius sit melle, & exhibeatur iā celebrata digestionē cibi præcedentis, ubi autem queratur maior lenificatio diminutis, aut remotis mirobolanis posset poni mane 3. i. aut amplius aut minus secundum exigentiā, & similiter cassia. Quintò docet apponere medicamen infrigidatiuum partim repercussiuū, partim resolutiuum, ac doloris sedatiuum, quod componitur ex semine altheę, id est, malua uisci aut brancę ursinę, aut maluę syluestris, quę idem sunt. Cuius descriptio erit hæc. 3. s. seminis altheę calidi cum æqualitate declinantis ad siccum, quantum uolumus: uerbi gratia. 3. 4. contundantur optimē semina in mortario, & cum aceto debite incorporando fiat emplastrū aliqualeter liquidum, et super petia extendatur & parti dolenti frigidum applicetur, aut aliqualeter tepidum: si quæras maiore resolutionem. Et subdit quòd ex semine psillij & aceto posset fieri medicamen simile. Sed aduerte qđ debemus accipere mucilaginem psillij exeuntem siue tractam ex cortice non ex medulla, quia medulla est ulceratiua existens calida & sicca in quarto, pars uerò exterior frigida, & humida in secundo, debet ergo poni in aqua calida, donec mucilago separetur per debitam confricationem absque forti confrictione, quę mucilago cum aceto misceatur & administretur, sed hoc medicamen magis conuenit in principio, & ubi magna infrigidatione opus sit. Ex his dictis Rasis, quinque elicimus intentiones curatiuas. Prima est sanguinis hunc dolorem facientis euacuatio ac.

tio ac diuersio. Secunda est malae complexionis calidae in cerebro in frigidatio ac sanguinis ad ipsum fluentis percussio. Tertia est cholerae sanguinem aeuantis & fluere facientis euacuatio. Quarta est in frigidatio & percussio cum resolutione mixta tandem perueniens ad resolutiua pura. Quinta est debita sex rerum non naturalium administratio. Et sexta subdi potest, scilicet accidentium correctio. Euacuatio quidem sanguinis debet esse prima, duabus conditionibus obseruatis. Prima, quod uenter non sit stipticus ac fecibus repletus, in quo casu primo cum clysteri in frigidante, ac lenituo educenda sunt. Secundo, quod dolor non sit fortissimus adeo quod ordinem curationis praeuaricet. In quo casu à sedatione doloris inchoandum est iuxta can. quartae primi. Cumque ad diuersum trahere uolueris, dolorem illius membri prius seda. Quod faciendum est secundum praecepta Auicennae, quarta primi capite tertio, aut cum remouentibus causam, scilicet malam complexionem cal. cum in frigidatibus, sicut oliuis & succis, de quibus inferius, aut si sit propter solutionem continui à sanguine mordicante aut extendente, ponantur ea quae leniant, dilatent, poros aperiant resoluen do, ut materia non in loco angusto concludatur, fortius soluens continuum, non tamen cum multa caliditate, sicut mucilago malua uisci, feminis lini & psyllij cum oleo rosaceo, & chamomelino, & similib. debite reperfactis. Aut si haec non ualeant, fiat cum anodinis, secundum plurimum, sunt enim dilatantia poros, & confortantia calorem naturalem ratione suae similitudinis, qui est principalis & efficax curator omnium aegritudinum. Et tertio si haec duo genera non sufficerent, fiat seditio cum stupefacientibus, sed cum timore & cautela, incipiendo à leuioribus, & magis exterius applicitis, quam in caput purgij, aut interius sumptis, aut in aures distillatis. Potare autem ea inter cetera deterius est, licet exterius applicita magis partem opplent, & materiam amplius in uno loco concludat. Sed circa phlebotomiam aduerte. Si corpus fuerit plenum, scilicet sanguine, secundum ambitum totius, & cum hoc nobiliter fluat ad caput, aut in causa fuerit retentio mēstruorum, aut haemorrhoidarum, ex saphenis primo facienda est phlebotomia, deinde si sanguis fuerit adhuc calidus et multus, ex basilica lateris eiusdem partis, aut uena comuni: tertio ex cephalica: quarto ex uena frōtis dolore existente magis posterius, aut loco ipsius, sanguis ex naribus prouocetur, aut naribus sanguisuga applicetur. Si uero dolor fuerit magis anterior fiat phlebotomia ex uenis nuchae ubi collum capiti coniungitur: aut uentofatio ibidem, aut in spatulis, aut sanguisugarum in his locis applicatio. Et si magis declinat ad dextram phlebotomentur uenae post aurem sinistram, & contra, si declinat ad sinistram, phlebotomiam autem uenae nasi credo magis conferre ad euacuandum sanguinem contentum in parte anteriori, & similiter phlebotomiam uenarum laborij licet aliquantulum diuertat. Phlebotomia aut paruarum uenarum in cute capitis existitium euacuat sanguinem coniunctum sibi proximum. Verum si illae phlebotomiae fieri non possunt propter aetatem & alia huiusmodi, sanguisugae in locis ipsarum apponant, quantae Auenzoar non dubitauerit

phlebotomare puerum suum triennem, qui phlebotomia illa euasit. Phlebotomiam autem uenarum guidem, nunquam ausus sum facere, uerum in magna plectoria capitis, & in casibus extremis, sicut in apoplexia sanguinea, in magno apostemate sanguineo credo quod nulla phlebotomia est magis prompta ad succurrendum. Si autem magna sanguinis repletio sit in toto sed tamen non in fluxu ad caput à phlebotomia uenae communis est inchoandum, aut eiusdem lateris aut contrarij secundum maiorem aut minorem plectoriam, aut secundum quod quiritur maior aut minor diuersio, deinde ad cephalicam & ceteras, per ordinem, ut supra, ueniendum est, imò nota, quod etiam in cephalaea immateriali, corpore existente plectorico, phlebotomia conuenit. Rasis autem praecipiens phlebotomiam cephalicam eiusdem lateris loquitur in casibus communiter contingentibus, in quibus non est magna repletio, ceterae autem diuersiones continuari debent, maxime facta phlebotomia, de qua dictum est, sicut fricationes, uentofationes, sine scarificatione, ligaturae, quae omnia fiant descendendo, incipiendo à partibus propinquis tendendo ad remotas sed inter cetera memor esto lotionis crurium, cum aqua calida: diuersiones autem, quae fiunt cum euacuatione, e contra incipiunt à remotis, & redunt ad propinqua. Memora etiam uniuersales euacuationes semper debere praecedere particulares, nisi ubi non adesset repletio in toto, neque in aliquo membro sibi materiam communicare potente, &c. Secunda autem intentio perficitur cum medicinis, quas Rasis superius posuit, ex aqua rosacea, oleo rosaceo, & aceto, cui intentioni accommodatur postrema eius medicina ex psyllio & aceto, cum magis opus esset in frigidare, & loco supra scripto si non habeatur, applicetur succus plantaginis, succus uirgae pastoris cum modico aceto, & succus lactucae si adesset uigiliae, & si opus sit magis in frigidare, succus solatri, semperuius, & huiusmodi. Haec tamen conueniunt obseruatis quibusdam conditionibus. Prima, quod capilli cum forficibus praescindantur. Secunda, quod applicentur super cerebro anteriori, & in loco commissurarum, non autem posteriori, quia multum frigidum est, & est locus originis nuchae. Sed pone quod materia calida sit ibidem, quid sciendum? Dico quod debemus stare, contenti uniuersalibus. & si opus est aliquid applicare, applicetur oleum rosaceum, aut aliud simile non multum frigidum, & tamen super parte anteriori applicentur, quae dicta sunt. Iuuabunt enim ad remotionem caliditatis in parte posteriori. Tertia, est gradus medicinae, ut sit proportionatus gradui aegritudinis, uirtuti, naturae membri secundum ipsum situm, dignitatem, &c. quarta primi colligenda, capite 1. Quarta, ut sit membri secundum omnes suas uirtutes confortatiua, etiam proprietate sua occulta, siue forma specifica. Quinta, ut stipticitate saltem in principio participet. Sexta, ne modus substantiae poros opplet resolutionem prohibens, sicut lac. Ex quibus infertur huiusmodi medicinas non semper actu frigidandas applicandas, ut cum uirtus est debilis, calor naturalis paucus, imò sunt aliqui cum aliquo permiscendae sicut cum pauco croci aut uini odoriferi. Sunt tamen casus tres, in quibus non conueniunt huiusmodi frigida.

Primus casus ubi multi uapores, & grossi essent in capite siue à toto comunicati, sicut in febribus materialibus, & præcipue pendentes à materia grossa. Sodam enim calidam in febris multiplicat usus epithematum uapores exire non permittentium, prima tertij, ubi tamen uapores essent subtiles, acuti, sicut in tertianis puris, inueni huiusmodi frigida odoranda, & per nares trahenda, sicut acetū, aqua rosacea, & similia. Similiter quando ab aliquo membro huiusmodi uapores capiti comunicarentur, & similiter quando essent in capite congelati. In quo casu cum medicinis facietibus ipsos euaporare esset procedendum, sicut decoctione anethi, florum chamomillæ, rosarum, et similibus. Secundus casus ubi sorda conungeretur rheumatismo. In quo casu euacuationibus, & diuersionibus, de quibus supra, esset procedendum, & cum odoratis contrariis discrasie. Tertius casus, ubi caput esset repletū, ipsius enim euacuatio hæc localia debet præcedere. Tertia autem intentio, scilicet euacuatio cholerae permixtae cum sanguine completur cum his, quæ superius dicta sunt, qui canon ampliatus est ad euacuationem phlegmatis, melancholice, aquositate aut plurius, si sanguini permixti forent cum his, de quibus infra dicitur. Quarta autem intentio complicans repercussionem, & resolutionem complenda est cum his, quæ in textu dicta sunt, & quæto magis ad statū proceditur resolutione super repercussis augenda sunt, in declinatione autem sint pura sicut in apostematibus præcipitur. Et ex his, quæ optime ualent ad resolutionem uaporum, & materiae siue apostematis, siue non, est pulmo agni uel arieris incisus & æquatus, secundum exigentiam partis cui applicatur, qui ita calidus sicut extrahitur ab animali euiscerato applicetur, aut infundatur in aqua calida, & expressus capiti applicetur. Sed melius est, ut infundatur in aqua calida decoctionis florum chamomillæ, melliloti, rosarum, uiolarum, anethi, & similibus, & applicetur ut supra, cum hoc enim quod resolutum est doloris sedatiuus, & ad hanc intentionem laudantur catuli, et pulli columbarum perme dium incisus, & ita calidi caliditate sua naturali applicati, in quo casu huiusmodi remedia essent frequenter permutanda, facile enim putrescunt & olent, & tunc magis nocerent, quàm prodesse. Sed melius fuisset, ut ex secunda & quarta intentione una fuisset facta ambas complectens. Quinta autem intentio, scilicet debita administratio sex rerum non naturalium, licet debeat sequi iuxta textus seriem, cæteris tamen postponenda est, cum ipsa ordinanda sit secundum exigentiam aliarum, & propterea melius est, ut correctio accidentium sit in ordine quinta, quæ completur curando præsentia, ab imminetibus præseruando, ut si adsit instans uigiliarum, & similia, curentur, & si timeantur futura, præseruentur, sicut aduentus apostematis, cæcitas, & similia, secundum ea, de quibus in sequentibus capitulis agitur. Sexta autem intentio, scilicet debita administratio sex rerum non naturalium completur sic: Eligatur aer moderatè frigidus, & temperatus in passiuis, aut declinans parumper ad siccum, boni odoris, priuatus uentis, fumis, & uaporibus extraneis, sit autem eius frigiditas maior & minor secundum gradum ægritudinis, cui debet op-

poni, cui etiam uirtus consentiat, & sit magis aut minus luminosus, secundum dispositionem uirtutis, & spirituum, & uarietatem accidentium consequentium. Si enim sit pronitas in subeth, debet esse luminosus: si uero in uigilias, obscurus, neque in loco habitationis sit hominum frequentia, neque strepitus. Potus eius sit diminutus, & similiter cibus, bibat aquam coctam aut simplicem, aut cum paucis saccharo, aut cum paucis uino granatorum, uinum enim non conuenit nisi in declinatione, & sit pauciferum, cistolum, aut album, optime lymphatum: cibi autem sint frigidi saltem potentia, & melius est, ut ad siccum declinet, sed econtrario in cholera ad humidum, & sint pauci nutritiui, & boni, & non sint uapores, quapropter sint faciles digestionis. Verum ubi timeretur raptus materiae cholerice ad stomachum sint stiptici, neque in hoc casu æger sit famelicus. Ex conuenientibus autem in sanguinea, & cholera sunt endiua, portulaca, lactuca, atriplex, spinachia, ferculum ex acresta, panicum, & milium, panis lotus, præsana hordeacea, & huiusmodi, abstineat à carnibus & ouis, nisi in declinatione. Et tunc pulli parui, & cetera huiusmodi maxime cum acresta, & uino granatorum poterunt exhiberi, cum quibus etiam & succo limonum, citriorum, aranciorum, &c. etiam sua cibaria poterunt condiri, & in fine mensæ conuenit aliquid pyri, aut cotonea, cocta aut confecta, aut coriandra confecta, & hoc idem regimen conuenit in cholera, sed magis declinet ad humidum. Multitudo somni communiter confert in sorda, & maior sit in cholera & melancholica, quàm in sanguinea, aut phlegmatica, & sit capite eleuato, & non supinè iacendo, & dormiat bene cooperatus, secundum partes inferiores. Caput uero non teneatur multum calidum, ut humores, & uapores non repant ab inferioribus ad superiora, circa inanitionem, intellige generaliter in omni capitis dispositione uentrem debere esse lenem propter educationem materierum communium, quæ suis uaporibus nocumentum inferunt: secundò, quia paratur uia naturæ ad expulsiōnem superfluitatum: tertio, quia melius perficiuntur operationes naturales, similiter uia urinales teneantur aperte cum seminibus communibus, aut alijs calidioribus in alijs materijs, secundum exigentiam ipsarum. Et similiter fricationes descendendo conferunt ad uaporum diuersionem, & resolutionem, & etiā euacuationes omnium superfluitatum capitis per nares et palatum, modo fiant cum facilitate, &c. Frictiones tamen fortes capitis uidentur, leuis pectinatio compe tit, uomitus multum nocet in omnibus passionibus capitis, nisi adsit ægritudo per præsentiam materiae in stomacho. Coitus similiter secundum plurimum nocet nisi in corporibus coitu assuetis sit præsentia multi spermatis, nam tunc posset concedi, sed fiat raro & cum facilitate. Exercitentur membra inferiora, caput autem quiescat, fricationes autem corporis descendendo, quantum quidem secunda sit fortior prima, optime conferunt præcedentibus euacuationibus uniuersalibus, de quibus supra, et feb. non existente forti, similiter effusio aquæ calidæ super extrema. Sit quietus quantum est possibile secundum omnia animi accidentia, unde caueat à furore, ira, uoce clamosa, sonis fortibus, fulgorib, & huiusmodi.

DE CVRA CEPHALAE PROVENIENTIS A CHOLERA.

SI autem cum istis fuerit impulsu uelocitas, & in tactu sentitur caliditas, sed nec in facie neq; in oculis fuerit rubedo nec tensio: in principio solvatur uenter, deinde fiat ea quae diximus: naribus autem oleū iniiciatur uiolatum, uel oleum cucurbitae dulcis, aut nenupharis oleum, aut oleū de floribus salicis, quorum quodlibet super niuem infrigidatum capiti superfundatur, et nutriatur ut diximus. Ager quoq; odoret camphoram, & aquam rosarum, & salices, & uiolas, & his similia. Quod si aegritudo multum inualecat, sumatur olei & camphorae uniuscuiusq; quantum ponderant duo grana bordei, quae dissoluta in oleo de salicibus mittantur in nares & aures.

In hac parte ponit curam cephalae prouenientis a cholera. Et primo ponit signa scilicet uelocitatem pulsus & caliditatem in loco doloroso sensatam cum priuatione rubedinis, tensionis, & aliorum san. significationum, de quibus longo sermone superius actum est. Secundo ponit curam: primò per solutiuam iam superius posita & declarata: secundo per ea quae in nares iniiciuntur, sicut oleum uiolaceum, frigidum & humidum in primo, oleū cucurbitae dulcis frigidum & humidum in secundo, oleum de floribus nenupharis frigidum et humidum in tertio, oleum de floribus salicis frigidum & humidum in primo, quorum quodlibet singulariter aut etiam plura simul mixta possunt iniici in naribus, cuius simile etiam de auribus est intelligendum. Hec namq; sunt frigida & humida, caliditate et siccitatem a cholera impressam remouentia. Et haec eadem actu ualde frigida super parte dolente applicanda sunt, licet in auribus & naribus iniecta debeant esse tepida. Tertio curat per odores frigidos: docet enim odorare camphoram, aquam rosaceam, salices & uiolas, quorum fumalis euaporatio singulariter aut mixta sua frigiditate & humiditate discrasia calidam & siccam remouet, licet camphora sicca sit. Quarto his non sufficientibus docet accipere opij, camphorae, anagra, quae dissoluta in oleo de salicibus in aures & in nares iniiciantur, ut dolor per membra stuporem remoueat: haec namq; frigida sunt, opij in quarto, camphora in tertio, dolorēq; stupefaciēdo tollunt. Ex quibus duas elicimus intentiones curatiuas. Prima cholera euacuat aut diuertit, quae intentio cōplenda est cum his de quibus actū est superius. Sed pone simul cholera & sanguinē esse in causa, aut alium humorem cholerae permixtum. Quid agendū est? Dico quod si sanguis, aut cholera, aut alius humor equaliter concurrunt, aut si sanguis dominetur a phlebotomia, tūc incipiendū,

postea cholera euacuanda. Si uero cholera dominetur aut alius humor, tunc aut sunt permixti cum sanguine apti educi cum sanguine, et tunc a phlebotomia est incipiendū. Si uero non sunt permixti nec apti educi cum sanguine, ab euacuatione humoris dominantis cum pharmacia est incipiendū, deinde sanguis minuatur, praeterq; in apostemate, in eo enim a phlebotomia salte diuersiua secundum plurimū est inchoandū. Ita dico de quocunq; humore cum sanguine peccante. Si uero alius humor cum cholera peccet, ambo simul euacuandi, & ille magis qui dominatur. Si uero cholera equaliter cum alijs dominetur, magis cholera euacuanda est: quia de ea habetur maior suspitio & est caeteris partibus euacuationi paratior. Idem dico de alijs humoribus inuicem permixtis: semper magis dominans & digestior, & de quo magis timeat, est magis euacuandus. Digestiua tamen melius est praemittere salte euacuationi eradicatiuae, licet euacuatio minoratiua, & maxime cum lenientibus praemittenda sit: postquam debet sequi digestiua, qualia sunt syrupus uiolaceus, de endiua, de portulaca, de nenuphare, de papauere, oxyfachara, syr. de granatis, de limo, de citro. Sed haec cum aquis frigidis & humidis temperanda sunt, & maxime ducentibus uirtutē eorum ad caput, sicut aqua uiolacea, nenupha, lupulorū, licet non sint humida. Potest aut unum ualde propriū sic componi. R. sem. cōmuniū frigid. ʒ. 2. florū uiol. ros. nenupha. an. ʒ. 1. endiue, scariolę, lactucę an. M. 1. summitatū papa. al. ʒ. s. uini grana. ʒ. 4. cum sac. albissimi lb. 1. fiat syr. decoquendo suprascripta in aque lb. 4. nec medietas consumatur, postea coletur debite exprimendo, & addat saccharū & uinum grana. & fiat syr. longus pro duabus uicibus. Reliqui abbrevietur. Et postq; abbreviatum est, postea cum aquis distemperatum, de quibus dictum est, sumatur. Si uero cholera grossa fuerit, syr. sint oxyfachara, acetosus simplex, endi. bysantinus, acetosus cōpositus, sumpti cū aquis endi. lupulorū, cidio. et huiusmodi. Solutiua aut sunt suprascripta, quibus secundum opportunitatē addipossunt electuariū suc. ros. diaprunis solutiū, electuariū de psi. Et si pillulas maluerit sine custodia, sint pillulę allciaret, minoratis tamē masti. et hiera, et cōfectis cum aqua rosacea, aut electuariū suc. ros. Cū custodia uero, sint pillulę aureę. Secunda intentio malam cōplexionem calidā & siccā in cerebro corrigit, caput confortat, ac cholera repercutit cum his, quae dicta sunt per Rasim, quae frigida actu frontis, temporib. & cōmissurę coronali applicētur. Et praeter haec sunt succus lactucae, semperuiui, solatri, & harū decoctiones addendo papauer, flores nenupharis, & mucilaginé pillij, usq; ad se. hyoscy. alb. cum adest instantia uigiliarum. Et tunc nō ponatur acetum, nisi forte modicissimum ad penetrandum. Si uero non adsit instantia uigiliarum addatur acetum pro sexta parte, aut saltem octaua. Et haec intentio perficitur cum odoramentis, de quibus Rasim. Et quorum est haec descriptio. R. florū uiolarum, florū nenupharis, foliorū salicis. ana ʒ. s. ros. rub. ʒ. 2. camphorę ʒ. s. Fiat magdaleon cum aqua rosacea, & sepe odoretur. Aut bulliant in aqua rosacea, & in aliquo uase reponantur. Aut his puluerizatis & cum dragagato mixtis, aut gummi arabico fiat sicut pomū. Et ultimo his non ualentibus sedetur dolor, &

unt. Sangu. caten. firm.
colony. intet. calida firm.
Ammonia
Turbid.
Stomach.
 uigiliae, cum stupefactionibus, de quibus Rasis in litera. Et debent duae guttae illius liquoris repidi pro quacumque aure imponi, & aliquid huiusmodi naribus sugatur. Sed non diu in auribus permaneant, ne suo stupore nocuum auribus inferant. Et ad hoc ualet praecipue cum adesset instantia uigiliarum, requies, descriptione Nicolai, & alia huiusmodi. Sed si stupor induceretur, dissoluatur calsia lignea, & crocus cum oleo decocto, & in aure stupida aliquid ponatur, aut naribus sugatur. Cui parum uini optimi addi possit. Castoreum uero, theriaca antiqua, & uinum potens corrigit nocua narcoticorum. Sed à minus calidis inchoandum est. Tertia autem intentio scilicet accidentium correctio perficiatur, secundum ipsorum exigentiam, ut puta uigiliae, cum his, quae dicta sunt. A reliquis autem praeruectur, ut inferius in proprijs capitulis. Quarta autem intentio, scilicet regimen sex rerum non naturalium perficiatur, ut supra in foda sanguinea. Sed in cholerica frigidiore & humidiora conueniunt, & somnus prolixior. Et haec duae intentiones duabus primis ex textu eliciendis adduntur pro complemento curae.

DE CVRA CEPHALAE PRO-
 uenientis à phlegmate.

QUod si cum praedictis aegritudinibus nihil eorum quae diximus affuerit, de rubedine in facie, & fuerit aegritudo antiqua, in principio uenter, cum pillulis cochij soluat, quas ego feci. Confectio pillularum cochiarum. Rec. pulueris picrae drach. 10. colcyntidis drach. 3. & tertiam, scammoniae drach. 2. S. turbith, stecados an. drach. 5. Fiant pillulae ex istis. Et sunt doses 10. Postquam uero uenter solutus fuerit infundatur caput ex oleo sambacino, & oleo de ben, & mittatur in nares. Aeger quoque odoret algaiam, & insuffletur muscus naribus. Quod si aegritudo multum infestauerit, sumatur euphorbium & castoreum amborum: an. 6. pars, drach. 1. & dissoluta in pauco oleo sambacino, mittatur in nares & aurem.

Ponit curam cephalae phlegmaticae. Et primo per medicinas educentes phlegma, secundo cum alterantibus malam complexionem, frigidam, & humidam cerebri, & phlegma resoluentibus, cum medicinis locibus loco dolenti applicatis odoratis, & in nares & in aures iniectis. Prima medicina solutiva est pillulae cochiae: cuius est haec descriptio. R. pulueris hierapii, scilicet simplicis Gal. compositae ex mastiches, spicae nar. carpopalsami, assari, croci, xilobalsami, calsiae lig. ana. 3. unam, aloes duplum ponderis omnium,

de hierapii accipiantur drachmae decem. Est enim calida & sicca circa secundum gradum, & posset fieri liquida in modum electuarij addendo mellis quantum sufficit, ut puta, pro 2. 3. pulu. & dimidia lb. una mellis: & sic ea frequenter utimur, maxime in clysteribus & posset ea exhiberi per os 3. 1. pro uice, & euacuat phlegma & cholera. Secunda medicina ingrediens hanc receptam est colocynthis, calida & sicca in tertio, euacuans phlegma crassum à cerebro & neruis, & locis remotis, licet etiam cholera pro parte euacuet cuius ingreditur, 3. tres & una tertia. Tertia est scammonia calida, & sicca in tertio, attrahens cholera cum fortitudine, cuius ingreditur 3. ij. & s. Quarta est turbith calida in tertio, euacuans si confortatum sit cum zingibere & similibus, phlegma crassum à capite & neruis & iuncturis. Si uero non confortatum sit phlegma aquosum, cuius simul cum stecados calido in primo, sicco in secundo, euacuante phlegma & cholera, debilitat tamen & secundum aliquos melancholia accipiuntur ana. 3. s. Ex quibus hanc medicinam phlegma à praedominio, & cholera subdominanter euacuare comprehenditur. De quo forte quis mirabitur cum sit propria in foda mixta ex phlegmate & cholera quomodo conueniat in plura phlegmatica. Praeterea propter admixtionem scammoniae acceleratur operatio eius antequam medicinae tardè euacuantes phleg. compleant operationem, euacuabunt itaque chole. & non phleg. Et hoc manifestè est contra praecceptum Auicennae quarta primi capituli, de quando et qualiter euacuari oportet, dicentis quod non sunt admiscendae medicinae diuersae in uelocitate & tarditate diuersos humores euacuantes, una enim complebit operationem antequam altera incipiat. Ad quod dicitur primo Rasis hoc fecisse, quia humores peccantes cum ad aliquem locum defluunt siue apostemandum, siue non raro sunt puri, imò plurimum adinuicem permixti, sicut & in uenis sunt permixti, praecipue cholera cum alijs miscetur, cum sit ad fluxum paratissima, imò sit aliorum uehiculum. Et propterea semper, uel ferè semper est ipsius euacuationi intendendum, esto quod ipsam manifestè peccare non uideamus. Et credo quod haec sit melior responsio ea, quam communiter dant expositores, dicentes, quod haec posita est ut sit calcar aliarum medicinarum, non enim in tanta quantitate deberet poni. Et ad obiectionem simul cum auctoritate Auicennae dicitur: quod ipsa scammonia non complet operationem suam antequam aliq. imò accelerat operationem aliarum, cum aliq. notabiliter sint dominantes, et proprie, si illae medicinae diu steterint adinuicem, & sint aliquantulum fermentatae, & proprie cum etiam aliq. medicinae satis cito suam uelocitatem operationem. Et dicit quod sunt doses decem. Ex quo comprehendere potes hoc solutiu pro quacumque uice esse forte ualde, quia si bene computes erit unaquaeque dos 2. 3. & ferè dimidia, cum tamen experiamur 1. 3. notabiliter operari. Quare tibi consulo ut sis contentus communiter 3. 1. Homines enim suae regionis sunt robustiores nostris. Secundo docet remouere malam complexionem frigidam, & phlegma resolueret, caput infundendo ex oleo sambacino. Et est oleum ieuifemin, & non est factum ex floribus sambuci, secundum quod arbitratu expositores. Sam-
 bacus

regula aspersa uino albo & aceto acuto. ex quibus ita calefactis, imò aliquantulum correfactis sacculi impleantur, & ita calidi saepe applicantur. Grana quoque sinapis & grana nasturtij infusi modicum in aceto, optime conferunt si ex eis sacculi impleantur & applicantur. Theriaca quoque uel mithridatum cum succo mentae permixtum loco dolenti appositum egregie confert. His aliquid opij apud magnam necessitatem addi posset, aut addatur aliquid philonij rom. in quo opium correctum est, aut apud urgentem necessitatem distillantur 2. gran. opij cum oleo liliorum, aut castorei, aut euphorbij & debite tepidum, in aurem sequentem dolorem iniiciatur. Sed raro accidit ex humore frigido ingentem fieri dolorem, & propterea secundum plurimum non est usus opiatorum necessarius. Pomum odoriferum ad confortationem cerebri frigidi. ꝛ. laudani, ligni aloës, stiracis, calamintae. an. drachmam 1. garioph. nucis musc. sem. basiliconis. an. 3. s. cum aqua rosacea in qua sit aliquid de musco fiat pomum, & si aliquid ambræ addatur, est praestantius.

Quarta intentio est correctio accidentium, ex quibus frequenter corrigendus est subeth cum fricationibus fortibus, & alijs generibus diuersionu, & odore aceti acutissimi. A ceteris uero praeseruetur & corrigatur, ut propria exigunt capitula. Quinta intentio exigit aërem calidum & siccum, & secundum plurimum luminosum. Potus sit uinum uetus medicis uinositatis aut multae aliquando, sed in parua quantitate, sed praestantior est aqua mellis cui aliquid modicum piperis addi possit. Fercula sint facili digestionis, paucarum superfluitatum ad calidum & siccum declinantia, carnes autem laudabiliu concedi possunt. Et in fine mensae parum diacitoniten cum speciebus, aut aliquid pyri, aut cidonij confecti.

Somnus debet esse minor quam in alijs speciebus sode. Et dormiat capite leuato, & super latere sano. Et sit bene pannis coopertus, tam secundum caput, quam secundum corporis residuum. Sollicitè purget omnes corporis superfluitates per regiones conuenientes, sicut superius in foda sanguinea dictu fuit.

Vomitum tamen summo opere fugiendus, nisi adesset in stomacho materia dolorem fugiens. Exercitium aut fugiendum. Verum fricationes suppleant uicem exercitij. Vitet accidentia animae excessiua, licet ira leuis et huiusmodi accidentia caliditate naturalem aliquantulum excitantia, liberius concedi possunt.

COMPLEMENTVM CVRAE cephalae calidae.

IN cephalaea uero calida emplastru hoc fronti & temporibus est imponendum. Cuius haec est confectio. Recipe lactucarum, sies memithe, sandalum album & rubrum, faufel, rosas, opium, fiat ex eis emplastrum: postquam aceto & aqua rosacea conspersa fuerint, fronti imponantur super quod mittatur pannus aceto & aqua rosacea infu-

sus, qui cum tepesfactus fuerit, iterum infundatur & desuper ponatur.

Reuertitur ad complendam curam tam cephalae calidae quam frigidae, inchoans a calida, pro cuius cura conficit hoc emplastru ultimum & efficacissimum ad tollendum malam complexionem calidam, tum etiam ad stupefaciendu. Cuius descriptio est talis. ꝛ. sem. lactucarū quod est frigidum & humidum in secundo, sies memithe, id est, succi memithe per decoctionem inspissati, uel ad solem, frigidi & sic. in primo, & est herba similis papaueri aliter dicta glauciu, & est species chelidoniae. Ille autem succus sic inspissatus dicitur sies, licet sies proprie sumpta sit medicina ocularis existens formae pyramidalis ad similitudinem nuclei dactyli. Sandalus est lignum triplex, album, rubrum & citrinum, ceteris duobus magis odoriferu, frigidum & siccū in tertio. Faufel est aulana Inda, frigida in secundo, & sic. in tertio. Rosae frigidae & sic. in primo. Opium frigidum in quarto, siccum in secundo. Haec omnia debent aggregari in modum emplastri, postquam aceto & aqua rosacea conspersa fuerint. Et possunt poni omnia in equali dosi praeter opium, quod oportet subduplari, aut saltem subquadruplari ad quodlibet illorum, ubi tamen esset mala complexio calida, & sic. possemus augere humidum. Hoc autem emplastru super aliquam petia subtili extensum, parti dolenti superponatur, & super ipsum imponantur petiae infusae in aqua rosacea & aceto saepe replicatae, ut frigiditas actualis & potentialis conseruetur, & propterea non multum tepescere dimittantur.

COMPLET CVRAM CE- phalae frigidae.

Linimentu uero cephalae frigidae. Recipe castoreum, euphorbium, piper, sinapim, stiracem, rutam, marrubium: quae siccata & puluerizata, & etiam cicotriconizata misceantur, & conspergatur in uino ueteri, ex quibus fiant trochisci, et desiccantur. Quandocumque necesse fuerit, ex uno in uino ueteri aut oleo costino uel chamomelino dissoluto frons multotiens liniatur. Hoc enim linimentum omni antiquae cephalae confert, non solum superpositum, sed etiam auri injectum, quae sequitur illud tempus, postquam in aliquo de praedictis oleis resolutum fuerit. Aegro uero uinum uetus & forte dandum est. Cum autem cephalaea per hebdomadam unam perseuerauerit, aeger in balneum mittendus est, atque super caput eius aqua in qua chamomilla et sampsuchus

chus & nemen, & stecas arabicus cocta fuerint, simul aut sigillatim fundenda est.

Hic complet curam cephalææ frigida cum materia phlegmatica. Licet etiam mala complexio frigida pura his curanda sit. Primò ponit hoc linimentum cuius est hæc descriptio: *castorei, euphorbij, piperis, sinapis, quæ omnia calida sunt in quarto, stiracis sicca & calida in secundo, rutæ calida & sicca in tertio, marrubij calidi & sicci in secundo.* Quæ omnia in æquali dosi posita, aut fortè calidorum in quarto posset dosi ad cætera subduplari, siccata, puluerizata, & cicotriconizata, id est, tamisata, commisceatur cum uino ueteri, ex quibus sic mixtis fiat trochisci, & desiccantur, & usui referuntur. Trochiscus dicitur forma rotunda ex duabus partibus leuiter compressa, & dicitur à trochos græcè, rota latine, in quam formâ reducuntur pulueres cum aliquo liquore permixti, ut eorum uirtus diutius conseruetur, quorum trochiscorû accipiat unus uel plures necessitate urgente, & dissolutus cum uino ueteri, aut aliquo oleo scilicet chamomelino aut costino parti dolenti applicetur, aut aliquid eius in aurem parti dolenti proximam iniiciatur. Secundò complet huius cephalææ curam per uinum uetus & potes exhibendum in modica quantitate siue uia medicina, siue uia cibi exhibetur. In magna enim quantitate nimis euaporado, aut in stomacho seu acetosando ex indigestione potest magis nocere quam iuuare. Demû docet curare per balneû siue igneum aliter dictum pyreum, sicut est furnus pane extracto, aut æreum satis notum, aut aqueum siue naturale sicut thermarum, aut artificiale sicut ex decoctione rutæ, beronicæ, calamenthi, saluie, hyssopi, stecados arabici, malorag & similium: quibus potest addi sulphur & alia notabiliter calefacientia secundû frigiditatem resistentia. Vltimo docet curare cum embroca facta cum decoctione rerum similium his de quibus supra. Est aut embroca casus liquoris ex alto super aliquod membrû, nam propter casum fortius imprimi, & magis uirtus eius profundatur. Nemen, id est, serpillum, & non sisimbrium.

CVRA CEPHALÆÆ PER COMMUNITATEM AD STOMACHUM.

Quod si cephalææ quotidie ante comestionem inuadat, & post comestionem recedat, succurrendum est infirmo ante horam qua uenire consuevit, dando eis buccellas pauis in succo granati, aut uua acerbæ, aut horum similium infusas.

Ponit curam cephalææ per communitatem ad stomachum, tradens solû curationem illius quæ fit propter raptum materiæ cholericæ ad stomachum. Cuius signum est, quia ante comestionem inuadit, post comestionem uerò recedit. Cum enim stomachus est uacuus fit facilè materierû susceptiuus, & maxime earû quæ faciliè ad ipsum fluunt sicut materiæ cholericæ. Faciliè aut sedatur hic dolor per comestionem, chole-
ra ad fundum stomachi repressa, & fortè in aliquibus egrediente pileron, aut fortè per uomitum educta.

Si aut materia esset phlegmatica aut melancholica nõ sic propter suâ crassitiem et uiscositatē faciliè reprimetur. Et esto quod in principio aliquantulum sedatur parum, post magis augetur, cum ipse cibus corumpatur à materia cui admiscetur, & etiam propter indigestionem cedat in materiam. Curat ergo dando buccellâ panis in uino granatorû aut acerbæ, aut alio simili, sicut succus cydoniorû, & huiusmodi, ante raptum materiæ cholericæ ad stomachû, uel saltem ante aduentum cephalææ, quæ sua frigiditate aut stipicitate choleram reprimunt, aut ipsum aduentum ad stomachum prohibent. Ex his datur intelligi curam reliquarum specierum cephalææ per communitatem siue à toto siue à membro determinato comunicetur, quæ si à membro determinato comunicetur, quinque exigat intentiones curatiuas. Prima euacuat quod de humore malo in membro suscipiente & mittente continetur. Secunda diuertit quod est aptum communicari cum fricationibus, uerosis, ligaturis, lotionibus & clysterijs trahendo ipsum ad partes oppositas membro cui fit comunicatio. Nec non rubificationibus, uelificatibus, & tandem cauterizantibus factis super ipso membro comunicante. Tertia confortat membrû mittens ipsius malas cõplexiones & dispositiones corrigendo, ut neque talem humorem multiplicet, neque aliunde suscipiat, sed fiat minera laudabilis chimi. Quarta claudit uias medias inter membrû mittens & suscipiens. Quinta membrum suscipiens cõfortat ne huiusmodi transmissum recipiat. Prima intentio est euacuatio humoris. Si ergo stomachus, uel epar, uel splen, uel matrix, uel cholera, uel alium humorem, aut uapores ab his eleuatos, primò præmittenda est euacuatio humoris tam in membro suscipiente, quàm in membro mittente, siue sit sanguis cû phlebotomia, siue alius humor cum pharmacia, integra ex minoratiuo, digestiui, & eradicatiui, etiam sepius iteratis secundum exigentiam. Secunda intentio est diuersio si sit sine euacuatione incipit à membro læso, aut propè ipsum, & tradit ad partes oppositas distantes tam à membro mittente, quàm suscipiente. Et ex fortibus & proprijs in attractione materiæ sode in uigilante ex soda, est fricatio pedû, multotiens enim dormit super ipsam patientem sodam, & quandoque fit eius assiduatio in pedibus donec resoluat soda & lotiones pedum conferunt: si aut cum euacuatione incipit à remotis ueniens ad propinqua, rubificancia aut uescicatoria & cauteria siue actualia, siue potèntialia fiant super ipso membro mittente, aut in loco sibi proximo. Et ulcera diu, ut per unum mensem, aut amplius teneantur aperta, ut materiæ integra fiat consumptio, ut in stomacho, si ratione fundi fiat per duos digitos supra umbilicum, si in ore stomachi fiat posterius circa decimâ tertiâ spondylem, aut antèrius parum intra malum granatum, si in splene in latere sinistro circa ipsius regionem, si in epate in latere dextro, si in matrice circa alchatim, eodem modo in reliquis. Fiant aut illa magis aut minus profunda secundû situm membri mittentis & cæteras naturas cõpositionales, & membri ipsius nobilitatē, & secundum quod opus est ut ulcus longo aut breui tempore teneatur apertum, & secundû has cõsiderationes

b 2

etiam opus est, ut fiat magis aut minus latum. Hæc tamen sunt de his quæ postponenda sunt & non fienda, nisi cum cætera non contulerint, magis tamen ob vulgi infamiã quàm quod res in se sit periculosa, imò existimo si medici essent audaciores multa mirabilia facerent cum his cauterijs, sicut Albucasis.

Tertia autem intentio perficitur cum his quæ à proprietate & etiã à qualitate manifesta confortant membrum mittens, ipsius dispositiones corrigendo: siue sit malitia complexionis, siue unitatis, siue compositionis taliter ut fiat mineralaudabilis chimia. Quæ omnia qualiter compleri debeant in proprijs videntur est capitulis de quibus infra.

Quarta autem intentio, scilicet clausio viarum intermediarum, completur, quandoq; cum stipticis & confortantibus, sumptis per os in fine mensæ, ut cidonijs, pyris, coriãdris, & huiusmodi, quãdoq; cum medicinis & ligaturis, sicut si communitas sit à pede cum institis notabiliter stricis circa totum crus, necnon si oportuerit medicinarum stipticarum applicationem etiam desuper stringendo cum ligatura. Et similiter hæc eadem circa collum fieri possunt, materijs aut uaporibus ad caput ascendentibus per cannã pulmonis, meri, uenas aut arterias colli, quod idem est, & circa tempora medicinis ligaturis compleri potest. Quandoq; uerò completur uenarum & artiarum laqueatione postquam cõprehensum fuerat quæ sit illa, per tumore, caliditatẽ, pulsus, dolorem, & huiusmodi. Si ergo sit de paruis, fiat altero duorũ modorũ, aut scindendo super ipsam & postea ipsam cum stilo ignito, aut cauterio punctali cauterizãdo, aut cutem simul cum uena urendo, & tandẽ escara remota consolidando. Quod etiam cauterio potentia li perfici possit, actuale tamen melius est & tutius. Si uerò sit de magnis, scindatur uel uratur cutis super ipsa, qua scissa uel amota ligetur uena in duobus locis satis sibi inuicem proximis, & scindatur in medio & utraq; extremitas cauterizetur. Nota tamẽ quod si materia factura cæcitatem, descenderet ad oculos per uias intrinsecas, hæc uenarum laqueatio nullius esset proficui, sed in hoc casu esset ponendum sedaginum in parte posteriori capitis in locis ubi collum capiti coniungitur, aut essent facienda cauteria in duobus cornibus posterioribus scilicet iuxta loca mendosa, aut esset apponendum cauterium in commissura coronali.

Vltima uerò intentio scilicet capitis confortatio, completur cum applicitis extra circa frontem & tempora, ut oleo rosaceo & aceto, quæ materia existente calida cõtinuentur, frigida uerò existente cum mixtione calidorum temperentur. Conforteturque caput cum sumptis interius, ut diamusco, diambra in discrasia frigida, iuleb ros. & similibus in calida, & ex proprijs sunt cerebella hoedorum et gallinarum. Confortatur etiam caput ne recipiat, & ipsius frigiditas & humiditas corrigitur cum cauterijs sex, aut aliquo istorum. Vno in commissura coronali. Alio in medio sagittalis scilicet circa summitatem capitis. Tertio in lambda. Duobus alijs circa tempora, & maxime ubi sunt commissurę mendosæ. Et ubi timeretur nocumentũ in nucha. Sextum fiat in parte posteriori ubi caput principio colli iungitur, et fiat

ad similitudinem ossis oliuæ & penetrent usq; ad os, aut saltem ad almochari, & diu conferentur aperta scilicet ultra mensẽ. Et quamuis posita sint sex cauteria prædicta pro cõfortatione capitis & correctione dispositionũ eius, non tamen semper oportet hæc omnia facere, sed plerunq; sufficit unum aut plura secundum unam aut plures cerebri particulas corrigendas, quodlibet enim corrigit particulam sibi proximam. Et deum testor quod nulla alia est melior hac medicina, & magis efficax in confortando cerebrum, & corrigẽdo eius prauas dispositiones cuiuscunq; generis sint, & quomodocunq; euerint siue per essentiam siue per communitatem. Sed præcipue ualet in corrigendo dispositiones chronicas frigidas & humiditas cerebri ac ortorum ab eo, necnon membrorum suppositorum quibus cerebrum mittendo superfluitates communicet.

CVRA CEPHALÆE PROVENIENTIS à causa primitiua.

SI autem cephalæa contingat propter multam in sole moram, sufficienter ex oleo rosaceo & aceto infrigidatis curari poterit. Quæ tamen si ex hoc non quieuerit, ex alijs infrigidantibus curanda erit.

Docet remouere cephalæam pendentem à causa primitiua, utputa à sole cum frigidis capiti applicitis scilicet oleo rosaceo, subquadroplo ad acetum, et sint actu infrigidata, & capiti cum petijs lineis applicentur. Quæ si non suffecerint docet ad alia frigidiora esse procedendum, quæ ex præcedentibus satis possunt esse nota, sicut sunt succi lactuæ, semperuiuæ, & similia. Quibus semper aliquid aquæ rosacæ pro confortatione, & aceti pro penetratione est addendum. Et tu pro complemento habes duas intentiones curatiuas. Prima est remouere causam primitiuam. Secunda nocumentum ab ipsa in capite impressum. Ergo si causa primitiua fuerit sol, aut alia causa calefaciens, pone ægrum in umbra & in loco frigido. Si uerò fuerit uentus aut res infrigidans pone ipsum in loco calido. Nocumentum autem impressum remoue cum contrarijs capiti applicitis, quorum copia ex dictis & dicendis tibi erit manifestata. Si uerò ex soda perliquefactionem humorum à causa calida, aut expressionem à causa materiali frigida fieret, procede sicut superius in soda materiali est ostensum.

VLTIMVM REMEDIVM NE SEQUATUR AMISSIO VVSUS.

SI autem soda adhuc perseverauerit, & fortior fiat, neque ullo modo remoueat, & timeatur ne æger uisum amittat, & aqua ad oculos descendat, temporum arteriæ sunt incidendæ & extrahendæ. Hoc tamen quod nunc loquimur, est præter nostram

stram intentionem in hoc libro.

In hac parte ultima presentis capituli ponit ultimum remedium multoties necessarium, ne sequatur amissio uisus, scilicet incisionem siue laqueationem uenarum & arteriarum, temporum, per quas uias materia ad oculum deferretur factura cecitatem quæ laqueandæ sunt modo superius dicto. Primò cognito per tumorem, dolorem, & pulsationem quæ sit illa scilicet per quam materia ad oculum deferretur. Nota tamen laqueationem arteriarum magnarum satis esse suspectam. Et propterea si pores cum defensionibus prohibe materiam ad oculum fluentem. Subdit tamen et quæ nunc dicit esse præter intentionem suam in præsentis opere. Cum non fuerit intentio sua in hoc libro ad tertium instrumentum medicinæ scilicet ad chirurgiam procedere. Ex his iam manifestæ sunt tibi curationes specierum cephalææ pendentium à mala complexione sine materia, cum in ea non exigantur nisi tres de intentionibus superscriptis, scilicet alteratio, accidentium correctio, & debitum regimen sex rerum non naturalium. Et etiam cum materia sanguinea, cholericæ, phlegmaticæ, non autem melancholicæ, sed eam statim subiungam. Similiter posita est cura cephalææ per communitatem à membris determinatis, non autem à toto sicut in febribus & crisi, quam nunc subiungam. Et cum hoc subiungam curationes multas aliarum specierum quæ mihi uidebuntur magis necessariae. Ex quibus reliquæ possunt innoscere. Spiritus autem sanctus sit nobis auxilium amen.

CVRA CEPHALÆÆ PROVENIENTIS à melancholia.

Cura sodæ melancholicæ sex exigat intentiones curatiuas. Prima digerit. Secunda euacuat. Tertia diuertit. Quarta malam complexionem alterat caput confortando. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Digestiua debent esse humida, aliquando calida, aliquando frigida, secundum quod melancholia est naturalis, aut adusta. Et debent esse incisiva & subtiliatiua magis aut minus secundum maiorem uel minorem crassitatem aut uiscositate. Et per tertiam & quartam uirtutem respicientia determinatum humorem & membrum. Ex proprijs ergo est syr. de epithymo descriptione Mesue in antidotario. Item alius eiusdem intentionis sublimis & expertus est: hæc. r. capillorum ueneris, radicem buglossæ domesticæ & syluestris, & florum earum, polipodij. ana. ʒ. i. epithymi. ʒ. i. folliculorum senæ, chamæpityos, stecondos, ana. ʒ. septem, chamædryos, squinanti, elbori nigri. ana. ʒ. 3. fumiterreæ. ʒ. octo, eupatorij. ʒ. 4. succi pomorum dulcium. ʒ. 8. omnia præter epithymum & succum pomorum bulliant in lb. quatuor aquæ usque ad consumptionem medietatis, deinde bulliant in ea epithymum ebullitione una, & coletur, & cum succo pomorum & sacchari. lb. tribus fiat syrupus, cuius dosis est ʒ. decem, usque ad duas uncias cum aqua buglossæ lupulorum, endiuæ & similibus.

Euacuanda debent habere tres conditiones. Prima, ut non sint multum fortia, ne subito magnam solutio-

nem faciant. Secunda ut non multum recedant à graduali temperamento. Tertia, ut sint mixta cum lenientibus & humectantibus, & cum hoc secum aliqua cordialia misceantur. Quæ conditio in omnibus medicinis, ac omni regimine ægritudinum melancholicarum seruanda est, ex proprijs simplicibus est sena, epithymum & polipodium, & similia: & ex compositis pillulæ indæ, de lapide armeno, & de lapide lazuli, & ex electuarijs diafena, confectio amech, maxime in melancholia adusta. Diuersiones autem communes & propriæ cum euacuatione & sine, faciendæ sunt quemadmodum in præcedentibus dictum est in alijs speciebus sodæ. Applicanda autem capiti debent esse humida, calida, aut frigida, secundum quod melancholia est adusta aut non adusta, plurimum tamen debet ad calidum declinare, sicut decoctio facta ex buglossa, boragine, sena, epithymo, & similibus, cum capite castrati in decoctione dissoluendo, & ex oleis est oleum sesaminum, amigdalarum dulcium & similia. Accidentia autem sicut uigilia, alienatio &c. corrigantur quemadmodum dictum est, & inferius in proprijs dicitur cap. Regimen autem sit humectatiuum & inpinguatiuum, non tamen oppilatiuum, sit autem declinans ad calidum aut ad frigidum, secundum humoris exigentiam, & aliarum circumstantiarum, sicut dicitur in capite de melancholia. Si uero in causa sint humores adusti totum regimen medicinalis, nec non sex rerum non naturalium declinet ad frigiditatem & humiditatem, & humores adusti euacuentur cum pillulis de fumoterra, electuario amech, & similibus. & ex his potes elicere curam sodæ pendentis ab humoribus mixtis. Digestiua enim & euacuatiua debent esse mixta secundum humorum exigentiam.

Cura autem sodæ per communitatem à toto sicut in febribus est. Ut consideres, an sit solum in causa, mala complexio calida & sicca. Et tunc sola infrigidatione & humectatione opus est cum his quæ superius dicta sunt. Si uero materia repat ad caput, ipsum forte apostematuro, procedatur sicut superius dictum est in soda humoralis, & dicitur in capite de phrenesi. Si uero in causa sint uapores febriles, sicut est secundum plurimum, communicati à toto auræ minera putredinis, considerentur an sint pauci & subtiliter, & tunc duæ sunt intentiones. Prima diuertere sicut dictum est superius. Deinde infrigidare & humectare & confortare caput cum sibi applicitis, & his quæ dicta sunt superius, non tamen multum oppilantibus. Si uero uapores sint multi & crassi, diuersionibus intendatur omni ingenio. Secundo ipsorum in capite contentorum euaporationi & resolutioni, sicut cum decoctione rosarum, uiolearum, meliloti, chamomillæ, seminis althææ, anethi & similibus, & si infrigidatione opus sit, quædam frigida sicut dictum est superius, per nares trahantur, & in aures inficiantur, sint tamen actu tepida. Et quandoque apud necessitatem urgentem utaris narcoticis, aut ex eis aliquid in aures distillando, sicut dixit Rasis in textu, aut aliquid per os sumendo. Non autem capiti applicentur, ne oppilando magis uapores concludantur & incrassentur, & deinde fortior sequatur dolor.

In cura autem sodæ creticæ sit prima intentio ut na-

b

tura iuuetur per quamcunque uiam expulsionem tentauerit, modo sit conueniens. Vt si senserit dolorem & rugitum circa intestina, cum suppositorijs aut clysteribus adiuuetur. Si uero nauseam & subuersionem, cum impositione digiti uomitus adiuuetur. Similiter cum impositione pennae in ore in oleo intinctae, aut sumptione oxymellis cum succo raphani & similibus. Si uero senserit gravitatem & tensionem circa renes prouocetur urina cum decoctione seminum communium frigidorum & similibus. Si uero senserit cutem humidam & pulsum undosum sudore adiuuetur, ægrum bene pannis cooperiendo & anhelum continendo. Et si apparuerit rubedo in oculis, radij, imaginationes citrinae, tunc sanguis ex naribus prouocetur cum impositione digiti, aut setis porcinis, & similibus sanguinem ex naribus prouocantibus. Si uero in subafcella aut inguine aut post aures dolore senserit illic emplastra attractiua ponantur, & etiã uentosae si oportuerit. Secunda intentio quae uapores reprimunt in finemensumatur, sicut cidonia, aut coriandra & obseruentur reliqua in crisi seruanda.

Cura sodae apostematosa ex cursu phrenesis inferius intelligitur. In cura sodae ex oppilatione. Primo intendendum est ad deoppilationem educendo humorem oppilantem. Euacuatione tam communi integrata ex minoratiuo digestiui & eradicatiui, quam propria sicut in curatione sodae materialis superius dictum est. Secundo intendendum est ad alterationem malae complexionis ex oppilatione derelictae cum contrarijs ex his quae dicta sunt colligendis. Accidit autem ut dicit Auicenna, in proprio capite, in cura huius sodae contrarietas, cum aliquando oporteat deoppilari cum calidis tam digestiuis quam euacuarijs humore existente crasso, ex quibus augetur mala complexio calida ex oppilatione derelicta: in hoc ergo casu iuxta sententiam Auicenna, nunciat deoppilatio cum huiusmodi calidis ex quibus aucta mala complexione calida fiat, postea ipsis dimissis, alteratio cum frigidis. Et postea iterum redi ad deoppilandum cum calidis, ita ut haec intentiones sint sibi inuicem mutuo succedentes totiens, donec cura compleatur.

In cura sodae ex percussione si fuerit solum contusio absque uulnere manifesto. Prima intentio est prohibere apostema, scilicet approximando loco contuso faldellas stupeas infusas primo in aqua rosacea, & aceto subtriplo ad ipsam, & postea ipsas bene expressas iterum infusas in oleo rosaceo, & albumine oui debite adinuicem conuassatis comprimendo, aut ligando deluper cum ligatura conueniente. Et faciendū phlebotomiam ex cephalica, aut uena communi eiusdem partis, aut contrariae, secundum multitudinem repletionis. Apud quam necesse est reiterare phlebotomiam, ut ante dictum fuit. Si uero albumen oui non habeatur, accipiantur aquae, aut succi stiptici, & permixti cum pulueribus costrictiuis loco percusso applicentur. Aut etiam sola aqua communis applicetur. Sed non praetermittatur debita strictura cum ligatura facta secundum artem, haec enim est radix cures. Et debet esse strictura super loco contuso, & super parte distante magis gradatim relaxata. Deinde gradatim debemus permiscere reperculsiua cum resolu-

tiuis, donec ueniamus ad resolutentia pura. Et ex proprijs est myrtus, absinthium, cuminum, calamentum & huiusmodi. Si uero sit uulnus manifestum cum fluxu sanguinis, intendatur ad ipsius restrictionem, ac etiam apostematis prohibitionem cum faldellis stupeis infusis in albumine oui, cum pulueribus costrictiuis debite conuassatis, ex quibus uulnus repleatur. Ac etiam fiat phlebotomia modo iam dicto. Et tandem uulnus curetur, ut ex proprijs capitulis, quarta primi, & quinta sexti est uidendum. Et si propter commotionem cerebri homo fiat sine uoce, ac forte cum paucis & debili sensu & motu, & steteris sicut; ad tertiam, & non additur neque minuitur, tunc claudatur in tertio, ut expectetur usque ad septimum & non moueatur ante illud cum aliquo. quarta quarti, capite de casu & offensione. Quod intelligendum est, ægrum non esse mouendum cum aliqua forti operatione, sicut esset secare cutem, os fractum euellere. Tamen debemus facere phlebotomiam uirtute uitali stante, & totum caput infundere cum oleo rosaceo, omphacino, & cum in alijs medicinis localibus suprascriptis secundum exigentiam. Dieta autem in primis casibus debet esse tenuis, sed cum his accidentibus tenuissima. Postea ad confortationem cerebri ægritudine aliquantulum declinante, praecipue ubi multus sanguis exiuerit. Iubet Auicenna prima tertij, capite proprio cerebella gallinarum dari, sunt enim tunc propria, & tunc in quantitate multa exhibeantur. Ralis autem sexto Almanforis ultimo capite, post principium conficit emplastrum in his dispositionibus proprium, maxime in contusione, factum scilicet ex folijs myrti, balaustijs & corticibus granatorum, in aqua & aceto usquequo dissoluantur coctis, parum musci, galliae & xilooloes, & calami aromatici admiscendo. Ex quibus omnibus cum aceto & aqua & uino ueteri ac stiptico coniuncti quater emplastrum conficiatur, & loco superponatur. Venter autem in his casibus ex aqua fructuum aut leui enemate soluatur.

In curatione sodae pendens ex debilitate capitis. Prima intentio post euacuationem est malam complexionem capitis remouere. Secunda caput confortare. Tertia debitum regimen uitae, excludens omnem causam debilitantem tam exterius occurrentem quam interius sumptam. Mala autem capitis complexio remouetur cum contrarijs tam interius sumptis quam exterius applicitis, de quibus supra.

Caput autem confortatur cum his quae dicta sunt propria capiti per tertiam uirtutem, & quae sunt subtilia cum stipticitate quadam odorifera. Ex frigidis sunt rosae & camphora: ex calidis, ambra, muscus, maiorana, cinnamomum, cubebe &c. Ex compositis, diambra, diamusculus, aromaticum ros: ex frigidis saccharum rosatum. Compositum confortans omne membrum est theriaca. Et simplex confortans omne membrum est terra sigillata, & oleum rosaceum temperando complexionem confortat omne membrum.

Tertia autem intentio perficitur comensurando cibum & potum in quantitate & qualitate uirtuti digestiue, & non sit uaporosus nec nocens cerebro, sicut alleum, crocus, orobus, faba, phaseli, hyoscyamus, lac, lentes,

res nuces, oliuæ, raphanus & similes, debite proportionando reliquas sex res non naturales.

Cura sodæ ex acuitate sensus perficitur cum his quæ præbent nutrimentum grossum & uiscosum, sicut sunt capita & pedes animalium, & partes uiscosæ, similiter pisces & caseus, frumentum, hordeum, rixum, far, fabæ & similia digestiua constante. Si uero sit debilis detur horum granorum chist, & partes uiscosæ horum animalium iuuenum, & similiter pisces parui in specie sua. Narcotica quoque sicut papauer, lactuca & similia ad hoc egregie cõferunt præcipue in complexiõe calida aut siccata plurimum est. Quandoque tamen necessarium est leuiter stupefacere etiam cum medicinis tam interius sumptis, quàm exterius applicitis sicut syr. de papauere & unctionibus & decoctionibus exterius applicitis, & intendatur capitis & corporis humectatiõi, humiditas namque spirituum obrundit sensum.

In cura sodæ ex uermibus existẽtibus supra stricturam narium, oportet ut purgatio fiat corporis & cerebri maximè educens phlegma. Deinde fiat caputpurgium cum hierapicra distemperata cum succo foliorum persici, aut radices mori. Sementina quoque naribus insufflata, aut cum aliquo humore attracta confert, & similiter omnia quæ necant uermes. Et in summa iuuatur sternutatorijs, & caputpurgijs purgatiuis cerebrum, & uermes necantibus.

In cura oui sunt eadem obseruandæ intentiones: Et eius cura eisdem medicinis perficitur. De quibus actum est superius. Quæ diuersificandæ sunt secundum exigentiam causarum à quibus pendet. Sed præter hæc aduertendum est, quod cum ouum similiter & hemigræna aut dolor alius antiquatur, præter intentiones communiter habendas indigemus spiritali capitis confortatione cum his quæ dicta sunt in sodæ ex capitis debilitate. Item ouo, hemigræna, & quocunque dolore uehementer intenso frequenter indigemus stupefaciẽtibus, natura tamen nequeunt dolorem tolerare. Et tertio cum dolores antiquantur frequenter indigemus operatione manuali, sicut uenarum laqueatione, cauterizatione & similibus, est enim radix curæ sodæ huiusmodi.

In cura hemigrænae & homonopagiæ præter intentiones communes euacuationis & diuersionis, & præter ea quæ obseruanda sunt in dolore chronico & forti de confortatione cerebri, stupefactione & operatione manuali, medici inuenerunt quasdam medicinas proprias tam in calida quàm in frigida. Ex proprijs ergo in calida est emplastrum ex fece atramenti siccæ quæ dissoluatur cum aceto multæ fortitudinis, & loco dolenti applicetur, & apud uehementem dolorem octaua pars opij secum misceatur optimè incorporando per longum spacium, & super locum distringat, est enim expertum, & crocus est conueniens, & similiter emplastrum ex ruta, menta, cum uino, oleo rosaceo, & pauco aceti. Aliud in calida proprium. Rec. succi agrestis, mirrhæ ana partem unam, secis encaustri scriptoris partes duas, aluminis, iamei, croci ana partis unius quartam, confice conterendo cum aceto uini, & liniatur super tempora, siue loco dolenti, & stringatur, strictura enim multum confert, ita ut lignum aut plumbum decenter positum

super loco dolenti, & notabiliter constrictum sedet dolorem fortem pulsatiuum. Caputpurgium quoque ex lacte mulieris cum pauco camphoræ, cui etiam apud necessitatem addatur tantundem opij quantum camphoræ optimè confert, de quo etiam aliquid modicum in aure sequente dolorem distilletur. In hemigræna autem frigida quæ ex longitudine temporis deprehenditur: ægritudo enim cuius tempus prolongatur est frigida secundum omnem dispositionem & indiget resolutione, quod calefaciat cum fortitudine. Medicamen expertum acceptum à muliere decoquantur radices cucumeris alfini & absinthium in oleo & aqua donec dissoluantur, & embrocetur pars dolorosa ex aqua & oleo calidis & fiat emplastrum ex fece: confert enim hemigrænae frigida cum febre & sine febre. Et emplastrum de sinapi ad hanc intentionem reuoluens humorem frigidum rubificans & uescimur. Item unguentum factum ex gummi, rutæ agrestis, corticibus radicum capparorum, scylla & euphorbio tritis, & commixtis cum uino odorifero. Et ex sedantibus dolorem ilico est ut ingrediatur balneum & multiplicentur inclinationes super aquam calidam, deinde fiat caputpurgium ex oleo fisticino. Medicamen magnum conferens hemigrænae difficili & chronicae, & non est quod confortet sicut ipsum. Accipe ex emplastro sinapino 3. 2. & commisce cum eo scyllæ 3. 3. costi, radicum cappa, euphorbij, añ. 3. 3. omnia trita cum aceto & uino odorifero, ana. quantum sufficit, aggregabis & emplastra super locum. Caputpurgium expertum ad hemigrænam difficilem ex humore frigido. 3. 2. euphorbij, castorei, ana. partes æquales, fiat ex eis sief, & apud necessitatem fricetur cum uno eorum super cutem cum aqua calida aut oleo castino, aut nardino, & distilletur ex eo in nares & aurem quæ est ex parte doloris, deinde balneetur, & ad huc ex medicamine distilletur, & hoc uicissim cito hemigræna soluetur, huic adde apud necessitatem parum opij, etc. Et sic est finis huius capituli, deo gratias.

DE SCOTOMIA ET VERTIGINE. Caput. II.

CIRCA rubricam inquirenda sunt quid nominis & quid rei, unde dicitur scotomia à scotos Græcè quod est tenebra, inde scotomia quasi tenebra siue obtenebratio. Et hoc est secundum Isidorum & Simonem Ianuensẽ. Vnde Isidorus quarto ethimologiarum capite nono dicit: Scotomia uero nomen sumpsit ab accidente, quod est representans tenebras cum uertigine. Et non dicitur à scotos quod est uisio, & mya musca, sicut quidam sunt arbitrati. Dicitur autem uertigo à uero, uertis, quia apparent res super patientẽ uerti, aut quod cerebrũ ipsius & corpus reuoluatur. Pro notitia aut quid rei præmittendum est, quod uertigo capitur quadripliciter. Primò pro quacunque gyratione siue circũuolutiõe, quæ integratur ex duobus motibus, motu scilicet pulsus & tractus, & sic accipit septimo physicorum, qui modus nõ est ad propositum. Secundo

modo accipit pro comprehensione huius motus, siue naturali, siue preternaturali, qui etiam non est ad propositum. Tertio modo accipit pro comprehensione preter naturam huiusmodi circumuolutionis aut alterius motus cum dispositione ad casum. Quarto pro comprehensione preter naturam huiusmodi circumuolutionis, aut alterius motus cum dispositione ad casum corrupta uisione, & uisus obtenebratione. Et hoc quarto modo accepta proprie dicitur scotomia, differens a uertigine tertio modo accepta, non connotante uisus corruptionem & obtenebrationem, unde omnis scotomia est uertigo non e contrario. Sed taliter uertigo accepta diffinitur, quod est actio corrupta sensus communis cum casu aut dispositione ad casum quam habes imaginatur corpus suum, aut res super ipsum reuolui. In descriptione scotomiae preter ea que ponuntur in descriptione uertiginis, additur, cum corruptione uirtutis, uel actionis uirtutis uisus ipsiusque obtenebratione, quemadmodum quid nominis scotomiae bene sonat. Quidam uero dicunt inter uertiginem et scotomiam hoc interesse, quia scotomia & uertigo importat corruptam uisionem, sed scotomia superaddit solum, uisus obtenebrationem. Quod uidetur satis consonum sententiae Ildori capitulo superius allegato, cuius sunt haec uerba: Vertigo est quotiescunque uentus confurget, & terram in circuitu mittit. sic & humectatione hominis uenae & arteriae uentositatem ex resoluta humectatione gignunt, & in oculis gyrum faciunt. Unde & uertigo nuncupata est. Superius autem dictum est ex eius sententia scotomiam tenebram importare cum uertigine, &c. Diffinitio autem Auicennae magis consonat sententiae primae. Dicit enim, uertigo est, ut haberi ipsam imagineur corpus suum, aut res super ipsum reuolui, quare non regit se, ita ut firmetur. imo cadit, nullam in diffinitione de corrupta uisione, aut obtenebratione mentionem faciens. Licet parum infra ponendo differetiam inter uertiginem & epilepsiam dicat. Vertigo autem est, ut cum homo stat, obtenebratur oculi eius, et excitatur ad hoc ut cadat, ibi enim sumit uertiginem contractam ad scotomiam, & secundum utramque uiam scotomia sub uertigine continetur. Secundum tamen Rasim primo continentis capite secundo, uertigo est dispositio in qua apparet res reuolui: & tamen homo non cadit, sed regit se. Sed in scotomia homo cadit, & uocatur sidra secundum glossam contentam in Almanforis cap. de scotomia. Et hoc modo una sub altera non continetur. Tutius uero dicitur liber, nomina sunt ad placitum. Et in harum diffinitione ly actio corrupta ponitur loco generis, quod uerum est, cum nulli in diuiduo de specie humana naturaliter conueniat. Dicitur autem sensus communis, cum ipse sit in mente post operationem sensuum exteriorum comprehendere omnia sensibilia tam propria quam communia. Et per hoc differt ab imaginationibus oculis appropriatis, & ceteris corruptis actionibus tam sensuum exteriorum quam interiorum. Reliquae autem particulae sunt ad exprimendum ipsarum quidditates. Et quanquam haec dispositio sit actio corrupta: potest tamen morbus dici cum immediatè & per se laedar operationes sensibilibiter: facit enim errare cogitatuam & quan-

doque uirtutem uisuiam, unde non est uerum quod dicit Gerardus de solo, quod principium eius est error uirtutis uisuiam, cum frequenter contingat oculis clausis & sine lumine. Laedit etiam operationes uirtutis motuiam saltem mediare: ideo in carente uisu, licet possit esse uertigo, non tamen scotomia. Ex iam dictis possumus habere solutionem quaestionis communiter solitae moueri. Cum autem contingat sensum communem errare circa obiectum sensus auditus, & aliorum sensuum, quare non dicitur in uertigine aut scotomia ita fieri corruptionem operationum aliorum sensuum, sicut sensus uisus? Ad quod responderet Gerardus d. primam causam esse, quia organum uisus est propinquissimum organo sensus communis. Quare ratio nulla est, cum aequè propinquum sit organum auditus, cum neruus auditus sit proximus panniculo cerebri, & ualde proximum est organum olfactus scilicet carunculae mamilares. Dixit secundum causam esse, quia organum uisus est maxime inter cetera organa spirituosum huius autem dispositionis causa immediata est motus inordinatus spirituum. Sed haec ratio solum concludit quod rarius debet complicari aliorum sensuum corruptio. Sed ratio ceteris melior est, quia in uertigine sensus communis errat in comprehensione motus: non est autem motus ita aptus sentiri alio sensu, sicut uisu. Et quoniam actio sensus communis possit corrumpi circa comprehensionem sensibilibus aliorum sensuum, non deberet dici uertigo, aut scotomia, sed alio nomine nuncupari. Iam ad capitulum accedamus.

CVm aliquis illud quod ante eum est, circulariter moueri uiderit, & oculi tenebescunt, & cadere uoluerit, facies & oculi in eadem hora rubuerint, uenae quoque quae sunt post aures grossae apparuerint, ex ipsis uenis facienda est phlebotomia. Et uentosa in collo & tibijs sunt ponenda. Quod si praedicta non apparuerint uenae, & facies fuerit rubea, sanguis ex cephalica uel basilica erit minuendus. Et uentosa in tibijs sunt ponenda. In hac praeterea scotomiae specie, & in ea qua ante diximus, caput ex oleo rosaceo et aceto est infundendum. Cui confert ut aeger acetosa comedat & stiptica. Et est quando prouenit sidra cum uapore qui ab aliquo eleuatur membro, cui confert, ut aliqua ex medicinis curtem adurentibus illi superponatur membro. Aeger quoque calida cibaria uitare debet.

bet. Venter quoque ex apozimate mirobolan. citrin. quod in cap. de cephalaea diximus, est soluendus.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. Primo ponit curam scotomiæ & uertiginis pendentis à materia calida, secundo à materia frigida. Secunda ibi. Cum autem neque in facie. Prima iterum in duas. Primo ponit curam scotomiæ & uertiginis pendentis à materia sanguinea; aut saltem à prædominio sanguineæ existentis in cerebro. Secundo ponit curam earundem pendentem à simili materia cerebro à membris inferioribus communicata, secunda ibi. Quod si prædictæ non apparuerint uenæ, Et ut legam ambas partes simul dicit. Cum aliquis uiderit ea quæ sunt ante ipsum circulariter moueri, aut alio motu licet non moueantur, & oculi obtenebescunt, & cadere uoluerit, hæc sunt signa communia, licet secundum approprietur scotomiæ. Et facies, & oculi rubuerint in eadē hora, & uenæ quæ sunt post aures grossæ apparuerint, hæc duo ultima scotomiæ & uertigini sanguineæ, aut saltem à prædominio sanguineæ appropriantur, & uos supplete alia signa scilicet grauedinem capitis, tensionem, tactum calidum & pulsus magnum, somnum longum, non tamen profundum, urinā rubeam, grossam, & similia sanguinem significantia. Tunc ex illis uenis quæ sunt post aures facienda est phlebotomia: præmissa tamen phlebotomia cephalicæ. Et uentosæ in collo & tibis sunt ponendæ scilicet incipiendo à parte superiori colli, & descendendo ad nates & coxas si fiat sine scarificatione: sin autem cum scarificatione procedatur e contrario à partibus distantibus ad propinquas. Quod si prædictæ uenæ non apparuerint grossæ, scilicet quæ sunt post aures, & in alijs locis capitis, quod significat sanguinis repletionem non adesse in capite: fuerit tamen facies rubea, quod significat præsentiam sanguinis multā in epate & membris inferioribus quæ cerebro communicantur: aut saltem uapores eius, tunc ex basilica facienda est phlebotomia consentiente uirtute, & alijs indicantibus de phlebotomia, præmissis dysterilenitiuo si oportuerit. Et uentosæ in tibis erunt ponendæ, id est, in locis inferioribus infra epas. Non autem in collo ne sanguis uersus caput trahatur. Et in hac & superscripta conuenit caput epithymari ex aceto et oleo rosaceo subtriplo, ad acrum, ad infrigidandum, reperiendum, & caput confortandum, & uitanda sunt cibaria calida. Et uenter ex apozimate, id est, decoctione siue infusione mirobolanorum, citrinorum, prunorū, & tamarindorum, sicut in capitulo præcedenti dictum fuit, est resoluendus, ad educendum materiam cholicam cum sanguine mixtam, quæ facit ipsum euaporare, & amplius ad superiora moueri.

Cum autem neque in facie rubedo, neque feb. cum scotomia fuerit, attendendum est, an sit stomachi subuersio & nausea, aut nō. Quæ si affuerit prius uomere cogendus est. Deinde de pillulis cochijs dosim unam su-

mat. Et à frigidis abstineat cibus.

Ponit curam scotomiæ pendentis à materia phlegmatica. Et primo existente in stomacho, & communicante uapores capiti. Secundo existente in cerebro. Secunda ibi. Si autem nec subuersio, &c. De ambabus partibus simul dicit, quod cum nō fuerit in facie rubedo, nec affuerit febris, siue feb. propriè intelligas siue caliditatem in partibus faciei & capitis sensatam, supple nec alia signa significantia materias calidas, tunc considerandum est, an stomachi sit subuersio, id est, inclinatio ad uomitū cum motu stomachi ad ipsum absq; hoc quod sequatur uomitus, aut nausea, & inclinatio ad uomitum absq; motu ad ipsum, & supple alia signa significantia stomachi læsionem, unde uerisimiliter cerebrum stomacho comparatur: tunc æger prius cogendus est uomere, aut sponte, si natura ad ipsum complendum sit sufficiens, aut artificialiter faciendo ægrum prius comedere quædam uiscosa, sicut alaganas, res salas, raphanum & huiusmodi, & notabiliter potare, tandem post horam ipso prius moto motibus inordinatis exhibere uomitiuum, sicut hanc decoctionem. ℞. radices raphani syluestris ʒ. i. sem. atriplicis, asari, ana. ʒ. s. bulliant in octo. ʒ. aquæ usque ad consumptionē medietatis, & coletur cū qua colatura distēperetur oxymellis simplicis aut scyllitici. ʒ. i. s. croci. ʒ. s. olei. ʒ. i. & tepidum in potu exhibeatur, post cuius sumptionem per horā, aut cum inceperit nauseare, æger procuret sibi uomitum digito imposito in ore, aut penna intincta in oleo, sæpe ac sæpe cum iteratione, ut exquisita fiat euacuatio. Deinde uno aut duobus diebus medijs sumat unam ʒ. pillularum cochiarum, aut s. ʒ. hieræ compositæ Gal. debita seruata custodia. Et hæc medicinæ exoluentes conueniunt, ubi non solum in stomacho, sed in partibus circumstantibus fuerit huiusmodi materiæ repletio. Si uerò sola repletio fuerit in stomacho, sufficient pillule stomachicæ, ut alefangine, & abstineat à cibis frigidis ne phlegma augmentetur.

Si autem neque animæ subuersio, neque nausea affuerit, neque caliditatis signa apparuerint, uenter ex pillulis cochijs multotiens soluiatur. Cibaria quoque frigida omnino uitet. Et gargarismus fiat, quo phlegma deponatur. Et in naribus quoque post illud, ponatur aliquid de his quæ narrauimus quo caput calefiat.

Ponit curam scotomiæ & uertiginis pendentis à phlegmate per essentiam in capite, quam primo complet euacuatione iterata cum pillulis cochijs, integrata ex minoratiua digestiua & eradicatiua. Est enim difficile materias grossas à capite educere. Secundo uitandum cibaria frigida & utendo calidis. Tertiò diuertendo cum gargarismatibus phlegma ex capite deponentibus. Quod etiā de caput purgij & masticatorijs est intelligendū, omniq; genere diuerso nū usq; ad ipsam cauterizationem factā in cōmissura

coronali, cum cætera non contulerint. Cum quibus autem debeant fieri hæc gargarismata, caput purgia, masticatoria, sufficienter dictum est in capitulo præcedenti. Hic uero commemorabo gargarisma factis huic proposito conueniens. 1. mastichis, acori, liquiritiæ, passularum. añ. 3. 2. s. i. eos hislopi añ. 3. 2. pirethri, staphisagriæ 3. 3. sinapis añ. 3. 1. contundantur grosso modo, & bulliant in 4. lb. aquæ ad consumptionem medietatis & coletur. Et colatura misceatur cum oximelle simplici, aut scyllitico: quo gargarismate utatur stomacho ieiuno. Vltimo doceat naribus immitti aliquid quo caput calefiat & confortetur ac phlegma deponatur siue resoluatur, sicut gallia muscata, species diambriæ, muscus, nux muscata & huiusmodi. Dans per hæc intelligi cætera quæ iuuant ad has intentiones complendas, sicut epithimata, odorata, & naribus insufflata. Ex odoribus autem conuenientibus est odor supradictus, aut suffumigium ex auiculis cipri, aut cortice citri, aut thure, nucemuscata & similibus. Iam superest declaratis quid nominis & quid rei & textu exposito, reliqua absoluamus scilicet causas, species, signa, prognostica & curam. Prima distinctio, species scotomiæ & uertiginis sunt duplices, scilicet per essentiam & communiter, siue absolutam, siue non absolutam. Quæ uero sunt per communiter, quandoque sunt per communiter à toto sicut in crisi & febribus, quandoque per communiter à membro determinato. Et potest esse quodcumque membrum. Sed inter cætera maxime cerebro communicans est stomachus & matrix. Secunda distinctio, uertigo siue scotomia, quædam est intensa existens cum corrupta uisione, obtenebratione & casu, quædam remissa sine aliquo istorum, quædam media. Et iterum, quædam frequens, quædam rara, & quædam media inter has. Pro notitia uero causarum. Sciendum quod causa coniuncta uertiginis est inordinatus motus spirituum & uaporum qui spiritibus sunt permixti in uenis, arterijs & neruis ac utriculis maxime anterioribus cerebri, qui spiritus inordinatè moti representant sensui communi species motus qui non est, et sic faciunt sensum communem errare, qui error est actio ipsius non diminuta, non ablata, sed corrupta. Et similiter quandoque errat uirtus uisiva propter motum inordinatum spirituum uisibilium deferentium species obiectorum exteriorum quiescentium. Ac si mouerentur, unde uisui apparet res extrinsecus moueri, & similiter apparet caput et corpus ipsius patientis reuolui. Nam æquale est secundum Auicem, cum diuersificatur proportio partium spiritus ad partes mundi, siue diuersificetur ex parte spiritus siue ex parte mundi. Idem enim sequitur effectus scilicet ut iudicetur res uisibilis moueri, siue moueatur, siue quiescat. Sed forte quis instabit, quia uertiginosus non errat circa aliquod obiectum, nisi illius species ad sensum communem per oculum deferantur, aut delatæ sint, sed cum nemo possit uidere caput suum nisi forte per species reflexas in speculo, species capitis sui non deferuntur per uisum ad sensum communem: non ergo errabit circa caput suum apprehendendo ipsum moueri quando quiescat. Ad quod dicitur concedendo illud ad quod argumentum deducit, & quod non apprehendit caput suum moueri. Sed solum apprehendit partes corporis sui ab ipso uisibiles moueri, & consequenter fit idem iudicium de capite. Causa uero remotior uertiginis est duplex, primitiua & corporea. Primitiua quidem sicut si homo moueret se circulariter, spiritus eius similiter moti etiam post quietem corporis representabant res uisibiles similiter moueri, & erit dispositus ad casum, uel forte caderet cum spiritus non figantur in membris taliter ut possint regere membra. Secunda causa, si homo aspiciat res circulariter motas aut aliter uelociter motas, sicut aquas currentes aut equos currentes: formæ enim rerum uisibilium sic motarum in spiritibus impressæ, simile motum causant in spiritibus, quare disponitur ad casum similiter prospectus ex alto loco. Tertia causa est, aspectus rerum radiosarum & uehementer lucentium sicut solis & similibus: mouetur enim spiritus inordinatè propter ipsorum excellentiam. Quarta causa sunt uoces, aut soni excedentes sicut tonitrua aut sonus bombardæ, conquassant enim totum corpus & spiritus inordinatè mouent. Quinta causa est, percussio capitis facies motum undosum in spiritibus, sicut mouetur aqua ex proiectione rei grauis in ea. Sexta causa est percussio circa dorsum, agitur enim sanguis & spiritus in uena chili, & consequenter in uenis ad caput inde ramificatis ab arteria orti. Septima causa est, furor, timor, & huiusmodi accidentia spiritus inordinatè mouentia. Similiter crapula & ebrietas, somnus multus & propriè super repletionem, longæ uigiliæ, & sic de rebus reliquis non naturalibus. Causæ uero corporeæ, quædam sunt in capite, quædam aliunde communicatæ. Primæ sunt sicut uapores diu quiescentes in capite, postea aliqua occasione commoti. Secunda uapores nouiter geniti ab humoribus, qui sunt in capite ab aliqua mala complexione fortè inducta, aut à causis primitiuis, aut corporeis. Tertia causa, præsentia malorum humorum in capite cuiusunque generis, aut motorum in ipso capite, aut saltem euaporantium: fortis enim caliditas adueniens capiti mouet humores tam naturales quam præternaturales in ipso comprehensos & facit ipsos euaporare sicut ex p̄lo auic. ignis mouet aquam motu inordinato. Causæ uero communicatæ. Quandoque sunt communicatæ à toto sicut in febrium crisi, alia euacuatiõe artificiali, per quas secundum plurimum uapores, aliquando tamen humores ad cerebrum deferuntur. Quandoque sunt communicatæ à membro particulari quocumque, frequenter tamen à stomacho & à matrice. Et hi uapores, siue sint proprii capiti siue communicati: quandoque sunt tenebrosi grossi, & tunc magis causant scotomiā: quandoque pauciores minus grossi & opaci, & tunc magis uertiginem contra scotomiā distinctam. Et qui communicantur capiti: quandoque per uias amplas communicantur scilicet meri & cannam pulmonis: quandoque per uias strictas sicut neruos, uenas & arterias extrinsecus aut intrinsecus. Iam superest agere de signis.

Signa uertiginis & scotomiæ absolutæ nota sunt ex relatu ipsius ægri. Et forte ex casu, aut dispositione ad casum quæ cernimus in ipso ægro. Et cum hoc ex relatu ægri habemus, utrum sit solum uertigo, aut cum hoc scotomia per corruptionem uisus & obtenebrationem. Intereft autem inter uertiginem et epilepsiam, quia epilepsia est cum motibus spasmodicis sine sensu aut locutione

b. de 20. G. 4. 17.
aff. port. 4.

rione parū durans, uertigo se habet ecōtrario, quāuis
 ambē cōueniunt in casu. Signa uerō uertiginis à cau-
 sa primitiua est p̄cessio illius causę & nocumentum
 ex illa causa derelictum. Si uerō causa fuerit corpo-
 rea per communitatem. Primum signū est p̄cessio
 nocumenti totius, aut membri alicuius, & quod uer-
 tigo crescit & decrescit cum cumento aut decremen-
 to nocumenti totius, aut membri communicantis,
 & quod etiam remouetur cū remotione illius, ut si sit
 à nocumento totius, tunc p̄cessit febris aut crisis aut
 aliquid huiusmodi. Similiter si pendeat à stomacho,
 p̄cessit mala digestio, deiectio appetitus, grauitas,
 nausea, uomitus, cōturbatio, & anxietas stomachi, et
 quod dolor aliquis est in anteriori parte cerebri usq̄
 ad mediū, propter communitatem neruorū reuerfi-
 uorum, & fortasse dolor est in collo propter commu-
 nitatē meri, & si sit à matrice, p̄cesserūt, aut sunt p̄-
 sentes aggritudines matricis, & similiter de alijs. Se-
 cundum signum, quia uertigo non est ita frequens,
 aut continua sicut quando est per essentia in capite.
 Tertium signum, quia operationes sensuū non sunt
 ita læsę quando est per communitatem sicut quādo
 per essentiam: quæ autem materiæ peccant in mēbris
 communicantibus ex dictis superius & dicendis infe-
 rius satis fiet manifestum. Si uerō cōmunitas sit abso-
 luta non apparēt signa materierum, aut alicuius cor-
 porei in toto, aut membro communicante, quod ta-
 men rarissimum est. Signa uerō uertiginis per essen-
 tiam sunt signa his tribus iam dictis contraria. Siue
 rō sit à mala complexiōe sine materia, in cerebro erit
 leuitas capitis, & ferē subito proutus illius malæ cō-
 plexionis notabiliter intensæ secundū plurimum ab
 aliqua causa primitiua. Si uerō sit in causa multitu-
 do uaporum, tunc aderit, et etiam p̄cessit sonitus &
 tinnitus aurium, et cuiusdam fragoris in capite, & est
 caput sine grauitate saltem notabiliter. Si uerō sit p̄-
 sentia materiæ in capite euaporātis, tunc adest graui-
 tas in capite, perturbatio sensuum tam interiorum q̄
 exteriorum, & est uertigo ualde frequens, & fortasse
 adest in capite dolor ferē cōtinuus. Signa cuiuscun-
 que materiei in capite peccantis ex p̄cedētī cap. no-
 ta sunt. Signa uerō uiarum per quas fit cōmunica-
 tio sunt, quia si fit communicatio per uenas & arteri-
 as extrinsecas sentitur ipsarum tumor, & tēsiō & pul-
 satio maior solito. Si uerō per uenas & arterias intrin-
 secas nō appareret tumor, licet magis intra sentiat ex
 tensio quædam & pulsatio maior solito, & in his ca-
 sibus nō est dolor de quo fit curandum. Si uerō fiat
 cōmunicatio per neruos, adest in collo dolor nota-
 bilis magis intra, & nullum signū ex sup̄scriptis ap-
 parēt. Et etiam quando fit cōmunicatio per uias in-
 trinsecas, compressio super uenis exterioribus, & sti-
 pitorum approximatio non cōfert uertigini. Pro-
 gnostica. Primum, uertigo frequens intensā cū per-
 turbatione sensuum, nūciat apoplexiam maximē in-
 decrepitis. Secundum, uertigo sequēs stuporem nū-
 ciat apoplexiam. Tertium, sōda sequens uertiginem
 soluit ipsam aut propter calefactionem cerebri ex sō-
 da, unde uapores resoluitur, aut propter fixationē ma-
 teriæ in cerebro, unde facit sōda & nō uertiginem cū
 prius dum esset in motu fecerit uertiginem, sine sōda
 In cura scotomix et uertiginis si pendeat à causa

primitiua, sicut si homo se mouerit in gyrū & aspexe-
 rit res uelociter motas, aut radiosas, aut audierit so-
 nos ingētes & huiusmodi p̄terquā à percussione &
 crapula. Prima intentio est remotio causę primiti-
 uæ, & uicarię eius. Vnde ager se remoueat à uisione
 huiusmodi et auditu sonorū, etc. Et remoueat uica-
 ria eius scilicet cōmotio spirituum, & eorum disgre-
 gatio quiescendo animo & corpore in loco obscuro.
 Et si causa uicaria derelicta fuerit, mala complexio in
 cerebro curetur cum cōtrarijs interioribus & exterioribus ap-
 plicitis secundum opportunitatem. Secunda inten-
 tio si humores fuerint in motu propter quantitatem,
 aut eorum qualitatem, aut modū substantię, euacue-
 tur, & diuertantur, secundū exigentiā: & cum plebo-
 tomia, & alijs generibus euacuationum, secundum
 exigentiā cuiuscunque humoris, quæ tamen cor-
 pus non p̄ter modum agitent & humores ampli-
 us in motu ponant. Et propterea sint coniuncta cum
 quibusdam stipticis, & confortantibus sicut sunt mi-
 robolani. Et intendatur ceteris generibus diuersio-
 num. Etiam humores, si noceant, qualitate & mo-
 do substantię alterentur, & ad medium reducantur
 sibi conueniens donec fiant benigni, aut sint euacua-
 tioni p̄parati. Ingrossario tamē plus iuuat, & pro-
 hibet motum quā subtiliatio. Tertia intentio est re-
 spectu accidentium sicut tenebrositas derelicta corri-
 garur cum clarificantibus, de quibus infra. Acciden-
 tia etiam imminetia prohibeantur. Vnde non stent
 super scalis nec super aquis, nec prope ignem, nec pro-
 pe flumina, aut alias res periculosas in quas faciliē p̄-
 cipitari possunt. Quod p̄ceptum multo magis in
 epilepticis est seruandum. Quarta intentio est debi-
 tum regimen uitæ. Debet enim locari in aëre tempe-
 rato & aliquantulum obscuro, & sint cibi & potus com-
 munitate frigidi, acres & stiptici, sicut succus citonio-
 rum, granatorū in quibus buccellę panis infundantur,
 nec sint uaporosi aut uetofabiles, imo fumorū repres-
 siui, dormiat notabiliter, moderatē inaniatur, quies-
 cat mēte, & corpore sit tranquillū. Si uerō p̄deat à
 solutione cōtinui, curetur cura solutionis cōtinui du-
 cta in cap. de sōda. Quod si post curā solutionis con-
 tinui remaneat uertigo, curetur per remotionem cau-
 sę eius, sicut in sequentibus dicitur. Similiter si pende-
 at à crapula aut ebrietate, curetur cura facietatis nau-
 seatiuæ, & ebrietatis infra ponenda, inter cetera pro-
 uocetur uomitus, diu abstineat à cibo et potu, nisi for-
 tē in ebrietate biberit aquam, multum dormiat, resi-
 duum facietatis nauseatiuæ cum soluentibus leuibus
 deponat, & cū confortantibus stomachū sicut diatrio-
 pipereō procedatur maximē, in corruptione ad acē-
 tosum, & quę uapores reprimūt, in fine mēse exhibea-
 tur, semē caulis, post ebrietatē exhibitū, sedat ipsam.
 Cura uerō scotomix per communitatem siue à to-
 to siue à determinato membro perficiat, sicut superius
 in cura sōdæ dictum est longo sermone. Qui huic ca-
 pitulo est accommodandus, cū nō sit bonū idē totiens
 replicare inter cetera cauendo à uaporosis & uento-
 sis, & sumēdo in fine mensę quę uapores reprimūt.
 Cura scotomix per essentia si fuerit mala complexio,
 sine materia curanda est cum cōtrarijs tam interioribus
 quā exterioribus applicitis. Et cū hoc caput confortan-
 tibus, de quibus in p̄cedenti capitulo actum est.
 Si uerō

Si uero pendeat à uaporibus prius in capite quiescentibus, nunc uero propter agitationem facientibus scotomiam iam causa à qua generati sunt, remota. Prima intentio est diuertere uapores & uentositates, quæ facillè possent illos uapores fouere & augere cum clysteribus, fricationibus, lotionibus, & cum omni genere diuersionum. Secunda intentio est illos uapores in capite existentes resolvere cum fricatione capitis, scalpione, pectione, & tandem cum medicinis ipsos resoluentibus, interius et exterius applicitis. Ex quibus sunt sacculi ex milio & sale in farragine cum uino & pauco aceti torrefactis. Interius autem sumenda sunt theriaca, mithridatum, diamuscum, diambra, diaciminum, coriandrum, anisum, ameos, & huiusmodi uentositatem carminantia: magis tamen aut minus calefacientia secundum ipsorum uaporum naturam. Tertia est confortatio cerebri & etiam aliquorum instrumentorum sensuum, si debilia fuerint cum theriaca, mithridato, diamusco, diambra, foxniculo, et similibus cum sacculis suprascriptis. Quibus possunt addi cortices citri, nux muscata, maiorana. Sed hæc intentio etiam simul cum secunda compleri possit. Quarta est correctio accidentium ut sonitus & tinnitus cum impositione olei amygdalarum amarum in auribus. Et cum præseruatione ab accidentibus imminetibus. Quinta autem, cum debita administratione sex rerum non naturalium completur, unde uidentur uaporosa & uentosa, & caput grauata sicut phaseoli, fabæ, cicer albū, pisces uiscosi, cancri, ostraca, & genera conchilium, caules, capitij, fructus humidi, auellanae recentes, &c. ex libro simplicium cognoscenda. Vinū potens in modica quantitate ualeat, procuretur bona stomachi & epatis digestio, exercitium supra famem, similiter somnus supra uacuitatem, cōfert ad resolutionem uaporum & uentositatum. Accidentia animi caput moderatè calefacientia iuuant similiter.

Cura uertiginis materialis quinque exigit intentiones curatiuas, prima euacuat, secunda diuertit, tertia malam complexionem alterat & materiam uehementem repercutit: existentem autem in capite resoluit, & extrahit caput confortando, quarta corrigit accidentia, quinta ordinat debitum regimen sex rerum naturalium.

Prima intentio, siquidem materia fuerit sanguinea & peccet solo quanto non solum in capite, sed in epate & alijs membris, materiam capiti communicatibus fiat phlebotomia, primò de saphenis uel basilica uel communi aut pluribus secundum quod tibi uidetur magis expediens, deinde fiat phlebotomia ex cephalica, & demum phlebotometur uena post aures, cuius iuuamentum ferè est commune ad omnes scotomias materiales: diuertit enim pro parte materiam in capite coniunctam eradicat. Confert etiam stomachicè per communiter si cauterizetur aut laqueetur prohibendo transitum uaporum, aut materiarum ad cerebrum anterius. Si autem peccatum sanguinis fuerit, in solo capite sufficit sola phlebotomia cephalicæ, & postea uenæ post aures aut frons, aut uenarum nasi, aut uenarum quæ sunt in cute capitis, aut in his locis sanguisugæ apponantur, postponendo semper quæ causam coniunctam euacuant. Si autem peccet

in quali propter admixtionem alicuius humoris, cum sanguine ille euacuetur cum proprijs secundum ipsius naturam & ingrossetur & subtilietur secundum oportunitatem. Secunda intentio, diuersio fiat cum clysteribus, uentositationibus, fricationibus, ligaturis, & cum omni genere diuersionum usque ad cauterium. Iuuamentum commune huic, & omnibus speciebus uertiginis materialis est, si comprehenderit ipsam provenire à retentione mēstruorum, aut sanguinis hemorrhoidalis, aut saniei ex auribus, aut alterius euacuationis consuetæ, illa solita euacuatione remouetur. Tertia autem intentio, perficitur cum applicitis ad extra infrigidantibus & repercutientibus si opus est, sicut ex oleo rosaceo & aceto subtriplo ad ipsum. Et in fine cum resoluētibus puris, sicut oleo chamomelino in medio mixtis. Et potest fieri cum emplastris, fomentis, embrocis calidis, aut frigidis secundum materiam exigentiam ex capitulo de sode colligendis.

Quarta intentio, correctio accidentium fiat secundum accidentia præsentia & imminetia, sicut dictum est. Quinta intentio, debitum regimen seruetur sicut in sode sanguinea dictum fuit. Curatio autem reliquarum specierum uertiginis materialis, sicut cholericæ phlegmaticæ & melancholicæ, completur iuxta quinque intentiones dictas, sicut dictum fuit, & ferè cum eisdem remedijs, quorum rememoratio præcessit in sode à simili causa pendente, huic ergo capitulo accommodentur. Si enim in singulis capitulis fieret dictorum superius iteratio, nimium uolumen excresceret. Et hæc de hoc capitulo sufficiant.

DE PHRENESI CAP. III.

Phrenesis, Karabitus, sirsen, sunt nomina synonyma, significantia apostema scilicet calidum in panniculis cerebri, de quo diuersi auctores sub his diuersis nominibus determinant. Phrenesis autem est uocabulum Græcum, licet sit sumptum ab accidente consequente hoc apostema, quod accidens est rabies cum alienatione. Attamen apud auctores medicinæ significat hoc apostema: Karabitus uero est nomen Arabicum sumptum ab accidente quod est alienatio, proprie enim in lingua Arabica importat alienationem, sed transumptum est ad significandum apostema, ad quod sequitur huiusmodi alienatio. Sirsen uero est dictio persica à sir quod est caput & sen apostema quasi capitis apostema, sicut birsen dicit à bir, quod est pectus & seu apostema quasi pectoris apostema. Et ex his patet quid rei. Est enim apostema calidum per essentiam in panniculis cerebri, ad quod significandum sunt hi tres termini contracti. Verum aliquando ampliatur ad significandum apostema calidum in substantia cerebri, quod est deterius & ut plurimum interficiens in quarto, licet apostema panniculorum sit magis dolorosum. Et cum transeunt quartum, secundum plurimum sanantur. Est enim aegritudo peracuta. Et si quis quaereret quis panniculorum cerebri frequentius apostemetur. Dicendum hoc esse difficile scire, sed dura mater citius debet apostemari, ex eo quod natura est minus de ipsa sollicita & fortè à causis extrinsecus occurrētibus. Sed pia mater frequentius quia mollior

mollior & plena uenis & à causis intrinsecus occurrentibus magis apta apostemari. Compara ergo hæc adinuicem: sed in pia matre est deterius. Neque habeas pro inconuenienti substantiam cerebri posse apostemari. Licet Serap. opinatus sit cōtrarium, nam omnia membra siue dura sicut ossa, siue mollia sicut cerebrum, & pulmo, possunt apostemari: omnia enim membra que possunt extendi cum nutrimento, & augeri, possunt etiam extendi cum superfluitate & sic apostemari. Notate tamen membra dura sicut ossa & panniculi frequentius apostemari à materia calida subtili: si apostementur per uiam defluxus. Et cōtrario membra rara mollia à materia frigida & grossa. Vbi uero per uiam paulatinæ congestionis, tunc apostematur secundum naturam sui nutrimenti, & superfluitatis inde decisæ.

Cum aliquem febris conclusa continuata inuaserit cum forti capitis & oculorum grauedine, & in facie atque in oculis uehemens fuerit rubedo, & capitis dolor, & horror luminis affuerit, & in pulsu uelocitas & frequentia superfluitas inuenientur, signa phrenesis certissima iudicabuntur. Quod si lingua nigra aut citrina fiat, & permisceatur intellectus, & multum fuerit alienatus, et uigilauerit multum, iam phrenesis perfecta est.

Diuiditur præsens capitulum in duas partes. Primum agit de phrenesi theoricè: secundo practicè. Secunda ibi. Aegro itaque antequam. Prima in duas. Nam primum ponit signa phrenesis inchoantis siue nondum confirmatæ. Secundo ponit signa phrenesis confirmatæ. secunda ibi. Quod si lingua nigra. In prima parte Rasis ponit sex signa phrenesis inchoantis: siue prognostica phrenesis ex proximo secuturæ. Prima est febris continua conclusa, id est, in qua non sunt ex crescentiæ aut decrescientiæ, quod est proprium febri sanguineæ, ex sua forma specifica, ut non crescat de die in diem, nec de tertio in tertium, aut de quarto in quartum. Vbi uero phrenesis esset cholericæ febris, sequens esset caufon aut tertiana continua. Secundum signum est fortis grauedo capitis et oculorum, propter multitudinem sanguinis in his partibus grauitantis, licet hoc signum sit commune phlegmati & melancholiæ, & non sit cholerae. Tertium signum est uehemens rubedo in facie & oculis, quod est proprium signum sanguinis, si rubedo illa fuerit purpurea tendens in obscurum. Vbi autem fuerit purpurea tendens in citrinum, magis attestatur cholerae. Verum tensio uenarum facit differre inter sanguinem & choleram, cum in sanguine sit ualde maior. Quartum signum est capitis dolor proueniens immediate à mala complexione & solutione continui. Est tamen differens in pro-

ueniente à sanguine aut à cholera, quando proueniens à sanguine sit extensiuus, à cholera uero mordicativus et pungitiuus. Quintum est horror luminis, quia lumen nimium calefacit, disgregat & dilatat amplius sanguinem, & spiritus ipsos magis ad partes faciei et oculorum trahit, unde aeger ex lumine læditur, propterea se conuertit ad tenebras effectus cōtrarios iam dictis producentes. Verum horror luminis posset ex alijs causis cōtingere, sicut ex spiritibus paucis & subtilibus, & cæteris causis noctilopæ, sicut ex ulcere corneæ. Sextum signum est uelocitas, & magna frequentia in pulsu propter necessitatem adauctam, cui non potest per solam magnitudinē satisfieri, aut fortè debilitata uirtute aut instrumento facto inobediēte pulsus est paruus. Verum in proueniēte à sanguine pulsus est maior, & magis plenus quàm in proueniēte à cholera. In secunda parte ponit signa demonstratiua phrenesis præsentis, & iam confirmatæ. Primum est lingua nigra, aut citrina: citrina quidem si proueniat à cholera, & tandem efficitur nigra & arida adustione continuata. Si uero à sanguine efficitur nigra per adustionem non tamen præcedente citrinitate. Secundum signum est permixtio intellectus, id est, corruptio cogitatiuæ & existimatiuæ, & multa alienatio, id est, corruptio & magna læsio sensus communis, quæ etiam imaginatiua dici posset: potest enim & rectè & corruptè imaginari, quod multo magis potest cogitatiua, quod prouenit ex phrenesi in organis harum uirtutum facta: nam si fuerit in primo uentriculo, magis læditur sensus communis: si in secundo, magis cogitatiua & existimatiua: si in posteriori, magis memoratiua. Tertium & ultimum signum est superflua uigilia proueniens ex uehementi caliditate & siccitate, sicut ad somnum magis facit frigiditas & humiditas.

Iam opus est pro complemento huius partis theoricæ ut ponamus species et causas, & secundo suppleamus signa quæ ommissa sunt à Rasi, & ultimo prognostica iuxta morem consuetum. Phrenesis est duplex, uera & non uera. Vera est apostema calidum per essentiam in panniculis cerebri. Et est duplex. Quædam parua lædens unum uentriculum tantum pendens à pauca materia. Quædam est magna ualde pendens à multa materia apostemante ferè omnes partes pāniculorum, & lædente ferè omnes operationes sensuum interiorum. Imo quandoque adeo ex crescens est, ut propter multitudinem extensionis dilater commissuras, & tumor partibus extrinsecis communicetur. Quædā est media inter has. In parte ramen posteriori raro fit phrenesis propter frigiditatem eius, sed secundum plurimum lithargia. Phrenesis autem non uera, quæ dicitur periphrenesis, id est, iuxta phrenesim non est apostema, sed adiunt accidentia ueram phrenesim consequentia, sicut dolor, alienatio, & uigiliae, & huiusmodi: hæc autem pender à materia, siue à uaporibus à toto communicatis calidis, imprimētibz nocumentum in cerebro, sunt in febribus acutis, & crisi. Et aliquando per simplicem alterationem acuendo spiritus & sanguinem. Secunda causa est humoris acuti in ore stomachi, uel in fundo cōmunicantes nocumentum cerebro. Tertia causa est apostema stomachi, aut dolor

uehementis in eo, similiter apostemata cholericum uel sanguinea in alijs membris communicantia fumos uel nocumentum absolute, sicut apostema almochari, diaphragma pleurefis, mediastini, pulmonis, lacertorum, pectoris, uelice, renum, matricis, intestinorum, iuncturarum, & membrorum neruorum. Veræ autem phrenesis, causæ primitiue, sunt omnia exacuentia cholera, uel sanguinem & cerebrum multum calefacientia sicut sol, aeris caliditas, cibi & potus nimis calidi & multi, motus fortes & huiusmodi. Causæ corporeæ sunt duplices, antecedentes & coniunctæ. Antecedentes sunt humores subtile, acuti, apti penetrare in panniculos sicut sanguis cholicus, cholera rubra, cholera citrina, et quodcumque humores adusti subtile, sicut sanguis & cholera adusti: frequenter tamen euenit à sanguine & est benignior, deinde à cholera siue rubra, siue citrina & est malignior: deinde ab humoribus adustis, & est malignissima cui associatur demonium. Placuit tamen Auenzoar ipsam posse prouenire à melancholia fecali tertio thesiri. Et subdit quod licet humores calidi sint frequenter in causa sicut cholera & sanguis: ipsi tamen non sunt puri, sed aquoso phlegmati permixti à quo cerebrum non denudatur. Causæ autem coniunctæ sunt idem humores actu facientes apostema.

Signa ueræ phrenesis, quædam sunt prognostica, quædam sunt demonstratiua, & quædam rememorative. Primum signum prognosticum phrenesis sunt febres acutæ, continuæ, maxime cum dolore capitis. Secundum, stipticitas uentris in eis et subtilitas, urinæ, materia cholericæ petente superiora. Tertium obliuio rei nouiter factæ sine causa exteriori, quia significat materiam iam opprimere cerebrum. Quartum, somnia mala terribilia, et procliuas ad iram & odium sine causa, quia arguit materiam calidam petere cerebrum. Quintum, dolor capitis cum repletionem & extensionem uenarum faciei & oculorum. Sextum, facies citrina præter solitum. Septimum, uigiliæ prolixæ. Octauum, somnus inquietus cum furore & clamore. Nonum, stridor dentium non consuetus in somno & in uigilijs.

Signa autem prognostica phrenesis iam inchoantis, sunt illa sex quæ posuit Rasis, in textu superius exposita, scilicet, febris continua conclusa, magna capitis & oculorum grauedo, uehementis in facie & oculis rubedo, dolor capitis, horror luminis, uelocitas in pulsu et magna frequentia. Et ex prognosticis est corporum præparatio. Corpora autem præparatiua ad phrenesim, sunt sanguinea et cholericæ, & magis iuuenes quam senes. Ex qua cõter senes non euadunt. Iuuenes autem cæteris paribus magis euadunt. Sed pueri maxime inter omnes.

Signa uerò demonstratiua phrenesis præsentis sunt tria posita à Rasi, & superius exposita, scilicet lingua nigra, aut citrina, permixtio intellectus, et multa alienatio, nec non multæ uigiliæ. Hæc namque signa simul cum præcedentibus & cum his quæ sequuntur præcisè distinguunt ueram à non uera, & cum his quæ significant partes cerebri læsas, & cum significantibus causas cõiunctas ipsius phrenesis, sunt certa signa demonstratiua phrenesis præsentis.

Signa distinctiua inter phrenesim ueram & non ue-

ram sunt, quia cum dolor capitis perseverat, & alienatio, & uigiliæ, & febris continua conclusa, & cætera signa phrenesis iam dicta, tunc est phrenesis uera. Si uerò hæc accidit interposita & crescente febre, aut alia ægritudine, quæ præcessit crescat, & illa decrescere decrescant, & illa recedente etiam recedant, tunc est phrenesis non uera, sicut in paroxysmis febris acutæ frequenter accidit, & non est aliqua phrenesis per cõmunitatem quæ ita appareat continua, & faciat medicum quandoque errare sicut quæ sequitur apostema diaphragmatis. Secundo, phrenesis uera non fit subito, sed paulatim, & semper augendo procedit, non uera fit subito, & quandoque augetur & quandoque minuitur. Tertio, in non uera præcessit nocumentum torius aut alicuius membri, sed in uera non est hoc necessarium.

Signa uerò causarum phrenesis sunt, quia incipit cum rubedine oculorum, uenarum tensione & plenitudine, & cæteris signis attestantibus sanguini, ex ætate, complexionem, habitudine, tempore, regimine, &c. tunc illa phrenesis est sanguinea. Præterea est cum risu. Tertio, est uniformis propter motum sanguinis esse uniformem. Alij autem humores habent motus determinatos, quibus mouentur, aut de die in diem, aut de tertio in tertium, aut de quarto in quartum. Quarto, distillatio sanguinis ex naribus.

Quinto, oculi pleni lipa. Sexto, somnus longus. Septimo, imaginationes rubæ. Octauo, lingua rubra posita nigra per adustionem. Si uerò sit cum rixa, rapacitate & audacia, in quietudine, & facies & oculi fuerint citrini & fici, & multæ uigiliæ, lingue citrinitas, deinde nigredo cum asperitate & alia signa significantia cholera, tunc phrenesis est cholericæ, quibus addas imaginationes citrinas, attenuationes narium, tractionem frontis ad superiora, spasmatis, musculis frontis.

Si uerò sit cum rixa continua, maxima inquietudine permixta melancholice, cum continua uigiliarum instantia, febri acutissima, cum nigredine lingue & asperitate, & cæteris signis significantibus humores adustos, tunc pender ab humoribus adustis, & sunt oculi turbati ex directo pupillæ, uaporibus adustis spiritibus permixtis. Et cum his duabus speciebus frequenter cõiungitur demoniū, ita ut sint cum furore maximo omnes percutientes, nec possunt teneri nisi difficulter. Et si non tenerentur proijceret se ex fenestris. Si uerò sint nunc cum fletu, nunc cum risu, & cæteris significantibus humores mixtos, tunc pender ab eisdem.

Signa uerò significantia partes cerebri læsas sumuntur maxime à læsione operationum. Nam si lædatur sensus communis, ut quia non cognoscat sensibilia extrinseca sibi prius nota, nec inter ea ponat conuenientiam & differentiam, & colligant uillos, & sciscitantur species sensorum, quæ non sunt & corrupte imaginantur, tam in luce quam in tenebris, tam oculis apertis quam clausis, tunc læsio est in parte anteriori cerebri, & in primo uentriculo, quod confirmatur si nocumentum oculis communicetur, ut quia fiat ophthalmici, et similiter si dolor suus fuerit in parte anteriore. Si uerò dolor fuerit in medio capitis, & læsa fuerit cogitativa ut quia male discurrat, male componat & diuidat, & similiter existimatiua, ut quia eliciat amicitiam, ubi debet elicere inimicitiam, aut e contrario, & alia similia, tunc phrenesis est in secundo

cundo uentriculo & hic turbatur, in eo quod audiat quia nerui auditus scilicet, quintū par. correspondet medio uentriculo, licet sit uerisimilius neruos omniū sensuum ad primum uentriculum, scilicet, organum sensus communis terminari, & loquitur cum alienatione plurima, quia cogitativa est domina sermonis. Si uero fuerit obliuiosus nec referauerit species aut intentiones, quas merito debuisset seruare, ut quia petit urinale & obliuiscit propter quod petit, tunc phrenesis est in posteriori cerebro, et præcipue si dolor fuerit in parte posteriori. Si uero fuerint læsæ plures uirtutes cum febre maxima & dolor fuerint in pluribus partibus, uerisimile est phrenesim multis partibus communicari, sed hoc attendendū est in principio non in statu, quia forte tunc posset nocumentum unius partis toti communicari.

Signa uero distinguuntur inter apostema cerebri, & panniculorum sumuntur ex dolore. Quia non est dolor nisi obrutus ex apostemate cerebri, & adest rubedo aut citrinitas in oculis, ita ut appareant ophthalmici, & pulsus est undosus. Contraria signa sunt in apostemate panniculorum, & apparent oculi in apostemate cerebri, quasi exeuntes propter impressionem à neruis opticis apostematis, & oculus illius lateris in quo est apostema sibi magis comparitur. Verum apostemate existente magno quandoque dolor ultra modum excreuit propter extensionem panniculorum, sed quomodocunque sit, cæteris paribus, magis communicatur nocumentum oculis in apostemate sanguineo, & cholero cerebri quam panniculorū, & est maior ægritudo, secundum plurimum interficiens in tertio propter nobilitatem membri, & si non moriuntur, usque ad quartum euadunt.

Signa temporum phrenesis. Primum, quia subscipta accidentia remissa cum inchoant significant principium. Cum manifeste augentur, augmentum. Cum stant in sua maxima intensione, statum. Cum uero manifeste declinant, declinationem, licet raro declinent, cum secundum plurimum moriuntur.

Secundum, dolor communicatus parti posteriori quando solum prius fuerit in scincipite, significat phrenesim factam, & materiam in panniculis fixam, & hoc uniuersaliter significat exicatio oculorum à forti flamma, & postea fluxus lachrymæ inuoluntariæ maximè ex oculo correspondente parti læsæ propter defectum contentiuiæ, & est mortale, primo prognosticorum, comment. 14. & Gale. quarto Aphorif. confirmat, etiam significat fluxus sanguinis narium guttatim, natura nequeunte multum expellere.

Signa uero rememorative sunt accidentia ex phrenesi derelicta. Signa permutationis phrene. sunt hæc. Si permutatur in lithargiam, primò remittuntur omnia accidentia sequentia feruorem. Secundò profundantur oculi magis quam in lithargia non consequente phrenesim, magis consumpta humiditate ex phrenesi præcedente, & materia magis deriuata uersus posteriorem uentriculum. Tertio adsunt magis lachrymæ, materia ad naturam phlegmatis uersa. Quarto currit saliuua siue superfluitas humida. Quinto, pulsus tardus diminuta necessitate, & lenis, & undosus remota siccitate. Signa permutationis in alchachilos sume-

da prima tertij, tractat. 3. cap. de signis Karabiti circa finem. Primo occultatur nigredo oculorum oculis tractis uersus cerebrum sicut in appropinquantibus morti, & apparet albedo oculorum uersus cerebrū, secundò dormit supinus uirtute debilitata. tertio inflatur etiam uenter eius propter defectum caloris, uapores grossos exiccantis & non resoluentis unde retinentur. quarto extenduntur ossa pectoris anhelitu magnificato ob phrenesis augmentum. quinto multiplicatur tremor membrorum ob defectum uirtutis motiue, uel tremor, id est, iectigatio propter uapores communicatos musculis & neruis. sexto apparet testiculi albi sanguine & spiritu tractis ad caput. Si uero permutetur in hecicā, fit pulsus durus, paruus, frequens, secundum habitudinē unam, oculi profundi, dantur ob resolutionem humiditatum, corpus denigratur ex arefactiōe, & multa alia signa hecicorum. Si mutetur ad spasmus, erunt signa spasmī, de quibus infra dicitur in capitulo de melancholia. Si uero ad substantiam cerebri signa patet ex dictis superius.

Prognostica. Quando phrenesis adeo excreuerit ut separauerit commissuras et tumor partibus extrinsecis sit communicatus, tunc est mortalis. Secundū, permixtio rationis cum fletu & risu ex quo significat permixtio sanguinis & melancholiæ est ualde mala.

Tertium, phrenesis facta ex permutatione peripneumoniæ ad ipsam, ut septimo Aphorif. 12. Aphorif. In perepneumonia phrenesis malū, quod intelligendū est tam de non uera phrenesi significante calorem intensum, & fumos malignos caput perentes, quam de uera phrenesi permutata materia symptomatice ad cerebrum, quæ permutatio est praua & mortalis, ut post tantam ægritudinem apostemetur cerebrū membrum principale non uera autem significat malitiam peripneumoniæ, quæ secundum plurimum est mortalis. Similiter si phrenesis uera permutetur ad non ueram est malum ualde, sicut si materia apostematis panniculorum cerebri permutetur ad pulmonē, aut diaphragma, & sic cordi uicinetur. Similiter si tāta sit ut communicet nocumentum absolutū illis membrīs ut quia doleant, & impediatur in operationibus suis est uehementer malum, &c. Similiter si permute- tur ad substantiam cerebri est citò perimens. Si uero permutetur ad loca emunctoria cerebri, aut aliquod membrū ignobile, permutatio illa salubris est. Quartum, spasmus sequens phrenesim mortalis præcipue de inanitione. Quintum uomitus cholere rubæ aut citrinæ præcipue ad quem nō sequitur alleuatio malum, sed uomitus cholere zinariæ prædicat festinam mortem. Sextum, urinæ limpide claræ significantes deriuationem materiæ ad cerebrum, & uirtutis impotentiam ad expellendum ad uias urinæ, ut quarto Aphorif. Quibus urinæ limpide claræ pronunciat mortem. Vnde Auicenna, nullus uisus est habens apostema in partibus cerebri, cuius urina fuerit aquosa qui euaserit. Septimum phrenesis in qua habetur fiducia est in qua æger recordatur alienationum suarum: nō enim est cerebrum ultimè oppressum. Octauum, sperandum est in ea in qua est risus continuus, ut sexto Aphorif. desipientiæ quæ cum risu sunt securiores. Significant enim materiam sanguineam benigniorem, Nonū, fluxus hæmorrhoidalis sequens ad phre-

neſim bonum, cum per illum quandoque etiam cauſa coniuncta educatur, aut ſaltem cauſa antecedens fo uens cōiunctam, unde poſtea redditur uirtus fortior ſuper coniunctam ad eam reſoluendam. Decimum, phrenēſis in lithagiā permutata ſecūdm plurimum bonum: ſi uerō ad dæmonium, pernicioſum: mate ria facta aduſta, & magis acuta & maligna, ſi uerō ad hecticam materia communicata toti, aut reſoluta, ca liditate fixa remanente bonum, dat enim inducias, permutata autem in aſchachilos mortem feſtinam, materia putrefaciente panniculos cerebri. Vnde ſe primo Aphoriſ. Quicumque in cerebro ſchachi lon patiuntur, in tribus diebus pereunt. Vnde ci mum, fluxus ſanguinis narium frequenter ſoluit phren. Duodecimum, ſudor ſuperueniens non dia phoreticus frequenter eſt ſalubris terminans iſtam. Si uerō fuerit diaphoreticus, mors feſtina ſequitur. Decimum tertium, rixa fortis, continua inquietudo, ſaltare ſuper parietes in phrenēſi uera, mortale: ſigniſi cat enim dæmonium eſſe coniunctum. Et ſi quæra tur unde eſt quodd ſunt ita fortes ſecundum uirtutem motiuam, & ita debiles ſecundum ſenſitiuam. Di cendum quodd apparent fortiores ſecundum uirtutē motiuam quā ipſi ſani: quod tamē non eſt uerum, ſed hoc prouenit quia mouentur ſecūdm ultimum conatum parendo menti læſæ quod nō faciunt dum ſunt ſani, niſi fortē fugientes pericula ſicut ignem, aut à uolentibus ipſos occidere: uirtus autem ſenſitiua di minuta eſt, quia exicatio proueniens à phrenēſi, ma gis lædit neruos ſenſitiuos quā motiuos, cum ner ui ſenſitiui operationes ſuas magis humiditate perſi ciant, & etiam ex alio, quia mente ægrotante non de bitē ſentiunt etiam res doloroſas iuxta Aphoriſmū ſecundæ partiē. Quicumque dolentes aliquid corpo ris plurimum dolorem non ſentiunt, hiſ mens ægro tat. Decimum quartum, ſi bibunt aquam & ſtrangu lantur, de proximo moriuntur, anhelitu impedito, aut fortē meri ſpasmato, et præcipue ſi in ſtrāgulatio ne illa ſpuma circa os appareat: nigreſcunt enim eorū facies propter caloris innati ſuffocationem. Et quia ſpiritus & ſanguis ad loca ita uehementer læſa conuer tuntur & oculi ſunt cōgelati, non moti propter ſpaſ mum, & ſit frequenter ſtrāgulatio cum propter ne ceſſitatem magnam non poſſint tanto tempore con tinere anhelitum donec bibant. Decimum quintum, quando currunt in ſania ducti agentes ſecundum ulti mum conatum, deinde cadunt ſtatim, moriuntur ſpi ritibus reſolutis. Decimum ſextum eſt ſumptum ex libro Hippocr. ſi in ſiniſtro pollice infirmē apparue rit ſimilitudo fabæ citrinæ, duræ, & infirmus ſoluatur ſuperius & inferius, moritur in ſexto: nam per il lud apparens in pollice, ſcilicet manus & ante ſigna digeſtionis ſignificat materia mala uenenofa, ſcilicet ſtimulans uirtutem, & uirtus ſignificatur impotens cum non poſſit expellere ad extra, ſed ſolum creſcere per uiam permutationis & partem ualde paruam, & hoc confirmat, quia natura ſymptomaticè operans ſoluit uentrem uel prouocat uomitum, ideo moritur in ſexta quæ aſſimilatur ſæuo tyranno ſi non mori tur ante. Decimum ſeptimum, in quiſitio extremita tum & feſtucarum eſt mortale, primo prognostico rum com, 27. ad finem, quia ſignificat ultimam corru

ptionem uirtutum interiorum, & frequenter ſit cum clauſione oculorum. Decimum oſtauum, eſt frigus perſeuerans extremorum propter conuerſionem ſan guinis & ſpirituum ad caput apoſtematum, ut quarto Aphoriſ. com. 48. In non deficientibus febris ſi quæ extra frigida fuerint, &c. Et 7. Aphoriſ. In mor bis acutis frigiditas extremitatum malū. Decimum nonum, anhelitus diuerſus & inordinatus aliquan do interceptus propter fortem dolorem, aut quia ani ma eſt ad aliud officiū conuerſa, unde obliuiſcit anhe lare, malū. Vigefimū, extēſio oſſium pectoris neceſſi tate cogente ad multū dilatandū pectus, licet hoc am plius appareat in phren. ab apoſtemate diaphragma tis, malum. Vigefimum primum, tremor membro rum nocumto epatis communicato, malum, aut fortē ſoluit ægitudine. Vigefimum ſecundum, abſciſſio uocis aut propter ſpasmus, aut quia obliui ſcitur loqui, mortale. Vigefimum tertium, ſi deſy derant aquas, ſed parum bibunt, quia continuè ua rijs imaginationibus diſtrahuntur, malum. Vige ſimum quartum, pulſus durus ſerrinus eſt propter apo ſtema eſſe in membro ſiccō, ſcilicet panniculis. Si uerō eſſet in ſubſtātia cerebri eſſet unduoſus: ſi in utra que erit mixtus, & eſt uelox, ut ſatis faciat neceſſitati, & tandem ægitudine procedente fiet frequens, tum quia uirtus debilis nō poterit ipſum magnificare aut uelocitare, tum quia inſtrumentum fiet inobediens. arteria præter modum exiccata, diuerſus & inordi natus propter uirtutis debilitatem, & fortem pu gnam, tremulus propter uirtutis ſubleuantis impo tentiam, aut propter reſiſtentiam ex duritie arteriæ, aut quia ſequitur tremorem cordis ad quem ſequitur ſyncopis, ſpasmus, quia arteria reperitur tenſa ad modum chordæ & ſignificat phren. factam & ſpaſ mum de inanitione aut non proportionatū ad mate ria. Et ſi erit calida & ſicca magis quā frigida & hu mida ſignificat ægitudine factam, & ſecundum plurimum mortem. Vigefimum quintum, quieſcere in maiori parte corporis & non in manibus arguit uirtutem proſtrātam quæ prius deſicit in pedibus & in manibus. Vigefimum ſextum, pigre loqui & ſub miſſe cum alienatione mortem portendit ſignificans uirtutis oppreſſionem. ſecunda quarti, alienatio cum alguaza, id eſt, uoce ſubmiſſa & taciturnitate eſt mor tale. Vigefimum ſeptimum, diſtillatio urinx inuolū tariæ, malum. Vigefimum oſtauum, obliuiſio dolo ris, niſi abſint cauſæ doloris, mortale.

Aegro igitur antequam prædicta com pleantur accidētia, eſt ſubueniendum ex ſan guinis detractiōe, & uentris ſolutione cū ſucco fructuum.

In hac parte Raviſ ponit curam phrenēſis. Et diui ditur hæc pars in quatuor. Primò curat phrenēſ. per euacuationem, ſecundo per dietam, tertio cum medi cinis capiti applicitis, quarto iterum redit ad complē dum ſermonem de phlebotomia. ſecunda ibi. Nutri mentum uerò, tertia ibi. Caput autem. quarta ibi. iuxta finem capituli. Cum autem eger. De prima par te dicit Raviſ phreneticum eſſe curandum cum ſan guinis extractione antequam prædicta accidētia compleantur.

compleantur. Pro quo notate festinandum esse in cura phrenesis, et similiter in cura cuiuscunque ægritudinis non dantis inducias: nam si in phrenesi expectetur quod materia sit fixa, cura erit cassa & uana, uerum antequam figatur, cura est possibilis, sed non apud negligentes; & stolidos, ergo quamprimum occurris præmissa uentris lenitione, aut natura. aut arte cum clysteri leniente, fac phlebotomiam uirtute, & ætate et ceteris consentientibus quæ phlebotomia sit copiosa usque ad syncopim exclusiue si oportuerit multo sanguine peccante, & fiat ex cephalica eiusdem lateris, post hæc si cholera fuerit permixta sanguini cum succo fructuum euacuetur, quæ medicina superius posita fuit in cap. de cephalæa.

Nutrimētum uero eius sit aqua hordei semel, aut bis in die sumpta secundum consuetudinem quam in tempore sanitatis habuerit.

In hac parte curat per dietam exhibendo aquam hordei semel aut bis secundum consuetudinem, quam æger in sanitate habuit. Pro quo notate duplicem aquam hordei. Vnam quæ est potus medicinalis. Altera uero potus tantum quando est potus medicinalis sit hoc modo. *℞.* hordei excorticati & bene fricato cum panno aspero *℥*ss. i. aquæ claræ *℥*ss. 20. bulliant in uase uitreato bene mundo, lento igne, & sine fumo ad consumptionem medietatis & coletur. Hæc quidem cum hoc quod est potus, est etiam medicina. Lenit enim uirtute medullæ hordei & abstergit per corticem eius. Secunda uero quæ est potus tantum recipitur, ut supra hordei conditi, *℥*ss. i. laua ipsum pluries cum aqua calida, deinde cum *℥*ss. 10. aquæ facias ipsum bullire una ebullitione, postea aquam projice, deinde ponas super ipsum aquæ *℥*ss. 20. & decoquitur usque ad consumptionem medietatis. Hæc enim aqua sitim & asperitatem sedat, inflammationem extinguit, uentrem lubricum reddit, præcordia humectat, & non est absterfua. Si uero hæc aqua ulteriores decoctionem recipiat infundendo in eam parum postquam circa *℥*ss. 10. aquæ calidæ efficitur cibus & potus, quæ quibusdam colata, quibusdam uero non colata secundum necessitatis exigentiam ab Hippocrate dari præcipitur. Colata tamē est minus nutritiua. Et quādo adhuc ulteriorem recipit decoctionem usque adeo ut habuerit mediocritatem inter spiritum iunctum, & liquidum, est cibus laudabilis habēs bonitates solennes. Si ergo phrenesis acutissima fuerit stabimus contenti aquæ hordei, quæ est potus medicinalis, aut potus tantum. Si uero fuerit pauca acuitas dabimus pitisanam habentem mediocritatem inter spiritum iunctum, & liquidum. Si uero phrenesis fuerit media, dabimus mediam inter has quæ est cibus & potus. Verum moderni ex farina hordei faciunt pitisanam, quæ est cibus satis conueniens si bene decoquatur, & moderni etiam non ita tenuiter dietant sicut antiqui, cum homines nostri temporis magis gulę indulgeant. Si autem uolueris esse contentus aqua hordei consulo, ut saltem quater in die naturali exhibeas, scilicet quinque aut sex uncias pro uice,

Caput autem ex oxyrodino infundendum erit. Quod si multæ affuerint uigiliæ sumantur uiolarum siccarum, corticum papaueris albi, hordei excorticati, sem. lacturarum, radices mandragoræ, omnium. ana. M. i. quæ omnia in curcuma plena aqua tamdiu coquantur donec aqua rubescat, deinde aqua illa dum est tepida, ab alto super caput fundatur, & sic caput super ciminile in quo aqua colligatur, quæ in curcuma posita, iterum super caput fundatur, hoc autem omni die multoties fieri conuenit. Caput præterea ex oleo uiolato muliebri lacte admixto iungendum erit, quod etiam in cotto positum capiti est supponendum.

In hac tertia parte iubet quasdam medicinas capiti apponi ad infrigidandum caput & confortandum, & materiam ad ipsum uenientem repercutiendum. Prima est oxyrodinum, id est, ex aceto & rosæ, compositum, uel in quo est uirtus rosarum, istud est medicamen supra descriptum in cura sodæ sanguinæ, in quo acetum est subquadrum ad aquam rosaceam, & oleum rosaceum, uerum melius est, ut sit tertia pars si intendas magis repercutere, & sit oleum omphacinum factum ex oliuis immaturis, & rosæ sint albe syluestres non maturæ. Secunda medicina administranda est ubi multæ fuerint uigiliæ, cuius est hæc descriptio. *℞.* uiol. sicca. quæ sunt frigidæ & humidæ in primo, hordei excorticati frigidi & siccī in primo, corticis papaueris albi, frigidi in tertio, siccī in primo, sem. lacturarum, frigidi & humidī in secundo, radicum mandragoræ frigidæ in tertio, sicca in secundo, omnium ana. M. i. quæ omnia in curcuma & est uas satis notum, plena aqua donec aqua rubea fiat, decoquantur usque ad consumptionem medietatis. Violæ tamen ponantur in fine decoctionis. Hæc autem aqua super caput ex alto fundatur embrocando, & sit caput super concha, in qua aqua colligatur, quæ aqua in curcuma posita iterum super caput fundatur, quod in die multoties fieri conuenit, ut uirtus medicinæ ad profundum penetret: forti enim ægritudini fortis medicina opponitur. Et hæc aqua debet esse tepida aut actu frigida, magis aut minus secundum fortitudinem uirtutis, consuetudinem ægri, & gradum ægritudinis cui apponitur. Tertia medicina conficitur ex oleo uiolæ, lacte muliebri admixto ex quo caput est iungendum, & cortum siue peciæ lineæ in eo confusæ sunt supponendæ, & multoties reiterandæ ad tollendum malam complexionem calidam.

Cum autem æger in principio huius æ-

gritudinis in uirium fortitudine permanere inuentus fuerit, phlebotomandus est, nisi super infirmū timueris. Postquā uerò eius ægritudo minui cæperit nequaquā phlebotometur, quod si eius ita soluta uirtus est, ex alio præseruetur regimine donec euadat

In hac parte ultima dicit phlebotomiam esse faciendam duabus conditionibus obseruatis. Prima quod ægritudo sit in principio aut saltem non sit in statu tota materia iam fluxa. Secunda, quod uirtus sit constans, ad ætatem & reliqua à quibus sumitur indicatio de phlebotomia. Vltimò dicit, quod cum ægritudo declinare inciperit nequaquam fiat phlebotomia, imò si tunc uirtus temporis fuerit dissoluta, regatur alio regimine magis ingrossante exhibendo aliquid carniū tenuium conditarum cum uino granatorum, aqua rosea, succo arancij, acetositate citri, & etiam aliquid uini pauciferi optimè lymphati donec ad sanitatem redeat.

Cura phrenesis quinque exigit intentiones curatiuas, prima euacuat, secunda diuertit, tertia repercutit malam complexionem alterando, in fine resoluens, in medio simul repercutiens & resoluens, quarta corrigit accidentia, quinta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima intentio. Mihi non occurrit nisi unus casus in quo non competit phlebotomia, scilicet quando phrenesis pendet à sola cholera nullo sanguini permixta, corpore etiam existente pauci sanguinis. In hoc enim casu sola pharmacia opus est. Tunc ergo exhibeatur aqua fructuum. 12. prunorum 3. s. tamarindorum. 3. 2. uiol. 3. 2. mirobolanorum citrin. 3. 1. contendantur grosso modo mirobolani, reliqua addantur præter uiolas & bulliant in 10. 3. aquæ ad consumptionem medietatis, sed uiolæ ponantur in fine decoctionis, coletur & clarificetur, & in potu tepida exhibeatur. Si uerò uenter esset nimis stipiticus posset addi aliquid mannae, aut aliquid parum electuarij de succo ros. aut electuarij de psillio & simillium &c. Si autem medicinam sumere non posset fiat clyster ex decoctione maluarum, matrum uiolarum, lactucarum, florum nenupharis & existeret magno caumate, semperuius, solatri, de qua decoctione accipiantur 15. 3. olei uiolati. 3. 3. salis. 3. s. & tepidum imponatur. Si uenter esset nimis stipiticus possunt addi 3. aut 4. 3. electuarij succi ros. quæ clysteria in hoc casu, & in alijs de quibus statim, sunt frequentanda, ut uenter maneat lenis, & ad inferiora fiat diuersio. In omnibus alijs casibus inchoandum est à phlebotomia consentiente uirtute, ætate & alijs à quibus queritur licentia de phlebotomando. Sed sunt tres casus in quibus opus est incipere à phlebotomia uenarum pedum scilicet saphenarum aut aliarum. Primus casus est ubi in toto esset sanguinis plethoria, tunc phlebotomandæ sunt saphenæ ambæ, si materia ambabus partibus capitis communicetur. Si autem soli dextræ, phlebotometur saphena dextra: si soli sinistra, saphena sinistra secundo per duodecim horas aut circa post, phlebotometur basilica eiusdem lateris & tertio post phlebotometur cephalica, in manu si queraris maiorem

diuersionem, in brachio si queraris maiorem euacuationem. Postea phlebotomentur uenæ frontis aut nasi leporis, aut eisdem locis sanguifuge applicentur, & etiam intra nares quæ etiam applicitæ faucibus scilicet parum infra aures optimè diuertunt & euacuant. Similiter uenæ post aures & labij superioris phlebotomantur conferunt, aut si in eis sanguifuge applicentur. Vltimò, si opus est phlebotomentur uenæ per cutim capitis disseminatæ, aut sanguifuge applicentur: euacuant enim causam coniunctam. Secundus casus est, ubi phrenesis acciderit propter retentionem sanguinis menstrualis, aut hæmorrhoidalis, post quarum saphenarum phlebotomiam in his casibus applicentur sanguifuge ano in locis consuetis hæmorrhoidarum 3. aut 4. aut plures secundum exigentiam, ad prouocandum tamen menstrua phlebotomia uenarum quæ sunt sub curuatura poplitis efficacius operatur. Et si non possunt phlebotomari uentose cum scarificatione aut sanguifuge in his locis applicentur deinde phlebotomentur aliæ uenæ si oportuerit sicut in primo casu. Tertius casus ubi phrenesis succederet ad alium morbum scilicet ad syncocham, cautione tertianam continuam. Et in omnibus his in quibus materia permutarentur à membris inferioribus & propriè infra epas ad superiora, post quam phlebotomia phlebotomentur aliæ uenæ si oportet ut in alijs casibus. Si uerò materia phrenesis comunicetur ab epate aut membris spiritalibus, phlebotomanda est basilica aut dextra, aut sinistra, aut utraq; secundum locum apostematum, post quæ succedat phlebotomia cephalicæ & aliarum uenarum secundum exigentiam. Si uerò materia corineat à furcula supra, phlebotometur cephalica eiusdem partis cum parte ipsa, sed in manu ubi queratur maior diuersio, & propriè in manu ubi queratur, post quæ si oportet reiterare, phlebotometur cephalica brachij eiusdem lateris, sed tutius est ambas cephalicas in brachijs uel etiam manibus phlebotomare & propriè in manibus, deinde reliquæ uenæ particulares secundum exigentiam, aut in locis ita dictis sanguifuge applicentur. Sed memora quod ille phlebotomie debet esse copiosæ, ita ut perueniatur ad syncopim exclusiue, quod comprehenditur ex pulsu, quapropter oportet in his casibus. ut pulsus semper tangatur, nam cum tremat & descendit & diuersificatur absque ordine, ita ut inuenias unam pulsationem magnam, aliam paruum, significat propinquitatem syncopis, quare oportet ut sanguis restringatur. Et oportet ut sit cautela in ligatione uitæ super uena, & ut sit firmata, quæ motus ipsius & agitatio irrationalis non soluant. Quædoque enim soluit eam & deinceps per seipsum propter imaginationem corruptam ducentem eum ad illud. Quod si uirtus & dispositiones non consentiunt ut fiat phlebotomia uniuersalis ex manibus aut pedibus aut non est tibi possibile tenere eos propter inquietudinem & rixam fortè, tunc phlebotomia est in fronte, aut sanguine ex naribus. prouoca, aut sanguifugas in locis iam dictis applica, quæ etiam particulares extractions sanguinis sine uniuersalibus fieri debent si tota materia iam fluxerit. Post hæc si cholera fuerit in causa, eam euacuabis cum medicinali leniente superius descripta, aut sibi simili, quæ etiam maxime digesta materia, erit reiteranda. Digestiua autem sunt syrupus uiolarum, de nenuphare

nenuphare, de portulaca, de papauere, oxifacchara, de citro, de limonibus & similes, distemperandi cum aqua endiuiae, acerosae, nenupharis, semperuiuae, foliari & similibus. Sed syrupus de papauere est praestans in hac re. Secunda intentio perficitur cum clysteribus, de quibus supra, ligaturis, uentofationibus, prouocatione sanguinis hemorrhoidalis & mēstrualis. Sed melius est ut diuersiones sint cum euacuatione sicut uentofationes in tibijs, sub genu, in coxis, in natibus, in spatulis, lotiones tamen brachiorū & crurium cum aqua decoctionis papaueris, lactucarū, se. hyoscyami, florum nenupharis & similibus, optimē conferunt diuertendo & somnū inducendo. Tertia uerō intentio perficitur cum repercussiuīs applicitis fronti, temporibus, parti anteriori colli fere usq; ad nuclā cum oleo rosato, aceto, aqua rosata, & si opus est cum magis in frigidantibus addendo his succum plantaginis, semperuiuae, foliari, nisi tumor cōmunicet exterius tunc enim oportet incipere ab eo in quo sit parum mollificationis & sedationis doloris. sicut mucila. sem. psillij, & sem. maluauisci, deinde stiptica applica collo & temporibus nō tumentibus, & si opus est somni inductione ponantur circa frontem & tempora et cōmissuram coronalē, semen papaueris, hyoscyami albi usq; ad ipsum opium cū aliquo liquore permixta, & cholerica iuuatur ualde si fiat emplastrū ex folijs sentis, id est rubi. Sed in cholerica, aut pendente à materia adusta sunt frigida aut humida. In sanguinea frig. & sicca magis proportionant, & magis frigida in cholerica adusta quā in sanguinea. In augmento autem usq; ad mediū status repercussiuā cum resolutiuīs miscantur sicut si oxypodino adderetur aliquid meliloti, & postea in statu magis augendo melilotum. In his temporibus confert pulmo arietis madefactus in aqua decoctionis rosarū, uiol. florum nenupharis, chamomilae, meliloti, quibus pro inducendo somnum potest addi papauer & semen hyoscyami albi. Eodem modo potest applicare columbam aut catulum uiuentem per medium scissum, ita quod in summā, in principio approximentur repercussiuā iam dicta. In augmento repercussiuā cum resolutiuīs, uincensibus repercussiuīs, sed in statu usque ad mediū eius uiuant resolutiuā. Sed post mediū status per totam usq; declinationē sint resolutiuā pura sicut decoctio facta ex meliloto & similibus quae non multum transcendunt primū gradum, & sint omnia haec iuxta posse capitis confortatiua, tam stipticitate quadam quā forma specifica, sicut flores anethos, id est, rorismarini, sol. lauri, sed cum uiolis possent temperari. Quarta autem intentio corrigit accidentia scilicet uigiliarum, instantiam cum iam dictis, & ex proprijs sedantibus dolorem & columba uel catulus uiuus scissus per medium, et aspersus semine hyoscyami albi subtilissimē puluerizato appositus loco dolenti. Aliud fortius illo. Recipe casiae lignae, ʒ. unā, opij, ʒ. duas, croci. ʒ. s. puluerizentur, & cum aqua rosacea & pauco aceti albi liniantur frons & tempora. Experimentum Gerardi, ʒ. terrae sigillatae quantumuis malaxetur cum aqua rosacea & aceto & tepidum soleis pedum applicetur. Stupescitium domesticum sauis. ʒ. conferuae uiolarum, conferuae nenupharis ana ʒ. s. sem. papa. albi. ʒ. unam, se. hyo-

scyami. ʒ. i. sacch. q. s. de hoc qualibet die poterit exhiberi, & quando caetera nō conferrent detur requies descriptione Nicolai à media. ʒ. usq; ad. 1. Caue tamen opiata maximē sumpta per os & naribus applicata, uirtute existente debili, quoniam perimunt. Sitis autē sedatur cum aqua decoctionis tamarindorum & retentione eorum & similibus in ore. Urina autē prouocetur si obliuiscatur urinare scalpēdo inter anū & uirgam ubi est collum uescicae, aut etiam cūmicem, aut sexcupedem in orificio uirge imponendo. Et tandem cum haec non suffecerint regionem uescicae comprimendo, & fomentando sicut cum oleo paritariae & similibus. Caueant etiam astantes ne saliat ex fenestris, & ne se aut ipsos percutiat. Si uerō transierit in aschachilos, cura uana est, & Auicē. mortem pronunciat, si uerō permureretur ad substantiam cerebri cura est etiam uana secundum plurimū. Auicē. laudat phlebotomiam uenarum, quae sunt sub lingua. Si uerō in lithargiam, curetur cura lithargiae.

Ultima intentio est debitum regimen sex rerū non naturalium. Vnde aer declinet ad frigidum, & sit redolens ex asperione pomorum, florum & foliorum redolentium, nec non asperione aquae rosaceae, uidentur calefacientia, ut ignis, sol, flatus hominum, luciditas aeris multa, strepitus & formae, id est, picturae. Cibus sit aqua hordei, uel prāsana subtilis à prin. usq; ad statū inclusiuē cum emulsione seminum cōmunium frigidorum, & papaueris albi, de aqua tamen hordei est superius sufficienter dictū. Similiter panis simulae infusus, & lotus in aqua frigida. Similiter lactuca & acetosa condita cum agresta uel uino granatorū murzori uel acetosori, bibant autē aquam coctam cum pauco saccharo, quae permisceatur cum uino granatorum secundum libitū, aut bibat aquam hordei aut aquam prunorū tamarindorum. Debent enim tam cibaria quā medicinalia ad frigidum declinare: magis tamen aut minus secundū tempus morbi, & tempora anni, nec non materiam, quia in materia adusta cōpetunt frigidiora & humidiora, & similiter in cholerica quā in sanguinea. Nota tamen quod huiusmodi potus in his apostematibus non debent esse ualde frigidi acti, imo aliquando tepidi, utpura tempore hyemis, qui canon tamen magis obseruandus est in apostematib. membrorū spiritualium & naturalium. Et graduetur dieta ita ut à principio usq; ad finē, uel statum potius sit ualde tenuis, sed in declinatione minus, & tūc magis cōuenit ferculū ex simula, & magis in declinatione parū uini pauciferi optimē lymphati & carniū cum acibus alteratarū. Et in cholerica sint fri. & humid. In sanguinea frigida & sicca. Prouocetur somnus ut dictū est omni ingenio possibili. Ingenietur etiā ad quietem quantum est possibile: cum praesentia amicorum quos uereantur, & omni blanditiā possibili, quibus nō ualentibus ligentur & detineantur, nō tamen uerberentur, sicut in mania nō apostematosa. uenter teneatur lenis, si nō naturaliter, saltem cum clysteribus de quibus supra, declinent ad iucunditatem, & animi & corporis quietem. Phlegmon & erysipila sunt apostemata in substantia cerebri, scilicet phlegmon à sanguine, erysipila à cholera, quae distinguuntur à phrenesi sanguinea & cholerica per signa superius dicta, ipsa autem inter se distinguuntur

per signa similia illis quibus distinguitur phrenesis sanguinea à cholera, & eodem modo curatur sicut phrenesis dictæ. Erysypila enim in cerebro curatur sicut phre. à materia cholera cum asperionibus & succis frigidis & humidis & propriè sumptis ex corticibus melonis, cucurbitæ & cucumeris quibus etiā secundum necessitatē frigidiora addantur & eadem intentiones accommodandæ sunt quæ dictæ sunt in phre. cholera. Et similiter phlegmon in cerebro curatur sicut phrenesis sanguinea, appropriat tamen ei Auicē. phlebotomias uenarum quæ sunt sub lingua post phlebotomias uniuersales. Sibare est dæmonium superfluum accidens cum sisen calido choleraico, ita quod homo cum hoc quod habeat sisen alienet propter dæmonium agitatiuū, est enim cum furore & rabie modum excedente, dæmoniū enim siue mania lupina non dicit in quiditate sua nisi alienationem cum rabie & furore ad differentiam mania canina, quæ est alienatio nunc cum rixa & furore, nunc cum locis & applausione sicut est natura canum, & prouenit ab humore benigniori, sicut à sanguine choleraico aut adusto, sed sibare dicit aggregatum ex dæmonio & apostemate cuius causa est cholera rubra, pura, aut adusta. Cum karabito enim puro fit alienatio acrationis permixtio, & nō est in ipso dæmonium, si autem est cum ipso dæmonium est sibare. Et multoties quidem antecedit dæmonium cum cholera ipsa, & cerebrum impellitur in principio sue applicationis, deinde sequitur apostema ipsa fixa. In karabito dæmonium accidit ab apostemate, in sibare dæmonium & apostemata simul proueniūt à materia, nec unum est causa ex qua aliud inueniatur, & si quandoque fiat unumquodque causa additionis alterius. Species autem & causæ silaræ patent ex dictis.

Signa prognostica, demonstratiua & rememoratua. Similiter modi terminationis & prognostica sumuntur ab eisdem & eodem modo sicut dictum fuit in phrenesi, & maxime cholera. Ipsi etiam cura est cura phrenesis choleraicæ cum additione & humectatione multa, inductione somni omnibus auxilijs, & oportet ut extremorum ligatio assiduatur cum cæteris generibus diuersionum materiam cholericam & uapores acutos à capite diuertentium.

DE LITHARGIA. Cap. III.

Gratia complementi doctrinæ, hoc subdam caput de lithargia. Et iuxta morem consuetum lithargia, sisen frigidum sunt termini synonymi significantes hanc ægitudinem quæ definitiue est apostema frigidum ad intra craneum. Et hoc apostema nomen sumpsit ab accidente scilicet obliuione quæ sequitur ad ipsum. Lithargia enim apud Græcos obliuionem importat. Prima distincta. Lithargia est duplex quædam phlegmatica, ut plurimum eueniens, & propterea Auicē. diffinit ipsam apostema esse phlegmaticum. Quædam est melancholica raro eueniens, nec ita propriè dicta lithargia cum sit non ita factiua obliuionis. Secunda distincta. Quædam fit in panniculis cerebri, & hoc raro, cum raro accidat humorem grossum, uiscosum, in substantiam densam penetrare. Aliquando fit in substantia

cerebri, & hoc etiam raro, licet frequentius quàm in panniculis, quia raro contingit, uiscosum in uiscosum penetrare. Aliquando fit in uentriculis, sed raro, & tunc lithargia coniungitur apoplex. uel epilep. secundum maiorem aut minorem oppilationem, licet aliæ sint differentia. Aliquando & raro accidit in origine nuchæ & neruorum & in ipsis neruis, & tunc lithargia coniungitur paralysi aut spasmo. Frequenter autem secundum Auicē. accidit in meatibus, anfractibus seu porositatibus cerebri qui meatus sunt plurimi, ut patere potest in anatomia. Sed fortè quis instabit. Si humores colligantur in meatibus cerebri, & non in substantiam cerebri intrent neq; in panniculis, non fiet solutio continui, & sic non erit apostema. Dicunt quidam quod aliqua pars subtilior intrabit in substantiam, & sic fiet solutio continui & apostema, sed certè isti falluntur malè loquētes ad mentem Auicē. Si enim dum lithargia fit in meatibus oporteret aliquam particulam humoris ingredi substantiam cerebri aut panniculi, frustra dixisset Auicē. quod raro fit in substantia cerebri aut panniculis, imo semper secundum hanc responsionem esset in aliqua parte. Ex dictis ergo aliter dicendum est, quod secundum plurimum humor colligitur in meatibus, non intrans secundum aliquod siue in aliquā cerebri partem. Et cum infertur, ergo non facit solutionem continui, neganda est consequentia, nam ille humor facit extensionem in partibus cerebri, cum à lateribus illius meatus sit in substantia cerebri in fundo, similiter in parte superiori panniculi. Ad magnam autem extensionem in partibus cerebri, sequitur quædam solutio continui coniuncta malæ compositioni sequenti extensionem, & malæ complexionis sequenti naturam humoris quæ fortasse frigida est, & etiam alteri malæ complexionis sequenti conuulsionem humorum in eo loco, & prohibitam transpirationem quæ fortasse calida est. Et hi tres morbi apostema constituunt. Et ne miretur quis de hac responsione, legat Auicē. 3. quarti tract. 2. cap. de apostematibus uentris. Et fortè percipit percussione manus, & propriè quando inuenit spatium ad quod aggreget, sicut stomachus & intestina, & quod est inter panniculos circumdantes ossa, & inter ossa circumdata lacertis, & inter lacertos similiter, & quod circumdat chordas & fortasse non resoluit spatia, imo subtiliat membra coniuncta & etiam resoluit ea, & generat in eis quod facit necessarium disrumpere ea & uentositates remanet propter spissitudinem suam, & propter crassitiem & spissitudinē eius quod continet eam constrictionem pororum. unde patet quod in his uerbis uult uentositatem tam in stomacho quàm intestinis quàm inter ossa contentam, extendendo membra illa facere apostema uentosum, absq; quod intret alicuius membri substantiam. Iterum lithargia aliquando est in cerebro anteriori faciens obliuionem communicando nocumentum uentriculo scilicet posteriori, quandoq; uerò est in cerebro posteriori quæ uerius debet dici lithargia, & est plurimum contingens.

Causæ lithargiæ primitiue sunt multa, frigiditas aeris multum imprimens in cerebra debilia, uinum uinosum scilicet multum, usus ceparū et omnium multum euaporantiū ad caput et propriè uapores uiscosos.

Item

Item somnus multus et propriè supra repletionem, supinè dormire, & de die, repletio nauseatiua & multitudo comestitionis fructuum & cuiuslibet in quo est euaporatio & putrefactio. Causæ antecedentes sunt humores scilicet phlegmatici frequentius, & melancholici rarius & mixti ex his. Causæ uerò coniunctæ sunt idem humores in cerebro iam comprehensi sicut & materia scoromæ, sed hæc est uehementius confirmata, utraque enim ab eadem materia potest pendere, licet materia scoromæ sit magis uaporosa.

Signa lethargiæ. Primò, prognostica sunt tremor capitis, grauitas eius, & propriè partis posterioris, frequenter cum dolore paruo, pigritia ad motus corporeos. Significant enim materiam frigidam oppressuram cerebrum. Item signa superscripta permutationis phre, in lethargiam. Demonstratiua. Primum, dolor leuis, sed continuus, quia substantia cerebri non sentit, non est enim dolor nisi per communiter ad panniculum cooperientem anfractus, & sic debet esse extensius & grauius. Secundum, febris lenta, in apostemate enim principalis necessaria est feb. propter magnam cõmunitatem cum corde, sed est lenta ratione phlegmatis, imò quandoque non sentitur, id est, uix sentitur, phleg. leuiter putrescente. Tertium, subeth grauis, id est somnus profundus propter fortem oppilationē ab humore multo crasso & uisoso. Quartum, obliuio apostemate lædente uentriculum posteriorem, aut per essentiam, aut per cõmunitatem. Quintum, anhelitus tardus diminuta necessitate, & debilis ob debilitatem musculorum pectoris, & diaphragmatis ob nocumentum cerebri, cum strictura propter aggregationem materiei, & quia obliuiscitur anhelare, cum spuito propter catarrhum, imò est aliquando tanta obliuio ut os clausum obliuiscantur aperire, & apertum claudere. Sextum, singultus cõmunicato nocumento stomacho per neruos reuersiuos. Et albedo linguæ frigidit, & humid. dealbente, & phleg. super asperso, pigritia respondendi quasi nō intelligat aggrauatis sensibus interioribus. Et cõmunicato nocumento linguæ per nocumentum in 7. pari neruorum cerebri ortum habente à termino cõmuni inter nucham & cerebrum. Permixtio intellectus & amentia læso uentriculo medio per essentiam aut per cõmunitatem. Egestio humida deriuato phleg. ad intestina iuxta apho. Quibus spumosa egestionem in diarrhoea his phlegma à capite defluit. Vrina sicut asinorum phlegmate aut uaporibus eius cum urina permixtis, iacent præcipitati in lecto econtrario habentibus karabium, quia cum quiete sine furore & motu. Pulsus magnus uirtute satis cõstante & instrumento obediēte cum necessitate, nec obstat anhelitus paruus qui secundum plurimū est in istis quamuis anhelitus & pulsus proportionentur, anhelitus enim currit cursu pulsus, nam pulsus & anhelitus, licet sint proportionabiles non tamen æquales, id est, eundem scum deinētes in suis latitudinibus, sed melius sunt proportionabiles in sanis sed non in aegris cum possint aliquando impediri instrumenta scilicet anhelitus & non pulsus & econtrario, similiter in lithargia impediuntur magis instrumenta anhelitus quam pulsus magis nocitis neruis quam arteriis.

Sunt pulsus rari, quia satisfit necessitati per magnitudinē. Et per idem tardi, sunt tremuli & undosi debilitata uirtute. Et quia apost. est molle et in membro molli assimilaturs pulsibus peripneumonicorum in mollitie, non tamen in uelocitate, & frequentia, maiori existente necessitate in peripneumonia. Sunt etiā in peripneumonia longiores et latiores ut melius sufficiant necessitati. Et quia arteria à phleg. in peripneumonia amplius remollita & dilatationi paratior, pulsus sunt cadentes in medio. Pro quo nota quod reperitur pulsus cadens. Et est pulsus cuius quies est ualde longa inter duas pulsationes, ita scilicet quod alia pulsatio fieri potuisset. Est enim ille pulsus cadens lithargicorum. Alius est pulsus intercidens, ut in cõmento pulsuum de pulsu peripneumonicorū, & est cum deficit alia pars motus, est enim geminās motū quasi bis pulsans, ut est anhelitus puerorum flentium. Et ille accidit in peripneumonicis, & fit propter defectū uirtutis, ideo peripneumonia est mortaliior lithargia cap. allegatō. Ex quibus uides quod aliter hic sumitur cadens in medio, aliter secunda primi. unum signum commune omnibus speciebus lithargiæ est retentio uring, aut quia obliuiscuntur urinare, aut propter debilitatem lacerti colli uesicæ. Signa autem materierum & maxime melancholicæ. Nam signa prædicta phlegmaticæ magis appropriantur. In melancholia dolor est fortior: quia frigiditas siccitati coniuncta est actiuior, est etiā longioris durationis, cum melancholia tardius resoluatur, secundo est rixa & alienatio, materia magis stimulantē, tertio sunt oculi aperti sicut congelati, in unum locum intuentes siccitate melancholiæ magis musculos palpebrarū contrahente, & adsunt cætera signa melancholiæ, sunt etiā signa sumpta à cõplexione, habitudine, & humiūsmodi, & non est subeth sicut in lithargia, licet forte addit importetia uigilandi. Signa uerò loci apost. sunt hæc: Nam si est in substantia cerebri subeth est fortior, quia materia est magis opprimens, & per idem difficultas maior ad motū, albedo linguæ maior ipsa amplius phleg. aspersa, oculi sunt eminentes relaxatis & compressis neruis opticis. Si uerò sit in panniculis dolor est fortior, motus leuiiores, maior sensuum oppressio. Prognostica. Cum multiplicentur accidentia lithargiæ & sudor, est perimens, ut si multiplicetur tremor membrorum. Sudor diaphoreticus, & anhelitus fiat paruus, sed frequens cū strictura & oregmone. Et econtrario si dilatur anhelitus, & fiat fortis, minoratur subeth, hebetudo sensuū, & tremor membrorum, speratur salus & maxime si appareat aliqua bona crisis, ut apostema post aures uel in cute capitis. Cura lithargiæ quinque exigit intentiones curatiuas. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia in principio repercutit, in medio simul repercutiens & resoluens, in fine solum resoluens, & causam coniunctam educēs. Quarta corrigit accidentia. Quinta ordinat debetum regimen sex rerū nō naturalium. Pro prima intentione. Si phlegma aut melancholia fuerint peccantes cum sanguine & cū ipso educibiles præmissa uentris lenitione, reliquis consentientibus phlebotomia, inchoetur à phlebotomia, & secundum plurimū fiat de cephalica sinistra, aut dextra secundum quod in dextra aut sinistra parte materia cõtinetur, & hauriatur

communiter. 6. 3. sanguinis uel circa. Si uero humores iam dicti non fuerint educibiles cum sanguine, sanguine tamen peccante, ab euacuatione humorum est inchoandum, post quā sequi debet phlebotomia. Si uero sanguis nullo modo peccauerit, sufficit aliorum humorum euacuatio, uerum aliquando oportet in primis phlebotomare uenas saphenas, secundū quod dictum fuit in phre. & aliquādo basilicam dextram aut sinistram, si splen aut epar miserint materiam. Euacuatur autem humores phlegmatici cum hierapica simplici & composita, pillulis cochis, & his quæ dicta sunt superius in soda phlegmatica præmissa digestionem saltem ante eradicationem cum oxymelle simplici & composito, scyllitico, syrup. de stecados & aquis rutæ, saluæ, betonicæ, stecados, hyssopi, maioranæ & ceteris superscriptis in soda phlegmatica. Melancholia uero digeratur cum syr. de epithimo, syr. de pomis dulcibus & aquis buglossæ, boraginis, stecados, & ceteris superius dictis in soda melancholica & soluitur cum educantibus melancholiā superscriptis, & inferius in ca. de melancholia describendis. Sed inter omnia clystera obtinent principatum & sunt radix curæ, quapropter duo saltē in die naturali faciendū sunt ubi eadem die non fiat alia euacuatio. Descriptio clysteris in phlegmatica est illa. R. saluæ, maioranæ, rutæ, betonicæ, roris marini, allari siue baccharæ, hyssopi, stecados arabici. ana. M. unū, contendantur crasso modo, & bulliant in octo lb. aquæ ad consumptionem dimidij & coletur, de qua decoctione accipiantur. 15. 3. & cum tribus 3. olei communis & 2. 3. mellis. ro. & pauco salis fiat clystere, & si opus est facere clystere acutius addatur hiera simplex uel composita, uel electuariū indum & similia, decoctio possit fortificari si superscriptis adderetur centaureæ minoris. M. 1. & similiter colocynthidis. 3. 2. carthami. 3. 1. corticum radicum capparis, seurticæ. an. 3. s. Clystere conferens lithargiæ melancholicæ quæ raro aduenit, & si accidit raro eradicator. R. epithimi. 3. 1. colocynthidis interioris. 3. 2. polipodij. 3. s. calamenthi M. 1. coquantur in 4. lb. aquæ ad dimidij consumptionem. Galeni clystere efficacæ & sublimæ ad apoplexiam, paralysem, lithargiam tam phlegmaticam quā melancholicam. R. radices cyclaminis, colocynthidis. an. 3. 1. s. carthami. 3. 1. centaureæ minoris. 3. s. ellebori nigri. 3. 1. allari. 3. 8. coquantur omnia in aqua sufficienti, & fiat clystere. His autem clysteribus in phlegmatica addi potest sal gemma ad acuendum & sal indum in melancholica. Et debes clystera acutere magis aut minus secundum maiorem aut minorem stuporem & secundum ægræ tolerantiam & feb. acuitatem. Incipere tamen debes à leuioribus gradatim procedēs ad fortiora. Et si æger non potest tenere clystera facias minus stimulantia subtrahendo sal & mel. Vomitus aliquando confert stomacho multum repleto & ipso comunicante uapores aut materias capiti, secundum plurimum tamen nocet, ubi ergo conueniat accipiantur duæ 3. oxymellis simplicis, aut scyllitici cum 4. 3. decoctionis raphani, in quo si uolueris fortius uomitiuū steterint infusi in eo fustes ellebori per unam noctem, aut accipe dictum succū cum oxymelle iam dicto. Secunda intentio completur cum uentilationibus & frica-

tionibus, ligaturis, lotionibus, quæ cū fiant sine euacuatione incipiant à nucha & collo & gradatim descendendo procedant quæ frequenter reiterentur & ante cibū & post cibum, ut materia in capite nō figatur. Confert etiam prouocatio hæmorrhoidarum & menstruorū, maximè si ex eorum retentione prouenerit, necnon quæcūq; euacuatio consueta renouetur, gargarismata uero masticatoria & sternutatoria non ita à principio administrantur, & non nisi uersalibus præmissis & reiteratis præcipuè sternutatoria, multum enim inquietant & materiam dilatant, ita ut quandoq; perducant ad apoplexiam materia ad uentriculos delata. Tertia intentio cōpletur cum his quæ repellunt materiam in principio sicut oleum rosaceum triplum ad acetum, aut duplum approximandum fronti, temporibus, et collo. Et si apparet nimis frigidum, adde aliquid stipiticum calidum sicut oleū de malthice aut menta. Et in augmento misceatur resolutiua cum repercussiuis usq; ad medium statum, gradatim uersus statum augendo resolutiua sicut si superscriptis adderes parum castorei, sit autem hoc oleum factum ex oleo completo & rosæ rubeis completis. In phrenesi autem sit omphacinum ex rosæ rubeis non completis. Et post medium statum usq; ad totam declinationem ponantur resolutiua purè, sicut acetum scylliticum conuassatum cum oleo rosaceo in quo distemperatū sit castorei, confert in augmento & euigilare facit, & quandoq; in statu pro oleo rosaceo fiat permutatio ad oleum irinū & de narsisco. Et quandoq; permiscetur capilli hominis adusti triti multum, cum aceto usq; dum fiat sicut unguetum, & est medicina rationalis in lithargia & subeth, excitant cito à somni profunditate. Et quandoq; misceatur eis castoreum magis in statu uel prope. Emplastrum ex inuentione Mesue conferens lithargiæ in statu & declinatione faciēs euigilare, est hoc. Recipe pyrethri, sinapis, scyllæ. ana. 3. unam, castorei, euphor. ana. 3. quinque. omnia cum succo asphodilorum & succo lampfuci misce & epithimetur pars posterior capitis, & est acutum rubificans, imo fortè uesicans. Scylla quoq; cum oleo rosaceo & aceto trita addendo castoreum, est medicina efficacæ & experta. Si autē diuturna efficitur hæc passio, grana tria castorei cum uncia. s. oxymellis in potu exhibita est medicina experta. Similiter theriaca, mithridatum, diamusculus, diambra optimè conferunt confortando & resoluen-do, ad resoluendum etiam possunt fieri fomenta ex ruta, decoctione maioranæ, calamenthi, stecados usque ad sinapim & scyllam in aqua cum pauco aceto acutissimo, infundendo spongiā in hac decoctione & optimè expressam superpone loco apostemato & bis aut ter iterata, post cuius amotionē sequatur iunctio cum aliquo ex superscriptis.

Quarta uero intentio sedat subeth & obliuionem loquendi, urinandi & egerendi, & aliorum, incitando eos ad loquendum & euigilandum cum clamore & extirpando pilos, maximè ex membris inferioribus, & ligando fortiter membra inferiora, & comprimendo uesicam & pecten ad hoc ut urinent, & ceteris ingenijs in phrenesi dictis. Si tamen permutaretur ad paralysem non est prohibendum, imò cum fricationibus eiusdem partis adiuuandum, cum

cum paralyſis fit minor morbus quàm lithargia & propriè quando timeres permutationem ad apoplexiam. Quinta intentio completur locãdo eos in aëre lucido, pleno imaginibus ad calid. & sic, tendēte cum accensione ignis ex lignis iuniperi, lauri, rorismarini & similibus redolētibus. Cibis autē sit aqua ciceris siue brodiū cicerū, uel lupinorū, & potus sit aqua melis, cui possunt addi dum coquitur tria aut quatuor grana piperis. Et si opus fuerit crassiori diætā, dentur uirelli ouorum, & uinum uinosum ualde inmodica quantitate concedi potest: brodiū quoq; carniū cum pauco cinnamomi aut piperis, & panara subtilis est ad hāc intentionem, sed diætā sit subtilis usq; ad medium status, deinde incrassetur iuxta canones uniuersales. Abstineat ab aqua frigida. Parū dormiat, unde excitetur de media hora in mediam horam & dormiat capite leuato & post cibū stet uigil per unā horam. Sit uenter eius inanitus cum clysteribus ut supra, et omnes euacuationes naturales procurētur. Fricationes fortes uicem suppleant exercitij, prouocetur ad iram & tristitiam, & coram eo stent clamantes & strepitus facientes ut nō profundetur in somno, imo gratia huius semper odorēt, & in naribus ponatur acetum acutissimum.

DE SVBETH, SAHARA, SIVE
dormitatione uigilatiua.

Subeth sahara dormitatio uigilatiua sunt termini synonimi significantes apostema mixtū ex phlegmate & cholera intra craneum. Et sumpsit hoc apostema, nomen ab accidentibus scilicet a somno & uigilia. Subeth enim apud Arabes somnū importat: sahara uigiliam, inde subeth sahara idem sonat apud Arabes quod dormitatio uigilatiua apud latinos. In hoc autem apostemate aliquando phleg. uincit cholera. Et tunc dominante somno malo supra uigilias malas, uocatur subeth sahara, id est, dormitatio uigilatiua. Vincit autem cholera, supra phleg. maior est uigilia mala quàm somnus malus, & tunc dicitur sahara subeth, id est, uigilatio dormitatiua, unde fit ut apostema est mixtum ex phlegmate & chol. ita accidentia sequentia hoc apostema, sunt mixta. Et si dominetur cholera, magis dominatur accidentia cholerae, & tunc magis proportionatur phrenesi. Et si magis dominatur phlegma, magis dominantur accidentia phlegmatis, & tunc magis proportionatur lithargiae, & si humores æquantur, accidentia æquantur. Cura exigit easdem intentiones quæ dictæ sunt in phrenesi, & lithargia. Sunt tamen complendæ medicinis mixtis euacuantibus & diuertentibus phlegma & cholera & eisdem repercutientibus & resoluentibus, & similiter sedantibus accidentia mixta. Et regimen similiter sit mediū inter regimen phren. & lithargiae. Et phlebotomia est multum in hac necessaria, cum mixtio humorum arguat repletionem.

DE APOPLEXIA. CAP. V.

Apoplexia græcè idem sonat quod percussio latine, cadit enim apoplecticus ac si esset percussus. Est autem diffinitiuè secundum Auicē. ociositas membrorum a sensu &

motu propter oppilationem contingentem in uentriculis cerebri & in cursibus spiritus sensibilis & motiui. Ociositas a sensu & motu ponitur loco generis, & non est nisi ablatio sensus & motus. Quod intelligendum est de omni sensu tam interiori quàm exteriori, in apoplexia forti, sed in debili creditur aliquam esse operationem sensus interioris, licet nō exterioris. Est enim possibile esse oppilationē in origine nuchæ, & etiam in origine neruorum orientium a cerebro anteriori, licet uentriculus medius non sit multum oppilatus, & sic de uentriculo anteriori qui est multum latior, operabuntur ergo aliquantulum uirtutes eorum sicut in epilepsia operantur. Aufertur etiam omnis motus merè uoluntarius, non autem omnis naturalis aut mixtus, cum sit ad uitam necessarius motus cordis, & motus aliquis pectoris, quorum primus est naturalis, reliquus mixtus. Verum in forti apoplexia etiam aliqui motus mixti auferuntur sicut motus deglutitionis licet respiratio non auferatur. Et hi auferuntur a membris qui consueuerunt sentire & uoluntariè moueri. Additur postea propter oppilationē ad exprimendum causam apoplexiæ in uentriculis cerebri scilicet primo, secundo & tertio, & in cursibus spiritus sensibilis & motiui, id est, in meatibus cerebri qui sunt multi in ipsa cerebri substantia, per quos meatus ipsi spiritus mouentur. Et per cursus intelligamus origines siue meatus nuchæ & neruorum, per quos, spiritus sensibiles & motiui ad membra deferuntur. Ex quibus infertur apoplexiam esse accidens sequens oppilationem, licet etiam sit morbus, cum per eam impediatur cordis & membrorum & anhelitus operationes, fuit autem conuenientius ponere in diffinitione eius ociositatem pro genere quàm oppilationem, cum illa sit nobis notior, & hæc quidem de intentione medicorum dicta sunt. Arist. & philosophi dicerent apoplexiam esse porius passionem cordis quàm cerebri, quia ponunt cor esse principium sensus & motus, a quo nerui habent originem. Verum medici (licet cōcederent apoplexiam esse per communitatem a corde, unde dicit A. 11. tertij. 2. cap. iuxta finem. Aegritudines melancholicæ & epilepticæ nō euacuantur a communitate cordis) tamen uolunt apoplexiam appropriari cerebro & non cordi, & cerebrū esse principium sensus & motus & neruorum. Verum cum medici simus, sequamur medicos. Vtrum autem in apoplexia auferantur operationes intellectus, cum intellectus sit uirtus non operans per organum & etiam a corpore separata intelligat per species reseruatæ, est dubium nō paruum, cum oporteat. 3. de anima intelligentes phantasmata speculari, & sic requiritur uirtus cogitatiua quæ per uentriculum medium operatur. Credo quod huius quæstionis utraq; pars potest defendi sicut accidit in rebus dubijs, licet nisi una sit ueritas, & ex diffinitione superius posita manifestè patet solum diffinitam esse apoplexiam per essentiam in cerebro, & non per communitatem, cum in apoplexia per communitatem, similiter propter nocumentum cordis aut oppilationem arteriarum apoplecticarum non sit oppilatio in uentriculis cerebri.

QUum aliquis quasi dormiens iacet & sine somno stertit, & cum pungitur non sentit, tunc iam patitur apoplexiam. Est autem huius ægritudinis quantitas secundum quod fortiter aut debiliter stertit. Si autem spuma ab ore exierit, non est ei medicandum. Cum autem parum stertit, ægritudo est leuior. Hæc quidem passio aut interficit citò, aut in paralyum transit.

Capitulum istud diuiditur in 2. partes. Primò determinat de apoplexia theoricè, secundò practicè. secunda ibi. Cum ergo ista. Prima in tres. Primò ponit signa apoplexiæ absolutè, secundò innuens distinctionem quandam apoplexiæ ponit signa fortis apoplexiæ & debilis, in tertia modum terminationis ipsius, secunda ibi. Est autem huius ægritudinis &c. tertio ibi. Hæc autè passio &c. De prima parte dicit, quòd cum aliquis iacet quasi dormiens & stertit in modum dormientis, non tamen dormit, & cum pungitur aut infertur ipsi aliquis dolor etiam fortis non sentit, tunc ille patitur apoplexiam: ita quòd hæc duo signa, scilicet iacere in modum dormientis cum stertore, licet non dormiat, & non sentire, neq; etiam moueri præcipue cum pungitur aut infertur ipsi fortis dolor, significat apoplexiam. De secunda parte dicit, quòd huius ægritudinis quantitas, id est, apoplexia iudicatur fortior aut debilior secundum fortem aut debilem stertorem. Si enim ipso fortiter stertente spuma ab ore exierit, non est ei medicandum: in ea enim propter ipsius fortitudinem non est spes liberationis. Si autem parum stertat & spuma ab ore non exierit, tunc est leuior, in qua spes liberationis haberi possit, licet difficile. Vltimò dicit quòd hæc ægritudo aut citò interficit cum est multum opprimens cerebrum, ex eo quòd prohibita debita respiratione cor suffocatur, aut si debet liberari transit in paralyum, materia permutata à uentriculis cerebri ad neruos, aut ad originem nuchæ. ista autem paralyis, aut est unius lateris tantum, licet secundum plurimum dextri: aut est amborum, & tunc homo remanet sine sensu & motu in omnibus partibus præterquam in partibus faciei, quibus datur sensus & motus per septimum par neruorum ab ipso cerebro immediatè ortum habentium. Si enim esset paralyis in omnibus partibus, tunc esset apoplexia. Sed circa spumam intellige quòd spuma est congeries multarum ampullarum in humiditate quadam repertarum, quarum causa immediatè est aer aut uapor, aut uentositas sub humiditate illa reclusa, eleuans illam in altum, retinetur tamen propter humiditatis uiscositatem. Cum ergo in apoplexia anhelitus est strictus & fit suffocatio tunc calor ebulliens conuertit aliquid illius humiditatis in uapores qui retenti sub humiditate uiscosa, in cuppum eleuata faciunt ampullas & spumam. Secundus mo-

us est, quia anhelitu stricto aer egrediens permiscetur cum humiditate cui obuiat & ipsum eleuat in ampullas, & hij 2. modi mortem significant, significando uehementiam constrictionis anhelitus. Est autem tertia spuma non perniciofa, facta ex retentione humiditatis in ore, unde aer permiscetur cum illa humiditate, aut propter longam moram aut propter multam locutionem &c. Stertor autem fit propter aerem inspiratum & expiratum per loca angusta & per pulmonem & cannam eius. Coangustatur aut propter impotentiam uirtutis dilatantis pectus, aut propter multam humiditatem in uis anhelitus contentam, quorum utrumq; arguit anhelitus suffocationem: quanto autem aer transit per loca magis angusta, tanto est maior stertor & maior suffocatio: quanto autem per minus angusta, minor stertor & minor suffocatio, & per consequens apoplexia debilior, & hoc secundum plurimum. Est enim possibile paruò uel multo stertore existente anhelitus esse strictissimū, & hoc quia nullus uel minimus aer penetrabit per ea loca, & tamen apoplexia erit fortissima, imò sic est in tendente ad mortem ex apoplexia, stertor enim continuè remittendo procedit. Nota tertio apoplexiam non semper interficere aut in paralyum terminari, imò quòdque materia creticè expellitur iuxta aphor. 10. sextæ particulæ. Caput dolenti aut circumdolenti, sanies aut aqua aut sanguis fluens, per nares aut aures aut os, soluit ægritudinem. Verum hæc crisis rarissime fit in apoplexia, cum uirtus sit debilis & multum oppressa à tanta materia: cuius signum, quia si uirtus fuisset fortis, non permisisset tantam materiam congeri. Et hæc intelligenda sunt de apoplexia materiali per essentiam in cerebro, de reliquis minimè.

Iuxta ordinem præmissum ad species & causas ueniendum est. Prima distinctio. Aliqua apoplexia est fortis, aliqua debilis, aliqua media. Fortis in qua uix apparet anhelitus, & est sine stertore & spuma. Media in qua anhelitus est debilis, licet manifestus, & est cum stertore & spuma. Debilis in qua anhelitus est fortis & ordinatus sine spuma & stertore. Et horum accidentium causa superius reddita est. Et ex his habetur 2. distinctio, quòd aliqua est mortalis, aliqua salubris. Primæ duæ interficiunt, sed prima uelocius secunda, tertia autem est salubris, quia possibilis est liberatio, licet cum difficultate iuxta aphor. 4. 2. secundæ particulæ. Soluere apoplexiam fortem &c. Tertia distinctio. Aliqua est apoplexia per essentiam in capite, aliqua per communitatem, sicut cum oppilantur uenæ siue arteriæ apoplecticæ, aut coarctatoriæ à sanguine phlegmate aut melancholia, aut attenuatoriæ à frigidityte forti, aut stipicityte, aut ab aliqua re exteriorius fortiter comprimente, & aliquando fit causa cordis propter oppilationem, malam complexionem, aut debilitatem. Vnde in his duobus casibus spiritus uirtuales non transmittuntur ad cerebrum, ex quibus debent fieri spiritus animales, & quia etiam debent concurrere ad quasunque operationes sensitiuas & motiuas. Tertius casus quòd in aliquo membro esset fortis dolor propter quem cerebrum contraheretur, unde fieret spasmus uniuersalis in toto, sed hoc fortè magis debet dici epilepsia quàm apoplexia. Quartus casus ubi à toto sicut in febribus communi-

communicarentur uapores capiti uentriculos opprimentes, ita ut fierent sine sensu & motu, & hoc idem eisdem uaporibus ab aliquo particulari membro communicatis. Aliquando apoplexia est per essentiam in cerebro propter oppilationem, aut attenuatoriam sicut à frigore forti extrinseco occurrente, aut ex appropinquatione alicuius rei uenenosæ, unde cerebrum contrahitur, aut à percussione, aut casu comprimente os super cerebrum, aut sanguine, aut alia materia repleta inter os & cerebrum, aut à simili materia in meatibus cerebri existente. Aliquando oppilatio est coarctatoria propter sanguinem phlegm. melancholiam in uentriculis cerebri contentam, & aliquando propter fortem dolorem cerebri ipsum contrahitur taliter ut fiat huiusmodi oppilatio. Causæ autem sumptæ ex rebus non naturalibus sunt sicut aer foetidus, uehementer frigidus & humidus & uaporosus, & sicut nimis potus. s. apho. Si inebriatus quis repetere sine uoce &c. Nec non crapula multa, usus longus rerum frigidarum caput repletum aut stupefacientium, somnus multus & propriè de die & resupinè, retentio euacuationum consuetarum, nimia quies aut nimis fortè exercitium, subitò occurrens timor multus aut tristitia. Et ex his sequitur quarta distinctio quòd aliqua apoplexia est materialis, quædam immaterialis propter fortem constrictionem cerebri, aut contractionem, propter aliquam causam intrinsecam aut extrinsecam, sicut à dolore aut accidentibus animi. Plures tamen istarum magis merentur nominari epilepsiæ quàm apoplexiæ cum epilepsia sit spasmus uniuersalis, sicut apoplexia est paralytis, uniuersalis, apoplexia uerò nunquā fit à causis exiccantibus cum cerebrum non possit tantum exiccare, ut homo fiat apoplecticus.

Signa uerò quædam sunt prognostica. Ex quibus est dispositio corporum ad apoplexiam. Et ista sunt frigida & humida, maximè secundum cerebrum complexionaliter & ætatiuè, ut, 2. aphor. Epilepti in iuuenibus in cōmen. apho. 6. Apoplectici maximè sunt in ætatibus à 40. an. usq; ad 60. Et in hac ætate magis ab humore melancholico, licet in decrepitis magis à phlegmate, pueri uerò magis incurrunt epilepsiam propter fortitudinem caloris uapores excitantis, quæ sunt magis immediata causa epilepsiæ sicut humores frequentius apoplexiæ, & cum hoc pueri habent uirtutem fortem non sinentem multam materiam cōgregari. Horum oppositum est in senibus, & propriè decrepitis. Item habentia capita parua & stricta sunt ad apoplexiam parata. Vertigo perseuerans in senibus cum debilitate sensuum, incubus, iectigatio, stupor, pigritia, ad motus corporeos, grauis & longus somnus cū repletionem, tremor in toto propriè in capite, concussio dentium in somno, urina nigra, id est liuida, obscura, crassa, cineritia, uaporosa, id est, cum multa spuma tenaci, cum multo sedimine ferrino siue fursureo, id est, diuiso in paruas partes tamen compactas, ut sunt ferraturæ ligni, aut serinum, id est, simile fero lactis uel fermento in aqua dissolutum, inflatio uenarum guidez arguens multam materiam oppilarum arterias subethicas aut cerebri uentriculos, hæc quidem apoplexiam prognosticantur.

Signa inchoantis apoplexiæ sunt clamor, deinde anhelitus mugitui similis, deinde uox sicut strangulati, & hæc sunt cum apoplexia inceperit, sed nōdum

multum impresserit, postea ipsa iam multum imprimente fit stertor, postea spuma & fit ablatio sensus & motus ad modum superius expositum. Et hæc ueritatem habent in apoplexia media cōmuniter contingente, in fortissima autem fortasse nō procedent ista propter subitum aduentum eius neq; etiam apparet stertor modico aëre et tardè inspirato, in debili etiam non est stertor, nec uox strangulati, nec fortè anhelitus mugitui similis, licet clamor frequenter præcedat.

Signa autem significantia materiam sanguineam sunt facies & oculi rubei, & calore multum suffocato tendit illa rubedo in uiride & tandem in nigrum, tensio uenarum, id est, guidez, uenarum faciei, oculorum, frontis, temporum & uenarum quæ sunt post aures, & plenitudo uenarum quæ sunt sub lingua, & fit subitò ualde, & si præcessit casus uel percussio est illud manifestius & pulsus plenus. Phlegma uerò significat color albus, oculi pleni lippa, nares humidi, humiditas ex ore profluens, ore gmon. Melancholiam autem significat color tendens in fuscum, priuatio huiusmodi humiditatum à capite profluentium, & sunt signa communia significantia speciem materiæ sumpta à complexionem, habitudine, ætate, sexu, regione, arte & regimine de quibus supra. Spuma quoq; significat speciem humoris suo colore albo, plumbeo, citrino, rubeo &c. Signa apoplexiæ apostemose est febris continua secum coniuncta. Aliquando tamen apostema procedit, & tunc sunt signa apostematis de quibus supra, aliquando subsequitur materia fixa & soluite continuum. Signa distinguunt inter apoplexiam & subeth sunt, quia in subeth remanet auditus & uisus & operationes aliquæ sensuum interiorum & exteriorum, & fit magis paulatim. Differt à syncopi quia in syncopi facies est sicut mortui reuocato sanguine & spiritu ad cor, in apoplexia facies est secundum consuetudinē. Et in syncopi pulsus est submersus, debilis ualde, interdum uermicularis, sed in apoplexia est ferè pulsus consuetus. Et in syncopi secundum plurimum casus in terrâ est uelocior. Differt ab epilepsia, quia in ea sunt motus spasmodici, in apoplexia non, licet quandoq; fit cum spasmis in facto esse, & epilepsia est cum periodis, apoplexia non. Differt à præfocatione matricis, quia præfocata audit & sentit & ad sunt ei operationes sensuum interiorum.

Apoplexia per colligantiam cognoscitur, quia præcesserunt nocumenta totius uel membri communicantis. Si uerò sit per essentiam non est necessarium tale præcessisse &c. Oppilatio autem arteriarum subethicarum cognoscitur secundum plurimū per inflationem uenarum colli, & cum abundantia nocumentorum cerebri. Illa autem quæ à corde est cognoscitur, quia secundum plurimum est facies sicut mortui, est enim secundum plurimum syncopi coniuncta. Vltimò distinguitur apoplecticus fortissima apoplexia à mortuo per quatuor signa. Primum est, ut in aëre quieto operiantur os & nares corto subtilissimè carminato. Aut candela accensa cum flamma ex opposito narium ponatur. Aut cyathus plenus aqua super extremitate pectoris ipsius resupini ponatur, tunc si non uideatur aliquod istorum moueri, certū est ipsum esse mortuū. Quòd si cōtra in ipsis aliquis motus comprehendatur adhuc uiuit. Simile experimentum est de speculo rerissimo opposito ori et naribus

nam si non maculetur est mortuus. Si uero macule-
tur quod non est nisi propter flatum anhelitus uiuit,
sed hoc signum est ceteris minus certum. Pro quo no-
ta quod anima potest mouere pectus motu dilatatio-
nis & constrictionis solo concursu spiritus uitalis si-
ne animali. Vnde hic motus erit dicendus merè na-
turalis non mixtus, ut uult G. 2. aphorif. 42. com. Et
etiam confirmatur autoritate Hip. allegata per Auic.
21. tertij cap. de generatione embrionis. Dicit enim
quod cor est primum quod uiuit & ultimum quod
moritur, ergo motuum est cerebrum uiuente corde,
sed cor non potest uiuere nisi per respirationem euen-
tetur, ergo erit respiratio cum non erit spiritus anima-
lis. Ex quo sequitur ut supra aliquem anhelitum esse
merè naturalem, licet tamen Gal. sextò interiorū uo-
luerit aliqua animalia frigida per aliquod tempus nō
anhelare, sed sufficere eis euentationem quæ fit ab ex-
trinfeco per porositates corporis, illud tamē tempus
est paruum, sed de homine habēte cor ualde calidum
non est uerisimile. Non apparentibus tamen signis
alicuius anhelitus, neq; pulsus auctores prohibent hu-
iusmodi corpora quæ sunt uel fuerūt apoplectica, se-
peli usq; ad tres dies, cuius triplex ratio redditur.

Prima est sumpta à motu humorum, omnis enim
motus humorum in triduo finitur. unde in hoc tem-
pore si quid uitæ superfit debet declarari, cum pro-
pter motum nouum cuiuscunq; humoris in triduo,
debeat fieri aliquis motus in egro, sicut euentatio aut
crisis. Secunda causa est, quia luna, saltem uelociter
mora, peragrat mediam quartā circuli signorum ex
qua confurgit aspectus sextilis uirtutem confortans,
peragrat enim uelociter mora singulo die quindecim
gradus, hæc autem ratio non est generalis, sed solum
est ualida, dum luna uelociter mouetur. Tertia cau-
sa, quia in hoc tempore incipit aliquis foetor mortis
declaratiuus, & propterea resuscitatio Lazari quadri-
duani iam foetentis fuit miraculosa non naturalis, er-
go quam primum incipit foetere, etiam si esset prima
dies sicut in æstate est sepeliendum præcipue factis ex-
perimentis superscriptis. Genilis tamen addit quod
tertia dies est dies ultimi et acutissimi conatus, in qua
si nullum signum uitæ apparebit nunquam deinceps
est sperandum, 7. apho. Quibus cunq; sphacelatum est
cerebrum &c. Prognostica. Primum, apoplexia
fortis aut media est secundum plurimū mortalis, uidi
enim quosdam sed paucos apoplecticos media apo-
plexia cum forti fectore & spuma saluatos fuisse.

Secundum, omnis apoplexia per communitatem,
aut immaterialis, salubris, saluatur absque transitu in
paralytim secundum plurimum. Tertium, apople-
xia per essentiam materialis salubris, per transitum in
paralytim secundum plurimum saluatur. Quartum
cum applicantur naribus apoplectici potenter cōmo-
uentia sternutationem, & non sternutat nec sentit im-
pressionem, mortale. Cura.

Cum ergo ista accidentia uisa fuerint,
attendendum erit an patientis facies multū
rubere, aut denigrari, aut uiridis fieri ui-
deatur, quæ admodum contingit cum sanguis
in aliquo membro ex coarctatione retine-

tur. Tunc enim sanguis ex duobus guidet, ille
coextrahendus erit, aut ex duabus cephalicis.

Hic Rasis ponit curam apoplexiæ. Et diuiditur in
tres partes. In prima ponit curam apoplexiæ sangui-
næ. In secunda phlegmaticæ. In tertia iterū redit ad
complendum curam sanguinæ, secunda ibi. Quod si
ita non fuerit, tertia ibi. In prima aut huius passio-
nis. De prima parte Rasis ponens signa apoplexiæ
sanguinæ & curam dicit, quod cum signa apople-
xiæ absolutæ uisa fuerint, erit attendendū an patien-
tis facies multum rubere aut denigrari aut uiridis fie-
ri uideatur, sicut contingit cū sanguis in aliquo mem-
bro retinetur ex coarctatione, id est, propter constric-
tionem, & tunc in hoc casu faciēda est phlebotomia
aut ex duabus guidet, aut de duabus cephalicis. Et uos
supplere alia signa sanguinis, scilicet tensionem uena-
rum, tactum calidum &c. de quibus supra.

Notandū primò sanguinē quatuor ex causis posse
uiridem fieri & tandē denigrari, primò per adustio-
nem, quia calidum agens in humidum denigrat, pri-
ma primū, secundo per congelationem spiritus calo-
rem naturalem mortificando, spiritibus corruptis, qui
sunt lucidi penes Auic. in lib. de uiribus cordis, tertio
per exitū sanguinis à uena in aliquo loco conclusi si-
cut in cōtusione. quarto per constrictionē sanguinis
etiā ad intra uenas non debite euentati spiritibus cor-
ruptis qui ei admiscuntur. Et hic ultimus modus est
ad propositū, nam propter anhelitus constrictionem
in apoplexia, sanguis qui primò erat rubeus prohibi-
ta ipsius & spirituum debita transpiratione & euen-
tatione prius uirescit, deinde nigrescit, amplius euen-
tatione prohibita per ulteriorem suffocationem. Est
enim uiriditas quasi transitus à rubeo in nigrum.

Notandum secundò, quod uenæ guidet sunt du-
plices. Quædā intrinsecè occultatæ in collo. Et quæ-
dam extrinsecè apparentes in eo in ambobus lateri-
bus colli. Et sunt istæ quæ phlebotomantur quarum
phlebotomia diuerit à cerebro & sanguinem in loco
coniunctū propter propinquitatē etiam euacuat. Ti-
metur aut harum phlebotomia primò propter infir-
miam ne dicatur infirmū esse subscannatum, secundo
quia retentio sanguinis absque forti constrictione est
difficilis. Et si fortiter cum ligatura constringitur, ma-
gis impeditur anhelitus. Item fit expressio sanguinis
ad superiora, unde augetur apoplexia, & etiam con-
stringitur super arterijs apoplectici quod præparat
ad apoplexiam. Veruntamen sanguis posset etiam
cum pauca strictura constringi ut infuso cotto in al-
bumine ouī & super eum digito cōpresso donec adhe-
reat. Phlebotomia tamen cephalicarū est cōmuniter
consueta, & satis effeac. Verum propter ultimū di-
ctū Rasis in præsentī cap. aliquando oportet inchoa-
re à phlebotomia saphenarū cum corpus est ualde ple-
toricum & sanguis petit superiora, ut etiam in alijs
duobus casibus superscriptis in phre. ubi uerisimi-
liter simus securi ægrum posse durare donec fiat secun-
da phlebotomia scilicet ex guidet uel cephalicis scil-
licet usq; ad duas uel quatuor, horas uel circa. Si autē
uideremus fortem apoplexiam, tutius est à cephalicis
inchoare. Et debet esse phlebotomia copiosa secundū
sanguinis exuberantiā postea phlebotomentur uenæ
magis propriæ siue particulares, ut quæ sunt sub lin-
gua.

gua, post aures, in fronte uel naso, uel occipite, uel cute capitis, ita ut una aut plures fiant phlebotomiae secundum exigentiam. Post hoc si opus est humores sanguini commixtos euacuare fiat cum clysteribus non multum calidis, sicut in phlegmatica, sed tamen potenter euacuantibus, de quibus infra aut cum sumptis per os sicut pillulis cochinis, hiera cōposita distemperata cum pauco hidromellis.

Quod si ita non fuerit, imò cum aërem attrahit hic, sentitur & auditur in pectore oregon, ex hoc clystere erit clysterizandus, cuius hæc est confectio. Recipe colocynthidis, buccormariem, centaurea minoris, hartanite, ellebori albi, omnium ana M. i. coquantur omnia in tribus lib. aquæ, donec ad unam redeant, deinde colentur & ex media libra huius apozematis fiat enema, quod si citò exierit fiat iterum donec humorum multitudo cum eo exeat.

Ponit curam apoplexiæ phlegmaticæ dicens: Quod si non fuerint signa supra scripta sanguinis, imò cum respirat auditur oregon in pectore, id est, sonitus quidam sicut inpropinquus morti proueniens ex humiditate multa in canna pulmonis cui aër respiratus obuiat, & tu supple facie albam & cætera signa phlegmatis, tunc clysterizandus erit hoc clysteri educente phlegma a locis remotis, imò interdū sanguinem propter sui acuitatē. Colocynthidis cal. & sic in tertio. Buchormariem, id est, panis porcini siue cyclamen siue malum terræ cal. & sic in tertio. Centaurea minoris quæ est efficacior ad euacuandum phlegma a capite quam centaurea maior cal. & sic in tertio. al. in secundo. Hartanite quæ est una species buccormariem similiter cal. & sic in tertio. Ellebori albi inductiuū feutorum accidentium quod natura humana moderno tempore si exhibeatur per os non tolerat, licet toleraret elleborum nigrum, & est cal. & sic in tertio. Ex his quinque cuiuslibet M. i. bulliat in tribus lib. aquæ donec redeat ad unam, & ex media libra huius apozematis, id est, decoctionis siue infusionis fiat clystere, potenter enim euacuat phlegma & diuertit a partibus longinquis, omnia enim hæc phlegma potenter euacuāt imò hartanite & buccormariem extra applicata stomacho & uentri soluit, & uomere faciunt. Si autem uelimus clystere minus calidum, posset his in decoctione matrum uisolarum. M. i. addi & nō imponitur in hac decoctione nisi. s. lib. propter ipsius acuitatem, & hæc clysteria sunt multotiens replicanda bis aut ter in die, ut fiat notabilis huius phlegmatis euacuatio & diuersio, ita ut ferè totum tempus occupetur, nunc in clysteribus, nunc in cæteris diuersionibus. Aliud Gerard de solo. & centaur. minoris, utriusque saluæ, rutæ, abrotani, calamenthi, origani, an. M. i. anisi, marathri, fiseleos, se. basiliconis, an. 3. s. florum secados arabici, 3. i. pulpæ, colocynthidis, 3. 2. furfur, M. i. mellis anacardi, olei castorei, an. 4. s.

salis gemmæ, 3. i. hieræ picræ, ellebori albi, an. 3. 6. bulliant omnia in 10. lib. aquæ præter hierampicram, usque ad consumptionem medietatis & coletur & ex colatura accipiantur. s. quartæ & addatur hiera picra supra scripta & imponatur, est enim efficax propriū & ultimum. Et fortius esset si aliquid mellis anacardi nō decocti & similiter oleum de castoreo clysteri admisceretur, deinde imponeretur, est enim mel anacardi calidum in quarto uehementer stimulans.

Naribus quoque conditi & elleborus albus suauiter insufflentur.

Ponit curam per sternutationem insufflando in nares ægri conditi & elleborum subtiliter puluerizatos, ex quo apparet conditi non esse elleborū, sed est planta quæ dicitur struthium comouens sternutationem. Succus autem ireos potenter sternutare facit, sed succus cucumeris asinini potentius, omnium potentissimum est euphorbium.

Et est ingeniandum, ut anacardinū cum hydromelle per os ad stomachum multoties descendere cogatur quaque die semel. Ex quo aut. i. pondus in potu sumendum est, cuius descriptio est in capite de paralyti. Sartago præterea ferrea calefacienda est, & capiti multotiens adeo uicinanda ut patientis capilli adurantur.

Ponit curam dando per os. i. aur. confectiois anacardinæ commixtæ cum pauca aqua mellis taliter ut descendere possit per meri, hæc enim feb. inducens phlegma exiccat & resoluit, cuius confectiois descriptio ponetur in paralyti. Sartago præterea ferrea est calefacienda & capiti multotiens adeo uicinanda, ut patientis capilli adurantur. Melius autem est, ut hæc sartago sit ad formam capitis, & quod capilli prius fuerint abscessi, conuertit enim phlegma in uaporem & minuit.

Quod si hoc modo non sanatur in medicando plus laborabitur. Caput nanque rademus, & ex sinapi trito, & castoreo, & fortissimo aceto liniemus.

Docet applicare capiti raso medicamen factum ex sinapi, uel allio, & castoreo. an. cum aceto fortissimo distemperatis, hæc propter caliditatem suam attingentem usque ad quartum gradum potenter phlegma resoluit, imò rubificant, & quandoque uescant si per duodecim horas stent in loco applicata & aliquantulum constricta, debent autem poni super toto capite, maxime super tribus commissuris. Emplastrum Gerardii multum attrahens ad exteriora. & galbani, serapi. ni, opopanacis, an. 3. 2. euphorbii, pyrethri, sinapis, castorei, trium generum piperis, an. 3. 2. sulphuris uiui, 3. i. s. tereben. 3. i. puluerizanda puluerizentur, liquefieri liquefiant, postea misceantur omnia, & fiat massa & super alutam extendatur.

In prima autem huius passionis specie,

post phlebotomiā stringemus fortiter adiutoria ligando superius parum sub coniunctione ipsorum cum spatulis et stringemus tibias similiter. Capiti quoque superfundendum est oleum rosaceum & acetum uini, & phlebotomia facienda est prius in pedibus & postea in nasi extremitate.

Redit ad complendum curam apoplexiæ sanguineæ, & in primis iubet phlebotomiā uenarum pedū, postea uenę extremitatis nasi, et iubet post phlebotomiā fortiter adiutoria stringi parum super coniunctionem, & similiter tibias parum supra genu & capiti infundi acetum & oleum rosa, iuxta superiore doctrinam. Per hanc enim phlebotomiā pedum intendit euacuare & diuertere, & similiter intendit diuerrere per ligaturas dolorosas & ægrum excitare, & per oxyrodinum materiam ad caput uenientem, repercutere, quod conuenit materia existente in fluxu ad caput per uenas extrinsecas per phlebotomiā extremitatis nasi intendit sanguinem actū facientem apoplexiā eradicare, sed ante phlebotomiā nasi phlebotomentur cephalicę uel guidez. Et ex his quę dicta sunt potes elicere quinque intentiones curatiuas. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia localia applicat secundum exigentiam temporum. Quarta corrigit accidentia. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima autem in sanguinea & phlegmatica completur, ut dictum est supra, clystera tamen in sanguinea debent esse minus calida, & alia quando fiant suppositoria fortia ut ex salgemma folio, sed cum filo suspendantur, ut libere possint extrahi, & potest fieri ex melle cui addi potest salgemma, & illa quę ponuntur in clysteribus. Verum in melancholica ponantur in clysteribus & suppositorijs elleb. niger & cætera quę potentius euacuant melancholiam, ne hic opus est digestiuis, cum non det inducias nisi forte in declinatione. Secunda autem intentio completur omni genere diuersionum quę sunt assiduandę, & proprię fortiores earum sicut ligaturę & uentilationes & debent sæpe mutari, sic enim melius diuertunt & ægrum excitāt, & fiant sternutationes iteratę cum his quę dicta sunt. Tertia intentio est ex dictis manifesta. Quarta uerō intentio completur prouocando urinam cum his quę superius dicta sunt in capite de phrenesi, & alia accidentia corrigantur secundum exigentiam. Quinta autem similiter completur locando ægrum in aëre calido & sicco si fuerit phlegmatica, si uerō sanguinea in aëre sicco temperato in actiuis, aut leuiter declinante ad calidū, & si fuerit melancholica in aëre declinante ad temperiem in actiuis & passiuis, aut leuiter declinet ad calidū. Dieta autem sit nihil dare usque ad declinationem, & tunc potest dari hydromel & oxymel. In phlegmatica & melancholica acetosus simplex, & aqua hordei in sanguinea, & gradatim postea ascendere ad dietam crassiore, et conformem humori peccanti. Somnus autem cum declinat concedatur, sed multoties interruptus, sollicite incedatur ad euacuationem omnium superfluitatum, motus in declinatione conuenit, & si non

possunt fieri, fricationes fortes uicem suppleant exercitij. Prouocentur ad iram & tristitiam. Duo tamen præcepta maxime hic attende. Primum quod est commune huic et omnibus ualde acutis passionibus, ut scilicet subito festines ad curam, nam post duodecim horas si tardetur secundum plurimum cura erit irrita & uana. Secundum est in apoplexia per essentiam in cerebro materiali labores in prouocando paraly sim cū fricationibus fortibus maxime in ea parte in quam natura repit, & omnibus alijs auxilijs. Si uerō fuerit per cōmunitatem cura sicut in cap. de soda dictū fuit cum illis quinque intentionibus quę huic loco applicandę sunt. Si uerō pendear a causa primitiua ipsam remoue. Et nocumentū per ipsam immediatē impressum, uirtutem excita, & humores a lapsu prohibeo omni genere diuersionum. Si uerō a mala complexionē sine materia pendear, altera cum contrarijs, humores a lapsu prohibeo, uirtutem sopitā excita, cum omni genere diuersionum.

DE SVBETH. Cap. VI.

Subeth apud Arabes importat somnū longum & profundum, qui diffinitur, secundum Auicē, est somnus superfluous, scilicet in longitudine, & grauis, id est, profundus a quo difficilis fit excitatio, pendens a causa præter naturam. Dicitur autem superfluous & grauis ad differentiam somni naturalis, et dicitur pendens a causa præter naturam ad differentiam somni non naturalis, de quo infra. Somnus autem diffinitiuē secundum Auicē, est reditus spiritus animalis ab instrumentis sensum et motus ad suum principium, cum quo priuantur ipsorum instrumenta ab exitu operationis in ipsis, nisi quę necessaria sunt ad hoc, ut uita permaneat, & illa sunt instrumenta spiritus, id est, anhelitus, dicitur primò reditus spiritus animalis, quamuis etiam redeat spiritus uitalis & naturalis ad sua principia, principaliter tamen animalis, cum propter eum magis somnus inductus sit, quam propter alios spiritus ipso in uigilijs magis laborante in operationibus sensus & motus, & per consequens magis resolutio. Dicitur ab instrumentis sensus & motus, quia propter ea principaliter factus est somnus ut quiescant. Dicitur ad principium quia scilicet ad cerebrum quod est principium spiritus animalis, licet etiam in somno spiritus uitalis redeat ad cor, & naturalis ad epar, nō est tamen negandum quin omne genus spiritus redeat ad unumquodq; membrorū principium, sed plus de animali redit ad cerebrū quam de uitali ad cor & de naturali ad epar. Dicitur postea quod priuantur instrumenta sensuum et motus, non quidem completē, sed diminutē, cum in somno instrumenta sensui sentiant obiecta fortiter imprimētia, & moueantur, ut est manifestum. Vltimò additur præter ea quę sunt necessaria ad uitam, scilicet instrumenta anhelitus, nam ista scilicet diaphragma & pectus nullo modo in operationibus suis diminuuntur. Causę autē reditus spiritus ad sua principia est primò inclinatio ipsorū spirituum ad redeundū ad sua principia cum sunt lassati & resoluti, ut in suis principijs fortificantur & restaurentur, nō quia spiritus nutrantur cum sint inanimati, sed fouētur & alij de nouo regerentur; ideo Auerois secūdo colligit capite de opere somni

somni, comparat spiritus militibus qui fracti redeunt ad ducem exercitus, & ad signa ut inde fortificati acriores redeant ad pugnam. Trahuntur etiam spiritus à suis principijs, imprimantibus in ipsos proprietatem qua ad ipsos moueantur, licet etiam moueantur ad ipsa ne detur uacuum sicut accidit in corporibus subtilibus permixtis cum una pars mouetur reliqua subsequitur. Licet posset dici quod membra principalia attrahant spiritus nihil imprimendo per solam subordinationem, utilitas quæ sequitur ex parte ipsorum principalium & deseruiunt eis, maximè stomachi est, quod eorum digestionem fortificantur ideo dicitur quod somnus est quies operationum animalium cum fortificatione naturalium, sed intellige quod hæc diffinitio est causalis, quia data per causam efficiens quæ est reditus spiritus, si autem uelles formalem, dic quod somnus est quies operationum animalium cum fortificatione naturalium propter reditum spiritus animalis. Ex his quidem possent elici tres causas somni, scilicet efficiens quæ est ipse reditus spiritus animalis, causa autem remotior efficiens est ipsa forma impressa in spiritibus à principalibus, aut naturalis subordinatio ipsorum, aut propria inclinatio ipsorum, aut ne detur uacuum, quæ omnes sunt causæ reditus. Causa autem efficiens conseruans est oppilatio in rete mirabili & in neruis, uenis, & arterijs, per quas spiritus redeunt ad instrumenta sensus & motus, quæ oppilatio fit à uaporibus ascendentibus ad cerebrum in prima, secunda, & tertia digestionem qui uapores ingrossati à frigiditate & humiditate cerebri oppilant huiusmodi uias de quibus sermo præcessit, licet in somno præter naturam fiat oppilatio ab humoribus & uaporibus grossis. Causa autem formalis est quies operationum animalium, finis autem est fortificatio ipsorum spirituum, & digestionis stomachi & membrorum principalium, licet non sit finis ultimus, nam finis ultimus omnium operationum humanarum est felicitas &c. Causa autem materialis non est assignanda, quia neque somnus, neque aliud accedens habet causam materiale ex qua. Et si Auerrois dicit loco allegato uapores esse causam materiale somni, intellige causam materiale cum qua non ex qua, quæ nihil aliud est quam causa efficiens. Ex his habemus quod calor in somno fortificatur interius, minuitur exterius, quapropter in somno indigemus pluribus operimentis quam in uigilijs, & notate quod cum spiritus sint fortificati in somno etiam resoluta oppilatione redeunt exterius, et tunc animal expergitur, & non credatis quod semper redeant ad extra idem numero, qui prius fuerant ingressi, cum ferè in unaquaque cibatione fiat nouorum spirituum generatio sicut continue fit ipsorum corruptio. Notate etiam quod spiritus redeunt ad principalia à membris omnibus, ut ab ossibus, carne & huiusmodi quæ non sunt instrumenta, licet non ita sicut ab instrumentalibus, & etiam ab instrumentis anhelitis, sed pauci ita ut non diminuantur in operationibus suis, & hoc propter causas & fines assignatos, et ex his manifestum est quod somnus est passio anterioris cerebri, & proprie primi uentriculi, cum in eo magis impediatur sensus communis quam aliquis aliorum sensuum interiorum, & inter exteriores, magis usus & auditus, quam tactus, quia fiunt propter neruos ab interiori cerebro ortum ha-

bentes, sicut tactus per neruos orientes à nucha & cerebro posteriori. Somnus triplex est, naturalis, non naturalis, & præter naturam. naturalis qui fit à causis naturalibus non lædentibus sensibilibus neque insensibilibus sicut à resolutione moderata spirituum in uigilijs & laboribus, & oppilatione moderata à uaporibus primæ & secundæ & tertiæ digestionis. Non naturalis qui fit à causis non naturalibus insensibilibus lædentibus, sicut ab exercitio & uigilijs modum excedentibus & præter modum spiritus resoluentibus & à medicina soluente, & sicut à crapula & ebrietate non tamen modum excedente & assumptione rerum moderate stupefacientium, & sicut fit in neutris conualescentijs, & hic somnus est longus et profundus, aut quia spiritus sunt nimium paucificati, unde non superfluit ut possent exire, aut nimis ingrossati, unde sunt facti tardiores ad motum & forte nimia oppilatio facta est, nulla tamen existente læsione sensibili. Præternaturalis autem est qui fit à causis sensibilibus lædentibus sicut est subeth de quo nunc agit Rasis, & sic patet quid est subeth, quid somnus naturalis, & quid non naturalis.

*U*n aliquis quasi dormiens iacet, et tamen sentit & mouetur, sed oculos secundum plurimum habet clausos, quos tamen dum uocatur cum clamore, aperit licet iterum statim claudat, iam patitur subeth.

Diuiditur præsens capitulum in duas partes. Primo Rasis agit de subeth theoricè, secundo practicè. secunda ibi. Qui cum clysteribus. De prima parte dicit cum aliquis quasi dormiens iacet, & tamen sentit & mouetur ad differentiam apoplectici & syncopezati, & secundum plurimum tenet oculos clausos, ad differentiam congelati, de quo in sequenti capite, qui secundum plurimum stat oculis apertis, quos tamen dum uocatur cum clamore aperit, licet statim claudat, ad differentiam præfocatae quæ non aperit oculos, licet audiat et sentiat. Et quia subeth fit paulatim & post somnum & diu durat, præfocatio est his contraria, hic patitur subeth.

Qui cum clysteribus acutis quæ paulo ante nominauimus curandus est. In os quoque ipsius mittendum hydromel, et laborabimus ut descendat, ipsum enim nutrimentum existit eius. Caput præterea usque ad diatritum primum oxyrodino infundendum. Post tertium autem diem sterutationem prouocabimus ex his quæ nominabimus, & rademus caput, & leniemus ex sinapi & castoreo & aceto.

Hic ponitur curam subethici quinque remedijs. Primo curat ipsum cum clysteribus acutis, dictis in capitulo de apoplexia, quorum duo aut plura aut saltem unum imponatur in die ad diuertendum et euacuandum materiam phlegmaticam à capite. Clysteria tamen

possunt esse leuiora quam illa quæ dicta sunt in cap. de apoplexia, cum subeth sit minor agritudo quam apoplexia, ut faciendo decoctionem ex hyssopo, calamenthio, stecade arabico, agarico, quibus apud necessitatem addatur cæturea, colocynthis, & alia quæ ponuntur in clysteri descripto in cap. de apoplexia. Secundo curat cum hydromelle pluris aut paucioris aquæ. Commune aut hydromel recipit 8. partes aquæ, & unam mellis, & bullit usque ad tertiæ partis consumptionem continuè dispumando, & elaborandum est, ut descendat ad stomachum, quia cum difficultate deglutit. Est enim cibus medicinalis. Et si uis ipsum magis nutritiuum pone sex partes aquæ et unam mellis, & si ipsum minus nutritiuum pone 12. partes aquæ, & unam mellis, semper dispumando & bulliendo, donec pars tertia sit consumpta, uerum declinante subeth oportet ingrossare dietam dando brodium cicorum, & tandem aliquid carniū & uini. Tertio applicat capiti ox yrodinum superius descriptum, & hoc fronti & temporibus materia fluente per partes extrinsecas usque ad diatritū primum, id est, spatium triū dierum, donec materia sit fluxa. Quarto, materiam secundum maiorem partem fluxam euacuat à capite cum sternutatorijs dictis in capitulo de apoplexia, leuiora tamen possunt esse. Sufficit enim fortè succus artanice. Vltimo ponit medicinas resoluentes ex sinapi, castoreo & aceto, dictas in capitulo de apoplexia. Est tamen gradatim procedendum. Primo addendo castoreū, ox yrodinum supradictum, tandem componendo castoreum calidum usque ad finem tertij, & sinapi calidum in quarto cum aceto forti ad maiorem penetrationem. Iuxta modum consuetū ponendæ sunt species & causæ, signa, prognostica, & tandem cura. Subeth est duplex, quoddam longū pendens à sanguine, quoddam graue siue profundum pendens à phlegmate. Item, quoddam materiale, quoddam immateriale. Item quoddam per essentiam, quoddam per cōmunitatem, aut à toto, aut à membro particulari, & quodcunque horum fuerit, aut est intentum, aut remissum, aut medium, &c.

Causæ primitiue sunt, sicut casus & percussio in capite maximè comprimens os. percussio in temporibus, ubi sunt arteriæ apoplectice, colli laqueatio & compressio super arterijs apoplecticis, frigus aeris & humiditas superflua, crapula & ebrietas, narcotica sumpta per os, aut exterius applicata, quorū quedam oppilant oppilatione attenuatoria, quedam coarctatoria, quedam utroque modo. Causæ corporeæ per cōmunitatem sunt sicut febres, & propriè frigida & maximè phlegmatica in suis principijs, nec non multa spirituum resolutio à quacunque causa fiat siue corporea, siue incorporea, similiter coitu, fame, uigilijs, aut exercitio, aut mora in balneo, resolutio, aut aliud quodcunque extenuans & resoluens sicut aggritudines acutæ & prolixæ, & similia. Item, communicatio à quocunque membro mittente uapores ad caput, sicut à stomacho, intestinis, & uermes aut materia eorum, & sic de singulis, qui uapores propter sui multitudinem faciūt oppilationem coarctatoriam. Et si propter malitiam complexionis, fiat contractio cerebri, tunc oppilatio est attenuatoria, & quandoque est coarctatoria in arterijs subethicis à sanguine aut phlegmate prohibente transitum spiritus uitalis. Et si

est cōpleta, sequitur apoplexia. Si diminutio sequitur subeth. Per essentia aut in cerebro potest esse à mala complexionione frigida, scilicet constringente, aut à mala cōplexione humida relaxante, ita ut paries cadat supra parietem. Et utraq; est oppilatio attenuatoria, aliquando est à materia sanguinea aut phlegmatica, quæ si sit in meatibus transitus spiritus, oppilat coarctatoriè: si uero extra eos sicut inter cranij & cerebri, aut in ipsis anfractibus & substantia cerebri, siue apostemetur, siue non, facit subeth oppilando attenuatoriè. Caliditas aut & siccitas non faciunt subeth nisi per accedens, caliditas attrahendo, siccitas corrumpendo, & inter omnes qualitates frigiditas est potentior in cauendo subeth. Signa aut subeth. Et primo prognostica. Primum est debilitas capitis à frigiditate, humiditate, repletionem & ipsius paruitate. Secundum est grauitas capitis cum hebetudine sensuum & tarditate ad motū. Signa distinctiua inter subeth, apoplexiam, syncopim, perfocacionem matricis, & cōgelationem sunt ex dictis manifesta. Differt aut à lithargia, quia lithargia est cum febre, cum alienatione & obliuione, hic uero non, & est lithargia secundū plurimum in cerebro posteriori, hic uero in anteriori, & propriè in primo uentriculo. Signa caularum primitiuarū sunt præcellio earum & nocumenta ex ipsis derelicta. Signa subeth per cōmunitatem siue à toto, siue à parte, sunt præcellio nocumenti totius aut partitis, & quod augeatur subeth cum augmento illius, & decreuit cū decremento illius, aut auferatur cum ablatione illius, & per cōmunitatem interdum fit subitò, per essentiam uero fit magis paulatim. Signa subeth à frigiditate siue materia erit color uiridis, tendens in nigrum propter mortificationem spirituum, pulsus durus propter congelationem arteriæ, tardus diminuta necessitate, & non erit inflatio in facie nec in palpebris. Et si sit ab humiditate siue materia etiam non erit inflatio, nec rubor significans sanguinem, nec grauitas capitis, sed erit mollities in toto & in pulsu. Si fuerit à phlegmate, apparebit eius, multitudo in egestionem, urina, ore, naribus & oculis. Secundo, fatietas nauseatiua plurima præcedens regimen proportionale, cōplexio naturalis & gratiua frigida & humida, pulsus mollis, paruus, latus, quasi cadēte superiori latere arteriæ cum quadam fluctuatione seu undositate, Subeth maximè profundum significat albedo in facie & oculo, linguæ limositas, grauitas capitis, ociositas, ponderositas, inflatio palpebrarū. Si uero fuerit à sanguine, erit inflatio uenarū colli, linguæ, faciei, oculorū, frontis, temporum, post aures rubedo faciei, & oculorū caliditas percepta circa caput, & non erit somnus ita fixus, nec tanti periculi. Si uero sanguis & phlegma simul sint in causa, signa sunt mixta: & si apostement, aderunt signa mixta apostematis quæreda ex his quæ superius dicta sunt in signis apostematū. Prognosticum subeth non apostemofolum secundum plurimū curatur, sed apostemofolum rarissimè. Cura si fuerit à percussione, colli laqueatione, casu, offensione, constrictione, ut causa primitiua remoueatur, & nocumentum ab ipso derelictū, siue sit uulnus, siue contusio, corrigatur, sicut dictum est in cap. de sōda ex percussione, ad quod recurrit. Et si pendat à frigiditate siue materia, remoueatur causa infirigidans, si qua sit, & secundo frigiditas inducitur altere-

cur

tur cum calefaciētibz exterius applicatis sicut unctio-
nibus, somētis, embrocis ex oleo laurino, sambacino
de lilio, de costo, &c. Et cū somētis ex maiorana, stecca
de, calamētho, folijs lauri, & cū interius sumptis, scilicet,
diamusco dulci, diābra, mithridato, theriaca, cōse-
ctiōne anacardina, & aqua uitę, quę sunt ultima in ca-
lesaciēdo interius sumpta sicut exterius applicata, &
sunt aliqua cal. in quarto sicut sinapis, castoreum, eu-
phorbiū, et huiusmodi permixta cū paucō aceti ad ma-
iorē penetrationē, & eligant medicinę secundum gra-
dū ēgritudinis cui opponuntur, & tertio omnia hæc
sunt capitis cōfortatiua stipititate quadā, aromati-
cate, & subtilitate substantię et formā occulta. Et lapsus
humorū prohibeat cum digerētibz, euacuātibz, &
diuerētibz secundū oportunitatē, & similibus intē-
tiōibus, mala cōplexio humida corrigat, sed sint sic-
ca actū & potentia. Si uerō subeth pendeat à uenenis
sumptis, subitō ipsorū uomitus procuret, & etiā edu-
ctio per uentrē maximē cū lauatibus & liniētibus cor-
& cerebrū & spiritus confortēt. Et bezahartica pro-
pria cōtra illa uenena exhibeant, & nocumenta per il-
la uenena inducta corrigant; si uerō subeth pendeat à
crapula & ebrietate, curet cū uomitu exquisito, lōga
abstinentia & somno, & cum educētibz, per inferiūs &
cū cōfortantibus, sicut dictū fuit in capite de soda ex
ebrietate & nauſeatiua satietate. Si uerō subeth pende-
at à materia sanguinea uel phlegmatica per essentiam
in cerebro, procede sicut dictū fuit in apoplexia san-
guinea, et phlegmatica, præter hoc quod subeth nō in-
diger tanta festinatione sicut apoplexia, nec ita forti-
bus & extremis curatiōibus cū sit ēgritudo minus a-
cuta, et in qua saltē ante eradiciua pōt permitti dige-
stio, nec hic est opus tenuissima diēta sicut in apople-
xia, sed de aqua mellis & brodium cicerū, horū etiā
cura in soda sanguinea & phlegmatica est perquiren-
da. Subeth uerō à multa resolutione spirituum cura-
tur, restauratione eorū cum debito regimine & de-
licato ex his quorū parum, multum nutrit, & cum
confortatione membrorum principalium & stoma-
chi, nec his opus est euacuatione aut diuersione, sed tā-
tum aliqui à somni profunditate excitatione. Sub-
eth uerō per communitatem curatur illis quinque intē-
tionibus quę posite sunt in cura sodę per commu-
nitatem, quę huic loco accommodandę sunt; duo ta-
men præcepta sunt obseruanda in curatione subeth &
similium ēgritudinum. Primum, ut in approxima-
tione localium uereamur actualet humiditatem, ex
qua interdum plus nocetur, quā iuuetur per poten-
tialē siccit, aut cal. Et propterea in discrasia frigida &
humida præstantiora sunt quę sunt calida & sicca, a-
ctu & potentia, sicut sacculi ex rebus calefaciētibz
& exiccantibus. Secundō, ut timeamus oppilationē
quę ex oleagineis frequenter derelinquitur, nisi sit a-
cetum secum mixtum, & propterea post approxima-
tionem oleorū & uiscosorum subsequatur ipsorū cō-
ueniēs absterſio, & lauatiua præstantiora sunt quę olea.

DE CONGELATIONE.

Congelatio sumitur quinque modis. Primō
prout distinguitur contra condensationem
& taliter accepta sic diffinit ab Arist. 4. me-
theo. quod est passio humidi aquei à frigidityte forti
per quod humidū aqueū, qd est terminabile termino

alieno per frigiditytē induraf, et sic terminabile termi-
no proprio. Cōdensatio uerō nihil aliud dicit nisi mi-
norationē quātitatis materia nō diminuta. Est enim
densum cuius partes propinquę faciūt, & taliter nō su-
mit hic. Secundō accipit ab Auicē. pro tetano siue pro
cōgelatione materię humidę in neruis sicut accidit in
neratibus per loca frigida ex qua nerui tetanant, & ta-
liter nō sumit hic. Tertiō accipit à Ga. 2. interiorū ca.
2. pro impedimēto operatiōis, & taliter nō sumit hic.
Quartō sumit ab eodē quarto de accidēti & morbo
pro stupore, & taliter non sumitur hic. Quintō ut hic
sumit pro ēgritudine partis postterioris cerebri, quę
est mala cōplexio frigida & sic, per quam spūs sūt in-
mobiles, & nerui inflexibiles auferēs sensum & motū
uoluntarium, aut notabiliter impediens. Licet Io. Se-
rap. dicat hanc esse oppilationē in posteriori uentricu-
lo cerebri, ex qua auferit sensus & motus uoluntarius,
& hoc modo erit morbus officialis, dic ut liber. Ha-
ber enim nomina multa. A Rasi hic dicit cōgelatio-
nem ab Auicē. Prima tertiū dicitur suchos, est enim species
cōgelationis. 2. Aphor. com. 3. dicit catalepsis Gręcē
quod est detētio Latine. A Serap. cap. allegato dicit
catharas. Et quarto interiorū uocatur catechos ex his
manifesta sunt quid nominis & quid rei cōgelatiōis.

Cum aliquis quasi dormiēs iacet, &
nō mouetur, et licet sint oculi aperti
palpebras tamē nō mouet, cōgelatus est siue
rigidus. Curādus est uerō ex medicinis sub-
eth. Hoc tamē addito ut oleū sambacinū su-
per caput fundatur, et in omni li. eius sit un-
ctiua una euphor. Ipsum quoq; caput ex casto-
reo et euphorb. et oleo sambacino liniatur.

Diuidit præſens ca. in duas partes. Primō. Rasis de-
terminat de cōgelatiōe theoricē, Secundō practicē, secū-
dū ibi. Curādus uerō erit. De prima parte dicit. Cū a-
liquis iacet quasi dormiēs & nō mouet, et supple neq;
sentit, et licet oculi sint aperti, palpebras tamē nō mo-
uet, neq; etiā oculos. Sūt enim eius oculi fixi quasi in-
ruētes in unū locū, hic est cōgelatus siue rigidus. De se-
cūda parte dicit, qd hic curādus est ex medicinis sub-
eth cū oporteat ipsum fortiter caleſieri, licet nō adeo
exiccari. Et propterea uitet acētū quod concedebat in
subeth. Et laudat oleū sambacinū. i. ienseminū calidū
et siccū in 2. cui pro una quoq; Tb. admisceat euphor-
bij 3. i. quod est calidū in quarto, euphorbiū quoq; et
castoreum permixta cū oleo sambacino est medicina
propria attingēs ferē usq; ad quartū gradum, quę in
modū linimēti capiti est applicanda, aut si uis maio-
rem impressionem infundantur petiæ lineæ in ea, &
applicentur maximē cerebro posteriori.

Duplex est congelatio. Debilis, in qua nō cōfertur
omnino sensus et motus uoluntarius, de qua dicit Se-
rapio cap. allegato, quod habens eam doler in cere-
bro anteriori. Alia fortis omnino auferēs sensus in-
teriores & exteriores et omnē motum uoluntarium.
Credo tertiam speciem in qua aufertur aut minuitur
sensus & motus uoluntarius omniū partiū corporis

præterquam partium faciei, cum nocumentum per essentiam sit frequenter solū in ventriculo posteriori.

Causæ primitivæ sunt frigiditas æris excessiva sicut tempore hiemali, & maximè cum statu uetorum septentrionalium. Et pluvia frigida cum impetu obuians capiti, propriè parti posteriori, nec non potus aquæ frigidissimæ grossè latentis in puteis profundis in quantitate sumpta, & propriè stomacho ieiuno, & maximè post coitum, Exercitium aut balneū nec non usus ciborum præbentium nutrimentum grossum, frigidum, & multiplicantium melancholiā naturalem, aut per congelationē genitam, aut phlegma uitreum, sicut sunt fungi, melongia, lentes, pisces nominatus torpido, imo hic congelat manus piscatorū solo tactu. Et fortè odor argenti uiui, cerusæ aut opij, & similium causeret hanc passionem. Et fortè poëtæ fingentes homines uidentes caput Medusæ faxificari uolebant ipsos incurrere hanc passionem ex qua sūt immobiles. Et extrasis quam quandoq; incurrunt homines circa aliquod obiectum attentissimè speculantes, est dispositio huic similis, sunt enim immobiles semiclausis oculis in unum locum intuentes, licet nō uideant, neque audiant propter animæ fortem conuersionem ad aliquid speculandum. Nam attentis fortibus imaginationibus delata sub oculis nō uidemus, secundo de anima.

Causæ corporeæ per communitatem sunt uapores frigidi melancholici, aut à phlegmate uitreo eleuati, aut à toto sicut in empiala & liparia, aut in febre syncopali humorosa, aut in quartana, & hi uapores nō sunt putridi, licet fortè à caliditate putredinali sint eleuati, aut eleuantur ab aliquo membro particulari, sicut splene, mirach, stomacho, intestinis qui ad caput uenientes, & propriè ad partē posteriorem quæ frigidi or est, spiritus cōgelant & neruos reddūt inflexibiles.

Causæ uerò corporeæ per essentiam in cerebro sunt melancholia naturalis, aut genita per cōgelationem, & similiter phlegma uitreum congelans spiritus, opilans, uentriculum posteriorem, aut fortè mala complexio fortis frigida & sicca sine materia impressa ab alia causā primitiua cum dispositione cerebri ad huiusmodi passionem.

Signa uerò prognostica sunt dispositio passī, quia est corpus exanguē melancholicum frigidum, tam cōplexionaliter quā ex ætate. Signa uerò demonstratiua sunt quia est sine sensu & motu uoluntario, uel multum in his diminutus propter spirituum congelationem, uentriculi posterioris opilatione, stat oculis apertis, palpebris contractis humido ipsarum exiccato, in cæteris membris stat sicut erat cum incurrat passionem, quia nerui sunt congelati facti inflexibiles, ideo totum corpus est frigidum & inflexibile, unde stat oculis apertis fixis, ac si in unum locum intueretur, & ex his patet differentia inter ipsam & apoplexiā, quia licet ambe priuentur sensu & motu uoluntario, tamen apoplecticus stat oculis clausis nec membra ipsius sunt frigida immobilia, & facies apoplectici est magis similis suæ naturali faciei, congelati uerò magis tendit in pallorem cum nigredine propter calidi extinctionem differt ab epileptico, quia epilepsia est cū moribus spasmosis, hic sine motu, nec stat cum oculis apertis. Differt etiam à syncopi, quia in syncopi est facies sicut mortui, sed non in cō-

gelatione, & in syncopi pulsus est cadēs, diuersus, inordinatus: hic uerò satis æqualis, & in syncopi non stat oculis apertis, neq; corpus est rigidum sicut in cōgelatione. Differt à præfocatione, quia præfocata audit & sentit & stat oculis clausis, & est facies sibi consueta, neq; corpus est rigidū, sed in congelatione sunt his contraria. Differt à subeth & lithargia, quia subethicus & lithargicus stant oculis clausis, quos tamen aperiunt si cū clamore uocentur, sentiunt, mouentur & loquuntur. Et in lithargico est feb. hic uerò ad sunt istorum contraria, & in subethico & lethargico pulsus est magnus undosus, mollis, latus: hic uerò nō multum magnus, strictus & durus. Differt à tetano, quia tetanatus audit & uidet, & exercet sensus interiores, hic uerò nō. Signa causarum ex dictis superius in soda, aut apoplexia sunt satis nota & manifesta.

Prognostica. Si congelatio est fortis, cura est impossibilis. Si debilis cura est possibilis, sed non apud negligentes.

Cura. Primò si pendeat à frigiditate rerum exterius occurrentium, tunc illæ amoueantur. Secundò nocumētum per illas impressum à contrarijs abijciatā interius q; exterius applicitis, unde exterius capiti & toti corpori obuiet aer calidus, & panni calidi, & capiti, & toti corpori applicentur, necnō medicinae in textu descriptæ, & interius si fieri possit, detur aqua uitis, aut confectio anacardina, aut theriaca, mithridatum, diambra, diamasum, & similia. Tertiò excitetur cum diuersionibus & clamore, quæ etiam iuuant ne fiat materialis. Si uerò sint interius sumpta sicut fungi. Primò ipsorum uomitus exquisitè prouocentur. Et si quid superest cum lenientibus & lauatiuis educatur, fiant quoque clysteria satis acuta horum educatiua. Secundò cerebrum & membra nobilia confortentur cum theriaca & mithridato, & similibus. Tertiò, bezabartica propria contra unūquodque uenenum exhibeantur. Si uerò fuerit per communitatem procedatur cum intentionibus quinque curatiuis dictis in capitulo de soda. Si uerò pendeat à materia existente in cerebro melancholica, aut phlegmatica uitreā, quinque requiruntur intentiones, scilicet, euacuatio, diuersio, approximatio localium, correctio accidentium, & regimen non naturalium. Si materia fuerit phlegmatica euacuetur cum clysteribus & medicinis dictis in capitulo de apoplexia. Et similiter fiant eodem modo diuersiones quæ in apoplexia phlegmatica præcipiuntur. Si uerò sit melancholica sicut est secundum plurimum, fiant clysteria acuta cum decoctione huiusmodi. s. polipodij, epithimi. añ. ʒ. i. ellebori nigri, ʒ. s. stecados arabici ʒ. ʒ. senæ. ʒ. s. salis indi. ʒ. s. alias, ʒ. i. bulliāt in 4. lb. aq. ad consumptionem medietatis. Sed epithimum ponatur in fine, & de hac colatura imponatur ʒ. ʒ. quibus si opus est acutere magis addatur hieralogodion, aut hiera diacolocynthidos, aut hiera hermetis, alicuius istarum ʒ. i. uel ʒ. s. Medicina quoq; digestiua & euacuatua sumantur sicut dicitur in cap. de melancholica, & dictum fuit in cap. de soda melanch. & fiant diuersiones, quæ præcipiuntur in apoplexia & præcipue fiat sternuatio cum elleboro nig. Tertia uerò intentio perficitur cum medicinis localibus dictis in textu. Aut si uis facere fomentum, aut embrocā decoque stecadem arabicum, senam assarum, bu-

glossam

glossam usque ad euphorbium & sinapim in aqua & spongia in hac decoctione infusa, & optimè expressa sepe capiti applicet, aut permittatur ex alto cadere super comillura posteriori. Et in his medicinis semper adde folia & flores iensenini: sunt enim propria, nec hic cōpetunt reperculsiua, quia humor est nimis grossus & indigens multa calefactione. Si quod accidens est sicut urinae retentio corrigat sicut saepe dictum est. Regimen autem non naturale declinet ad calidum & siccum in phlegmatica, sed in melancholica ad calidum & humidum, quæ ex dictis superius & dicendis in capitulo de melancholia facile comprehendī possunt.

DE PARALYSI. CAP. IX.

Paralysis Græcè, resolutio Latinè. Et quādoq; sumitur communissimè pro nocumēto in sensu & motu, scilicet ablatione, aut diminutione, unde cūque proveniat, non hic ita sumitur. Sic enim accepta dicitur de apoplexia & congelatione & similibus. Cōmuniter uero accepta conuertitur cum mollificatione, de qua est sermo apud Auicē. cap. de paralyti, quæ est ablatio aut diminutio in sensu & motu uoluntario, aut mixto, aut saltem in motu in aliqua corporis parte, non in toto. Si enim esset in toto, esset apoplexia. Et ex his patet quod mollificatio siue mollioritas non sumitur hic pro qualitate secunda insequente humiditate. Paralysis autem propriè sumpta est ablatio aut diminutio in sensu aut motu uoluntario, aut mixto secundum alteram medietatem corporis dextram aut sinistram.

Cum aliquis se mouere nō ualeat, aut unum uel plura ex membris mouere non potest, atq; eorum sensum amisit, ipsum paralytū ipsius membri, aut ipsorum membrorum incurrisse pronunciamus.

Diuiditur præsens capitulum in duas partes. Primò ponit signa paralytis. Secundò curam. secunda ibi cuius curam. De prima parte quid dicat satis est ex dictis manifestum, maxime ex diffinitione paralytis.

Iam ad species ueniendum. Prima distinctio. Paralytis cōiter accepta quadruplex est. Quandoq; enim est in toto exceptis partibus faciei quæ habet sensum & motū à neruis orientibus à cerebro & nō à nucha. Quandoq; est in omnibus partibus faciei. Quandoq; solum in altera medietate dextra scilicet aut sinistra. Quandoq; in membro particulari intrinseco aut extrinseco. Paralysis autē propriè accepta quæ est in altera medietate. Quandoq; est in tota medietate, scilicet à medietate uerticis capitis usq; ad pedē. Quandoq; solum à ceruice infra nullo existente nocumēto in partibus faciei. Secunda diuisio. Paralysis. Aut est cum totali ablatione sensus & motus in parte læsa. Aut sola diminutione ipsorum. Aut tertio cum nocumēto solum motus. Tertia diuisio. Quælibet istarū. Aut fit incipiendo, aut permutando ex alia egritudine, sicut ex apoplexia, epilepsia, cholica, febribus, pleureti, & similibus. Quarta diuisio paralytis, quædam est materialis, quædam immaterialis, sicut pendens à frigidityte, humiditate, solutione cōtinui, desiccatione,

Causa paralytis immediata, aut est mala complexio partis paralyticæ lapsa per calidum, siccum, frigidum, aut humidum. Licet mala complexio calida & sicca, nisi multū exceserit raro impediatur sensum aut motum, cum uideamus hecticos non impediri in sensu aut motu: uerum omnis mala complexio cum excedit deicit actum propriæ uirtutis. Sed mala complexio frigida & humida faciliè sensum & motum impedit, cum per frigiditatem sit contraria spiritui, & sensum stupefaciat, & per humiditatem neruos relaxet, unde sunt impotentes ad motum. Aliquando causa immediata est nocumēto in spiritu uitali aut animali, aut quia nimis crassus aut mala qualitate affectus manifesta uel occulta, aut nimis paucus unde est ineptum instrumentum ad sensum & motū, aut quia non transit ad membra propter nocumēto in uis transitis. Hoc autem nocumēto aut est solutio cōtinui maxime secundum latitudinē, quia secundum longitudinem raro impedit transitum spiritus. Aut est consolidatio post solutionem auferens porositate nerui in loco cōsolidationis, aut arteriæ, non enim hæc membra spermatica restaurantur per uiam primæ intentionis & omnino sicut erant, nisi forte in infantibus. Secunda causa prohibens transitum spiritus est oppilatio, quæ si est in cerebro, aut est in tota medietate dextra trium uentriculorum, & sic fiet paralytis à uertice capitis usq; ad pedem dextrum, & tunc erit impedimentum in locutione. Aut erit in tota medietate sinistra, & fiet paralytis totius lateris sinistri. Aut erit oppilatio solum in uentriculo posteriori secundum partem dextram aut sinistram, et fiet paralytis lateris dextri aut sinistri à ceruice infra cū incolumitate partium faciei, quia oppilatio cōmunicat solum unī medietati nuchæ, quæ diuisa est in duas medietates secundum longitudinem usq; ad caudam mediante panniculo subtilissimo male per uisum discernibili, quod rationale est, quia oritur à duabus medietatibus cerebri sic diuisi. Si uero oppilatio erit in toto uentriculo posteriori absq; oppilatione anteriorum uentriculorum, uel solū erit in ambabus partibus principij nuchæ, tunc paralytis erit in ambabus partibus, dextra & sinistra cum incolumitate partium faciei, licet curis capitis sit stupida cum recipiat sensum à neruis orientibus à ceruice. Similiter si fuerit oppilatio in cerebro anteriori & medio secundum partem dextram aut sinistram, erit paralytis in parte dextra aut sinistra faciei cum incolumitate residui corporis. Rarissime tamen contingit quod sit oppilatio in omnibus originibus septem parium neruorum à cerebro orientium quin comitetur alia egritudo, sicut epilepsia & similis. Si uero oppilatio est in nucha non in origine sua, sicut in dislocatione spondilis cum attritione nuchæ aut ruptura, ita ut dislocatio sit quasi angularis, non secundum figuram semicirculi sicut in gibbis, tunc fiet ablatio sensus & motus & paralytis fortissima in omnibus membris infra dislocationem. Et si erit una ex spondilibus colli satis citò morietur prohibita pectoris dilatatione. Et si est ex spondilibus infra pectus aderit impotentia retinendi urinam & feces, & ipsas expellendi. Si uero oppilatio sit in neruo particulari impediatur sensus & motus illius membri cui deseruit. Et similiter si fuerit à materia deferente spiritum uitalem.

Causæ

Causæ uerò remotiores primitiue sunt sicut percussio, casus, & offensus super capite, unde cranium super cerebrum comprimitur, nec non spōdiles dislocantur, & nervi scinduntur aut rumpuntur. Similiter arteriæ deferentes spiritum uitalem, cuius absentia non solum est causa paralytis, imò etiam mortis membri. Similiter frigiditas extrema aëris obuians capiti congelans spiritum, aut oppilans oppilatione attenuatoria. Similiter humiditas multa remolliens, faciens cadere unum parietem super alterum. Similiter crapula, ebrietas replens caput, & cerebrum debilitans, uinum enim potens multum transiens indigestum ad neruos acetosatur in eis, acetum quoque acuitatem nocet, potus aquæ congelatæ, somnus super repletionem, retentio euacuationum consuetarum, multus coitus, nimia quies, motus laboriosus, sicut extensio, constrictio & similia, accidentia animæ molesta sicut timor & tristitia.

Causæ uerò corporeæ antecedentes & etiam coniunctæ sunt humores superflui phlegmatici, sanguinei, licet phlegmatici ut plurimum sint in causa. Signa uerò pronostica sunt ista. Primum dispositio corporum frigidorum & humidorum, nec non calidorum & humidorum cum plurimum repleta sunt, & propriè in ætate decrepita, & maxime in hyeme, aut in uere multum humido. Secundum pronosticum. Urina infantis uiridis pronosticatur paralyticum. Arguit enim frigiditatem & phlegmatis abundantiam, uerisimiliter læsi sunt nerui infantium debiles. Tertium. Stupor & tremor perseverans pronosticatur spasmodum uel paralyticum secundum plurimum secundum differentiam materiæ crassæ, magis factiue spasmi, aut subtilis magis factiue paralytis. Quartum. Lassitas membrorum, diminutio in sensu & motu, sunt uia in paralyticum.

Signa demonstratiua sunt signa Rasis posita in textu. Et superius exposita scilicet nocumentum diminutionis aut ablationis sensus & motus solius. Pulsus paruus, tardus et rarus, sed uirtute debilitata sit frequens. Et eueniunt ei uicissitudines sine ordine, id est, quod aliquando frequens est magis, aliquando minus secundum uarium uirtutis conatum. Et urina secundum plurimum fit in eis alba, materia repente ad locum paralyticum. Et quandoque fit ualde rubea propter renum debilitatem in discernendo sanguinem ab aquositate, aut propter paucitatem eius, aut debilitatem uenarum quæ sunt post epar ab attractione sanguinis, aut propter dolorem, aut aliam egritudinem, quapropter non oportet ut ex rubedine urinae arguatur dominium sanguinis, & phlebotomiam esse faciendam. Signa autem causarum sunt, quia si est à casu, percussione, constrictione, ipsa eam significant, & nocumentum ex ipsa derelictum. Quandoque tamen occultatur cum neruus est profundus. Ipsam ergo significat quod subito accidit, & non confert ei curatio. Signa uerò distinctiua causarum extrinsecarum habentur ex narratione infirmi uel astantium. Si uerò causæ fuerint intrinsecæ, tunc si fuerit mala complexio, signa habentur ex tactu, quia representatur tactui caliditas, frigiditas, mollities uel asperitas, quod etiam æger percipit. Cognoscitur etiam ex iuuantibus & nocentibus, & quod facilis est curatio, & ex precessionem causarum imprimendum illam malam com-

plexionem. Ad hoc etiam adiuuat complexio membrorum ægri, complexio totius, habitudo, regio, ætas, tempus, regimen præcedens. Signa uerò humorum peccantium sunt hæc eadem & quæ superius dicta sunt in cap. de soda. Si uerò fuerit ab apostemate adhiuncta apostematum calidorum aut frigidorum aut mixtorum. Paralytis uerò cretica succedens alijs egritudinibus cognoscitur per præcessionem illarum, & quod diminuantur aut auferuntur facta huiusmodi permutatio.

Prognostica. Primum paralytis ex frigiditate & humiditate, sine materia est, ex his quibus facile est succurrere cum calefactione. Secundum. Quodcumque membrorum mollificatorum secundum colorem reliqui corporis existens, aut sibi naturalis non minoratur nec extenuatur, est de quo maior fiducia est habenda, sed in contrario contrarium iudica. Tertium. Paralytis subito eueniens à dislocatione spondilium, & propriè ad interiora, aut à solutione continui secundum latum non recipit curam, quæ uerò fit à solutione secundum longum, aut ab istu non conterente neruos uehementer quodque sanatur. Quartum. Paralytis fortis est quasi curæ impossibilis, debilis uerò non facile sanatur. Quintum. Tremor & dolor in paralyti superius, bonum. Sextum. Cum paralytis transiit annuum, secundum plurimum non recipit curam.

Septimum. Ex prohibitione spiritus eueniens est difficilioris curæ quæ proveniens à mala dispositione spiritus, licet illa quæ fit à corruptione spiritus si multa sit uix recipiat curam. Et quæ fit ex prohibitione spiritus uitalis est deterior, cum aufert uitam simul cum motu, & à fortiori causa provenit, quia uia sunt latiores scilicet arteriæ quàm nerui. Octauum. Paralyticatur unum membrum magis quàm aliud, quia magis debile, aut quia uias habet latiores, aut quia suppositum parti cerebri, aut nuchæ quæ magis patitur est. Nonum. Latus paralyticum si est frigidissimum & sanum calidissimum, malum, significat enim conuersionem omnium spirituum ad latus sanum, & ipsorum paucificationem in latere ægro. Unde partes aquæ & terræ dominantes in mole deducuntur ad frigiditatem actualem, & ex hac causa macrescit latus paralyticum, & uariæ pulsus in eo à pulsu lateris sani, secundum frigiditatis dominium. Et oculus lateris paralytici minoratur ex eadem causa, scilicet debilitatis uirtutibus naturalibus. Ex his patet quare aliquando auferitur motus & non sensus, aliquando e contrariò, nam spiritibus paucificatis citius auferitur motus quàm sensus. Et si fiant per diuersos neruos stat unum lædi sine altero. Et tertio hoc fiat secundum quod temperamentum pro uno magis corrumpitur quàm pro alio, sicut lapsus ad humidum magis imperfecit motum & e contrariò lapsus ad siccum magis impedit sensum. Cura

Cuius curæ incipimus pilulas foetid. quas compositui dādo, quæ recipiunt pulueris picræ drach. 10. colocynthis interioris drach. quinq; eupho. drach. 2. et semis, castorei, piperis, assæ foetida sagapeni. opop. sceitaragi indi. sinapis, oīum ana drach. 1. centauræ minoris, elaterij, ambarū ana. drach. 5

gummi

gummi in succo rutæ dissoluantur, & alia ex eis conficiantur, & fiunt pilulæ. Et fiunt ex eis decem potiones.

Diuiditur præsens pars in duas partes. In prima ponitur curam paralysis phlegmaticæ. In secunda curam paralysis ex percussione & casu. secunda ibi. Quod si paralysis. Prima in quinque. Primo ponit curam per uentris solutionem. Secundo per dietam. Tercio per medicinas locales. Quarto per medicinam sumptam per os resoluentem, scilicet confectionem anacardina. Quinto ponit quid faciendum sit si hæc non sufficiant. secunda ibi. Quarum una postquam, tertia ibi. Membra quoque eius, quarta ibi. Diebus uero quibus, quinta ibi. Quod si sumptum. De prima parte dicit, quod tu debeas incipere curam exhibendo pilulas fortidas quas ipse composuit etc. 2. pulueris picre. id est, amaræ, & est hiera simplex, de qua superius dictum calid, & sic. in secundo, soluens magis phlegma quam choleram, & propriè à capite & satis leuiter. 3. decem, euphorbij, colocynthidis, castorei, assæ quæ superius dicta & declarata sunt. Sagapeni, calid. in secundo, sic. in tertio. Gummi fati notum, & est in medicina cataractæ. Oppoponacis calid. & sic. in tertio. Scitaragi, id est, thapsie, & est herba similis nasturtio calid. & sic. in fine secundi, omnium ana. 3. 1.

Centaureæ minoris. Elaterij, & est succus cucumeris asinini, calid. & sic. in tertio, & multum ualet in ascite sublimatum, & in pilulas redactum cum correctiuis suis, est enim potentissimum ad educendum aquam. Gummi dissoluantur in succo rutæ quæ est calida & sicca in secundo, proprius in aegritudinibus capitis & neruorum, & subdit quot sunt decem potiones. Sed notate quod unaquæque potio erit. 3. 3. cum dimidia, & temporibus nostris est nimis excellentia medicina, quam corpora nequeunt tolerare. Sufficeret enim 3. 1. est enim euphorbium fortissima medicina, cuius dosis est Kirat. 1. usque ad 3. & Kirat est 4. gran. hordei. Et pro unaquaque potione de hoc, sola ingrediuntur gran. quindecim. Similiter de colocynthide calid. & sic. in tertio ingrediuntur in unaquaque potione gran. 30. cuius tamen dosis est à Kirat. 6. usque ad decem. Assa uerò est calid. in principio quarti, sicca in secundo. Et Galenus existimauit ipsam aliquantulum solutiuam, sed certum est quod ipsa confert solutioni antiquæ frigida. opponacum calid. & sic. in tertio & soluit phlegma. Similiter Sagapeni soluit phlegma & aquositate. unde si fiat computatio sufficeret. 3. 1. huius potiois.

Quarum unam postquam æger sumpserit per tres dies quiescat. Et nutriatur tunc cum aqua ciceris & oleo & sinapi. Et dein de bibat aliam potionem quod postquam ter fecerit, per aliquot dies quiescat. Et nutriatur carne frustatim incisa, & in sartagine fixa, & mutagenath in quibus sunt species calide, ut piper & his similia. In potu uero sumat hydromel.

Hic curat per dietam, dicens quod postquam æger sumpserit unam istarum potionum quiescat per tres dies ab omni alia medicina solvente nisi forte acciperet aliud quod dyltere. Et interim nutriatur aqua ciceris condita cum oleo. Est enim mos regionis suæ omnia cibaria ferè condire cum oleo. Et parum sinapis possit admisceri loco aromatum ut cibus sit calidior magis proprius contra phlegma. Et in fine trium dierum sumat aliam potionem ex superscriptis. Et sic post triduum sumat aliam & interim nutriatur, ut supra. Deinde post quiescat à medicinis solutiuis per aliquot dies, ut uerbi gratia, per hebdomadam, & interim nutriatur carne frustatim incisa et in sartagine fixa, sed sit caro leuis ut auium, et mutagenath qui sunt cibi ex carnibus minutissimè incisis, & cum speciebus conditis. Sed species in hoc casu sint piper, zingib. nux muscata et similes, quia nutrimentum debet esse calidum & siccum actu & potentia, quapropter uitentur brodiaia & quæ declinant ad frigidum & humidum actu & potentia, nisi aliqua de quibus infra. In potu uero sumat hydromel. Cuius hæc est descriptio, ut octo partes aquæ admisceantur uni mellis, & bulliant ad consuprionem tertiæ partis, & coletur. Cuius laudes sunt eximie in omnibus aegritudinibus frigidis capitis & neruorum.

Membra quoque eius ex oleo costino inungat. Quod recipit costi unciam unam, castorei unciam mediam, piperis, euphorbij pyrethri, omnium trium ana tertiam unciam unius. Dissoluantur omnia in media libra olei Keiri, aut de narcisco, & utere eo.

In hac tertia parte docet membra paralitica inungi, sed multo magis origines neruorum scilicet posterius cerebrum, & totam nucham cum oleo costino. Cuius hæc est descriptio. Recipe costi. 3. 1. piperis, pyrethri, euphorbij, ana tertiam. 3. 1. castorei. 3. 3. & dissoluant omnia in media lb. olei de Keiri aut narcisco. Keiri secundum quosdam est uiola omnis mensis, & apud Auic. non est capitulum de ipsa, sed apud Serapionem est. & Dioscorides uocat eam leucoion calidam & siccam in secundo, & est reletutiua tumorum, prouocat menstrua, sanat ragadias, & ualet podagris & c. pud Simonem est planta cuius sunt tres species, una habet flores albos, altera purpureos, altera citrinos quæ est similiter calid. & sic. Narciscus secundum Dioscoridem est bulbus emeticus, siue ut latini bulbū domesticum, multililium dixerunt, folia similia porro habet, sed minora, hastam duarum palmarum, sine folijs, flos est illi albus in gyro, & in medio croceus aut purpureus, radicem habet rotundam calid. siccam in secundo, proprius in passionibus neruorum. Reliqua nota sunt.

Diebus uero quibus quiescit danda sunt quoque die drach. 2. de anacardino, quod recipit zingib. pyrethri, nigellæ, costi, melanopiparis, macropiperis, oggi, omnium ana drachmas decem, myrrhbus, rutæ sicca

siccæ, assæ foetidæ, aristolochiæ, baccarum lauri, castorei, sceitaragi indi, sinapis, gentianæ, omnium ana, drach. quinqs, mellis, anacardi, drach. quinqs, ungantur cū oleo nucum & cum melle cocto conficiantur, hoc enim medicamen ualde confert paralyfi, apoplexiæ, torturæ, tremori, morphææ, morsib. scorpionis, & omnibus passionibus frigidis, & spasmo humido. Quod cum sumitur ilico prouocat sudorem, & infert febrem.

In hac quarta parte administrat quaq; die 2. 3. anacardinae confectionis, quod recipit zingib. pyrethri, costi, nigellæ, melanopiperis, id est, nigri piperis, macropiperis, id est longi piperis, quæ omnia sunt superius declarata, oggi alias ozi, id est, sem. petroselinæ, calid. & sic. in secundo. omnium ana 3. 10. myrrhæ, rutæ sicæ, assæ foetidæ quæ supra fuerunt declarata, aristolochiæ calidæ in tertio sicæ in secundo, castorei calid. & sic. in quarto, sceitaragi, id est, thapsiæ similis nasturtio, acuta, aperitiua, calidæ similiter in fine secūdi, sinapis calidi in quarto, gentianæ calidæ in tertio, sic. in secūdo, ana. 3. 5. mellis anacardi calid. & sic. in quarto. Anacardus est fructus arboris qui pediculus elephantis à quibusdā uocatur, ungatur cum oleo nucum, calid. in tertio, sic. in secundo, & cū melle cocto conficiantur. Hoc enim medicamen ualde cōfert paralyfi, apoplexiæ, torturæ scilicet oris, tremori, albaras, & est species morpheæ, morsibus scorpionis, & omnibus passionibus frigidis, & spasmo humido. Quando autem sumitur, ilico prouocat sudorem, & ilico infert febrem, quapropter ualet ad resolutionem causæ coniunctæ paralyfis. Et debet sumi cum 1. aut. 2. 3. hydromel.

Quod si sumptum non affert sanitatem, æger ab omni medicamine per decem dies abstineat, excepta dieta, deinde ad ipsius curam redeundum.

Ponit in hac quinta parte quid faciendum est cum suprascripta non suffecerint ad curam, dicit esse abstinendum ab omni medicamine per decem dies excepta dieta, deinde ad ipsius curam redeundum, scilicet ordinatè sicut dictum est. Ex quo collige in omni ægritudine maximè in chronicis esse faciendum interpolationem medicinarum, ne ægrum tedeat, & abominationem incurrat ex tam cōtinuo usu medicinarū.

Quod si paralyfis ex percussione aut casu euenerit, & accidit subito, ita quod nervi æqualiter contundantur, taliter permanebit, nunquam enim sanabitur. Quod si non repente ex prædictis, sed paulatim & molliter inuaserit, loco percussione emplastrum hoc est apponendum, quod recipit farina

nam fœnu græci, semen beben, semen mahalech, semen reusini, bdellium, ammoniacum, adipem anatis, ceram, oleum de lilio. Ex his fiat emplastrum & superponatur.

Hic docet curare paralyfim ex percussione, dicens quod si subito accideret, taliter permanebit & nunquam sanabitur, quapropter uanum est laborare in eius curatione. Licet in ætate infantili cura sit possibilis, cum membra spermatica possint in ea ætate secundum quod erant primo, restaurari. Quod si non repente sed paulatim inuaserit cura est possibilis, cum tunc proueniat ex decursu humorum ad locum qui deinceps possunt resolui. Applicat ergo loco percussione emplastrum quod etiam origini neruorum est applicandum, cuius est hæc descriptio. 3. farinam fœnu græci, calidit. & sic. in primo, exempli gratia 3. 2. sem. beben calid. in primo, sic. in secundo, sem. mahaleb, id est, medulla cerasi syluestris cal. & sic. in primo, sem. reusini, id est, pentadactyli quæ est cataputia maior siue sponsa solis calid. & sic. in tertio, licet alia species minor sit calida & sicca in quarto, ana 3. 2. bdellij calid. in primo & sic. in primo, ammoniaci calidi in fine tertij & sic. in primo ana 3. s. adipis anathidis, olei de lilio ana quantum sufficit ad bene impinguandum, ceræ quantum sufficit ad debite inuiscandum, misce. Sed nota hanc medicinam debere administrari uulnere iam consolidato, aut contusione remota, paralyfi remanente, licet etiam stante contusione conferat.

Cura paralyfis. Ante omnia tria sunt consideranda & attendenda in cura paralyfis spasmus, stupor, tremor, & saltus. Primum, ut non properemus in principio ad usum medicinarum fortium, digredientium, euacuantium, & diuertentium. Sed incipiamus à leuibus, gradatim ad fortiora procedendo. Quæ fortia non sunt applicanda in paralyfi leui nisi post quartum. In media post septimum. In forti post 14. Secundum, ut medicinæ quæ applicantur sint propriæ in huiusmodi dispositionibus confortantes cerebrum & neruos per uirtutem primam, secundam, tertiam, & quartam. Et similiter iuxta posse sint cibaria. Tertium, ut medicinæ locales applicantur origini neruorum scilicet nuchæ, & inde orientibus. Si uero fuerit in partibus faciei applicantur circa secundum aut primum uentriculum. Et similiter applicantur membris paralyticis etc. Si ergo paralyfis pendeat à causa primitiua, ut à frigore & similib. præterq; à percussione. Prima intentio sit remotio causæ primitiue, & nocumenti eius. Secunda prohibitio humorum à lapsu. Tertia correctio accidentium. Quarta debitum regimen sex rerum non naturalium, quæ ordinatè infra ponentur.

Si uero paralyfis sit phlegmatica sicut est ut plurimum, sex requiruntur intentiones. Prima digerit. Secunda euacuat. Tertia diuertit. Quarta causam coniunctam resoluit. Quinta corrigit accidentia.

Sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Et ego docebo simul plures istarum intentionum perficere. Ponamus ergo quod hæc paralyfis sit fortis, ut sit exemplum alijs.

Prima

Prima die paralyſi nihil medicinale faciendum eſt. Niſi forte dyltere leue ex brodio pulli cū uncia una ſachari rubei & pauco ſale, ſi uenter ſtriſtus ſit. Aut fiat ſuppoſitorium, & eadem die non comedat neq; bibat, niſi forte apud neceſſitatem ſumere aliquid hydromellis. Secunda die ſumat pro digeſtiuo, & par tim cedat loco cibi hydromel bis aut ter exhibitum in quantitate quatuor unciarū pro uiſce, & nihil aliud comedat, niſi forte ſi eſſet puer aut aſſuetus multæ co meſtioni poſſet dari aliquid modicum panatæ ſubtilis, in qua eſſet ſaluia, ſcilicet minutim incifa, & cocta, & hoc ſemel tantum in die naturali. Et nihil aliud fiat medicinale, niſi forte dyltere, de quo ſupra, aut ſuppoſitorium. In tertia die ſumat pro digeſtiuo a quam ſaluia cum melle roſ. aut cum æquali quantitate hydromellis. Aut hydromel in quo decocta ſit ſaluia, ſtecas arabicum, roſmarinus. Aut ſimiles nō multū calidæ, aut aperientes non multum. Et eadem die nihil aliud comedat aut bibat niſi panatā de qua ſupra, aut ouum unum cum ſaluia mixtum ſemel aut bis. Et poſt ſex aut octo aut decem grana pini præparata, & fiat dyltere, de quo ſupra. In quarta die ſimiliter regatur, ut in tertia, ſed in quinta ſexta & ſeptima ſit idē regimen cibi & potus de quo ſupra. In his diebus ſingula die fiat dyltere ſi opus ſit ex decoctione ſaluia, hyſſopi, ſtecos arabici ana M. unum, agerici, unciam ſemis, ſalis gemmæ drachmas duas, decoquantur in quatuor ℥. aquæ ad conſumptionē medietatis, & ex una ℥. huius decoctionis cum tribus uncis olei fiat dyltere. Digeſtiuum uerō ſit hydromel, de quo ſupra poſſet tamē addi aliquid oxymellis ſimplicis aut compoſiti, ubi uerō eſſet aſſuetus multiplici coſeſtioni, ſicut pueri, interdū detur aliquid huius confectionis, cuius eſt hæc deſcriptio. ℞. ſachari ʒ. 4. liqueſcat cum aqua ſaluia inſuſionis cinnamomi, nucis muſcatæ & zingib. & fiat manus Chriſti, uel detur parum huius electuarij. ℞. ſaluia recentis minutim incifa, & cum melle quantum ſufficit, fiat electuarium optimè deſpumando mel. Octauo uerō die ſumat. ℞. duos, pilularum de hiera ſimplici cum ſcrupulo uno agerici præparati in oxymelle ſcyllitico, ex quibus ſiant pilulæ ſeptem, & exhibeantur in mane, & taret prandium per ſex horas poſt. Et ſi uideretur debilis poſſet dari aliquid carnis, aut aues par uæ aſſatæ, aut aliquid ſimile in parua quantitate. Et ſemper in fine menſæ dentur grana pini præparata aut conſecta. Et hoc regimen uitæ continuetur uſque ad quartumdecimum diem, dando in cibo ea quæ dicta ſunt, & in potu ſolum hydromel, & abſtinere ſuper ſamem & ſitum eſt propria cura huius ægitudinis. Sed pro digeſtiuo in hoc tempore ſumat hydromel, de quo ſupra, cui in decoctione poteſt addi aliquid modicum cinamomi, zingiberis, aut nucis muſcatæ, ut. Recipe ſaluia, iuæ, ſtecos arabici ana manipulum unum, rutæ, maioranæ, ana M. s. mellis, ℥. s. aquæ, ℥. 4. cinamomi. ℞. duos, zingib. nucis muſcatæ ana ſcrupulum unum, bulliant ad conſumptionem tertiæ partis deſpumando, & colentur. Et poſſet etiam addi oxymellis compoſiti unciam unam, & propriè ſi materia uideretur craſſa, licet ut plurimum ſit ſubtilis, & in hoc tempore dylteria fortificentur addendo ſupraſcripto dylteri. ʒ. s. uel unam hieræ compoſitæ. G. aut hieralogodion, aut ſimilium, aut ad-

dendo ſupraſcriptis herbis in decoctione cecatiream, aut colocynthidem & ſimilia. Sed in quintodecimo die exhibeantur. ℞. 2. aut ʒ. 1. pilularum foetidarum, quarum deſcriptionem ponit Raſis in textu ſeruata debita cuſtodia. Et deinceps uſq; ad decimū & octauum uel uigeſimum diem cōtinuetur idem regimen uitæ, aliquantulum tamen ſi oportuerit paulatim increaſſando. Et pro digeſtiuo in his diebus detur oxymellis ſcyllitici, ſyrupi de ſtecos ana ʒ. ſex, cum tribus ʒ. digeſtiui ſupraſcripti. Poſtea ſumpto digeſtiuo in his diebus quater aut quinques detur drachma una, aut ʒ. quatuor pilularum foetidarum, de quibus in textu, ſeruata debita cuſtodia. Et dylteria in hoc tempore fortificentur multiplicando in hoc tempore centaureā, colocynthidem, & addendo artanitam de quibus in apoplexia, aut multiplicando electuaria ſolutiua, de quibus ſupra, deinde ſequenti die dentur. ℞. duo theriacæ diſtemperatæ cum uncia una hydromellis ſupraſcripti & ʒ. 1. uini potentis, & detur in mane, & dormiat poſt eam, & taret cibum per ſeptem horas, & fudet ſi poſſit. Et in hoc tempore cōueniunt diuerſiones fortiores ſicut maſticatoria, & ca putpurgia, & ſternutatoria, de quibus ſupra in alijs capitulis. Et ante iſta fortiora, conueniunt leuiora, ſicut fricationes ſuper parte ſana, fricationes enim ſuper parte ægra non ſiunt, niſi cum opus eſt reſoluere facta bina aut trina purgatione, poſt hoc conueniunt reſolutiua applicanda parti læſæ & origini neruorū incipiendo à leuioribus, ſicut eſt oleum de coſto deſcriptione Meſue, uulpinum, de ruta, de ſpica, & ſimiles gradatim aſcendendo ad oleum de coſto poſitum in litera à Raſi, oleum de caſtoreo, de piperibus, de euphorbio, poſtea ad aquam uitis factam ex optimo uino, eſt enim optima & ultima in reſoluendo. Poſtea ad emplaſtra rubificantia, & deſiccantia ex ſinapi & ſimilibus circa nucham & partem poſterio rem cerebri, ſed attendatur ne nimis profunde ulceret aut apoſtement, & propterea locus ſæpe uideatur. Et in hoc tempore competunt uentofæ ſuper parte paralytica, aliās, prætaſta, & propriè in capitibus lacertorum, & in hoc tempore conuenit conſectio anacardina, ſed incipiatur primò à ʒ. 1. gradatim aſcendendo uſq; ad duas. Et detur alternis diebus cum. ʒ. aut 2. hydromellis debite calefacti, et detur in mane ſtomacho ieiuno, dormiat poſt eam & fudet, quod ſi non curatus fuerit, quieſcat per decem dies debito regimine ſeruato, deinde iterentur medicinae fortes, ſcilicet digeſtiua, euacuatua, reſolutiua, rubificantia, et conſectio anacardina. Et ſi cum his nō liberetur uadat ad balnea ſulphurea, ænea, & aluminofa, uel lutofa, & ærea ſiue fumoſa, & ſumat aquā ſuper nucham & partem poſterio rem cerebri debito regimine in balneis ſeruato. Si uerò paralyſis phlegmatica eſſet leuior, citius poſſet increaſſare dietam, citius deuenire ad digeſtiua fortia, reſolutiua, rubificantia, & confectionem anacardinam. Procedente tempore, poteſt bibere parum uini boni cum hydromelle lymphati, & dietam magis increaſſetur, quæ ſemper declinet ad calida & ſicca, & uidentur brodiaſia niſi brodium cicerum, & galli antiquiſſimi, & brodium ſerpentis non uenenoſi, & conſert cerebrum leporum aſſatum, & herbæ aliquæ in hac diſpoſitione, ſicut quæ dictæ ſunt acorus, & propriè conditus cum melle, & diacorus. Et

ex aromatibus cinamomum, zingib, nux muscata, galanga, & piper, & ex fructibus grana pini &c.

Aër dedinet ad calidum & siccum, cuius caliditas gradatim intendatur. Somnus sit communiter sex horarum, & non dormiat super cibum. Omnes superfluitates sollicite per convenientes regiones purgētur. Exercitetur fortibus fricationibus, suppleant enim fricationes loco exercitij factæ primò super parte sana, deinde super ægra ad spirituum attractionem, & calidi uiuificationem. Ante illud tempus neq; fricetur, neq; exercitetur.

Accidentia animæ calorem exicantia sicut ira cōueniunt. Ordinetur dieta sicut dictum fuit subtilior in principio, quæ gradatim in crassando procedat, & cum proprijs sicut hydromel, saluia, rosmarinus, acorus, menta, maiorana, ruta, iua, hyssopus, cappares, brodium cicerum, galli antiqui, ius serpentis non uenenosi, aues parux, carnes leporis, & propriè cerebrū assatum, gran. pini præparata &c. Viterur uinum nisi paucum ægritudine iam declinante & mediocriter uinosum. Viterur acetum ex aqua frigida, sit famelicus & sitibundus.

SEQUITUR DE PARALYSI SANGUINEA.

Si uerò sit paralytis sanguinea secundum communem opinionem, tūc ab ipso initio fiat phlebotomia ex parte contraria loco paralytico, & satis copiosa, præmisso clysteri si oportet, licet nunquam uiderim phlebot. iuuare in paralyti nisi fuerit à percussione, cōtusione & similibus. Et detur aqua hordei & aqua faccharata. Et obseruetur reliquum regimen supracriptum in phlegmatica si phlegma fuerit sanguini permixtum, sicut est ut plurimū. Sed localia sint parum calida, unde sufficeret oleum chamomælinum, de spica, aut ruta, quibus etiam oleum ros. posset addi, imo calida augmentant ægritudinem. Et ita proportionale regimen seruetur in reliquis. Ex his potes concipere quid faciendum sit in reliquis speciebus paralytis humoralis si contingit. Si uerò pendeat à uulnere, cōtusione, aut laqueatione, dislocatione. Primò huiusmodi curentur cura sibi propria. Deinde paralytis si non subito euenit, quia subito eueniente liberatio est impossibilis secundum plurimū. Curetur ergo cum euacuantibus & diuertentibus. Primò si humores sint in fluxu, & in hoc casu conuenit phlebot. postea super loco paralytico, & loco originis neruorum approximantur medicinae mollificantes, resoluentes, poros dilatantes, ut spiritus penetrare possint, & cum hoc propriè in passionibus neruorum sicut est emplastrum descriptum à Rasi. Et potes facere balneum uel decoctionem ex uulpe cum quibusdam mollificatibus & resolutentibus, sicut foenu-græco, althæa, iua, saluia, stecade arabico, hypericone, Et permittatur uulpes excoctata primò, & fracta secundum ossa sua bullire usque ad carniū separationem. In qua decoctione æger ipse & membrū paralyticum balneetur fricando, stectendo, reflectendo, & postea ungatur cum oleo uulpino, aut ex unguento Rasis & loca bene calida cum pelle uulpis teneantur. Syrupus proprius in paralyti phlegmatica. Recipe saluæ, rosmarini, stecados, ana. M. unum, radicem acori, unciam unam, gariophilatæ, melissæ, herbæ paralytis, rutæ, satureiæ, hyssopi, betonice, bac-

carum lauri, ana. M. semis, bulliant cum quinq; lib. mellis in quatuor lib. aquæ usq; ad consumptionem medietatis, & aromatizetur cum cinamomo, nuce muscata, zingib, pipere, pyrethro, hoc enim conuenit factis huiusmodi purgationibus. Sed magis in processu addatur oxymel scylliticum. Syrupus de stecade descriptione Mesue. Vna 3. stecados arabici in pilulas redacta cum oxymelle scyllitico pluribus diebus successiue exhibita liberat à paralyti. Vna 3. pilularum de hiera simplici cum una drachma piperis, cum oxymelle scyllitico in pilulis redacta pluribus diebus exhibita potenter liberat. Ex euacuantibus propriè sunt pilulæ de euphorbio, de opopanaxo, de sagapeno, de sarcocolla, de hiera magna, sed uomitua conueniunt ubi stomachus suggeret materia, cum hoc etiam quod calefaciunt cerebrum. Vnus 3. assæ foetidæ sumptus in pilulis pluribus diebus est efficax medicina, oleum balsaminum de lateribus fortia sunt in hac dispositione. Vnguentū efficax. Recipe carpobalsami, euphorbij, ana, drachmā unam, bdellij, sagapeni, ana drachmas duas, salis nitri, castorei, ana 3. duos, pulueris anacardi, sinapis, aristolochiæ rotundæ, spicæ, cōstij, seminis agni casti, staphisagriæ, pyrethri, alphodylorum, radicis ireos, ana drachmam unam, cucumeris asinini, uini drachmas duas, balsami drachmam semis, mellis anacardi drachmam unam, terebinthinæ drachmas sex, olei de casto, & de ireos ana unciam unam, olei de spica, uncias duas, anethini unciam unam semis, pinguedinis ursi, tassi, uulpis, uulturis ana unciam semis, dissoluantur gummi in aceto scyllitico, deinde cū cera citrina fiat unguentum molle. Fiant etiam unguenta alia decoquendo anserem, in cuius uentre sit aliquid carni, aut uulpis. Et alia ad hoc disposita quæ omitto credens hæc sufficere. Et hæc de paralyti dicta sufficiant.

DE STUPORE. Cap. X.

Hoc est decimum capitulum, in quo agitur de stupore & tremore. Et primò præmittenda sunt quid nominis, & quid rei stuporis. Stupor enim deriuatur à stupeo, quod quandoq; admirationem importat, quandoq; stuporem mentis, id est diminutionem, aut ablationem uirtutum interiorum cerebri, quandoq; significat cuiuscunq; operationis diminutionem. Sed apud Auicennam hæc dictio stupor aliquando apud quosdam est synonyma paralyti, quorum modorum nullus est ad propositum. Hic uerò sumitur stupor pro ægritudine neruorum, quæ sic diffinitur ab Auicenna. Stupor est morbus officialis, id est membri organici faciens euenire nocumētū, in sensu tactus scilicet destructionem aut diminutionem, non aut corruptionem ad differentiam doloris, aut cuiuscunq; alterius tactus corrupti, sicut etiam sentire delitiosum pro doloroso aut e contrario aut calidum pro frigido.

Qum aliquis sentit aliquod suorum membrorum sicut est dispositio pedis cum sit stupidus, dicimus in illo membro stuporem esse. Quapropter eius cura

non est differenda, quando enim prolongatur tempus huius ægitudinis perducit ad paralyſim.

Diuiditur præſens capitulum in duas partes. Primo agit Raſis de ſtupore. Secundo de tremore. ſecunda ibi. Tremor autem. Prima in duas. Primo notificat tremorem. Secundo oftendit neceſſitatem feſtinationis curæ. Secunda ibi. Quapropter. De prima parte dicit. Cum aliquis ſentit aliquod ſuorum membrorum, aut etiam totum corpus, ſicut eſt pes quando eſt dormiens ſive obdormitatus, tunc illud membrum patitur ſtuporem, id eſt, diminutionē aut ablationem tactus. De ſecunda parte dicit curam non eſſe differendam cum tranſeat in paralyſim iſtis non differentibus niſi ſecundum magis & minus.

Species ſtuporis ſumuntur ſicut ſpecies paralyſis. Prima diſtinctio. Eſt enim quedam uniuerſalis, quedam particularis, ut in altera medietatē corporis dextræ aut ſiniſtræ, aut in aliquo uel pluribus membris particularibus. Secunda diſtinctio. Aliquis ſtupor ſit incipiendo, aliquis permutando ex apopleſia, epileſia, dolore capitis, pleureſi, & colica, & ſic de alijs diſpoſitionibus, quibus quandoq; ſuccedit ſtupor.

Tertia diſtinctio. Aliquis ſtupor eſt materialis, aliquis immaterialis. Aliquis intenſus, aliquis remiſſus. Intenſus auferens totaliter tactum, remiſſus ipſum diminuens. Aliquis eſt chronicus, aliquis interpolatus, aliquis continuus &c.

Cauſæ ſtuporis ſumuntur à quatuor, aut enim à principijs ſcilicet ab anima & duobus membris principalibus corde ſcilicet & cerebro, aut à deferentibus ſcilicet nucha, neruis & arterijs, aut à ſpiritu, aut à membro ſtupido. Siquidem à principijs, ut ab anima erit, quia ipſa conuerſa ad aliquod ſpeculandum non ſentit obiecta extrinſeca. Vnde ſecundo de anima. Atterenti fortibus imaginationibus delata ſub oculis non uidemus. Aut ex parte cordis, nam cum ipſum eſt de proximo incurſurum ſyncopim fit homo uniuerſaliter ſtupidus ſpiritibus ad cor reſtractis. Cum ſimiliter propter oppilationem cordis aut aliam ægitudinē ſpiritibus vitalibus non potentibus exire ad membra ſit homo ſtupidus, nam hoc modo accidit apopleſia ut ſupra. Aliquando eſt propter defectum in cerebro, ut in dolore uehementi, propter quem omnes ſpiritus animales conuertuntur ad ipſum. Aliquando propter oppilationem in cerebro coarctatoriam ex humoribus collectis in uentriculis, aut in origine nuchæ & neruorū, aut attenuatoria ex ſimilibus humoribus, cum apoſtemate aut ſine apoſtemate. Aliquando eſt in deferentibus ſicut in nucha, aut neruis aut arterijs cum ſcinduntur, ſtringuntur, aut aliter oppilantur, ſicut nucha oppilatur, aut ſcinditur propter diſlocationem ſpondilis, ut ſupra in paralyſi, & ſimiliter eſt in arterijs. Aliquando prouenit ſtupor ex defectu ſpiritus, aut quia paucus, aut frigidus craſſus, aut affectus alia qualitate manifeſta uel occulta, quapropter non eſt cōueniens inſtrumentum animæ ad ſenſum tactus. Aliquando eſt ex parte membri cum nimis calefactum ſit, inſtigidatum, humectatum, aut exiccatum, licet mala complexio frigida & humida, aliquando ſit in cauſa ut plurimum. Aliquando eſt

ex parte qualitatum ſecundarum, ut quia nimis craſſæ ſubſtantie, & propterea cutis pedis poteſt quodāmodo propter ſuam craſſitatem reputari ſtupida reſpectu cutis manus. Et ſimile huic poteſt præter naturale accidere alicui membro. Et propterea medium inter plantam pedum & calcaneum eſt magis ſenſituum, & magis titillationem incurrit 35. problematum, problemate ſecundo.

Cauſæ autem remotiores quedam ſunt primitiue ſicut percuffio, caſus, diſlocatio, conſtrictio, uiolenta extenſio, & ſimiles, in capite, neruis, aut arterijs, & ſicut morſus ſcorpionis aquatici, aut tactus piſcis nominatus barile uel miracha, necnō medicinæ ſumptæ interius, aut exterius applicatæ, nec non quidam ſerpentes calidi corrumpentes complexionem ſpiritus & membri, aer etiā frigidus, nimia crapula, uina potentia, ſunt cauſæ longinquæ ſtuporis, nimius ſomnus, ſuperflua uigilia, retentio ſuperfluum conſuetorum expelli, nimia quies, accidentia animæ excedentia, præcipue nimius timor qui primò facit tremorem, & tandem auctus auferit ſenſum tactus.

Cauſæ autem corporeæ antecedentes ſunt humores mali, aut malæ cōplexiones totius, aut membrorum communicantium neruis, ſicut in febris fortibus accidit ſtupor diſcratiato ſpiritu, & neruorum cōplexione. Et eadem uel ſimiles poſſunt eſſe cauſæ coniunctæ. humores autē facientes ſtuporem ſunt phlegma ſecundum plurimū. Aliquando ſanguis ſicut etiam in paralyſi.

Signa ſtuporis ſunt diminutio aut ablatio ſenſus tactus, aut totius, aut partis cui ſecundum plurimum aliquod nocumentum in motu coniungitur. Signa cauſarum primitiuarum ſunt ipſæmet cauſæ & nocumenta ex ipſis derelicta. Signa cauſarum corporearum ſcilicet malæ cōplexionis, & humoris facientis ſtuporem ſunt dicta ſuperius in paralyſi & in pleuriſq; alijs capitulis. Signa ſtuporis facti permutando ſunt præceſſio aliarum ægitudinum & ipſius ſucceſſio quo ſuccedente præcedentes ægitudines minuuntur, aut auferuntur. materia ad neruos, uel ad origines neruorum permutata, licet ſit poſſibile ſuccedere ſtuporem præcedente ægitudine non diminuta imo potius aucta.

Prognostica. Stupor perſeuerans pronunciat aliquam ægitudinem cerebri aut neruorum. Cauſa enim diminuta facies ſtuporem ſi augeatur, aliquam maiorem faciet ægitudinem cerebri aut neruorum.

Secundum omnis ſtupor membri particularis cum perſeuerat tranſit in paralyſim, cum paralyſis & ſtupor non differant niſi ſecundum magis aut minus.

Tertium, ſtupor faciei nunciat torturā oris. Quartum, ſtupor fortis cum uertigine perſeuerans nunciat apoplexiam. Quintum, ſtupor uniuerſalis perſeuerans, mortem prænunciat. Ex iam dictis inferri poteſt pedes aptiores eſſe ſtupori, primò breuiarij capite proprio, & ſecundo prognost. cum ſint diſtantiore a fonte caloris, & ab influxu ſenſus & motus, & magis deputati ad motum quàm ad ſenſum, & materie frigide pluries præcipitantur ad pedes. In manibus uerò ſunt omnia iſta oppoſita. Patet ſecundo quare pes factus ſtupidus, ex compreſſione aut ligatura apparet ualde magnus & grauis præter ſolitum, non enim eſt ob aliud, niſi quia uirtus motiua facta debi-

lis exprohibitione spirituum facit arbitrari pedem maiorem & grauiorem, sicut debili homini apparet paruum pondus esse magnum & graue. Et tertio patet quare in membro dormitante sit quaedam sentatio, sicut formicarum per illud membrum discurrunt. Hoc enim non est aliud nisi crassi uapores & partes sanguinis & spirituum, per meatus illius membri adhuc strictos discurrunt, quod non apparet dum membrum est sanum, illis discurrentibus per meatus membri latiores quam sint post constrictionem aut compressionem. Alia causa est quia uirtus tactiua in sano non immutatur ex horum discursu per membrum propter similitudinem membri cum eisdem. Sed membro in frigidato per complexionem ob absentiam spirituum postea ab ipsis spiritibus sanguine & uaporibus euenientibus immutatur propter dissimilitudinem. Nec causa huius est ut nonnulli arbitrantur quod uirtus tactiua debilis percipiat obiecta quae fortis non percipit. Credendum est enim quod uirtus tactiua fortis si aequaliter ab obiectis immutetur sicut tactiua debilis melius sentiat ea sicut & ceterae potentiae sensitiuae. Aliter tactiua temperati fortissima non melius sentiret obiecta etiam minima quam tactiua distemperati.

Curatur autem haec passio ex aliqua parte medicinarum paralytis, & cum dieta & unctione ex oleo costino. Quod si inueterauerit passio, aeger ex pilulis foetidis purgandus est, & complexio aequanda ex anacardino & dieta.

His Rasis ponens curam dicit quod stupor curatur ex aliqua parte medicinarum paralytis, et cum dieta, & cum unctione ex oleo costino, & hoc intelligitur cum fuerit recens & debilis, & immaterialis, aut pendens a pauca materia, & frigida, ad cuius complexio nis immutationem & paucae materiae resolutionem sufficit dieta & unctio absque purgatione & medicinis fortibus &c. Quod si inueterauerit, & supple fuerit fortis, auferent sensum cum cuius ablatione etiam motus secundum plurimum diminuitur, tunc aeger erit purgandus cum pilulis foetidis scilicet suprascriptis in paralyti, & complexio erit aequanda, id est, ad medium reducenda proportionatum membro, cum anacardino & dieta superius positus in paralyti cum plurimum stupor & paralytis pendeant a causa frigida & materiali. Curatur enim cum fortis est fere eisdem medicinis quibus curatur paralytis, sed aliquantulum leuioribus, cum etiam fortis stupor sit leuior quam paralytis.

Cura uero stuporis ordinanda est omnino, sicut cura paralytis a causa proportionali praecedens. Et omnes intentiones supra positae in cura paralytis, & omnes medicinae, atque omnia instrumentaria illas pericientia ad hunc locum adducantur. Verum non oportet ut sint ita fortes, nec dieta ita tenuis sicut in paralyti cum stupor sit minor morbus quam paralytis. Auicenna tamen praecipit in stupore a sanguine pendente phlebotomiam copiosam cum dieta tenui quae omnia in paralyti sanguinea etiam sunt attendenda.

DE TREMORE.

Quid nominis tremoris satis manifestum est. Describitur autem ab Auicenna secunda tertij, capite proprio quod est morbus officialis eueniens propter defectum uirtutis motiuae a motu lacertorum secundum continuitatem comparis grauitati corporis intrinseci sua motione motionem uoluntariam, quare commiscetur motus uoluntarij cum motibus non uoluntarijs. Subdit postea ad declarationem descriptionis, quod tremor est nocumentum in uirtute motiua, sicut stupor est laesio in sensibili. Dicitur primo morbus, quia per se & immediatè est laesio operationis duplicis uirtutis motiuae, quarum una est mouere quando oportet & qualiter oportet, & ad omnem differentiam positionis secundum humanam necessitatem, alia autem operatio est stabilire membrum & figere, quapropter tremor est morbus in situ, siue capiatur situs pro loco siue pro societate. Officialis si sit casus nominatiui, id est, compositionalis, siue morbus in compositione: si uero sit casus genitiui, id est, membri organici, siue instrumentalis, nam quamuis tremor sit etiam neruorum, est tamen principaliter organorum quibus motus principaliter attribuitur. Eueniens propter defectum uirtutis motiuae, qui defectus est diminutio non corruptio, cum tremor eueniat hominibus naturaliter dispositis ex decursu gratiui, nec ablatio, a motu lacertorum. Expresit principale instrumentum corporeum motus uoluntarij, secundum continuitatem, quia in tremore sit motus interruptus. Comparis, id est, aequalis, grauitati corporis scilicet membri, intrinseci sua motionem motionem uoluntariam factam a uirtute. Quare commiscetur motus uoluntarij cum motibus non uoluntarijs, mediantibus tamen quietibus inter utroque.

Sed contra, tremor in decrepitis ex decursu aetatiuo non est morbus, igitur diffinitio insufficiens. Dicitur concedendo antecedens, & quod Auicenna non diffinit hic nisi tremorem praeter naturam. Secundo arguitur, tremor nunquam est, igitur antecedens patet, quia quando est motus sursum non est, nec quando est motus deorsum, nec est quando est quies. Ad hoc negatur antecedens, & dicitur quod tremor est in quocumque motu & quiete, ex quibus componitur sicut & tempus est quando aliquid ipsius est, licet non totum simul. Tertio, tremor non laedit operationem uirtutis motiuae nec aliam, ergo non est morbus. Antecedens probatur, quia tremor est actio laesa uirtutis motiuae, sed ipsa actio laesa non laedit seipsam quare &c. Dicitur quod tremor est compositus ex duplici motione, scilicet, facta a uirtute & grauitate: nunc autem licet facta a uirtute non laedat seipsam, laeditur tamen ab illa quae facta est a grauitate. Quarto, si membrum positum in igne fugiens contrarium concutitur, tunc iste est tremor, & tamen non fit a grauitate aliquo modo, ergo, &c. Dicitur quod iste non est tremor cum non sit aliqua eius pars uoluntaria, sicut etiam rigor in febribus non est tremor, cum nulla pars eius sit uoluntaria: est tamen motus praeter naturam si fiat a causa aegra: si uero non, non est praeter naturam. Quinto, non semper tremor fit ex defectu uirtutis motiuae a motu lacertorum, cum aliquis sit tremor in quo uirtus motiua intendit figere lacertos & non mouere. Dicitur secundum Gal. in lib. de tremore

more & rigore, quod quantumcunque uirtus intendit stabilire membrum & lacertos eius, tamen ibi est aliquis motus, sicut in aue uolante alis extensis, quæ tamen non concutit alas, est ibi aliquis motus, licet non multum manifestus. Et ita est in membro quod uirtus intendit quietare. Ego credo tamen quod quicquid dicat Galenus, in aue iam dicta esse aliquem motum alarum, quia aliter caderet: non tamen sic est necessarium in brachio hominis, quod uirtus teneat extensum, cum illud inhæreat alicui fixo. Credo ergo descriptionem potius esse suppleendam à motu lacertorum uel fixatione. Sexto, tremor debilitat uirtutem, ergo non causatur ex debilitate uirtutis, tenet consequentia, cum idem non sit causa & causatum. Dicitur, quod idem est causa & causatum, sed diuersis modis, tremor quidem debilitat uirtutem fatigando eam, uirtus uero debilis ipsum producendo: sunt tamen ambæ de genere efficientium. Septimo, tremor est totaliter à natura, nam motio sursum est à natura, quia à uirtute membri est, motio deorsum est à natura, quia est à grauitate, quæ est naturalis ipsi membro. Dicitur, quod est à natura non tamen naturalis, cum uirtus præternaturaliter disposita ipsum efficiat, unde est præternaturalis, licet sit aliquo modo naturalis distinguendo naturale contra uiolentum.

Octauo, nunquam uirtus est compar grauitati, igitur, &c. Assumptum patet, quia in motione sursum uirtus superat grauitatem, in motione deorsum superatur. Dicitur, quod est compar ad hunc intellectum quod ferè toties natura superat grauitatē quotiens ab ea superatur, tamen tenendum est uirtutē esse aliquando parem ipsi grauitati, quia uirtus superans grauitatem successiue remittitur, donec à grauitate superetur: ergo cum non sit transitus ab extremo ad extremum sine medio, erit aliquando uirtus compar grauitati, & hoc erit in principio esse quietis. Et sequitur consequenter, quod inter hos motus contrarios medietas quies instatanea. Tenendo sicut ueritas est, quod omnis proportio maioris inæqualitatis sufficiat ad motum deducendo etiam resistentiam extrinsecam, scilicet mediæ. Nono, Si augetur resistentia aut minuitur potentia, non sit motus contrarius, sed tardatur: ergo motus sursum debilitata uirtute debet tardari, & non fieri motus deorsum. Dicitur, quod si augetur resistentia, aut tantum minuitur potentia, quod resistentia se habeat ad potētiam in proportionē maioris inæqualitatis, quod tunc sit motus contrarius. Si uero resistentiæ ad potētiam sit semper proportio minoris inæqualitatis, esto quod resistentia augeatur, aut potentia minuatur motus tardabitur, & non fiet motus contrarius. Ex quo sequitur motum sursum factum à uirtute continē remitti usque ad non gradum: motum autem deorsum factum à grauitate continē intendi, cum motus deorsum factus à grauitate sit uelocior in fine quam in principio. Ex quo sequitur ista conclusio, quod motus per totam horam intenditur, & in fine horæ erit sub non gradu, quæ conclusio licet sit possibilis, tamen in hoc casu est neganda, cum uirtus antea sufficiat tardare motum deorsum, quàm ipsum totaliter impedire, imò uerius est hunc modum remitti paulatim ad non gradum, licet forte à principio usque ad aliquod tempus intendatur. Decimo, uelocius mouetur membrum

sursum quàm uirtus exigit, & similiter deorsum, quàm exigit grauitas membri, ergo præter has sunt aliæ causæ horum motuum assignandæ. Dicitur negando assumptum. mouetur enim membrum ita uelociter sursum, sicut uirtus motiua cum illo conatu mouet ipsum: mouetur tamen uelocius saltē in principio, quàm appetitus cognoscitiuus intendat ipsum mouere. Ex quo sequitur, quod motiua & propriè debilis non est appetitui cognoscitiuo omnino subordinanda, membrum tamen deorsum ita uelociter mouetur, sicut grauitas cum his circumstantiis mouet ipsum. Tamen credo ad omnem operationem uirtutis motiua debilis, siue intendat stabilire membrum tremens, siue ad quamcunque differentiam mouere, præter membri grauitatem concurrentem solum ad motum deorsum ipsam uirtutem motiuam debilem cum conatu concurrere. In tremore namque ad appositas differentias etiā hæc experientia satis faciliè probari potest. Ex his patet differentia inter stuporem & tremorem, cum stupor sit passio sensitiua, tremor autem motiua. Secundo patet differentia inter tremorem & iectigationem, cum tremor sit partim uoluntarius, iectigatio autem omnino inuoluntaria. Et tremor est alicuius membri organici. Iectigatio musculorum, quæ sunt partes ipsorum organicorum.

Tertio patet differentia inter tremorem & pulsum cordis & arteriarum, quia pulsus cordis & arteriarum est merè naturalis, tremor autem mixtus. Et quia inter contrarios motus pulsus, percipitur quies media. Sed inter contrarios motus tremoris non percipitur quies media, non quia instantanea, sed quia breuissima. Quarto patet differentia inter tremorem & rigorem, quia rigor est merè naturalis, & in ipso totum corpus concutitur: licet tamen causa faciens concussionem non sit in toto. Tremor autem est motus mixtus, & non est in toto necessarium, sed aliquando solum in uno particulari membro.

Prima distinctio. Species tremoris sunt sicut stuporis, aut enim est in toto, aut in parte sicut in capite, aut alio membro particulari. Secunda, aut est chronicus, aut nouus, aut materialis, aut immaterialis, etc. Accidit autem ut caput moueatur ante & retro, propter nocumentum in musculis anterioribus & posterioribus, sicut aliquando tremit ad latera propter nocumentum musculorum lateralium. Et quandoque sit tremor in utrisque manibus & non in pedibus, ut quando causa non est in origine nuchæ, sed in ramis neruorum penetrantibus ad manus, aut si causa fuerit in origine nuchæ expellit eam natura ad loca propinqua propter minus malum, aut quando spiritus motiuius in inferioribus corporis est fortior, & magis uincens secundum necessitatem illorum membrorum, quia sunt ad motum magis deputata quàm manus, quare non patiuntur à causis, quæ non sunt ualde fortes, propterea frequentius accidit tremor in manibus quàm in pedibus, & cum liberatur paralyticus, citius redit motus in manibus quàm in pedibus, &c.

Causæ sumuntur aut à uirtute, id est, à spiritu, aut à membro, si à spiritu, aut quia paucus in toto propter nimias uigilias, aut exercitia fortia, aut famem, coitum, aut balnea, aut alia euacuantia sensibiliter, aut insensibiliter, aut quia est paucus in membro propter retractionem ipsius ad principale, sicut in

timore propter aspectum ex alto, aut propter ambulare super pontem, de cuius precipitio timetur, aut propter orare coram principibus, aut propter disputare, aut propter uelle inire pugnam, & quomodolibet aliter, aut quia spiritus motu inordinato mouentur sicut in angustia, tribulatione, gaudio, desiderio, passione dicta ilen, in qua spiritus simul ad oppositas differentias mouentur. Aliquando est defectus ex parte qualitatibus spiritus, quia crassus, frigidus, aut putridus, aut alia qualitate occulta uel manifesta affectus. Quandoque est ex parte membri male complexionati. Est enim complexio potissimum & immediatum instrumentum anime ad suas operationes perficiendas. Hoc autem erit si membrum sit nimis humectatum propter crapulas & mollificationem, aut uidelicet multitudine uini, aut propter potum aquae plurimae non in sua hora, sicut post coitum, balneum, exercitium, & ieiunium, aut est mala complexio sicca faciens membrum non bene obediens flexioni, aut erit oppilatio in membro ex causis repletionis multiplicibus humores crassos aut uiscosos, aut alijs causis oppilantibus coarctatorie, aut attenuatorie, aut carnosae, unde non penetrabit spiritus sufficiens ad debitum motum, quo prohibito fieret paralysis & diminutio sensus, tremor, aut solutio continui membra debilitans, & quandoque membro & spiritui simul accidit impedimentum, sicut ex morfu animalis ueneno si simul nocente spiritibus, & membro, aut forte duplex nocumentum unicuique proprium simul coniungatur. Causa autem tremoris frequentior est frigiditas superflua, aut humiditas remolliens, minor tamen humiditate paralyticam faciente.

Signa tremoris absolute sunt manifesta ex motu ipsius membri tremantis. Signa causarum sunt ipsae causae. Signa autem ipsarum propter defectum uirtutis & spirituum sunt, quia patiens deficit ex quocunque labore & motu, & similiter a quocunque nutribili facile releuatur & non potest pati famem diuturnam, quoniam syncopizaret. Signa uero superfluae frigiditatis aut humiditatis, & caeterarum causarum sunt ex saepe dictis manifesta.

Prognostica. Tremor magis peruersus est qui incipit a sinistro. Secundum, tremor in senibus medicatione non est remouibilis. Tertium, Tremor est uia in spasmodum aut paralyticum secundum materiam diuersitatem subtilis aut crassae. Quartum, Tremor in labio inferiori significat uomitum. Quintum, Alienatio superueniens tremori in causone, ut dicit Hippocr. soluit ipsum propter calorem intensum praeter modum calefacientem cerebrum & nervos, unde sequitur alienatio, & causa tremoris resoluitur sicut interdum e contrario soluitur permixtio mentis & causon materia ad nervos permutata, propter cuius permutationem sequitur tremor.

Tremor autem ex eisdem curatur ex quibus sanatur stupor. Sed si ex superfluo uini potu euenerit, aeger ab ipso erit abstinendus. Similiter si aqua quae ex niue dissoluitur bibendo hanc incurrit passionem, ab ipsa abstineat, & balneum calidissimum

ingrediatur, in quo tam diu moram faciat donec sudet a quo cum egressus fuerit in sole assidue moretur.

Hic ponit curam tremoris. Et habet tres partes. Primo ponit curam tremoris absolute. Secundo, quando prouenit ex potu uini. Tertio, quando prouenit ex potu aquae frigidae, partes patent. De prima dicit, quod tremor curatur cum illis, cum quibus sanatur stupor, de cuius cura sermo praecessit. Stupor autem & tremor curantur cura paralyticis, uerum leuiiores exigunt medicinas sicut sunt morbi leuiiores paralytici. De secunda parte dicit, quod si tremor prouenit ex superfluo potu uini, aeger ab ipso abstineat, & bibat aquam saccharatam, uel aquam mellis. De tertia parte dicit, quod si prouenit ex potu aquae quae ex niue dissoluitur, uel aliter frigida ualde, aeger ab ipsa abstineat, loco cuius utatur uino pauco medicis potetiae, uel aqua mellis cum pauco saluiae & piperis, & ingrediatur balneum calidissimum, in quo tatum stet donec sudet, siue illud balneum sit aereum sicut stufa, uel igneum sicut furnus ex quo extractus est panis uel sitaqueum calidum & siccum, & actu & potentia siue sit naturale, sicut thermae sulphureae, aut alia huiusmodi, aut artificiale. Et ad hoc confert sepeliri in arena sicca a sole uehementer calefacta, & statio sub sole confert &c.

Cura tremoris perficitur omnino sicut dictum est in paralytici. Verum sunt aliqua propria tremori sicut oleum de andachocha, id est, flore trifolij, quod in hoc habet mirabilem proprietatem applicitum super originem neruorum & membro tremulo cum fricatione bona. Similiter emplastrum factum ex folijs ipsius trifolij, cerebrum quoque leporis assatum ad hoc mirabiliter confert, & propterea frequenter comedatur. Et si tremor est in capite expertum est fecas sumptum singulis diebus pondere 3. i. aut. 2. cum 3. i. hydromellis, aut sine potu in forma pilularum. Ex nocentibus autem ualde in eo & omni aegritudine neruosa est multitudo phlebotomie, & nimius usus uini & aceti, & coitus, & aquarum frigidarum: aquae tamen, pluuialis est eis melior & minoris nocumēti, & in omni aegritudine neruosa. Castoreum quoque & oleum de cucumere asinino sunt propria tremori a causa frigida proueniente, siue castoreum sit exterius applicitum, siue interius sumptum.

DE TORTURA ORIS.

Cap. XI.

Tortura quae apud Serapionem uocatur acutis a quibusdam sic describitur. Tortura est morbus officialis figuram siue formam naturalem faciei corrumpens, ab Auicenna uero completius describitur secunda tertij. quod est morbus officialis in facie propter quem trahit pars faciei ad partem non naturalem, & alteratur forma eius naturalis & remouetur bonitas obuiationis utrorumque labiorum & ambarum palpebrarum ex parte. Officialis, id est, compositionalis. Est enim morbus in figura & etiam in situ, siue situs accipiat pro loco, siue accipiat pro societate, ut patebit ex dicendis. Aliter officialis, id est, membri officialis, id est, instrumentalis & organici: in facie ad differentiam torture alterius membri

membrum, propter quem trahitur pars faciei ad partem non naturalem, id est, contrahitur aliqua pars faciei ad situm non naturalem, & alteratur forma, id est, figura eius naturalis, & remouetur bonitas obuiationis utrorumque labiorum, & ambarum palpebrarum ex parte. In his uerbis specificat modum torturæ, & membra torta secundum plurimum in facie, ut sit nobis magis manifesta. Subdit autem ex parte, cum secundum aliquam partem sit bonitas obuiationis, & labiorum & palpebrarum, scilicet, secundum partem uicinam parti sanæ.

Cum hominis os contorquetur, & unum de oculis suis claudere non uolet, & si precipitur ei ut sufflet flatus ab una tantum parte exire uidetur, ipsum quoque tunc contorsionem pati dicimus.

Diuiditur presens capitulum in partes duas, primo determinat de tortura theoricè, secundo practicè, secunda ibi. Cuius curam. In prima parte ponit tria signa. Primum, quod os, id est, facies uel os, id est, labia oris torquentur. Secundum, quod oculus partis ægræ claudi non potest, id est, ob spasmus, aut paralytism palpebrarum non potentium sed ex toto contingere. Tertium, quia non potest sufflare nisi ex parte una, scilicet sana, altera non potente, scilicet debite moueri ob spasmus, aut paralytism, & similiter nec per eam potest expuere.

Species torturæ sunt istæ, nam aliqua est chronica ualde, transiens sex menses. Quædam est magis recens siue paucioris temporis. Iterum quædam est intensa fortis, quædam debilis & remissa uix comprehensibilis. Causæ torturæ coniunctæ sunt duæ scilicet spasmus aut paralytism partium faciei, unde fit partium faciei contractio, ad quem sequitur tortura. Spasmus tum secundum plurimum est in causa, cum partes faciei sint late, ad quas materiam etiam crassæ faciliè possunt precipitari. Causæ autem paralytism sunt dictæ superius. Causæ spasmi dicuntur in capitulo sequenti. Duas tamen memorabo. Una est apostema in collo quod facit torturam, aut causando spasmus, quod est secundum plurimum in nervis dantibus motum mandibulæ inferiori, quæ scilicet oriuntur à prima sphondyli, aut paralyticans eos dēneruos prohibendo transitum spirituum, & propriè si fuerit apostema molle, nerui enim dantes sensum & motum partibus superioribus faciei ramificantur à tertio pari neruorum cerebri. Secunda est uulnus in eadem parte aut in partibus faciei per quod fit paralytism solutis neruis, aut musculis mouentibus partes illas, aut forte fit spasmus neruis & musculis non totaliter scatis, aut propter apostema, quod sequitur ad uulnus replens & contrahens partes illas, quæ sic deinceps perpetuo remanent contractæ.

Signa prognostica sunt dolor profundus in partibus faciei & stupor in cute, & multitudo saltus, siue iectigationis in eisdem partibus prolongati, quodlibet namque istorum arguit præsentiam materiæ in his partibus, quæ si ampliata fuerit, aut uirtus debilitata, fiet spasmus aut paralytism, & consequenter tortura.

Signa demonstratiua torturæ cum aliquando propter eius paruitatem occultatur, est risus aut prolatio dictionum in quibus est O. Ex his enim tortura quantumcunque occulta manifestatur. Signa uero partis læsæ plerumque occultantur, quia interdum pars sana apparet ita torta sicut ægra, quia aliquando pars spasmata contrahit partem sanam, ita ut ipsa uideatur torta, & aliquando paralytica multum grauitans et defluens attrahit partem sanam, ita ut etiam uideatur torta, aliquando si parum paralytica sit contrahitur à parte sana, ita ut scilicet aliquando nulla appareat tortura, aut si apparet, æquè bene apparet in parte sana sicut in ægra. Signa ergo propria & distinguenda sunt infra scripta. Primum, quia oculus partis læsæ est aliquid cooperitus, cum palpebræ non possunt bene uniri: oculus autem sanus totaliter à palpebris potest cooperiri. Secundum est, quia non potest expuere nec sufflare per latus ægrum nec per medium oris, sed solum per latus sanum. Tertium est, ut precipiatur ut moueat genas & labia contrahendo, & elongando, & manifestè tunc patebit, quia non poterit latus ægrum sed bene sanum. Signa uero quod tortura sit à spasmo, est quia pars spasmata extendi non possit, pars uero paralytica faciliè ducitur ad omnem differentiam. Secundum, quia cum spasmata coniungitur sorda, & dolor aliquis, cum paralytica uero non. Tertium, quia in tortura ex paralytici sensus sunt magis turbati, & sentitur incute leuitas, & in lacertis, & stupor quidam, & humiditas profuit ex ore, & est palpebra inferior demersa, & medietas panniculi, quæ est super palatum ex parte illa est mollificata, stupida, humida, laxa, & apparet quod mediteretur homo & aspiciat ad inferiora, quia palpebra superior multum cadit, & magnam partem oculi claudit. In spasmata sunt signa his contraria. Signa autem spasmi sic, & hum. aut non proportionari ad materiam, uidebuntur in capite sequenti, & signa causarum paralytism in proprio cap. fuerunt posita.

Prognostica. Timor est mortis in tortura usque ad quatuor dies, quia materia faciliè potest conuerti ad cerebrum ipsum oppilando uel apostemando. Secundum, torturæ extentæ usque ad sex menses fortasse non speratur rectificatio. Tortura in decrepitis raro recipit salutem. Tortura sequens ægritudines fortes sicut apostema cerebri & similes, & spasmus de inanitione, quod signatur & scitur per euentum eius paulatim factum non recipit curationem.

Cura.

Cuius curam incipiemus cum solutione uentris ex pilulis foetidis. Nutrimentum uero eius atque ipsius potum dicimus, ut in capitulo de paralytism diximus. Aegro præterea quotidie in mane antequam comedat sinapim cum syrupo acetofo gargarizare faciemus, et mittemus eum in domum obscuram, & precipiemus ut unam nucem muscatam in parte oris, quæ torta est reti-

c 4

neat: Naribus quoque tunc sufflabimus condisi, ut sternutatio prouocetur. Sphondyles quoque colli eius, & faciem eius, & frontem ex oleo costino inungere conuenit, & est quotidie de anacardino aur. 1. pondus sumendum. Et si passio hoc modo soluta non fuerit aduentris solutiones, & agri sedationem redeundum est. De tortura uero quæ non repente, sed paulatim accidit non loquimur, ipsa namque non contingit nisi in phrenesi pernitiōsa morte iam imminente, & est ex siccitate.

Hic ponit curam torturæ pendens à paralyti aut spasmō humido, secundo dicit se non uelle ponere curam torturæ factæ paulatim ex spasmō de inanitione cum ipsa sit pernitiōsa, secunda ibi. De tortura uero. In prima parte docet Rasis euacuare. Primo cum pillulis foetidis. Secundo docet quod dieta eius sit sicut dictum fuit in paralyti. Tertiō præcipit gargarisma, ut hoc, R. sinapis 3. s. bulliat in lb. una aquæ ad consumptionem medietatis & coletur, cum qua colatura misceantur syrupi acetosi simplicis 3. 2. & gargarizetur stomacho ieiuno. Quarto locat torturam in loco obscuro per quatuor dies uel sex, ne materia amplietur & dilatetur per multi luminis presentiam.

Quinto teneat nucem muscatam in parte oris quæ torta est. Sexto prouocet sternutationem cum condisi superius declarato, uel loco eius prouocetur cum elleboro, & similibus. Septimo ungantur sphondyles colli, quia ab ipsis ramificantur nerui uenientes ad faciem. Et similiter ungantur partes frontis & faciei ex oleo costino superius descripto. Vltimo sumant quæque die aur. 1. confect. anacar. ut supra in paralyti. Et si cum his non curatur quiescat per decem dies solo regimine bono obseruato, deinde iterum redeat ad ea quæ iam dicta sunt. Cura torturæ exigit easdem intentiones quæ dictæ fuerunt in paralyti. Et hic esto memor sicut ibi non properare ad usum medicinarum fortium in principio digestiuarum aut solutiuarum, sed expecta usque ad quartum & septimum & decimum quartum diem sicut dictum fuit. Neque aliquo modo soluas cum debili aut forti solutio, nisi præmissa digestionem, sed solum sit contentus clysteribus lenientibus. Secundo in tortura ex spasmō primo mollifica, deinde resolue, sed in tortura ex paralyti solummodo resolue. Ex expertis est ut sumantur 3. 2. hieræ Hermetis per mensem continuum, secundum expertum est zingib. et acorus confecta cum melle siue dia-corus sumptus mane & uespere ad quantitatem nucis. Phlebotomia uenarum linguæ in tortura sanguinea optimè confert. Assiduatio ablutionis faciei cum aceto in quo decocta est sinapis est mirabil. prospice in speculo saepe inuat ad rectificationem torturæ. Cauterium super uenam quæ est post aurem, ultimum si per plures dies dimittatur apertum. Syrupus proprius in causa frigida, R. acori lb. s. zing. nucis

muscat. ana. 3. 1. mellis lb. 1. fiat syrupus clarificatus bulliendo supra scripta in sufficienti quantitate aquæ & administretur cum aqua decoctionis saluæ, sed non administretur nisi post septimum, & præcedente alia euacuatione. Solutiuum proprium post hunc syrupum est hoc. R. pilularum cochiarum foetidarum ana. 3. s. fiant pilulæ s. & exhibeantur in mane seruata debita dieta & custodia. Gargarisma. R. nucis muscæ 3. s. acori. 3. 2. pyrethri, sinapis. zing. ana. 3. s. aceti 3. 1. mellis 3. 2. bulliant in lb. 3. aquæ ad consumptionem duarum partium, sed non fiat gargarisma neque sternutatorium nisi præcedentibus purgationibus. Succus auriculæ muris cum nucem muscatam in eo infusa est proprius per nares attractus. Est autem auricula muris anagallis, pro ea tamen sumimus maioranā. Oleum proprium in tortura. R. rad. acori 3. 2. zing. nucis muscat. ana. 3. 2. olei cost. 3. 4. uini al. potentis tantūdem, bulliat super cineres usque ad consumptionem uini, & cum pauco ceræ fiat unguentum. Esto tamen memor in tortura à spasmō præponere mollificantia, deinde resolutiua succedant. Mollificatiuum propriū. R. mucil. fenugræci, sem. lini, butyri, axungiae anatis, olei amygdalarum dul. medullæ cruris uituli. ana. 3. s. olei de lilio 3. 1. nucis musc. 3. 1. ceræ quantum sufficit, fiat unguentum molle, aut misceantur mollificantia cum resolutis. Et hæc de tortura.

DE SPASMO. Cap. XII.

Spasmus à græco deriuatū idem significat quod contractio. Et describitur ab Auicē. secunda tertij cap. proprio, quod est ægritudo neruosa, qua mouentur lacerti ad sua principia, & inobedientes fiunt in dilatatione. Est quidem ægritudo, quia sensibiliter lædens. Et est ægritudo quæ est compositio præternaturalis in figura, quia membrum in spasmō malè figuratur contra uoluntatis imperium, & est morbus in situ, capiēdo situm tam pro positione siue loco quàm pro societate, cum membrum neque in debito loco remaneat, neque possit associari cui debet secundum humanam necessitatem. Neruosa, quia licet in omni spasmō membrum organicum lædatur secundum se totum: læditur tamen principaliter secundum partem neruosam ipsius, Qua mouentur lacerti. Expressit instrumentum principale motus uoluntarij, unde in hoc differt spasmus à singultu, cum in singultu non sit motus lacertorum. Ad sua principia, scilicet ad nucham à qua 31. paria neruorum & unum impar originantur, dantia motum & sensum ferè toti corpori à ceruice infra. Et à cerebro originantur septem paria, ut supra in anatomia quia omnes concurrentes ad cōpositionem omnium musculorum sunt causa ut ipsi muscoli spasmantur, & moueantur uersus nucham aut cerebrum. Et inobedientes fiunt in dilatatione, quia non possunt dilatari secundum uoluntatis imperiū, nisi ægritudo remoueat. Nota primo quod duplex est spasmus, proportionatus ad materiam, & non proportionatus. Non proportionatus est ille cuius causa immediata effectiua est uirtus siue anima, stimulata tamen à re præter naturam, sicut est dolor, solutio continui & huiusmodi. Proportionatus ad materiam est duplex, de repletionem & inanitione. Spasmus de repletionem est ille cuius causa

causa immediata effectiua est ipsa materia existens in neruo siue apostemet, siue non, nam dilatando membrum & extendendo secundum latitudinem & profunditatem est causa, quod abbrevietur secundum longitudinem, quare fit contractio. Spasmus de inanitione est, cuius principium effectiuum immediatum est siccitas ignea & terrea in eo crescens & dominans propter consumptionem humiditatis substantificæ, unde humidum, æreum & aqueum euaporat, & inter hos est differentia, quia in spasmō humido abbreviatur neruus in longitudine, & incrassatur in latitudine & profunditate. Sed in spasmō de inanitione secundum omnem dimensionem, fit abbreviatio & contractio. Ex quibus sequitur istas conclusiones esse concedendas. Prima conclusio, aliquis est spasmus immaterialis, qui tamen est morbus materialis, quia spasmus non proportionatus ad materiam pendens, exempli gratia, ex cholera eruginosa in stomacho est spasmus immaterialis, quia non proportionatus ad materiam, est tamen morbus materialis curandus per euacuationem. Secunda conclusio. Aliquis est morbus siue spasmus materialis, ut puta spasmus de inanitione qui est proportionatus ad materiam; & tamen est morbus immaterialis cum non sit ibi materia euacuanda, aut ad benignum perducenda per distinctionem. Dicitur autem spasmus materialis, quia in eius quidditate exprimitur materia, scilicet ipsius consumptio. Tertia conclusio. Aliquis est spasmus proportionatus ad materiam, & non proportionatus ad materiam, patet de spasmō, cuius causa effectiua immediata sit non solum materia, sed etiam uirtus stimulata. Et si magis uirtus concurrat ad prædominio dicitur non proportionatus ad materiam, & e contrario si materia ad prædominio dicitur spasmus proportionatus ad materiam. Et si ambæ equaliter concurrant ab utrisque equaliter denominabitur, scilicet ubi quilibet per se esset sufficiens ad illum producedum, ubi autem neutra esset per se sufficiens, sed ambæ simul, dicitur proportionatus ad materiam, & non proportionatus de copulato extremo, & non copulatiue. Nec uale hoc argumentum, est spasmus non proportionatus ad materiam, ergo non est proportionatus ad materiam, nec ibi arguitur ab affirmatiua de prædicato infinito ad negatiuam de prædicato finito.

Quarta conclusio. Aliquis spasmus est de repletionem & inanitione. Quinta conclusio. Aliquis est spasmus non proportionatus ad materiam de repletionem & de inanitione, quarum deductio facilius patere possit. Ex his patet, quod spasmus de inanitione habet unam causam priuatiuam, scilicet consumptionem humiditatis, & positiuam alteram immediatam incrementum siccitatis. Contra, si per siccitatem fieret spasmus, tunc hæctici tertiæ speciei omnes spasmiarentur, cum in ipsis sit facta ultimata exiccatio qua deducuntur ad mortem. Ad hoc dicitur multum interesse inter siccitatem quæ facit spasmum, & quæ facit hæcticam tertiæ speciei, nam ista est uniformis ferè æqualis per totam nerui substantiam ex eo quod inducta est paulatim. Illa uero quæ facit spasmum non est uniformis per totum, nec æqualis in toto neruo, ex eo quod ab agente uiolento in paruo tempore inducta est, unde magis exiccatur una pars nerui quàm altera, fit ergo contractio & applicatio in parte, scilicet minus exic-

cata, sicut in corio proiecto super prunas fit contractio una parte magis exiccata quàm altera, ubi si in sole aut in loco calido diu stetit, & multum fuisset exiccatum, non fuisset contractum, sicut & lateres cum coquuntur in fornace ab igne dulci non torquentur, sed ab igne nimis fortiter contorquentur. Sed contra, neruus est æqualiter dispositus per totum, agens fortiter, ut puta calor causonis potest omnibus partibus equaliter applicari, ergo non spasmiabitur. Præterea, si in hæctica est per totum uniformis exiccatio totum deberet equaliter contrahi, & sic fieri tetanus. Dicitur causas resistentes exiccationi nerui in causone non esse æquales, cum pars nerui aliquando sit circumuoluta membris humidioribus, siue iuxta posita: alia pars membris siccioribus, quare non æqualiter resistit per totum, neque etiam uapores febriles æqualiter omnibus partibus applicantur. Ad secundum dicitur, quod si fieret contractio in hæctico, tunc spasmus ille esset de inanitione, & similiter si corpus extensum & inflexibile humido ferè uniformiter in omnibus partibus neruosis exiccato, tunc esset tetanus. Sed dico nullam fieri contractionem notabilem, neque extensionem ad spasmandum sufficienter, aut ad tentandum.

Secunda distinctio est, aliquis spasmus est in fieri, ut quando actualiter fit contractio, aliquis est in facto esse, ut quando membrum post contractionem remanet contractum, tunc enim est quies ubi dum fiebat erat motus. Et ex hac distinctione sequuntur istæ conclusiones. Primò, Aliquis est spasmus fiens, qui tamen est morbus factus, ut puta spasmus de inanitione cum est in fieri, & complebitur etiam remota omni causa conseruante ipsum sicut febre, fluxu, & similibus. Est enim morbus factus, quia independens. Est tamen spasmus fiens cum actualiter fiat contractio. Secundò, quod aliquis est spasmus factus, qui tamen est morbus fiens cum ad remotionem causarum sit aptus remoueri, neque à seipso conseruabilis sit, ut patet in spasmō de repletionem facta & curabili. Tertia distinctio. Aliquis est spasmus proprius sicut est superius descriptus. Alius improprius, scilicet singultus, quia in stomacho non est musculus, aut aliud principium motus uoluntarij. Quarta distinctio. Aliquis est spasmus fortis adeo, ut ceruix contorqueatur & strideat dentes. Aliquis debilis sicut oscitatio & aliquis uniuersalis in toto qui non differt ab epilepsia, nisi quia est cum sensu intrinseco & extrinseco. Aliquis est particularis, et in una medietate, aut aliquo membro particulari. Aliquis est spasmus ad posteriora, & dicitur opisthotonus. Aliquis est ad interiora, & dicitur emprosthotonus. Aliquis ad utrumque et dicitur tetanus. Ad latera autem rarissimè evenit, cum in lateribus pauciores muscoli & nerui sint situati. Et harum diuersitatum causa est secundum quod causa spasmi est in diuersis locis sicut dictum fuit in paralyti. Et quicumque istorum aut est in initians, aut succedens ad alias ægritudines sicut ad synnachen, pleuresim, sirsen, & similia.

Causæ spasmi non proportionati ad materiam sunt accidentia animæ sicut timor & tristitia, solutio cōtinui, frigus nerui ex uulnere discooperiti, putredo, dolor, punctura animalis uenenosi, comestio & applicatio rerum uenenosarum, & comunicatio facta neruis ab alijs membris, siue absoluta, siue non absoluta, dummodo nerui non lædantur per essentiam, & magis spa-

smantur nerui ex communitate stomachi & matricis quàm propter alia membra. Spasmi de repletionem causæ sunt phlegma, ut in pluribus, deinde melancholia uel sanguis, rarissimè cholera, siue humores apostement neruum siue non. Et aliquando est uentositas, & est ex his quæ ueniunt in hora & remouentur in hora, & uulgariter uocatur gramfo. Causæ antecedentes sunt idem humores non actu inhibiti, aut apostemantes neruos. Causæ primitiue sunt crapula, ebrietas, somnus super satietatem. Exercitium fortè corpore pleno, retentio euacuationum etiam consueta, ingredi etiam balneum corpore pleno, liquefactio humiditatum à febre, & similes. Causæ spasmi de inanitione sunt febres fortes, ieiunia, uigilia, accidentia animi fortiter exiccata, fluxus uentris, & aliæ euacuationes fortes, & cætera præter modum exiccantia.

Signa distinctiua inter spasmodum & epilepsiam sunt, quia epilepsia est communis toti, & resoluitur uelociter, & est cum periodicis & non fit ex inanitione & aufert sensum. Spasmus uero in his ipsi opponitur, licet tamen spasmus dicatur epilepsia membri, sicut epilepsia est spasmus totius corporis & simulatur in motibus contractiuis, &c.

Signa prognostica sunt dispositiones corporum.

Primum, pueri sunt ad omnes spasmos maximè dispositi. Et etiam ab omnibus maximè reuocabiles. Iuuenes ad spasmum non proportionatum sunt proniores quàm senes. Corpora sanguinea & cholericæ sunt proniora ad spasmum quàm phlegmatica aut melancholica. Secundum, tremor & dolor circa collum & iuncturas nunciat spasmum, pulsus chordosus, & propriè cum diuersitate est nuncius spasmi. Tertium oculi contorsio & facies in modum ridentis est nuncia spasmi: fit enim ex contractione partium faciei, tremor manus ægri occultus, qui aliquando percipitur à medico solerti dum tangit pullum pronunciat spasmum, anhelitus difficilis intersectus, suspiriosus, quia non potest dilatari pectus propter contractionem diaphragmatis & musculorum, & huiusmodi nunciat spasmum. Signa concordantia habes 6. Aphor. Aphor. 54. In acutis passionibus cum febre luctuosa suspiria malum. Stipticitas uentris propter contractionem musculorum ani aut matricis ad superiora deriuatis. Retentio urinæ aliquando, & aliquando emittitur cum sanguine mixta propter debilitatem renum, aut fortem expressionem singultus. Soda, tremor & dolor prænunciant spasmum, stridor dentium, contractio cutis capitis. Signa demonstratiua est ipsa actualis contractio uel contractum esse, pulsus tensus diuersus in modum sagittæ ascendens in medio sui motus, & descendens in fine, & humilis in principio, in quo non apparet manifesta diastole propter nimiam tensionem, unde oportet fieri pulsus uelociores & frequentiores. Item arteria est calidior alijs membris calido spumoso ignito propter prohibitam transpirationem. Differt autem hic pulsus à pulsu principij paroxysmi, cum hic sit tensior et magis manifestus. Signa spasmi non proportionati ad materiam sunt causæ ipsæ, de quibus præcessit sermo. Signa uero spasmi de repletionem sunt eius causæ. Distinguitur inter sanguineam & phlegmaticam per signa sæpius dicta. Et causæ primitiue seipsam significant. Signa spasmi de inanitione, est quia paulatim

fit & præcesserunt causæ, scilicet inanientes. Prognostica. Primum, omnis spasmus uniuersalis ex uulnere est mortalis. Secundum, spasmus de inanitione cui in principio non resistitur est mortalis. Tertium, spasmus ad posteriora est cæteris deterior. Quartum, habetur quarto Aphor. In feb. non deficienti si labium aut oculus, aut supercilium, aut nasus distorqueatur, aut non uideat iam debili existente corpore quodcumque horum fiat iam est propè mors. Quintum, Ventositas multiplicata cum tremore uentris, mortem significat. Sextum, Saltus superfluus arguens multitudinem uentositatis malum. Septimum, Spasmus non proportionatus ad materiam, nisi sit uniuersalis ex uulnere secundum plurimum est salubre.

DE TETANO. Cap. XIII.

Tetanus, quasi totum tenens à tetano græco nomine deriuatus. Est secundum Aui. secunda tertij cap. proprio, egritudo officialis prohibens uirtutem motiuam à contractione membrorum, de quorum aptitudine est, ut contrahantur propter nocumentum in lacertis & neruis. Est enim tetanus morbus in situ & in figura, & propterea officialis, id est, compositionalis, uel membri officialis, id est, organici. Nam licet sit passio neruorum: est tamen principaliter organica, quia principaliter & immediatius sunt ad motum ordinata secundum humanam necessitatem, nec unquam est in neruis quin sit in organici. Dicitur prohibens uirtutem motiuam à contractione membrorum, ad differentiam spasmi, cuius est membra contrahere, & subditur propter nocumentum in lacertis & neruis, &c. ad differentiam priapismi in quo non est læsio neruorum nec lacertorum uirgæ, sed sola ipsa tenditur ex multitudine uentositatis crassæ replentis uenas & arterias. Contra sequitur quod tetanus non differt à paralyti. Dicitur, quod tetanus prohibet uirtutem motiuam à contractione membrorum cum ipsorum extensione, paralyti uero cum ipsorum mollificatione, propterea diffinitio est supplenda. Et propter hoc etiam differt à spasmo in facto esse. Alcuzez uero dictio arabica uarijs modis accipitur, ut uult Aui. in cap. de tetano. Quandoque pro spasmo musculorum surlæ. Quandoque pro spasmo oculi. Quandoque conuertitur cum tetano. Sed propriè acceptus Alcuzez est tetanus à causa frigida, & à uentositate proueniens, licet Aui. in capitulo proprio, & similiter ceteri authores sint multum uarij in usu horum terminorum accipientes frequenter unum pro altero.

Species tetani sumuntur, sicut species spasmi. Est enim quidam non proportionatus ad materiam pendens ex eisdem causis, ex quibus pendet spasmus non proportionatus ad materiam. Et quidam tetanus est proportionatus ad materiam duplex existens, de repletionem & de inanitione. Et causæ sunt eadem, nisi quia in tetano sunt duo spasmi diuersorum musculorum & neruorum ad oppositas partes siue differentias trahentium, imo duo tetani per quorum extensionem membrum remanet rectum & extensum ad nullam differentiam contractum, sicut si esset nocumentum in musculis anterioribus & posterioribus, aut si solum unus neruus aut musculus sit læsus, ille est læsus uniformiter per totum, exempli gratia, materia penetrante per riuolos

bulos nervi in totum nervum, unde non magis contrahibilis est ad unam partem quam ad aliam, sed in spasmō erit in una parte incrassans illam, & per consequens trahit ad se reliquam partem. Sed contra, si materia existens in una parte nervi, dilatans illam est causa abbreviationis nervi secundum longitudinē, multo magis existens in toto nervo & dilatans illum erit causa abbreviationis eius. Ad hoc dicitur negando consequentiam, quia omnis pars erit æqualiter extensa, sicut in marisupio undiq; æqualiter extenso secundum longitudinē & latitudinē, non magis contrahetur secundū longitudinē q̃ latitudinē, sed secundum omnē differentiam extendetur & maiorabitur, & secundum hunc modum membra undiq; apostematata ut non flecti possint dicuntur tetanata. Sunt enim secundum omnem differentiam magnificata, & similiter potest esse tetanus de inanitione membro uniformiter exiccato & non contracto, cuius causæ sunt eadem quæ spasmī. Et sic aliquando videmus brachium aut crus arefactum inextensibile. Et similiter erit tetanus non proportionatus ad materiam ex similibus causis contingens, ex quibus provenit spasmus, sicut ex causis primitivis, ut cū homo dormit super re dura, aut in somno unū membrum comprimit alterum, aut aliquod membrum sine extenditur aut percutitur taliter ut membrum non potest flecti, sicut aliquando ex similibus causis membrum spasmat, & non potest extendi. Alcuzez autem propriè sumptus provenit, aut ex frigidityte sine materia cōgelante, aut ex materia frigida crassa undiq; equaliter membrum extendente, siue apostemet, siue non, & similiter à ventositate, unde si materia paralyti cōgeletur, aut resolutis partibus subtilibus incrassetur, taliter, ut membrum remaneat extensum, ex paralyti fiet tetanus, siue alcuzez. Tetanus etiam aliquando fit incipiendo, aliquando succedit alijs agitudinibus, sicut synache & pleuresi, quemadmodum dictum est de spasmō.

Signa sumuntur eodem modo sicut dictum est in spasmō. Veruntamen ex signis prognosticis tetani est saltus plurimus, gravitas sermonis, durities in lacertis, & dolor in partibus sphondylium usq; ad alolos, & difficultas deglutendi, & cum scalpitur non delectatur. Secundum, urina sicut putredo & virus cum horripilatione & tenebrositate in visu, sudore in capite & ceruice significat extensionem in utrisque lateribus futuram. Tertium, cum tetanus communis incipit claudatur os, rubescit facies, fit dolor fortior & non potest sorbere, multiplicatur palpitatione, & lachrymantur oculi. Et differentia inter tetanum & spasmum in principio sui est, quod spasmus in lacertis incipit cum motu: tetani uero principium est in lacertis cum quiete. Cætera signa demonstratiua specierum eius & suarum causarum sunt similia his, quæ dicta sunt in spasmō.

Prognostica. Primum, tetanus est agritudo acutior cæteris paribus quam sit spasmus, & magis pernitiōsa cum sint duo spasmī, unde iuxta Aphorismū quintæ particulæ. Quicunq; à tetano apprehenduntur, in quatuor diebus pereunt. Verum spasmus de inanitione est deterior quam tetanus, quia contrahit secundum omnē dimensionem. Secundum, ille tetanus est malus quem præcedunt febres inseparabiles

cum inquietudine fletu & alienatione, & sit color citrinus propter eas, et exiccatur os et labiū, denigratur lingua et exasperatur cutis, & extenditur: est enim ex inanitione. Tertium, Omnis tetanus à percussione cui associatur singultus et permixtio rationis est mortalis. Sed circa dicta in litera dubitatur, quare spasmus nō est ita periodicus sicut epilepsia, cum tamen epilepsia sit spasmus uniuersalis. Respondetur quod aliquando sunt spasmī particulares periodici, ut quedam mulieres spasmanur in manibus secundum periodos aggregationis materierum in matrice, ut Galen. in libello de spermate, cap. 2. Secundo potest aggregari in alio membro materia per congestionem, uel quod ipsa recipiatur ab alio membro in determinato tempore quæ erit factiua spasmī periodici. Dico tamen quod epilepsia per essentiam est periodica frequentius quam spasmus, quia fit ex defectu cerebri, & multa malitia ipsius cuius defectus non corrigitur nisi à corde & epate, cum cerebrū sit membrum principale, neq; potest recipere correctionē per exterius applicita, sicut membra particularia extrinseca, propter profunditatem & distantiam ipsius cerebri, & propriè secundum uentriculos eius in quibus hæc materia continetur. Alia uero membra facilius corriguntur tam in membris principalibus quam nō principalibus. Et uirtutes medicinarum melius in membris particularibus penetrant ad profundum. Epilepsia etiam per communitatem est frequentius periodica, cum læsio cerebri etiam non ualde magna sit factiua epilepsie, in qua cerebrum contrahetur. Aequalis tamen læsio perueniens ad nervos, non facit ipsorum contractionem. Est enim natura quæ facit huiusmodi cōtractionem tam in nervis, quam in cerebro, ut expellat à se nocumentum magis sollicita de cerebro, quam de nervis: non est enim negandū aliquem spasmum particularem esse magis periodicum certa epilepsia per communitatem.

CVm aliquod membrum alicuius contrahitur, & ad suā redit originem, aut plura ex membris sic disponuntur, spasmatæ esse pronuntiabimus. Spasmus aut subito, aut paulatim inuadit. Spasmo aut subito euenienti eadem preparanda est cura, quam in paralyti conferre diximus. In eo tamen fricatione manuum & inunctione ex oleo castino plus utimur. Spasmus uero qui non repente, sed suauiter accidit post febrem, aut post multam uentris solutionem, aut multum uomitum, aut sanguinis fluxum malus est & uix curabilis. Quicquid tamen accidit, ei mederi incipiemus. Aegro namq; hordei aquam, & iura unctiosa, & mollia ministrabimus, & in

aquam dulcem tepidam ipsum mittemus, & unguemus ex oleo uiolaceo tepido, & oleo de seminibus cucurbitæ, & præcipue neruorum radices, in quibus spasmus existit. In tina quoque diu moretur & ex oleo uiolaceo inungatur. De uino bibat patiens parum, quod tamen multum habeat aquæ admixtionem. Et cibis nutriatur humidis.

Diuiditur hoc capitulum de spasmis in tres partes. In prima ponit signa spasmi sumpta ex quiditate ipsius. In secunda ibi. scilicet. Spasmus autem. Ponens unam distinctionem spasmi curat spasmus de repletione. In tertia ibi. Spasmus uero, &c. Curat ipsum spasmus de inanitione. Prima pars est manifesta ex dictis. In secunda parte primò ponit hanc distinctionem. Spasmus autem accidit subito, & est de repletione aut paulatim, & est de inanitione. Sed ipsi spasmis subito euenienti eadem properanda est cura, quæ superius dicta est in paralyysi, cum sit de repletione. Est tamen hæc differentia, quia in spasmis indigemus amplius fricatione & inunctione cum manu ex oleo costino superius descripto in paralyysi, cum humor sit crassior. Debemus etiam flectere ipsum membrum ad oppositum illi differentie ad quam contrahitur. In tertia parte dicit, quod spasmus qui non repente, sed paulatim accidit post febrem, aut multam uentris solutionem, aut multum uomitum, aut sanguinis fluxum est malus & uix curabilis, imò non potest curari nisi in principio. Curat autem ipsum cum rebus humectantibus interius & exterius applicitis, quæ qualitatiue & substantificè humectant. Et hæc secundum plurimū debent esse frig. minus tamen frig. quàm hum. Et omnia quæ dicit sunt manifesta. Concedit tamen uinum multæ aquæ admixtum, quod debet esse nouum, nutriendo enim humectat substantificè. Et cum hoc facit aquam multam quæ ei admiscetur ad extrema corporis penetrare, quapropter humectat etiam qualitatiue. In spasmis tamen de repletione debet esse uetus iuuas ad materię resolutionem. Cura spasmi de repletione quatuor exigit intentiones curatiuas. Prima ordinat debitum regimen. Secunda euacuat materias communes & causam antecedentem etiam diuertendo. Tertia resoluit causam coniunctam membra confortando. Quarta corrigit accidentia. Aer ergo iuxta primam intentionem declinet ad calidum & siccum. Dieta similiter declinet ad siccum, & sit ualde tenuis præcipue in spasmis uniuersali, ita ut sint cõtenti aqua mellis aut sacchari, aut pro cibo sumant panatam cum pauco saluie minutim incisæ, aut ouū unū cum saluia, aut brodiū cicerū cum saluia, & similibus. Caueant à carnibus & uino, nisi fortè parum uini antiqui concederetur ad materię resolutionem euacuatione iam præcedente. Declinante tamen ægritudine utatur carnibus facilis digestionis declinantibus ad siccum sicut perdiciis, & similibus. Et reliquum regimen seruetur, ut supra in paralyysi. Secunda intentio, scilicet euacuatio perficitur cum phlebotomia, si sanguis aut humorū mul-

titudo sit in causa. Quæ phlebotomia iuxta sententiam Auicennæ non sit multū copiosa tum ut calor innatus non debilitetur qui est principale resoluens, tum etiam quia nerui sunt frigidi. Et fiant aliæ euacuationes secundum exigentiam humorum peccantium, sicut dictum fuit in paralyysi. Attende tamen quod in spasmis uniuersali est necessaria festinatio, nec oportet præmittere digestiua, neque tardare sicut tardatur in paralyysi. Interficet enim frequenter à prima die usque ad quartam. Euacuatio autem fiat cum clysterijs leuibus aut acutis, & ceteris generibus euacuationum sicut dictum fuit in paralyysi. Vbi autem daret inducias ante digeratur materia, & seruentur canones superius dicti in paralyysi. Ad fortiora tamen digerentia & euacuantia est ceteris paribus citius procedendum, quàm in paralyysi, cum materia sit crassior. Digestiua & euacuantia illic requirantur in cap. de paralyysi. Tertiò intentio, scilicet causæ coniunctæ resolutio & membrorum confortatio, maxime cerebri & neruorum perficitur cum interius & exterius applicitis. Sed attende quod quantum ad exterius applicita differt cura spasmi à cura paralyysi, quia in spasmis debent esse aequaliter mollificantia, quia materia est crassa, & membra indigent erectione uersus figuram naturalem. Primum, ex cõuenientibus proprijs est ren contritus cum pinguedine sua, sed propriè uulpis aut lupi, & applicitus debetè calidus origini neruorū & loco spasmato. Secundum, est pelis uulpis & lupi, ex qua cum calore suo actuali dum nouiter facta est excoarctatio æger circundetur, similiter inunctio cum adipe luporum & uulpium. Item sessio in aquis decoctionis luporum, uulpium, & sigillatim, & coniunctim, præcipue si cum eius decocta fuerint aliqua propria, sicut abrotonum, anethum, folia lauri, hyssopus, stecas arabica, & similia. Oleum quoque de lilio est ad hoc præcipuum. Lana quoque succida super locis spasmatibus præcedentibus prius unctionibus est cõueniens. Vnguentum quoque factum ex styraceliquida. 3. 1. oleo de lilio. 3. 2. euphorbiæ, castorei, an. 3. 1. ceræ quantum sufficit, est cõueniens. Similiter oleum uulpium, & oleum de costo, descriptione Mesue. Fortius autem iam dictis est oleum de costo, descriptione Rasii. Balnea quoque et propriè sulphurea sunt ad hanc intentionem. Sed ex interius sumptis sunt diamuscum, diambra, theriaca, mithridatū, acori conditi, & diacorum, &c. Vltimum uero est confectio anacardina febrem prouocans, de qua superius in paralyysi. Quarta autem intentio, scilicet, correctio accidentium perficitur educendo feces, aut urinā si fuerint retentæ, cum eis quæ dicuntur in proprijs capitulis, & subueniatur in difficultate anhelitus cum unctionibus dilatantribus musculos, & positione ægri si oportuerit in balneo olei, cuius mandibulæ etiam uiolenter aperiantur si strictæ fuerint. Et reliqua accidentia curantur secundum propria capitula. Cura spasmi de inanitione perficitur cum frigidis & humidis secundum totum regimen sex rerum non naturalium, præcipue aeris tam inspirati quàm circumstantis. Sed tamen secundum plurimum maius studium debet esse in humectando quàm in frigidando. Hæc autem applicentur extra & intus secundum omnem modum, & sint humectantia quæ intus approxinantur tam qualitatiue quàm substantificè.

Vnde

Vnde cōuenit balneum ex lacte aut ex aquis in quibus cōcta sint folia salicis, hordeum fractum, uiola nenufar cucurbita, citruli, aut fiat tota tina ex succo cucurbitæ, aut ex aqua ros. in qua decoctum sit aliquod horum, aut ex aqua melonis indi, & similibus. Et fiant clysteria ex rebus similibus additis quibusdam impinguantibus, sicut oleum uiolaceum, nenufarinum, aut pinguedo porci lota pluries cum aqua frigida. Et ex oleo uiolaceo inungantur iuncturæ & totum dorsum, aut ex oleo nenufarino, aut salicis, & cum istis permisceri potest pinguedo porci recens, lota pluries cum aqua frigida, & infirmo detur lac recens secundum mensuram cōuenientem, quam possit digerere febre non existente. Sed presente febre detur aqua hordei, aqua cucurbitæ, aqua melonis Indi cum iuleb uiolaceo, aut simili. Et si cum istis miscatur parum uini albi subtilis unius anni tantum dulcis aliquantulum, aut saltem non acris erit conueniens, & quiescat & multum dormiat, & non fiant euacuationes nisi naturales & leues, & gaudeat, & maximum studium etiam habeatur in humectatione cerebri embrocado & unguendo commissuras capitis, & totum caput, & instillado huiusmodi in auribus & naribus, & utatur contuso & brodio consumpto in quo cōcta sit cucurbita, lactuca & similia, & si qua acciderit superuenerint, corrigantur secundum exigentiam.

Cura spasmi non proportionati ad materiam. Si fuerit à uulnere sedetur dolor & procuretur sanies, ad quod optime ualet emplastrum de malua uisco cum oleo ros. exterius applicitū, & terebinthina lota cum uitello oui in uulnere applicita, & tota nucha ungatur & fomentetur cum humectantibus temperatis in actiuis, sicut est oleum amigdalorum dulcium. Et si fuerit febris addatur parū olei uiol. Et si fuerit à punctura uulnus aperiatur, & cum incisione donec uirus transpirat, & in punctura instilletur sulphur, aut parum euphorbij dissolutum cum oleo rosaceo & terebinthina, & factu notabiliter calidum. Et caratim siue uermes terrestres cocti in oleo rosaceo, & appliciti optime conferunt: & si fuerint à putredine alicuius membri uulnerati, optimum remedium est cauterium actuale super parte putrida. Et si fuerit à frigiditate loci uulnerati, locus & partes circumstantes fomententur cum pannis insulis in oleis calidis ad hoc proprijs, sicut oleo decocto, & de croco. Et si fuerit ab apostemate, curetur apostema secundum quod oportet semper mitigando dolorem cum unctionibus & emplastris, & infundendo membrum in oleo, & similibus. Et in omnibus his attendendum est originem neruorum cum humectantibus secundum plurimum temperatis in actiuis: imò frequenter oportet ponere agrum in tina ex oleo communi, & cum exit à tina induere ipsum camisia, & caligis suffultis lana succida. Et si fuerit à ueneno aut à punctura uenenoformi, cura requiratur sexta quarti, & à Rasis 8. huius, & origines neruorum fomententur cum humidis declinantibus ad calidum aut ad frigidum secundum exigentiam rei uenenosæ. Et si fuerit à cholera prassina in stomacho, aut alio humore, uomitu, aut secessu ducatur, & si fuerit à cōmunitate aliorū membrorum, sicut matricis aggritudines illius membri curentur secundum quod oportet. Dieta autem debet esse tenuis & declinans ad calidum, aut ad frigidum

secundum exigentiam causæ, & accidentia curentur secundum quod oportet.

Cura tetani est eadē quæ spasmi à simili causa. Verum indiget ut magis festinetur, quoniam est acutior quàm spasmus. Et ex his quæ ualde conueniunt est ut ferueat succus anethi, & mittatur in ipso catulus talis, id est, catulus canis aut uulpis, & decoquatur donec dissoluatur, & infundatur eger in decoctione eius bis, aut quantum uel quotiens oportet. Et si non haberetur tanta quantitas succi, ut in ea posset ager infundi, habeantur petiæ quæ in tali decoctione infundantur, & loco nuchæ aut membro tetanato superponantur. Et sic est finis huius cap. de spasmo & tetano.

DE EPILEPSIA. Cap. XIII.

Epilepsia græcè quasi comprecisio dicitur uel captiuitas latinè, ex eo quod secundum Alexandrum tenet omnem sensibilitatem captiuam. Dicitur morbus caducus, ex eo quod cadit patiens ob eam. Dicitur morbus comitialis, eo quod si aliquis hoc morbo in comitijs caderet, comitia ad aliam diem transferebantur. Comitia uero dicebantur cōuentus uniuersi populi Romani, Calendis Ianuarij in campo Martio ad magistratus creandos. Dicitur morbus lunaticus ex eo quod secundum morum lunæ commoueri uideretur. Hanc alij uocant *ἑρπεύου*, id est, sacrum morbum, eo quod sacram partem corporis possideat, scilicet cerebrum in quo animam habitare dicunt. Alij *ἡρκεύου*, id est, herculeum eo quod Herculem ferūt hoc morbo laborasse, uel quia sit fortis in posternando homines sicut Hercules. Dicitur etiam comestalis, quia comestiones, crapulæ, ebrietates sint ipsius causæ. Et *πρόνους*, eo quod facillè pueris accidit: nam *πρόνους* græcè puer latinè dicitur. Et propter hoc à quibusdam infantilis uocatur. Ab Auicenna uero cap. proprio. mater puerorum. Epilepsia ab Auicen. sic describitur: est enim aggritudo prohibens membra animata ab operatione sensus & motus, & erectione non integrè propter oppilationem contingentem. Est quidē aggritudo in figura & in situ tam pro positione quàm pro societate. Prohibens membra animata, id est, in quibus uiget uirtus sensibilis aut motiua. Ab operatione sensus & motus, & erectione non integrè, eo quod si fortis sit, tollit omnem sensum interiorem & exteriorem, licet non omnem motum, posthibet tamen ut corpus possit erigi, imò si sit rectum stare non potest, sed in terram cadit. Si uero sit debilis remanet aliquid sensus interioris, scilicet cogitatiuæ & memoriæ, ex eo quod minus læduntur quàm sensus communis, cum magis lædatur uentriculus anterior quàm duo posteriores, cuius oppositum est in apoplexia. Et additur propter oppilationem contingentem, scilicet in cerebro. non enim absoluitur epilepsia ab oppilatione cerebri, & propterea etiam dicitur morbus in uia.

Cum aliquis cadit in terram, & torquetur & commouetur, & intellectum amittit, dicimus ipsum epilepticum fore, Quod si spuma exit per os, aut se com

mingit, aut sperma egreditur, aut egestio, passio tunc est grauior & uehementior.

Diuiditur præfens capitulum in duas partes. In prima ponit signa epilepsiae. Secundo curam. secunda ibi. Si autem æger. Prima in duas. Primo ponit signa epilepsiae in generali. Secundo signa fortitudinis eius. secunda ibi. Quod si spuma. In prima parte ponit tria signa. Primum est, quod cadit epilepticus si rectus sit. Secundum est, quod post casum commouetur, scilicet motibus quibusdam spasmodicis. Tertium est, quod intellectum amittit, id est, omnem sensationem interiorem uel maiorem partem, & similiter omnem sensum exteriorem præcipue auditum & uisum, licet forte aliquid tactus in parua epilepsia possit remanere. Hæc enim omnia sunt spiritu sensibili & motiuo non debite potestate transire per uentriculos, neque deferri ad membrum propter oppilationem. In secunda parte ponit signum fortitudinis epilepsiae, quod est exitus spumæ per os, uel urinæ egredi, aut sperma, aut egestionem, & supplete alias euacuationes, scilicet sanguinis per os aut nares. Hæc enim omnia arguunt fortem spasmus propter quem pectus non potest dilatare, & calore succenso in spiritalibus prohibita euacuatione fit spuma, de qua in apoplexia sufficienter dictum fuit. Aliæ similiter euacuationes fiunt propter fortem spasmus & compressionem musculorum uentris super intestina, & uesticam ad quam sequitur expressio urinæ & fecum. Similiter ad fortem contractionem uasorum spermatis fit ipsius effusio, & ad fortem contractionem cerebri sequitur expressio sanguinis per nares & colatorium: non tamen hæc omnia in omnibus fiunt, sed quedam in quibusdam secundum corporum dispositiones.

Quia epilepsia est spasmus uniuersalis secundum plurimum, uel non fit sine eo, sicut spasmus particularis est epilepsia membri particularis, propterea species epilepsie sunt ferè eadem cum speciebus spasmi. Prima diuisio, est enim quedam species non proportionata ad materiam, & est secundum plurimum. Et quedam proportionata ad materiam. Et hæc est de repletionem, & non de inanitionem, quia epilepsia non potest fieri à siccitate cerebri tantum, primo quia fit subito, sed spasmus siccus non fit subito. Secundo, quia cerebrum non posset tantam siccitatem tolerare ut multum spasmetur quin moriatur corpus prius, cum cerebrum sit membri principale. Secunda diuisio est, quia alia est à principijs generationis, alia ex tempore, & hæc est antiqua, aut noua. Item alia est fortis, alia debilis, alia materialis, alia immaterialis. Aliqua fit incipiendo, aliqua permutando ex alijs egritudinibus, ut melancholia, incubo, & similibus. Item aliqua non periodica, aliqua periodica & cum periodis ordinatis aut non ordinatis, alia cum motibus spasmodicis, alia sine

Causæ epilepsiae quedam sunt primitiue sicut percussio, aut in capite, aut in aliquo membro neruoso, aut morsus animalis uenenosus, aut sumptio, aut applicatio medicinae uenenosæ. Similiter ex sex rebus non naturalibus aer nimis frigidus, aut putridus, aut plenus fumis malis sicut aer plenus fumis eleuatis à carbonibus non potentibus transpirare, lumen intentum subito occurrens, Auditus sonorum ingentium et hor-

rendorum, crapulae, ebrietates, & nimia fames, somnus nimius, retentio euacuationum consuetarum, nimia quies, nimius motus, & proprie post repletionem. Coitus plurimus & nimia abstinentia ab eo, timor nimius, nimiaque tristitia. Sunt etiam quedam quæ à proprietate excitant epilepsiam, aut si epilepsia sit occulta ipsam manifestant sicut comestio apii & epatis hircini, mirra quoque & suffumigium cornu caprini detegit epilepsiam. Indui quoque pelle hirci nouiter excoiati, aut quæ aliquanto tempore steterit infusa in aqua excitat epilepsiam. Causæ corporeæ per essentiam in cerebro sunt dolor fortis aut mala complexio siens fortis, aut solutio continui. Causa autem immediata omnis epilepsiae est oppilatio coarctatoria, aut ex uapore uentriculos implente, & origines ipsius nuchæ & neruorum, aut ex materia phlegmatica secundum plurimum, secundo melancholica. tertio sanguinea, rarissime uero cholericæ. Verum semper oppilatio est causa immediata. Remotior secundum plurimum uapor aut uentositas. Et adhuc remotior sunt humores à quibus uapores & uentositates eleuantur. Oppilatio uero attenuatoria fit ab eisdem causis in meatibus, non in uentriculis, secundum plurimum uero fit ab ipsa uirtute contrahente cerebrum stimulata à re præter naturam, siue sit per essentiam in cerebro, siue aliunde communicata. Et propterea secundum plurimum epilepsia est cum motibus spasmodicis, quia ad contractionem cerebri, sequitur etiam contractio neruorum. Et propterea secundum plurimum non est proportionata ad materiam. Epilepsia uero facta ab oppilationem coarctatoria, non concurrente uirtute ad contrahendum cerebrum, est secundum plurimum sine motibus spasmodicis. Causæ autem epilepsiae per communiter sunt, aut à toto sicut in febribus, aut crisi, aut à stomacho propter fortem dolorem, aut fortem famem, & est communitas absolute, aut propter presentiam humoris calidi aut frigidi in eo communicantis uapores cerebro communitate non absoluta, aut est ab epate, aut splene, aut ab intestinis, sicut in uermibus, aut dolore forti, aut à mirach, aut à renibus, aut à uelica, aut à matrice & est frequenter, aut à quocunque alio membro particulari, ita ut à pollice pedis per sæpe eleuentur uapores ueneni, qui dum attingunt caput faciunt epilepsiam. Verum à matrice frequenter fit dispositio mixta ex syncopi & epilepsia, ipsis uaporibus nunc magis cordi, nunc magis cerebro communicatis. Et quandoque æqualiter: uapores tamen spermatici sunt deteriores quam menstrua, & quandoque à uasis spermaticis uiri, cognoui eleuari uapores à spermate alterato facientes epilepsiam fortem sine motibus spasmodicis, qui tandem cum debitis auxilijs sanitati restitutus est. Signa quidem quibus differt spasmus ab epilepsia superius dicta sunt. Differt autem apoplexia ab epilepsia, quia epilepsia est cum motibus spasmodicis secundum plurimum qui non sunt in apoplexia. Differt autem epilepsia sine motibus spasmodicis ab apoplexia, quia epilepsia secundum plurimum cito soluitur, & est cum paroxysmis, & rarissime terminatur ad paralyfim, apoplexia si fortis sit interficit, si debilis terminatur ad paralyfim ferè semper. Differentia uero inter epilepsiam fortem sine contractionibus spasmodicis quæ terminatur in paralyfim & apoplexiam debilem, quæ etiam terminatur in paraly-

paralyſim non eſt perceptibilis, ſunt enim ſerè eadẽ, & ab eiſdem cauſis prouenientes. Et ſi eſt ſignum diſtinctiuum illud ſumitur ab ætate. Signa uerò prognostica ſunt grauitas capitis, incubus, uertigo, & reliqua ſuperius poſita in apoplexia: ſi enim hæc ueniant in ſeneprognosticantur apoplexiam, ſi in pueris epilepſiã, ſi in medijs inter hos, nunc epilepſiã, nunc apoplexiam ſecundum corporis diſpoſitiones.

Signa demonſtratiua ſunt quæ dicta ſunt in textu. Item uiriditas uenarum quæ ſunt ſub lingua, cum hoc quod eſt prognosticum, eſt etiam ſignum demonſtratiuum. Signa uerò epilepſiæ per cõmunitatem ſunt nocumenta aliorum membrorum præcedentia, cum quorũ augmẽto multiplicatur diminutione diminuitur, ablatione auferitur, & etiam quia non fit ſubito, & æger ſentit paulatim aduentum eius, & eſt cerebrum incolume in ſuis operationibus niſi tempore paroxyſmi. Quando uerò eſt per eſſentiam ſunt ſigna his contraria. Membra autem his communicans cognoscitur per ipſius nocumenta, quæ autem ſint materiæ peccantes in capite cognoscitur per ſigna dominijs phlegmatis, melancholiæ, ſanguinis, cholerae, uentofitatis, & uaporum quæ sæpe dicta ſunt ſuperius, præcipuè in cephalæa. Cauſæ autẽ primitiuae ſunt ſibi ſigna.

Prognostica. Primum, Epilepſia à generatione rariffimè curatur. Secundũ, Epilepſia accidens pueris uſque ad quatuor annos ut plurimum interficit propter multitudinẽ materiæ & ſtructuram uiarum: oportet enim ſi epilepſia debet curari, ut cauſæ ipſius remoueantur ſi ſit materia per expulſionem ad nares, uel per colarorium, aut quod permutetur ad exterius, aut in paralyſim tranſeat, ſi ſint uapores aut uentofitates quod reſoluantur, ſi dolor quod mitigetur, ſi mala complexio quod æquetur. Tertium, Epilepſia accidens pueris poſt quartum annum frequenter curatur circa 14. aut 25. calore factio acutiori, & materijs paucificatis. Si autem his temporibus non curatur, deinceps nõ curabitur. Quartum, Epilepſia melancholica eſt cæteris deterior, licet rarius eueniens quàm phlegmatica. Quintum, Epilepſia eſt fortiffima cum qua ſunt fortes ſpaſmi, deinde quies longa cum prolongatione paroxyſmi: nec etiã remiſciſcitur caſus, & præcipuè ſi cum ea fuerit expreſſio alicuius ſuperfluitatis. Sextum, Epilepſia per cõmunitatem ſecundum plurimum ſanatur. Septimum, Aſſaphaphati morphaea, aut alia huiusmodi apparentia in cute capitis, aut partibus adiacentibus ſunt terminus epilepſiæ. Octauum, Quãdo paroxyſmi epilepſiæ continuantur in omni diſpoſitione interficit. Cura.

Si autem æger ante acceſſionẽ ſentit quafi aliquid ex aliquo ſuorum membrorum eleuari, & aſcendendo caput petere, & dein de ſyncopizatur & cadit, tunc oportet in hora qua ſentit illud antequam illud accidat membrũ à quo procedit fortiter ligare, prohibebit nanque hoc acceſſionem euenire. In

tẽpore uerò quietis corpus multotiens erit euacuandum cum pilulis cochijs. Et locus à quo exoritur paſſio ex ſinapi & pipere, & euphorbio ac melle anacardi erit epithymandus, & epithyma dimittendum erit donec ueſcitur, & ueſica rumpatur, & aqua qua in eis eſt collecta effluat. Ipſæ quoque non citò ſunt conſolidandæ, quinimo dimittendæ, ut quod in eis colligitur emanet, dein de conſolidentur: hoc enim huius ægritudinis omnino exiſtit ſalus. Ad ultimum uerò uentoſæ cum parua ſcarificatione ſuperponere utile eſt.

Hic ponit curam epilepſiæ. Et primò per cõmunitatem, ſecundò per eſſentiam in cerebro. ſecunda ibi. Quod ſi cum epilepſia. Prima pars in duas.

Primò ponit curam epilepſiæ per cõmunitatem à membris exterioribus. Secundò per cõmunitatem à ſtomacho, ſecunda ibi. Aeger uerò. Prima iterum in duas. Primò ponit curã epilepſiæ per cõmunitatem à membris exterioribus inchoante paroxyſmo. Secundò tẽpore quietis, ſecunda ibi. In tempore uerò quietis, &c. De prima parte dicit, quod ſi æger ante acceſſionem ſentit aliquid eleuari ab aliquo ſuorum membrorum & paulatim aſcendendo caput petere, deinde ſyncopizatur cum illud ad caput peruenit, tunc pro cura oportet, ut quamprimum ſentit illud eleuari liget membrum à quo iſtud eleuatur, fortiter ligatura, ſcilicet cum aliqua aluta fortiter ſtringendo membrum illud ſupra locum, à quo ille uapor incipit eleuari. Hæc nanque ligatura aut omnino prohibet paroxyſmũ epilepſiæ, prohibendo ſcilicet tranſitum uaporis uenenoſi, aut ſaltem minuet prohibendo ne totus uapor ad ſuperiora feratur. Vnde ſi uapor à manu eleuetur ligetur brachium, ſi à cubito adiutorium ligetur, ſi à pede tibia, ſi à genu uel infra ligetur coxa. Dicunt etiam quod ſi fiat ligatura infra locũ à quo eleuatur conſert diuertendo ad inferiora.

De ſecunda parte dicit, quod tempore quietis inter unum paroxyſmum & alterum erit multotiens euacuandum cum pilulis cochijs.

Sed hic nota duo. Primum, quod euacuatua debent habere duas conditiones. Prima, ut reſpiciant membrũ determinatũ, ad quod debet fieri euacuatio, unde fortè in caſibus iam dictis eſſet melius euacuare cum pilulis de hermodactilis euacuantibus à locis diſtantibus, & à iuncturis, aut ſi ſimul à cerebro & locis iam dictis bonum eſſet has pilulas adinuicem permiscere. Sed ut euacuetur humor determinatus peccans pilulæ cochiæ à prædominio euacuant phlegma. Si autẽ peccaret melancholia, oporteret etiam pilulas indas cum iſtis permiscere, & aliquando aureas, aut ſibi ſimiles cholera ſecum peccante.

Secundum, eſt ut ante iſtas euacuationes præcedant digeſtiua, non enim poſſet humor euacuari, & præci-

puè ineptus euacuationi, & propriè à locis distantibus, nisi præcedente digestionē, quæ etiam digestio debet respicere tam humores peccantes, quam etiam membra in quibus peccant.

Secundò, debet super loco à quo morbus exoritur apponi uesticatorium ex sinapi, pipere, euphorbio, ana 3. unam mellis anacardi, omnium, calid. in quarto, quantum sufficit ad incorporandum & hoc unguentum dimitatur super loco ab octo horis usque ad duodecim, scilicet donec locus notabiliter uesticetur, deinde uesticæ cum acurumpatur, ut aqua in eis collecta effluat, & sic conservetur ulceratio in loco, saltem per uiginti dies aut plures & iam reiterando uesticatorium donec materia quæ est radix ægritudinis sit eradica- ta, postea permittatur consolidari. Ventosæ quoque cum pauca scarificatione ad hoc sunt proficue trahendo materiam ad exteriora, aut ergo utrumque fiat, aut alterum tantum secundum materiæ exigentiam, sed materia existente sanguinea, fortasse uetiosæ plus conferrent, uesticatorium quo communiter utor, sit ex cantharidibus & fermento permixtis adinuicem cum aceto fortissimo, & loco superponatur ad quantitatem castaneæ. Et pes coruinus contritus ad hoc ualet, simili- militer ruta agrestis, sed est leuior. Et quando hæc non sufficerent propter materiæ distantiam à membri superficie, & propriè ubi non essent membra suspecta, sicut in coxa, natibus spatulis applicetur cauterium potentiale, & permittatur profundari secundum exigentiam, & teneatur apertum per 40. dies.

Ager uerò si ante accessionem nauseam aut tristitiam, aut cordis tremorem sentit. Et deinde ægritudinis accessio sequitur, cogendus est multotiens uomere ex aliquo uomitu. Deinde picram in potu saepe accipere conuenit. Stomacho quoque emplastrum ex spica, & rosis, & mastiche, & cortice thuris cum uino odorifero ponendum est. Nutrimentum uerò eius totum taliter statuendum est, ut paucarum sit superfluitatum sicut caro frigida in sartagine & caro cocta in caziolis, & cibus qui sit de aue quadam quæ habet in palato dentes, & uocatur taguid, & caro de uolatilibus & hoedina.

Ponit curam epilepsiæ per communitatem à stomacho, dicens quod si æger ante accessionem, id est, paroxysmum sentit nauseam, id est inclinationem ad uomitum aut tristitiam, id est conturbationem, aut anxietatem stomachicam aut cordis tremorem, id est, oris stomachi, quod antiqui cor appellauere, aut tremorem cordis per communitatem à stomacho, deinde sequitur paroxysmus epilepsiæ, debemus prouocare uomitum, aut cum impositione digiti in ore, aut pennæ, aut cum aliquo uomitiuo sicut ex succo uel

decoctione raphani, in quo steterit infusus elleborus per aliquot dies, sufficit tamen communiter dies una, ita ut de illo succo extractio elleboro sumatur. 3. res, cum. 3. duabus oxy mellis simplicis, et sumatur tepidum prius per horam præcedente comestione alagorum, aut huiusmodi rerum uiscosarum, & incidentium, & exquisitus fiat uomitus. Secundò hoc non sufficiente sumant hieram picram simplicem aut compositam, ut si quid remansit euacuetur. Tertiò confortetur stomachus ut bene digerat, & ne materiam aliunde recipiat cum hoc emplastro uel unguento. 3. spicæ calid. & sic. in primo, rosarum frigid. & sic. in primo, mastich. calid. & sic. in secundo, corticum thuris calid. & sic. in secundo, cum uino odorifero aggregetur, & si opus est oleo, addatur mastichinum, uel de spica uel cidoniorum, est tamen melius in modum menti absque oleo & cera cum phyltro infuso in uino & bene expresso, in quo suprascripta bene decocta fuerint æqualiter de ipsis sumendo. Quarto nutrimentum eius sit bonum, paucarum superfluitatum, declinans ad siccum, & propriè humore existente phlegmatico, & propterea carnes comedantur assatæ, aut frigida in sartagine, aut in caziolis quæ sunt magis curpæ, aliàs concuæ quàm sartagine, & sint faciles digestionis, sicut auis uocata taguid quæ habet dentes in palato, quæ non est in regionibus nostris, sed loco ipsius sint perdices, turdi, franguelini, phasiani, turtures, quæ augmentum faciunt in cerebro, & augent intellectum. Similiter caro hoedina & leporum iuuenum est adhuc conueniens.

Quod si cum epilepsiâ sensuum affuerit tenebrositas et debilitas, nec aliqua de prædictis significationibus inueniantur, ægro pilulæ cochicæ multotiens sunt tribuendæ. Et eius conseruatio subtilianda. Et cibaria quæ diximus danda. Gargarismus quoque fieri debet. Et sternutatio ex his quæ diximus prouocanda. Ac naribus poxonice puluis subtilissimus qui simuletur alcohol, insufflandus.

In hac parte ponit curam epilepsiæ per essentiam. Primò phlegmaticæ, secundò sanguinæ, tertiò ponit electuariū. quarto redit ad complendum curam sanguinæ, secunda ibi. Si quis autem. tertia ibi. Electuarium. quarta ibi. Electuarium hoc. De prima parte dicit, quod si cum epilepsiâ fuerit tenebrositas sensuum, id est, corruptio & debilitas, id est, diminutio sensuum, scilicet tam interiorum quàm exteriorum, nec aliqua significatio de prædictis inueniatur, quæ nobis significet epilepsiam fieri per communitatem ab alijs membris, & hoc maxime quia sentit accessionem eius, tunc ægro sunt multotiens dandæ pilulæ cochicæ, quia materia secundum plurimum est phlegmatica. Sed attende ut supra, quod digestionis præcedant. Secundò conseruatio, id est, dieta est subtilianda sicut dicitur, et cibaria iam dicta sunt danda. Tertiò fiat etiam gargarismus & sternutatio, & supple etiam

etiam masticatio cum his quæ sæpe dicta sunt in capitulis præcedentibus. Quarto pulvis pœoniæ, scilicet radicis, aut seminis eius calid. & sic. in secundo, & propriè in epilepsia subtilissimus, sicut alcohol, id est, pulvis qui in radijs solis apparet, est insufflandus naribus.

Si quis aut cum epilepsia in facie et oculis rubedinem habuerit, et uenarum crassitiem, phlebotomandus erit ex saphena sanguis, & ex carnositate tibiari cum uentosis erit extrahendus. Capiti præterea oleum rosæ et acetum superinfundatur, & absteineat à uino, & à cæpis, et alleis, ac sinapi, et porris & apio, & fabas, & canabith, & postremo ab omnibus fumum caput ascendentem & replentem generantibus.

Ponit curam epilepsie pendens à sanguine & cerebro, & à toto communicati, quæ cognoscitur per rubedinem oculorum & faciei, crassitiem uenarum, & alia signa, de quibus supra. Tunc in primis facienda est phlebotomia de uena saphena, sed melius ex ambabus, deinde ut legatur ultima pars huius capituli ex uena basilica & supple, aut cephalica, & postea si oportuerit ex uenis magis proprijs, sicut ex uenis quæ sunt sub lingua, post aures, in fronte, in cute capitis non dico in omnibus, sed in quibus uidebitur magis expedire, quod cognoscetur ex ipsarum tensione & crassitie. Et etiam ad diuersionem docet ex carnositate tibiari fieri cum uentosis scarificationem, cuius simile si oportuerit faciendum est in natibus & in spatulis. Tertiò, fronti, temporibus, aut parti anteriori apponi oleum rosaceum triplum ad acetum ad infrigidandum & repercutiendum. Quarto æger caueat à uino, carnibus omnibus sanguinem multiplicantibus, necnon à cæpis, alleis, sinapi, porris, apio, à proprietate excitante epilepsiam, fabis, canabith quæ est caulis imperialis scilicet caputium, & ab omnibus ad caput euaporantibus, sed comedat ea quæ sanguinem infrigidant sicut panicum, endiuia, acetosam & similes, & bibat rob, id est succum per decoctionem inspissatum ad solem fructuum acetosorum, sicut agrestis granati & similia.

Emplastrum quod omni epilepsie speciei remedium affert. Recipe pirethri, sileos, stecados, omnium ana drach. 10. agarici drach. 5. cordermeni recentis & acuti, asse optime, aristolochie, omnium ana drach. 1. & mediam, deinde extrahatur succus ex scilla mixtus cum pari quantitate mellis, coquatur & conficiantur ex eo species & fiat electuarium ex quo patiens quotidie sumat & caueat sibi à cibis crassiss.

Electuarium hoc omnibus epilepsie speciebus excepta una sanguinea, quam Gal. nominauit, & nos etiam iam fecimus mentionem, oppitilatur, cui uidi conferre phlebotomiam ex saphena prius, & postea ex basilica, deinde eius regimen sunt ex his quæ sanguinem in corpore minuunt & ipsum infrigidant. A carne præterea & uino absteineat. Et bibat rob acetosorum fructuum. Capiti quoque superponantur ea quæ ipsum infrigidant.

Hic ponit electuarium conferens omni epilepsie præterquam sanguineæ & cholerice, cuius descriptio est hæc. Recipe pirethri calid. & sic. in tertio, aperitiui oppilationum colatorij & narium extrahentis phlegma, sileos, id est sileris montani calid. & sic. in secundo multum ualentis in foda, & ad impregnationem mirabilis confortatiui stomachi, & uiscerum, stecados capitalis, maxime solutiui phlegmatis & choleræ, mundificatiui cerebri & neruorum an. 3. 10. agarici, quod est medicina domestica euacuans à cerebro & neruis. 3. 5. cordermeni id est, carui agrestis uel cardamomi calid. & sic. asse calid. in quarto, sic. in secundo resoluentis uentositatem, & propriè in epilepsia, aristolochie rotundæ calid. & sic. in secundo resoluentis uentositatem. ana. 3. 1. s. de his accipiat secundum dosim prædictam descriptam in textu & cum succo scilicet scillæ multum incisiuo & solutiuo phleg. & melle ana quantum sufficit fiat electuarium, primò bulliendo succum scillæ cum melle donec sufficienter dispumetur, postea addatur pulueris superscripti pro unaquaq; lb. 3. 2. & s. & de hoc accipiat in mane ad quantitatem nucis, & possit accipi de eo in sero cum itur dormitum saltem per duas horas, aut tres post cenam leuem.

Cura epilepsie est duplex. Quædam enim administranda tempore paroxysmi, diuertendo cum frictionibus, ligaturis fortibus, iteratis, & sternutationibus & suffumigijs ex assa citò remouet paroxysmum, & uocetur uocibus fortibus, & eius facies aqua frigida aspergatur, necnon digiti cōtorqueantur. Verum in hoc differt à cura apoplexie, quia non oportet ut faciamus in paroxysmo eius euacuationes quæ precipiuntur in apoplexia, cum sit breuis terminationis. Neq; in apoplexia fiant sternutationes quæ hic precipiuntur, cum propter multitudinem materie sit ibi timor de eius agitatione maiori quam in epilepsia cum à pluri materia pendeat. Hi etiam uersus in aure dicti subito releuant à paroxysmo.

Gaspar fert myrrham, Thus Melchior, Balthazar aurum.

Hæc tria qui secum portabit nomina regum, Soluitur à morbo Christi pietate caduco.

Qui etiam secum hæc portant, liberantur ab epilepsia. Vbi uerò paroxysmi epilepsie essent continui oporteret phlebotomare & euacuare secundum exigentiam materie sicut in apoplexia. Et extrinseca fortia

applicare sicut uesticantia cauteria, & etiā sartaginem ferream ut in apoplexia &c. Cura epilepsie à uulnere capitis, si eueniat propter cōpressionem ossis supra cerebrū aut retentionem materie, tunc ipsum os subleuetur aut amoueat. Et procuretur ut materia transpiret. Et si cerebrū sit apostematū curetur cura apostematis superius dicta & uidenda quinta quarti ab Auic. Si uerò pendeat à uulnere membri neruosi sicut à punctura execrata aperiat uulnus ut materia transpiret & interius imponatur oleum rosaceū calidum cum paucis sulphuris. Et apud fortem dolorem membrū in oleo calido teneatur, & desuper lumbrici terranei in oleo cocti superponantur, & curetur uulnus, & apostema eius si fuerit secundū quod oportet, si autē curato uulnere epilepsia remaneat curetur sicut epilepsia materialis de qua infra, prouenit enim propter aggregationē materie determinatis periodis uirtute digestiua & expulsiua cerebri debilitatis. Si uerò pēdeat à morfu animalis uenenosi fricetur locus morfus ut sanguis exeat, aut uentose cum scarificatione superponantur, & emplastra attractiua & propria contra genus animalis mordētis, & inter cetera applicatio animalū nouiter intersectorū apertorum, cum calore actuali confert trahendo ad se uenenū, etiam ipsa uiua cum ano applicita conferunt, & locus superior defendatur cum aceto & forti strictione per magnam partem eius, & membra principalia cōfortentur cum interius & exterius applicitis, præcipue cum theriaca, & bezahartica contra illud uenenū exhibeantur, nec in his casibus competunt solutiua saltem fortia, neque phlebotomia. Si uerò sumperit uenenū, procuretur ipsius uomitus exquisitus. Et si quid superest cum lenientibus educatur, sicut cum multo oleo calido, sumptis, aut cassia & clysteri. Tertiō membra principalia confortentur & dentur bezahartica contra ista uenena. Et in hoc casu non cōpetit phlebotomia. Si uerò pendeat ex labore, aut ex aspectu luminosorum, aut ex auditu sonorum terribilium, aut ex timore & ceteris animæ accidentibus. Primō causæ primitiue remoueantur. Secundo inducatur somnus & quies & reliquum regimen secundū quod oportet ordinetur. Et si humores positi sint in fluxu diuertantur & quietentur, si uerò pēdeat ab aëre malo uenenofo, aut foetenti, aut putrido, aut pleno uaporibus malis, sicut carbonum. Causæ primitiue remoueantur. Fiant fricationes, & reliquæ diuersiones. Et procuretur uaporis in capite contenti resolutio cum fricatione aequali capitis & pectinatione. Exhibeanturque illa quæ cerebrū & cor confortat interius & exterius applicita & odorata. Non tamen stiptica & ualde oppilantia super capite ponantur. Ex his potest elici cura epilepsie pendētis à reliquis primitiuis.

Cura epilepsie per cōmunitatem septem cōpletur intentionibus. Prima euacuat. Secunda diuertit tam à membro mittente quā à cerebro. Tertia dispositionem membri mittētis corrigit, ipsum confortando. Quarta uis transitus ad cerebrum claudit & intercipit. Quinta cerebrum confortat ne recipiat. Sexta accidentia corrigit. Septima ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Vnde si pendet à membro exteriori, ut puta à uapore eleuato, à coxa uel genu, primō materia proportionalis illi euacuetur. Secundo, uapores diuertantur frican-

do & ligando partem illam inferiorē scilicet tibiā. Tertiō materia ex loco eradicetur apponendo super loco uesticantia, aut cauteria. Quarto locus superior stringatur forti strictione ut uapores non possint ad superiora penetrare. Quinto confortetur cerebrum cum interius & exterius applicitis, ne huiusmodi materiam recipiat. Sexto, curentur accidentia. Septimō regimen ordinetur secundū quod dicitur, & plures harum intentionum simul sunt perficiendæ. Similiter si pendeat à stomacho, aut à matrice, aut à uasis spermaticis & ceteris membris procedatur, ut iam dictum est. Et ego ponam exemplum de epilepsia per cōmunitatem à matrice. Primō ergo fiat euacuatio proportionalis materie peccanti, ut si pendeat à phlegmate, euacuetur. Secundo, materia & uapores diuertantur fricationibus, ligaturis, appositionibus uentosarum in coxis & tibis descendendo. Tertiō, materia ex matrice eradicetur prouocando menstrua cum phlebotomia saphenarum, aut uenæ quæ est in curuatura poplitis, & cum nastalibus prouocantibus, inter quæ principatum obtinet farina gith cum mercuriali supposita in matrice, & ceteris remedijs menstrua prouocantibus, & materias in matrice contentas eradicantibus, & si esset spermatica, coitu educatur si fieri posset, aut si proportionali, aut cum exiccantibus sperma procedatur. Quarto, uia intermediæ claudantur cum stipticis applicitis circa regionem renum & umbilici, & debita strictione. Quinto, caput confortetur, ne recipiat cum interius & exterius applicitis. Sexto, accidentia curentur. Septimō regimen ordinetur, secundum quod dicitur in epilepsia per essentiam. Cura epilepsie per essentiam sex exigit intentiones curatiuas. Prima digerit. Secunda euacuat. Tertia diuertit. Quarta causam coniunctam resolut & eradicat. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Et in omnibus his semper sit intentio ad cerebri confortationem. Digestio uerò in phlegmatica perficitur cum melle rosæ, oxymelle simplicis, oxymelle composito scyllitico, syrupo de stecade, & fumantur cum decoctionibus propriis, scilicet hyssopi, pœoniæ, stecados, pyrethri, allæ, acori, origani, sileos, aristolochiæ rotundæ. Si uerò sit melancholica, tunc detur syrupus de epithymo cum oxymelle scyllitico, cum decoctione epithymi, detur syrupus de pomis dulcibus superius descriptus in sode melancholica, cum decoctione iam dicta. Tamen multa inferius ponentur in cura melancholicæ quæ huic capitulo accommodanda sunt.

Secunda intentio in phlegmatica perficitur cum pilulis cochis, hiera composita Gal. hiera diacolocynthidos et similibus, sed in mixta ex phlegmate & melancholia est hoc proprium. Recipe sileos, aristolochiæ rotundæ, castorei, salis indi. ana 3. quatuor, radicis pœoniæ, trochiscorum de scylla ana. 3. sex, pul. hierapic. stecados, epithymi ana drach. decem, polipodii, 3. 8. agarici 3. duodecim, colocynthidis drach. undecim, turbith, 3. 15. mirobala. nigrorū, belliricorū, emblicorū ana 3. tres, lap. lazuli, 3. 15. et mirobalanorum citrinorū, ellebori nigri, chamæpitheos, chamædreos ana 3. 8. & confice pilulā cum melle scyllitico, dosis est à drach. una usque ad drach. unā semis. Sed ad materiā melancholicā est hoc propriū. Recipe hieræ pi-

cræ, 3.

træ. 3. quinq; epithymi. 3. 10. lapidis lazuli loti. 3. 7. scamoneæ. 3. 1. colocynthidis ellebori nigri, spicæ. ana drach. duas, confice pilulas cum aqua mellis. dosis est. 3. 1. sed post eas sumant tres uncias decoctionis epithymi, & passularum. In epilepsia cholericâ, quæ rarissime accidit, digestiua & euacuatua accipiant, quæ superius dicta fuerunt in soda cholericâ. In sanguinea uerò fiat phlebotomia, aut ex saphenis multa existente plectoria, aut si retenta sunt mæstria, aut sanguis hæmorrhoidalis, & postea procedatur ad phlebotomiâ cephalicæ. Si uerò epar fuerit in cā phlebotomies basilica, deinde cephalica secundū plurimū, tamen sufficit phlebotomia cephalicæ, postea phlebotomē uenæ sub lingua et aliæ uenæ particulares, ut supra in soda et Karabito. Tertia uerò intentio scilicet diuersio perfrictum cum frictiōibus primò leuioribus, deinde fortioribus & lotionibus crurium & brachiorū cum rebus proprijs superius nominatis, materia etiam diuertat cum clysterijs, quorum hæc est descriptio, scilicet, 3. alascæ hyssopi, absinthij, ana 3. 5. pulpæ colocynthidis. 3. 2. centaureæ minoris 3. 4. carthami. 3. 1. s. bulbi in quatuor lib. aquæ ad cōsumptionem dimidij, de qua accipiant. 3. quindē, & cū 3. s. olei de Kerna, fiat clystere. Clystera quoq; in apoplex, dicta in hoc conueniunt, diuersificent tamen secundū materiæ exigentiam. Quarta intentio scilicet eradicatio materiæ cōiunctæ perfrictum cū sternutorijs, masticatorijs, gargarismi, sæpe superius dictis. Et ex proprijs est pyrethrum, mastix, & cubebe, quibus potest fieri gargarisma & masticatorium. Secundo cū iniectionis in narib, sicut pulvis pœoniæ subtilissimus, & cum iniectionis in aurib, sicut pulvis spicæ nardī, nā curat perfectè. Et ad hoc ualent sacculi capiti appliciti, et propriè super commissura coronali, & sagittali, & stecæ, ruta, pœonia, maiorana, nux muscata & similes, similiter ualet pulvis mustelæ, et sanguis eius & pulvis et pulvis hirū dinū iecoris milui iniectionis in aurib, et narib, balsamus etiam similiter iniectionis, & sub lingua uel palato positus est proprius. Odorata etiā cōferunt ut ruta, nigella, maiorana, & etiā comesta sicut theriaca, mithridatum diamuscus, diaphis arcotico & similes. Sed inter cætera duo sunt ultima curantia epilepsiā cerebralem si manu humana potest curari. Vñ est ut fiat cōtractio materiæ de profundo capitis ad cutim, ita quod in cute fiant alahafati, ad quod faciendum ponatur super magnā partem capitis, & propriè super commissura coronali & sagittali hoc emplastrum capite raso, 3. ammoniaci dissoluti cū pinguedine anatis, aut milui quæ est magis propria. 3. 2. fermēti. 3. 1. fina, subtiliter puluerizati, 3. s. cātharid. 3. s. pœoniæ 3. 2. fiat emplastrū, & dimittat super loco donec rubeat, & uescas faciat & crustas, deinde remoueas & cū pinguedine milui fiat iniectionis, postea iterū emplastrū apponatur, & sicutotiens fiat nunc cum uno, nunc cū altero donec crustæ & alahafati in capite acidant, et sic per longum tempus usq; ad duos menses aut plures conferuentur. Reliquum est ut fiat cauteriū actuale aut potentiale in commissura coronali usq; ad ossis superficem, & ita ulcus per duos menses aut plures conferuetur apertum.

Quinta intentio corrigit spasmū & dolorē ex ipso accidentē inungēdo sphondiles cum oleo liliorum alborum, uulpino & de costo descriptio Mefu, Præ-

seruet aut ab imminētib, periculis ne stet super aquis, aut prope ignem & similia. Sexta autem intentio est. Ut ordinetur aer in phlegmatica & melacholica ut sit declinans ad calid. & sic in phlegmatica, & sit temperatum in passiuus in melacholica, in sanguinea aut & in cholericâ ad temperamentū. Permutetur quoq; regio iuxta aphorif, secundæ particulæ. Epileptico uerò iuuenibus. Et sit boni odoris artificialiter cum sparsione foliorum lauri, rutæ, iuniperi, & cum auriculis cipri, galia muscata, laudano, & puluere pœoniæ &c. Salata sit endiuiâ, ruta, cichorea, feniculus, aspharagus, cappares cum aceto parum acuto. Item menta, maiorana, rosmarinus, penthaphilon, de quo Auic. scribit quod bibitum cum uino triginta diebus sanat. Euitet erucam, allium & cætera euaporantia.

Aromatizet cibaria sua cum nuce muscata, cinnamomo, gariophyllis, mace, fisei, & semine pœoniæ. Potus eius sit uinum pauciferum medi coloris nō uinum nec antiquum, sed unius anni bene depuratū, nam ut dicit Auic. parū ex ipso sumptum dilatat animam & excusat à multitudine aquæ, nam ipsius multiplicatio est nociua ualde. Summè etiā ualent urina artificiatia cum salua & rore marino, iuxta doctrinā Diosc. & Arnoldi. Sedaqua mellis & propriè cum paucis piperis, cinamomi & gariophylorum, est præstantior in phlegmatica. Carnes sint facilis digestionis, boni nutrimenti, paucarum superfluitatum, & aues sæpius dictæ sunt præstantiores quàm quadrupedes, & propriè turtures quæ augmentum faciunt in cerebro & intellectu, secundo canon. capite de duragi & propriè cerebra debite præparata conueniunt. Et sint carnes istæ prius leuiter dixæ, deinde affæ uel frixæ, similiter carnes musculosæ conueniunt, pingues uerò euitentur. Euitet etiam omniantia nutrimentum crassum ac superflue humidum, oua sorbilia conueniunt. In fine mensæ comedat pyrum assum uel conditum. Sit cœna leuior prandio, nec etiam comedat nisi celebrata digestionis cibi præcedentis, & ieiunet semel aut bis in hebdomada, non tamen toleret multum famem, non bibat extra horas cibationum, non multiplicet cibaria in mensa una. Exercitetur stomacho ieiunio intensiue & exterius notabiliter secundum tolerantiam uirtutis. Non tamen exercitium sit nimis intensum, immo potius longum quàm intensum, & monet Auic. quod cum infirmus mouetur superiora, moueat etiam inferiora. Et induatur secundum tempora leuibus non grauantiibus, ut pellibus agnorum, dorforum, uarij, luporum, ceruinorum & similibus. Et in æstate sint suffulti cendalo de grana & similibus. Studeat quantum potest stare rectus & capite leuato, nec iaceat nisi tempore somni. Somnus non sit meridianus, nec nimis longus, nec nimis breuis, nec supra repletionem. Et dormiat super altero laterum, & non supinus. Studeat euacuare superfluitates omnes per conuenientes regiones. Et leuis frictio capitis & pectinatio confert fecibus expulsis. Nec coeat nisi præter modum stimulat fuerit. Accidentia sint quæ declinando ad lætitiā. Sunt etiam quædam laudata ab autoribus in epilepsia quorum quædam subiungam ex magis proprijs quibus in toto pro-

cessu, aut aliquo eorum utendum est. Primum est uestica apri immediate cum abstracta est cum urina sua, quia nunquam est uestica in animali sine urina, hæc cum tota urina posita in furno aut alio modo ad ignem exiccata donec possit pulverizari exhibita in quantitate fabæ cum 3. i. oxymellis, aut media singulo die sto macho ieiuno sanat, autoritate Alexandri, qui refert se uidisse quosdam sanatos in tertio die assumptionis. Secundum est pyrethrum coditum sicut conditur zingib, autoritate Hip. in singulo die exhibitum est medicina fidelis. Poconia secundum omnem modum administrationis, scilicet radix & semen, ita quod etiam appensa collo ualet autoritate Gal. sed sumatur à stipite habente florem album. Coagulum leporis bibitum in quantitate parua scilicet à sex granis usque ad decem cum aqua mellis, aut maiorana, aut rutæ, epar asinum assatum & comestum ualet autoritate Diosc. Cerebrum cameli & mustelæ exiccata & porata perfecte curant. Gal. in libello de theriaca: Item puluis mustelæ, hirudinum combustorum, epata etiā milui, cornu cerui, bibita, aut singulariter, aut coniunctim liberant.

Ruta syluestris contrita, naribus imposita alleviat paroxysmum & eum retardat. Viscus quercinus interius sumptus uel collo suspensus. Item ben, betonica aut folia trifolij & semen cum aqua bibita, aut assa cum sagapeno mixta, utputa assæ. 3. s. sagapeni. 3. i. hæc mixta cum aqua & uino potu sumpta ualent. Antimonium à proprietate cōfert. Ossia capitis hominis combusta & cum uino subtili bibita singulo die. 3. i. chabbanum suffumigatum reuiuiscere facit epilepsiam. Ungula asini combusta & trita, & in potu data, ualet. Britoniæ si sumatur. 3. i. aut. 2. præseruat ab epilepsia per totum annum, si semel sumat autoritate Diosco. Lapidēs qui reperiunt in uentre hirūdinis, primò natæ apud augmentū lunæ ualēt autoritate Azaruij si ponantur in subascella sinistra aut pulverizati et bibiti. Smaragdus collo suspensus & similiter potatus, optimè ualet. Similiter caput cuculli collo suspensum præseruat ab epilepsia, attrahit ipsam ad se cum singulo mense patiat epilepsiam sicut magnes attrahit ferrum. Et hæc dicta sufficiant de epilepsia.

DE INCUBO. CAPVT. XV.

Incubus ab incubando dictus, eo scilicet quod appareat phantasma graue incubare homini in somnijs, ac si cum eo cubaret. Quod phantasma homines dormientes secundum plurimum reputant esse demonem. Quod forte aliquando est uerum. Sed minus post aduentum Christi, cum antea cum hominibus magis conuersarentur. Propter quod sciendum de intentione Augustini 15. de ciuitate Dei & sancti Thomæ in prima parte sue theologiæ quod reperiuntur demones qui dicuntur incubi & succubi imò unus & idē est incubus postea succubus. Vnde demon aliquando suscipit formā quā ex aere cōficit, colorē enim suscipit per multā condensationem sicut aqua per congelationem. Assumit ergo formam alicuius mulieris cum aliquo uiro conuerset, & cum illo succubo uir coit putans se coire cum muliere cuius formam demon assumpsit. Cum demon sit succubans in modum mulieris & recipit sperma quod conseruat. Et factus postea incubus accipiens formā uiri alicui mulieri conuerset, & secum coiens interdum ipsam impregnat. Nec est dicendum inde genitum esse filium demonis, sed

uiri cuius sperma recipit, quod postea in matricem iniecit, sicut nec impregnata in Lauello secundum quod recitat Auerrois, peperit filium lauelli, sed eius qui spermatizauerat in Lauello. Et hoc modo affirmant doctores fuisse genitos gigantes, quorum maior copia fuit ante diluuium quam post. Describitur autem ab Auicenna. prima tertij, tractatu. 5. capite proprio sic: Incubus est aegritudo in qua homo sentit cum somnum ingreditur phantasma graue super se cadens & comprimens ipsum & angustiatur eius spiritus, & interfecatur uox ipsius & motus eius, & fortasse præfocatur propter pororum oppilationes, & cum ab ipso separatur excitat eum subito. Est quidem aegritudo quia sensibilibiter lædens operationes. Si enim incubus accipiat pro oppilatione est aegritudo in uia. Si uero accipiat pro istis actionibus læsis, scilicet motu, anhelitu, & uoce, quamuis sit actio uel actiones læsæ, & per consequens accidens aegritudinis, est tamen aegritudo ex eo quod motus impeditur impedit anhelitum, & anhelitus impedit uocem. Sentit autem homo cum somnum ingreditur phantasma graue cadens super se & comprimens se, quod phantasma secundum plurimum existimat esse demonem propter opinionem uulgariū, quod demones de nocte ambulent, & cum hominibus coniungantur ipsos lædentes. Illud enim nocumentum perceptum in somno facit hominem sic iudicare. Si uero non esset opinio de huiusmodi demonibus, existimarent esse aliud graue alterius generis. Primum autem quod impeditur est motus, prohibito debito transitu spirituum ad membra mouenda propter oppilationem diminutam secundum plurimum in priori uentriculo, & ad motus impedimentum sequitur impedimentum anhelitus & uocis, & hoc propter oppilationem pororum, id est, uiarum spiritus. Et cum ab eo supple incubus separatur excitat hominem subito, erat enim forte excitatus uel leuiter dormiens, licet propter hoc nocumentum uel hæc nocumenta non posset exire in operationes. Ex quo inferitur huiusmodi oppilationem fieri à leui causa. Virgilius tamen 12. Aeneidos loquens de Turno optimè incubum describit in his uersibus.

Ac ueluti in somnis oculos ubi languida prefficit
Nocte quies, nequicquā auidos extendere cursus
Velle uidemus, & in medijs conatibus ægri,
Succidimus, non lingua ualet non corpore notæ
Sufficiunt uires, nec uox nec uerba sequuntur.

Sed instatur quia etiam deberet fieri incubus in uigilijs, quia causa opilans potest esse in uigilijs et ipsam in uigilijs contingit oppilare. Ad quod dicendum incubum rarissime inueniri in uigilijs cum uapor qui est causa coniuncta sit multo magis aptus resolui in uigilijs & motibus quam in quiete & somno, non tamen neganda est possibilitas. Secundo instatur, quia deberet etiam impedire sensum sicut motus impedito transitu spirituum. Ad quod dicitur leuem oppilationem posse impedire motum, non sensum, cum plures spiritus ad motum quam ad sensum requirantur. Et si impediret etiam sensum tunc esset epilepsia.

Ex quo apparet differentia inter incubum, epilepsiam & apoplexiam tam ex parte causæ quæ accidentiū. Incubus est duplex, quidam fortis & frequens, quidam debilis & rarus. Itē quidā materialis, quidā immaterialis

materialis, quidam per essentiam, quidam per coitatem.

Causa immediata eius qui per essentiam est oppilatio in priori uentriculo uel in origine nuchae uapore crasso, aut paucissimo humore facile resolubili. Causa antecedens est sanguis, phlegma, aut melancholia, a quibus huiusmodi uapores eleuantur.

Causae primitivae sunt omnes quae possunt huiusmodi uapores excitare. Aliquando uero fit à frigore extrinseco oppilante originem neruorum attenuato, nec est negandum quin possit fieri à daemone. Sennus etiam resupinus est multoties causa eius, tertia primi, cap. de somno & uigilia, materiae in uentriculo posteriori congregata ad quem non terminant uiae expulsiōis, sicut ad primum & secundum.

Causae autem per communiter sunt oppilatio in nemic, aut in arterijs apoplecticis à simili uapore aut à similibus causis primitiuis &c.

Signa incubi absolute habentur ex relatu egri. Signa causarum primitiuarum sunt ipsa met causae. Verum difficile esset cognoscere esse daemone, nisi per signum sumptum à conferentibus, ut quia passio recederet per coniurationes & similia quae non pertinent ad medicum. Signa autem causarum antecedentium possunt esse nota ex sepe dictis. Sed quod sit per essentiam cognoscitur propter aliquam aegritudinem capitis, aut dolorem, antecedentes, aut subsequentes, nec non ex uertigine & tinnitu. Si uero sit per coitatem nihil horum adest, sed forte nocumenta aliorum membrorum antecedunt. Item si prouenerit propter decubum resupinum significatur esse per essentiam.

Prognostici. Primum, incubus est antecessor unius trium aegritudinum, apoplexiae, epilepsiae, aut maniae siue melancholiae. Secundum prognosticum. Habentes corpus debile secundum cerebrum sicut conualescentes aut habentes malitiam complexionis cerebri sunt aptiores ad incubum, & apti magis ab ipso laedi.

Cum quis in somno quasi graue aliquid super se cadere senserit, incubum pati nunciatus est. In ipse namque cura non est tardandum ipse enim epilepsiae praedubius est, ipse namque praecedit. Aeger quoque si in colore rubescit, et uenas habuerit plenas ex saphena erit minuendus. Et uento se in carnositate tibiaram ponenda sunt. Aeger praeterea potu uini & rerum dulcium comestione abstinendus erit, & praecipue ab omni re quae multum generat sanguinem. Quod si huic contrarium accidit ueter ex pilulis cochliis multoties erit soluendus, et eius regimen subtilandū, exercitio quoque utendum erit & membra interiora erunt fricanda.

Rasis determinans de incubo, primo notificat ipsum, secundo ostendit festinandum esse ad curam cum sit praemambulus epilepsiae, tertio curans ipsum si pen-

deat à sanguine multo phlebotomat saphenas, & uentosas docet apponere in carnositate tibiaram ad diuersionem, prohibet uinum, res dulces & omnia generantia multum sanguinem. Si uero contrarium acciderit, id est, quod pendeat à phlegmate, uenter multoties erit soluendus cum pilulis cochliis, & eius regimen subtiliandum quod declinet ad calidum & siccum. Et aeger exercitandus est ad materiae & uaporum resolutionem, & membra interiora erunt fricanda gratia diuersionis. Cura omnino perficitur sicut in epilepsia & propterea omnes intentiones ibi posita & ea quae illas perficiunt sunt huic cap. accommodanda. Ex eis tamen quae optime conferunt, sunt gratia poconiae in potu secundum continuitatem sumpta. Incubus etiam melancholicus curetur secundum ibidem dicta, & in cap. de melancholia dicenda.

DE MELANCHOLIA.

CAPVT XVI.

Melancholia dicta aequiuoce, de melancholia humore, & melancholia aegritudine. Dicitur à melan. Graece, nigrum Latine, & choli fel siue cholera. Vnde melancholia quasi nigrum fel siue nigra cholera. Describit ab Auic. prima tertij, tract. 4. cap. proprio, quod est mutatio existimationum & cognitionum à cursu naturali ad corruptionem & timorem & malitiam propter complexionem melancholicam, facientem syluestrem spiritum cerebri, facientem ipsum timidum propter tenebras ipsius sicut tenebrae extrinsecae sollicitant, & timere faciunt secundum quod complexio frigida & sic. contraria est spiritui debilitans ipsum, sicut complexio calida & hu. ut complexio uini est conueniens & confortans. Dicitur mutatio existimationum & cogitationum, & supple etiam imaginationem aliquando. Ad corruptionem & timorem & malitiam. i. iudicium peruersum, cum iudicent melancholici recta & honesta, inhonesta & non recta, eliciantque inimicitiam pro amicitia. Et frequenter etiam imaginetur ea quae non sunt ut latrones esse in domo aut demones, non aut corrumpit memoria cum sit in cerebro posteriori, sed uirtutes iam dictae sunt in anteriori, licet laedat reminiscetia quae perficitur per actum cogitationum. Et per hoc differt à corruptione imaginationum, siue cogitationum, cum melancholia dicat corruptionem duarum uirtutum, differt etiam à stoliditate & amemoria, quia stoliditas est diminutio uirtutis cogitationum. Amentia uero quasi sine mente, cogitationum ablatio quantum ad principale actum eius, qui est discursus, non enim magis discuntur quam infantes propterea dicuntur infantilitas, posset tamen dici & forte conformius communi opinioni quod ly & tenet diuisiue. Subdit causa harum corruptionum cum dicitur propter complexionem melancholicam, ipsa enim siue cum materia siue sine materia facit spiritum cerebri syluestrem, id est, non domesticum, sed solitariū. Interius, id est in parte interiori. Et facit ipsum timidum, id est, timorem representantem, uel timidum, quia fugientem in modum timidi, propter tenebras ipsius melancholiae. uel ipsius spiritus, nam sicut tenebrae extrinsecae sollicitant hominem, et timere faciunt, sic tenebrae intrinsecae sollicitant spiritum, & timidi reddunt, & probat, istud est, quia complexio melancholiae frigida & sic est contraria spiritui, quemadmodum complexio calida & humidum, ut complexio uini est conueniens & confortans ipsum spiritum. Ex quibus inferitur melancholiam

liam corrumpere existimationes & cogitationes, & primo propter complexionem, secundo propter nigredinem & tenebrositatem, tertio quidem propter id quod sequitur ex his propter formam specificam occultam siue complexionem insequentem materiam, quæ fortè plus ad hoc concurrat quàm complexio aut tenebrositas. Sed in hoc utrum nigredo siue tenebrositas melancholiæ aut spiritus, aut substantiæ ventriculorum concurrant ad corruptiones harum virtutum est magna differentia, & altercatio inter Auer. 3. colligit iuxta finem & sequaces eius & modernos medicos. Auerrois namq; opinatur nigredinem siue in humore, siue in spiritu, siue in cerebro nullo modo esse causam harum corruptionum, & timoris, aut tristitiæ, quia tunc sequeretur colorem esse ægritudinem, cum immediate & per se lædat operationes, scilicet debitam receptionem specierum cogitabilium in spiritu & eas indebitè repræsentet uirtuti cogitatiuæ, quia sub ratione horridi & tristici consequens tamen est falsum cum nunquam distincta sint genera ægritudinum nisi in malam complexionem & compositionem & solutionem continui. Econtrario uerò medici, contra Auerroim instant. Quia cuius temperies est sanitas, eius intemperies est ægritudo per locum à contrariis, sed luciditas spiritus & cerebri est causa quòd species recipiantur sub ratione conuenientis si obiectum tale sit, ergo tenebrositas erit causa quòd recipiantur sub ratione horridi, tristici & disconuenientis, & per consequens nigredo in spiritu siue tenebrositas erit ægritudo. Et confirmatur, quia color corneæ & crystalloidis est ægritudo impediens debitam receptionem specierum uisibilium. Secundo quantitas aucta aut diminuta est ægritudo, & mediocris est sanitas, ergo ita erit in colore & luciditate, tenet consequentia, cum quantitas sit minus actiua quàm color. Et assumptum concedit ipse Auer. Et ex his inferitur secundum medicos melancholiam esse causam corruptionū harum uirtutum secundum complexionem, formam specificam, & nigredinem. Secundo inferit quòd homines magis timēt in tenebris q̃ in luce, quia cū in tenebris nō possint ponere differentiā inter obiecta per uisum, omnia reputantur sensui communi & uirtutibus interioribus sub ratione nigri, tristici, & horridi, & phantasiantur de mones & his similia. Medici autem soluunt rationē Auerrois cōcedendo ad quod deducit, scilicet quòd sanitas & ægritudo consistunt in colore, luce, & tenebrositate, uerum dicunt aliqui ex medicis, quòd neq; tenebrositas spiritus neq; nigredo humoris, & similiter luciditas spirituum est sanitas, neq; ægritudo, cum huiusmodi debeantur animatis, & non inanimatis. Sed Iacobus de forliuio diceret quòd inanimata sicut spiritus & humor bene possunt esse subiecta sanitatis & ægritudinis, licet nō debeant denominari formaliter sana aut ægra, concederet tamen quòd tenebrositas uentriculorum cerebri est ægritudo sicut eorū luciditas est sanitas, & ipsos esse denominandos formaliter sanos & ægros, cum sint animati, & cum inferitur contra medicos quòd plura essent genera ægritudinum quàm tria, responderet colorem ad complexionem reduci, quia insequit complexionem. Vel melius dic quòd medici posuerūt tantū tria genera ægritudinū omnibus membris cōmuniā, malā scilicet cō-

plexionem, malam compositionem & solutionē cōtinui, non tamen negarent alia esse particularia genera ægritudinum sicut diaphaneitatem, luciditatem, et huiusmodi quæ non debentur omnibus membris, sed solū oculis & cerebro. Secundo instant pro parte Auerrois. Color non potest ledere per se operationem alicuius membri nisi illud membrum per colorem, lucem aut diaphaneitatem suā exerceat operationes sed solum oculi sunt huiusmodi, igitur. Ad hoc respondēt medici quòd cerebrum per luciditatem tam propriam suorum uentriculorum, q̃ spirituum animalium suas exerceat operationes sicut et oculus. Tertio instant contra medicos nullus color potest immutare aliquē sensum interiorē cerebri nisi ille prius fuerit sensus per oculum. Sed color melancholiæ existit in cerebro & tenebrositas spiritus animalis nunquā fuit sensata per oculum, ergo non possunt immutare aliquē sensum interiorē cerebri, consequentia nota cū minori, & maior arguitur, quia ita est de obiectis sensus uisus sicut aliorum sensuum. Sed obiecta aliorum sensuum, sicut odor non possunt immutare sensus interiores, nisi prius immutauerint suos sensus exteriores ergo &c. Ad hoc respondent medici quòd color melancholiæ aut opacitas spiritus nō sentiuntur ab aliquo sensu interiori, sunt tamen causa ut omnia obiecta represententur sensib. interiorib. sub specie opaci & tenebrosi, & per consequens timendi, horridi, sicut etiā color existit in cornea, non uidet à crystalloide, uerum est causa ut omnia uisibilia represententur secundum naturam illius coloris, unde si est niger omnia uidebuntur nigra. si citrinus citrina, & sic de alijs, sicut radij solares transeuntes per uitrum citrinum apparent citrini, & per nigrum nigri. Quarto instant contra medicos, quia si color melanch. immutaret sensus interiores, cum hoc faciat sine lumine etiā potest immutare uisum sine lumine, cōsequens est falsum igit. Ad hoc respondēt medici, quòd neq; color existens in cerebro, neq; color existens in oculo immutant uirtutem uisuiam aut aliquem sensum interiorē, sunt tamē causa quòd obiecta corruptè comprehendant. Et dicitur secundo quòd ad comprehensionem obiectorum per sensus interiores sufficit lumen intrinsecū spiritus animalis & uentriculorum cerebri, non tamē lumen intrinsecū oculi sufficit ad uisionem, quia species obiectorum suorum non sunt ita depurate sicut postea cum immutāt sensus interiores. Quinto instant contra medicos si tenebra spiritus animalis esset causa timoris sequeretur quòd alicuius effectus positiui, ad æquata causa esset pura priuatio, scilicet tenebra respectu timoris. Ad hoc respondēt medici quòd non solum tenebra est causa timoris, sed etiā ipsi spiritus qui repræsentant & etiā ipsa melanch. est causa huius per suam complexionem, & proprietatē occultam. Sexto instatur contra medicos. Si melanch. per suam proprietatem uel etiā opacitatem esset factiua timoris, ergo sanguis propter suam claritatem esset factiuius lætitiæ. Respondent quòd sanguis clarus aut nitidus per suam claritatem, complexionem, & proprietatem est factiuius lætitiæ & audaciæ sicut econtrario melanch. per omnia hæc est factiua timoris & tristitiæ. Septimo instatur, quia melanch. neq; per colorem solū pōt immutare sensus interiores, neq; per species eius, cum ibi non sit lumen, quo color & eius

eius species actuentur. Ad quod respondet, ut supra. Et ad auctoritatem Auer. qui dicit quod color non est causa substantialis, ad corrumpendas uirtutes animae, sed haec causa prouenit ab una specie malae complexionis sicut & aliae aegritudines & tu scis quia habitus animae sequuntur complexionem corporis in hac conjunctione. Et qui dicunt quod anima terretur propter humorem melanch. nigrum, sicut terretur homo in obscuro, dicunt uerba cantionum, id est, fabularum, quia aliqua laesio non aduenit animae in obscuro, nisi priuatio sensus uisibilis, quia non uidet anima in corpore, ut possit dici quod sentiat terrorem nigredinis, & magis foedum est dicere quod uideat extra, quia anima non est extra neque intus. Sed est sciendum quod de natura huius humoris melancholici est ut ipsum sequantur haec accidentia, sicut de natura sanguinis est ut ipsum sequatur laetitia & gaudium. Et propterea dicimus quod sanguis dat lumen animae, & hoc manifestum est ei qui gustauit aliquantulum de natura. Non uult ergo Auer. quod melancholia per suam nigredinem sit causa terroris & timoris, sed solum per suam complexionem primam, aut insequentem materiam, uerum nigredo magis cedit loco signi quam causae, sicut in rheubarbo citrinitas non est causa soluendi cholera, sed solum sua complexio siue forma specifica, uerum citrinitas est signum rheubarbo inesse bonam proprietatem in soluendo cholera. Nos autem cum medici simus, sequamur medicos, licet rationes medicorum scriptae non sint demonstrationes.

Cum alicui cogitationes male sine causa acciderint, & timor, & tristitia in eo praeualuerit, melancholia principium in eo est. Cum autem res ad hoc peruenit, ut etiam ea quae cogitare coepit, ore promat, uerba sua atque actus permisceat, iam melancholia perfecta est. Cui ergo haec male cogitationes & tristitia & tribulatio accidunt, antequam praeualere incipiant, succurrendum est, quia si praeualuerint cura est difficilis.

Diuiditur praefens cap. in partes duas. In prima agit Rasis de melancholia theoricè: In secunda praedicè, secunda ibi. Quod si cum melancholia fuerit dolor &c.

Prima in tres. Primo agit ponendo signa iniantis melancholiae, secundo perfectae & iam completae, tertio ostendit festinandum esse ad curam antequam perficiatur, secunda ibi. Cum autem res, tertia ibi. Cum ergo male. De prima parte dicit quod cum alicui male cogitationes acciderint, supplere uos & existimationes male, ut quia existimat amicos, inimicos inhonesti pro honestis, aut phantasetur aliqua quae non sunt, neque possunt esse, aut non sunt uerisimilia cum timore, & tristitia sine causa, tunc hic incipit

esse melancholicus. Credunt enim semper se decepti, semper insidiari sibi. De secunda parte ponit signa melanch. perfectae dicens quod quando ad hoc peruenit ut quae cogitat ore promat, uerbaque sua & actus permiscet, uerbi gratia, dicens se esse factum regem, aut esse daemone, aut quia timeat casum coeli, tunc melancholia perfecta est. Ultimo dicit propterandum esse ad curam melancholici iniantis, nam si perficietur, cura erit difficilis, cum omnes aegritudines pendentes ab humore melancholico terreno aut à complexione frigida & sicca difficiliter soluantur, est enim inimica principijs uitae & spiritui qui est instrumentum animae ad suas operationes, ut supra ostensum fuit.

Melanch. dupliciter sumitur, communiter & proprie, accepta proprie, est superius diffinita de intentione Auicennae. Et est corruptio existimationum & cogitationum à complexione melancholica frigida & sicca, cum materia aut sine materia. Et est sine rixa, saltu & agitatione, imò cum quiete. Et in hoc differt à mania proprie sumpta quae est cum rixa & agitatione & prouenit à mala complexione calida & sicca, & humoribus adustis. Sed communiter accepta est communis tam ad melancholiam proprie sumptam quam ad maniam: Est enim corruptio existimationum & cogitationum à quacunque causa prouenit. Et forte hoc modo accipit eam Auicenna in capitulo de cutubuth, cum dicit quod cutubuth est species melanch. Et tamen dicit ibidem quod prouenit à melancholia genita per adustionem cholerae uel melancholiae quod est satis uerisimile, cum sit semper in motu, & propterea dicta est cutubuth, licet Ger. de solo diceret quod cutubuth est species melancholiae proprie dictae. Et sic uidetur ex ordine capitulorum Auicennae. Nec ualet hoc argumentum generatur ex melanch. adusta, ergo est mania, nam dicit ipse quod in quadam melanch. adusta referuatur caliditas adurens in quadam uero non, partibus subtilibus resolutis. Melanch. ergo proprie sumpta potest generari ex melanch. adusta quaecumque sit illa, si in ipsa non referuatur caliditas adurens, & talis est materia cutubuth, & propterea cutubuth non est cum rixa. Tu uero dic ut libet haec non sunt demonstrationes. Communiter ergo melanch. accepta diuiditur in maniam & melanch. proprie sumptam superius diffinitam. Mania uero est duplex una lupina, aliter dicta daemonium lupinum, uidentur enim non homines sed demones & lupi, qui patiuntur hanc maniam. Alia dicitur mania canina ad canum similitudinem. Et dicitur à quibusdam quod in urina patientis maniam caninam apparent quaedam sicut formae & figurae catulorum paruorum, sicut apparent etiam in morsu à cane rabido. Sed causa maniae lupinae est melanch. genita per adustionem cholerae, aut melancholiae & est deterior, quia difficilioris curationis, cum humor genitus per adustionem melancholiae sit magis crassus, ineptior digestionis & resolutionis & euacuationi. Et signa eius sunt agitatio, saltus, inquisitio, lupinositas, id est mores luporum, & aspectus cui non assimilatur aspectus hominis, imò est sicut luporum. Differt etiam ab una specie Karabiti quae est cum daemone, quoniam cum hac mania non est se, sed Karabi. est

cum

cum se. Canina autem est species manie existens cum ira permixta tripudio & inquisitione corrupta permixta petitioni quoadmodum est ex natura canum. Et in hac est associatio uehementis & amicitia, cum obedientia et conuenientia simul, licet aliquando sit cum ira & rixa. Et ista generatur per aduersionem sanguinis cui aliquid cholerae aduictae, aut melancholiae ex ea genitae permixtum est. Est autem alia species maniae quae uocatur scintillarum in qua lucent oculi ad modum scintillarum ignis, & imaginantur scintillas & ignes. Et haec prouenit a uaporibus aduictis melancholicis eleuatis a melancholia genita per aduersionem sanguinis & cholerae.

Melancholia uero licet habeat infinitas species in nominatas. Nam quidam timent casum coeli super se. Quidam quod terra absorbeat eos. Quidam timent latrones. Quidam ne lupus aut demones ingrediantur ad eos. Et omnes hi errant in cogitativa, licet fugientes non errent in existimativa. Quidam uero imaginantur res coram oculis quae non sunt. Et quandoque imaginantur se esse factos reges, aut lupos, aut demones, aut aues, aut instrumenta artificialia, & hi errant in sensu communi, & imaginativa. Et sunt quidam eorum qui diligunt mortem. Quidam eam abhorrent. Et sunt quidam qui rident quorum melancholia est sanguinea, imaginantur enim quod placent, & delectentur eos. Quidam sunt qui plorant & imaginantur res tristes, quarum causa est melancholia pura. Sed melancholia habet duas species famosas. Una dicitur cutubut. Et nomen sumpsit a quadam specie araneae quae mouetur super aqua diuersis motibus sine ordine. Alia autem dicitur ilisci siue heros. Cutubut autem est species melancholiae plurimum eueniens in februario, non expectans usque ad uer, propter subtilitatem humoris melancholici secundum plurimum. Generatur enim a melancholia genita per aduersionem cholerae, aut melancholiae in qua forte caliditas adurens non multum remansit. Et propterea licet sit cum motu plurimo, tamen non est cum rixa, imo cum timore. haec enim diligit fugere ab hominibus uiuis & appropinquare mortuis, & sepulchris cum malitia furoris repente aduenientis ei. Et est eius processio nocturna, & occultatio diurna. Et totum istud facit diligendo solitudinem & elongationem ab hominibus. Et cum hoc non quiescit in uno loco plus una hora, imo non cessat discurre & ambulare in cessione diuersa ignorans quo uadit cauendo sibi ab hominibus. Quandoque tamen non cauet sibi ab eis, parum discernens istud quod uidet, & sit ei praesens. Et citrinus est color faciei. Et lingua sicut sitientis. Et super crura ipsius sunt ulcera quae non consolidantur, quorum causa est corruptio materiei melancholicae effusa ad crura, & multitudo motus pedum quarum materiae ad ipsa descendunt. Et praecipue quia occurrit cruribus eius frequenter aliquod offendens, aut canes interdum mordent eum, quare fiunt in eis ulcera quae difficulter consolidantur, & propter motum, & quia sunt canerosa. Et oculi eius sunt sicci, debiles, submersi non la chrymantes propter siccitatem cerebri & oculorum. Causa autem suae uariae incessionis sine ordine, nunc ad unam differentiam, nunc ad aliam, sicut facit ista aranea quae dicitur cutubut, est, quia fugiens est ab omni individuo apparente ei ipsum timens, nam ipse pro-

pter paucitatem suae conseruationis & defectum rectificationis consilij sui incipit in parte una moueri et obuians alij individuo iterum fugit ad partem aliam.

Ilisci uero siue heros, aliter passio diuina, quia quidam putauerunt a deo fieri. 1. prognosticorum, comment. 7. uel quia accidit istis sicut contemplantibus diuina, qui omnem suum spiritum & cogitationem in illa conferunt. Et haec passio est sollicitudo melancholica in qua homo inducit omnem cogitationem suam super pulchritudinem quarundam formarum & figurarum cum uehementi desiderio ad illa prosequendum, licet non sequatur.

Et signa eius sunt profunditas oculorum, siccitas ipsorum, & priuatio lachrymarum, nisi cum fletus adest, & motus continuus palpebrarum risibilis quasi aspiciat aliquod pulchrum & delectabile aut audiat rumorem aut iucunditatem, quod prouenit ex apprehensione alicuius sub ratione iucundi, & anhelitus eius est plurimae intersectionis, & multae eleuationis interdum cum suspirijs. Et nunc alteratur ad risum et laetitiam, nunc ad tristitiam & fletum praecipue cum audit cantilenas amoris, & proprie cum sit memoria tristitiae, & elongationis a re amara, & sunt omnia membra eius arefacta praeter oculos, ipsi enim licet sint profundi, palpebrae tamen sunt graues & crassae propter uigilias eius & ploratus, propter quos ad palpebras saepe aliquod rheumatizat, & in figuris eius sunt sitib. non est ordo, quasi in nullo situ inueniat requiem, & pulsus est diuersus absque ordine, sicut pulsus habentium taedium. Et eius quidem pulsus, color, & dispositio alteratur cum sit rememoratio eius quod diligitur, aut cum praesentatur ei. Unde possibile est ut medicus prudens cognoscat quod sit illud quod diligit cum cum non consistit ipsum. Cognitio enim eius quod diligitur non parum confert ad curam, & propterea medicus semper tangens pulsum patientis faciat rememorari nomina eorum circa quae est suspirio, necnon figuras, domus, artes, genus, regiones, & comparetur unumquodque ad nomen eius quod diligitur, nam cum rememorabitur illud quod diligitur fiet pulsus diuersitas & intersectio, necnon color eius mutabitur, & similiter anhelitus. Confert autem scire istud quoniam interdum nullum regimen medicinale prodest nisi regimen coniunctionis inter eos si lex & fides permittat. Etiam sunt uisus quidam qui post tolerantiam febrium, & prauarum aegritudinum & post debilitatem uirtutis ex amore ingenti, sanitati restituti sunt cum obtinuerint quod summopere optabant, ex quo significamus mirabilem obedientiam naturae meditationibus animi. Causa itaque primaria huius passionis est amor praeter modum, uerum postea humores aduruntur, et ad melancholiam conuertuntur quibus amplius haec passio figitur. Melancholiae praeterea communiter sumptae dantur aliae distinctiones. Prima quaedam est per essentiam in cerebro, quaedam per communitatem. Secunda, quaedam est materialis, quaedam immaterialis. Tertia quaedam sit incipiendo, quaedam succedit alteri aegritudini. Item quaedam est periodica, quaedam non periodica. Item quaedam antiqua, quaedam noua.

Causa autem melancholiae per essentiam in cerebro sunt. Aut mala complexio frigida & sicca sine materia, quae permutando complexionem cerebri & spiritus

ritus animalis, & similiter eorum substantiam, excludendo scilicet partes subtiles, calidas, luminosas, facit eorum substantiam tenebrosam, hoc idem facit mala complexio calida & sic, nam adurendo denigrat & tenebrosam facit ipsorum substantiam. Aliquando sunt hæc malæ complexiones cum materia, aut melanch. naturali aut genita per congelationem, & hæc faciunt melanch. distinctam contra maniam. Et aliquando pendunt à melanch. genita per adustionem sanguinis, aut phleg. in quibus non reseruat multa caliditas adurēs. Mania autem propriè generatur ex melanch. genita per adustionem cholerae, aut melanch. aut si melancholiae sanguineae aut phlegmaticae aliquid cholerae adustæ permisceretur. Et hi humores quandoque sunt in uenis cerebri, quandoque in meatibus, quandoque in uentriculis, siue apostemant siue non. Et hi humores quandoque sunt geniti in ipso cerebro siue per propriam eius complexiōem siue per malam qualitatem à residuo corporis uel ab extrinseco sibi comunicatam. Melanch. uero per colligantiam quandoque est à toto sicut in quartana feb. & in finemorbis naturalium acutorum, scilicet in quibus generantur melanch. per adustionem, & ideo isti phantasiuntur circa mortuos. Quædam per communitatem à splene. Aut quia splen non debite mundificat sanguinem, aut quia est apostematus, aut quia uenæ oppilate sunt per quas melanch. transit ab epate ad ipsum, aut uia sunt oppilate quæ transeunt ab ipso ad intestina, aut uia quæ transeunt ab ipso ad os stomachi, & sic non potest expellere melancholiam superfluum. At quia debilitata est expulsua eius aut attractiua. Vnde neque expellit saltem ad loca conuenientia, aut non debite attrahit. Quædam est mirachia, id est à mirach, per mirach intelligendo mesenterium in quo sunt melaice, quæ primò fit per congregationem superfluitatum crassarum chilosarum quæ per adustionem transeunt in melancholiam, & euaporando ad caput faciunt melancholiam. Similiter fieri potest ab oppilatione uel apostemate melaicarum epatis, quia nutrimento non penetrante putret. Et quandoque fit à matrice sanguine mensitruo per putrefactionem, adustionem, uel congelationem in melancholiam uerso. Et quandoque fit à spermate diu retento modis similibus corrupto. Et nota secundum plurimum non fit melancholia absque communitate cordis imò fortasse magnitudo ipsius erit ex corde. Et fortè principium eius secundum plurimum est ex corde, licet confirmetur in cerebro, & est in hoc circuitio, quia ad corruptionem complexionis in corde corrumpitur complexio cerebri & e contrario. Huius autè potissima causa est spiritus animalis, quia spiritus animalis est continuus spiritui uitali in arterijs apoplecticis, & remirabili, & ex ipso generatur, & si sanguis cordis esset subtilis, tersus, & clarus, resisteret corruptioni cerebri & ipsum rectificaret. Et ex ipso etià generaretur spiritus uitalis clarus, qui est materia spiritus animalis, quapropter raro aut nunquam fit melancholia absque communitate cordis, licet non confirmetur hæc ægritudo nisi in cerebro. Et quandoque fit per communitatem ab epate, aut quia sanguine adurit, aut quia non debite separat melancholiam à sanguine, nec expellit ipsam ad splenem. Et uniuersaliter à quocumque membro potest fieri melancholia per col-

ligantiam, aut quia aduritur nutrimentum ipsius, aut quia non expellit superfluitatem nutrimenti quæ rectè partibus subtilibus resolutis uertitur in melanch. Causæ uero primitiue sunt aer turbulentus frigid. & sic, aut calid. & sic, adurens sicut aer æstatis & dierum canicularium & autumnus est huic ægritudini proportionatus. Verò licet sit disproportionatum quantum ad causæ generationem, tamen proportionatum est ad mouendum causam latentem iam genitam. Vnde 3. aphorismorum illo. Vere & autumnus mania mouentur, & melancholia. Hyems uero est disproportionata nisi fortè per congelationem melanch. multiplicet. Secundò cibi melancholici, ut lentes, caro uaccina, caprina antiqua, panicum, uinum turbidum, crassum, exercitium forte, exiccatium, superflua uigilia, timor, tristitia fortis, studium uehemens, longi carceres. Causæ autem corporeæ remotæ sunt retentio hæmorrhoidarum, & fluxus mensitruu consueti. Et quandoque fit à dæmone corrumpente complexiōem cerebri. Agit enim per media naturalia siue semper ibi afflatur, siue post hanc operationem recedat.

Signa uero melancholiae quædam sunt prognostica, quædam demonstratiua. Ex prognosticis sunt primò dispositiones corporum sicut sunt corpora bruna, pilosa, extenuata, & e contrario parum disposita ad melancholiam sunt corpora alba & pingua. Secunda corpora habentia cor uehementer calidum & cerebrum humidum sunt disposita ad melancholiam, quia caliditas cordis est generatiua cholerae nigrae in ipso, & humiditas cerebri est susceptiua impressionis eius quod generatur in corde, quapropter trauli, id est, syllabam multoties repetentes antequam dictiōnem proferant sunt ad ipsam parati, & propriè si linguas habuerint lenes, oculos mobiles, & quorum facies est uehementis rubedinis, & cum hoc sunt bruni, pilosi, & propriè cum in pectoribus eorum sunt pili nigri, crassi, & amplas habent uenas, & labia crassa, quoniam quædam istorum significat caliditatem cordis sicut pilositas, amplitudo uenarum, rubedo faciei, oculorum mobilitas, quædam significant humiditatem cerebri, scilicet traulitas, mollities lingue, crassities labiorum. Tertiò magis dispositi sunt ad melancholiam uiri quam mulieres, licet in mulieribus sit deterior cum proueniat à fortiori causa, & similiter magis dispositi sunt iuuenes & senes quam pueri. Secundum prognosticum sumitur ex aphor. 23. sextæ particulae. Si timor & pusillanimitas multum tempus habent melancholicum perficiunt, sunt enim melancholia simul signum & causa.

Signa uero initiantis melancholiae sunt quæ dicta sunt in textu. Item uelocitas iræ si materia fuerit adusta, tertiò dilectio solitudinis, quia non conuersatur propter timorem aut tristitiam. Signa uero perfectæ melancholiae sunt ea quæ dicta sunt in textu. Signa uero causarum immediatarum, infinitarum specierum ipsius melancholiae malè possunt sciri sicut neque causæ distinctæ sciuntur. Verum non reducuntur nisi in speciales modos mixtionis melancholiae, & speciales conditiones indiuiduales, sicut dicimus quod uenenu canis rabidi inducit ad timorem aquæ, ideo etiam in proposito secundum varias impressiones specierum uariarum, uarios modos melancholiae, & secundum uariam dispositionem passionum fit uia

riatio in phantasijs & iudicijs corruptis, quapropter ipsarum species esse infinitas, aut saltem indefinitas facile concedi potest.

Signa uero melancholiæ per essentiam in cerebro, est superfluitas cogitationis, & assiduatio sollicitudinis melancholicæ, id est, attrinentium melancholiæ & assiduus aspectus ad rem unam ut ad terram. Item color niger capitis, faciei & oculorum, & nigredo pilorum capitis, & crassities. Item antecessio in somnietatis & cogitationi & longa mora in sole, quæ primò cerebro nocet. Item ægriitudines cerebri antecedentes sicut epilepsia. Item parum iuuamentum ex medulla, & in summa sunt accidentia maiora, & magis continua, quando est per essentiam in cerebro. Item non præcesserunt, nec fortè cõcomitantur eum aliqua malæ dispositiones corporis uerisimiliter factiuræ melancholiæ. Signa uero eius quæ est per communitatem à toto, sunt nigredo corporis & eius arefactio, & retentio eius quod solebat euacuari ex splene & stomacho & ex ano aut matrice, scilicet sanguinis hæmorrhoidalis & menstrualis. Item multitudo pilorum crassiorum & nigrorum. Item antecessio ciborum melancholicorum, necnon antecessio egritudinum quibus succedit melancholia sicut sunt febres chronicæ & maximè permixtæ.

Signa uero eius quæ est ex splene sunt multitudo appetitus propter effusionem cholæræ nigræ ad stomachum, cum paucitate digestionis, propter frigiditatem complexionis, multitudo rugitus lateris sinistri, & quandoque inflatio splenis. Si enim splen non attrahat melanch. propter aliquam ex causis supradictis, tunc splen attenuatur. Si uero attrahat & non expellat propter causas suprascriptas, tunc splen est tumidus.

Signa uero eius quæ est à stomacho sunt nocumenta stomachi antecedentia, aut concomitantia quibus auctis augetur melancholia & diminutis minuitur.

Signa uero mirachia sunt nausea & frequens grauitas in mirach, malitia anime, corruptio digestionis, & eructuatio acetosa, rugitus & exitus uentositatis, & inflatio, & inuenit dolorem inter utraque spatulas usquequo cibus digeratur, & euomit phlegma permixtum cholæræ, aut melancholiæ, & quandoque præcedit apostema in mirach, aut oppilatio in melaicis, & apparet fluxus chilosus chilo non potente transire ad epar.

Signa uero quod fit per cõmunitatem à corde aut à matrice, aut membris alijs sunt præcessio nocumentorum huiusmodi membrorum, & propriè cum non uidetur ab alijs causis pendere uerisimiliter.

Signa uero humoris melancholici sunt ista, nam quando est à sanguine, est cum risu, siue uero, siue non uero, & non est in eo tristitia uehemens. Si autem est à phlegmate est cum pigritia & quiete & dominio frigiditatis & si à cholera est cum agitatione, rixa, & dæmonio. Et si est per adustionem uehementem melancholiæ, est etiam cum rixa & dæmonio magis persequente, & si fuerit à cholera pura nigra, tunc cogitatio in ipsa erit plurima, & audacia minor nisi moueatur & rixetur, & habet odium cuius non obliuiscitur.

Signa uero causarum primitiuarum sunt ipsæmet causæ. Signa uero dæmonis nulla sunt nisi quod dicat aliqua quæ ante nesciebat, sicut si loqueretur literaliter, aut theutonicum, aut secundum aliud idioma

quod prius nesciebat aut sciat aliqua occulta quæ uerisimiliter scire non debet. Quanquam Ari. problematum 19. problem. 1. hæc omnia resoluat in melancholiam. Inquit enim quod ex melancholia quidam facti sunt sicut diuini prædicentes futura. Et exemplificat de Sybilla & Bachide, & quidam facti sunt poëtae, sicut Malanthius Syraculanus. Ego uero adhærens ueritati fidei Christianæ credo Sybillam Erythream esse prophetissam, & de Christo prophetizasse, & Malanthium Syraculanum qui post maniam numeratus est inter poëtas, credo ante maniam non fuisse expertem poësis, uerum post maniam subtiliorem factum esse, humiditatis cerebri eius ingenium hebetantibus resolutis, non enim credo sola melancholia huiusmodi posse contingere, sed ex coniunctione angeli uel dæmonis cum anima humana &c.

Prognostica. Primum melanch. cum risu est salubrior cæteris. Secundum hæmorrhoides, elephantia, uarices superuenientes solunt melancholiam.

Tertium. Melancholia periodica debito seruat regimine curatur. Ex indebito uero regimine efficitur continua non curabilis. Quartum. melancholia per essentiam in cerebro multum antiqua non est curabilis, per communitatem uero antiquata frequenter curatur. Quintum euacuatio cholæræ nigræ uomitu & fecellu, & similiter eius apparitio in cute sicut in panno & lentiginibus soluit melancholiam.

Quod si cū melancholia fuerit dolor uentris & inflatio, & malus color, & digestionis corruptio, & uomitus accessus & excreationis multitudo.

Hic Rasis agit de cura melancholiæ. Habet autem hæc pars. 2. partes. In prima ponit curam melanch. splenetice. In secunda ibi. Si autem cum melancholia. Ponit curam melancholicæ per essentiam in cerebro. Prima iterum in duas. Nam in prima parte ponit signa melancholicæ splenetice. In secunda ibi. Incipienda est cura. ponit ipsius curam. In prima parte ponit 6. signa. Primum est dolor uentris scilicet stomachi & intestinorum. Secundum est ipsius uentris inflatio propter uentositatem genitam à melanch. est enim melancholia plurimum uentosa, 19. problematum problemate 1. Ventositas etiam multiplicatur propter indigestionem, phlegmate multiplicato & uentoso. Tertium est malus color. Quartum corruptio digestionis, scilicet ad acetosum secundum plurimum, & propterea fit malus color. Quintum est uomitus acetosus, scilicet aut melanch. ad stomachum deriuatæ, quæ est acris cum ponticirate, aut fortè fit uomitus acetosus, id est, phleg. acetosi per corruptam digestionem multiplicati. Sextum est multitudo excreationis, id est, sputi per communitatem à stomacho. Deinde cum dicit.

Incipienda est cura cum phlebotomia ex basilica aut saluatella sinistræ manus. Et si sanguis uisus fuerit niger, dimittatur egressi in multa quantitate. Subtilis autem & rubens si fuerit, restringendus erit ilico.
Habet

Habet hæc pars sex partes. In prima ponit curam per phlebotomiam. In secunda ibi. Aeger uero ex rebus. Ponit curam per nutrientia. In tertia parte, scilicet ibi. Mittendus est in balneo. Ponit curam per balneum. In quarta ibi. Post hoc autem decoctione. Ponit curam per medicinas soluentes. In quinta ibi. In his autem diebus. Complect regimen per dietam, & reliquum regimen sex rerum non naturalium.

In sexta. Et studendū est. Docet rectificare splenem & stomachum. De prima parte dicit incipiendam esse curam cum phlebotomia basilicæ quæ est in curuatura brachij in parte inferiori, quando intentio est magis euacuare aut in saluarella eiusdem in manus sinistra, quando intentio est cum hoc diuertere. Et hæc saluarella reperitur in manu inter anularem & auricularem, & est ramus basilicæ. Et subdit quod sanguis egrediens est considerandus: si enim fuerit subtilis & rubeus, ilico stringendus est, si uero fuerit niger & crassus dimittatur egredi in quantitate multa, cum ipso enim humor melancholicus educitur. Et propterea præcipiat medicus phlebotomanti ut faciat foramen latum, ut sanguis crassus possit egredi. Nota tamen sicut dicit Auic. in cap. huic proportionato quamuis sanguis subtilis appareat in princ. non tamen ita subito est restringendus, sed permittantur egredi duæ 3. uel circa, quia aliquando post subtilem egreditur crassus & niger.

Ager uero rebus lenientibus est nutriendus, ut sunt ales fidebegi, quæ sunt ex carne hœdina & arietina.

Ponit curam per nutrientia & dicit quod nutriendus est æger ex rebus lenientibus, id est humidis, & etiam uentrem mollicatibus sicut sunt ales fidebegi, id est, iura quæ fiunt ex carne hœdina parum distante à naturitate, & arietina unius anni uel circa. Et sic intellige de reliquis carnibus humidis boni nutrimenti paucarum superfluitatū sicut capones, phasiani. Et proprie multum impinguati.

Et mittendus est in balneum in quo non diu moretur.

Lubet ægrum poni in balneo aque dulcis, aut in decoctione rerum humectantium, in quo tamen non multum moretur, ut non debilitetur, neque partes subtiles resoluantur, & ideo balneum debet esse satis temperatum cōforme calori nostro, & debet etiam aqua balnei proijci super caput ægri. Et per hunc usum balnei multos à quartana liberaui: digerunt enim humor melancholicum ipsum reducendo ad benignum uel ad expulsiōem præparando.

Post hoc autem decoctione de epithymo quam ego composui utatur. Recipe mirobalarum indorum drach. 10. polypodij drach. 5. senæ drach. 8. turbith. drach. 4. stecados drach. 10. passularum enucleatarum drach. 10. epithymi cretensis drach. 10. omnia excepto epithymo in 4. lib. aque co-

quenda sunt donec ad lib. 1. & sem. redeant, quandoq; hoc factū fuerit addatur epithymū, & ilico ante ignē remoueatur, et dimittatur donec infrigidari coeperint. Quumq; infrigidata fuerint manibus fricata colentur. Deinde sumantur agarici 2. tertiae. drach. 1. aloës. drach. 1. salis indi. drach. sem. elleb. nigri quartam drach. 1. & conficiantur cum melle, aut cum iuleb, & fiant ex eis pilulæ quæ per tres horas ante decoctionis acceptionem sumendæ sunt, postea sumatur decoctio. Deinde tribus diebus quiescat. In his autē diebus quibus quiescit nutriatur ex eis quæ præcepimus. Et in potu sumat uinum subtile & clarum & bene odoriferum. Post hoc quoq; iterum soluendus est ut prius. Hoc uero ita, ut prædiximus, tertio iterandum est, quarta quoq; potio et danda est. Ager uero ab omnibus quæ choleram generant nigram abstinendus est, ut sunt carnes syluestres omnes et caro uaccina, & hircina, & magnarum caprarum, & fabæ, & caro salita, & caseus uetus, & lentes, & omnia humectatiua. Vinum præterea grossum, labores & uigilias euitet. Nec patiatur famem uel sitim, uino uero subtili in potu utatur, & præcipiendum est ei ut dormiat.

In hac quarta parte citat per solutiua dando decoctionem de epithymo. & mirobalarum indorum & nigrorum qui sunt frig. & sic. melancholiam soluentes 3. 10. polypodij cal. & sic. in secundo soluentis melancholiam, & phleg. salum 3. 5. senæ cal. & sic. in secundo soluentis melancholiam 3. 8. turbith. cal. & sic. in secundo soluentis phlegma 3. 4. stecados cal. in primo. sic. in secundo soluentis melancholiam & phlegma à capite 3. 10. passularum enucleatarum cal. & hum. 3. 10. epithymi cretensis cal. & sic. in secundo optimè soluētis melancholiam 3. 10. omnia excepto epithymo coquenda sunt in tribus lib. aque ad consumptionem medietatis, & cum quasi facta fuerit huiusmodi consumptio addatur epithymum, & ilico ab igne remoueatur, quia epithymum parum sustinet de decoctione, & hæc sic bullita dimittantur infrigidari & refrigerari, & cum aliquantulum infrigidata fuerint, bene exprimantur & colentur, & colatura reseruetur, quam debet æger accipere in quatuor uicibus debite calidam. Et inter unam assumptionem &

alteram medient tres dies, & sumatur unaquæq; portio in mane celebrata digestionem cœnæ præcedentis, sed per tres horas ante unamquamq; istarum portionum detur quarta pars istarum pilularum. R. agarici cal. & sic. euacuantis phlegma, cholera & melancholiam 3. aloës cal. & sic. euacuantis phlegma & cholera, & rectificantis, scilicet alia solutiva 3. i. salis indii, cal. & sic. in secundo soluentis melancholiam 3. s. elleb. nigri cal. & sic. in tertio soluentis melancholiam gran. 15. fiant pilulæ 20. cum melle aut iuleb uiol. aut simili, quæ pilulæ in quatuor uicibus debent sumi sicut decoctio prædicta, sed per tres horas ante decoctionem, hoc autem fit ut pilulæ sint primo actuatæ, deinde decoctio succedat per tres horas, ut adiuuet operationem pilularum superscriptarum, ut etiam humectet & æquet humores uel humoris substantiam. Si tamen uenter esset facilis sufficeret sola decoctio, & esset præstatio quàm pilulæ, causis inferius assignandis. Tẽpore intermedio æger quiescat animo & corpore, & nutriatur his brodijs & carnibus quæ dicta sunt superius. Et bibat uinum subtile, clarum, odoriferum, participans aliqua dulcedine, & sit unius anni tantum. Et æger abstineat ab omnibus quæ cholera nigram multiplicat sicut carnes syluestres, leporum, cuniculorum, ceruorum, & huiusmodi. uitet carnem uaccinam, hircinam, magnarum caprarum, fabas, carnem salitam, caseum ueterem, lentes, & omnia olera præbentia nutrimentum siccum, sicut ruta, & eruca, & similes. Sed cucurbitæ, spinachia, & cætera humida concedi possunt. Vitet etiam uinum crassum, laborem multum, uigilias multas, imò multum dormiat, nec patiarur longam famem, aut sitim.

Et studendum in splenis curatione ex his quæ in sequentibus in cap. de splenis curatione qui augmentatur, dicturi sumus. Os quoq; stomachi confortandum est, & propriè ex medicinis quarum mentionem in sequentibus facturi sumus cum ægrotudines stomachi nominabimus.

In hac sexta parte & ultima dicit Rasis splenem esse curandum, & propriè cum tumidus est secundum quod inferius dicitur, ubi agetur de curatione splenis quādo tumescit. Est tamen regula generalis in omni ægrotudine quæ sit per cõmunitatem ab aliquo membro, membrum istud esse rectificandum. Similiter dicit esse confortandũ os stomachi in melancholia splenetica, cum stomachus per os eius recipiat melancholiam, quæ præter modum fluens ad ipsum corrumpit ipsius digestionem.

Si autem cum melancholica ea quæ nominauimus non fuerint, & acciderit post longam morã sub sole, aut phrenesim, aut percussione in capite phlebotomia ex cephalica facienda est. Et capiti studium adhibendum ex reliquo regimine quod dicimus

propriè. Aqua præterea tepida ab alto loco super caput fundenda est. Deinde oleũ ros. cum aceto uini capiti infundatur, & lac muliebre de super mulgeatur. Naribus etiã oleũ de seminibus cucurbitæ dulcis, & lac muliebre injiciatur. In balneum quoq; sæpe mittendus est, & multum ex aqua tepida capiti est superinfundendum. Aeger etiam omnia odorifera quæ frigida sunt odoret.

In hac secūda parte principali curat melancholiam per essentiam in capite. Habet hæc pars duas partes. In prima curat melancholiam quæ est in mania. In secunda ibi. Si autẽ melancholia. Curat melancholiam propriè sumptã, distinctam contra maniam. De prima parte dicit, quod si cum melancholia non fuerint ista quæ nominauimus, id est, illa sex signa melancholice splenetice, imò acciderit post phrenesim, aut longam morã in sole, quæ arguunt ipsam pendere à melancholia adusta, aut acciderit post percussione in capite, per quam humores calidi ad caput attrahuntur, qui postea adusti faciunt maniam. In his ergo casibus in principio faciendã est phlebotomia ex cephalica quæ est incuruatura brachij in parte superiori, tũ ad diuertendum materiã fluentem, tum ad euacuandum materiã iam fluxam. Secundo est capiti studium adhibendũ in reliquo regimine superius dicto per euacuationem humoris melancholici. Tertiõ aqua tepida est capiti ab alto infundenda ad humectandum & infrigidandum, postquam embrocationem oleum ros. mixtum cum quarta parte aceti, ut magis penetret capiti infundendum: hæc enim infrigidant, confortant & reperiunt, & de super lac muliebre infundatur ad humectandũ & infrigidandũ, oleum etiam de femine cucurbitæ, lac muliebre singulariter aut coniunctim naribus injiciatur. Vltimò ad infrigidandum & humectandum debet poni in balneo aquæ tepidæ multũ de ea capiti infundendo & odoraret ea quæ frigida sunt & humida, sicut aquam ros. & uiol. & similes.

Si autem cum melancholia nihil fuerit eorum quæ diximus in principio matrix uena dextri brachij aperienda erit et sanguis considerandus, & ut prædiximus faciendum erit & regiendum. Et postquam hoc regimẽ infirmo adhibueris per aliquot dies quiescere dimittendus est. Deinde ut prius in cura eius incipiendum donec sanitatis fiat restitutio.

Docet curare melancholiã distinctam contra maniam, quæ provenit à cholera nigra non adusta, aut à melancholia phlegmatica uel sanguinea, in qua non remanet multa caliditas, & etiã quæ provenit à melancholia genita per cõgelationem, sed maxime hoc regimen

regimen est proprium melancholiæ naturali & sanguineæ. Sed maximè quâdo fouentur à mala cordis & membrorum spiritalium dispositione. Et habet hæc pars quatuor partes. In prima ponit curam per phlebotomiam. In secunda ibi. Studium uerò totum. Ponit curam per debitum regimen sex rerum nō naturalium. In tertia parte ponit curā per solutiuā ibi. Pilulæ quæ cholera nigram. In quarta ibi. In duobus uerò, ponit curam per electuarium lætificans. De prima parte dicit quod si cum melancholia non fuerit aliquod eorū quæ diximus, scilicet signa ipsius melancholiæ splenetice, & supple neq; fuerint signa manig, matrix uena, id est, cōmuni dextris brachij erit aperienda, & sanguis cōsiderandus: nā si fuerit subtilis, clarus, non permittatur exire nisi in parua quantitate, ut dictum est. Si uerò crassus & niger permittatur exire secundum uirtutis tolerantia & cæteras circumstantias. Deinde reliquū regimen scilicet, balneū, embrocatio, euacuatio capitis obseruandum est, ut superius dictū fuit, interponendo inter unā euacuationē & aliam tēpus sufficiens ad uirtutis restaurationē.

Studium uerò totum quod erga melancholicos est obseruandum, est ut impinguentur & carnosi fiant, ex quo enim pingues & carnosi fuerint ilico sani erunt. Cibi autem qui illis congruunt sunt caro arietina, & hœdina, & gallinacea, & panis de simula. Oppyrus autem panis nullo modo est eis congruus. Vinum quoq; subtile & clarum eis conueniens est, uinum uerò crassum non est eis bonum, nec nigrum. Lac autem recter ab uberibus extractum dum adhuc calet eis confert. Pisces recentes & sesami de saccharo facti. Et oleum amygdalinum. Præterea audire cantilenas, & gaudere, & habere ante se res delitiosas, & dormire plurimum confert eis. Econtrario uerò cogitare, & solos morari, & uigilare maximè nocet eis.

In hac parte ponit ipsorum debitum regimen. Est enim studendum ut impinguentur & carnosi fiant. Ex quo enim pingues & carnosi fuerint, ilico sani erunt. Cauendum tamen ne cadant in oppilationes, & propterea caro arietina, hœdina, gallinacea, & similes boni nutrimenti & humidi, & brodia ipsarum conueniunt, & panis de simula, id est, optima farina. Panis autem oppyrus, id est, crassus & azimus sicut est panis rusticorum nō conuenit. Et similiter conuenit uinum subtile clarum, album, unius anni, nigrum uerò crassum aut antiquum non conuenit, lac recentius multum ab uberibus, ut non corrumpantur, confert. Et similiter pisces recentes, & sesami cal. & hum. conditi cum saccharo, et oleum amig. cal. & hum. cō-

ferunt. Et similiter audire cantilenas, gaudere, habere res delitiosas conferunt, sicut econtrario superflue cogitationes, solos morari, multum uigilare & omnia exiccantia plurimum nocent.

Pilulæ quæ cholera nigram expellunt, de quibus datur his qui decoctionem sumere nequeunt. Rec. epithymi cretensis, drach. 20. polypodij, agarici amborum, an. drach. 10. elleb. ni. salis indi amborum, an. drach. 5. stecados drach. 7. pulueris hieie pic. drach. 15. bibat ex eis drach. 3. In diebus uerò quibus quiescit æger, debet sumere elect. quod uocatur lætificans, quod recipit melissæ, cortic. citri, gariop. galie musc. mastichis, croci orientalis, cinamomi, nucis muscatæ, cardamomi, neberemit, been al. & ru zedoaria, doronigi, sem. ozimi, gariophilati omnium an. partes æquales, musci quantum est 10. pars drach. 1. deinde sumantur chebuli 20. & emblici 30. & terantur, & in tribus lib. aquæ coquantur donec ad unam redeant & colentur, in colatura uerò addatur mellis lib. 1. deinde bulliant donec aqua consumpta sit, post hoc ex hoc melle conficiantur species prædictæ, quod tamen in pōdere sit triplum ad species. De quo cum necesse sit ad magnitudinem auellanae sumendum est. Hoc enim medicamen latitiam & coloris pulchritudinem, & digestionis bonitatem operatur & retardat canos.

Ponit descriptionem pilularum quæ debent dari his qui non possunt sumere decoctionem. R. epithymi, &c. Hæc descriptio superius declarata est sufficienter, tamen 3. 1. s. pro uice dari potest, licet ipse iubeat dare 3. 3. In diebus uerò in quibus. Hic Rasis describit electuarium lætificans in quo ponitur melissa dicta ranzata & citraria. & secundo canon. bederelegen. cal. & sic. in secundo. lætificatiua cordis auferens tremorem. Cortices subtiles citri aromatici, cordiales cal. & sic. in secundo. Gariophili maximè cordiales cal. & sic. in tertio. Galia musc. cuius plures sunt descriptiones in Seruitore & Mesue, mastix medicina stomachalis, theriaca stomachicæ cal. & sic. in secundo. Crocus maximè lætificans scilicet, ut 3. atr. interficiant lætificando, faciendo spiritus exalare cal. in secundo, sic. in primo. Nux musc. cal. & sic. in secundo. stomachalis & cerebralis. Cinamomū cordiale præseruans à putredine cal. & sic. in tertio. & præstantius quàm cassia lignea ad corrigendum putrefactionem

& rectificandum complexionem, ad mundificandum uirus malum, ad resistendum medicinis mortiferis & uenenosis, sicut uult Auic. 14. tertij c. de cura debilitatis epatis, & istæ duæ excedunt omnes alias medicinas in effectibus iam dictis. Cardamomum cal. & sic. in tertio. stomachale, neheremith, id est, peonia, de qua supra. Been al. & rub. radices cordiales cal. & sic. in secundo. zedoaria ualens contra uenena habens duas species, scilicet, zorumbeth cal. & sic. in tertio. alia est zedoar, quæ est præstantior prima. 2. can. cap. de zorumbeth, doronigi cal. & sic. in tertio. confortans cor. Seminis ocimi gariophilati, id est, basiliconis minoris habentis folia parua, & redolentis bene ad differentiam magni, maiora habentis folia, quod calidius & siccius est quam maius scilicet circa secundum gradum, et aliter dicitur bedoragi, de istis 15. accipiuntur. añ. 3. 2. musci gran. 12. & est cal. & sic. in secundo. hæc omnia subtiliter puluerizentur. deinde sumantur chebuli numero 20. emblici numero 30. & teratur crasso modo, & bullant, in lb. 3. aquæ donec redeat ad 1. Verum mihi uidetur nimis magna quantitas mirobalanorum in comparatione ad aquam, sufficeret enim medietas, & coletur, & colatura ista bulliat in lb. 1. mellis, donec sufficienter spumetur, & aqua consumpta sit. deinde species suprascriptæ cum hoc melle miscantur, ita ut mel sit triplum ad species quamuis mos communis apud apothecarios est, ut pro. 1. lb. mellis ponantur 3. 2. et s. pulueris, sed hoc modo est uirtuosius: ponunt etiam communiter pro 1. sachari. s. 3. pulueris, licet 3. 1. posset poni. Hoc enim electuarium sumptum ad magnitudinem auellang in mane cum retardatione cibi saltem per quatuor horas inducit leticiam, coloris pulchritudinem, digestionis bonitatem, et tardat canitiem. Sed nota hoc electuar. conuenire in melancholia phlegmatica, aut pendente ab humore melancholico genito per congelationem, & non per adustionem: est enim notabiliter cal. & sic. Et si uelles ipsum conuenire in melancholia à cholera nig. & à cholera naturali addas 3. 3. passularum enudeat, pro unaquaq; lb. ipsius.

Primo ponam curam eius quæ est per essentiam in cerebro, secundo eius quæ est per communitatem, tertio eius quæ pendet à causis primitiuis. Cura itaq; illius quæ est per essentiam in cerebro, si sit mala complexio sine materia, exigit 4. intentiones curatiuas. Prima alterat malam complexionem cum contrariis cerebrum in omni dispositione confortantibus & etiam cor. Secunda prohibet humores à fluxu ad cerebrum si fuerint proni ad fluxum. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima completur cum notabiliter humectantibus, sed sint aliquando cal. aliquando frig. secundum discrasiam exigentiam, & cum hoc propria & cerebri & cordis confortatiua, necnon spiritus confortantia & illustrantia, quæ confortatio & spirituum illustratio in toto curre processu debet attendi & in quacumque specie. Et propterea pro completa notitia bonum est, ut hic describam nouem modos confortationis spirituum, & per consequens membrorum principalium, & sibi deseruentium, deinde medicinas in hac dispositione proprias quibus poteris uti secundum necessitatem. Nouem modi confortandi spiritus. Primo confortantur spiritus per restaurationem ad quod ualent

cerebella hocedorum, aprorum, uitulorum, gallinarum, frequenter comesta. Et uinum album aromaticum subtile, & alia generatiua boni sanguinis & clari, & utellouorum aqua carnis, & similia. Secundo per splendiantia spiritum, & reddentia ipsum illustrem & clarum, ut faciunt margaritæ. Tertio per congregantia & prohibentia resolutionem eius sicut Karabe & mirobalani emblici. Quarto corrigendo lapsam complexionem eius, ut frigidum cum calidis propriis sicut melissa, doronigi, muscus. Et calidum cum frigidis sicut rosa acetosa, & camphora. Quinto per occultantia proprietatem, ut hiacynthus & calcedonius. Sexto, separando contraria, ut buglossa, & cætera quæ separant uapores melancholicos à spiritu, & melancholiam à sanguine. Et sicut omnia clarificantia siue mundificantia sanguinem, facientia ipsum illustrem sicut capillus ueni, fumus ter. lupulus. Septimo, per exercitatoria spiritus exercitio suauis & sibi proportionato, sicut cogitationes, aspectus, auditus, rerum gratiarum & desideratarum, ut cantilenæ & soni. Octauo, confortando & conseruando calidam complexionem spirituum sicut faciunt omnia aromatica habentia substantiam subtilem aromaticam conformem substantiæ spiritus, sicut crocus, & quorum copiam subiungam statim. Nono & ultimo defendendo spiritus à uenenosis & ab his quæ sunt sibi contraria, tam per qualitates manifestas quam occultas, & propter modum mixtionis & alia insequentia materiam, sicut faciunt zedoaria, lapis sinaragdis, & similia. Et plures harum intentionum si diligenter adueras tu inuenies in diamusco & in electuario de gemmis descriptione Mesue. Et in lætificans Alman. in hoc cap. & in similibus compositis, & de nouo componendis ad hoc propositum, in quibus nihil debet poni nisi propter aliquam specialem intentionem proposito deseruientem. Nunc uero subiungam medicinas simplices & compositas alteratiuas & euacuatias in hac dispositione propria ex quibus sunt infra scriptæ. Frigida sunt primo acetum, quod aliquando debet esse scilicet cum propter humoris crassitatem & uiscositatem, lactuca, endiuia, lac, cucurbita, flores nenupharis, acetosa, rosa, uiola, coralli, margaritæ, coriandrum præparatum, flores prunorum, amigdalorum, flores citoniorum, pirorum, & propriè odorare persica, pira, poma aromatica. Composita, saccharum rosæ, saccharum uiuæ, Syrupus de pomis Mesue. Olea ex aliquibus suprascriptis. Calida sunt aqua lactis, basilico, gariophilatum, calamus arom. gariophili, melissa, muscus, os de corde cerui, ambra, been utrunq; cortices citri, crocus, cubugi, id est, caro perdicis, doronigi, enula, gallia, macis, menta, nux muscata, rosmarinus, xilaloës, passulæ. Composita sunt diamuscum, diambra, mithridatum, pliris arconicon. Rosata magna Nicolai. Electuarium de gemmis Mesue. lætificans Alman. aromaticum rosæ, muscatum, gariophilatum, Gabrielis. Mesue. Confectio Kemes Mes. conditum de citro. Galia muscata theriaca, &c. Temperata & agentia à proprietate sunt sicut aurum buglossa & flores eius, calcedonius lapis collo suspensus. chrysolithus lapis finitro brachio ligatus, borago & flores eius. Hiacynthus, saccharum buglossatum, saccharum boraginum, lapis beza-har. Solutiua simplicia sunt agaricus, aloës, aqua lactis, colocynthis, elleborus niger, epithymum, escula

lapis

lapis lazuli, lapis armenus & mirobalani, chebuli, & nigri, sal indus, fena. Composita sunt confectio hamech, diasenae, pilulae indae, pilulae de lapide lazuli, pilulae de lapide armeno, hiera Rasid, Mesue, decoctio epithymi Mesue. His ergo pro complenda prima intentione quae est malae complexionis alteratio utere simplicibus, aut compositis exterius applicitis, aut interius sumptis secundum quod expedit tuo proposito. Prohibentur autem humores à fluxu iuxta secundam intentionem euacuando & diuertendo secundum quod dicitur in sequentibus. Corrigan- tur autem accidentia praesentia secundum quod expedit iuxta tertiam intentionem, ut puta uigilia cum somniferis exterius applicitis inungendo, embrocando auribus & naribus instillando, etiam interius sumptis, incipiendo à leuioribus, & gradatim ad fortiora procedendo. Et similiter cetera accidentia praesentia corrigan- tur secundum opportunitatem. Cauendum est etiam ab imminentibus periculis aegris & astantibus, ne se ex alto praecipitent & ne se percutiant, neque alios, quapropter oportet quod aliquando teneantur in compendibus & uerberentur. Et sint deputati eorum custodes aliqui quos uereantur & timeant, nisi enim sic fiat nec permittent se medicari secundum quod oportet, & magna interdum faciunt scandala, & cura omnis erit uana. Regimen autem sex rerum non naturalium iuxta quartam intentionem declinet ad humidum semper, sed aliquando ad cal. aliquando ad frig. secundum discrasiae exigentiam, & totum regimen sit impinguium, preterquam quod non faciat cadere in oppilationes, & inter cetera somnus sit prolixus, & omnia animi accidentia ad iucunditatem declinent. Si uero mania & melancholia pendeat à mala complexionis capitis, aut sit ualde antiqua, aut ex generatione contracta, aut sequens alias aegritudines, quarum impossibilis sit eradicatio sicut quae sequitur epilepsiam, cura secundum plurimum est impossibilis, sed lenienda & accidentia mitiganda quantum est possibile.

Cura uero maniae & melancholiae pendens à mala complexionis cum praesentia materiae melancholicae in cerebro non aliunde communicatae sex exigit intentiones curatiuas. Prima euacuat euacuatione integra ex minoratione, digestionem & eradicationem iterata si oportuerit. Secunda diuertit, tertia causam coniunctam resoluit & euacuat, quarta malam complexionem in cerebro derelictam corrigit, & cerebrum, & cor confortat. Quinta accidentia corrigit. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Pro prima intentione. Si melancholia fuerit sanguinea, aut aliud genus melancholiae cum sanguine peccauerit fiat phlebotomia ex cephalica dextra aut sinistra, scilicet, secundum eam partem in qua maior capitis grauedo apparet, & fiat foramen latum & sanguine existente nigro hauriantur 5, aut 6. 3. sanguinis secundum exigentiam circumstantiarum. Si uero sanguis fuerit subtilis aut tendens in album, non hauriantur ultra 2, aut 3. 3. Et si causa huius melancholiae fuerit epar, aut splen, phlebotometur basilica dextra aut sinistra, & si retentio menses uel aut hemorrhoidarum fuerit in causa, phlebotomentur sa- phenae Mesue autem corpore existente pleno sanguine phlebotomat, primo ex uena nigra, deinde ex ba-

silica in melancholia: incipit enim à phlebotomia magis communi. Sed in mania incipit à basilica existimans epar esse causam adustionis et conuersionis sanguinis in melancholiam. Et etiam post has si oportuerit phlebotomanda est uena frontis ad eradicationem causae coniunctae. Si uero aliud genus melancholiae peccauerit distans à natura sanguinis, si multum fuerit, minoretur cum 1. 3. scenae & gra. 5. zing. permixtis cum 3. 3. feri caprini, uel sumatur serum caprinum cum 3. 2. epithymi. & zing. salis gemmae. an. gran. 2. uel minoretur cum pilulis istis, q. senae, epithymi, pilularum indarum, ana. 3. 1. zing. salis gemmae, ana. gra. 2. aloes epatici 3. 1. cum aqua buglossae formentur pilulae 15. de quibus possunt sumi quinque uel septem pro minoratione. Deinde digerat materia cum syrupo de pomis descriptis Sabor apud Mesue in capitulo de cura maniae aut melancholiae, aut cum syrupo de epithymo, aut de bisantibus, aut uiolis, aut de fumo terrae cum aqua buglossae, boraginis, endiuiae, nenufaris, mellissae, & similibus quae declinent ad calidum et frigidum secundum exigentiam melancholiae & aliarum circumstantiarum. Et possunt syrupsus distemperari cum sero caprino, & esset ualde conueniens. Eradicetur autem materia si fuerit adusta in mania cum electuario hamech, distemperato cum sero caprino, in quo bullierit epithymum, senae, sal indum, zingib. & flores buglossae. Si uero melancholia non fuerit adusta loco electuarij hamech ponatur diasena Nicolai, aut eradicetur cum pilulis indis de lapide lazuli, & lapide armeno, & similibus. Multa etiam solutiuia per te componere potes obseruatis quatuor regulis Mesue. Prima, ut non semel multam & laboriosam facias euacuationem, sed per interualla parum pro uice educendo, quo euacuato reiteranda est. Secunda, ut medicinae exoluentes non recedant multum à gradu medicinarum incolumium, quod intelligendum est tam quo ad qualitates manifestas, quam quo ad occultas. Tertia, ut solutiuia semper sint mixta cum humectantibus & lenientibus, propterea praestantiores sunt medicinae in forma liquida quam sicca. Quarta, ut nunquam denu- dentur à medicinis confortantibus membra principalia & spiritus. Similiter multa digestiua componere potes cal. aut frig. secundum quod expedit, sed semper sint humida non oppilantia, immo oppilationem remouentia. possunt enim aliqua ex simplicibus, supra enumeratis bullire cum aqua lactis, & postea facta debita collatione, potest decoctio syrupizari cum sacch. est enim aqua lactis optimum uehiculum in huiusmodi passionibus. Et nota quod bonum est huiusmodi digestiuis & euacuariis ponere aliquid dirigens talem medicinam ad caput, sicut uiolae, stecae, & similia. Secunda uero intentio, scilicet, diuersio perficitur cum clysteribus, quae per te potes componere fricationibus, uentrosationibus, descendendo, lotionibus extremi- tatum, quae cum hoc quod diuertunt, sint etiam ad somnum inducendum iuuatiua si expediret, sicut etiam diuersiones cum caput purgans, mastica- torijs, gargarismatibus, quae tria cum hoc quod diuertunt etiam causam coniunctam eradicant, quod pertinet ad tertiam intentionem. Et ad hoc optime ualent cauteria actualia, & proprie cum

auro facta in commissura coronali, sagittali, lambde, & duabus commissuris mendosis quæ sunt in lateribus, non dico quod omnes semper cauterizari debeant, sed una aut plures secundum quod est expediens tuo proposito, semper inspiciendo cuius partis cerebri operatio magis lædatur, & fiat in commissura illi parti pertinenti. Et huiusmodi cauteria non solum conferunt in ea quæ est per essentiam, sed etiam per communitatem confortando cerebrum ne recipiat, ut apparuit in cap. de soda per communitatem & de intentione Auic. Tertia autem intentio quæ est causæ coniunctæ eradicatio completur cum iam dictis in secunda intentione, & partim cum cõplentibus quartam, quæ est cerebri & cordis confortatio & malæ cõplexionis derelictæ correctio. Et complentur ambo cum quibusdam localibus, ut embroca ros. foliorum salicis, florum nenuaris, uiol. boraginis, buglossæ, an. M. i. senæ ʒ. s. stecados arabici. ʒ. i. capitis castrati numero 1. Caput castrati confractū bulliat in sufficienti quantitate aquæ cum superscriptis usque ad decoctionem. deinde cum aqua illa tepida caput lauetur & embrocetur alternis diebus, etiam omni die, & pluries in die si expedierit. Et si non possit dormire, huic decoctioni possunt addi cortices papaueris & lactuca. Balnea etiam ex similibus humectantibus facta, toti corpori sunt in hac dispositione conuenientia, & in fine possent inungi caput, & maxime in mania cū oleo ros. uiol. de floribus salicis de nenufare, & etiam myrtino ad confortationem & malæ complexionis derelictæ correctionem. Et confortetur etiam cor cum epithymatibus in hac dispositione proprijs quæ ex superscriptis eligantur, saccharum quoque ros. buglossæ, uiol. boraginum cum gemmis, margaritis, passulis transmarinis, succo pomorum dulcium, & huiusmodi ualent iuxta quartam intentionem ad cerebri & cordis confortationem. Et si mala complexio derelicta esset frigida sicut in melancholia procedatur cum calidis exterius applicitis & interius sumptis. Superscriptæ enim embrocæ & unctiones magis conferunt in mania quam in melancholia, imò in melancholia augeantur cal. & minuatur frigida: semper tamen in quacunque specie declinet ad humidum. Corriganter accidentia & propriè uigiliarum instantia cū syrupo de papauere, sumpto hora somni, cum lacte sem. papaueris. Et si potèntioribus opus erit, datur requies descriptione Nicolai, aut aliqua ex pilulis de cynoglossa, siue alcaiber apud Mesue, cap. de catarho ex inuentione Alexandri, & etiam inducatur somnus cum his quæ applicantur fronti & temporibus sicut cum populeone, cui apud necessitatem addatur parum opi, aut cum embrocis de quibus sermo præcessit, & cum balneis humectantibus. Et si aliquando cibus in stomacho corruperetur, uomitu educatur, & postea stomachus cõfortetur cum aromatico ros. & etiam exterius applicitis, & omnia accidentia secundum quod oportet corriganter recurrando ad illorum capita propria. Sexta autem intentio scilicet, debitum regimen, ordinetur ut fuit dictum de intentione Rasis in expositione textus. Declinet enim aer ad humidum, & sit aliquantulum calidus aut temperatus in actiuis in melancholia, sed in mania declinet ad frigidum unde habitat in terreno, sed sit clarus & lucidus. Et domus habitationis sit sine picturis, & simi-

liter sit regimen in cibo & potu, ut dictum est de aere, & sit impinguium præter hoc quod oppilet. Sed declinet ad frigidum in mania & ad calidum in melancholia. Et dentur omnia quæ generent bonum sanguinem, subtile, clarum, & cum hoc cerebrum & spiritus confortent. Quapropter uinum album uel medijs coloris, subtile, unius anni tantum, aliquantulum dulce, & debite lymphatum secundum exigentiam, est huic proposito conueniens. Et sit somnus prolixus, & procurentur euacuationes à natura institutæ. caueat à coitu nisi natura præter modum stimulari, moderatè exerciteur, & tempore debito & fricationes leues diuertit, & impinguant & uicem suppleant exercitij. Et omnia iucunda administrantur ei cauendo à tristitia, ira, solitudine, cogitationibus profundis & prolixis. Sit tamen deputatus eius custodiæ aliquis quem timeat & uereatur, & à quo secundum opportunitatem uerberetur, ut sit obediens.

Cura autem mania & melancholia per communitatem.

Cura autem mania & melanch. per communitatem duplex exigit regimen. Vnum circa membrum recipiens scilicet, cerebrum, alterum circa membrum mittens. Membra autem mittentia quorum communitate frequenter læditur cerebrum & incurrit melancholiam, sunt sex, cor, stomachus, splen, mesenterium, quod est causa melancholia mirachis, licet etiam mirach proprie acceptum potest esse causa eius, epas, & matrix. Primum autem regimen cerebro adhibendum, quod debet obseruari in toto curre processu, est, ut confortetur & prohibeatur ne à membro sibi communicante recipiat uapores, aut humores, aut malam qualitatem per quam ipsius complexio distemperetur. Hoc autem fit cum interius sumptis & exterius applicitis ipsum confortantibus ne recipiat huiusmodi causas nocumentorum, & ne labatur in aliquam ægritudinem in quam merito membri sibi communicantis esset aptum labi: ergo in omni dispositione cerebrum debet humectari, debet autem aliquando calefieri & propriè in melancholia, aliquando refrigerari & propriè in mania, secundum exigentiam nocumenti sibi à membro mittente communicati, aut communicandi. Debet etiam confortari cum his quæ propria sunt calidis aut frig. secundum exigentiam. Quæ autem sint ista patere possunt ex iam dictis, sunt enim enumeratæ fere omnes medicinae famosæ simplices aut compositæ cal. & frig. hu. & sic. & temperatæ in hac dispositione propriè, tu tamen utere his quæ tibi magis deseruiunt. Secundum autem regimen respiciens membrum mittens quatuor exigit intentiones. Prima quia ista nocumeta horum membrorum secundum plurimum sunt materialia, est euacuatio integrata ex minoratione, digestionem & eradicationem etiam iterata secundum exigentiam. secunda est diuersio tam à membro mittente quam à cerebro recipiente, tertia est causæ coniunctæ facientis nocumentum in membro mittente resolutio & remotio, quarta est huiusmodi membri confortatio, rectificatio ipsius cõplexionem ut huiusmodi materias non generet, sed fiat minera materiae laudabilis. Quæ autem sunt digestionem & euacuatio materias horum membrorum iuxta primam intentionem ex dictis, & dicendis manifestum erit. Oportet enim aliquando phlebotomare aliquando electiue

DE CATARRHO.

Tertio autē intentio scilicet causæ coniunctæ à mem
bro mittente refulsit perficitur cum emplastris, &
unguentis, & fomentis tam membri quàm materiæ
proprijs, & aliquando cum ventosis, cum scarifica
tione & sine, & aliquando cum cauterijs tam actua
libus quàm potentialibus in membro mittente, licet
actualia sint præstantiora quæ diu teneantur apertæ
sunt enim efficacia in multis passionibus. Ethæc om
nia cum hoc quod euacuant causam coniunctā etiam
à cerebro diuertunt. Istorum autem membrorum con
fortatio & malitiæ complexionis rectificatio iuxta
quartam intentionem perficitur cum interioris appli
citis suæ diversæ cōtrarijs aliquiditer siccis, & per
viutem quartam ipsa confortantibus, quæ omnia
parere possunt in proprijs capitulis dispositioni sin
gulorum membrorum. Accidentia autem corrigant
& ordinetur debitum regimen sex rerum non na
turalium secundum quod dictum fuit in cura melan
choliæ per essentiam in cerebro, &c.

DE CVRA CVTHVBVTH.

...obediens.

quacunq; alia causa primitiua.

DE CATARRHO. Cap. XVII.

Gerardus de solo his duobus uerib. hæc permutauit.
Cum fluit ad pectus dicatur rheuma catarrhus,
Ad frons branchus ad nares dico coryzam.

Ex his patet quid nominis & quid rei. Catarrhus
erō ad omnes ægritudines corporis disponit. Fluēs

qua caufat podagram, & cæteros dolores articuloꝝ,

Ad cor causant tremorem in eo & ceteras passiones. Et ad uenas apoplecticas, apoplexiam. Et per uenas fluens ad epar, causat nocumenta in ipso, & ad renes, & ad uescam, quādoq; excoctionē. Et ut unico uerbo omnia cōplectar, potest esse causa quarumcūq; aegritudinum cuiuscūq; membri saltem in genere.

Cum caput alicuius in egressione balnei discooperitū fuerit, aut post exercitium, aut post aliud, fueritq; aer frigidus & uentus septentrionalis, & accidit inde naribus, & palato pruritus, & commotio & sternutatio.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. Primò ponit causas catarrhi & signa in generali, secūdò curam. secunda ibi. Pannus tunc calefaciendus. De prima dicit, quòd dum caput alicuius in egressione balnei discooperitum fuerit, aut post exercitium, aut aliud calefaciens sicut iram, coitum & similia, & præcipue si fuerit aer frigidus & uentus septentrionalis, qui frigidus est & siccus, tunc iste incurrit catarrhum. Cuius signa generalia sunt hæc, titillatio pruritus in naribus & palato, & commotio, & sternutatio. Si enim materia fluat ad nares causabitur in eis pruritus commotio propter motus illius materie & interdum sternutatio si uirtutem stimulauerit ad expellendum. Horum autem ratio est, quia in balneo humores calefiunt, subtiliantur, pori aperiantur. Similiter in exercitio & alijs huiusmodi calefacientibus. Vnde aer frigidus occurrens multum penetrat ad profundum, & multo magis uentus, quapropter fit illarū humiditatum liquefactarū per balneum expressio ad membra supposita, & sic catarrhus. Signa uerò iam dicta sunt propria, cum cōmotio, titillatio, & pruritus quidam non absoluantur ab ipsa materia actu fluente. Prima distinctio. Catarrhus est duplex, quidā cal. quidam frig. Et catarrhus calidus potest à causa frigida pendere sicut à uento exprimente humiditates calidas in capite existentes, & potest pendere à causa calida sicut à balneo liquefaciente. Idem dicendum est de catarrho frigido. Et propterea nō te decipiat causa, nec arguas, causa est calida, ergo catarrhus calidus est, nec contra, est causa frigida, ergo catarrhus frigidus, sed uide signa inferius ponenda. Verū secūdum plurimū catarrhus calidus pēdet à causa calida, et frigidus à frigida.

Secūda distinctio est. Aliquis catarrhus est crassus. Aliquis subtilis. Et uterq; potest esse calidus & frigidus subtilis quidē cholericus est calidus, subtilis aquosus est frigidus. Similiter crassus potest esse calidus partibus subtilib. per actionē calidi resolutis, et potest esse frig. & factus crassus per actionem frigidi partes subtiles exprimentis. Tertia distinctio quidam est salus, quidam amarus, quidam acutus, quidam foetēs, & hi sunt calidi: quidam insipidus, quidam dulcis, & hi sunt frigidi. Quarta distinctio, quidam est continuus, quidam interpolatus, imò frequenter periodicus, materia indeterminato tempore sub certa quantitate sufficiente ad mortū aggregata, qua fluxa quies erit per tantundem temporis.

Causæ sunt triplices primitiue antecedentes & coniunctæ. Primitiue quædam sunt extraneæ sicut percussio capitis cerebrum debilitans, Sumptio uenorum aut eorum applicatio, balneum calidum. Et cōmestio rerum calidarū sicut aliorum caparum & similitū, rosæ & uiolæ à proprietate faciunt coryzam. Ex causis primitiuis non extraneis est aer frigidus, statio sub radijs lunæ & uenti septentrionales humiditates exprimentes, similiter aer calidus, statio sub sole & uenti meridionales caput replentes & humiditates liquefacientes. Et si uenti septentrionales succedant ad meridionales plures catarrhos & aegritudines ab eis pendentes expectare oportet, cū primi caput replent, secundi humiditates expriment. Et multiplicantur etiam in hyeme, & proprie si præcesserit æstas septentrionalis pauca pluuie, & autumnus austrinus pluuiosus. Et quando multiplicantur catarrhi in hyeme & proprie in regionibus meridionalibus propter repletionem capiti. Item crapulæ, ebrietates, uina potentia, satietas nauseatiua sunt causa catarrhi, & proprie in regionibus meridionalibus, & omnia ad caput multum effumantia & difficilis digestionis. Somnus enim multus est causa eius caput replendo & humectando, repletio superflua & retentio superfluum consueuorū euacuari. Item nimia sanguinis euacuatio per phlebotomiam, aut aliter sunt causa eius. Exercitiū forte humores liquefaciendo & nimia quies caput humectando. Ira fortis & cogitationes fortes humores liquefaciendo sunt causa catarrhi. Antecedentes quidem causæ sunt duplices, quædā per essentiam, quædā per cōmunitatem, primi sunt humores superflui cuiuscūq; generis in capite existentes, item malæ cōplexiones, ut frigida debilitas digestiuam, & humida debilitas retentiua, & calida humorem subtilians & stimulans expulsiua. Siccā uerò rarissimè est in causa eius, nisi forte poros obstrueret quibus prohiberetur uaporū resolutio, & mala cōplexio frigida est causa, cur branchi & coryzæ in ualde senibus non maturarū, cum frigiditas illa ex decursu ætatiuo acquirita corrigi non possit, quapropter per uiam paulatim factæ congestiōnis in his, & in quibus uirtus digestiua & expulsiua est debilis, fiunt catarrhi, digestiua nō potente sufficienter conuertere nutrimentum, & expulsiua non potente superfluitates expellere, debilitas istarum uirtutū quandoq; contrahitur ex principio generationis, quandoq; ex tempore propter longas cerebri ægri tudines. Catarrhi autē quandoq; fiunt propter cōmunitatem, aut à toto sicut in febribus, & maxime in principijs febriliū uidemus fieri catarrhos materiæ aliquatīs ex caliditate uaporū febrim, quandoq; per cōmunitatem à membro particulari, sicut à stomacho maxime cū debilis est in digerendo, multis uaporibus ad caput eleuatis, & proprie cū os stomachi est debile, nō se corrugans super cibū. Et similiter pendere possunt à reliquis mēbris nostri corporis. Sed notate quòd licet plures sint catarrhi frigidi q̄ calidi, eo quod superfluitates cerebri sunt secundum plurimū frigidæ magis q̄ calidæ, sunt tamen frequentius à causa calida q̄ à frigida, cum causæ calidæ faciant catarrhos attrahendo & dissoluendo. Et ex eo quod magis ponūt materias in motu ipsas subtiliando. Frigiditas uerò facit catarrhos debilitando uirtutem, unde paulatim cōgerit materia, & aliquādo in crassando

crassando uapores ad caput eleuatos, est enim caput sicut alembicus, ut uult Auic. quandoq; uerò humiditates exprimendo. Frigiditas uerò magis immobilitas, & retinet materias quam caliditas. huic tamen opinionioni non assentio cum sit contra experientiam, & contra Auic. s. tertij cap. proprio, & contra Gal. 2. techn. &c. Notate secundo quod caput calidum est paratum catarrhis à causa extrinseca siue calida siue frigida propter pororum dilatationem, caput uerò frigidum est magis paratum catarrhis à causa intrinseca. Humidum uerò propter utramq; causam est ad catarrhos paratissimum. Tertiò notate quod corpora habentia plenem durum non habent catarrhum, quia habentes unum membrum debile habet reliqua membra incolumia materijs ad membrum debile fluētibus, secunda causa, quia habentes plenem durum, habent humores crassos, terreo, non aptos fluxui. Et similiter e contrario habentes catarrhos non facile incurrun duritiē plenem. Vltimò nota quod sorda con iuncta catarrho auget ipsum tum attrahendo propter dolorem, tum uirtutes debilitando &c.

Signa prognostica catarrhi sunt causae ipsius: & dispositionio corporis de quibus sermo praecessit. Signum demonstratiuum commune catarrho & coryzae est titillatio & commotio quaedam sensata in naribus uel in gutture secundum fluxum materiae ad unam partem uel ad alteram.

Signa catarrhi calidi, & frigidi, sunt haec. Primum sumptum à complexione maximè capitis, quia si calidum sit, ut quia facies erit rubra uel citrina erit signum catarrhi calidi. Si uerò contra complexio fuerit frigida, quod significabitur per palorem et plumbeitatem, erit signum catarrhi frigidi. Secundum signum est sumptum à caliditate uel frigiditate sensata eius quod fluit per nares aut palatum. Tertium signum sumptum à sapore siue odore eius quod fluit, nam si fuerit saporis aut odoris acuti, aut salis, aut amari, aut foetentis istud est calidum. Si uerò insipidi, dulcis aut acris istud est frigidum. Quartum sumitur à colore, si enim quod fluit fuerit citrinum aut rubeum, significat caliditatem. Si uerò album & non fuerit falsum, frigiditatem. Si uerò nigrum aut uiride sine sapore aut odore forti significante caliditatem istud est frigidum. Si uerò cum dolore forti, illud est calidum. Verum nigredo à frigiditate est opaca, à caliditate est lucida. Quintum signum sumitur à iuuantibus & nocentibus. Si enim inuenitur per se à febre & calidis est frigidus, sin contra, est calidus. Sextum signum sumitur à nocuentis eius. Si enim fluens ad nares fecerit punctiōem, ardorem, frequentem sternutationem cum oculorum rubedine & partium adiacentium, ipse est calidus & praecipue si ibi fuerit paucitas nasitatis, id est, locutionis cum naso, neq; odoratus fuerit uehementer impediens, neq; oppilatio narium multa. Ex contrarijs autem signis cognoscitur ipsum esse frigidum. Si uerò fluet ad palatum & guttur & fecerit asperitatem, in gutture punctiōem, ardorem, mordicationem, alchola, ipse est calidus, & horum priuatione arguitur ipsum esse frigidum.

Signa uerò catarrhi crassi uel subtilis sumuntur. Primum ex eo quod expellitur. Nam si fluat & non terminetur termino proprio subtilis est. Si uerò sit globatum & terminetur termino proprio crassus est. Secundo

sumitur ex uelocitate fluxus, nā si fluat subito & maximè ad partes distantes sicut ad uias angustas ipsius pulmonis subito suffocans est subtilis. Si uerò tarde fluat est crassus imò interdum adeo crassus est, ut uix possit euelli. Verum non te decipiat mora ipsius, nam longa mora exempli gratia in pulmone partibus subtilibus resolutis incrassatur, & sic cū expellitur apparet crassus, sed haec ambiguitas tollitur ex uniformitate uel difformitate eius, nam si crassus sit per totum hoc arguit eius crassitiem. Si uerò crassus sit in medio, subtilis in partibus circumstantibus, arguitur ipsum esse subtilem, illę enim partes circumstantes subtiles sunt, quę nouiter aduenerūt nondum incrassatae. Ceterae autem differentiae catarrhi facile dignoscuntur. Signa uerò causarū primitiuarum sunt ipsae causae primitivae, antecedentes uel concomitantes nocumenta ex ipsis derelicta.

Cognoscitur autem esse per communiatem à toto, ut quia adsunt nocumenta totius, ut puta febris, in quarū paroxysmis catarrhus augetur & ipsis recedentibus minuitur, ipsis ablatis remouetur, similiter si praecedat aut adsit nocumentum membri particularis, ut stomachi aut aliorum quorum nocumento aucto augetur catarrhus & diminuto diminuitur.

Cognoscitur autem esse per essentiam in capite ex ipsius continuitate, & quia non adsunt aliorum membrorum aegritudines à quibus pendere potest. Signa uerò humorum scilicet phlegmatis aut cholerae & cetera à quibus pender sumuntur à signis superius positis. Signa uerò causarum efficientium corporea, scilicet calid. frigid. &c. parent ex dictis in praecedentibus capitulis, ut quia caliditas capitis est cum citrinitate faciei aut rubore, & similiter temporum, frontis & oculorū, & cum caliditate sensata circa illas partes, & ceteris signis calid. cerebri laetius uidentis prima tertij, & secundo techn. Si uerò cum frigiditate erit pallor & albedo, color plumbeus, tactus frigidus. Si uerò fuerit humiditas in causa, erit multa mollities, laxitas &c. Sicca uerò ex asperitate & paucitate catarrhorum cognoscitur.

Signa uerò debilitatis siue ex tempore siue à generatione contractae, sumantur à diminutione operationum cerebri & ortorum uel corruptione, similiter à paucitate resistentiae causis aegris &c.

Prognostica. Primum catarrhosi sunt ferè ad omnes aegritudines facile parati maximè habentes catarrhū subtilem. Secundum. Catarrhus per essentiam diu inueteratus raro uel nunquam recipit curationem.

Tertium est Hippocratis. Branchi & coryzae in ualde senibus, id est, decrepitis non maturantur, 2. Aphor. Ante omnia in cura catarrhi sunt tres canones obseruandi. Primus aliquando catarrhus & causa catarrhi conueniunt. Aliquando contrariantur, & siquidem conueniant, ut quia ambo sint frigidi cum calidis procedemus. Si uerò ambo calidi, cum frigidis. Si uerò contrariantur, ut quia causa sit calida, & catarrhus frigidus, aut e contrario, est diligenter considerandum cui magis intendere debeamus. Sed hic attende canones Auic. quarta primi, capite ultimo. Si enim causa catarrhi & catarrhus eque fortes sint, aut causa fortior, magis ad causam intendere debemus, tum quia causa, tum quia secundum plurimum ipsa non remota catarrhus non remouetur. Et propterea

Rasis in catarrho proueniente à uento frigidus uel à ère frigidus docet caput cum panno multum calefieri, etiam si catarrhus esset calidus. Similiter e contrario ubi catarrhus pender à sole uel à caliditate impressa in caput deberemus ipsam primò remouere cum frigidis, etiam si catarrhus esset frigidus. Vbi uerò causa esset parua & leuis, catarrhus autem ualde fortis magis oportet intendere catarrho, causa tamen non omnino neglecta.

Secundus canon est ut semper in principio caueamus ab omnibus inquietatibus, & materiam agitantibus, siue illa fuerint medicinalia, siue pertineant ad regimen sex rerum non naturalium. Et propriè omnis motus siue localis siue sternutatio & cætera huiusmodi sunt in principio uitanda.

Tertius canon ut demus ea quæ confortant caput & membrum quod læditur per catarrhum sicut pulmo & huiusmodi. Et caueamus à nocentibus sibi. Et propterea cauendum est ab acribus & acerosis. Et similiter à ualde stipticis & ponticis uel si huiusmodi conueniant propter ipsum catarrhum sicut acetum ad incidendum, bolus armenus ad constringendum, hæc acetosa corriganur cum dulcibus, stiptica cum lenientibus &c.

Cura ergo catarrhi secundum Mesue sex exigit intentiones. Prima ordinat debitum regimen. Secunda digerit materiam. Tertia euacuat. Quarta diuertit. Quinta sistit ipsum. Sexta corrigit accidentia. Et hæc intelligenda sunt præter intentionem primam generalem quæ est remotio causæ quæ secundum plurimum in cura omnium catarrhorum est præmittenda. Si ergo causa fuerit primitiua sicut àer frigidus, aut calidus, crapula, ebrietas, somnus diurnus, & huiusmodi remoueantur. Et similiter nocumenta ex ipsis derelicta. Si uerò fuerit per cõmunitatem à toto sicut in febribus, attendatur curæ febrium, catarrho non neglecto, & similiter si fuerit per cõmunitatē à stomacho aut à membro particulari nocumentum illius membri corrigatur & diuertantur uapores ad inferiora, omni genere diuersionum. Et semper in fine mensæ sumatur aliquod uaporum repressiuum, & oris stomachi corrugatiuum, sicut coriandrum, citonium & huiusmodi, & iterum cura catarrhi nō negligatur. Si uerò causa fuerit per essentiam in capite sicut mala complexio calida aut frigida, aut debilitas aliam consequens dispositionem ex tempore, aut à generatione cõtractam, huic in primis intendatur. Et si eius cura, catarrho conueniat simul amborum curæ cõmuni intendatur. Igitur iuxta primam intencionem Mesue. Si catarrhus fuerit calidus declinet àer ad frigidū. Si frigidus ad calidum, secundum plurimum tamen ad sicum. Et hoc dico ubi catarrhus & eius causa conueniant. Vbi uerò contrariantur, causæ secundum plurimum in principio magis attendatur, deinde catarrho, & inter cætera cauendum est ab aëre fumoso, uentoso, pluuioso, & statione sub radijs solaribus aut lunæ, & propriè per fenestram ingredientibus, & sit boni odoris. Caput uerò magis aut minus teneatur calidum secundum temporum exigentiam, ita ut non æstuet neq; frigeat, habendo tamen respectum ad consuetudinem quæ in hoc multum consideranda est. Verum in causa calida & catarrho calido magis frigidum teneatur, e contrario

in catarrho & causa frigidis. Residuum tamen corporis satis calidum teneatur ut uapores nō retineantur, imò transpirent & resoluantur & ad inferiora diuertantur. Potus eius sit aqua saccharata aut aqua mellis aut hordei aut saltem per arenā distillata. Cauendum est à uino nisi in declinatione, potus tamen non sit nimius. Vitet potum aquæ frigidæ, nisi catarrhus ualde calidus sit. Potus aquæ calidæ maturat catarrhos. Verum in catarrho subtili calido retentio aquæ frigide in ore confert. Ex ferculis conueniunt far, hordeū, spelta, sed maximè horum kisch. Item kisch fabarum, farina hordei, amyli, in calido, sed in frigido kisch frumenti, ficus sicca, kisch cicerum. Vitentur caules & cætera multum effumantia, uitentur etiam multum brodialia & propriè in cœnis. Ex carnibus & piscibus conueniunt quæ sunt facili digestionis, boni nutrimenti, paucarum superfluitatum, & lac est preciosum in catarrhis maximè calidis nisi aliud obferat. Sit cœna leuior prandio imò interdum omitatur. Diminutio enim ciborum & potuum est cura prima. In fine mensæ comedat corrugantia os stomachi & fumos prohibentia, sicut coriandrum præparatum, citonium aut pirum cõctum, somnus nimis nocet, & etiam superflua uigiliæ, magis tamen nocet somnus & propriè immediatè post crapulas & quemcumque cibum & maximè diurnus, dormiat capite leuato ad alterum laterum declinante. Procurentur euacuationes omnium superfluitatum per conuenientes regiones. Fricatio tamen capitis & pectination non conueniunt in principio, sed in fine. Coitus superfluus nocuus est, exercitium non conuenit nisi in declinatione. Verum fricationes & propriè partium inferiorum uicem suppleant exercitij. Accidentia autem sint quæiata. Secunda intentio, scilicet digestio perficitur in subtili calido cum syrupo uiolaceo, de iuiuibis, de sebesten, de papauere aut cum eorū decoctionibus. Et mucilago plij est efficax. Similiter diadragagatū, diapapauer, diacodion sunt ultima. Cum hoc enim quod digerunt etiam sistunt catarrhum. Si uerò fuerit catarrhus, calidus, crassus cum aliquo istorum sicut cum syr. uiolaceo admisceatur aliquod incisiuum, absteriuum, sicut syrupus acerosus aut oxymel simplex, & aqua hordei potus medicinalis est & absteriuum. In catarrho uerò frigido crasso conuenit oxymel simplex, compositū, scilliticum, loch de pino, diariis & similes: Et sumatur cum aqua mellis aut hyssopi aut passularum, & similibus. Si uerò catarrhus fuerit subtilis frigidus aquosus, conueniunt calida & sica incassantia sicut syrupus de myrto cum melle ros. & possit sumi cum aqua decoctionis, thuris, sandaracæ, nucum cupressi, & possunt aromatizari cum mace, gariophyllis, galia muscata, & similibus. Verum Mesue digerit catarrhos tam calidos quàm frigidos cum balneis, & cum his quæ capiti applicantur & cum his quæ injiciuntur in aures & cum odoratis per nares calidis aut frigidis secundum exigentiam. Sed credo hæc non cõuenire nisi ubi materia fuerit ualde pauca aut ubi fuerit minorata.

Tertia autem intentio completur cum euacuantibus materiam peccantem. Si ergo materia fuerit calida educatur cum decoctione fructuum, scilicet iuiubarum, sebesten, prunorum, uiolarum, cum quarum decoctione trahatur, calliæ, 3. i. s. & exhibeatur

exhibeatur stomacho ieiunio, & posset addi apud necessitatē à. s. 3. usq; ad. 1. electuarij de succo rosarum, pilule etiam alsiaret possent exhiberi post cenam & apud necessitatē possunt fortificari cum 3. s. pilula rum aurearum, & polypodium habet proprietatem in euacuando materiā salisam. Si uero fuerit phlegmatica conuenit hiera simplex, hiera composita, pilule cochiae & similes. Clysteria quoq; conueniunt in calida, si sint infrigidantia & humectantia & lenientia, & in frigida si sint calefacientia & magis acuta. Phlebotomia uero non conceditur nisi in tribus casibus. Primus, si catharrus est calidus in corpore calido cū multa sanguinis abundantia, scilicet in quo sit oculorum rubedo, uenarum plenitudo &c. Secundus si catharrus fuerit calidus & declinans ad aliquam partem figuratur in ea, sicut in oculis, faucibus, pulmone pleura, diaphragmate. Tertius casus si catharrus sit cum febre & maximē continua, arguente materiā uel putrescentem uel peccantē ad intra uenas. Quarta intentio, scilicet diuersio perficitur quandoque cum communibus, sicut cum fricationibus, ligaturis, uentofactionibus, lorionibus crurium & brachiorum quę debent diuēficari secundum materiā diuersitatem. In catharro quidem calido sint frigida, & in frigido calida, quandoq; perficitur cum proprijs & sunt quatuor generi, scilicet caput purgia, gargarismata, masticatoria & uescantia siue cauterizantia. Caput purgia uero sunt ad diuertendum materiā per nares de cuius fluxu timemus ad loca nobilia. Hęc enim digesta materia & euacuata optimē conferunt, ipsa uero non digesta nec euacuata magis nocent agitando materiam, quā profint ipsam diuertendo. Et hęc diuēficanda sunt, in materia quidem frigida conceduntur acuta, sicut succus artanite, elleborus & similia, in calida uero aqua uiol. cum succo blitis aut pauco succo artanite. Perficitur etiam hęc intentio cum suffumigationibus & odoramentis aperientibus nares & deoppilantibus colatoria, sicut si in catharro calido reciperet fumum decoctionis uiolarum, & infrigido fumum decoctionis maioranę. Gargarismata uero sunt propter quatuor intentiones. Prima ut partem nobilem per ignobilem purgent sicut gargarismata factum ex decoctione pyrethri, zingib. & similibus, purgat enim cerebrū per uiam oris, aliquādo fit ad stringendum fluxum sicut administratio diacodi & decoctio rosarum, balauitiarum & similitum. Aliquando fit ad abstergendum illud quod fluit sicut administratio oxymellis simplicis aut scillitici, aliquando fit ad alterandum quod fluit sicut administratio camphore ad calidum, & mirrhę ad frigidum. Aliquando uero plures ex his intentionibus per gargarismata complentur, & propterea gargarismata in cura catharri conueniunt in tribus casibus. Primus, in catharro calido subtili cum rebus in crassantibus, & infrigidantibus ut fiat agilis ad expellendum, cum prius propter subtilitatem & acuitatem excreari nō posset, sicut syrupo depapauere cum aqua ros. Secundus, in catharro multę uiscositatis & spissitudinis cum rebus incidentibus & abstergentibus, sicut oxymelle simplicis aut scyllitico. Tertius, quando timeremus materiam figi in faucibus aut in gutture sicut in synachi gargarizamus diamoron, & similibus. Sunt autem quatuor casus in quibus gargarismata sunt suspecta.

Primus est timor & suspitio catharri ad pectus, & ad pulmonem fluere consueti & propterea in paratis ad asthma, & phthisim, & similes passiones propter catharrum cauemus gargarismata. Secundus casus est si catharrus sit acutus, subtilis, cuius fluxus facillē cōcitaf, in hoc enim casu melius est retinere in ore infrigidantia & in crassantia non gargarizare. Tertius casus est est in pręfocationibus quę sunt subito ad has enim parati non gargarizent. Quartus casus, si catharrus sit multus & uehemens quantū ad motum eius, Hęc autem gargarismata & masticatoria sunt quandoq; ad diuertendum materiā fluentē ad nares ut per uiam oris expellatur. Masticatoria enim licet conferant diuertendo ipsam materiā ad nares & in purgando cerebrum, tamen obsunt aliquando faciendo materiam pręcipitari ad guttur, ad meri, & ad cannam pulmonis, & propterea etiā in cura corycę cautē eis utere. Quartum autem genus, scilicet rubificatio cutis capitis, & uescatio perficitur radēdo caput in commissura coronali, postea fricando cum cēpe acuto aut scillitico aut panno aspero, & deinde super commissura apponere emplastrum de sinapi, & fortius illo est fermentum cum cantharidibus secum mixtis cum acetoro forti, & hęc super loco dimittantur. 10. aut. 12. horis cum bona stricatura. Deinde remoueat & uesciā aperiantur, & super loco caules ad ignem motificatę cum axungia porcina ponantur, ut locus conseruetur apertus, sed oportet ut de quinq; diebus in quinque dies hęc uescatio renouet usq; ad quadraginta dies, quod si hęc non contulerit, cauterizetur super commissura coronali, fiat autem hęc cauterizatio cū ferro ignito cādente usq; ad ossis superficiem, & fiat paulatim, sæpe cum stilo tentando. Potest etiam fieri cauterio potenciali, sed actuale est pręstātius, licet magis horrendum &c. Quinta intentio, scilicet catharri constrictio perficitur cum constringentibus statim dictis. Verum Mesue reprehendit stolidos medicos qui ante digestionem & mundificationem communem, imō in medio agitationis huiusmodi cōstrictiua administrent, quę sunt causa cumulationis catharri, deinde disruptionis uehementis, quapropter regulariter operando administrentur post intentiones suprascriptas. Verum dubitat Mesue, utrum in casibus extremis, scilicet quando ex catharro timeremus subitam suffocationem sicut pluries uidi in. 24. horis suffocari, debeamus procedere cura regulari iam dicta, an statim à constringentibus incipere, cum ægritudo non det inducias. Et in summa ipsi tutius uidetur regimē diuersiū quā constrictiū, nam regimen diuersiū licet agiter materiā & multiplicet, tamen conuertit multiplicatam ad partem contrariam non timorofam. Ego uero licet credam obsequendum esse secundum plurimum pręceptis huius medici diuini, tamē dicam quę in his casibus reperi utilia & quę nociua. Vocatus itaq; ad hos casus et inueniens ipsos cum tanta anhelitus constrictione ut non possent loqui, neque etiam quasi bibere & cum continuo orogmone, & cum facie liuida tendente in nigram, & cū sudore quodam ob anhelitus angustiam, ratus sum hęc tanta nocumēta & tam subita prouenire à catharro multo & subtili, subito ad partes pulmonis pręcipitato, aut ad aliquas partes ob quarum nocumētum anhelitus impeditur, & sic esse in continuo flu-

*de summo catharro
ut de quatuor.*

hiera simplex, hiera composita, pilule cochiae & similes.

*Catharri subtilis suffocantia
cura.*

*quatuor gargarismata
suspecta sunt
gal. rō p. 2. m. 26.
quod. par. 32.*

xu, quapropter eos statui in aëre libero, luminoso, ad frigidum declinante, iniunxique dietam tenuissimam. prohibui eis omnem locutionē, & motū corporeum situauique eos sedantes pectore dilatato parum pannis cooperto, cum nulla frictura pānorum circa collum neq; circa alias partes. Et ipsis dedi in potu Syrupum de papauere, cum aqua iulubarū, & hor dei, & diapapauer, aut diacodiō, & interdū apud magnam necessitatem unā ex pilulis opiatis inferius describendis, aut parum philonij. Et aliquando ad anhelitum dilatandum posui uentosam super spondilib. pectoris, & aliquando pectore existente pectorico feci phlebotomiā, ubi materia inciperet figi in aliquo membro nobili, & aliquādo uentosam in pulpis spirulæ ad diuersionem, & secundum hunc modum ferre omnes euaserunt. Reliqui autem in quibus processum est cum euacuantibus & diuertentibus & materiam agitantibus omnes periire, quomodo enim sperandum est huiusmodi materiā tanto impetu ad partes illas præcipitātam posse euacuari aut diuertere, imò huiusmodi materiam agitantia, amplius eam ad loca profunda fluere faciunt. Constringentia catarrhum iuxta quintam intentionem alia sunt gargarismata. Alia suffumigationes. Alia quæ retinent in ore. Alia quæ odorant. Alia quæ deglutuntur. Alia quæ lambuntur. Ex gargarismatib. ad catarrhum calidum. 3. aquæ ros. 3. 3. cāphoræ 3. 1. misce. Similiter aqua decoctionis corticū papaueris & ros. cui si addatur parum boli armeni est præstantior, non tamen fiat huiusmodi gargarisatio magno cum impetu. Ad catarrhum uerò frigidum subtilem confert gargarisma cū uino decoctionis olibani, aut uernicis, cui possunt addi nuces cupressi. Ex suffumigijs ad catarrhum calidū est semē lini prius infusum in aceto per diem naturalem, postea torrefactum & suffumigatum. Sandaracha in aceto infusa est sublimis. Ad catarrhū uerò frigidum fiant suffumigia ex olibano, ligno aloës, sandaracha mixtis uel diuisis. Nigellæ quoq; torrefactæ & trite suffumigatio est mirabilis. Similiter odoripius ligatæ in panno. Costi et nigellæ suffumigium est expertū, formæ sicut auellanæ ex olibano, stirace sicca, castoreo, uernice, ligno alloë an. partibus æqualibus cōfectæ cum resina pini, aut pice, aut ladano suffumigatæ per embotum abscondūt fluxum catarrhallem. Retenta in ore ad catarrhum calidum sunt diacodiō & diadragagantū, diapapauer. Et cuiuslibet istorū si addatur lutum armenum incorporando cum pauco syr. de myrto efficitur præstantius, modicum cāphoræ tentum in ore sistit catarrhum cal. Sed ad frigidum conferunt olibanum, & similiter spica in ore retenta. Confectio formarum similium lupinis quæ retentæ in ore sistunt catarrhum calidum. Recipe amyli, dragaganti, amigdalorum dulcium, sem. papaueris albi & corticū eius, gūmi arabici, boli arm. an. 3. unum confice cum mucilagine psilij, & sem. citoniorum, et si uis ipsam dulcorari adde diacodiō 3. unā. Aliæ fortiores. Recipe olibani. 3. unam, myrrhæ, croci, spicæ, stiracis siccæ an. 3. semis, opij scrupulū unū, fiant ex eis formæ prædictæ & teneatur una ex eis in ore & non deglutatur salua. Ex odoribus ad catarrhum calidum & ad febrem adurentem syncopalem aut pestilentialem sunt formæ quarum hæc est permixtio, 3. faufel, id est, auellanæ indæ, Sandalorum al.

& rub. an. 3. 1. rosarū. 3. 2. s. sandali mascati, id est, citrini. 3. tres, camphoræ. 3. semis, boli ar. 3. octo, omnia præter camphoram terantur sicut alcohol & agitentur cōterendo cum aqua rosacea per hebdomadā unā, deinde misceatur cum eis camphora, & fiant poma quatuor cum gūmi arabico, & aqua rosacea hæc odorata sistunt catarrhum & ualent in pestilentia curando & præseruando, sed cōferuntur in uase uitreo in loco recenti, & liniantur sæpe cū aqua rosacea per mixtionis camphoræ & sandali citrini. Sed ad catarrhum frigidum conferūt poma huiusmodi si odorētur. 3. stiracis calamitæ. 3. 5. olibani, mastichis, uernicis, an. 3. 3. costi, spicæ. an. 3. 2. ambrae. 3. 1. laudani, ligni aloës, an. 3. 4. musci. 3. 5. fiat pomum unum cū dragaganto & aqua rosata damascina. Aliud ex inuersione Mesue. 3. 8. laudani. 3. 8. ligni aloës. 3. 7. galliæ muscatæ. 3. 6. ambrae. 3. 2. musci. 3. 5. fiat pomū unū. Sunt enim nobilia & experta in cōfortatione cerebri & cordis frigidi. Res autem quæ lambunt ad catarrhum calidum sunt diadragagantū, diapapauer, diacodion cum bolo armeno, ut supra. Sed thus & mirrha deglutita sistunt catarrhum frigidum. Confectio pilularum sistentiū omnem catarrhum. 3. thuris masculi. 3. 1. mirrhæ, opij, croci, an. gran. 7. Succiliquiritiæ. 3. 1. fiant. 7. pilulæ cum aqua rosata, & detur. 1. tempore somni. Pilulæ alcaiber descriptione Alexandri medici apud Mesue in fine capituli de catharrho sunt præstantissimæ, & per alcaiber intelligitur cynoglossa siue lingua canis.

Correctio uerò accidētium catarrhalium iuxta sextam intentionem perficitur per uarietatem nocumētorum, quæ insert ipse catarrhus, de quibus in sequentibus uidebitur, si deus uoluerit.

Pannus tunc calefaciendus est, & capiti superponendus, in quo tamdiu moretur, donec æger calorem in capitis profunditate sentiat penetrasse. Deinde nigellam odorare incipiat, & prouocetur sternutatio, & caueat ne supinus iaceat, & comedat parum, a uino quoq; omnino abstineat.

Hic ponit curam. Et primò catarrhi. secūdò coryzæ. secunda ibi. Quod si cursus. Prima in tres. Nam primò ponit curam catarrhi leuis magis respiciētem causam quā catarrhum. secundò ponit curam catarrhi fortis. tertio pro cura catarrhi inueterati remittit nos ad cap. de tussis. secunda ibi. Quod si passio. tertia ibi. Si uerò tussis. In prima parte curat catarrhum leuem a pauca materia pendente cum panno calefacto crasso comprehendente totum caput, collum et partes uicinas, quod rādiu ita calidum teneatur, aut totiens applicetur donec æger sentiat caliditatem in profundum capitis penetrasse. Hoc fit maximè ad remouendum nocumētum impressum ab aëre frigido & uento, & ad resolutionem materiæ quæ pauca est. Secundò odorat nigellam ad easdem intentiones. Tertiò prouocat sternutationē confidens materiam paucā per illam regionem posse diuertere. Quartò ordinat regimē cauēdo ne æger supinus iaceat, ne materia ad posteriora capitis præcipitet, et uinū prohibet. Quod

Quod si passio ex appositione panni calidi alleuiata non fuerit, nec minuitur per ipsum, fiat phlebotomia ex cephalica, et soluetur natura ex rebus quæ non exasperant sicut hæc decoctio quam in potu sumere debet qui tussim patitur, & in pectore asperitatem habet, et indiget uentris solutione, quæ recipit iuiubas 20. sebesten 30. passularum enucleatarum, drach. 10. uiolarum siccarum, drach. 4. radicis liquiritiæ fricata, drach. 5. ficus citrinas 10. coquantur in 3. lib. aquæ donec redeant ad 1. & colentur, & in colatura dissoluantur cassiæ fistulæ drach. 7. tereniabin drach. 10.

Hic curat catarrhum fortem. Et primò sine febre. Secundo cum febre, & ubi timetur materiam figi in aliquo membrorum spiritaliū. Secunda ibi. Quod si nec phlebotomia, &c. In prima parte, primò curat hunc catarrhum per phlebotomiam & per medicinā soluentem leniendo ex quibus arguitur hanc materiam euacuandam esse calidam. Descriptio autem huius medicinæ solutiue satis est manifesta.

Quod si neq; phlebotomia profuerit, neq; uentris solutio, et inde ad pectus materia descenderit & commoueantur tussis & febris ilico fiat phlebotomia de mediana. Et patiens a carne abstineat, & uino & in potu sumat aquam hordei, & muraba uiolatum quamdiu calor fixus perseverauerit, & tussis fuerit sicca & aspera. Sed postquam calor quieuerit & tussis mollificata fuerit & screare inceperit, huius decoctio quæ cum muraba uiolato danda est donec pectus mundificetur, & tussis sedetur, & uox clara reddatur, quæ recipit ficus citrinas 5. iuiubas 10. sebesten 20. passularum albarum enucleatarum drach. 10. liquiritiæ excorticatæ drach. 5. coquantur usque ad dissolutionem, & colentur, deinde & dentur omni die uncia tres, cum muraba uiolato drach. 5.

Ponit curā catarrhi cum febre, cum incipit imprimere in aliquo membrorum spiritaliū diēs. Quod si nec phlebotomia cephalicæ nec uentris solutio, de quibus dictū est profuerit, & materia ad pectus desc-

derit, commouens tussim & febrim reiteret ilico phlebotomia, & hæc debet esse ex uena communi, ut simul à capite & pectore euacuet, & patiens abstineat à carne & uino, imò bibat aquam hordei cum muraba uiolato, id est cōdito uel syrupo de uiolis, et hoc quādiu calor fixus, id est, febris fortis perseverauerit, & tussis fuerit sicca, id est, sine spūto, & aspera, materia non digesta. Sed quiescente febre & tussi mollificata. Et cum æger screare coeperit materia iam digesta, decoctio infra scripta est sumenda cum syrupo uiolato usq; ad pectoris mundificationem & uocis claritatē. Descriptio autem huius decoctionis & simplicia sunt satis manifesta.

Si uerò tussis inueterauerit diuq; permanserit, tunc ostēdemus qualiter curanda sit, cum de tussis cura tractabimus.

Remittit nos ad cap. de tussi pro cura catarrhi inueterati.

Quod si cursus in naribus diu perseverauerit & non fuerit calor, fluxus erit restringendus suffumigando nares per traiectorium. Et si quod per nares effluit subtile ac acutum & citrinū fuerit, suffumigatio fiat ex sulphure prius in aceto infuso & postea siccato, aut ex fabis, aut hordeo excorticatis, & in aceto prius infusis, & postea siccatis, aut ex saccharo albo & sandalo albo. Quod si neq; calor, neq; rubor in facie fuerit, suffumigatio fiat ex costo, aut thure, hæc namq; suffumigatio fluxū restringit.

Hic curat coryzam primò frigidam, cuius tamen curam complet in fine capituli suffumigando nares, calore neq; rubedine existente in facie, cum costo herba calida, & sic. in secundo. & thure calido & sicco in primo. Si uerò coryza fuerit calida, quod comprehendit ex calore & rubedine faciei, et quia illud quod egreditur per nares est subtile acutum & citrinum, tunc fiat suffumigatio ex thure prius in aceto infuso, cuius caliditas frangitur per acetum, & ex fabis & hordeo excorticatis prius in aceto infusis, postea siccatis: remanet enim in eis uirtus cōstrictiua propter acetum, aut ex saccharo albo, & sandalo albo, frigido & sicco in secundo. saccharum autem ferè est temperatum, & possunt adinuicem permisceri cum aqua rosata, aut pauco aceto faciendo formulas ex quibus fiat suffumigatio. Quādo autem hæc remedia Rasis, sint administranda satis patere potest ex superius dictis.

DE OPHTHALMIA.
CAP. XVIII.

Postquam Rasis in præcedentibus egit de passionibus cerebri, & neruorum. Hic agit de passionibus oculorum incipiens ab ophthalmia. Pro quarum notitia præmittendum, quod oculus est membrum instrumentale in superiori parte corporis situm, aqucum, rotundum ex septem tunicis &

tribus humoribus compositum, sex musculis motū, uno sustentatum, ad uidendum finaliter ordinatum. Habet enim primò coniunctiuam undecunque oculum circumdantem præterquam in parte anteriori ubi est cornea quæ coniunctiuam oritur ab almochari. Est deinde cornea undiq; circumdans oculum post coniunctiuam, quæ in parte anteriori dicitur cornea ad similitudinem cornu, in parte posteriori sclerotica, id est, dura, ortum habens à dura matre, & hæc in parte anteriori ex directo pupillæ est crassa ex quatuor pelluculis composita, quæ tamen per anatomiam non facile distingui possunt, & in parte anteriori non est colorata, sed perua & diaphana. postquam sequitur uvea, ortum habens à pia matre sic dicta, à similitudine grani uuæ, à quo capulus est euulsus, & hoc foramen uuæ dicitur pupilla, posterius autem dicitur secundina. Est deinde aranea, posterius dicta retina ortum habens à nervo optico, quæ non immediatè sequitur uveam, sed inter eam & uveam mediatur humor albugineus, licet in parte posteriori sequatur secundina: hæc itaq; circumdat immediatè humorem crystallinum & uitreum. Ex humoribus autem primum occurrat albugineus ad similitudinem albuminis oui, qui est maior cæteris in quantitate. Post quem sequitur crystallinus non immediatè, sed mediante tunica aranea, qui crystallinus dictus est à similitudine crystalli. Et dicitur grandineus à similitudine grandinis, aliquantulum durus & rotundus, in parte anteriori ubi recipiuntur species uisibiles, aliquantulum planus, in eo enim perficitur uisio: in parte posteriori figuræ pyramidalis, circumdatus secundum partem posteriorem à uitreo à quo nutritur, sic dicto à similitudine uitri liquefacti. Et sic sufficit de anatomia oculi. Qui licet dicatur componi ex septem tunicis: tamen in ueritate non sunt nisi quatuor, sed sunt septem secundum denominationem. Verum Galenus addit quartum humorem quem dixit contineri inter uveam & corneam quem lucidum æthereum appellauit, sed cæteri dicunt hanc esse partem albuginei per foramen uuæ egredientis usq; ad corneam. Triplex est regimen oculis adhibendum, scilicet, regimen quod debetur oculis inculpatis sanis, siue temperati sint, siue distemperati. Regimen præseruatiuum quod debetur oculis inculpatis sanis & neutris. Regimen curatiuum, quod debetur oculis ægris & neutris. Primum uero secundum Mesue completur quinque modis. Primus conseruat superficiem oculi tersione decenti & naturali, & hoc faciunt medicinæ abstersiuæ habentes medicritatem & temperiem in tersione, sicut succus foeniculi, & est proprium, & similiter collirium ex eo cuius est hæc descriptio. Recipe succi foeniculi depurati per residentiam eius, & facilem coctionem ipsius in uase æneo cum nummis auri puri, sicut in 1. 3. succi foeniculi ponerentur quinque folia auri, & post sufficientem colationem ipsius accipitur de ipso 3. 1. mellis puri, clari. 3. 3. & bullant iterum ebullitione una, & coletur, ponatur in ampulla uitrea, & suspendatur in sole, & permuetur de uase in uas abijciendo super hypostasim, & distilletur ex eo in oculo secundum exigentiam, custodit enim sanitatē oculi & abstergit ipsum & clarificat uisum, & quandoq; depuratur tantum in sole absq; decoctione, & est expertū. Et ad hoc ualet succus memythæ & est species chelidonæ & el-

set magis proprius in oculis calidis, & cum hoc oportet tueri oculum à fumo, puluere, flatu uentorum, nimia æris inæqualitate, & ab his quæ faciunt oculum senescere, sicut coitus, labor plurimus, fletus excedens mensuram, ebrietas, somnus plurimus, nimia uigilia, somnus supra repletionem, & cauere à cibis & potibus uaporosis, turbidis, sicut caules, porri, acrimonia, salsa, fabæ, lentes, & omnia conturbantia sanguinem & spiritum. Item, Fœniculus, uerbena, rosa, chelidonia, ruta. Ex his fit aqua quæ lumina reddit acuta. Si hæc aqua ex his quinque distillata conseruetur in uase æneo, acquirit ab eo absterfionem, uerum ubi mi nori indigeramus absterfione, conseruetur in uase uitreo. Aliud collirium uisum acuens & oculi sanitatem custodiens. R. succi foeniculi 3. 40. succi rutæ 3. 20. ponatur in ampulla uitrea cum 3. 15. mellis clari obturetur orificium eius et dimittatur in sole per tres menses & abijciendo fecem eius bis uel ter in mense. Si autem opus esset minori calefactione, addatur huic succi granatorum dulcium & aceto fortū, ana. 3. 10. & dimittatur in sole, ut supra. Antimonium quoq; lotum, & thuria præparata cum aqua rosata, & aqua foeniculi permixta, sanitatem oculi calidi conseruat.

Secunda res completur cum medicinis quæ alterando custodiunt sanitatem oculi, scilicet, calefaciendo, in frigidando, humectando, & exiccando, sed temperatum cum similibus in gradu & forma cōseruamus calidum uero cum frigidis, frigidum cum calidis, humidum cum siccis, & siccum cum humidis. Hæc enim sunt uirtutaliter similia & non formaliter. Eligant autem ex his quæ oculi sunt propria per uirtutem quam sicut est thuria in exiccando, uiola, psillium, & albumen oui in humectando, foeniculus in calefaciendo, rosa in in frigidando. Tertia res completur per medicinas conseruantes sanitatem eius in compositione licet superficies cōtineatur sub compositione. Et hoc faciunt omnes medicinæ confortantes perforationē & concavitatem partium eius, & non sinētes fieri opilationē pupillæ, nimiam dilatationem, strabositationem, & similes. Siue illæ medicinæ sint euacuantes, siue resoluētes, siue confortantes cum proprietate & simplicitate moderatē. Quarta res completur cum medicinis conseruantibus unitatem & prohibitionē omnium causarum, quæ possunt soluere continuum, siue primitiuæ sint, siue corporeæ. Quinta res completur per medicinas multiplicantes spiritum uisibilem & ipsum illustrantes sicut sunt carnes assatæ, aut elixæ animalium uiuentium de rapina, & forbere iura eorum, & propriè picæ. Item ius serpentum non uenenosorum & caro ipsorum comesta confortat uisum. Item cerebella hædorum & gallinarum. Item uinum album aromaticum subtile, & alia generantia sanguinem clarum. Ex maximè autem splendēdantibus uisum & spiritum uisuum sunt margaritæ. Arist. instruens Alexandrum regem inquit. Frequērationes pectinis, & propriè eburnei super caput uapores uisum impediētes euertunt ad cutim, ne uisus obsint. Item aspectus rerum uiridum in loco multæ temperiei uisum corroborat & oculi fatigationem remouet. Ex propriis in hoc est smaragdus. Item iniunxit post oculi defatigationem ingredi domū obscuram non multæ tenebrositatis, & intueri per fenestras in quibus sit aliquid peruium uiride, uel in-

tueri aquam clarissimam in uase uiridi existentem, & submergere ipsos oculos in ipsa, sed hoc fiat tempore calido, & exercitatio legendi literas mediocres, pulchras, uisum corroborat, & oculi sanitatem custodit. Et ex proprijs in confortatione uisus & proprijs ubi humores sint crassi, uiscosi est usus aceti scyllitici. Itē trisera magna & trisera minor, & proprijs cum quarta parte pulueris herbe adhil, & est herba habens folia similia tamarisco, et theodorici ad hoc multum confert. Item pilulæ lucis euacuando sunt propriæ. Et chebuli conditi euacuando & confortando. Eleuuarium sublimē conseruans sanitatem oculorum, & confortans spiritum uisibilem in claritate sua. 82. Herbe adhil, aut loco eius euphrasie. 3. 2. feminis feniculi. 3. 5. macis, cubebæ, cinamomi, piperis longi, gariop. 3. 4. puluerizentur subtilissimè, & accipe mellis depumati lb. 1. succi etiam feniculi costi depurati, succi rutæ depurati, añ. 3. 1. succi chelidonie. 3. 5. coquantur succi cum melle usque dum mellis tenuis habeant spissitudinem, & secum misce species & conseruetur in uase uitreo, cuius dosis est. 3. 3. alienando coenam uel dimittere, & similiter sumat in mane. Regimen præseruariuum completur. Primò generaliter cauendo ab omnibus quæ possunt lædere oculos secundum complexionem, compositionem, & unitatem, & spiritus, de quibus pro magna parte dictum est superius. Et adhibendo regimen contrarium lapsui in quem oculus est pronus labi, hoc autem consistit in cognoscendo causam lapsus, illud enim secundum plurimum est, aut propter defectum oculi, aut tortius, aut alius membri oculo communicantis, et hoc propter nocumentum in complexione cum materia, aut sine compositione, aut unitate. Si ergo defectus sit propter complexionē sine materia, alteratione indiget cum contrarijs sicut superius dictum est. Si uero sit cum materia aut ista tantum est in oculo, aut in partibus ipsi communicantibus. Si sit in oculo, solum educat, aut insensibiliter per resolutionem ad quod confert succus & aqua feniculi, & sarcocolla, aut sensibiliter per lachrymas. Ad quod confert salitæ cum sale, aut sale armoniaeo. Si uero sit in partibus sibi communicantibus, quadruplici regimine indiget, euacuatione scilicet, diuersione, fluxus interceptione, & oculi confortatione. Euacuatio autem fiat cum phlebotomijs aut pharmacijs secundum exigentiam materiæ peccantis, quæ respiciant utrumque membrum mittens & suscipiens. Diuertatur etiam materia omni genere diuersionum, siue euacuatione, siue frictionibus, uetustationibus, lotionibus, &c. Et cū euacuatione sicut clysteribus, masticatorijs, caputpurgijs, gargarismatibus, phlebotomijs uenarū nocuæ uenarum post aures, temporum frōtis, & earum quæ sunt in cute capitis, necnon prouocatione fluxus sanguinis narium, hæmorroidalis & menstrualis. Et ex hoc genere sunt sedagina posita in collo ubi coniungitur capiti, cauteria in cornibus posterioribus ex directo oculorum, cauterium in cōmissura coronali. Interceptio autem fluxus perficitur, aut cum appositis frōti & temporibus, aut cum laqueatione uenarum & articularum secundum quod dicitur in curatione ophthalmie. Confortetur autem oculus cum his quæ sunt propria tam interius quàm exterius applicitis

moderate stipticitatis, de quibus in regimine conseruariuo dictum fuit. Si uero nocumentum sit in compositione & unitate studendum est confortationi oculi cum iam dictis. Et ne humores ad oculum profuant cum intentionibus de quibus statim dictum est. Nocumentum autem in spiritibus potest esse, aut propter ipsorum paucitatem aut propter ipsorum crassitatem & turbulentiam. Primò autem subueniendum est cum cibis boni nutrimenti paucorum superfluitatum & bono uino subtili odorifero. Secundò autem, nocimento subueniatur cum his quæ clarificant sanguinem & spiritum, & ipsos spiritus illustrent de quibus superius dictum est, & dicitur in sequentibus in debilitate uisus. Et ne spiritus paucifecerit cauendum est à phlebotomijs & alijs modis extrahendi sanguinem, & à coitu, labore nimio, et ab aspectu rerum radiosarum & splendidarum, &c. Tertiū aut regimen patebit in sequentibus.

De ophthalmia autem præmittendum quid nominis & quid rei. Dicitur enim ophthalmia ab ophthalmos Græcè, quod idem est quod oculus Latine, inde ophthalmicum, id est, medicamen oculare. Diffinitio uero autem est apostema in oculo scilicet in coniunctiua oculi, &c.

Cum ea quæ in oculis alba sunt in rubedinem mutata fuerint, fluxerintque lachrymæ, & in angulis oculorum lachrymalibus lippitudo collecta fuerit, tunc dicemus agrum pati ophthalmiam. Et quantum plus symptomatum uehementia aut ipsorum affuerit minoratio, tæto est ophthalmie fortitudo aut ipsius debilitas. Deterior autem ophthalmia est, cum alba oculorum uidentur inflata & adeo eleuata, ut oculorum cooperiant nigredinem, & palpebræ inuerfentur.

Istud capitulum diuiditur in partes duas. In prima agit de ophthalmia theoricè. In secunda practicè. Secunda ibi. In principio uero. Prima in tres. In prima ponit signa. In secunda ibi. Et quanto plus. Ponit signa fortitudinis & debilitatis eius. In tertia ibi. Deterior autem. Ponit signa ophthalmie pessimæ. Quæ dicit in omnibus partibus nota sunt, & amplius notificabuntur ex dicendis. Symptoma duo importat. Aut accidens sequens egritudinem, & taliter sumitur hic. Aliquando significat motum impetuofum naturæ contra morbum distinctum, contra crism laudabile. Symptoma enim græcè periculū & ruina latine.

De speciebus ophthalmie. Sciendum quod duplex est ophthalmia uera, & non uera ab Auicenna dicta cōturbatio, quæ non est uerum apostema, sed quedam oculi rubedo pendēs à causa primitiua. Vera autem habet triplicem speciem secundū magis & minus differentem. Quapropter species appellandæ non sunt, quia magis & minus non uariant speciem. Vna est

maxima in qua coniunctura tantum eleuatur ut coope-
riat corneam, & palpebra inuerfatur ne oculum tege-
re possit, proueniens secundum plurimum ex sanguine
phlegmatico & in oculis eminentib. qui sunt facilius
materierum susceptiui cum magna plectoria corporis &
capitis, de qua Rasis in litera. Et haec Graece uocat chi-
mosis. Arabicè uero alguardenigi. Et haec non solum
fit à materia calida, sed phlegmatica & melanch. Exi-
stimo tamen ipsam non fieri à materia cholerica, et plu-
rimum accidit infantib. licet in adultis etiam uiderim.
Est & alia species ophthalmiae quae est parua à paucis
pendens humore. Et per consequens datur tertia spe-
cies inter has media. Et de speciebus ophthalmiae est
quae habent periodum secundum periodum genera-
tionis materiae & effusionis eius. Solent etiam species
ophthalmiae assignari sex secundum humores, à qui-
bus pendent scilicet sanguinea, cholerica, phlegmati-
ca, melancholica, aquosa, uentosa.

Sed nunc de causis eius. Primo generalib. efficien-
te, materiali, formali & finali. Causa efficiens ophthal-
miae tam antecedens, quam coniuncta sunt humores ipsi.
Et non sunt causa materialis, quia ophthalmia est acci-
dens, & accidens non potest generari ex substantia tan-
quam ex causa materiali. Ophthalmia itaque neque ali-
quod apostema, neque aliquis morbus, cum sunt acci-
dentia, habet humores pro materia sua ex qua gene-
rentur, nisi tantum morbus in numero. Causae efficien-
tes primitivae sunt extrinsecae à sex rebus non natu-
ralib. & sibi annexis sumptae, necnon alijs indebitè oc-
currentib. Causa ophthalmiae materialis in qua non ex-
qua, est ipsa coniunctura. Causa formalis est ipse tu-
mor. Causa finalis ut oculum destruat, &c.

Sed nunc de modo euentus ophthalmiae dicendum
est. Potest enim dupliciter generari. Per uiam paulatim
factae congestiois ex superfluitate nutrimenti ipsius
coniuncturae, & etiam ex nutrimento male conuerso
quae non resoluuntur, sed in dies paulatim congerun-
tur ut tandem apostema faciant, quod secundum plu-
rimum est frigidum. Et generatur etiam per uiam de-
fluxus maximè ex capite, aut per partem extrinsecam
mediantibus uenis & arterijs humores ad coniunctu-
ram deferentibus, aut per partem intrinsecam, scilicet
per foramina orbitae ad cerebrum terminata per que
musculi & nervi optici ad oculum ueniunt. Et tunc hu-
mores à cerebro & panniculis ueniunt intrinsecis. Se-
cundum tamen plurimum, est per partem extrinsecam
propter colligationem coniuncturae cum almochari
à quo oritur. Aliquando etiam materiae ueniunt ocu-
lo ab alijs membris, & proprie cum oculum infecuta
est malitia complexionis, & fecit eum susceptiuum ma-
terierum & est debilis, aut ex generatione, aut ex tem-
pore. Nunc autem de signis.

Cognoscitur ophthalmia in genere per tumorem,
grauitatem, dolorem, & ruborem. Sed species tres diffe-
rentes secundum magis & minus cognoscuntur per
uisum. Species uero distinctae secundum humores
cognoscuntur. Quia sanguinea est notabiliter rubea
cum tumore notabili, dolore grauatiuo & extensiuo
magis quam pungitiuo, cum multitudine lachryma-
rum aut mediocritate, lippitudinisque multitudine, &
caeteris signis arguentibus dominium sanguinis in cor-
pore & capite. Cognoscitur cholerica per rubedinem
clariorem uergentem ad citrinum cum paruo tumo-

re, dolore acuto pungitiuo, effusione lachrymarum
acutarum, paucis lippitudinis, paucaeque oculi glutina-
tione. Cognoscitur phlegmatica per colorem rube-
um uergentem ad album cum paucissimo dolore ex-
tensiuo, aut grauatiuo non pungitiuo, cum paucita-
te lachrymarum non acutarum, & multa lippitudi-
ne & uiscosa, & similiter cognoscitur aquosa, sed est
tumor magis mollis & minor uiscositas lippitudi-
nis, in caeteris similatur phlegmaticae.

Cognoscitur melancholica per ruborem uergen-
tem uersus fuscum cum paucis tumore, paucissimis
lachrymis, pauca lippitudine & minuta sed dura.

Cognoscitur uentosa quia est sine lachrymis, sine
lippitudine, sine grauitate, & per euaporantia facile
remouibilis.

Signa temporum ophthalmiae sunt. Quia in prin-
cipio est tumor paruus à paucis pendens humore cum
paucis rubore, & est fluxus lachrymarum subtilium
sine lippitudine paucaeque oculi inuiscatione. In augmen-
to apparet maior tumor, & rubor, lachrymaeque in-
crassantur suntque tenaciores, & apparet notabilis lip-
pitudine notabilisque oculi inuiscatio. In statu est maior
tumor, qui debet esse, sed forte rubor tendit ad albedi-
nem quandam, lachrymae sunt crassiores & uiscosio-
res, maior lippitudine, maiorque oculi inuiscatio. In de-
clinatione haec omnia minuuntur. Sed quia quaedam
lippa significat crassitiem & uiscositatem materiae, quae-
dam digestionem, inter utraque est quatuor signis di-
stinguendum. Nam proueniens ex crassitie materiae
ferè statim apparet à principio & communiter in oph-
thalmia phlegmatica à praedominio. Et apparet cum
nondum est neque praecessit uehementia accidentium
excepta grauitate, & grana eius sunt minuta. Et quar-
to non attinent relucetiae. Et quatuor signa his con-
traria sunt in illa quae prouenit ex digestionem materiae.
Non enim apparet nisi post processum aegritudinis
& post uehementiam accidentium, scilicet aut cum est
aut cum praefuit. Et grana eius sunt crassa, & attinet
cuidam relucetiae. Quapropter nota quod lippa est
superfluitas quare digestionem oculi, licet in oculo oph-
thalmico pro parte decidat ab humore faciente oph-
thalmiam. Sed cuidam forte uidebitur dubium pro-
pter quod species ophthalmiae frigidae rubent, cum cae-
tera apostemata ab humoribus frigidis pendencia non
rubeant. Cuius causa duplex est. Prima sumpta à do-
lore. Est enim oculus ualde sensibilis & propter dolo-
rem multus sanguis & spiritus ad coniuncturam tra-
hantur qui ibidem contenti in uenis ipsius coniunctu-
rae dant coniuncturae colorem rub. licet non aposte-
ment, ex quo fit quod humor apostemans est frigidus.
fit ex se per accidens tamen calefit, & per consequens
fit magis illuminabilis ex praesentia sang. & spirituum.
Secunda causa sumitur à multa albedine coniuncturae,
in qua omnis rubedo eueniens facile discernitur. Co-
gnoscitur modus euentus eius per uenas & arterias ex-
trinsecas quia inueniuntur tumentes uel aliqua ipsa-
rum. Et si arteria, est magis pullans consuetudo, palpe-
bra ipsa tumens aliquantulum apparet, & similiter loca
ipsi propinqua. Et hoc signum est proprium. Si au-
tem materia fluit per partes intrinsecas multoties fit
frequens sternutatio, & dolor prius incipit à pro-
fundo oculi & parte posteriori eius quam uideatur
ophthalmia.

Prognosticum

Pronostici. Primum, Ophthalmia si recte curet secundum plurimum sanatur, nili quæ maxima est, frequenter enim perducit ad putrefactionem oculi & aliquando tandem ad mortem putrefactione ingrediente ad cerebrum per musculos & nervos opticos, frequenter quoque perducit ad exitum uicæ corneæ disrumpita per corrosionem aut putrefactionem. Secundum. Quando prolongatur ophthalmia secundum plurimum perducit ad ulcerationem uel aliquod uestigium in oculo derelinquit. Causa enim prolongationis est sumpta ex duobus principaliter. Prima ex materia quæ incessanter profluit ad oculum, aut propter multitudinem eius: aut oculi debilitatem, aut uicæ amplitudinem. Secunda causa est aliquod nocuum iam impressum difficulter remouibile, sicut ulcus in oculo, aut sanies retro corneam, aut aliqua mala materia in tunicis inphiltrata, aut scabies, aut pili palpebrarum. Tertium. Dolor multum prolongatus in ophthalmia pessimum, significat enim materiam aut acutam corrodentem aut multum extendentem, aut maturationem, aut uaporem crassum tunicis reclusum, sed hoc minus malum est & uaporationibus sedatur. Cuius doloris quadruplex causas distingue per species doloris aut acuti pungitiui & mordicatiui, aut grauantis extensiuui, aut pullatiui sine grauitate & perforatiui, atque alijs signis significantibus acuitatem materiæ & multitudinem. Et signis etiam significantibus maturationem in sequenti cap. de ulceribus dicendis. Quartum. In regionibus meridians & temporibus calidis & humidis frequenter accidit ophthalmia, & facile curatur, in contrarijs uero contra. Quintum. Cum præcedit hiems septentrionalis & sequitur uer meridionale & similiter æstas, multiplicatur ophthalmia, & multo magis multiplicatur, si e contrario tempora se habuerint &c.

CURA OPTHALMIAE NON
VERAE A CAUSA
PRIMITIUA.

Cura conturbationis perficitur remouendo causam. Post cuius remotionem si aliquid in oculo remanet impressum caliditatis aut frigiditatis aut alterius dispositionis præter naturam, cum contrarijs remoueat applicitis oculo & partibus adiacentibus. Et in summa curetur cura principij ophthalmia ueræ de qua statim, & cum applicitis, & cum phlebotomia si expedierit. Et inter cætera somnus prolixus laudatur, quia dolorem sedat & humorum agitationem. Et si quid nocumeti impressum est, corrigitur, & maxime remedijs congruentibus præapplicitis. Et si fuerit ex percussione prius iniiciatur in oculo, & desuper albumen oui cum aqua rosacea concussa, & tandem sanguis columbæ ut inferius in tarsati ad sanguinis resolutionem. Et si dolor instaret præmissa phlebotomia, fiat oculi fomentatio cum philtro aut spongia, panno subtili lineo inuoluta & infusa in lacte & oleo ros. debite calidis, & bene expressa oculo dolenti sæpe applicita &c. De cura ophthalmia ueræ. Cura ueræ ophthalmia triplex exigit reum circa causam coniunctam actu facientem ophthalmiam. Tertium est utriusque commune. Primum exigit quinque intentiones. Prima est mino-

ratio materiæ. Secunda digestio. Tertia eradicatio. Quarta est diuersio. Quinta fluxus interceptio.

Prima scilicet minoratio completur secundum plurimum per phlebotomiam quæcunque sit materia, uel per uentofationem uel aliquod proportionabile, sicut sunt sanguisugæ quas inueni magis cõferre quam uentofas si congruè applicentur. Sed materia existente multa fiat prius ex cephalicâ contraria ut docet Rasis. Deinde si materia sanguinea sit, fiat sequenti die phlebotomia cephalicæ eiusdem lateris. In hac enim sanguinea nec digestio, nec euacuatio per solutiua est multum necessaria. Si tamen sanguis est multum subtilis, aut calidus, competerent in frigidantia & incrassantia sicut syr. de papauere, de iuiubis, & similes. Si uerò materia sit cholerica, facta primò phlebotomia, aut ex eodem latere, aut e contrario secundum materiæ multitudinem, minoretur materia cholerica cum lenitio, in quo sit plus alterationis quam euacuationis sicut ex decoctione fructuum, prunorū, tamarindorum, uiolarum, & mirobalanorum citrinorum cum qua trahatur mannæ. ʒ. i. s. uel quantum sufficit, succi ros. est in hac intentione cõueniens si aliquid eius suprascriptis addatur, deinde sequatur si oportuerit propter materiæ multitudinem secunda phlebotomia ex cephalicâ eiusdem lateris, & in hac cholerica ophthalmia procedendum est cum digestiuis in frigidantibus ualde & incrassantibus materiam, sicut syr. uis. de papauere, mucilago psylli, aqua nenupharis et similia. Et iterandæ sunt euacuationes, ut materia eradicetur. Si autem plegmatica uel melanch. uel aquosa, uel uentosa reliquis consentientibus, similiter incipiendum est à phlebotomia quæ etiam aliquando reiteranda est propter materiæ multitudinem, minus tamen in melancholica, aquosa & uentosa, sed in uentosa minus quam in cæteris, sed in his pendentibus ab humidis frig. possunt exhiberi solutiua exoluētia, sicut pilulæ cochia de hiera cum agarico in phlegmatica, pilulæ indæ in melancholica, turbit non confortatum in aquosa. Et in uentosa est euacuandus humor à quo uentofitas eleuatur.

Digestiua autem in materia phlegma. est mel ros. oxymel simplex, & in melanch. syrupus de epythimo cum syrupo acetoso, aut oxymelle simplici. Et possunt distemperari cum aqua feniculi, aut euphrasie, cum his enim digestiuis & euacuariis intendendum est humori facienti ophthalmia, & membro lesio tam mittenti quam recipienti, nec stemus contenti una euacuatione, sed iterandæ sunt ut materia eradicetur.

Et sic etiam expeditæ sunt tres intentiones, scilicet minoratio, digestio & eradicatio. Sequitur quarta, scilicet diuersio quæ multiplicib. instrumentis cõplenda est. Est enim quædam diuersio sine euacuatione, et in hac incipere debemus à partib. propinquis & tendere ad partes remotas, sicut exempli gratia, in fricationibus debemus incipere à collo & à spatulis & descendere ad brachia deorsum coxas & crura, similiter uentofando primò nocrea, deinde ad spatulas, deinde ad nates, ita in ligaturis & lotionibus. Diuersio autem cum euacuatione fit e contrario incipiens à remotis & perueniens ad propinqua, et completur multis instrumentis, scilicet phlebotomijs, & primò debemus incipere à phlebot. uenarū quæ sunt in nocrea, deinde

uenarum quæ sunt post aures. deinde uenarum aut arteriarum temporum, deinde uenarum frontis deinde uenarum quæ sunt in angulis oculorum domesticis quæ non apparent nisi apud fortē gutturis cōstrictio nem. Istæ tamen magis euacuant causam cōiunctam quàm diuertant. Et loco istarum phlebotomiarum excusaret appositio sanguifugarum in locis eisdem. Secundum genus diuersionis est laqueatio quæ debet fieri in superiori parte colli ubi collum ceruici coniungitur, & sic debet teneri per triginta uel quadraginta dies, quotidie trahendo sedaginum ad diuersionem materiæ. Tertium genus est cauterium siue cauterizatio siue actualis siue potentialis, & debet primò fieri in posteriori capitis ex directo oculi ophthalmici, ut non penetret nisi usq; ad almochari cuius escaræ casus procuretur & dimittatur apertum, deinde si oportet fiat in commissura coronali, quod apud uehementem necessitatem penetret usq; ad os, & diu teneatur apertum. Hæc tamen sunt de illis quæ postponi debent quantum est possibile. Non dico tamen quòd hæc diuersiones in singulis ophthalmiis sint necessariæ sed eas memoro, ut unusquisq; possit uti his quæ suo proposito magis seruiunt. Non obliuiscamini tamen phlebotomiæ uenarum quæ sunt in nœcrea uel uentofationis in eadem, si nō reperiuntur uenæ aut sanguifugarum appositione. Ex hoc enim loco sanguinis extractio est inter cæteras diuersiones præstantissima. Quinta & ultima intentio quantum ad causam antecedentem est fluxus interceptio. Quæ primò completur cum medicinis cōstringentibus applicitis fronti & temporibus, de quibus Rasis ponit unam descriptionē in litera. Et ab hac intentione per medicinas complenda quamuis posterius posita sit, in ordine tamen ab hac uia operationis fere ab initio facta, scilicet una phlebotomia aut duabus plus debitis inchoare. Perficitur secundò cum sectione uenarum uel arteriarum, quod fieri non debet nisi cum scripta ad curam nō sufficiunt, quæ si sint magnæ, debet primò scindi pellis, & uena in duabus partibus ligari in medio ligaturæ scindi & extrema cauterizari, ubi tamen est magna necessitas euacuationis, nō esset inconueniens ut extremitas uenæ scissæ, quæ est uersus oculum, dimittatur tantum non ligata donec sanguinis quantitas sufficiens fluat, in arteriis tamen hoc esset magis suspectum. Si autem sit de paruis uenis scindatur per medium absq; ligatura & cauterizatione, sanguis enim ad libitum restringi potest. Hæc tamen uisima intentio maximè conueniens est materia fluente per partem extrinsecam, sed materia fluente per partem intrinsecam simus folliciti in euacuationibus & diuersionibus iteratis.

Cura autem localis respiciet causam coniunctam tribus perficitur intentionibus. Primò percussione pura conueniente in principio. Secundò resolutione status. Tertio percussione mixta resolutione conueniente augmento & statui, ita tamē ut gradatim procedatur à percussione puris paulatim augendo resolutione donec deueniamus ad resolutionem puram. Si autem ophthalmia tenderet in uiam exituræ, recurrendum est ad capitulum sequens de exituris & ulceribus oculorum. Restat tertium regimen duas exigens intentiones communes tam causæ antecedenti

quàm coniunctæ, scilicet correctio accidentium ex quibus maximè corrigendus est dolor, aut cum remouentibus causam de quibus iam dictum est, aut cum stupefacientibus leuibus, aut opiatīs, de quibus seriatim post expositionem textus agetur, aut cum anodinis & facientibus materiam euaporare maximè præmissis uniuersalibus. Et ubi dolor ex conculatione materiæ in loco proueniret, sicut cum balneis totius corporis, aut cum suffumigationibus & fomentis applicitis oculo dolenti, & partibus adiacentibus ex decoctione uiolarum, ros. seminum citoniorum, fœnugræci, florum chamomilæ, meliloti, anethi, & similibus, & sicut fomentum factum ex lacte & oleo ros. Spongia aut philtro in ipsis infuso & oculo dolenti aliquoties applicito, non est tamen diu oculus fomentandus ne dilatando & calefaciendo materia ponatur in fluxu. Si uero dolor proueniret, sicut plurimum prouenit, aut quia apostema exituraretur aut quia ulceraretur oculi particulam, recurre ad capitulum sequens de ulceribus exiturarum. Ultima intentio est debita administratio sex rerum non naturalium secundum exigentiam intentionum præcedentium. Aliter enim regendus est ager in principio, aliter in augmento & statu, aliter in declinatione, aliter cum dolor instat, aliter cum est sine dolore. De regimine tamen harum rerum non naturalium. Rasis aliquid tangit in litera. Aliqua subiungam post textus expositionem. Iam igitur ad expositionem quorundam dictorum in textu ueniendum est, quia quæ clara sunt omittentur.

In principio uero curationis ophthalmiæ, cephalica est phlebotomia ex manu uel ex brachio partis contrariæ quæ est oculus infirmus, nisi leuis fuerit ophthalmia. Et quanto fortior fuerit ophthalmia, tanto plus est minuendum de sanguine. Deinde uenter ex mirobalanis citrinis & terreni abim & succo fructuum soluendus est. Et ager à carne & a uino & a rebus dulcibus abstinere debet & cibum minuire.

Pars practica diuiditur in sex partes. In prima docet curare principium. In secunda quæ incipit ibi. Quòd si ista non suffecerint. Docet curare augmentum. In tertia quæ incipit ibi. Et si lipitudinis. Docet curare statum. In ultima ibi. Si autem oculus leuior. Docet curare declinationem. In quinta ibi. Ex his autem. Redit ad ponendum medicinas principij. In sexta ibi. Si est album. Ponit descriptionem medicinarum quarum superius fecit mentionem. In prima parte omnia clara sunt præterquam cum dicit, phlebotometur cephalica ex manu uel ex brachio. Pro quo sciendum quòd penes Auic. cephalica quæ in manu phlebotomatur non est ramus cephalicæ quæ in parte superiori apparet in cubito, sed est ramus uenæ communis sicut est scilicet, ut est apud Auicennā prima primi doctrina, s. cap. 4. de anatomiā uenarum manus, hæc tamen potest dici cephalica,

quia confert in passionibus capitis. Sed tamen est differentia inter phlebotomiam harum uenarum, quia quæ est in pollice & est ramus uenæ communis confert ad longinqua diuertendo, illa autem quæ est in brachio magis multitudinem euacuando, & immediatus à parte læsa.

Quod si ista non suffecerint, sies album in lacte puellam lactantis fricandum & in oculis distillandum. Et si lippitudinis multitudo affuerit in oculis collecta, radius cotto inuoluatur & madefiat in aqua, & cum ea oculus ab illa lippa mundetur. Deinde puluis albus aspergatur & superponendo oculis aliquid, ut cottum suauiter sustentetur & ligetur. Et æger in domum tenebrosam mittatur. Et ingenandum est quantum possibile est ut somnus prouocetur. Caueat tamen ne super oculum infirmum dormiat, & ne caput depressum sit sed superius eleuatum. Nec uesinentorum capitia sint stricta nec in faciem se diu proiciat.

Docet administrare sies album in cuius descriptione ponit sarcocollam, & ideo secundum Mesue conuenit in augmento, non in principio. Sed quis forte instabit quod Rasis omisit medicinas principij. Dicendum est quod sic dat ipsas intelligi, nã si ab hoc sies albo remoueat sarcocolla est medicina principij. Vel forte hic Rasis breuitati indulgēs uoluit hoc sies esse medicinam principij ophthalmiæ proueniētis ex materia mixta ex humoribus calidis & frigidis. Verum consuetudo Mesue & aliorum autorum in principio ophthalmiæ calidæ est apponere albumen oui cum aqua rosacea, uel lacte. In secunda parte principij sies album sine sarcocolla & in augmento cum sarcocolla, & tandem addere aliquid aquæ sceniculi aut aquæ decoctionis, sem. citoniorū, aut scœnugræci, ubi queratur maior digestio, et maior sedatio dolorum. Caue tamen summo per ne matures. Et si lippitudinis. In hac tertia parte omnia clara sunt, docet enim curare statum, & ideo ponit puluerem album qui fit ex sarcocolla & sies memithæ, caue tamen ne pulueris substantia mordicat ideo fortè melius est ut simus cōtenti collyrijs in forma liquida, sies & collyrium idē sunt, scilicet medicina ocularis. Et habet formam oblongam ad similitudinem ossis dactili, quanquam moderni intelligant per collyrium medicamen oculare liquidum. Collyrium aliquando accipitur pro supposito quod est ad similitudinem sies siue collyrij propriè sumpti.

Si autem oculus leuior fiat & dolor sedetur, ac lacrymæ minuantur phlebotomia iam facta, & uentre soluto, balneum

multoties & frequenter ingrediatur, ex hoc enim passionis reliquæ dissoluentur.

Quod si in oculo humorositas & grauedo remanserint, puluis citrinus est immittendus. Ex his autem quæ habenti ophthalm. multum conferunt, est ut fons & palpebræ ex hoc liniantur epithymate. Quod Rec. sies, memithæ, ros, aloes, licij, sandali rub. faufel, croci orientalis, omnium ana partes æquales, fiant ex eis pilulæ, cumq; necesse fuerit resoluatur una ex eis in succo coriandri, aut in succo endiuicæ, aut in aqua rosacea, & liniatur cum eo & liberabitur si deus uoluerit. Sies album. Recipe cerusæ ablutæ drach. 10. sarcocollæ crassæ drach. 3. dragagan. drach. 1. opij drach. semis, fiant ex eis pilulæ lenti similes. Puluis citrinus. Recipe sarcocollæ crassæ drach. 10. aloes. drach. 2. croci drach. 2. myrrhæ drach. 1. licij drach. 2. & his optimè tritis immittatur puluis cum opus fuerit. Puluis albus. Recipe sarcocollam albam & pinguem, quæ mittatur in lac mulieris quod melius est cum alicuius iuenculæ fuerit, & dimittatur in umbra donec siccetur & teratur optimè & omnibus drach. decem ipsius addatur sies, memithæ drach. 2. quæ iterum optimè trita roponentur, & cum opus fuerit in oculum mittantur.

In hac ultima parte ponit puluerem citrinum resolutum declinationi conuenientem qui fit ex sarcocolla, aloë, croco &c. Verum applicat in hac ultima parte res conuenientes principio ut puta constringētia intercipientia fluxum quibus statim ab initio uti debemus, scilicet facta prima phlebotomia, sies, memithæ, id est succus memithæ inspissatus. Est autē memithæ planta frigida naturæ quæ dicitur glaucium, & est species chelidoniæ frig. et sic. in primo, cuius succus extrahatur post aliqualem exiccationem ut partes aqueæ resoluant & ad formam sies reducat & sic in toto le exicetur. Licium uero temperatum in actiuis sicum in secundo fit ex folijs, granis, radice cuiusdam arboris spinosæ similis buxo, multum ualet in ophthalmia. Faufel, id est, auellana inda.

Croci orientalis, id est, communis quo utimur, crocus autem hortulanus est flos chartami, & cætera

nota sunt. Et nota quod Rasis in declinatione concedit balneum, in quod multoties aeger ingredi debet ad resolutionem residui materierum, quod balneum debet esse aëreum aut aquae dulcis. Sed tempore isto hoc non utuntur, nequaquam autem conuenit in augmento, esset enim causa maioris fluxus humorum ad oculum & augmenti apostematis, imò neq; conuenit in statu nisi cum tota materia fluxerit. In descriptione pulueris albi ponit sarcocollam quae est gummi calid. in secundo, siccu in primo, multum ualens in ophthal. ad resoluendum & abstergendum. Et est preparandum in lacte mulieris iuenculae. Alias docet esse preparandum in lacte mulieris nutricis puellam, quod ultimum intelligendum est ipsam peperisse illam quam nutrit, sic enim lac est frigid. & humidius. Est autem melius ut sit iuencula quam senex, quia lac ipsius est humid. licet calidius, sed est calidius calidius. Et spiritus oculo conueniente. Cetera patent &c.

Sed ut modus curationis ophthalmiae pro iuuenibus clare dearticuletur, ponamus exemplum. Occurrit tibi forte plethoricus patiens ophthalmiam satis notabilem & infestam mixtam humoribus calidis dominantibus praecipue sanguine sicut frequenter accidit. Raro enim fiunt apostemata singularia, tertia quarti. In prima die ophthalmiae fiat phlebotomia stomacho ieiunio uenae cephalicae in brachio contrario oculo ophthalmico, & hauriantur 3. decem sanguinis, plures & pauciores secundum exigentiam uirtutis, repletionis, aetatis, temporis anni & aliorum a quibus querenda est licentia in phlebotomia. Et si fuerit stipiticus secundum uentrem praemittatur huic phlebot. clystere lenitiuum. Et eadem die ponatur in oculo aliquid aquae rosae & proprie ex rosae syluestrib. actu frigid. nam quae in oculis ponuntur debet esse actus frigida secundum plurimum, & quae in auribus, calida de sex horis in 6. horas. Et clauso oculo ponatur super faldella corti lenis circumdata petia linea subtili infusa in aqua rosae quae cooperiat oculum & partes circumstantes, & praecipue magnam partem frontis, & aliquantulum stricte super oculo ligetur ita ut dolorem non inferant: quae similiter de sex horis in 6. horas cum suauitate renouetur. Si autem dolor uehemens instaret in hoc principio permisceatur haec aqua rosae cum aliquo leui stupefaciente sicut est aqua papaueris, mucilago psyllij, succus lactucae, solatri, aut pomorum mandragorae quae mixta in oculo & super oculo, & partibus adiacentibus applicentur. Secunda die phlebotometur ex cephalica eiusdem brachij & hauriantur 3. 6. sanguinis uel circa, qua completa ponatur de sex horis in sex horas sicut albi sine sarcocolla cum aqua rosae, aut lacte distemperatum aut super cote cum eiusdem fricatum & sit sine opio si dolor non affuerit, aut cum opio si dolor erit, & super frontem, & super tempus oculo communicans ponatur percussiuum. Descriptio percussiuum applicandi super frontem & tempora. 3. sicut sicut, sicut, rosarum, licij, boli armeni. an. 3. 1. cum albumine oui optime incorporetur, & fiat sicut unguentum & extendatur super petia lata secundum frontis latitudinem & fron-

ti apponatur. Et una alia similiter tempore, oculo communicanti & non remouetur nisi de tertio in tertium, aut cum cadunt per se. Si tamen hoc tempore infestaretur addatur 3. s. opij, et utere ut prius. Aliud percussiuum, doloris uehementis sedatiuum. Recipe croci, memithae, lycij, aloes, gummi arabici, acaciae, opij, ana partes aequales, confice formas similes auellanis cum succo solatri aut rubi, & cum oportet dissolue unam earum cum succo solatri aut rubi, aut mucilagine seminum citoniorum aut psyllij, aut albumine oui, aut aqua rosacea secundum exigentiam necessitatis.

Et in hoc liquore infundatur faldella corti petiolinea subtili circumdata & ponatur ut supra, & remittatur secundum necessitatem satis frequenter, ne nimis super oculo exsiccentur & inuiscetur, remotio enim rei multum inuiscatae esset causa augmenti doloris, & maioris fluxus humorum, & propterea multum uiscosa non sunt super oculo ponenda sicut huiusmodi faldellae infusae in albumine oui et similibus multum oculo adherentibus. Deinde tertia die soluatut uenter si non fuerit nimium solutus cum aqua decoctionis mirbalanorum citrinorum, prunorum, tamarindorum, uolarum, cum cuius uncij tribus aut 4. trahatur cassia uncia una aut 3. 10. aut dissoluatur cum ea mannae 3. una semis, & portio calida exhibeatur, post cuius sumptionem tardet prandium per quinque horas, & haec euacuatio potest deinceps replicari secundum exigentiam semper digerendo materiam cum syrupo de papauere, & similibus & idem collyrium oculo imponatur, & cetera fiant ut supra usque ad quartum diem. Et in hoc quarto die gratia diuersionis phlebotomentur uenae nocte. Et si non reperiuntur, uenotetur locus iste cum scarificatione aut sanguisugae apponantur. Deinde quinta die sicut albo supra scripto addatur. 3. 1. sarcocollae nutritae in lacte mulieris, & distemperentur cum lacte mulieris & aqua rosae, & quarta parte mucilaginis, sem. citoniorum, aut hoc sicut addita sarcocolla super cote cum lacte fricetur. In hoc enim tempore opus est digestionem aliqua & doloris sedatione, cum in hoc tempore uniuersaliter debeat esse augmentum quod magis declaratur si oculus lippitudinis habere coeperit: Ante enim hoc tempus, scilicet in toto principio non est in oculo lippitudo neque inuiscatio notabilis palpebrarum sed solum fluxus lachrymarum subtilium: Et in hac quinta die si opus fuerit propter materiae multitudinem gratia diuersionis phlebotomentur uenae quae sunt post aures ex parte oculi aegri & dimittantur per se constringi, aut sanguisugae apponantur. Hoc etiam ultimum collyrium usque in diem septimum continetur, scilicet quousque peruentum fuerit ad principium status quod declarabitur per multitudinem lippitudinis & palpebrarum inuiscationem cuius lippitudinis grana sunt crassa & continentia cuidam relucetiae. Deinde post septimum collyrio addatur plus sarcocollae & aliquid aquae foeniculi sicut continetur usque in diem. 10. uel. 11. Et in unaquaque mutatione est oculus debite a lippis abstergendus cum extremitate filii cotto inuoluti, & etiam si opus fuerit poterit cum aqua rosae repida madesieri, & cum ea oculus lauari & abstergi, & post debita absterfione medicinae debent imponi. Et in hoc tempore exterius super oculo ponatur cortum petia linea subtili circumdata infusum in decoctione rosarum & foenugraeci, aut

aut ros. & meliloti. Si autem hoc tempore dolor ex-
cresceret signum est ulceris aut exituræ, pro quorum
curatione recurrit ad capitulum sequens de ulceribus
& exituris. Post 11. autem usque ad 14. uel circa in quo
tempore est declinatio, quæ per signa prius posita cõ-
prehendi debet, perueniatur ad resolutiua pura quæ
de intentione auctorum in forma pulueris, & liquida
possunt applicari, licet ut credo tutius sit cum humi-
dis procedere, pulvis enim frequenter & si sit optimè
tritatus & præparatus sua asperitate dolorem com-
mouet, & est aliquando causa noui fluxus humorum
ad oculum. Et ex conuenientibus in declinatione est
ut oculus collirizetur cum sarcocolla nutrita cum
aqua fœniculi & distemperata, cui propter humoris
caliditatem aliquid thuriæ præparatæ posset addi, aut
oculo imponatur collirium, huiusmodi descriptio-
ne Mesue. 12. sarcocollæ nutritæ. 3. i. croci, spicæ, aloës
loti. an. gran. 6. distemperentur cum aqua fœniculi,
cui si in oculo uideatur nimia caliditas, addatur ali-
quid aquæ ros. Et si oculus toleret, in forma pulueris
potest applicari. Exterius autem ponatur cotum in-
fufum in decoctione fœnugraci, ros. meliloti in aqua
& uino. Regimen autem sex rerum non naturalium
est ut æger locetur in aëre temperato obscuro nõ uen-
toso neque fumoso aut mali odoris, teneatque non solū
oculum lēsum clausum, sed etiam sanum, unius enim
oculi cõmotio inquietat alterum, teneatque caput tem-
peratè calid. & in omnem euentum nihil gerat stri-
ctum circa caput neque circa collum. Dormiatque capi-
te eleuato super ceruicem aut super latere oculi sani, &
nequaquam super oculo ægro, dormiatque multum,
de nocte maximè, sed non dormiat nisi distanter à ci-
bo per 2. horas uel circa, habeatque propolē uentrem
lubricum ut assellet bis in die, aut naturaliter aut au-
xilio medicinali, scilicet suppositorio aut clysteri-
bus, nullo modo exercitetur, nec loquatur, sed frica-
tiones uicem suppleant exercitiij, quæ fiant satis for-
tes aut mediocres incipiendæ à spatulis aut brachijs
descendendo. Et possunt fieri bis in die stomacho ie-
iuno, similiter lorio crurij cum aqua calida, cõfert
ram stomacho ieuno quam post cibum. Sit sperans
& gaudens. Vitet omnia animi accidentia multum
excedentia. Dieta eius sit tenuis, unde cibum minuat,
imò carnem aliquando omittat, caueatque à uino, car-
nibus, & rebus dulcibus in toto curæ processu præ-
terquam in declinatione, ac uniuersaliter quanto ac-
cidentia sunt uehementiora sit dieta magis tenuis, &
in omnem euentum declinet ad frigidum. Caueatque
ab euaporantibus etiam si frigidi sint sicut acetum, &
etiā ab his quæ à proprietate nocent oculis aut à mo-
dificatione sicut lactuca, coriandrum, lentesc, & in-
condiantia omnia, unde comedat ptisanam, panicum, &
condiantur cum pauca agrestia, aut uino granatorij,
sed non sit multum acerosa, comedatque in fine mensæ
aliquid repressiuum uaporis sicut pyrū aut citonium
coctum uel confectum. In declinatione potest uti car-
lympharo in pauca quantitate, & uino paucifero
ad finem declinationis, tanto magis dieta incrassetur.
Hæc dixi in cura regulari secus in cura coacta. Acci-
dentia namque & uirtutis debilitas interdum ordinem
curationis præuariant, Et ex hoc possunt elici modi
curationis cõterarū specierū, ophthalmiæ, Erit aut-

xilium ad plura sequentia capitula. Si enim ophthal-
mia fuerit cholerica, communiter una phlebotomia
sufficiet, & humor cholericus erit aliquoties euacuan-
dus cum aqua fructuū de qua supra, & cæteræ inten-
tiones respiciētes causam antecedentem ut supra com-
pleantur. Et medicinae locales declinent plus ad frigi-
dum, & minus ad siccum. Si uero fuerit phlegmati-
ca, euacuetur humor phlegmaticus cū his de quibus
sermo præcessit, & remedia plus declinent ad calidum
& siccum. Si uero melanch. euacuetur humor melan-
cholicus, & remedia localia sint magis humida & sa-
tis in actiuis temperata. In aquosa euacuetur humidi-
tas aquea cum his quæ dicta sunt & remedia localia
sint magis sic. & ad calidum declinantia. In uentosa
aut euacuetur humor à quo eleuatur uentositatis & pro-
cedatur cum calidis & siccis uentositatē carminanti-
bus, quæ aut sint huiusmodi in quacunque materia cõ-
petentia non dearticulatē scribo, sed facile possunt eli-
ci ex dictis & ex dicendis, si enim omnia dearticulatē
ponerentur, magnū uolumen excresceret & tædium
legentibus pareret imò etiam longius processit quàm
decreueram, sed hoc erit auxiliū ad sequentia, gratia
tamen completioris doctrinæ describā aliqua localia
secundū uarias species ophthalmiæ. Si ergo ophthal-
mia fuerit frigida, phlegmatica utere in principio si hoc
cū succo myrti aut aqua ros. cuius hæc est descriptio:
12. si albi descriptio Almanforis. 3. i. spicæ, croci,
ana gran. 5. distemperentur cum succo myrti, aut a-
qua rosacea, & in processu utaris isto. Recipe sarco-
collæ. 3. i. spicæ. 3. i. rosarum. 3. i. 2. croci. 3. i. opij, a-
loës, gummi arabici, amyli, dragaganti, ana. 3. s. con-
fice cum aqua pluuiali et utere eo cum aqua fœniculi,
aut succo eius, sed dolore nõ existente remoue opij.
Si aut materia fuerit melancholica addatur cum simi-
libus mucilago, semen citoniorū, aut utamur simili-
bus collirij ad calidum declinantibus cum lacte. Ma-
teria uero existente cholerica utamur si albo cum
opio aut sine opio, cum aqua papaueris aut mucila-
gine psilij, aut similibus, & in processu cum lacte &
mucilagine sem. citoniorū, & addatur in statu parū
sarcocollæ et aqua fœniculi. Et materia existente aquo-
sa utamur thuria cum sarcocolla & similibus. Sed ma-
teria existente uentosa resoluatur cum filtro aut spon-
gia infusa in aqua decoctionis ros. fœniculi, cymini,
meliloti, aliquoties applicita purgatione præceden-
te. Pulvis etiam citrinus, & similiter pulvis albus Al-
manforis conuenientes in statu & declinatione, oph-
thal. cal. aut mixtæ etiam essent conuenientes in prin-
cipio ophthalmiæ frig. aut saltem in augmento, si mi-
sceantur cum lacte, aqua ros. mucilag. sem. citoniorū
& similibus & cum decoctione meliloti, & sem. cito-
niorū. Et exterius aut applicandis super toto in prin-
cipio ophthal. cal. est cotū carminatū circundatū pe-
tia lini subtili infufum in aqua ros. Et si dolor esset in-
fundatur in aqua papaueris cum lacte & aqua ros. &
in processu conuenit pomū coctū cum aqua ros. per-
mixtum aut coctū suprascriptū fufum in aqua deco-
ctionis ros. meliloti & sem. citoniorū, & sic ulterius
procedendo addantur calida & minuuntur frigida.
Sed in ophthalmia frigida in principio exterius su-
per oculo applicetur cotum infufum in aqua deco-
ctionis ros. & myrti. Et in processu infundat in aqua
decoctionis, anethi, rosarū & malug in uino supico,

& magis in processu in uino decoctionis meliloti, spicae, foenugraeci, & rosae. Ex applicandis autem fronti & temporibus in ophthalmia calida ad reperiendum est istud quo communiter utor. R. boli ar. ʒ. i. aquae rosae ʒ. ʒ. acetici ʒ. i. albuminis oui numero 2. misce & infundantur petiae & fronti & temporibus applicentur. Sed in ophthalmia frigida cum hoc misce thus & masticem, uerum apud necessitatem posset superprescriptis addi. ʒ. s. opij aut amplius secundum maiorem necessitatem sedandi dolorem. Et si materia esset calida ualde cholericā posset addi succus semperuiuae aut solatri, aut aqua papaueris. Quod si materia facies ophthalmiam esset corrosiua utaris sief albo cum opio, cum albumine oui, & postea addas aliquid sief de plumbo uel elysir de quibus in sequenti cap. Et nota quod ea quae ponuntur in oculis debent esse actu frigida, & non multum stiptica, sed ea quae fronti, temporibus apponuntur debent esse ualde stiptica & continuari usque ad statum inclusiuē, ea autem quae in oculis ponuntur uariantur secundum tempora, & similiter quae ponuntur super oculis.

DE VLCERIBVS OCVLORVM.

Cap. IX.

Circa rubricam intellige quod haec rubrica, scilicet de ulceribus oculorum multos decipit interpretes huius capituli. Existimant enim quod Rasis in hoc cap. solum agat de ulceribus oculorum, cum tamen primo agat de pustulis siue exituris oculi ad quas sequuntur ulcera cum rupta sunt, postea de ulceribus. Et utrorumque in praesenti cap. ponit curationem. Et propterea forte fuisset conuenientius ut rubrica diceret de pustulis & exituris oculorum. Sed Rasis a fine, scilicet ab ulceribus in fine remanentibus sumpsit denominationem. Praemittenda sunt ergo iuxta consuetudinem quid nominis & quid rei, pustulae siue exiturae, & similiter ulceris. Pustula enim dicitur quasi apostema paruum, est autem apostema, secunda primi, aegritudo composita ex tribus morbis, ex quibus cum coniungitur provenit una aegritudo. Alidubellet uero est apostema colligens humores calidos siue frigidos. Sed exitura est dubellet colligens humores calidos, unde termini se habent sicut superius & inferius. Exitura autem fit dupliciter incipiendo & permutando. Exitura incipiendo est illa quae fit incipit fieri, ita incipit colligere. Sed exitura permutando est quae primo fit, deinde post tempus colligit. Exiturae autem quae fiunt in oculis, & proprie in cornea secundum plurimum fiunt incipiendo. Vlcus autem est solutio continuitatis cum sanie ad differentiam uulneris, quod est solutio continuitatis sine sanie.

Cum in oculis fortis dolor & punctio nociua ac pulsus sentitur, & lachrymarum fluit multitudo, & cum palpebrae eleuantur, & oculi aperiuntur, loca quae sunt in albis ipsorum inueniuntur rubra, & si totum fuerit rubeum, & unus lo-

cus magis rubere inuenitur, aut in nigredine locus aliquis albus apparet, pustula iam in oculo exorta est.

Ad hanc uero curandam passionem necessarius est medicus ualde instructus in curis oculorum. Nos tamen curationes ipsius summas & aggregationes dicemus. Dicimus itaque quod ulcera quae in coniunctiua nascuntur, hoc est in albis oculorum non adeo sunt timenda ut ea quae in cornea, hoc est in oculi nigredine fiunt. Deterius uero ulcerum est illud quod in nigredine sub pupilla existit, eminētia namque ad istum est uelocior.

Diuiditur autem praesens capitulum in partes, 2. in prima agit de pustulis siue exituris corneae theoricē. In secunda ibi. Horum autem ulcerum, agit practice. Prima in tres. Nam in prima ponit signa earum. In secunda ibi. Ad hanc uero curandam, ostendit esse necessarium medicum in aegritudinibus oculorum esse eruditum, pro harum dispositionum curatione. In tertia ibi. Dicimus autem quod ulcera, ponit diuisionem harum pustularum in suas species, ostendens quae sit deterior. Pro declaratione huius partis theoricae iuxta consuetudinem nostram primo uidenda sunt species & causae pustularum corneae & ulcerum eius. Secundo signa. Tercio prognostica.

Pustulae igitur corneae. Quaedam sunt phlegmantes ab aquositate siue phlegmate aquoso, & dicuntur apud Auic. uesicae. Et apud Axaraium ampullae. Quaedam sunt cholericae, quas Auic. appellat exituras. Sed Rasis hic & Ioannes Serap. secundo breuiarum & Iesus Ali ulcera. Tertiae sunt sanguineae quae boethor ab Auic. dicuntur. Quartae melancholice & proprie ex melancholia adusta quas caneros Auic. nominauit. Rasis tamen breuitati indulgens solummodo de cholericis & sanguineis tractauit hic. Pustulae uero phlegmaticae pendentes a phlegmate aquoso non autem crasso, quia non possent in substantiam densam nisi difficillime penetrare, distinguuntur quinque modis, scilicet situ, quantitate, modo substantiae, acuitate & colore. Situ quidem, nam quandoque aquositas continetur inter primum & secundum corticem corneae, quandoque inter secundum & tertium, quandoque inter tertium & quartum. Ex parte quantitatis, nam quaedam pendunt a multa materia fere totam corneam occupante, quaedam a pauca siue mediocri. Modo substantiae, quia quaedam pendunt ab aquositate subtiliori, quaedam crassiori. Acuitate uero, nam quaedam pendunt ab aquositate magis acuta & corrosiua, quaedam ab aquositate suauis non acuta. Colore autem, nam quaedam tendunt in nigrum cum diaphaneitate, quaedam sunt albae non diaphanae. Primae sunt illae quae continentur inter primum corticem & secundum. Secundae sunt illae quae continentur inter tertium & quartum. Mediae autem inter has sunt continuae inter secundum & tertium. Ratio autem primarum

rum est, quia aquositas illuminatur à lumine continetis propter propinquitatem. Vnde visio aspicientis potest penetrare per ipsam, usque ad uueam, & propterea apparet coloris nigri, nam quandoque nigrum ponitur sub diaphano apparet diaphanum coloris nigri. Secunda ratio est, quia radij penetrantes per ipsam usque ad uueam reflectuntur ab uuea ad aquositatem, & propter distantiam aquositas ab uuea radij reflexi sunt rectiores & magis nigredinem uuee representantes. Si uero aquositas continetur inter tertium & quartum corticem, tunc non posset sufficienter illuminari à lumine continetis, neque visio aspicientis posset per ipsam penetrare ad uueam, quapropter apparebit sub colore suo, scilicet albo & non apparebit diaphana, & etiam quia radij liqui penetrant usque ad uueam, postea reflexi non sunt recti propter propinquitatem, ipsa aquositas existente ex directo medij pupillae, quanto enim radij illi reflexi sunt breuius tanto sunt minus recti, & propterea minus representant nigredinem uueae. Et quanto sunt distantes sunt magis recti & melius ipsam representantes. Oppositum tamen accidit respectu ipsius aegri, nam illa quae est interior apparet sibi magis nigra & tenebrosa cum magis uisum impediatur, & minus illustratur à lumine continetis. E contrario exterior apparet magis alba, et minus tenebrosa propter causam oppositam. Et si quis quaereret quomodo distinguitur haec uesica, siue pustula nigra à pustula nigra respectu humoris melancholici. Dicendum quod nigredo confurgens merito sitis est cum luciditate & paruitate, sed confurgens merito humoris est nigredo propria terminans uisum non lucida ne diaphana.

Item dicendum de his pustulis cum pendent à cholea aut ab alijs humoribus, quae enim sunt magis extra apparent magis clare, quae uero magis intra magis opacae, semper tamen tendunt in colorem humoris ex quo generantur. Vlcera uero quae Auic. exiuras appellat, sunt septem specierum, & generantur secundum plurimum ab humoribus acutis aduulsis quatuor, in superficie corneae, & accidunt propter ipsa asperitas, cum palpebra comprimitur supra cornea. Prima, est ulcus simile fumo uel pulueri in colore, & tenue expansum occupans locum magnum. Secunda species est profundior, uehementius alba & minoris quantitas, & nominatur nubes propter similitudinem cum nube alba. Tertia dicitur corona, quia est super corona nigredinis, & quandoque occupat aliquid de albo coniunctiuo, & quod est super corona est album, & quod est super coniunctiuo est nigrum. Quarta species nominatur lanosa, existens in superficie corneae, ac si lana pauca esset super ipsa. Tres aliae sunt profundae, quarum una nominatur anulus, submersam habens profunditatem, & est ulcus profundum, strictum mundum, propterea nominatur anulus ad similitudinem gemmae anuli, & petatur ungula, & est minoris profunditatis & latioris occupationis. Tertia est ulcus, quod nominatur adustum, mundificatione est timor, Et etiam si non mundificatur est timor, quia humiditas currit per corrosionem panniculorum, & corrumpitur cum ea oculus. Item ulcera & pustulae distinguuntur, nam quaedam

sunt in coniunctiua, & sunt minus mala, quaedam sunt in cornea, & sunt deteriora. Et deterius ex illis quae sunt in cornea, est factum ex directo pupillae.

Causae pustularum sunt quatuor humores iam dicti & quaecunque possunt illos humores mouere ad oculos siue sint causae primitivae, siue corporae. Causae uero ulcerum sunt aut ophthalmia aut pustulae corneae, de quibus sermo praecedens, ipsis enim eruptis succedunt ulcera. Et quandoque generantur à causis primitiuis, sicut gladio & similibus casu & offensione. Aliquando sunt ab humore paulatim superficie corrodente, & etiam lachrymae acutae diu continuatae possunt hoc facere. Et nota quod pustulae quandoque rumpuntur exterius & sanies fluit extra, quandoque rumpuntur interius & sanies continetur retro cornea & similitur ungulae, est enim sicut quaedam lunula.

Signa pustularum sunt ea, quae dicta sunt in textu scilicet fortis dolor propter membri sensibilitatem, punctio nocua propter acuitatem & mordicationem humoris, aut pustulae ruptionem & pulsus siue dolor pulsatiuus propter uehementem caliditatem, unde arteriae coniunctivae pulsantur amplius solito. Et multitudo lachrymarum cum multa aquositate ad oculum deriuata, tam propter dolorem quam propter caliditatem. Quintum signum per quod locus ulceris distinguitur est, quia scilicet si pustulae uel ulcera sunt in albis oculorum loca illa apparent rubea. Et si totum fuerit rubeum locus ulceris uel exiturae apparebit magis rubeus, sed in nigredine oculi locus ulceratus uel pustulatus apparebit albus. Ratio primi est duplex dicta superius. Vna quia in coniunctiua sunt multae uenulae, & propter dolorem ulceris & calidum multum ex sanguine & spiritu attrahitur ad coniunctiuam & magis ad locum laesum, & propterea rubet sicut facies sanguine ad ipsam attracto. Secunda causa est quia in coniunctiua alba omnis rubedo est ualde manifesta. Causa autem quod apparet albedo in cornea est, aut propter saniem ibidem existentem albam, aut si sit ulcus sine sanie ac subingrediens representat colorem album, sicut subingrediens cornu in frusta diuisum. Tertia causa, quia per pustulam & ulcera perditur diaphanitas corneae, & quia color magis conformis diaphaneitati est albedo, color apparet albus diaphaneitate in albedinem conuersa, sicut uidemus aquam diaphanam per congelationem effici albam & uisum terminare. Est enim color extremitas perspicui terminati corporis per opacum. Caetera quae in hac parte dicit Rasis theoricè sunt nota. Dicit tamen in parte ultima huius partis theoricè, quod ulcus existens sub pupilla ex directo pupillae, uel etiam parum infra pupillam est deterius caeteris, cum ad ipsum uelocius sequatur eminentia, id est, exitus uueae. His addas sextum signum, scilicet, quod qui habet ulcera aut pustulas in cornea, & proprie calidas non potest tollere lumen, tum scilicet, quia lumen calefacit, tum quia spiritus & sanguinem trahit ad locum unde fit maior inflammatio & dolor propter motum humoris & spiritus ad locum. Et tertia causa est, quia in ulcere lumen penetrat ad crystallodenum non debite mundificatur per ulcus in cornea, quapropter non potest ipsum sustinere.

Prognostica. Primum. Pustula aut ulcus profundum in cornea ducit ad caecitatem aut aliquod uesti-

gium album derelinquit, scilicet, cicatricem quæ non est diaphana cum sit restaurata per uiam secundæ intentionis. Secundum, Pustula uel ulcus cancerosum secundum plurimum est incurabile ducens ad destructionem oculi, & est magis dolorosum in oculo, quam in alia parte nostri corporis. Tertium, Secundum plurimum deterior est ruptio ad interiora, quam ad exteriora oculi, licet eruptio utrinque sit cæteris deterior.

Horum autem ulcerum curâ cum phlebotomia incipere debemus, & sanguinis extrahere multitudinem secundum quod possibile fuerit. Consequenter autem uenter soluendus est. Et æger sibi cauere debet à carne & uino dulci. Et esse contentus herbis frigidis, & in potu sola aqua uti. In oculo uero in initio sies album cum lacte muliebris est mittendum, & si pulsus iam eleuari et sedari uidetur, sperandum est quod ægritudo soluetur sine saniei collectione. Quod si pulsus post sanguinis extractionem & uentris solutionem ac sies albi immisionem quiescere non uidetur, parua fiducia in hoc quod diximus, est habenda. Est itaque tunc sies de olibano mittendū in oculo, et pila aliqua oculo superponenda & cū ligatura stringenda. Ante uero quod hoc eueniat, oculus suauiter effligandus & sine superpositione pilæ. Et non cesses in oculum sies de thure sæpe distillare donec sanies in pilâ uideatur.

Hic ponit curam pustularum & ulcerum corneæ. Et diuiditur hæc pars in duas partes. In prima parte ponit regimen uniuersale curationis istorum. In secunda ibi. In oculo uero. Ponit regimen particulare. De prima dicit esse inchoandum curâ cum phlebotomia extrahendo sanguinem secundum conditionem patientis. Secundò, æger soluendus est cum medicina leniente frigida descripta superius in capite de ophthalmia. Tertio regatur æger cauendo se à carne & uino & propriè dulci, sed sit contentus herbis frigidis sicut portulaca, endiuiâ, lactuca, cucurbita, & solum aquam bibat. In oculo uero, hic ponit regimen particulare, & diuiditur in quinque partes, in prima parte ponit curam istarum pustularum usque ad statum. In secunda ibi. Quod si pulsus. Ponit curam ipsarum in statu usquequo rumpantur. In tertia ibi. Ex quo uisum fuerit, ponit curam ulcerum remanentium post rupturam pustularum. In quarta ibi. Cum autem caro, &c. ponit curationem albedinis remanentis post curationem ulcerum. In quinta parte ibi. Sies de thure. Ponit descriptionem quatuor collyriorum complementum intentiones suprascriptas. De prima

parte dicit, quod in principio sies album distemperatum cū lacte mulieris est ponendū in oculo, & si per huiusmodi impositionem simul cum remedijs uniuersalibus dolor pulsatiuus alleuiari & sedari uidetur, sperandum est quod ægritudo soluetur sine collectione saniei. Quod si dolor pulsatiuus post remedia suprascripta, non quiescat, parua fiducia habenda est, quod ægritudo soluetur sine collectione saniei, imò credendum est perseverante dolore pulsatiuo saniem colligi, & propterea est accelerandum ad maturationem, & sies de olibano est ponendum in oculo, & pila aliqua sicut faldella ex cottō est superponenda oculo, & cum ligatura stringenda, quæ omnia fiunt ne cornea rumpatur, & humores & uuea exeant.

Si uero non timeremus ruptionem corneæ non esset necessarium pilam oculo superponere & stringere, continetur ergo sies de thure donec pustula rupta & sanies in pilam superposita uideatur.

Ex quo enim hoc uisum fuerit, sies de plumbo uti necesse est usquequo profunditas fiat plana & tota caro generetur, ea tamen, quæ diximus, tunc sunt facienda cum pustula non est magna. Quoniam cum magna fuerit, fueritque iuxta pupillam, aut inferius ea, est tunc necesse ut cum elisir medicetur, ne oculus emineat. Ad pilæ quoque superpositionem & ligaturam est redeundum. Aeger præterea semper supinus iacere debet, & a forti motu abstinere.

Docet curare ulcera remanentia post rupturam ponendo in oculo sies de plumbo usquequo profunditas fiat plana, & tota caro generetur. Et subdit, quod hæc faciendæ sunt cum pustula non est magna, ipsa enim existente magna propriè iuxta pupillam aut infra eam, ita ut manifestè timeamus de exitu uueæ & humorum, tunc est necesse, ut cum sies elisir posito in oculo medicetur, ne oculus emineat rupta cornea & egrediente uuea. Et in hoc casu debemus pilam superponere & ligare, & æger debet iacere supinus, & abstinere a forti motu, imò etiam à locutione. Isto autem sies elisir utimur ad alteram duarum intentionum, aut sanie emanante ad prohibendum ne ulcus corrodat & amplificetur. Est enim frigidum, siccum, & stipticum. Aut eo utimur ante ruptionem pustulæ ad faciendum eam rumpi interius, ne oculus deformetur, & sanies interius collecta in processu poterit resolui, aut cum operatione manuali extrahi sciendū do in parte inferiori, ubi scilicet, collecta fuerit, sicut dicitur in curatione cataractarum.

Cum autem caro in loco uulnerum perfectè generata fuerit, uel locus apostematis carne repletus fuerit, remanebit ibi in oculo albedo. Quod si sulcus profundus fuerit, albedo est crassa, & si in superficie tantum carnis

carnis fuerit, erit subtilis. Vlcus quoque si à pupilla fuerit remotum, & steterit se paratim per se uestigium, illud quod remanet nihil mali faciet. Si autem iuxta pupilam quandoq; fuerit post ulceris curationem uestigium remanens, prohibebit uisionem. Quapropter tunc utendū est rebus et medicinis, quibus uestigium quod diximus abstergi & deleri possit.

Docet curare albedinem post consolidationem ulcerum remanentem, quæ aliquando est crassa & profunda, aliquando superficialis secundum quod ulcus est profundum aut superficiale. Et hoc aliquando non impedit uisum si non fuerit ex directo pupillæ, & aliquando impedit si fuerit ex directo, quapropter utendum est medicinis, quibus uestigium illud possit abstergi & deleri, de his autem dicitur inferius in capite de albedine oculi.

Sies de thure. Recipe ammoniaci, sarcocollæ amborū. ana. drach. 5. tuhris, drach. 10. croci, drach. 2. conficiantur ex mucilagine fœnugr. & fiet ex eis sies. Sies de plumbo. Rec. plumbi usti, antimonij, thutiæ ablutæ, calce caumenon, gummi Arabici, dragag. omnium. ana. drach. 8. opij, drach. 5. terantur, et cum panno serico, qui sit subtilissimus cernantur & cribellantur, & conspergantur ex aqua pluuiali, & fiet ex eis sies. Sies ex quo caro in ulceribus oculorum generatur, & uicæ egressio prohibetur, & uestigium subtiliatur. Rec. cadmiæ ablutæ, thutiæ ablutæ, cerusæ, antimonij, thuris omnium. ana. drach. 2. myrrhæ drach. 1. sarcocollæ crassæ, drach. 1. & 5. sang. dracon. aloes, opij, ana. drach. 1. fiat ex eis sies. Elisir quo est utendum cum timetur ne ex ulcere uicæ sequatur egressio. Rec. antimonij, hæmatitis amborum, ana. drach. 10. acatiæ, drach. 3. aloes drach. 1. terantur, & fiant ex eis sies, & administrantur apud necessitatem.

Hic describit quatuor sies, complètia quatuor intentiones suprascriptas. Primum est sies de thure maturo pustulas, & ammoniaci cal. in tertio, sic. in primo maturatiui & resolutui sarcocollæ, ana. 3. 5. thuris cal. & sic. in primo, 3. 10. croci 3. 2. conficiatur sies

cum mucilagine, fœnigræci, extrahendo secundum doctrinam Seruitoris. Secundum est sies de plumbo carnem generans in ulceribus mundificans & sigillans. 3. plumbi usti frigidi & humidi maximè correctiui ulcerum malignorū, antimonij frigidi in primo sic. in secundo, thutiæ ablutæ frig. in primo sic. in secundo aeris usti calidi in secundo sic. in tertio absterfui. gummi arabici, dragaganti omnium, ana. 3. 8. opij 3. 5. terantur & ramificentur & conspergantur aqua pluuiali, quæ est magis subtilis & absterfuiua. Deinde ponit aliud sies, ex quo caro in ulceribus generatur, & prohibet egressionem uicæ & uestigium subtiliat. 3. cadmiæ ablutæ, quæ est fuligo adhærens parietib. superioribus fornacis, in cuiuscunq; metalli purificatione, & est diuersæ complexionis secundum diuersitatem metallorum, thutiæ, cerusæ, antimonij, thuris, ana. 3. 2. myrrhæ, 3. 1. sarcocollæ crassæ, 3. 1. 5. sang. dracon. qui est frig. & sic. constrictiui, prohibens fluxum, conglutinans ulcera & plagas recentes, aloes, opij, añ. 3. 1. fiat ex eis sies. Sies elisir quo utendum est, cum timetur ne ex ulcere sequatur egressio uicæ, 3. antimonij, lapidis hæmatitis frig. in secundo, sic. in tertio, & ualet multum in ulceribus oculi. Et habet proprietatem mirabilem ad gomorheā, & debet esse lotus añ. 3. 10. acatiæ, 3. 1. sed nos non habemus acatiam, quæ sit de succo arboris, cuius gummi est dragagantum, sed loco illius utimur succo prunellorum, aloes, 3. 1. fiant ex eis sies cum albumine oui: nam hoc sies est frigidum, siccum, stipticum, consolidatiuum.

Triplex est harum pustularum regimen curatiuum, sicut dictum fuit in ophthalmia. Primum est uniuersale respiciens causam antecedentē. Secundum est particulare respiciens magis coniunctam. Tertium est commune utriq;. Regimen uniuersale quinq; perficitur intentionibus curatiuis. Prima est minoratio. secunda digestio. tertia eradicatio. quarta diuersio. & quinta fluxus interceptio. Et hæc omnes perficiuntur cum phlebotomijs, euacuationibus, digestionibus, diuersionibus, & fluxus interceptionibus, sicut dictum fuit. In ophthalmia à simili causa proveniente sola est differētia, quia rarius oportet interciperi fluxum cum percussiois fronti & temporibus applictis, & cum sectione uenarum & artiarum in pustulis corneæ, q̄ in ophthalmia, cuius causa est, quia materiæ fluentes ad coniunctiuam frequentius fluunt per uenas & arterias extrinsecas, quàm per intrinsecas, eo quod coniunctiua oritur ab almo chati. E contra uero cornea à dura matre quæ sub craneo est, quare materię frequentius fluunt ad ipsam per interiora, quàm per exteriora saltem in comparatione ad coniunctiuam. Attamen ubi in utraq; necessariū sit interciperi fluxum cum eisdem remedijs est illud faciendum, &c.

Secundum uero regimen exigit tres intentiones curatiuas, sicut dictum fuit in ophthalmia, scilicet, repulsionem in principio, repulsionem cum resolutione in augmento usq; ad medium status gradatim augendo resolutionem, à medio status deinceps resolutionem puram, si pustulæ tendat in uiam resolutionis, & hæc eisdem remedijs ferè complendæ sunt, nisi quod magis sedatiua doloris & stupefacientia sunt necessaria in pustulis corneæ, quàm ophthalmiæ propter doloris magnitudinem. Veruntamen est differentia, quia pustulæ corneæ frequentius maturantur, q̄

ophthalmia, eo quod cornea est magis densa, & minus habens de caliditate innata, & etiam quia inter cortices eius facilius materia colligitur. Et propterea in principio pustularum indigemus repercussiuus secundum plurimum magis frig. & stupefacientibus, & dolorem sedantibus sicut lacte cum aqua pa. aut sicut siefalbo cum opio, siue sarcocolla cum lacte: in augmento uero addatur sarcoc. Et si dolor & pulsatio, & cetera accidentia uideantur remitti, tunc sperandum est pustulam per uiam resolutionis terminari. Si uero pulsatio & reliqua accidentia augeantur, suspicandum est de maturatione. Et propterea iuber Rasis, tunc apponi sief de thure, sed quia hoc est nimis cal. laudo, ut in primis incipias cum magis domesticis, sicut cum mucilagine sem. cit. aut sem. lini. aut foenugr. cum siefalbo, & postea uenias ad sief de thure cum lacte, quod tanto tempore continuetur, donec pustula rupta fuerit, & sanies in pila uideatur. Et si illa pila siue faldella esset infusa in lacte, aut in aliqua decoctione maturatiua, sicut sem. citoniorum, sem. lini, aut foenugr. cum pauca aqua ros. esset praestantius. Hoc autem fit ut per illam compressionem conseruetur cornea ne disrumpatur, & hic etiam modus esset obseruandus in ophthalmia, si ophthalmia aliquando maturaretur. Rupta uero exitura intentio remanet ad ulcus triplex, scilicet, mundificatio, carnis generatio, & consolidatio. Prima perficitur cum aqua decoctionis mellis ros. aut aqua sacch. aut cum sief de plumbo cum lacte permixto: habet enim uirtutem mundificatiuam, & est ceteris praestantius.

Secunda intentio perficitur cum eodem, & aqua rubi, idem etiam sigillatione perficit, sed magis proprium in sigillando est sief elisir. Dicit tamen Rasis, quod si pustula est magna uel ulcus magnum, loco sief de plumbo ponamus sief elisir, quod intelligi potest, ut dixi circa tex. & ante maturationem ut sanies fluat interius, ne tunc cornea disrumpatur, quod maxime uerum est, ubi pustula illa esset profunda, scilicet inter tertium & quartum corticem, possit etiam intelligi, ut administraretur sief elisir in ulcere magno & proprie corrosiuo ad prohibendum corrosionem, est enim frigidum & siccum & stipticum. Et in his casibus semper debet fieri compressio cum pila, sed cum curantur ulcera sit infusa in aqua ros. Eresto memor nunc super oculum apponere aliquod tenax, ne in remouendo dolorem faciat. Si uero uulnus esset recens, factum a causa primitiua, prima intentio esset phlebotomia. Et si alius humor superabundaret in corpore educatur, & maxime cum medicina leniente. Secunda intentio est prohibitio discursus materierum ad oculos cum repercussiuus superius dictis fronti & temporibus applicitis. Tertia est administratio intentionis circa uulnus. In principio ponatur aqua albuminis oui in oculo, & die sequenti aqua albuminis oui cum sief albo, & ita continuetur usque ad quartum. Et deinceps addatur istis sief de plumbo pro tertia parte & gradatim minuatur sief album, & augeatur sief de plumbo donec sief de plumbo solum ponatur, & postea ad cicatrizandum ponatur sief elisir. Si autem timeremus egressum uuae, statim apponamus sief elisir cum albumine oui, & semper pila in aqua ros. infusa est super oculo comprimenda. Tertium regimen commune utrique perficitur duabus

intentionibus, scilicet correctione accidentium et debito regimine uitae. Accidentia uero corrigenda sunt tria, scilicet, dolor, aut cum remouentibus superius dictis, aut cum anodinis fomentando oculum lacte & oleo ros. tepidis, aut cum stupefacientibus tam interius quam exterius applicitis. Secundum est instantia uigiliarum curanda cum stupefacientibus interius & exterius applicitis. Vnde omni nocte uadit dormitum datur 3. 2. syr. de papauer. cum hoc enim quod digerit materias subtiles cal. etiam somnum inducit. Et si non sufficeret datur a 3. s. ad 1. requies descriptione Nicolai, aut aliqua pilula opiata, aut lac sem. papauer. ponatur inferculis. Regimen uero perficitur cum aere, cibo & potu, sicut dictum est superius, & dieta debet esse subtilior, quam in ophthalmia, & magis frigida actu & potentia. Et reliquum regimen obseruetur nisi quod hic opus est pluri somno, maiori quiete animi & corporis. Si uero pustula esset aquosa post uniuersalia & euacuationem sibi propriam cum turbith non confortato, scilicet aut eius infusione in aqua foeniculi est necessarium procedere cum his, quae illam humiditatem exiccant, sicut medicamine deluto comparato ad saniem, loco cuius utimur luto sigillato, & luti sigil. & torrefacti 3. 3. thutiae praeparatae, 3. 1. cadmia lotae, & antimonij abluti, ana. 3. 2. scoriae aeris ablutae, 3. 3. opij si dolor fuerit, 3. 3. gummi 3. 4. terantur cum aqua pluuiali, & fiat ex eis sief, & administretur cum aqua foenugr. aut foeniculi, & quando multiplicatur curetur cum ferro faciendo foramen paruum in parte inferiori, & eodem modo & cum eisdem medicinis extrahatur sanies contenta sub cornea. Verum de hoc latius, ubi de cura cataractarum. Si uero appareret bothor sanguineum in cupum aliquantulum eleuatum post uniuersalia distilletur in oculo frequenter lac, postea sanguis columbae aut turturis calidus sicut exit a uena, & pomum coctum cum aqua ros. permixtum super oculo applicetur, & aliquantulum comprimat. Si uero fuerit pustula cancerosa tunc post uniuersalia intentio est sedatio doloris cum sief, scilicet, albo opiato, & lacte mulieris, & emplastrum factum ex uisello oui, & oleo ros. exterius applicitum est conueniens.

Intendatur ergo sedationi doloris, modis superius dictis. uera autem cura non est possibilis & potius laetis laudatur in ea, similiter euacuatio cum sero capri no in quo sit senae & epithimum. Verum forte esset praestantius oculum euellere cum non uideatur cura possibilis, fortasse enim (sicut aliquando uidi) cancer per partem post partem communicabitur cerebro, & sequetur mors, & propterea melius esset oculum euellere, & finire multum sanguinem egredi & deinde locum cauterizare cum cauterio actuali.

DE HIS QUAE IN OCULIS CADUNT
dunt Cap. XX.

Sumat resina, id est, gummia pini, & sper oculum trabatur, & extrahit illud quod in oculo cecidit.

Circa istam rubricam nota, quod ea quae in oculis cadunt si ad placitum remoueri possunt, non sunt dicenda

cenda ægritudines, licet etiam uisum impediunt, aliter sequeretur quod compedes essent ægritudo, & quod induritus uestes graues esset æger: sunt enim hi in operationibus sensibilibus impediti. Si uero illud quod cecidit in oculo non sit ad placitum remouibile, quia forte fixum in oculo aut in palpebra, si impediatur operatio est morbus, aut in numero, aut in uia, si impediatur delationem specierum ad crystalloidem, aut saltem est causa opilationis, quæ est morbus in uia. Verum hæc fuit differentia inter Gal. & Auic. quia Gal. uoluit quod nihil debeat dici sanitas aut ægritudo si pendat à causa primitiua. Auic. uero uoluit omnem dispositionem immediate nocentem operationibus aut ipsas perficientem esse dicendam ægritudinem aut sanitatem siue pendeat à causa primitiua, siue non, dummodo sit in aliqua naturarum, scilicet compositione, compositione aut unitate. Mihi tamen magis placet opinio Auic. Et secundum nullum istorum authorum id quod cadit in oculo ad placitum remouibile est dicendum ægritudo. Si autem non potest ad placitum remoueri, quia fixum & incarnatum, et sensibilibus læderet operationes secundum utrumque istorum est dicendum ægritudo. Pro cura aduerte quod multiplex est modus extrahendi id quod cecidit in oculo. Primus si fuerit illud sub palpebra superiori aut inferiori trahatur cum una manu palpebra superior inferior notabiliter capiendū ipsam cum digitis in extremitate sua. Et similiter trahatur cum alia manu eodem tempore palpebra inferior inferior, & præcipiatur ægro ut uoluat oculum ad superiora, & subito quod cecidit in oculo exhibet. Si autem prima uice non conseruatur effectum experientis secunda uice & tertia, & hic modus est leuissimus omnium. Secundus modus est, ut impleas os tuum aqua aut lacte & dilatata palpebra quantum fieri potest insufflet aqua aut lac cum uelocitate in oculum. Istud etiam aptius fit per catathir, siue infectoriū. Tertius multoties dilata ta palpebra, ab ubere lac in oculū inijciat. Et isti modus utiles sunt quando aliquid acutum sicut sal ammoniacus, aut argentum sublimatum, aut similia ceciderint in oculum. Quartus contineatur anhelitus ob turando os & nares, donec oculi lachrymentur, & ex bit cum lachrymis quicquid in oculo continetur. Quintus inuerferur palpebra & in extremitate stili ponatur resina, aut terbenchina, aut uiscus, & tangatur quod cecidit in oculo, & extrahatur. Sextus fricetur carabe super panno, donec uehementer calefiat & uicinetur illi quod cecidit in oculo & adhærebit ipsi. Attrahit enim festuca sicut magnes ferrum. Septimus si illud sit infixum in oculo aut palpebra eum molletis dentatis, aut tenacula acuta dentata extrahatur. Et ex his patet litera textus.

DE ALBEDINE OCULORVM
Cap. XXI.

NOta quod albedo, albula, nubes nebula, albugo, rela, pannus aliquando accipiuntur ut termini synonymi significantes hanc dispositionem quæ diffinitiuè est uestigium apparens in superficie corneæ secundum plurimum tendens in albedinem. Verum apud aliquos diuersa important, ut apud Auic. nebula importat uestigium magis superficialiale, albugo magis crassum, sed de his non est cu

randum. Sunt tamen hæc nomina sumpta à rebus, quibus hæc passio assimilatur. Verum Rasis solummodo loquitur de albedine, quæ est cicatrix ex ulcere derelicta: est autem hæc albedo si sit coram pupilla uisum impediens, morbus in uia. Si uero sit concava aut eleuata, & lædat per illud, posset dici morbus in superficie & in situ. Si autem lædat per colorem, ut quia faciat obiecta apparere citrina, aut alterius coloris cuius non sunt reducitur secundum aliquos ad morbum in complexionem, sed secundum ueriores sententiam reducitur ad morbum in colore. Si uero non lædat per colorem suum, aut quia non sit ex directo pupillæ nec aliter lædat, tunc non est ægritudo: est tamen de his, quæ cum ægritudinibus nominantur 2. primi. doctrina prima capite sexto.

ALbedo quæ in oculis contingit est uestigium post ulcerum curationem remanens quando consolidantur.

Hoc caput diuiditur in duas partes. In prima agit de albedine oculi theor. In secunda ibi. Hæc autem passio, &c. Agit de ipsa practice, prima in duas. Primo ponit ipsius diffinitionem & causam. In secunda ibi. Quæ cum in oculis, &c. innuit species eius. De prima parte dicit, quod albedo in oculis contingens est uestigium remanens post ulcerum consolidationem, cuius causa est, quia illud quod generatur loco illius quod deperditum est ex ulcere, generatur per uiam secundæ intentionis ex nutrimento, quapropter non est omogeneum primo, cum primum deperditum fuerit membrum spermaticum, quod non potest restaurari, sicut prius, propter carentiam materiæ spermaticæ à principio generationis contractæ. Verum in infantibus propter propinquitatem temporis principis generationis, si parua sit facta deperditio & superficialis potest restaurari per uiam primæ intentionis omnino primo similideperdito, ad quod etiam concurrunt quod uirtutes naturales sunt fortiores in infantibus, quæ in adultis potest melius assimilare nutrimentum secundum naturam eius cui apponitur.

Quæ cum in oculis puerorū fit, leuior est ad curandum quæ cum accidit annosis. Cum enim in annosis fit, ad sanandum fortasse impossibile existit, nisi subtilissima fuerit.

In hac secunda parte innuit quod quæ generatur in oculis puerorum, est leuior ad curandum, quæ cum accidit annosis, imò forsitan in eis cura est impossibilis nisi albedo subtilissima fuerit, huius causa patet ex iam dictis. Species albedinis sunt tres, quædam est scilicet cicatrix ex ulcere derelicta, quædam est uestigium ex humore imphiltrato in superficie oculi, quædam est uestigium ex defectu uirtutis assimilatiuæ proueniens, sicut albaras & morphaea. Et cuiuslibet istarum specierum, quædam est crassa, profunda, quædam superficialis. Quædam magna occupans magnam partem, quædam parua, & quædam noua quædam antiqua. Cicatricum uero quædam concava, quædam eleuata. Secundæ & tertiæ speciei, quædam alba & est phlegmat, quædam tendens in uiridi

tatem uel citrinitatē, & est cholericā, quādam in rubedinem & est sanguinea, quādam in fuscum & est melancholica, sed ut plurimum sunt albę, etiam si tēdant in alium colorem. Ex his parent causę ipsarum.

Signa uerō ipsarum absolute sumuntur ex uisu. Signa uerō cicatricis sunt. Primum, quia aliquando est concava, ceterę autem albedines non sunt concavę. Secundum signum cicatricis est ulcus præcedens, & omnia signa ulceris & pustularum ruptarum dicta superius. Tertium signum, quia frequenter non bene tolerat lumen. Quartum signum est paruum iuuamentum à medicinis. Secundę uerō speciei sunt signa opposita, licet alię ægitudines præcesserint, & non ulcera. Signa uerō tertię speciei sunt, quia illa uestigia facta, sunt signa manifesta sine manifesta ægitudine præcedente, uel fuerunt à generatione contracta, & hoc secundum plurimum.

Prognostica. Primum, cicatrix in pueris etiam mediocris quandoq; remouetur, in annosis uerō nō nisi ualde superficialis & minima. Secundum, cum secunda species albedinis etiam crassa in infantibus facile remouetur, sed in annosis si crassa fuerit, & antiqua nō remouet, nisi fortē cum operatione manuali perficienda secundum quod dicitur in sequentibus: in medijs autem iudicia media sunt habenda. Tertia species non est curabilis, licet fortē paliabilis.

Hęc autem passio ex his medicaminibus curanda est, postquam æger balneum egressus fuerit, aut faciem super uaporem aquę cal. quousq; rubea sit tenuerit. Si tamen ex hoc medicamine in uenis rubedo oculi & dolor peruenierint per aliquot dies ab eo quiescendum donec oculus quiescat, & post ad idem redeundum. Medicamen ualde utile ad albedinē remouendam & uisum clarificandum, ego quoq; non uidi quod eo melius aut æquale esset ad albedinem remouendam. Rec. massacumia, spumę maris, stercoris magni lacerti, baurach. sacchari bigeri omnium, ana. partes æquales, deinde sumantur acori, chelidonię, foeniculi omnium, ana. partes 10. coquantur in lib. 1. aquę donec ad quartam redeat et coletur, ex hac aqua imbibantur species, quas diximus, ita quod conficiantur ex ea, & siccentur in umbra, deinde iterum terantur & cōspergantur ut prius & siccentur. Quod postquam quater factum fuerit siccentur & terantur & in oculis mittantur. Hoc medicamen nulli, ut prædiximus, compar existit in re-

motione albedinis: remouet enim hoc medicamen crassam albedinem, etiam ex oculis animalium.

Hęc pars diuiditur in partes duas, nam in prima parte ponit primā intentionē, quę est albedinis mollificatio. In secunda parte ibi. Si tamen ex hoc medicamine. Ponit secundam intentionem, quę est ipsius absterfio. De prima parte dicit, quod eger primō debet in balneum poni, aut teneat faciē super uaporem calidum, aquę calidę usquequo rubea sit ad hoc, ut albedo mollificetur. De secunda parte dicit, quod si ex hoc medicamine, de quo dicitur, posito in oculo immediatē post albedinis mollificationē rubedo fiat in oculo, & dolor proueniat per aliquot dies ab hoc medicamine quiescendum est, donec oculus ad naturalem redeat dispositionem. Deinde secundo, idem medicamen est imponendum præcedente prius mollificatione, ut dictum est, & sic est procedendum, nunc ponendum medicamen, nunc interponendo mollificationē, donec albedo cōsumpta sit. Deinde describit istud medicamen, quod summis laudibus extollit, quod medicamen Rasis accipit à Gal. in lib. secretorum, 12. massa cumiæ. & Simonia. credit quod sit uitrum nō perfectē decoctum. Alij credunt quod sit compositio quādam, qua uasa terrea uitreantur, scilicet, facta ex uitro filice & plumbo, licet aliqui solum componant ipsum ex plumbo se habente in proportionē dupla selquialtera ad filicē, id est lapidem à quo excutitur ignis, uitrum enim secundum Auic. cap. proprio, ualeat ad delendas albugines, & dicit ibi quod est inter lapides, sicut stultus inter homines: nam sicut stultus, placidus, est obsequens alijs hominib; sic uitrum est obsequens recipiens quidem colorē cuiuscūq; quod secum commiscetur, spumę maris cal. & sic. in tertio absterfuit uehementer, stercoris stellionis uel diab; quod est multū ualens in cataracta & baurach, loco cuius accipimus sal, nitrum, sacchari albisimi, ana. partes æquales, & deinde sumatur acori cal. & sic. in secundo, chelidonię cal. & sic. in tertio, foeniculi cal. & sic. in secundo, ana. 3. 10. & istę tres sunt medicinę oculares absterfuię. Coquantur in 1. lb. aquę & colentur, in qua aqua imbibant species prædictę, deinde siccentur in umbra, & iterum terantur & cōspergantur eadem aqua, ut prius & exiccantur, quod postea factum fuerit quater siccentur & terantur subtilissimē, & in oculum mittantur: delet enim non solum albuginem homini, sed albug. crassam brutorum.

Cura duplex exigit regimen. Vnum generale habendum circa causam antecedentem si adsit sicut in albugine pendente ab humore: si uerō nō adsit, caueatur tamen fluxus humorum in paratis ad hoc, quod regimen perficitur digestionē, euacuationē, diuersionē secundum humorū exigentiam, & aliquando fluxus interceptione cum superius dictis in cura ophthalmiæ. Secundum regimen respiciens ipsam ægitudinem iam factam duabus perficitur intentionibus.

Prima mollificat ipsam albuginem, & oculi substantiam teneram facit cum balneo in aqua dulci toti corpori, aut cum inclinatione faciē super aquam decoctionis raparum, aut paleę hordei, aut paleę aue nę, aut foenic. uerbenę, rutę, chelidonię, & huiusmodi. Secunda

di. Secunda intentio est post suffumigium immedia-
te apponere aliquod absterfium & subtriliatiū inci-
piendo à leuiorib. sicut sacch. al. candid. aqua distilla-
tionis mellis, aut puluis factus ex candid. sarcocol. &
spuma mar. aut cum osse sepia, aut cum urina pueri
coagulata in furno in uase aeneo aut cum stercore hi-
rundinis, & est satis forte. Auic. commendat succum
centauræ min. cum succo pap. ruffi mixto cum pau-
co melle, & succus linguae palseris est proprius, & est
herba cum qua hirundines recuperant uisum. Vel r.
stercoris hirundinum subtilissimè pulueriz. 3. i. mel-
lis quod sufficit ad incorporandū, misceantur, & di-
stemperentur cum aqua acori uel euphragiae, & fiat
collirium. Secretum Gerardi. Recipe aqua rorif-
ma. quæ fit hoc modo, habeatur uitrum mundum
& impleatur floribus rorifm. & fortiter obturetur &
ponatur sub terra in dieb. magni æstus per 4. o. dies, et
aqua quæ inueniet in oculo imponatur. Vltimum
est medicamen Ras. supra scriptum. Sed attende tria.
Primum quod incipias à leuiorib. deinde gradatim
procedas ad fortiora. Secundum documentū est, quan-
do experiris medicinas fortes, accipias stilumin cuius
extremitate sit cortū, & illud in funde in aliquo liquo-
re, deinde fac pilule rem adherere & superpone cum
filo solum loco ubi est albugo, & remoueas & reite-
res secundum quod tibi uidebitur expedire. Tertium
si rubedo aut dolor in oculo acciderit ex huiusmodi
acutorum impositione, desine per aliquot dies donec
oculus ad primā redeat sanitatem. Et si aliquo auxi-
lio opus sit, impone lac, deinde redi ad medicamē. Et
propterea cū utimur istis fortib. non esset malū appo-
nere frōti & temporib. aliquod defensiuū. Si uero cū
medicinis auferri nō potest, auferat operatiōe manua-
li, ut infra dicitur, aut si cura uera fieri nō potest cum
aliquo colore palietur albugo. Regimen aut sex rerū
non naturalium iam patere potest ex sæpius dictis.

DE SCABIE ET PRURITV OC-
VLORVM. Cap. XXI.

Primo agendum est de scabie. Secundo de sebel-
oculorum. Scabies & pruritus differunt, quia
pruritus est tristis sensatio, scilicet cum pūctio-
ne & acuitate in superficie intrinseca palpebræ. Scab-
ies uero est ægritudo in superficie cū asperitate & ru-
bedine, aut pustulis in superficie intrinseca palpebræ
cum pruritu. Vnde hoc modo pruritus est accidens,
quia actio læsa uirtutis sensitivæ, sed scabies propriè
est ægritudo in superficie intrinseca palpebræ cōno-
tando pruritum. Species scabiei secundum Auic.
sunt triplices. Prima est asperitas cū rubedine quam
secundum plurimū præcedit pruritus, & fit asperitas
propter excitationē superficiē palpebræ & rubedo
ex accensione sanguinis & aliorū humorū. Secunda
species est granulosa cum rubedine & asperitate alsim-
ilata granis intrinsecis ficus immaturæ, quæ tendūt
in rubedinē. Illæ aut pustulæ siue grana sunt facta ex
aliqua ulceratione. Tertia species est in qua sunt gra-
na dura cum uehementia scissiois & pauca rubedi-
ninantem, sed durities fit propter trassum terreum
derelictum partibus subtilioribus euaporantibus, &
propterea non est cū tanta rubedine, sicut prima &
secunda species, cum per adustionem tendat in fulce-

dinem. Sunt itaq; grana eius, sicut grana ficus sicca.
Verum Ioannes Serapion distinguit in quatuor spe-
cies. Prima nominatur dissutis, & eius intentio est
pruritus. Secunda curechatis, aliàs tracheris, & eius in-
tentio est asperitas. Tertia succesis, & eius intentio est
ficus. Quarta tulufis, & eius intentio est exiccatio du-
rities aut soliditas, & si bene cōsyderes non discrepat
ab Auic. Causæ coniunctæ sunt quatuor sanguis,
scilicet adustus, cholera adusta, phlegma falsum, aut
per adustionem transiens in melancholiā, & melan-
cholia adusta. A phlegmate uero & melancholia pu-
ris non generatur scabies aut pruritus cum oporteat
eorum materiā subtilitate quadam participare. Ve-
rum per putrefactionē uaporib. acutis eleuatis ad cur-
tim possēt fieri pruritus, secundum plurimum tamen
generant scabies & pruritus à materia mixta 7. quar-
ti, sicut materia sanguinea cui admisceat cholera adu-
sta, uel sub propria forma, uel per nimiam adustionē
in melancholiam uersa. Aliquando sanguini pmisce-
tur phlegma falsum, & baurachii & nominat scabies
humida respectu prioris, à qua fluit humiditas subtri-
lior, & paucior. Et si hoc phlegma falsum esset conuer-
sum in melancholiā, uel melanch. alterius generis cū
sanguine misceret, scabies esset sicciore, pauciore emit-
tens humiditatem. Dicit aut hoc phlegma nitrosum uel
baurachium ad similitudinē salis, niri et baurach quæ
inter genera salis sunt acuta, sicut illud inter phlegma-
ta. Causæ antecedentes sunt idem humores, cum non-
dum collecti sunt in loco. Et quæcunq; causæ corpo-
reæ sunt horum productiue. Causæ uero primiti-
uæ sunt omnia ex acuentia humores, & in huiusmodi
conuertibilia sicut falsa, acuta, amara, uehementer dul-
cia, oleaginea unctuosa, bibita & comesta. Scabies &
pruritus quandoq; sunt incipiendo, quandoq; per-
mutando maxime ex ophthalmia, pustulis & ulceri-
bus, licet ipsorum præsentia augeat & conseruet oph-
thalmiā & ulcera, sintq; ipsorum productiua. Pro-
declaratione istius materiæ tria sunt discutienda. Pri-
mum, ubi cōtineatur materia pruritus & scabiei. Se-
cundū est, utrū eadem sit materia pruritus & scabiei.
Et si differunt quæ sit crassior & acutior. Tertium
utrū pruritus semper præcedat scabiē. Quantum ad
primum præmittendum quod materia pruritus est
duplex, sicut scabiei, antecedens & coniuncta. Præmit-
tendū secundū, qd pruritus quādoq; est per essentiam
in membro, quandoq; per cōmunitatem siue per col-
ligatiam, sicut est de cæteris speciebus dolorū et delitiis.
Quibus præmissis dicendum. Prima conclusio. Cau-
sa coniuncta scabiei et pruritus secundum plurimum
est inter duas cutes, scilicet hymen & ueram cutem,
patet de pruritu, quia plurimum sedatur scalpore cu-
ius actio non profundatur. Patet hoc idem de scabie
cum pustulæ ipsius in cute contineantur. Secundū,
quia cura utriusq; perficitur per abstergentia & exic-
cantia in cute posita. Secunda conclusio, causa con-
iuncta pruritus non necessariō est in cute. Patet in
habentibus pruritum, in quibus pustulæ non appa-
rent, huiusmodi enim materia sub cute continet pun-
gens & stimulans superficiem intrinsecā, licet tamen
pruritus posset esse à solo uapore ad cutē perueniente
& hic facillimè paucō scalpore sedat. Tertia conclu-
sio, licet sit semper pruritus in scabie: non tamen ne-
cessariō materia faciens pustulas scabiei est pruritua.

Pater conclusio cum uideamus aliquando scabiosos non prurire secundum partem pustulosam, sed secundum superficiem cutis intrinsecā, quod provenit, aut ex uapore ad cutem delato, aut ex materia pruritua.

Quarta conclusio in pruritu tam per communiter absolutam, quam non absolutam materia pruritus in parte pruriente non continetur, quæ conclusio patet satis ex notitia terminorum. Est autem pruritus per communiter absolutam cum parti prurienti nihil corporeum communicatur. E contra per communiter non absolutam, quando aliquid corporeum parti prurienti communicatur sicut uapor.

Quinta conclusio, causa antecedens pruritus secundum plurimum est in uenis, & aliquando in uis medicis inter uenas & cutem, &c. Pro solutione secundi dubij nota primò, quod aliquis pruritus est intensus, aliquis est remissus, aliquis mediocris. Secundò nota, quod quanto pruritus est intensior tanto materia est calidior & subtilior aliorum paritate supposita ex parte sensibilitatis & ceterorum. Et e contrario quādo pruritus est remissior, materia est minus subtilis & acuta, patet, quanto materia pruritua est magis stimulatua, & impressiua, tūto est calidior & subtilior. Et contra quanto minus, tanto est grossior uel frigidior & aquosior, iuxta aphorismum non tū quin tæ particulæ. Latæ pustulæ non ualde pruriginosæ, &c. Contra, quia supposita paritate ex parte caliditatis quanto materia est crassior, est magis impressiua, & per consequens magis pruritua, patet, quia quāto est crassior, habet plus de multitudine forme, quam potentia rei insequitur, igitur, & confirmatur experientia, nam quanto cholera est crassior tanto profundat magis actionem suam, sicut cholera zinariā, unde 13. de ingenio sanitatis, si cholera fuerit crassa, & calidissima cutem excoriabit usque ad sui interiora, sicut accidit in formica miliari in comparatione ad heri spiliam. Ad hoc dicendum inhærendo sententiæ priori, quod quanto humor est crassior aliorum paritate supposita, tanto est impressiuior & actiuior. Sed dico secundò quod si cum humore crasso fuerit iuncta multa caliditas, faciet aliud genus doloris deterioris, quàm sit dolor pruritus. Et si instetur, ponamus quod quanto crassities plus imprimit, quàm subtilitas, tanto caliditas in humore crasso remittatur, & sequitur quod humor subtilis & crassus minus calidus æquè intensum facient pruritum. Credo concedendum esse illud ad quod deducitur. Cum hoc tamen concedendum est intentissimum gradum pruritus provenire ab humore subtili & non crasso, licet diuturnior & non facile per scalporem sedabilis proveniat ab humore crasso magis quàm subtili. Tertiò nota quod quidam pruritus scalpore sedatur, scilicet qui pender à materia subtili & paucā. Calescit enim membrum scalpendo, pori dilatantur, materia subtiliatur, unde facile exhalat. E contrario materia existente multa & crassa, non tota resoluitur. Et si forè tota cōiuncta etiam soluat, forè noua materia antecedens trafic in cōiunctam. Prima conclusio. Materia pruritus intensi citò per scalporem sedabilis est subtilior, materia scabiei remissi pruritus, & non facile per scalporem sedabilis. Secunda conclusio. Materia scabiei intensi pruritus facile sedabilis est subtilior, materia pruritus remissi non facile sedabilis. Tertia

cōclusio. Ex paucitate pruritus tam quò ad intensiorem, quàm quò ad durationem, materia pruritus arguitur, aliorum paritate supposita. Quarta conclusio. Non est necessarium materiam scabiei, & pruritus esse distinctarum specierum cum ab omnibus speciebus humoris adusti, de quibus supra posuit utraq; pendere. Quinta conclusio. Pruritus & scabies consequens ipsum, secundum plurimū ab eodem pendens humore, qui cum primò cuti applicatur facit pruritum, postea magis egrediens facit scabiem. Sexta conclusio, secundum plurimum materia pruritus quem non consequitur scabies, est subtilior, materia scabiei patet, quia secundum plurimum facile scalpore sedatur. Oppositum quandoq; contingit cum propter materię crassitatem nequeant exterius expelli. Causæ enim pruritus sine scabie sunt aut crassities materię aut nimia subtilitas: est enim uapor aut sicut uapor, aut densitas cutis, aut imbecillitas uirtutis sicut in senibus. Pro solutione tertij dubij pone duas conclusiones. Prima secundum plurimum pruritus præcedit scabiem, patet, quia materia scabiei secundum plurimum est pruriginosa, ergo in prima applicatione ad cutem facit pruritum, postea egrediens facit scabiem, cum quo tamen stat quòd multi sunt pruritus ad quos non sequitur scabies. Secunda conclusio, impossibile est scabiem præcedere pruritum, patet, cum scabies in quiditate sua includat pruritum. Corollarium scabies & pruritus quandoq; sunt simul tempore, patet, de pustulis quæ non sunt à materia pruriginosa quæ postea per adustionē baurachia facta & pruriginosa simul incipit facere scabiē & pruritū, id est, illæ pustulæ sunt scabies cū ante nō essent scabies.

Signa uerò scabiei & pruritus absolute sunt ex dictis manifesta, scilicet, ex rubore cum pruritu & asperitate, & sæpe infirmus scalpit palpebram, signa uerò specierum, de quibus supra, sunt ex dictis manifesta. In quo autem differat scabies à lepra est alibi uidentum, inter quas & si multæ sint differentie, hæc una est potissima, quia cum lepra, semper associatur defectus tertij actus uirtutis nutritiue, scilicet assimilationis, quod non est in scabie. Signa uerò causarum sunt, quia stetit à sanguine, est notabilis rubor purpureus sine pustulis aut satis diminutis intensus pruritus, & facile sedabilis, & si aliquid emanat illud est satis subtile. Et si est à cholera pruritus acutior & facile sedabilis, & rubedo tendit in citrinum, & pustulæ paruæ profundæ, & si quid egreditur est subtile citrinum. Signa uerò baurachiarum comprehenduntur ex rubedine tendente in albedinem. Et ex pustulis latioribus id quod egreditur est plurius quantitatatis tendens in albedinem: & pruritus est remissus non facile sedabilis. Melancholia uerò subtilis adusta comprehenditur ex rubore tendente in fuscedinem. Et ex asperitate magna cum pustulis profundis & aliquando crustis paruis, & quod egreditur tendit in fuscedinem. Complexio quoque, habitudo & tempus, ætas, ars, regio, regimen præcedens, sunt quoq; coadiuvantes in cognoscendo huiusmodi dispositionum causas.

Prognostica. Pruritus & scabies primæ speciei est cum medicinis curabilis, quæ uerò est tertiæ speciei, non est curabilis nisi cum operatione manuali. Media uerò rarissime curabilis nisi cum operatione manuali, &c.

DE SEBEL. Cap. XXII.

Sebel secundum Auic. est panniculus accidens oculo ex inflatione uenarum apparentium in superficie coniunctiue & corneae, & textur quidem in eo quod inter ea sicut fumus. Verum secundum Rasim non est panniculus, sed similitudo panniculi, cuius sententia est uerior, accipiendo panniculum proprie, quia non contextitur ex neruis & ligamentis, sicut textitur panniculus. prima primi. doctrina quinta, capite primo. Sed quia extenditur supra coniunctiuam & corneam ad modum panniculi, ideo dicitur panniculus. Repletio autem uenarum est causa sebel, & modus est, quia uenae capillares multae dispersae per coniunctiuam, sed paucae & subtilissimae per corneam transcurrentes intumescunt, & fiunt apparentes, & propter magnam propinquitatem apparent in forma panniculi. Secundo imaginamur, sicut placuit Auic. quod ab illis refudet sanguis subtilis, qui coagulatur in forma telae & panniculi. Vel tertio imaginemur, sicut magis placuit Rasi, quod caro coniunctiue & corneae tumeat aliquantulum inter illas uenas propinquissimas, unde faciunt nobis phantasiam, quod hoc totum apparens sit unus panniculus sed in uero ibi sunt naturales uenae, ut in secunda parte canticorum com. 87. & zoar. libro 8. cap. de sebel. & ex isto potest inferri differentia inter sebel & ungulam, quia ipsa est quoddam nerueum, uel sicut nerueum sine repletione uenarum, oriens à lachrymali domestico, nec cooperit nisi in forma sagittae, sed sebel cooperit totum oculum uel quasi totum, & habet alias circumstantias, de quibus supra. Ex quibus inferitur quod sebel est ggritudo in superficie situ & uia. Et praeter haec secundum Auic. est morbus in numero.

Sebel est duplex, quoddam nouum, quoddam antiquum. Item quoddam grossum, quoddam tenue.

Sebel quandoque causatur per uiam defluxus maris fluentibus ad uenas coniunctiue & corneae, quandoque per panniculum extrinsecum, scilicet almocharin, quandoque per panniculos intrinsecos, scilicet, duram matrem uel piam matrem, siue uenas & arterias earum, quandoque generatur per uiam paulatim factae congestionis in uenis ipsius oculi ex nutrimento non debite conuerso & retento & superfluitatibus non resolutis. Causa uero coniunctae sunt sanguis solus, aut alij humores cum sanguine mixti, sed alij humores sine sanguine ipsum causare non possunt, cholera enim pura ipsum causare non potest, cum propter sui subtilitatem impediat coagulationem & panniculationem, purum etiam phlegma & melancholia non faciunt sebel cum sint alba & fusca, & sebel rub. sed isti mixti cum sanguine poterunt ipsum causare, & ita erit subel sanguineus, sanguineum cholicum, sanguineum phlegmaticum, & sanguineum melancholicum, &c.

Signa sebel aspicienti satis manifesta sunt cum uideat panniculum rub. tegentem coniunctiuam et corneam pro magna parte ex uenis iam dictis tumentibus contextam. Signa etiam causarum manifesta sunt, est enim sanguineum notabiliter rubeum, purpureum, sanguineum cholicum rub. tendens ad citrinum, sanguineum phlegmaticum rub. tendens in alb. sanguineum melancholicum rub. tendens in fu-

scum. Sunt & alia signa superius in scabie dicta, quibus materia peccans cognoscitur. Si uero descensus materiae ad oculum per panniculum extrinsecum est exuberatio uenarum exteriorum, rubedo faciei, pulsatio uehemens in fronte aut temporibus si descendat per arterias, aliud signum fluxus materiae per extrinsecum ponit lesus Ali capite de sebel. quod te trahente palpebram inferiorem uersus te sebel eleuatur, ac si erigeretur uersus te propter maiorem colligantiam palpebrae cum exterioribus oculi, quod signum est absque calumnia. Signa uero descensus materiae per panniculos intrinsecos sunt, quia nihil istorum, quae dicta sunt, apparent. Signa uero quod materia eius paulatim congesta sit, est quia factum est paulatim in longitudine dierum sebel, praeterea consequuntur quaedam accidentia, scilicet pruitus propter uapores & materias subtiles adustas retentas, lachrymae ex oculi debilitate, aut pruitu, aut ex indebito concursu siue contactu palpebrae super oculum, nocumentum à lumine solis uel candelae propter disgregationem materiae attractionem, & eius dilationem, debilitas uisus, aut ex debilitate oculi, aut quia impedit dilationem specierum pupilla conficta, aestuatio oculi, tum propter dolorem, tum propter multi sanguinis & spirituum praesentiam, minoratio oculi & pupillae retento nutrimento in uenis, & ideo delato ad oculum uel oculi substantiam.

Prognostica. primum. sebel est de aegritudinibus, quae eradicantur. Secundum. Sebel est morbus contagiosus, ita ut permuteetur de uno oculum ad alium aut ad oculum aspicientis ipsum uaporibus exeuntibus inficientibus oculum aspicientis simili infectione, aut propter imaginationem & praecipue si aspiciens sit debilius oculorum. Tertium. Sebel nouum subtile curabile est medicinis, antiquum uero & crassum non nisi operatione manuali.

Qum palpebra inuersa et interius apparet rubea, & aspera, & scabies adest. Et cum super alba oculorum & super nigredinem uidetur similitudo panniculi ex uenis rubeis & crassis texti, adest passio, quae uocatur sebel. Haec uero duae passiones sunt graues & chronicae & uix curabiles.

Primo agit de his dispositionibus theoricè. Secundo practicè. secunda ibi. Patiens tamen dum sanus. Quod dicit in prima parte, satis est ex dictis manifestum. Pro cura harum dispositionum ante omnia sciendum, quod si scabies & ophthalmia aut ulcera coniungant prius inchoandum est à curatione ophthalmiae & ulcerum, & uniuersaliter omnium aegritudinum, quae sunt maiores, postea ueniendum ad curationem scabiei & aegritudinum minorum. Et hoc ubi harum aegritudinum curatio perfici possit, ubi uero maiores curare non possent, non curatis minoribus à curatione minorum inchoandum est, maioribus non neglectis iuxta canonem Auic. 4. primi capite ultimo.

Triplex est igitur regimen harum dispositionum curatiuum. Primum uniuersale respiciens causam antecedentem. Secundum particulare siue locale respiciens causam coniunctam. Tertium est commune utriq;. Primum exigit quinque intentiones. Prima minorat. Secunda digerit. Tertia eradicat. Quarta diuertit. Quinta fluxum intercipit. Prima autem intentio, scilicet minoratio secundum plurimum in scabie & sebel, sed maxime in sebel completa est per phlebotomiam, aut cephal. si materia fuerit pauca, aut basilicæ si separauerit mittendo materiam. Et si in causa fuerit retentio menstruum aut hæmorrhoidarum præmittatur phlebotomia saphenæ eiusdem lateris, & postea duobus diebus intermedijs, aut tribus, aut pluribus phlebotometur cephalica eiusdem lateris. Hauriatur autem quantitas sang. secundum tenorem uirtutis & cæteras circumstantias indicantes de phlebotomia. Et penes Rasim facta phlebotomia uniuersali, aliquando phlebotomamus uenam frontis ad eradicandam materiam coniunctam, uel de proximo transituram in coniunctam. Si uero non appareat dominium sang. imò aliorum humorum quod frequenter accidit in scabie, minoretur materia peccans, aut cum pilulis de fumoterræ, quibus admisceatur parum pil. aur. aut aggrega. ut uirtus ducatur ad caput, aut cum infusione, aut decoctione polip. 3. i. in sero caprino, cui etiam potioni addatur parum suc. ros. aut aqua lupulorum, ut uirtus ducatur ad caput. Eleuarium quandoq; hamech est in hoc casu præstantissimum si 3. 3. eius misceantur sero caprino, aut aqua lupulorum facta minoratione, à qua inchoandum est materia existente multa. Si uero pauca à digestionem incipendum est, & procedatur ad digerentia sicut est syr. de fumoterræ, cum aqua lupulorum, succus quoque fumiterræ solus depuratus per residendam aut permixtus cum sero caprino est præstantissimus in hac dispositione & in scabie rotius, mundificans sanguinem quod maxime est attendendum. Et ex mundificantibus est casia fist. fumuster. capil. uen. lupuli & epithymus cõfert in hoc, & in euacuando humorem melancholicum, quapropter cum melancholia est in causa, semper misceat, & in digestiuis et euacuatiuis: habet enim antonomasiam super omnibus euacuantibus melancholiam, licet debiliter soluat, quapropter syr. de epithymo est proprius in digerendo humorem melancholicum: si uero aliquando phlegma grossum esset in causa, sicut aliquando in sebel, misceatur in digestiuis oxymel simplex aut compositum, & per tot caput per acetum. Digestiua namq; in his dispositionibus, imò in omnibus debent respicere determinatam materiam & membrum, tam mittens, quam suscipiens per tertiam & quartam uirtutem, & per primam & secundam respicere discrasiam membrorum & materiæ, necnon modum substantiæ ipsius humoris, & ut uia conseruentur apertæ aut strictæ secundum exigentiam, & respiciant reliquas species compositionis & unitatis, sic enim operatio sua felicitatur, & in scabie, & plerisq; alijs dispositionibus attendendum est mundificationi sang. sicut cum illis, de quibus dictum est. Quid autem sit mundificare sang. & clarificare, & per quas uirtutes hoc complectur, & quor. modis fiat, & quæ sunt medicinæ hoc fa-

cientes, & similiter, quibus modis spiritus illustrentur, pro parte dictum est in capite de cura melancholice, sed magis exquisitè dicitur in capite de cura debilitatis uisus. Digesta autem materia eradicetur, aut cum phlebotomijs secundum exigentiam, & in hoc ualeat phlebotomia uenæ frontis, de qua Rasim in littera, aut cum solutiuis, de quibus sermo præcessit, quæ etiam in his dispositionibus sunt iteranda, & uniuersaliter in omnibus dispositionibus, in quibus materia difficulter eradicatur, aut propter dispositionem membri aut materiæ. Et non obliuiscaris, quòd aloës est proprium solutiuum in scabie, septima 4. capite proprio ita ut solus frequenter excuset, & sic absolute sunt tres primæ intentiones, scilicet minoratio, digestio, & eradicatio. Quarta intentio, scilicet diuersio posset perfici omnibus generibus diuersionum cum euacuatione & sine, sicut dictum fuit in ophthalmia, & prouocentur menstrua & sang. hæmorrhoidalis si ex eorum retentione acciderint. Ex proprijs autem diuersionibus sunt phlebotomiæ uenarum nostræ, uenarum post aures, temporū, & frontis, præcipue illarum quæ uidentur magis rumentes, aut in his aut in aliquibus ipsarum sanguisugæ apponantur, phlebotomia etiam uenarum quæ sunt in angulis lachrymalium domesticorum optimè confert magis eradicando materiam, quàm diuertendo, sed non uidentur nisi post fortem gulæ constrictionem. Quinta uero intentio, perficitur cum appositione repercussiuorum fronti & temporibus, & secundo cum sectione uenarum & arteriarum deferentium humorem ad oculos, sicut dictum fuit in ophthalmia, sed hæc non fiant nisi materia fluente per uenas & arterias extrinsecas. Secundum regimen locale quandoq; perficitur cum medicinis in pruritu et scabie leui & sebel incipiente, quandoq; cum operatione manuali in scabie, secundæ speciei, & tertiæ, & sebel antiquæ. Operatio uero cum medicinis duas exigit intentiones, sicut in albedine. Prima perficienda est cum molificantibus, sicut cum balneo aquæ dulcis, & cum fomentatione decoctionis raparum, & aliorum, sicut dictum fuit in albedine. Secunda intentio perficitur cum abstergentibus & exiccantibus, & interdum aliquoties corrodentibus imediatè applicandis post fomentationem prædictam in utraq; dispositione, & inchoandum est à leuioribus gradatim procedendo ad fortiora. Ex proprijs autem leuibus est puluis factus ex sacch. candid. thuria, sarcocol. spuma maris añ. fortius autem hoc est. R. aloes partem 1. salis ammon. partem s. confice cum melle, aliud satis domesticum. R. carabe partem 1. corticum granatorū partes duas, conficiantur cum melle & applicentur. Et fortius isto est medicamen Auic. accipiat cortex oui, & stet in aceto cal. 10. diebus, uel dimittatur cum aceto in sole, & postea exicetur in umbra et teratur subtilissimè, & applicetur, est enim proprium in sebel, puluis etiā lapidis hematitis est proprius in utraq; dispositione, & maxime in sebel. Fortius autē isto sicut rub. descriptum à Rasim. R. hematitis, coleotar usti, id est, uirioli Romani, & est cal. in quarto, & lapis hematitis non ablatus est cal. in primo, sicut in secundo, sed ablatus frig. & minus siccus, añ. 3. aeris usti. 3. 2. myrrhæ, croci. añ. 3. 1. piper. lon. cal. et sic. in quarto cõspargant uino ueteri post optimā puluerizationem, & fiant

& fiant ex eis sief, & si timeres huiusmodi approximationē permisce cum tertia parte, aut s. sief al. & tūc paulatim auge secundum necessitatē, & secundum qd oculus tolerat, & lapis hematitidis solus cōfert, aut cum pauco mellis. Aliud Mesue satis domesticum. & ceruicē, uiridis aeris, añ. tere cōtrititione ultima, & confice conterendo cum uino albo potenti, & succo rutæ, & ponatur in uase aeneo lymphi per diem & noctem, postea coletur & colatura referuetur in uase uitreo, & distilletur in oculo mane & sero. Sief cōferens ulceribus & scabiei oculorū cum caliditate. & cadmię, croci, scorix aeris, gummi arab. aeris usti, añ. 3. 3. myrrhæ lapidis hematitidis, spic. añ. 3. 1. opō, ro. añ. 3. 1. piperis al. gran. 4. confice cum uino, & utere cum albumine oui. Sed in horū applicatione obseruentur hi canones. Primus, ut à leuiorib. inchoetur gradatim ad fortiora procedendo. Secundus, ut sepe in oculo aspiciamus si nimis aut diminutē imprimat. Et si nimis impresserint, & dolorē & ruborem præter modum fecerint, dimitemus ipsorū impositionem per aliquot dies, donec oculus sit restitutus. Et postea faciemus ut prius. Si aut mediocriter, sequamur eo modo, si diminutē, gradatim augebimus, donec sufficienter imprimant. Operatio uerò manualis in scabie siperficetur. laceat æger supinus super aliqua tabula capite aliquātulum eleuato & inueretur palpebra, & sub palpebra inuerfa ponatur stilus aliquantæ latitudinis, cui palpebra cum fricatur adhaereat, deinde medicus inuoluat digitum suum indicē cum folio paritarię aut ficus, & reñedo palpebrā, & stilum, cum alia manu fricet superficiem intrinsecā palpeb. donec erumpantur granula quæ sunt in eius superficie, & bene sanguinare permittatur, & post lauet palpebram, & oculum cum aqua ros. tepida. Aliquando hæc operatio perficitur cum una lima subtilissimē dentata fricando superficiem palpebræ, ut prius & citius expeditur. Aliquando uerò fricatur cum huiusmodi lima prius ponendo super superficiem palpebræ aliquem puluerē, sicut spuma maris. Credo quod secunda operatio sit cæteris expeditior. Postea mundificato oculo, scilicet, à sanguine cum aqua ros. tepida aut aceto, aut uino forti, aut cum his mixtis simul imponit medicinam aliquam abstergentē ex superius descriptis ad consumendum residuum illius quod remansit. Deinde claudat oculum desuper ponendo faldellam ex corio circumdata perialinea ueteri, & infusam in lacte & aqua ros. aut in lacte & oculo ros. si uolunt magis mitigare dolorē & aliquando secum cōiungunt uitellum oui, sed Memino, & mica panis infusa in uino cocto cum pauco croco. Sed tempore calido cum uitellis ouorum oleo ros. & uiol. Sebel autē cum operatione manuali curatur sic. Extent ægrum super tabula, aut faciant ipsum sedere super una bancha equitando bancham, & ponant ministrum post ipsum, qui eleuet palpebram superiorem, & trahat inferius palpebrā inferiorem ut oculus stet apertus, deinde medicus accipiat cū unco, id est, paruo unco argenteo uenulam unam, & eleuet, et postea cum acu penetret ubi eleuata est, & penetrare cum filo de serico subtili, aut si non uult ius extremitate est stilum de serico, & sic annectunt ipsum, deinde hoc idem facient in alia parte eiusdem

uenæ uel alterius, & sic faciunt in uenis, id est, magnis apparatibus tam in parte syluestri, quàm in parte domestica omnibus filo annectendo, ut supra. Deinde omnia huiusmodi fila eleuabunt & incident omnes illas uenulas, quibus sunt fila alligata totaliter ex transuerso, & sinent multam quantitatem sang. egredi, & hanc operationē faciant in coniunctiua & non in cornea; nam per exitum sang. ab huiusmodi delitescunt etiam uenæ corneæ. Deinde post hoc, oculo scilicet, mundificato à sanguine, ut supra, imponunt medicinam abstersiuā, sed Mesue prius imponit aquam infusionis cymini, & post illam, peluerē citrinum & liget oculum exterius applicando, quæ dicta sunt superius in scabie. Sed bonum est ut post has operationes fronti & temporib. applicetur defensiva, ne materia propter dolorem attrahatur ad oculum, deinde ponatur in domo obscura & quiescat, & dormiat capite eleuato, & non super latere oculi læsi, & inungatur ei dicta tenuis frigida sine carnibus, ouis & uino neque mastigent aliquid, neq; loquantur nisi uoce submissa, & quanto minus est possibile moueatur, & fiant istę operationes tempore temperato, scilicet, uere aut autumno. Tertium regimen utriq; commune duas exigit intentiones, scilicet accidentiū correctionem & regimen sex rerum non naturalium. Corrigitur itaq; dolor fomētando oculum cum lacte & aqua ros. aut oleo ros. Et secundum Auic. uitellus oui sanat dolorem sequentem operationē sebel cum incisione si oculo superponatur, & melius est, ut sit tepidus inter duas petias inuolutus, sed tangens oculum sit subtilissima. Et si hæc non suffecerint administretur in oculo sief album cum opio. Si uerò esset instantia uigiliarū sedetur, ut superius dictum est, cauendum est etiam post operationem manualement in scabie & sebel ne palpebræ adhæreant oculo & secum inuiscetur. Ad hoc autem confert bis aut ter in die aperire palpebras & ab oculo separare, sed melius est oculum intra palpebras aliquotiens soluere. Vltima intentio est, ut loceatur in acre satis tēperato non uentoso neq; fumoso boni odoris aqualiter obscuro. Cibi & potus sine declinantes ad frigidum & humidū, nisi forte in sebel phlegmatica in quo declinet ad siccū, & sint præbentia nutrimentum subtile non crassum aut uiscosum. Caueat à salis acutis, amaris, dulcibus, unctuosiss, acerosiss multum, & ab omnibus multum uaporosis, inter cætera caueat à nucib. eruca, caulibus, & ab omnibus quæ sunt difficilis digestionis & à melle, caueat à uino uinoso & ebrietate, sit cœna leuior prandio, dormiat multum de nocte, & non incipiat dormire nisi distanter à cibo per duas horas, & capite eleuato, & nullo modo super latere oculi læsi, nec cum facie deorsum, neq; faciat aliquā operationem secundum quam oporteat caput inclinare deorsum. Caueat à coitu & uitet iram, clamorem, rixam, nec ferat aliquod strictum circa collum, &c.

Patiens dum sanus est phlebotomia ex brachio & fronte, & uentris solutione uti debet. Et in commestione uitare dactylos & sesamos de melle, & uitet ebrietatem.

Hic ponit curam, & primo per uniuersalia, secundo per particularia: secunda ibi. Et quando non est plenus. De prima dicit, quod patiens dum sanus est, debet uti phlebotomia ex brachio & uena frontis & uentris solutione, de quibus dictum est, & uiter da ctylos & selamos conditos cum melle, quia praebeant nutrimentum crassum & adustum. Sed uidetur includere contradictionem cum dixit: Patiens dum sanus est. Istud ergo intelligendum est de regimine praeseruatiuo, patiens, id est, aptus pati has dispositiones utatur phlebotomia, & cetera ne huiusmodi dispositiones incurrat. Aliter patiens has dispositiones, id est, nullam aliam habens aegritudinem, nam posset habere aliquam aliam aegritudinem qua prohiberentur huiusmodi operationes sicut phthysim.

Et quando non est plenus saepe ingredi balneum est ei utile. Et frequenter immittere oculo sief rubeum similiter cofert. Sief. rub. Rec. hematitis, colcothar combusti amborum. an. drach. 3. aeris uisti, drach. 2. myrrhae croci, an. drach. 1. piperis long. drach. s. conspergantur ex uino ueteri & fiat sief, his praeterea aegritudinibus confert sief uiride, cuius descriptio in cap. de ungula continetur. Quod si passiones istae uetustae fiant, scabies fricatione indigebit & sebel collectione, non tamen mensurae huius libri conuenit, ut de his tractetur.

Primo ponit curationem localem cum medicinis: secundo cum operatione manuali. secunda ibi. Quod si passiones. De prima parte duas elicit intentiones curatiuas. Prima est mollicare oculum cum balneo & fomentis, sicut dictum fuit. Secunda est abstergere, exicare, & resolueri, & corrodere cum sief rub. & similibus, cuius descriptionem ponit, & declaratum fuit superius, reliqua sunt manifesta, &c. Curat tertio operatione manuali remittens nos ad aliud cap. 1. ad suam chirurgiam, quia hic solum physice tractat.

DE PRURITU LACHRYMALIUM
Cap. XXIII.

Endiua tenera sumatur & teratur, & fiant ex ea magdaleones parui & ex oleo uiol. inungantur & oculis superponantur. Et in hora dormiendi ligentur. Rosatum tamen melius est & citius confert. Et si hoc non suffecerit, lentes absque corticibus, & sumach & ros. rub. & granati carnositas sumantur, & contrita ex careno conspergantur, & more emplastri superponantur.

Hic agit de pruritu lachrymalium, de quo superius dictum est, quantum est expediens. Lachrymalia enim citius pruriunt, quam ceterae partes oculi, & proprie lachrymale domesticum, quia plures materiae ad ipsum defluunt cum uiae sint latiores. Diuiditur hoc capitulum in partes duas. Primo ponit curam per localia, in secunda ibi. Quod si non suffecerit. Ponit curam per uniuersalia. De prima parte dicit, quod fiant magdaleones parui, id est, corpora parua scilicet, ad quantitatem orbitae ex endiua tenera, id est, non multum antiqua, quae scilicet, contundatur cum oleo uiolaceo aut ros. quod est melius, quia magis confortat & repercutit, & oculis superponatur in hora dormiendi, & ligetur ut conuenienter adhaereat est enim hoc medicamen frig. & humidum, reperculsiuum, conueniens in principio alterans humorem iam fluxum, & remouens malam complexionem impressam & prohibet materiam fluentem. Secundum medicamen si hoc non solum suffecerit, est ut lentes frig. & siccae absque corticibus, ut non sit in eis asperitas, & sumach & rosae rub. & granati carnositas intrinseca, omnia frig. & sic. & stiptica conterantur & post contritionem conspergantur ex careno cal. & hum. mitigatiuo & resolutiuo, & est uinum coctum & reducatur ad formam emplastri, & superponatur ut prius ligando: est enim medicamen augmenti usque ad medium status.

Quod si non suffecerit ex cephalica prius phlebotometur patiens, deinde ex uena frontis & ex uenis quae sunt in lachrymalibus angulis. Venter quoque frequenter soluatur, & multotiens balneum ingrediatur.

Ponit curam uniuersalem per phlebotomiam uenae cephalicae & uenae frontis & uenarum, quae sunt in angulis lachrymalibus domesticis. Venter etiam soluitur & balneum ingrediatur, de quibus omnibus sufficienter dictum est superius. Medicamen uero proprium in pruritu & in prima specie scabiei miscetur thutia praeparata subtilissime puluerizata cum uino maluatici, aut optimo uino antiquo albo, & aqua ros. et potest admisceri magis aut minus de uino secundum quod uolumus maiorem & minorem excitationem & resolutionem, & hoc collirium quater in die oculo imponatur. Aliud infallibile. r. sang. drach. aloes epatici, sarcocollae nutritae, an. 3. 1. zingarioph. croci, caphorae, an. 3. s. thutiae praeparatae, 3. 4. terantur pulueres subtilissime, & misceantur in uino maluatici, & aqua ros. an. 15. 1. bulliat in uase uitreo, ponendo illud uas in una caldaria aquae, per cuius bullitionem bulliat dictum collirium existens in uase uitreo usque ad tertiae partis consumptionem & usui reseruetur. Et quodcumque eo utimur conualescent uas, melius est tamen ut anteorum applicationem fomententur oculi cum decoctione aliqua, de qua supra, & excusabitur a balneo, quod Rasis praecipit fieri.

DE VNGULA. Cap. XXIII.

Vngula dicta ad similitudinem unguis, eo quod ipsa tegit secundum plurimum extremitatem oculi uersus lachrymale domesticum

ficum, sicut ungues tegunt extremitatē digitorum. Describitur ab Auic. 3. terij, cap. proprio, quod est additio coniunctiue, & uelaminis continentis oculū incipit secundum plurimum à lachrymali domestico, & currens semper super coniunctiuam. Et quandoq; tegit corneam & inuadit eam, ita quod cooperit foramen. Dicitur primò additio, scilicet, præter naturam, coniunctiue, id est, uelaminis continentis oculum. Coniunctiua enim undecunq; continet oculū præter ubi est cornea. Et dicitur coniunctiua quia cōiungit partes oculi adinuicem, aut quia coniungit oculum cum craneo in orbita, & currit semper super coniunctiuam, licet non semper tegat corneam. Et reuera ungula est membrum cum sit corpus ex prima mixtione humorum genitum & non compositum, ergo simplex. Et non est panniculus, quia non componitur ex uillis nerveis & ligamentis, neque est nervus, ut patet satis ex paucitate sensus: relinquatur ergo quod sit caro, quia cum nullo alio simplici tantā habet conuenientiam quantam habet cum carne. Et cum caro sit etiam quintuplex uerisimile est ipsam esse carnem confusam præternaturalem. Ex quo inferatur ungulam esse morbum in numero. Morbum quidem quia sensibilibiter impedit motuū oculi, & quandoq; sensitiuam faciendo dolorem, in numero, quia addit in numerum partium oculi. Si autem cooperiat pupillam, est etiam morbus in uia, & potest etiam dici morbus in situ & superficie. Et nota quod aliquando in ipsa apparent uenulæ per substantiam eius disseminate.

Cum aliquid panniculo simile ex angulo qui est ex parte naris oriri uidetur, & album oculi cooperire, & peruenit usque ad nigredinem, generatur passio quæ dicitur ungula. Cuius nocumentum tunc solum est prius cum peruenit usq; ad nigredinis partem quæ est iuxta pupillam.

Hoc capitulum de ungula diuiditur in partes duas. In prima parte determinat de ipsa theoricè. In secunda ibi. Hæc igitur passio, determinat practicè. Prima pars satis ex dictis est manifesta. Et non dixi ungulā esse panniculum, sed panniculo similem, quia subtilis & lata. Et ipsam dixi esse deteriore cum peruenit ad partem nigredinis, id est, corneæ quæ est iuxta pupillam, id est, ex directo pupillæ, tunc enim uisum impedit, pupilla enim propriè est foramen uueæ multum à modo substantiæ, & sunt tres. Neruea quia ad nerui similitudinē in duritie. Et carnea quia ad carnis similitudinem quando est mollior. Adiposa quia ad similitudinem adipis, & hanc tertiam speciem ponit Albuca. Secundò distinguuntur ex parte caloris. Nam quædam est rubea notabiliter à sanguine proveniens. Quædam alba à phlegmate permixto cum sanguine. Quædam citrina siue uiridis à cholera mixta cum sanguine. Quædam nigra à melancholia mixta cum sanguine. Semper enim sanguis concurret ad generationem membrorum tam cōiuncta generatione quam

seuncta, & similiter ad nutritionem. Vtrum autem ad generationem membri omnes humores concurrant sicut elementa ad mixti generationem, est alterius speculationis. Distinguit etiam ex parte quantitatis. Nam quædam est magna occupans magnam partem coniunctiue, imò corneam ipsam. Quædam est parua. Quædam mediocris. Item quædam est crassa. Quædam subtilis. Distinguitur quartò ex parte adhærentiæ. Nam quædam est multum inuiscata cū cōiunctiua aut cornea. Quædam leniter est & facillimè separabilis. Quintò ex parte originis. Nā quædam orit ex lachrymali domestico, & est secundum plurimum, quia illud propter latitudinē uiarum est plurimum materierum susceptiuum. Quandoque oritur à lachrymali syluestri & est rarius. Quandoq; à profunditate palpebræ inferioris aut superioris, & est rarissimum. Sextò & ultimò. Quædam antiqua. Quædam noua. Et quædam à generatione contracta. Causæ pro magna parte sunt manifestæ. Causa enim materialis ex qua, est secundum plurimum superfluitas nutrimenti lachrymalis & coniunctiue, licet etiam aliæ materiæ superfluentes possint esse causæ materiales ipsius. Causæ primitiue sunt quæcūq; huminōi humores multiplicat et ad oculos declinare faciunt. Causa efficiens est uirtus augmentatiua cū colore naturali. Formalis est forma carnis. Finalis in quantum caro ut habeat esse, sed finalis in quantum morbus ut lædat. Materia uero adiposa est phlegma aquosum cum parte unctiosa sanguini permixtum. Signa satis nota sunt, cum sensibus subiaceant.

Prognostica. Primum. Quæ dura est, antiqua, crassa, magnam partem occupas, & multum inuiscata & propriè cum cornea, est incurabilis. Secundum. Adiposa mollis, parum inuiscata, subtilis, distans à cornea, est facillè curabilis. In medijs dispositionibus iudicia sunt media.

Hæc igitur passio dum subtilis est cum siefuiridi, & sief de chalcantio est medicanda. Si autem uetusta fiat & crassa, cum ferro est expolienda.

Primò ponit modos curationis. Secundò ponit duplicem descriptionem sief, ibi. Siefuiride. Quid dicat in prima parte satis notum est. Innuit enim duplicem modum curationis. Vnum cum medicinis. Reliquum cum operatione manuali.

Siefuiride quod cōfert sebel & scabiei & ungulæ et albedini. Rec. ziniar. drach. 3. colcothar usti drach. 6. arsenici rubei, baurach spumæ maris, omnium ana drachmam unam, salis ammoniaci drachmam semis, ammoniaci drach. duas, ammoniacum in succo rutæ dissoluatur & species ex eo conspergantur & fiat ex eis sief, est enim mirabile. Sief de chalcantio quod cōfert ungulæ. R. æris usti, chalcantibi amborum

ana drach. 5. ziniar. drach. 2. salis ammoniaci, baurach, arsenici sublimati omnium ana drach. 1. terantur & per hebdomadam unam dimittantur, deinde fiant ex eis sief, & fricetur ungula cum eis.

ziniar, id est uiridis aeris corrosiui, calid. & sic. in quarto. drach. tres, colcothar usti, id est, uirioli rub. usti, calid. & sic. in tertio. 3. sex, arsenici rub. calid. in tertio, sic. in secundo. baurach, spumæ maris calid. & sic. in tertio. omnium ana. 3. 1. salis ammoniaci calid. & sic. in quarto. 3. semis ammoniaci. 3. 2. ammoniacum dissoluatur in succo rutæ, & cæteri pulueres conspergatur eodem suc. & simul incorporando fiat sief, quod est mirabile siue in forma pulueris, siue in forma liquida applicetur. Sief de chalcætho. Recipe aeris usti, chalcanti, id est, uirioli uiridis ana drach. quinque, ziniar drachmas duas, salis ammoniaci, baurach, arsenici sublimati, omnium ana. 3. 1. terantur & per hebdomadam, unam dimittantur, interim ipsa bene puluerizando & incorporando & fiat sief ex eis cum aliquo liquore ut suc. rutæ & cum eis ungula fricetur. Quatuor sunt species uirioli, scilicet, Colcothar quod est citrinum, chalcanthum uiride, & hæc sunt calid. & sic. in tertio. Chalcadis scilicet album. Asluriæ rub. & hæc duo sunt cal. & sic. in secundo. Veruntamen Simon la. dicit quod colcothar est chalcanthum uiride antiquatū. Arsenici. 3. sunt species. Rub. Citrinum, quæ sunt minus acuta, calid. in tertio, sic. in secundo. Albū dictum realgar calid. & sic. in quarto. Sed arsenicum sublimatum est cæteris acutius & multum causticum, & eius operatio durat tribus diebus dum profundè cauterizat quapropter consideret qualiter in oculo administretur, sed de hoc statim dicetur.

Cura ungulæ triplex exigit regimē. Primum uniuersale circa causam antecedentem. Secundum locale. Tertium utriusque commune. Primum empletur. 5. intentionib. scilicet minoratione, digestionē, eradicatione, diuersione, & fluxus interceptione. Quæ omnes qualiter debeat compleri satis potest ex suprascriptis parere cap. de scabie & ophthalmia. Secundū regimen duob. perficitur modis, primò cum medicinis, secundò cū operatione manuali. Primus uerò modus conueniens in subtilib. et mollib. & propriè quando non possunt leuiter cū operatione manuali remoueri duobus perficitur intentionib. Prima est mollificatio cum balneo aut fomentis suprascriptis. Secūda immediatè post fomentationē apponere medicinas abstergentes & corrodescentes à leuiorib. inchoando & gradatim ad fortiora procedendo. Thus solum tritū & aspersum cum aqua calid. & postea collirizatum est expertum & securum. Collirium Ruffini descriptū à Iesu Ali. 8. lapidis hæmatitis lori, aeris usti, cadmiæ, argenti. añ. 3. 4. pip. al. 3. 2. pip. nigri, spumæ maris. añ. 3. 8. aloës succotrinii, spicæ, garyop. añ. 3. 4. zing. 3. 3. amyli, mirob. belliricorum. añ. 3. 2. croci, salis ammo. añ. 3. 1. terantur et cribellent subtilissimè & utere. Est enim sublimè & famosum. Collirium Auic. ex testa cæcorum fricata ab ea linimento mixto cum oleo cucurbitæ est apud eos mirabiliter laudatum. Fortiora sunt descripta per Ras. in textu. Et si uis uti fortib. sine quibus se-

cundum plurimum ista operatio cōpleri non potest. Accipe sief descripta à Ras. & tenendo aliquod ipsorum inter digitos applica cum extremitate eius super ungulam. Et tādū teneas donec æger sentiat dolorē, & postea amoueas. Et pone in altera parte eius dē ungulæ & sic paulatim tota consumetur aut intingatur extremitas stili cotto inuoluta in aliquo collirio foris ex suprascriptis, & applica super ungula ut prius, aut illi extremitati prius in aliquo liquore balneatæ annē & pulueres suprascriptæ sief. Et applica quousque sentiat dolorē ut supra. Et si oculus incurreret ophthalmiam & dolorē, desiste ab huiusmodi operatione per aliquos dies. Deinde reuertere donec cōpleta sit. Et hoc modo securè poteris uti huiusmodi medicinis fortib. Elonga tamen hanc operationē à cornea quantum potes. Et cum facis huiusmodi operationes dolorosas bonum est ponere defensiuum circa frontem & tempora ne humores fluant ad oculum, & clauso oculo pone desuper faldellam cotti infusam in lacte, & aqua ros. & oleo ros. ad doloris mitigationē. Modus autē operationis manualis in ungula est triplex. Primus si ungula nō sit multum cum oculo inuiscata & cū uncinis in extremitate eius māgis separata siue minus inuiscata capiatur palpebra eius aperta & sic retenta per aliquem bonū ministrum eleuet. Et si opus sit alio uncino ad meliorem eleuationem applicetur, postea cum instrumento ad modum lancetæ, sed obtuso aliquatè excoriet ipsam ab oculo separando usque ad lachrymale cui annexa est, & ibidem incidat cum forfice & cautè ne caro lachrymalis incidatur, sic enim fieret fluxus lachrymarū perpetuus. Secundus modus est in illa quæ multū cum oculo est inuiscata ut suspēdatur cum uncino propter duritiem eius in parte magis eleuata & crassa, & si non potest capi cum uncino propter duritiem eius perforetur ibidē cum acu subtilissima, in cuius extremitate sit filū, & cum filo suspēdatur & eleuet quātum aptè fieri potest, quia eleuata adhuc infigatur alia acus capiēdo maiorem partē eius, & quantum de ipsa capi potest, dummodo nō lædatur oculus et tracto filo de serico usque ad medium eius trahatur filum, nunc ad unam differētiā nunc ad aliam secādo & ipsam ab oculo separādo primò uersus cornē, postea uersus lachrymale donec totaliter separatur. Et si uideretur tibi quod cum pilo caudæ equinæ separari melius posset secādo ipsam experire quomelius perficiatur operatio hæc postea iuxta lachrymale incidatur, & in hac operatione cauendum est ab incisione partium oculi, caro enim lachrymalis cognoscitur per rubedinem & molliem, & coniunctiua cognoscitur per duritiem & maximè caue ne cornealædatur. Tertius autem modus secundum Albu. proprius in ungula adiposa acceptatus à multis in curatione macularum de quib. sermo præcessit, perficitur cum rasorijs rasando siue abradendo totū quod est in superficie oculi, illud enim aptè fieri potest non radendo oculum, cum illa additio sit oculo mollior, & post has operationes imponūt in oculo cyminiū marficatum cum sale ad prohibendum inuiscationē oculi cum palpebra. Ego autem credo conuenientius esse immediatè post has operationes sief album cum lacte ad sedandum dolorē & prohibendum ophthalmiā. Prohibetur autem inuiscatio, faciendo ægrum sæpe mouere oculum sub palpebra, & si non possit aperiri

turaliquando palpebræ si ab oculis separentur, & postea si opus est transactis duobus diebus uel tribus aliquid ex medicinis abstergentibus, de quibus supra, ad consumendum residuum in oculo ponatur. Tertium regimen duas exigens intentiones, scilicet correctionem accidentium & debitum regimen sex rerum non naturalium ex capitulis præcedentibus potest elici.

DE ATARFATI SIVE SANGVINE
effuso in oculo. Cap. XXV.

Macula rubra, atarfat, tarfa, pustula, sanguis infusus in oculo sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem quæ diffinitiuè est sanguis in superficie oculi adhærens & inuisus. Et si sit ex directo pupillæ impedienti uisionem est morbus in uia. Si uero sit in alia parte oculi et lædat ad malam complexionem cum materia reducitur. Si uero non lædat non est agritudo, sed est de his quæ non sunt agritudines, & tamen cum agritudinebus numeratur, ut est apud A. secunda primi doctrina prima, cap. sexto.

Species eius sunt, quia aliquando sanguis ille occupat magnam partem superficiem oculi. Aliquando paruum, existens sicut punctum rubeum, ideo atarfat dictum est. Item aliquando est recens sanguine nouiter infusus, & est coloris rub.

Aliquando est antiqua, & tunc est nigra, uel tendens in nigrum resolutis ex longa mora partibus igneis & aeris, remanentibus partibus terreis tendentibus in fuscum.

Causa immediata est duplex. Vna est exitus sanguinis à uena uel arteria, aut quia solui ipsarum continuitas aut per uiam resudatiōis. Causa autem solutionis continui ipsarum quandoque est primitiua sicut percussio, casus, fricatio oculi, motus laboriosus, statio sub sole & huiusmodi. Quandoque est intrinseca corporea sicut multitudo sanguinis extendens, & ipsius ebullitio, sicut aliquando in febris, balneo, & forti exercitio unde humor ebulliens scindit uenam, & foras subtilem resudat extra uenam. Aliquando est humor corrosius substantiam uenæ corrodens. Secunda causa coniuncta est aliquid remanens ex materia apostematis sanguinis resoluti secundum maiorem partem, siue ut uerius dicam, illud remanens est ipsa macula, sed apostema præcedens uel causa immediata ipsius est causa huius maculæ. Signa sunt macula rubra, aspicienti est manifestata, quod autem sit ex reliqua apostematis ex præcedente apostemate cognoscitur, quod uero sit à causa primitiua ex relatu agri habet, quod uero sit à causa corporea cognoscitur cum nulla causa primitiua præcesserit. Vtrum autem à plenitudine uel ab acuitate cognoscitur, quia plenitudinem declarat testis uenarum. Ebullitionem uero declarat complexio calida corporis & causæ sanguinem ebullire facientes, sed quod sit ex resudatione cognoscitur quia tenuis & subtilis est. Et quando est ruptura uenæ, crassior est macula illa sanguinis crassiori fluente.

Prognosticum. Hæc dispositio est ex toto genere salubris natura aut arte curabilis. Cura triplex exigat regimen ut supra. Primum uniuersale. Secundum particulare. Tertium commune utriusque. Primum regimen uniuersale quidem completur per phlebotomiam secundum quod superius dictum fuit, Necnon medici

na solutiua, quæ debet esse leniens & infrigidans sicut aqua fructuum cum cassia aut māna. Diuersio etiam perficitur, tam diuersionibus communibus, quæ propriis, scilicet phlebotomia particularium uenarum capitis, de quibus supra. Fluxus etiam interceptio, perficiatur ut supra.

Secundum regimen perficitur in principio cum repercurientibus, & in fine cum resoluentibus, & abstergentibus, in medio autem commixtis. Ex conuenientibus in principio est aqua albuminis oui in oculo infusa. Aut si in ea infundatur parum boli armeni, & deinde coletur & sic colata & expressa oculo imponatur. Et de inde secunda die ponatur in oculo lac in quo bolus armen. et similia sunt infusa. Exterius autem applicetur albumen oui cum oleo rosæ, contusum. Deinde tertia & quarta die & quinta imponatur sanguis columbi calidus, aut turturis, extrahendus per phlebotomiam uenarum, quæ sunt sub ala, aut per decoctionem & est calidior. Et hoc tempore emplastre oculi cum sœnugræco, & rosæ coctis in aqua rosæ, aut emplastre cum folijs salicis coctis cum aqua rosæ. deinde emplastre cum sœnugræco, & rosæ cum uino decoctis. postea cum non est timor noui fluxus uaporetur oculus cum decoctione chamomilæ, meliloti, aut foliorum caulium, & postea emplastre cum folijs salicis, et caulibus tritis, & coctis cum uino potest antiquo. Et in hoc tempore ponantur in oculo colliria fortia. scilicet thuris, 3. i. tere ultima contritione, et funde super ipsum ex aqua pluuiali in qua solutum sit sal commune & si uis ut magis imprimat dissoluatur in aqua sal ammoniacum, aut sal gemma & cum superscripto thure etiam miscetur, & fiat collirium. Fortius autem est illud quod à Rasi in littera describitur. Olibani quoque una, & salis gemmæ tertius unius partis in lacte dissoluta egregie conferunt & similiter cum aqua raphani. Si uero macula rubra fuerit reliqua apostematis, fomentetur oculus, primo cum decoctione passularum cui parum sœnugræci addi potest, deinde collirizetur cum succo passularum sine arillis & aqua mellis, & cum eisdem cum quibus sit fomentatio potest emplastrari, ut quod derelictum est emplastre & mollificetur & resoluatur.

Tertium regimen commune utriusque, scilicet completum est per correctionem accidentium, & per regimen sex rerum non naturalium, patere potest ex sæpe dictis. In principio enim dum est dolor & aestuatio debet esse tenuis. Postea his accedentibus, declinantibus, potest incrassari.

Quoniam in oculo ex percussione aut ex re alia punctum rubrum fieri contingit, sanguis qui ibi est dissoluendus est, postquam aestuatio quieuerit. Sumantur igitur arsenici rubri, olibani, ammoniaci, myrrhæ, omnium. an. partes æquales & fiant ex eis siesqui in succo coriandri fricentur & in oculo distillantur, quandiu tamen dolor perseverat albugo oui sumenda est & oleo rosæ commiscenda & cottum ex eis inuolutum oculo est superponendum.

Habet hoc caput 2. partes. In prima ponit causam huius passionis. In secunda curam. Secunda ibi. Sanguis qui ibi est. Quod dicit in prima manifestum est. In secunda parte. Primo docet quid faciendum est cum aegritudo processerit, cuius causa est, quia medici secum plurimum non uocant in principio sed postea: aliquandiu processit. Secundo ponit curam quae debet principio. Quae dicit in parte ista manifesta sunt. Describit enim colliriū satis forte applicandū, postquam estuatio, id est, calor & dolor & fluxus humorum cessauerit. & arsenici rub. olibani, myrrhae, ammon. añ. partes aequales fiant ex eis sicut cum succo coriandri, qui etiam cum uis uti eis sunt fricandi super corneam in succo coriandri & collirizandi, melius tamen est ut arsenicū saepe abluiat cum aqua rosacea aut succo iam dicto. Et forte melius est ut hoc colliriū cum extrema te stilli conto inuoluto applicet, quia ad placidū sic potest remoueri & super macula reiterari. Hic est dubium nondum decidum. Vtrum scilicet in cornea sint uenae & arteriae per quarum rupturam potest fieri tarsati. Et uidetur quod sic quia nutrit & uiuit, & quia patit sebel qui est pāniculis accidet ex inflammatione uenarum apparentium in superficie coniunctiuae & corneae, in oppositum arguit. Quia quantumcunque essent minutae adhuc apparent. Item essent plenae sanguine qui non est diaphanus, & per consequens non esset perfecte diaphana, imò in aliqui. partibus colorata. Itē si oculus uidet uaporem & impedit ab eo multo magis impeditur a praesentia sanguinis in cornea. Credo conformando me dictis A. et ceterorum et experientie quod in ea sint uenulae et arteriae minutissimae, quae sunt diaphanae & non repletur sanguine, sed humiditate prima de secundis, facta diaphana, & trasparente secundum ipsius corneae exigentiam, sed cum multus ad oculos fertur sanguis, sanguis replentur & apparuit. Et ad argumenta in oppositum dico quod si uapor impediatur uisum, iste tamen non impediunt cum sint diaphanae, sicut cornea, neque uidetur ab ipsa separare cum sint minutissimae & ei similes.

DE LACHRYMIS SIVE DISTILLATIONE OCULI. Cap. XXVI.

Lachrymae. Distillatio oculi sunt termini synonimi signantes hanc dispositionem, quae distinitiuè est aegritudo secundum quam oculi semper apparent humiditatem aquosam, & quandoque currunt guttae. Vel breuius. Lachrymae sunt humiditas aquosa ab oculo profluens, & in alia ueritate sunt aegritudo in uia, cum uisum impediatur prohibendo debitam delationem specierum uisibilium per corneam, et haec non sunt nisi superfluitas aquosa refecata in secunda, tertia, aut quarta digestionem. Aquositas namque genita in epate per secundam digestionem, et postea expulsa cum sanguine, ad chilim magna pars eius tamquam superflua expellitur per uenas emulgentes ad renes, & deinde a sanguine colata expellitur per poros uritides ad uescicam & mingitur. Reliquum autem ipsius aquositatis quod remansit cum sanguine ut uehiculum sit ipsius sanguinis, penetrat cum sanguine ad extremitates uenarum quae ad oculos terminantur & fit lachryma. Generatur secundo materia lachrymae in tertia digestionem in extremitatibus uenarum cum sanguine conuertitur in primam humiditatem de secundis, est enim illius tertiae digestionis superfluitas, & haec simul est materia lachrymarum & etiam

sudorum, licet etiam prima aquositas sit materia sudoris.

Tertio refecatur superfluitas aquosa in quarta digestionem cum prima humiditas de secundis transmutatur in secundam & tertiam, & tamen tertia, scilicet cambium transmutatur in quartam, scilicet in glutem & membrorum substantiam. Duae enim in quarta digestionem refecantur superfluitates altera crassior, & est illa immundities quae apparet in corporis superficie, & ex hoc genere sunt mucinarius cerum auri etc. Altera subtilis quae aliquando in uaporem, aliquando in sudorem paucum & subtilem conuertitur, & delata ad oculos in lachrymas conuertitur. Duae autem sunt uiae per quas haec materia lachrymarum ad oculos deferitur, primo per uenas exteriores frontales & temporales ad oculos terminatas, secundo per uias intrinsecas peruenientes ad oculos & per foramina quae sunt in orbita. Potest addi tertia uia quia humiditas fluens per nares quandoque per foramina ossium nasi ad oculos terminata deriuatur ad oculos sicut e contrario. Colliria posita in oculis deferuntur per eadem foramina narium ad os, unde quinta tertij, sentitur in ore sapor alcohol positae in oculo, huiusmodi autem signum est quia multis humiditatibus, defluentibus, per nares oculi lachrymantur.

Species lachrymarum sunt duplices. Quaedam uoluntariae provenientes aut ex tristitia dum fit cerebri restrictio, & consequenter humiditatis aquosae expressio, aut ex laetitia per quam fit cerebri dilatatio & suorum meatuum, & consequenter per canales dilatatos humiditatis aquosae effusio, & similiter sunt in ira propter caliditatem dilatantem & materiam mouentem ad exteriora, de quarum cura non est sermo in proposito. Aliquae autem sunt inuoluntariae. Et sunt duplices, quaedam natiuae, & quaedam temporales sive accidentales, quarum quaedam sunt antiquae, quaedam nouae. Et istarum quaedam sequuntur alium morbum sicut feb. apostemata cerebri & his similia. Quaedam uero non, & primae remouentur cum remotione egritudinum quas sequuntur. Secundae uero quandoque sunt continuae, quandoque interpolatae secundum differentiam causarum a quibus pendent et omnes istae sunt duplices, quaedam scilicet calidae & quaedam frigidae. Sunt tamen quaedam lachrymae accidentales consequentes ultimam debilitatem omnium uirtutum oculi & cerebri ac residui corporis quae accidunt in propinquo morti, & haec non sunt a uirtute expellente, sed fiunt a grauitate humiditatis inclinantis deorsum, quo etiam modo fiunt oregones in propinquo morti. Et de his saepe in prognosticis & in aphorismis & lib. reg. acut. fit mentio &c.

Causae lachrymarum in genere sunt quatuor. Defectus membri suscipiens scilicet oculi. Defectus membri mittentis, puta capitis & cerebri. Praesentia materiae. Et uiarum latitudo. Ex defectu quidem oculi dupliciter. Aut quia caro lachrymalis amota est, aut a generatione deficit, cuius defectus est dicendus morbus in numero diminuto. Aut est debilitas ipsius oculi, & maxime contentiuae.

Defectus autem membri mittentis quod est cerebri, aut caput saltem mediat, licet a toto corpore ad caput possit haec materia deriuari. Est autem in uirtute contentiua non potente retinere debitam, aut digestiua superfluitates multiplicante, aut in expulsiua non po-

rente

tentē insensibiliter resoluerē aut per loca cōuenientia expellere, & hoc propter malam complexionem ipsius cerebri frigidi & humidī secundū plurimum ex tempore aut ex natiuitate contractā, aut propter malam eius complexionem, aut propter apostema ipsius calidū, et frig. aut mixta aliquādo accidunt propter feb. maximē sanguineas faciētes multas materias euaporare ad caput, quæ deinde in humiditatem aquosam condensantur aut liquefaciunt materias ipsius cerebri, unde ad loca supposita fluunt. Præsentia autem materiæ est causa lachrymarum, aut ratione suæ multitudinis, aut ratione suæ acuitatis expulsiuam ipsius capitis stimulantis. Latitudo autem uiarum siue intrinsecarum siue extrinsecarū ad hoc adiuuat sicut ad cæteros fluxus. Et quādoq; causæ lachrymarum sunt primitiue, sicut frigus forte mordicando oculos, & exprimendo multo magis quæ calor. Similiter res sternutationem inducentes &c.

Signa lachrymæ sunt uisui nota. Defectus carnis lachrymalis etiam sensui subiaceret & haberet ex relatione, aut aliorum, quia fortē fuit abscissa ungula nimis profundē in lachrymalī domestico, aut quia impleuit fistula in eodem quæ sua sanie corrodit carnem lachrymalē, aut quia curata est cū corroditibus, aut causticantibus, aut quia hic defectus fuit à natiuitate contractus cum semper habuerit lachrymas.

Signa debilitatis oculi sunt quia oculus faciliē recipit superfluitates, unde fit frequenter ophthalmicus, aut quia naturaliter est eminens albus, cuius debilitas est à natiuitate contracta, & maximē cum parentes sui fuerint debiliū oculorū, est enim morbus hæreditarius. Signa sumpta ex parte cerebri sunt signa debilitatis digestiue, contentiue & aliarum uirtutum, nam si absolute debilis est, uirtutes omnes ipsius & ortorū ab ipso sunt diminutæ, si uerò digestiua debilis sit multiplicatur superfluitas in ipso. Si uerò contentiua sit debilis quæcūq; superfluitas in ipso aggregata etiā si pauca sit quamprimum fluit ad membra supposita. Sed fortasse quidam instabit, quia hoc est ex fortitudine expulsiuæ non ex debilitate contentiue. Ad quod dicendum, quod si hæ materiæ expellantur ab ipso per uias à natura institutas hoc arguit fortitudinem expulsiuæ. Si uerò fluant non per loca conuenientia sicut ad oculos, pulmonem, neruos arguitur potius debilitas contentiue q̃ fortitudo expulsiuæ. Signa autem ægritudinum quæ sunt causæ earum debilitatum cerebri, uel uirtutū eius malæ complexionis, malæ compositionis & apostematum habenda sunt ex his quæ in capitulis præcedentibus dicta sunt. Signa tenfius aut grauius ipsius, aut quia fortē hæ materiæ undique profluunt ab ipso cerebro.

Si uerò materia sui acuitate sit causa lachrymarū cognoscitur ex dolore acuto in capite necnon caliditate lachrymarum. Signa uerò latitudinis uiarū sunt priuatio signorum aliarum causarum, & quia uenæ in fronte & temporib. multum late et ample uidentur.

Signa lachrymarum quæ natiue sunt habentur ex relatione.

Signa lachrymarum in propinquis mortis sunt ipsa mortis propinquitas.

Signa lachrymarum calidarum habentur ex relatione ægri, aut quia ulcerant partes quas attingunt, nec-

non interdum frequens sternutatio ægri materia fluente per uias intrinsecas.

Signa quod sequantur alias ægritudines aut causas primitiuas sunt præsentia ipsarum ægritudinum aut causarum primitiuarum.

Prognosticum. Primum, quæ natiue sunt non curantur, nisi proueniunt ex superflua humiditate per decursum ætatiuum usq; ad ætatem iuuentutis corrigenda. Secundum, lachrymæ antiquæ difficillimē curantur. Tertium, lachrymæ sequentes alias ægritudines curantur si curari possunt, si uerò non, non. Quartum, lachrymæ diuturnæ frequēter perducunt ad fistulam lachrymalem. Vltimum, quæ proueniunt ex defectu totali uel maioris partis carnis lachrymalis non curantur, est enim caro lachrymalis frenum lachrymarum quæ remota etiam in corpore temperato fluere lachrymæ. Sed hic remanet dubium nondum discussum, à quibus partibus oculi lachrymæ fluant, an à lachrymalī domestico an syluestri. Ad quod dicendum quod à lachrymalī domestico secundum plurimum cum ad ipsum plures uiae & latiores terminentur. A lachrymalī autem syluestri, modicū cum ad ipsum pauciores uiae & strictiores scilicet uenæ & arteriæ temporales terminentur. Sed dicit Beneuentus, quod lachrymæ licet appareant in lachrymalibus, propriè tamen fluunt à duobus foraminib. paruis in fine pilorum palpebrarum, uno in palpebra superiori, altero in inferiori apud lachrymale domesticum. Et subdunt aliqui quod lachrymæ quæ ueniunt propter animi accidentia, scilicet tristitiam, iram, & huiusmodi profluunt à foramine inferiori cum hæc animi accidentia in corde fiāt, unde rationabilius est ut effundantur ex palpebra inferiori, quæ magis communicat cordi quam ex superiori. Quæ autem ueniunt per alias causas magis crebro communicantes defluunt per foramen palpebræ superioris. Ex iam dictis faciliē colligimus solutionem quorūdam problematum. Primum quare in risu fluunt lachrymæ & in tristitia nisi sit uehementē et subita non fluūt. Huiusmodi enim est causa quia in risu & gaudio fortis sit expansio humorum et caloris ad circumferentiam totius et etiam per uiam cuiusdam impressionis cerebri factæ in risu fluunt lachrymæ. In tristitia uerò paulatim facta non fluunt lachrymæ, quia fit retractio humorū & spirituum à circumferentia ad centrum, sed in subita fit compressio cerebri & expressio humiditatum. Et ex eadem causa in timore nō sunt lachrymæ, quia subito retrahuntur humores, & spiritus ad cor. Sed in ira quandoq; sunt lachrymæ propter uehementē agitationem, expansionem, & commotionē humorum ad exteriora, & hoc uerū est nō in principio ire, sed in processu cum calor magis expanditur.

Secundū problema, quare habentes oculos lachrymosos iudicantur luxuriosi. Sed hoc solum habet ueritatem in quibusdā, in quibus oculi sunt lachrymosi propter subtilitatem & mobilitatem humorum, & latitudinem uiarum, cum caliditate. Hæ enim sunt causæ concurrentes ad hoc ut homines sint luxuriosi.

Ubi autem habent oculos lachrymosos ex alijs causis problema non contineret ueritatem. Verum potius e contrario possumus dicere luxuriosos habere oculos lachrymosos, quia in ipsis debilitantur uirtutes omnes & propriè cerebri, quare merito abun-

dant lachrymæ, necnon cæteræ superfluitates.

Tertium problema, quare in forti intuitu alicuius obiecti sunt lachrymæ. Cuius causa est, quia in tali intuitu debilitatur oculus, merito fixiōis spirituum secundum habitudinem unā. Secundo à lumine & obiecto oculi ita fixi debilitatur, imò quandoque in eis fit etiam quidam modus doloris. Tertio musculi ita fixi secundum habitudinem unā extenduntur, & ita ipsis remanentibus extrinsecis per aliquod tempus fit humiditatum oculi expressio.

Quartum, quare lachrymæ ridentium apparent frigida. Dicendum istud provenire, quia propter expansionem caloris ad faciē in risu, redditur facies calida & lachrymæ minus calida quàm sit facies apparent frigida, sicut urina existentis in balneo, mixta super coxam suam apparet frigida, cū tamen sit calida. Ad hoc adiuvat, quia in ridente calore expansio ad exteriora lachryma redditur frigidior. In plorante uero est econtrario duabus causis suprascriptis contrariis.

Quintum, quare uiso aliquo obiecto delectabili uel audito fluunt lachrymæ. Huius enim causa est, quia ut dictum est in lætitia calor & humores exterius expanduntur & uis dilatantur, quare &c.

Cura lachrymarum. Si sequantur causas primitiuas aut ægitudines alias sit per remotionem illarum causarum & ægitudinum si remouibiles sint, & cum hoc intendatur confortationi membrorum, scilicet oculorum cum stipticis moderatè & prohibeatur fluxus humorum ad oculum debito seruato regimine. Si uero sequatur defectum carnis lachrymalis non integrum nec pro maiori parte, curantur, cum impositione pulueris citrini ab Auicenna & Rasi in diuisionibus laudati. Recipe sarcocollæ nutritæ, 3. 10. sic memithe, 3. licij, aloës, añ. 3. duas, croci. 3. 2. semis, spumæ maris, 3. s. aggregentur & subtilissimè terantur, puluis etiam factus ex thure siue fumo thuris, qui melior est sarcolla & aloë, est ad hanc rem etiam præstantissimus, sed medicina ista sint præparata cum aqua decoctionis myrti. Si uero lachrymæ proveniunt secundum quod est ut plurimum ex præsentia materiæ multæ aut acutæ cū debilitate uirtutum cerebri & oculorum et latitudine uiarum, aut ex pluribus de causis suprascriptis.

Cura completur sex intentionibus. Prima euacuat, secunda diuertit, tertia causas debilitatis cerebri remouet ipsumque confortat, quarta fluxum intercipit, quinta oculum confortat, sexta ordinat regimen conueniens sex rerum non naturalium. Prima intentio completur cum minoratione materiæ ut cū pilulis de hiera simplici, cui agaricus addi potest materia existente frigida, aut cum pilulis assaieret, si magis ad caliditatem declinat. Et fiat digestio in materia calida, cum iuleb ros. aut syrupo de papauere, si calidior sit. Si uero frigida cum melle rosaceo. Et breuiter cum exiccantibus in omni dispositione. Sed calefacientibus aut in frigidantibus secundum exigentiam materiæ & membrorum. Non autem cum subtiliantibus neque aperientibus imò inuisantibus & inraffantibus. Eradicatio autem fiat cum pilulis cochis aut hiera composita, G. in frigida, aut cū aureis in calid. & cum his mixtis in mixta. Diuersio autem completur cum lotionibus brachiorum & crurium & totius corporis fricatione descendendo, necnon cum balneis aeris, aut aqueis in quibus sudor prouocetur, Magnificè enim conse-

runt & consumendo materiam aquosam & diuertendo. Item cum masticatorijs et gargarismatibus ad hoc proprijs. Et tandem cum cætera non sufficiunt cum cauterio in commissura coronali, quod est ad hoc præcipuum, maximè in causa frigida. Tertia autem intentio, scilicet capitis confortatio dupliciter completur. Vno modo remouendo causas debilitantes cerebri. Alio modo confortando ipsius uirtutes & spiritus multiplicando & confortando cum sibi propria per uirtutem primam tertiam & quartam. Si ergo causas debilitantes cerebrum fuerint ægitudines aut causas primitiue remouebantur si remouibiles sint. Si uero fuerit complexio ipsius cerebri naturalis lapsa humid. & frigid. quæ est secundum plurimum causa humilimodi, tunc cum eisdem poterit corrigi cerebrum, & confortari sicut est sacculus ex milio & sale torrefactis corticibus citri, maiorana, calamintha, stecade, cipro & similibus. Quibus si maior fuerit frigiditas & humiditas addi posset semine nausturij & sinapis, qui sacculi calefiat super latere calido uino potente asperso, & applicetur parti capitis anteriori & medio, aut caput lauetur cum lixiuio exiccante & confortante. Ex cinere uitis & stipitum caulium in quo decocta sit maiorana, bachara, folia lauri & in fine cum uno cyatho uini potentis antiqui maluatici lauetur. Aqua ardens capiti applicita est in hac dispositione ultima. Confortatur etiam cerebrum, & mala complexio frigida & humida corrigitur cum interius sumptis, sicut theriaca, & mithridato, diambra, & electuario de gemis cum speciebus Mesue, pliris arcoticon Nicolai, & tandem cum aqua ardente cuius parum à 3. una usque ad 3. 3. bibatur & teneatur os clausum. Si uero fuerit mala complexio calida corrigitur cum frigidis & sic. sicut cū sacculo ex milio torrefacto & rosis, cuius si maior fuerit caliditas addantur sandali, sed fortè præstantius est hæc extrinsecà omittere, nā si calida fuerit cerebrum discrasiant, si frigida humiditatem expriment & augent lachrymas. Procedatur ergo cum interius sumptis sicut cum iuleb, ros, syrupo de papauere aut diacodion cui aliquid specierum diambra, uel diambri musci ad cerebri confortationem addi potest, & cum odoribus quos require in capitulo de catarrho.

Quarta autem intentio, scilicet fluxus interceptio, completur si materia fluat per uias extrinsecas constitutis, fronti & temporibus applicitis, de quibus sermo præcessit in ophthalmia. Sed proprium in hac dispositione in materia frigida est quod ponit Mesue ex inuentione Democriti. Recipe lanam succidam non ablutam, & combure & cinerē eius diligenter tere & ex eo cum albumine oui line frontem et tempora, mox enim materiæ fluxum amputat & lachrymarum. Multa huiusmodi dicta sunt superius in ophthalmia ualentia in causa calida, & frigid. & mixta. Sed his non contentis, interceptio fluxum ueniendum est ad sectionem uenarum sicut in ophthalmia dictum fuit. Si uero materia fluat per partē intrinsecā hæc non conferunt, sed interceptus est fluxus necessariò cum interius sumptis, ad quod optimè cōfert diacodion descriptione Nicolai dādo ex ipso, 3. s. cū 3. una uini albi calidi, in quo coctum sit olibanum per tres aut quatuor horas post cenam leuem. In causa uero calida sumat unā ex pilulis his. Recipe thuris, 3. unum, myrrhæ, opij, croci, ana grana quinq; fiant pilulæ cum syrupo de papauere

papauere. Grana quoque thuris similiter myrrhæ deglutita ad hoc conferunt & non est in his timor de stupore & propterea ab ipsis & similibus non est inchoandum, & multa alia remediorum genera ad hoc require in capitulo de catarrho. Quinta intentio, scilicet oculi confortatio completur cum rebus mensuratis stipticis præcipue cum puluere Rasis ualente in causa mixta. Sed in causa calida remoueat piper, & ex hoc fieri colliri um cum aqua myrti cõfert. Et ad hoc iuuat puluis tutiæ ablutæ solus cum aqua myrti. Item puluis ossium mirobalanorum combustorum, cum dicta aqua. Itē Recipe tutiæ præparatæ cum aqua myrti. 3. i. coralli albi & rub. ossium mirobalanorum chebulorum combustorum, sumach gallarum, aloës, olibani, opij ana. 3. s. pulueres subtiliter triti misceantur cum aqua infusionis dragaganti & gummi arabici & est optimū. Vltimum cui nō est par per descriptionem Mesue ex inuentione Zri zes regis Medorum conferens lachrymis, ardori, asperitati oculorum & ferè omnibus eggritudinibus ex causa calida, & etiā aliquid in mixta & confort principio cataractæ, & qui uidet unam rem quasi duas. Recipe sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris diebus pluribus. 3. 4. dragaganti albi, olibani, scoræ ferri, margaritarum nō perforatarū ana. 3. i. spicæ indi, cadmiæ, auri & argenti, acaciæ ana. 3. s. amyli, cerusæ ana. 3. 3. tutiæ præparatæ subrubeæ. 3. tres, tere omnia cum succo granatorum acetosorum et fac sicari sicut prius, deinde cum aqua infusionis hueg, id est acori, ultimò cum aqua solatri, deinde pone camphoræ. 3. unam, sacchari albi, aur. i. deinde tere ultima cõtritione, et fiat ex medietate eius sies cum aqua ros. ex alia medietate alcohol subtilissimus & possimus etiā eo uti cum albumine oui & lacte etiam mulieris, est enim optimum confortans oculū. Sed nota quod pulueres præstantiores sunt in lachrymis quia fortius imprimunt, & etiam magis oculis inuisantur & adhærent si non faciant ardorem. Aqua tamen ardens secū dum quod diu expertus est quidam ex socijs confort optimè ad exiccandas lachrymas in causa multū frigida & humida si lachrymale cum hac balneetur aliquoties in die. Sed querit aliquis quare medicamina applicanda oculo in lachrymis, imò in omni passione oculi nisi ubi sanguis fluere & ubi etiā timeretur de exitu uicæ debent esse commensurata stipticis & non fortis. Et in alijs membris cum uolumus cõstringere aut repercutere utimur fortiter stipticis. Dicendum quod oculus fortificatus est ille qui lachrymas principaliter cõstringit & retinet. Fortificatur autē per stiptica mensurata & non per fortia. Quod si quis instaret etiam de brachijs & cæteris membris. Repellunt enim à se uasa confortata stipticis pharmacjs. Dicet quod non est similitudo quia in brachio & pluribus alijs membris similibus materiæ fluunt per uerri, imò & ligaturæ repercutientes, sed super oculo nō sic, unde melius est in eo intendere omnino ad confortationem magis quàm ad ultimā stipticicatem ipsū debilitantem. In materia autem fluente ad oculos appetemus super ujs scilicet fronte & temporibus excutemus stiptica, imò ferè sic est in omni membro, applicamus fortiora stiptica super ujs per quas materia fluit quàm super parte recipiente. Ex his inferitur opiata esse uitanda quantum est possibile. Sexta & ultima

intentio, scilicet debitum regimen perficitur ut dicimus in catarrho.

Cum lachrymales oculorum anguli semper humidi uidentur, patiens quotidie ieiunus ingrediatur balneum, & in oculum istum alcohol mittat. Rec. tutiæ drach. 10. coralli rub. mirobalanorum citrinorum, fricati aloës, omnium ana drachmas 2. piperis, drach. semis. fiat ex eis puluis qui assidue mittatur in oculo.

In hoc capitulo ponit curā lachrymarum. Et primò curat per balneum de quo dictum fuit, & potest esse balneum aqueum & æreum ad exiccandum & diuertendum materiam, secundo ponit curam per puluerem subtilissimum in oculo ponendum. R. tutiæ. 3. 10. corallorum rub. frigid. in primo, sic. in secundo, mirobalanorum citrinorum, aloës ana. 3. 2. piperis. 3. s. fiat puluis & ualeat in causa mixta & remoto pipere ualeat in calid. & sic patet textus &c.

DE DEBILITATE VISVS Caput. XXVIII.

Debilitas uisus, nocuentū, defectio tenebrositas, sunt termini synonymi huius dispositionis de qua diuersi autores sub his diuersis uocabulis determinant, quæ debilitas uisus diffinituè est actio uisus diminuta corrupta uel ablata uel læsio uisus diminutè corruptè uel ablata, nā cum Rasis nō faciat aliud capitulū de corruptione uisus, ablatione congruū est ut hoc cap. sit commune his trib. modis lētionū. Ex quibus inferi hanc debilitatē esse accidēs licet etiā possit esse morbus impediendo operationes uirtutum interiorum cerebri saltē per communitatem.

Sed pro terminorū declaratione, sciendū est actionē tripliciter lædi, scilicet diminutè, corruptè, & ablatè. Actio quidē ablata est cū omnino auferi sicut in uisu cecitas, et in appetitu omnimoda ipsius priuatio et dicit mors appetitus. Actio corrupta est actio nō cōueniens alicui indiuiduo speciei humanæ naturaliter disposito siue sibi sano, ut exēpli gratia in appetitu, appetitus carbonū & similitū nō cōuenientium speciei humanæ, & in uisu uisus unius rei quasi duæ sint, & unius coloris pro altero. Actio secunda diminuta uel diminutè læsa est cū minui operatio à perfectione operationis conueniente homini sibi sano, non tamē mutans speciem. Sicut in appetitiua appetitus remissus, aut nimis intensus ut caninus. Et in uisui uisio remissa. Non tamē est simile, de uisui cogitatiua, & alijs quibus operationib. animalib. sicut de appetitiua & multis alijs. Nā ille potest lædi diminutè dupliciter, per remissionē, & intensiōē sicut in appetitiua. Sed in uisui et in quibusdā alijs nō credo hoc euenire, scilicet quod lēdantur per intensiōem, imò quanto est intensior, & acutior ratio est perfectior, etiā si quis haberet uisum lyncis, licet multi ducti apparētib. rationibus opinentur contrariū. Et hæc omnia intelligenda sunt ad bonum intellectum, dico enim non esse possibile uisionem lædi per incensionem cum fortitudine

uirtutis uisus quæ maxime arguitur ex tolerantia excellentium sensibilium, sed sine huiusmodi fortitudine potest lædi per intentionem, secus autem in appetitua & alijs, possunt enim lædi per intentionem etiam stante fortitudine appetitua. Sed contra, uisio acuta est causa imaginationum, quarum causa non est uisio obtusa, ergo &c. Antecedens est A. tertia tertijs tractatu 4. cap. de imaginationibus, ut cum uisua propter eius acuitatem uidet uaporem existentem intra corneam, quem oculus obtusi uisus non comprehendit, per huiusmodi enim uisionem imaginatur homo aliquod obiectum esse in medio coram pupilla, quod tamen non est. Et confirmatur, quia huiusmodi uisio est corrupta, ergo leſa. Assumptum probatur, quia pro uapore ad intra oculum repræsentatur obiectum extra oculum coram pupilla. De hoc autem dicitur in cap. de imaginationibus.

Quum triplex sit species debilitatis uisus iam dicta, uideamus subdiuisionem uniuscuiusque in suas species. Visio enim diminuta duas habet species, quarum, utraque tripartitur. Sunt enim quidam male uidentes de prope, & bene de longè. Quidam e contrario male de longè & bene de prope, quidam male de prope et de longè. Item aliqui bene uident in claro & res claras & albas. Et male contra, scilicet res nigras, & in obscuro, quæ dispositio dicitur noctilopa. Aliqui bene in obscuro & res nigras, & male e contra, quæ dispositio dicitur aliar. Aliqui enim male uident utroque modo. Similiter uisio corrupta duas habet species, unam circa sensibile proprium, sicut uidentes unum colorem pro alio altera circa sensibile commune. Et est quadruplex. Sunt enim aliqui errantes circa numerum, quibus unum apparet duo, & e contra. Aliqui circa motum & quietem quibus res mota apparet quiescens uel e contra. Aliqui circa figuram quibus quadrata apparent circularia & e contra. Et aliquibus istorum apparent omnia in medio perforata, & aliquibus secundum latus abscissa. Aliqui errant circa magnitudinem, quibus res magnæ apparent paruæ & e contra. Quinto aliqui errant secundum situm, licet non sit sensibile commune aut proprium, de quo forte quis mirabitur cum distantia & propinquitat pluribus, sensibilibus possint sentiri, & istorum aliqui iudicabunt res semper magis de prope quam sint. Aliquando omnia magis distanter quam distent. Actio autem ablata non habet species nisi quod aliqui sunt uidentes aliquid luminis, licet nihil discernant. Et aliqui omnino nihil uident. Sed hæc ultima species proprie dicitur actio ablata, prima autem improprie & apud communitatē. Et istæ omnes species aliquando sunt ex tempore, aliquando sunt ex generatione contractæ.

Causæ debilitatis uisus in genere sunt duplices, quædam per communitatē, & quædam per essentiam. Per communitatē dupliciter. Aut à toto. Aut à membris particularibus, scilicet stomacho, cerebro, & ortis ab eo matrice & cæteris. Per communitatē à toto potest fieri debilitas uisus ex omni genere malæ complexionis, sine materia, & cum materia communicante oculo sub forma humoris aut sub forma uaporis et fumii. Ex caliditate enim superflua totius accidit debilitas uisus, sicut in multum febrilentibus, aut alio modo extreme calefactis, tum propter caliditatem resoluentem spiritus, tum propter uapores ad o-

culos delatos. Imò in febribus non solum accedit diminutio uisus, sed aliquando corruptio cum existimant se uidere aliqua quæ non sunt, & hoc propter uapores coram ipsa crystalloide situatos huiusmodi res repræsentantes. Ex superflua etiam humiditate & frigidityte accedit debilitas uisus, ut in hypofarica chronica spiritibus incrassatis & paucificatis. Et ex omnibus causis addentibus repletionem corporis superfluam, siue quo ad uasa siue quo ad uirtutem potest accidere debilitas in uisu. Accidit tertio ex uementi inanitione & siccitate, de qua Rasis in litera, sicut in ethicis, aut alio modo consumptis propter spirituum uisibilibus & humorum paucificationem & tunicarum excitationem. Et propterea in consuetudine tibus accedit debilitas uisus spiritibus resolutis & humido exicato. Siccitas etiam cum materia melancholice maxime obest spiritibus uisuius tanquam sibi maxime contraria ut superius in melancholia, licet frequentius uisio lædatur à phlegmatica. Est secundo debilitas uisus per communitatē à membris particularibus sicut à stomacho frequentius eueniens propter ipsius malam complexionem frigidam & humidam, cum materia phlegmatica ad caput uaporante, de qua Rasis in litera, licet per presentiam cuiuscunque materie in stomacho existentis potest actio oculi diminui & corrumpi. Item per communitatē à capite propter omne genus ægitudinis, scilicet complexionis, compositionis, unitatis & propter apostem, sed maxime cum hæc ægitudines sunt in parte anteriori cerebri magis oculo communicante. Nam partes integrantes oculi secundum magnam partem à parte anteriori capitis oriuntur. Unde propter illius partis ægitudinem actio uisus corrumpitur, diminuitur, & cum ultimanatur, aufertur. Maxime autem uisus debilitas accedit per communitatē à nervis opticis ad hoc ordinatis ut deferant spiritus uisibiles à cerebro ad oculos, & e contrario à oculis ad cerebrum, scilicet ad sensum communem species uisibiles. Et propterea in medio antequam exeat, in cerebro coniuncti fuerint, siue cruciuntur siue non. Propter ergo ipsorum nocumētā, ut cum spasmanatur aut mollescantur, aut discontinuantur, accidit frequenter ut unum appareat duo. Cum autem oppilantur non totaliter diminuitur uisus, si totaliter, aufertur. Similiter cum patitur apostem, aut solutionem continui secundum plurimum uisus aufertur, & propterea contusiones & incisiones factæ in parte anteriori cerebri frequenter uisum minuunt, corrumpunt & auferunt. Est etiam debilitas uisus per communitatē secundi paris neruorum cerebri uenientium ad compositionem septem musculorum oculi, propter quorum nocumēta uisus magis corrumpitur quam minuitur, aut auferatur, faciunt enim frequenter unum apparere duo, & etiā per ipsorum nocumēta oculi obliquantur. Et similiter potest uisus impediri per communitatē à matrice & cæteris membris, sicut à palpebris cum patiuntur scabiem aut alias ægitudines sibi proprias. Similiter à carne lachrymalis cum minuitur & cum lachrymale fistulā incurrit. Causæ autem primitiue sunt quæcunque possunt huiusmodi nocumēta totius membrorum particularium aut ipsius oculi facere aut conseruare. Causæ uero debilitatis oculi per essentiam sumuntur à quatuor, scilicet à compositione oculi, spiritibus, tunicis, et humoribus.

A compositione

A compositione quidem ut cum nimis magnus aut nimis emens, nā propter eminentiā melius uidet in obscuro q̄ in claro, melius de propēq̄ de lōgē, melius res nigras quā albas &c. Ecōtra aut oculus profundus se habet in omnib. Licet absolute ceteris parib. oculus profundus se habeat melius in omnib. istis q̄ oculus emens, sicut et oculus paruus respectu cuiuscūque uisibilis melius se habet q̄ oculus magnus. Secundō causae debilitatis uisus per essentiam sumunt à spirib. nam quandoq̄ multiplicantur, quandoq̄ paucificantur, quandoq̄ sunt crassi, quandoq̄ subtiles, quandoq̄ clari, quandoq̄ turbidi, quandoq̄ uniti, quandoq̄ disgregati. Causae autem multitudinis spirituum sunt multitudo humorū & nutrimenti cum bonitate membrorum principalium & sibi deseruiētium, & paucitate resolutionis ipsorū. Paucificationis uerō sunt causae contrarię. Et coitus paucificat spiritus. Et deterior est paucitas spirituum q̄ multitudo eorundē. Licet multitudo quādoq̄ noceat, cum ipsis multiplicatis nō sit liber eorum transitus per uias angustas. Et quia propter multitudinē sunt minus paruī, hoc tñ rarissimē accidit, propterea dixit A. quod eorum multiplicatio est melior usus uel res &c. Causae uerō crassitiei ipsorū est sanguis crassus est quo generant frigid. & humid. & permixtio uaporum cum eis postquā geniti sunt & econtra. Causae subtilitatis sunt subtilitas sanguinis, calid. & sic. & eorum depuratio à uaporib. Mediocritas tamē in crassitie & subtilitate est melior, & propterea uitada sunt prēbetia nutrimentū nimis crassum & subtile, & quēcūq̄ preter modum calefaciunt, infrigidant, humectant, & exciccat. Nec ualet si arguas, quia calid. & sic. plerūq̄ in crassant humores resoluendo partes subtiles terreis remanentib. & ita poterit esse in spiritib. Dicitur quod nō est similitudo, quia spiritus sunt subtilissimi naturę aēreę, apti facillimē per calid. & sic. transire in naturam ignēā, & sic magis subtiliari. Causae aut turbulētis ipsorū est turbulētia sanguinis ex quo generant, & turbulētia uaporū secū permixtorū, scilicet postq̄ geniti sunt, sicut econtra causae claritatis sunt claritas sanguinis, & eorū à uaporib. depuratio. Causae aut primitiue sunt quēcūq̄ generant sanguinē turbidū & quēcūq̄ ipsum turbidat sicut omnes qualitates primae modū excedētes. Et ecōtra, claritatis sunt causas in obscuro cum debita tēperie sicut econtrariō nimia luciditas & aēris calid. superflua est causa disgregationis. Et ex his possumus uidere causas sex specierum diminutionis uisus, & causas bonitatis uisionis. Nam si spiritus sint multi clari mediocres sit optima uisio de propē & de lōgē in claro & in obscuro, & respectu cuiuscūque obiecti. Habētes aut spiritus his contrarios scilicet paucos obscuros nimis crassos aut subtiles econtrariō malē se habent in omnib. huiusmodi dispositionib. Habentes uerō spiritus multos obscuros & crassos bene uidēt de lōgē, de propē uerō malē in obscuro, & albas, malē nigras, bene in claro, obiecta excellentia sicut aspectum solis melius quā habētes spiritus multos & claros et mediocres in substantia. econtrariō se habent in omnib. oculi habentes spiritus his contrarios, scilicet paucos subtiles & claros, posset etiam esse tanta paucitas spirituum & ob-

scuritas quod omnino uisus auferret, sicut in propinquis morti, & in quibus est integra oppilatio neruorum opticorū, disgregatio etiam spirituum minuit uisionem. Sicut econtra unio perficit nisi modum excedant, quod rarissimē accidit. Et omnes hae causae sunt aut à principio generationis aut ex tēpore cōtractae.

Tertiō sumuntur causae debilitatis uisus per essentiam à tunica oculorum. A cōiunctiua quidem cum diu passa est ophthalmia, licet aliqui ophthalmici clariius uideant quā ipsi sani. 31. problematum problemate 9. nam multis lachrymis fluentib. depurantur humores oculi & spiritus redduntur clariiores. Ex no cumento etiam corneae debilitatur uisus, corrumpit, & auferitur, cum enim patitur exituram & ulcus, si sit in tota cornea uisus auferitur, si partem pupillae occupet, uisus diminuitur, aut corrumpitur, & similiter cū remanet ex ulcere cicatrix aut aliud uestigium, si sit in medio apparent obiecta perforata secundum aliquā partem. Si in extremis coram pupilla, apparent obiecta diminuta secundum aliquā partem. Et quadrata quandoq̄ apparent rotunda propter diminutionem uisionis, quia anguli non uidentur, quod etiam accidit cum obiecta sint distantia. Si uerō cornea sit colorata colore rub. propter artafari apparēt obiecta rubra. Si uerō colore citrino ut in histeritia, apparēt omnia citrina & sic erit actio corrupta respectu sensibilis proprii, tunc enim accidet de speciebus ad oculum delatis sicut accidit de radijs solis ingredientibus per uitrum citrinum aut rub. apparent enim rubei aut citrini, nonnunquam etiam cornea excicatur aut humectatur superflue, ex quibus perdit paruicatem, & est causa diminutionis uisus, aut ablationis. Et quandoq̄ etiam uapor existēs coram pupilla siue naturalis siue accidentalis sicut in principio cataractę est causa corruptionis uisus secundum situm, nam aliquid iudicatur coram pupilla quod non est. Hic autem uapor & cataracta non solum possunt esse corneae adherentes, sed etiam uueae & telae araneae & in quocūq̄ loco inter corneam & crystalloidem. Aliquādo propter solutionem continui in cornea oculus nō potest tolerare lumen nec uidet in claro licet fortē in obscuro, ex eo quod transitus luminis nō gradatim sed magis subito peruenit, scilicet ad crystalloidem ut optime sentit A. cap. de debilitate uisus. Quandoq̄ fortas se haec ratio dubia uidebitur, cum semper lumen subito penetret ad crystallinum, & non gradatim, neque in tempore. Sed per gradationem illam intellexit A. modificationem quādam luminis factam per partes oculi, quae sunt ante crystalloidem quae modificatio quomodo fiat subito à potentia finita difficile est uidere. Sed credo sicut species subito multiplicantur, ita subito possunt moderari cum sint intentionales, sicut radij transeuntes per uitrum subito modificantur & colorantur secundum colorem ipsius quantum ad apparentiam. Et quandoque cornea rumpitur & egrediuntur humores & uuea. Ex defectu etiam uueae quae naturaliter debet esse nigra debilitat uisus cum est minus nigra debito sicut enim oculus efficit albus & si nimis nigra sic efficitur niger. Et melius uidet in claro sicut ei contrarius in obscuro. Aliquando foramē uueae nimium dilatatur & dicitur alinitas. Aliquando nimium constringitur, & tunc pupilla apparet parua & dicitur constrictio pupillae, quae cōstricta natura

naturaliter melius uidet omnia obiecta quocūq; modo situata q̄ oculus pupillæ latæ, licet habentes pupilam latam melius uideant in obscuro q̄ in claro, melius magna q̄ parua, melius nigra quàm alba. Et melius de prope q̄ de longe, & semper iudicant obiecta minora q̄ sint, pupilla uerò parua e contrario se habet in omnib. Ex hoc patet causa corruptæ uisionis respectu magnitudinis. Sed contra arguitur quod pupilla magna magis de prope uideat quàm parua. Sit obiectum æquale ita propinquum utriq; pupillæ ut à neutra uideri possit propter propinquitatem, elongetur paulatim æqualiter ab utraq; tūc manifestū est quod conus pyramidis huius rei citius recipietur in pupillam magnam quàm paruam, ergo citius & magis de prope uidebit ipsum. Ad quod dicit quod argumentum concludit de obiectis maiorib. pupilla, sed nō de minorib. aut æqualibus, nec ualet argumentum, magis de prope uidet, ergo melius uidet. Et si argueretur quod obiecta minora pupilla de æque bene secundū conum suæ pyramidis recipiuntur in pupilla magna sicut in parua, ergo æquē cito ab utraq; uideri debēt. Dicitur negando consequentiā non enim sufficit sola receptio coni pyramidis in pupilla, sed debita oculi dispositio quæ est deterior in pupilla magna q̄ in parua, neq; etiā species trāseunt ita unite in magna sicut in parua. Et si inferatur ulterius quod quāto pupilla est minor deberet melius uidere, speciebus transeuntibus magnis unitis. Dicit quod nō sequitur, quia potest esse ita parua quod extremitas pyramidis transeuntis per pupillam prius deperderetur antequam attingat crystallinum. Et hoc tenendo quod species rei uisibilis deferantur ad crystallinum sub forma pyramidis. In tela aut aranea potest esse omne genus ægritudinis, unde per nocumentum eius potest uisus diminui, corrumpi, auferri, sed tamen de nocumento eius autores non fecerunt mentionē tam specialē, eo quod est in profundo constituta nō ita subiacens uisui, aliarum uerò tunicarum præter corneam, uueam & telā araneam nocumentum non est primitiuū sed mediatum, lædunt enim uisum communicando nocumentum his de quibus sermo præcessit. Credendum tamē est quod omnes possunt pati malam complexionem cuiuscunq; generis, malam compositionem, solutionem continui & apostemata. Quarto & ultimò læditur uisus merito humorū. Albugineus ergo uel multiplicatur nimis, & hæc est una ex causis propter quā oculi sunt nigri, aut paucificat aut naturaliter aut propter ægritudinem chronicā uel acutam ipsum resoluuntur. Et hæc est una ex causis propter quam oculi sunt glauci, sicut sunt oculi multorum ægrorū & conualescentium qui postea sanitati restituti habent oculos nigros. Et nō est dubium quod isti uident melius de prope quàm de lōge, melius nigra quàm alba melius in obscuro quàm in claro, contrarij autē contrario modo se habent. Aliquando albugineus obscuratur aut propter uapores aut aduentum alterius materiæ ipsum turbidantis, aut quia propter aliquam ægritudinem taliter mutatur in substantia eius absq; aduentu alterius materiæ, & tunc malè uidet in omni dispositione, licet minus malè res claras in claro, imò aliquando hac causa uisus auferatur aliquando autē corrumpitur ut cum est in eo præsentia uaporis aut cataractę diminuat, propter quod existimatur aliquod obiectū

esse coram pupilla quod non est. Crystalloides uerò aliquādo magnificatur, aliquādo situatur uersus corneā. Et hæc duæ causæ sunt quod oculi apparēt glauci sicut contrariæ faciunt oculos nigros. Aliquando nimis subtiliatur & nō tolerat splendorem neq; bene uidet res albas, sicut cum in crassatur melius uidet in claro res albas, aliquando uerò obscuratur propter causas similes quæ dictę sunt in albugineo & in omni dispositione, malè uidet sicut cum est benè clarus est causa perfectæ uisionis, aliquando crystalloides non est situata ex directo pupillæ, & si est eleuata sursum aut deorsum magis debito unū apparet duo. Si uerò ad latera sit strabositas. Nocumentum autē uitrei ut dicit A. non est primitiuū sed lædit uisum pro quanto comunicat nutrimentum crystalloidi qui ab ipso nutritur si dat ipsi nutrimentum infectum aut opacum. Et propterea omnia uaporosa, inflatiua, turbidatiua sanguinē & spiritus sicut legumina, uina turbida, coepæ & huiusmodi sunt uitanda. Ex his ergo iam manifestæ sunt causæ oculorū, licet colorētur oculi frequenter secundum colorem cutis & complexionis dominatū,

Pro cuius rei ampliori notitia sciendum est constitutam & omnes alias tunicas præter corneā & telam araneā esse uerè coloratas, nō diaphanas, nō lucidas. Cornea autem & tela aranea sunt diaphanæ non coloratæ neq; lucide licet secundum G. tela aranea sit lucidissima, ut infra. Albugineus uerò & uitreus sunt diaphani, licet albugineus magis, non colorati nec lucidi. Crystallois autem sola inter ceteras partes est diaphana non colorata habens lucem propriam quæ ceteras partes oculi luminis susceptiuas illuminat, imò in quibusdam animalibus illuminat medium extrinsecum, sicut in catis, lupis, leonibus, serpentibus, bufonibus. Sed solum restat una causa sumpta ex multitudine spirituum, per quorū præsentiam oculus redditur glaucus & bene uidet in omni dispositione sicut per paucitatem spirituum oculus redditur niger & malè uidet in omni dispositione, quæ quidē paucitas spirituum accidit aut propter paucitatem nutrimenti aut dispositiones resoluentes aut propter oppilationem in neruis opticis, aut propter longum aspectum rerū albarum & lucentium sicut accidit iter agentibus per niues, & qui solem intuentur, aut propter longam moram in tenebris propter quam tādē spiritus paucificatur. Et hæc est una ex causis propter quam si quis diu contraxerit morā in tenebris, postea uenies ad lucem magnam subito excecatur. Illi enim spiritus qui paucificati fuerunt propter longam moram in tenebris propter lucem ualde intensam resoluuntur antequam alij succedant, & sic remanent cæci quæ cecitas deinceps auferri non potest cum de priuatione ad habitum non sit possibilis regressus. Quam rem Dionysius Syracusanus sæpe expertus fuit hoc modo, excecans multos quos diu in carceratos tenuerat.

Iam restat ut circa uisionē corruptā assignentur causę propter quid scilicet unū apparet duo, nisi enim effectus in proprias causas resolveremus, nō possemus eicurā debitā administrare. Sex ergo sunt causę quod unū apparet duo. Prima sumit ex parte uelocis & inordinati motus siue fluctuosi spiritum deferentis simu lachry rei uisæ, prius enim q̄ prima species recedat à sensu cōmuni in quo fit iudiciū imprimis secūda spēs eiusdē uisibilis delata per spiritū subsequente propter agitationem

agitationem in spiritu uisibili deferente, sicut apparet cum forma solis suscipitur in aqua uelociter fluente, apparent enim duæ formæ solis recepta noua forma in aqua antequam prima destruat, & sicut apparet gutta uelociter mota, quod sit una linea, & in baculo ignito uelociter circumducto quod sit circulus. Hoc autem accidit ebrijs, iratis, his quibus caput est contusum propter casum aut offensionem & quibuscumque ex quacunque causa sit hic motus inordinatus & fluctuosus spirituum.

Secunda causa sumitur ex parte humiditatis seu uaporis separantis spiritum uisibilem in duas medietates uel plures quod accidit etiam habenti solummodo unum oculum, & hæc separatio potest esse ante crystallinum in ipso crystallino, & post ipsum sicut accidit in rheumatismis & in principio aquæ.

Tertia causa, quando unus oculus magis quam alter contrahitur secundum rectitudinem aut propter spasmodum illius musculi qui est ad retinendum oculum aut propter contractionem unius nerui optici magis quam alterius aut alterius relaxationem, unde propter breuitatem uitæ simulachrum rei uisæ citius deferretur per unum neruum quam per alium ad sensum communem, & sic primo simulachro non corrupto in sensu communi reliquum subsequitur. Quarta causa est discontinuatio neruorum opticoꝝ propter spasmodum unius duorum neruorum aut amboꝝ, unde species non uniuertur. Quod etiam potest accidere à calu aut à percussione. Quinta causa sumitur ex parte unius oculi contorti sursum aut deorsum sicut in strabositate, non aut ad latera, quia in hac conuersione unius oculi sursum aut deorsum species delatæ ad sensum communem non uniuertur in coniunctione neruorum, sed transeunt separatæ, non autem est ita in contorsione ad latera, quia in hac neruus opticus non tantum contrahitur. Et hæc est causa quam assignat Arist. 31. problematum, problemate 7. Et G. 10. de utilitate particularum cap. penultimo, licet huiusmodi solutio multas patiarur instancias, quas gratia breuitatis omitto. Sexta causa dicta est superius de intictione lesu Hali, quædo crystallinus est situatus à magis sursum aut deorsum debito, quod credo intelligendum esse altero crystallino non similiter situato.

Superest dicere causas corruptæ uisionis respectu motus & quietis, respectu propinquitatis & distantie. Causæ enim quare quiescens apparet moueri, est motus fluctuosus & inordinatus spirituum de cuius causis dictum est superius.

His adde multitudinem uaporum permixtorum spiritibus qui sunt causæ inordinati motus spirituum sicut in uertigine & scotomia sufficienter dictum fuit, spiritus enim sequitur motum uaporum secum permixtorum, sed de hoc sufficiat quæ dicta sunt in uertigine.

Quod autem mora appareant quiescentia non credo contingere. Causæ autem quod distantia propinqua appareant, sunt causæ superius dictæ, quod magna apparent parua, quia si res magnæ apparent parua, etiam distantia inter oculum & rem uisam quam res uisæ sit erit magna apparebit parua, & per consequens quæ apparent distantia sunt causæ his contrariæ. Et forte propter hanc causam distantia & propinquitas non sunt sexum sensibile commune, sed ad magnitudinem reducuntur.

dinem reducuntur.

Signa debilitatis uisus absolute habentur ex relatione ægri. Quod si referre nesciat, aut si forte uelles ad excellentiam artis dicere quas ægritudines patitur consideranda oculum & omnes partes eius quantum pupilla sit dilatata, aut contracta, quàm bene sit clarus oculus, quàm bene moueatur, & consideranda dispositionem membrorum, per quorum communiter oculus posset lædi, & nunquid parentes eius fuerint debilius oculorum, nam medicus exercitatus sciet dicere quas ægritudines patitur, & quas uerisimiliter est incurusurus. Si uero oculus lædatur per communiter à toto uel à parte cognoscitur, quia præcesserunt ægritudines totius aut alicuius membri, cum quibus oculus est debilitatus, & quum augetur debilitas uisus, & contrario minuitur cum illæ minuuntur et quod debilitas secundum plurimum comunicatur ambo oculis, imò pluribus sensibus simul. Et si fuerint causæ calefacientes & exiccantes apparet oculi conuulsas & exiccatio, & læditur ex ieiunio, ab euacuatione, & ab aëre calido & sicco, & iuuatur à contrarijs, et interdum oculi apparent albi cum sumpto albugineo, cum prius fuissent nigri aut medij &c. Et si sint cum materia sicut in febribus humoralibus aliquando corrumpitur uisio uaporibus delatis ad oculum facientibus existimare aliquod obiectum esse coram oculis, quod non est, contra uero si fuerit à frigidityte & humiditate, & proprie si cum materia aderit inflatio oculi & forte cæcexia, iuuatur à calido, & sic ieiunio, euacuatione, nocetur à contrarijs. Et si fuerit per communiter à stomacho aderunt nocumenta stomachi.

Et si fuerit cum præsentia materiæ plegmaticæ patietur oculus imaginationes albas. Et si in stomacho fuerit præsentia cholere patietur imaginationes citrinas, & si melancholicæ imaginationes nigras, & secundum plurimum magis læditur stomacho pleno uisus quæ uacuo. Et sic discurre per matricem & alia membra. Si uero lædatur uisus per communiter ad caput hoc declarant ipsius capitis dispositiones præsentis aut præteritæ maxime in parte anteriori existentes. Et etiam quia non solum uisus læditur, sed secundum plurimum omnis sensus aut plures. Ponit tamē A. casum specialem quod propter nocumentum cerebri stat aliquando homo oculis apertis non potens claudere palpebras, nec uidens sed audiens, quod est propter nocumentum communicatum neruis optici & neruis mouentibus palpebras absque hoc quod communiceet quinto pari neruorum cerebri, quod potest esse à causa primitiua & à percussione, & similibus & à causa intrinseca aut à mala complexione frigida, & sic, & est quædam species congelationis. Si uero sit in uisu nocumentum per læsionem neruorum opticoꝝ, scilicet apostema oppilationem, solutionem continui, est secundum plurimum uisus ablatas, sed si propter apostemata, adeest feb. et si propter oppilationem adeest grauitas sine feb. & euenit subito secundum plurimum, si propter solutionem continui ipsa solutio est signum. Cognoscitur tamē oppilatio neruorum opticoꝝ fricando unum oculum & tenendo alterum compressum & uidere utrum in oculo fricato post fricationem aperto immediate comprehendatur pupillæ illius oculi dilatatio & contractio quibus apparentibus non est oppilatio cum spiritibus libere transcant, ipsi uero non apparentibus, adeest oppilatio.

oppilatio in neruis opticis, & tu postea experire in alio oculo tenendo primū compressum. Si uero lædatur oculus per cōitatem ad secundū par neruorū secundū plurimum impeditur motus oculi, & euenit strabotitas & frequenter unum apparet duo, strabotitate facta sursum aut deorsum. Et cū sit sursum, res uisa apparet magis infra. Et cum sit deorsum appareat magis desuper. Similiter si fiat ad latus dextrum, res uisa apparet magis in sinistro & e contra.

Sed nunc agamus de signis debilitatis uisus per essentiam.

Si ego fuerit propter malā complexionem aut cōpositionem aut magnitudinem oculi aut eminētiā sensui nota est, subtilitas uero spirituum comprehenditur quia uidet sine perscrutatione sicut e contrario in habentibus. Spiritus crassos requiritur perscrutari, aliter uehemens intuitus, & aliquandū obiectum intueri ad bene uidentum. Similiter subtiles non tolerant longam moram uisionis nec aspectum rerum lucentium nec mediū ualde luminosum, sed contra euenit habentibus spiritus crassos. Et hi non bene uident in obscuro sicut priores, & bene uident de longe, malè de prope, sicut subtiles e contrario. Spiritus autē turbidi malè uident secundum omnem dispositionē melius tamen in claro & res claras q̄ in obscuro & res niq̄ras & frequenter patiuntur imaginationes. Spiritus autem disgregati cognoscunt per causas ipsos disgregantes. Vt quia iter egerunt per niues & diu aspexerunt res lucentes & albas & immediatē post illud malè uident in obscuro. Auicenna uero reddens rationem huius, scilicet quod habentes spiritus crassos sicut fenēs bene uident de longē malè de prope, & habentes subtiles e contrario, dicit, quod si uisio fiat extra mittere, tunc radius uisualis exiens ab oculo & tendens ad rem uisā longinquā, si crassus est subtiliatur, et ad mediū reducitur proportionatum uisioni. Si subtilis est resoluitur, sed uidendo propinquā si subtilis est in sua subtilitate conseruatur, crassus autem non subtiliatur quantum est oportunum pro uisione, quare habentes spiritus subtiles melius uident de prope, sed habentes crassos melius de longē. Quæ opinio nullo modo saluari potest, nam per radium uisualē aut intelligunt spiritum uisibilem, estq̄ corpus sicut manifestē expressit Iesus Hali & Gentilis. Et tunc sequitur quod uisio nō fiat in instanti, imò exiger tempus ualde magnum, scilicet, antequā spiritus trāseat ad obiectum ualde distans, sicut ad cœlum, non enim postq̄ corpus est possunt transire in pleno nisi cum resistentia. Amplius, hic spiritus in tanta distantia, & in tam frequentibus aspectibus debent omnino consumi, et terea cum transeant per media distemperata, utputa per spheram ignis deberent corrumpi & sic uisio impediri. Rursus quomodo hæc corpora transirent per sphaeras cœli quæ nequaquā solui possunt nisi dare penetratio corporum, &c. Vltimò ex flatu uenti debet linea uisualis impediri uero simul impediēte aërem & spiritus. Non credo itaq̄ quod sit possibile uisionē fieri per exitū spiritus ab oculo ad rem uisā. Si uero per radium uisualē intelligant speciem ab oculo exeuntem ad rem uisā, quod tamen non placuit Gentili, tunc stabit difficultas eadem non soluta quam ipsi hoc ponēdo, soluere uolunt; non enim ap-

paret quomodo spiritus crassus subtiliatur propter exitum specierum, quæ sunt intentionales nihil resoluentes, aut minuentes de substantia oculi, aut spiritus. Præterea species intentionales quomodo possunt subtiliari aut incrassari? Præterea si species intentionales uadant ad obiectum, non propter hoc uidebitur obiectum, nisi similitudo uel species obiecti ueniat ad ipsum oculum, quare uidetur frustra in uisione tot species multiplicari. Si autem uisio fiat intus suscipiēdo, speciebus intentionalibus ab obiecto ad oculum transeuntibus, tunc dicit Auic. quod obiecto existente longinquo cristallinus multum commouet, ex qua fortis commotione si spiritus est crassus, subtiliatur & ad mediū reducitur. Spiritus autem subtilis nimium resoluitur, sed obiecto existente propinquo non fit glacialis motus ita fortis, & per consequens spiritus crassus non subtiliatur, sed subtilis bene uidet in sua subtilitate conseruatus, quæ opinio nisi haberet Auic. & reliquos autores ipsam defendentes, multum uideretur extranea, non enim apparet quare ex causa propter aspectum ad longinqua glacialis moueatur nō ab obiecto, quia eo quod distans est minus potest in glaciālem imprimere quā si propinquū esset, & sic ipsum minus commouere, non etiam a lumine mediū, quia siue obiectum sit propinquū siue longinquum idem est lumen alterans oculum glaciālem & spiritus. Fortē dicitur sicut placet Iacobo Forliuensi, quod licet sit idem lumen totale mouens oculum aspicientē de longē, & oculum aspicientem de prope: nō tamen uterq̄ oculus totaliter irradiatur, quia maior multitudo radiorum rectorum peruenit ad oculum distantem q̄ ad propinquum. Cōtra sit a. oculus, spirituum rectorum uidens b. obiectum ad distantiam bipedalem, manifestum est quod ab eadē multitudine radiorum rectorum illuminatur a. oculus simul uidens b. & c. Præterea omnes radij existentes in medio luminoso peruenientes ad oculum sub forma pyramidis perueniunt ad oculum, ergo omnes tales recti perueniunt ad oculum, ergo non maior quantitas radiorum rectorum peruenit ad oculū uidentis de longē q̄ de prope. Assumptum probatur quia simile est de radijs et speciebus uisibilibus, sed stante oculo fixo secundum unum situm eleuato uisibili, aut depresso, aut laterali moro: intra tamen distantiā in qua uideri possit semper species recte perueniunt ad oculum, ergo erit ita de alijs, sicut etiam in speculo omnes species obiectorum quomodocūq̄ situatarum, & omnes radij uenientes ad speculum recti perueniunt ad ipsum, ergo oculus ab æquali quantitate radiorum rectorum irradiatur siue uideat de prope, siue de longē. Præterea si fieret uisio in medio obscuro, obiecto existente in claro, sicut est possibile, non apparet quod habēs spiritus crassos deberet melius uidere de longē quā de prope, quia spiritus sui non subtiliarentur a lumine mediū. Et in hoc casu habens spiritus subtiles debet longius uidere, quā habens spiritus crassos, quia spiritus sui subtiles in medio obscuro et frigido in sua subtilitate conseruabuntur & crassi non subtiliabuntur, imò incrassabuntur. Nec etiam potest dici quod spiritus magis subtilientur propter obiectū longinquū, quā propinquū propter laborem, cum tātus labor & difficultas sit uidere longinqua magna sicut propinqua pauca, quæ

isio non fit per actum spiritus
sed uisum aut spiritus crassi
longam distantiā subtiliatur

quæ ratio placuit Iacobo Forliuensi, imò æqualis difficultas est uidere quæcunq; obiecta nimis deprope, sicut nimis de longe, cum neque propter nimiam propinquitatem, neq; propter nimiam longinquitatem possint uideri, ergo in uidendo deprope & de longe spiritus æqualiter debet subtilitari. Latitudines enim difficultatis uisionis propinqua & remota sunt æquales, cum ambæ ad non gradum potentia uidendi terminentur. Vltimò si propter uisionem ad longinqua spiritus crassus subtiliaretur sequitur quòd immediatè post illud cum factus est subtilis deberet bene uidere deprope, cuius oppositum experimur. Solent ergo perspectiui soluere dicentes, quòd quanto conus pyramidis rei uisus est acutior, tanto magis imprimit in uisum, & spiritum uisibilem amplius debilitat, sed conus pyramidis obiecti quanto est distantior tanto est acutior, ergo quanto est distantior, tanto magis imprimit in uisum, & debilitat spiritum uisibilem. Cum ergo spiritus subtilis sit debilius spiritus crasso magis debilitabitur ex distantia obiecti, q̃ spiritus crassus, quare non potest ita de longe uidere sicut spiritus crassus. Ecòtra autem obiecto appropinquante conus pyramidis est obtusior, & per consequens minus imprimens in oculum, & propterea cū maiori propinquitate ab oculo spiritus subtilis poterit uideri cui parua impressio sufficit ad uisionem: nō autem ab oculo habente spiritus crassos cum maior pro causanda uisione necessaria sit impressio. Sed contra, sequeretur fieri saltum de extremo ad extremum sine medio, & latitudinē actionis subito deperdi, quòd patet, quia obiecto ab oculo recedente, donec in fine horæ non uideatur, nam continuè intenditur per totam horam impressio obiecti in oculum, quæ tamen in fine horæ est sub non gradu. Secundò sequitur, quòd habens spiritus crassos uideret obiecta minora, quàm habens spiritus subtiles, consequens contra experientiam. Probatur consequentia, quia quanto obiectum est minus, conus pyramidis est acutior ceteris paribus, & per consequens magis impressiuus iuxta responsionem hanc, ergo, &c. Præterea lucidū siue album quanto est propinquius oculo, tanto agentius imprimit in oculum, ergo responsio falsa. Et cōfirmatur, quia omnis actio sit per contactum & debitam approximationem agentis ad passum. Sed quanto obiectum magis appropinquat oculo magis sibi approximatur, quare, &c. Quidam clarissimus doctor resoluit hos effectus in corrugationem pupillæ, id est partis corneæ ex directo pupillæ uel pupillæ, id est, foraminis uuæ, dicit quòd in sumptione humidi substantifici, quapropter minoratur secundum quamlibet partem sui. In his ergo conus pyramidis rei uisæ non suscipitur nisi in parte nō corrugata, quæ quia parua est, non potest suscipi nisi sit paruus: nunc autem quanto est distantior, tanto conus pyramidis est acutior, & per consequens melius suscipitur in parte non corrugata parua, & per consequens melius uident de longe, quàm deprope. Contra, quælibet pars pupillæ siue corrugata, siue nō corrugata est diaphana, ergo in qualibet parte & in tota superficie suscipitur conus pyramidis, teneet consequentia, & assumptum manifestū est ad sensum. Secundò sequeretur, quòd deberet melius ui-

dere obiecta parua quàm magna. Consequens est contra experientiam, probatur consequentia, quia conus pyramidis obiecti parui est minor, & per consequens melius suscipietur in parte non corrugata. Tertiò sequeretur, quòd isti deberent curari per humectantia, consequens est contra experientiam, nam curantur per exiccantia. Quartò, quòd hecticus fenestutis aut consumptus ex egitudine ex simili fundamento deberet melius uidere de longe q̃ de prope, consequens est contra experientiam, ergo, &c. Quintò, hæc opinio est insufficiens cum reperiantur iuuenes melius uidentes de longe q̃ de prope, & ecòtrario aliqui quorum effectuum causa non potest resolui in corrugationem aut non corrugationē pupillæ. Item sequitur quòd senes deberent què bene uidere obiecta minora sua pupilla, similiter iuuenes quod est cōtra experientiam. Illorum autem error qui resolverant hos effectus in spiritus magnos & paruos, tunicas & humores crassos & subtiles faciliè deprehenditur. Credo igitur aliter esse dicendum. Pro cuius rei declaratione præsuppono primò uisionem fieri per pyramidem uenientem ab obiecto ad oculum, cuius basis est in obiecto, conus in crystalloide, hoc suppositum communiter sentiunt philosophi & perspectiui. Secundò suppono, quòd obiectū potest esse ita distans, ut non uideatur, eo quòd conus pyramidis non attingat ad crystalloidem in qua fit uisio. Et si attingat ita debili ter imprimit, ut non sufficiat ad uisionem, similiter obiectum potest esse ita propinquum, ut non uideatur, eo quòd conus pyramidis, licet perueniat ad pupillam, non tamē peruenit ad crystalloidem sub forma pyramidis impeditus à foramine uuæ, aut si perueniat ita debili ter imprimit, ut non sufficiat ad causandum uisionem. Hoc suppositum experientia probatur. Tertiò suppono, quòd respectu cuiuscunq; obiecti uisibilis est signanda certa distantia in qua optimè uideri potest, ita scilicet, quòd nec sub maiori illa, nec sub minori in eodem medio ita bene uideri potest, quæ distantia non est eadem respectu omnium oculorū. Si enim respectu alicuius obiecti pedalis distantia sit optima oculo temperatissimo habenti spiritus satis multos mediocriter subtiles & optimè illustres cum ceteris circūstantijs facietibus ad optimam uisionem. Maior distantia requiritur habenti spiritus crassos, cum qua scilicet, maior distantia obiectum fortius imprimat in oculum, & minor distantia requiritur habenti spiritus subtiles, cum qua minori debilius fiat impressio. Quartò suppono, quòd respectu cuiuscunq; obiecti est signanda certa distantia in qua illud obiectum ex natura sua fortissimè imprimit in oculum impressione faciente ad uisionem & oculum debilitante, quòd non prouenit nisi quia respectu cuiuscunq; obiecti est signandus conus suæ pyramidis determinatæ acuitatis, cum qua optimè imprimat in oculum, ita quòd maior aut minor non ita imprimeret in oculū. Hoc experientia patet, & pro parte sequitur ex secundo. Et hæc distantia non est illa, de qua dictum fuit in tertio: ista enim diuersificatur secundum diuersitatem oculorū: hæc uerò est una & eadem ex natura rei & respectu omniū oculorum. His præmissis soluitur problema, nam respectu cuiuscunq; uisibilis habenti spiritus crassos, requiritur illa distantia in qua obiectū fortissimè imprimit in oculum impres-

Primo autem quæ hæc modo fuisse

sione faciente ad uisionem optimam illius obiecti ab oculo, quia spiritus crassus non facile patitur ab obiecto. Et hec distantia est maior illa quae requiritur oculo temperato ad uisionem illius cum minor impressio ad eius optimam uisionem sufficiat. Et quae requiritur oculo temperato est maior requisita habenti spiritus subtilis, huic enim ualde parua impressio sufficit ad uisionem, & a magna oculus debilitaretur. Cum hoc tamen stat quod oculus temperatus melius uideret in omni distantia quam habens spiritus crassos, & quam habens spiritus subtilis. Et similis solutio assignanda est respectu habentium tunicas & humores crassos aut subtilis. Contra sequitur quod oculus spirituum subtilium deberet uidere ad maiorem distantiam, quam oculus spirituum crassorum, quia ultra distantiam in qua oculus spirituum crassorum exigens fortissimam impressionem optime uidet, remittitur impressio usque ad non gradum, ergo erit deuenire ad impressionem optime proportionatam oculo spirituum subtilium. Ad quod dicitur quod non solum sufficit determinata impressio ab obiecto ad bene uidendum, sed etiam determinata coniacuitas oculis proportio nata. Exigit etiam oculus spirituum subtilium conum obtusorem, & oculus spirituum crassorum conum acutiorem, & temperatus medium inter hos. Contra sequitur quod oculus spirituum crassorum posset uidere obiecta magis parua, quam oculus spirituum subtilium, postquam exigit conum acutiorem, nam quanto obiectum est minus ceteris paribus conus est acutior. Negatur ad quod deducitur, nam licet ratione coniacutioris debeat melius uidere: tamen deficit impressio sufficiens quae debet esse fortis in oculo spirituum crassorum, & debilis in oculo spirituum subtilium: quanto enim obiectum est minus ceteris paribus, tanto minus imprimit, sed ubi obiectum paruum ab utroque uideri posset maior distantia exigeretur oculo spirituum crassorum, quam oculo spirituum subtilium. Et ex hac opinione inferitur, quod non omne agens quanto est propinquius passio tanto fortius agit, licet enim illud sit uerum in actione reali non est uniuersaliter uerum in actione spiritali, ut docet experientia.

Signa debilitatis uisus propter nocuentia tunicae, aut humorum sumuntur, sicut statim in exemplo declarabo, occurrit tibi fortis conquerens de mala ualitudine oculorum: debes igitur ipsum oculum diligenter aspicere notando compositionem quam emittens sit & quam magnus. Quod si uideres eminentiam praeter modum ac magnitudinem, nunciare potes ipsum esse debiliem oculorum, & procliuem in multas passionis de repletionem, & quod ad praesens non habet perfectum uisum. Postea etiam considera utrum oculus sit strabosus, & si strabositas sit ad latus dextrum tunc ipsi nuncia quod res uisae debent ei apparere magis in parte sinistra quam sint, & si strabositas sit ad sinistrum nuncia oppositum. Si uero sit sursum & notabilis res debet apparere magis deorsum quam sint. Et si strabositas sit deorsum nuncia contrarium, &c. Et si strabositas sit sursum aut deorsum notabilis in uno oculo tantum una res apparebit duae. Post hoc considera dispositiones singularum partium palpebrarum carnis lachrymalis coniunctiuae, & si quae erunt dispositiones praeternaturales nunciare potes nihil interrogando cum istae uisui subiacent. Post hoc con-

sydera corneam nunquid habeat pustulam uel ulcus quae comprehenditur ex signis superscriptis in capitulo suo. Si uero nullum istorum habuerit considera, nunquid sit aliquod uestigium in cornea, & etiam si est cataractae nuncia praecessisse ulcus. Si uero albedo alterius generis ipse passus est defluxum humiditatis ad oculum post cuius resolutionem hec macula remansit, & si huius macula quaecumque non sit ex directo pupillae modo uisum impedit: si uero ex directo pupillae occupans totam pupillam, considera an sit peruia aut non. Si enim sit peruia potes nunciare quod apparet ut uideat per quoddam uelum, et si est alba, obiecta apparent alba: & si citrina, citrina: & si rubea, ut in arafati rubea, & sic de singulis coloribus. Si uero non sit peruia & occupet totam pupillam, tunc nuncia quod nihil uidet nisi forte splendorem. Si uero macula illa in peruia occupet medium pupillae solum, dic quod omnia obiecta apparent in medio perforata. Si uero sit in latere dextro pupillae obiecta apparent diminuta in latere sinistro. Et si in latere sinistro apparent ex opposito diminuta. Et si in parte superiori aut inferiori obiecta similiter apparent diminuta in parte superiori aut inferiori. Si uero nullum istorum fuerit, considera an ipsa tunica cornea sit bene peruia an non, quod si non considera, utrum proveniat ab humiditate superflua, quod declarabitur quia tenax est, oculus plenus, & multae humiditates profluunt a capite & oculo, & praecesserit causae replentes, tunc dic ei quod diminute uidet ac si per uelum aspiceret. Et si illa imperuientia multum aucta sit, dic quod patitur irim provenientem ex reflexione luminis crystalloidis ad nubem oculi, id est, ad humiditatem quae est in cornea aut in albugineo, sicut in maiori mundo fit iris ex reflexione radiorum solarium a nube ipsius opposita.

Si uero imperuientia corneae proveniat ex siccitate, tunc apparet sicut corrugata, oculus diminutus cum pauca effusione humiditatis ab oculo & cerebro, & tunc nihil habet nisi quia diminute uidet, ac si uideret per uelum, ut supra. Postea considera pupillam, id est, foramen uiae utrum sit dilatatum aut constrictum praeter modum. Quod si extreme pupilla dilatata sit aut constricta fere nihil uidebit. Si autem notabiliter dilatata aut constricta, non tamen extreme uidebit omnia maiora quam sint propter constrictionem, propter dilatationem uero omnia minora quam sint. Post hoc considera nunquid uideatur homo oculi, id est, forma aspicientis in oculum. Quod si non uideatur tunc istud est aut ex defectu corneae, aut albugineae, aut crystalloidis, aut telae araneae. Si quidem uideris corneam obscuratam non solum ex directo pupillae, sed in alijs partibus argue quod sit ex nocumento eius. Si autem uideris corneam bene peruiam argue albugineum turbidatum, uel telam araneam, uel crystalloidem inter quae distinguitur interrogando aegrum an appareat ipsi nubes prohibens uisum, & tunc est ex nocumento albugineae obscurati, uidet enim parum aut nihil. Si autem non uiderit nebulam & non apparet homo oculi ut supra, tunc iudica turbidationem telae araneae & crystalloidis.

Pro quo sciendum quod homo oculi siue idolum oculi quod est forma aspicientis est in tela aranea, per quam reflectuntur species aspicientis in oculum, ut est apud Hali Abbatem tertio theoricis, & apud Gal. 10. de utilitate

de utilitate particularū 6. cap. cuius hæc est litera. Pupilla idolum in hac tela aranea uelut in speculo quodam consistit, est enim lenis & micans super omnia specula. Sed contra sequeretur uisionē non perfici in crystalloide, cuius tamē oppositum omnes arbitrantur, consequētia probatur, quia si a tela aranea quæ est ante crystalloidem reflectuntur species uisibiles sicut in speculo, ergo aliquantulum terminat species uisibiles sicut & speculum, ergo cum non perfectē transeat ad crystallinum, non fiet uisio perfectē in crystallino.

Ad quod dicitur q̄ in superficie crystallini, cui hæc tela aranea tenuissima est immediata, perficitur uisus, & simul ab hac tela & superficie crystallini reflectuntur species, & sunt causa apparitionis hominis, sed hanc Gal. appropriauit telæ aranæ tanq̄ parti densiori, neq̄ etiam ualet argumentum, reflectuntur aliquantulum species per telam aranæ, ergo non transeunt species sufficiens pro uisione ad crystallinum. Nam a quocunq̄ membro fiat reflexio, certum est etiā species transire per neruos opticos ad sensum cōmunem. Si autem nullum istorum nocumtorum quæ dicta sunt appareant tibi aspicienti in oculo, tunc considera, utrum nocumentum sit in neruis optici & tunicis sequentibus crystalloidem, & tunc facias experimentum, de quo supra, an pupilla per confricationē & alterius oculi compressionem dilatetur & constringatur an non. Si nō, tunc argue oppilationem in neruis optici aut in tunicis posterioribus oculi & nuncia ei ipsum non uidere. Sed inter oppilationem neruorum & tunicarum discernitur, quia si subito euenit & ablata sit uisio, subito est in neruis optici: si uero paulatim est in tunicis posteriorib. Sed in qua sit est difficile cōprehendere. Cognoscitur tamen causa nocumenti an sit mala complexio, an apostema, & etiam quæ species malæ cōplexionis & apostematis, per signa horū propria ex capitulis generalibus perquirenda. Quod si uideris oculum bene dispositū secundum omnes partes apparentes, & uides ipsius debitu motum non strabositate, non oppilationem, iudica ipsum esse sanum, nisi fortē haberet imagines per essentiam aut per communitatem, de quarum signis infra dicitur in capitulis proprijs, aut nisi fortē haberet dolorē qui per uisum a medico cognosci non potest, aut fortē unū apparet duo propter aliquas ex causis superscriptis quæ uisui nō subiacēt, aut nisi haberet diminutam uisionē causa spiritui, de qua supra.

Aliud ponendum in practica est, ut per signa propria distinguamus inter causas colorum oculorum, ut sciamus effectus in proprias causas resolvere, & eisdem curam adhibere si oportuerit.

Si ergo occurrēs tibi, habeat oculos glaucos, debes considerare. Primò an color cutis totius corporis & pilorum sit similiter glaucus, id est albus, & tunc hanc albedinē oculi debemus in dominium complexionis phlegmaticæ corporis & humorum resolvere.

Si uero non habeat similem colorum in cute aut in pilis, debemus quærere an hæc glaucos sit contracta a generatione, an ex tempore propter aliquam dispositionem præcedentem. Si sit ex tempore & habeat oculos aliquantulum concauos, scilicet, magis consuetogini, præcipue si non uideat ita bene res splendentes & in claro sicut consueuit.

Si uero hæc albedo sit naturalis, quærendum est an bene uideat in omni dispositione an non: si bene, est illa albedo ex altera duarū causarum, aut ex multitudine spirituum & claritate, aut ex magna reluctance crystallini inter quæ distinguitur, nam si fuerit homo bonæ habitudinis bene coloratus, abundas in sanguine & spiritu, credendum est illam glaucedinē provenire ex multitudine & claritate spirituum.

Si uero haberet dispositiones his contrarias provenit ex reluctance crystallini.

Si uero non bene uidet in omni dispositione, imò melius in obscuro q̄ in claro potest ex tribus causis contingere, aut ex paucitate albuginei, aut ex parua nigredine uueæ, aut ex magnitudine crystallini, siue positioe eius uersus partē anteriorem oculi inter quæ distinguitur, quia si ex paucitate albuginei, oculus apparet concauus, depressus non plenus. Si uero ex parua nigredine uueæ, aut ex defectu crystalloidis hoc nō apparet, sed inter illa duo distinguitur, quia cum crystallois est magna, aut posita uersus partē anteriorem apparet albedo oculi cum reluctance. Si uero sit ex defectu uueæ, apparet oculi albedo sine reluctance, sed inter magnitudinem crystallini & positionem eius uersus superficiem oculi distinguitur, quia quando est locata multū uersus superficiem uidet nigra, bene etiam in obscuro, alba uero male etiam in claro. Sed quando albedo provenit propter magnitudinē crystallini equaliter bene aut male uidet in claro & in obscuro, sed tamē non ita bene uidet in aliqua dispositione, sicut est conueniens. Et ex signis cōtrarijs si consideraues, signa distinctionis causarum colorū nigrorū cōprehendere poteris, hæc dixi quæ nunq̄ legi, neq̄ audiui. Tu aut si in aliquo est erratū, corrige & c.

Prognostica. Primū, defectus uisus per cōmunitatem ad neruos opticos secundum plurimū irremediabilis est, nisi tribus aut quatuor diebus corrigantur.

Secundum, defectus uisus propter paucitatem spirituum & causas inanientes est deterior, quā propter crassitatem eorum & causas replentes. Tertium, debilitas proveniens propter crystalloidem & telam araneam est deterior cæteris & minus corrigibilis.

Sicum debilitate huius humiditatis signa apparuerint manifesta, quæ tempore famis & exercitij parumper dissoluantur, pilula cochiae multotiens assidue erunt tribuende. Nutrimentum quoque patientis desiccantium esse debet. Et æger sæpe uomere cogendus est. Pulveres etiam desiccativi oculis sunt immittendi.

Hoc capitulum diuiditur in tres partes. In prima ponit curam debilitatis uisus propter humiditatem phlegmaticam existentem in toto, aut in cerebro aut stomacho, aut alio membro oculis etiam communicatam, sub qua etiam comprehenditur cura illius, quæ est propter turbulentiam & crassitatem spirituum.

In secunda parte incipiente ibi. Quod si cum prædicta, Ponit curam illius quæ provenit ex ina-

nitioe totius, & exiccatione tunicarum & humorum oculi, nec non ex paucitate & subtilitate spirituum. In tertia ibi.

Confectio alcohol. Reuertitur ad ponendum medicinas locales ponendas, in oculo pro curatione debilitatis uisus ex repletione, à cuius cura incipit in principio capituli.

In prima parte omnia clara sunt, nisi quòd quis solum ponit medicinam euacuantem humiditates phlegmaticas, scilicet pilulas cochias, & non ponat digestiua ut breuitati indulgeat, dat tamen ea intelligi. quorum superius multiplicem posuit descriptionem ad quæ recurre.

Intellige etiam dum dicit: Aeger sæpe uomere cogendus est, scilicet cum facilitate, donec cibus & materia phlegmatica stomachum replens, oculis communicans siteducta. Vomitus enim uiolentus facit oculos exire ipsos debilitans, & materias ad ipsos precipitans, propterea oculi in uomitu ligandi sunt. Nutrimētum patientis debet esse desiccatiuū, tum quia paucum, tum quia actū & potentia siccum, quapropter à nimio potu & brodialibus est cauendum.

Quòd si cum prædicta ægritudine affuerint siccitas & corporis obfuscatio nutrimentum erit augendum, & uinum in potu est tribuendum, ac super caput ipsius aqua tepida fundēda, & incuruatio super eam faciēda, balneum præterea ingrediatur, in quo tamen non multum sudet. Naribus quoque oleum de amygdalis dulcibus atque auribus est immittendum. Oculis uero lac mulieris adolescentis quaque die est iniiciendum, quod etiam frequenter fieri conuenit. Hæc uero debilitatis uisus species fortior sit in tempore famis, & dum uenter uacuuus fuerit.

Ponit curam debilitatis uisus cōtingentis ex siccitate ad quam sequitur corporis obfuscatio sanguine & spiritu paucificatis, in qua lac imponendum est oculis, adolescentis debet esse, quia magis humidum, magis uiuificum & spirituosum. Amplius spiritus & oculos confortans.

Confectio alcohol quod ualde acuit uisum, quia causa humoris debilitatur. Recipe tutiæ ablutæ & siccæ, drach. 20. deinde extrahatur succus lampſuci uiridis, & per noctem unam residere dimittatur & coletur ex quo tutia conspersa dimittatur quousque siccetur, postea teratur, deinde sumantur zingib. piperis nigri, macropiperis, chelidonia omnium, ana. drach. 2. salis

ammoniæ, drach. 1. cū tutia fuerit, drach. 20. post hæc omnia terantur & ex succo teneri foeniculi conspergatur, & siccata iterum terantur & reponantur, & cum necesse fuerit oculis immittatur, ad hoc prætere aualde confert sies de fellibus.

Quod dicit in tertia parte notum est. Est enim puluis istæ exiccatus, resolutius uaporum, & humiditatis turbidæ, & ipsius cum lachrimis eductius, & cum hoc egreditur tutia & chelidonia oculum confortantes. Colliria etiam de fellibus & quædam alia pro ampliori doctrina istis adiungantur, &c.

Cum debilitas uisus dupliciter eueniat per essentiam & communitatem. Ab ea scilicet, quæ per communitatem euenit est inchoandum. Et primò ab illa cuius causa est totius corporis repletio, aut alicuius particulæ oculis communicantis maximè stomachi, cerebri & neruorum, horum enim communitate frequentius uisus debilitatur, quia communitate aliorum membrorum maximè stomachi, cum uaporum multitudine, tum uiarum latitudine, tum quia directè respicit oculos, & partem cerebri anteriorem.

Cuius curatio quinque exigit intentiones curatiuas. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia regit membrum mittens. Quarta oculum confortat. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima quidem intentio si causa repletionis fuerit sanguis, qui dominatur perficitur cum phlebotomia aut alia euacuatione huic proportionali, necnon prouocatione hæmorrhoidarum & menstruorum, si eorum repletio fuerit causa, & similiter cum euacuatione cuiuscunque humoris, cuius causa oculus debilitatur, de quibus omnibus nec non digestiuis superius sufficienter dictum fuit in pluribus causis, & si materia fuerit in stomacho prouocetur uomitus, sed leuiter iteratis uicibus, ne uomitus imperuosus materias ad oculos precipitet & ipsos debilitet. Secunda intentio perficitur cum fricationibus, uentosis, elyteribus, crurium lotionibus. Item si expediret cum phlebotomia uenarum nocte, & quæ sunt post aures, &c. ut supra in ophthalmia, aut in his locis sanguisugæ applicentur. Summo pere tamē caue à nimia sanguis euacuatione, nam spiritus paucificantur, quorum magna copia est necessaria ad uisus fortitudinē. Si uero materia fuerit phlegmatica aut alterius generis diuertenda caput purgatis masticatorijs, gargarismatibus. Caput purgia tamen per nares postponantur quantum possibile est. Ultimo uero his non sufficientibus fiat cauterium aut in occipite aut in coronali, potentiale, aut actuale, quod melius est, de quo supra. Tertia intentio, scilicet membrum communicantis regimen & maximè stomachi perficitur cum confortantibus digestiuiam eius, & arcentibus uapores à capite præmissa euacuatione, ad quod in causa frigida optimè confert triphera minor. Item chebuli conditi, & propriè in mane sumpti. In calida uero triphera descriptione Mesue in capite debilitate uisus, cuius est hic textus: Sabor triphera mirabilis uisum confortans, cuius accidit impedimentum propter fumos ignitos cholericos aut calidos, & est ei impressio fortis, reducit enim oculos ad formam uigoris

uigoris adolescentiæ. Recipe mirobalanorū citrinorum, chebulorum & indorū, ana. 3. 2. s. belliricorum emblicorum, ana. 3. duas sacchari, 3. 6. tere in uase lapideo, & funde super ipsum aquæ fontium claræ aspergendo parum, & hoc fac per triduum, deinde permitte exiccari, & postea sparge super ipsum distillantem ex oleo rosæ & amygdalarum, & contere per alios tres, & iterum permitte exiccari, deinde accipe rosarum, sandali, cubebæ, machalar, id est, sandali citrini, cordumeni, ana. 3. 2. spodi, macis, ana. 3. 1. succi galliæ mulsatæ, 3. 1. s. deinde accipe sacchari albi lb. 1. & fac ex eis formulas similes auellanis, & da quolibet mane ana. 3. 2. ad 3. cum aqua calida. Et in hac causa optimè cōfert saccharum rosæ & mirobal. citrini conditi. Quarta intentio perficitur cum his quæ in oculo ponuntur complexionem & unitatē cōseruantibus, præferuntibus, & curantibus, si quid nocumen ti impressum sit, & spiritus & humores illustrantibus. Ex quibus est aqua communitalis facta ex fœniculo, uerbena, rosa, chelidonia, ruta, per distillationem aut decoctionem, & in causa frigida optimè cōfert collyrium, ex laminis auri superius descriptū in cōseruatione oculi. Aliud collyriū in causa calida descriptione Mesue: cōfortat. n. uisum debile, & sedat multitudinem lachrymarum. & antimonij loti & preparati in aqua pluuiali circa dies uiginti, tunc preparatæ cadmiæ, id est spumæ, argenti uel auri, ana. 3. 6. marchasitæ, 3. quatuor, tere unumquodq; per se, & tere bene per dies plurimos cum aqua pluuiali multoties, donec siccentur aquæ eorum, deinde terantur cum aqua fœniculi multoties cum cōtinuitate dierum aliquorum, similiter donec exiccetur. Tertiū uero cum aqua sampluci. Quartū cum aqua rutæ. Quintū cum aqua chelidoniæ, deinde exiccetur & addatur cum eis sedenege preparati, id est, lapidis hematitis, & croci, ana. 3. 1. margaritarū non perforatarū, 3. 2. musci 3. 1. teriam, camphoræ, 3. s. & proijce ipsa in mortario cū prædictis, deinde adde sumach, 3. s. tere usquequo exiccetur & fac alcohol, & administra mane & sero, quoniā probatum est & expertum. Quod si nō uolueris ipsum administrare in forma alcohol, distilla per a cum aqua rosata, aut fœniculi secundum quod est conueniens suo proposito, &c. Quinta intentio perie dedinans secundum exigentiam dispositionis corrigendæ, uitandus est aer fumosus, ventosus, nebulosus, ualde clarus & nimis obscurus, habitetq; in domo non alba neq; nigra, sed coloris medi, & prociū uiridis declinantis ad obscurum aut clarum, secundum exigentiā dispositionis corrigendæ. Aspectus enim rerum uiridium maximè cōfert sicut aquæ per calefacti teneantur aperti tempore æstiuo, cōfert in uisus cōfortatione. Et similiter aspectus gemmarum uiridium sicut smaragdi, similiter speculi uiridis optimè enim cōfortat. Sit ei potus uinum cistionis lymphandū magis aut minus cum aqua bene cōstantiarum secundum diferaliam temporis, & circumdies, & cœna, & non superfluē, neq; bibat in fine mensis, sed postq; potauerit aliquid uaporis repressiuum accipiat, ut citonia aut pyra cōdita, aut coriandrum

cōfectum, aut præparatum. Sit ei panis bene cōditionatus in quo aliquid fœniculi aut similiū uisum cōfortantium ponatur. Sint ei salatæ cappares, ruta, uerbena, chelidonia, fœniculus, endiuia, scariola sparagi, cicorea, lupuli. Vitetur lactuca, quæ salatæ condiantur cum aceto non multum acuto, aut cum uino granatorū & agresta secundum dispositionis exigentiam. Melius tamen est, ut coquantur ut sint facilioris digestionis. Sint ei fercula, quæ ex pane aut ouis fiant, secundum omnem usum communem. Ex granis cōueniunt hordeum, pannicium, spelta, far, rizum, & propriè ubi opus esset nutrimento cōfessionis. Vitentur faba, phaseoli, cicera, lentes, mes, id est, bisi sit rarè in usu. Ex herbis conueniunt fœniculus herba adil, quæ est similis tamarisco, petroselinum, serpillum, saluia, maiorana, borago, rapè, cucurbitæ, in dispositione & tempore calido amygdalata sermia.

Vitentur tamen fercula in cœnis & propriè in dispositione humida. Vitetur anethum. Ex carnibus magis conueniunt aues, quàm quadrupedia, & propriè quæ sunt facili digestionis paucarū superfluitatū, sicut perdices, phasiani, turdi, alaude, tutures, columbi uolare incipientes, & passeris sunt proprii. Ex quadrupedibus conueniunt uiculi, hœdi cōstrati annuales, lepores, capreoli, cuniculi, quæ in prandio sint elixæ, in cœnis allatæ, saltè quæ ex his sunt facilioris digestionis. Ex piscibus minus nocui sunt petrosi, agiles, parui in specie sua, & squamosi sicut ceuiali, lucij, strili, cauedani, barbones, eorum ouis adiectis senetæ scardue, marlones, & carpiiones. Vitentur tinche, anguillæ, cancri, sturiones pisces tamen marini minus nocui sunt. Eligantur ergo ex eis cōuenientes secundum speciem suam: frequens tamen usus pisciū indicat cœcitatem. Sapores conuenientes tempore frigido, & in dispositione multū frigida sunt piperata, & similia cum aromatibus & melle, & saccharo condita. Vitentur alleata, sed tempore calido & dispositione calida, uinum granatorum, & agresta, & acetum paucae acuitatis, & sapores, qui ex his sunt sicut salsa et similes. Vitetur omnes sapores qui sunt ex cœpis, porris. Omnia enim hæc acrimina uitanda sunt. Vitentur lac & lacticia, licet aqua lactis conueniens sit, butyrum & oleum conceduntur, uitetur caseus. Ex fructibus conueniunt ficus & uuæ bene maturæ. Similiter uuæ sicæ pruna, mora, pepones. Sed præstantia sunt pyra & citonia cōcta in fine mensis. Item conueniunt auellanæ, amygdalæ, pinæ piperatæ, & filicæ. Ex conditis conueniunt pyra & citonia. Sed zingitum in dispositione & tempore frigidis. Aromaticæ conueniunt sicut zingib. piper, cinamomum macis nux muschata, gariophili, crocus in dispositione & tempore frigidis. Sed in cōbatione hæc regulæ obseruetur, ut nuncq; comedat nisi digestionē celebrata. Surgat a mensa cum reliquijs famis, non multiplicet cibaria in mensa una, sit cœna leuior prandio, imò frequenter cœnam dimittat, & in cœna uitet brodiaia, sit somnus mediocris, scilicet, septem horarū, aut circa, somnus minus nocet, sed superfluæ uigiliæ magis, dormiat capite eleuato, et nuncq; cum oculis deorsum neq; dormire incipiat nisi distanter a cibo per duas uel tres horas, neq; dormiat in meridie nisi parum, scilicet circa horam mediam, & capite eleuato a medio Maij usq; ad medium Augusti, & hoc nisi somnum

nocturnū aliqua occasione omiserit. Euacuet superfluitates à natura institutas sollicitè & per loca conuenientia. Coitus multum nocet nisi ad ipsum superfluente materia stimuletur. Sed eius exercitium sit medicre: superfluum nanq; spiritum resoluit, & nimia quies spiritum incrassat. Similiter eligatur exercitiū oculo proprium, unde neq; obiecta minima, neque multum distantia diu aspiciat, neq; colores extremos neq; nimis lucida aut obscura, sed media & propriè colorem uiridem ut ante, neq; faciat aliquod exercitium per quod teneat caput & oculos inclinatos, neque post cibum immediatè exercitef, sed quiescat per duas aut tres horas, sit sperans & gaudens. Accidentia animi excessiua & molesta fugiat. Caueat à fletu longo, licet paucis aliquando uisum corroboret humores oculi depurando & spiritus illustrando per exitum lachrymarum. Cura autè debilitatis uisus propter exiccationem tunicarū & consumptionem spiritus & humorum per cōmunitatem à toto perficitur cum humectantibus, tam qualitatīuè q̃ substantificè interius & exterius applicitis. Quæ debet esse aliquando frigida sicut in hectica febrili. Aliquando calida aut temperata in actiuis sicut in hectica sen. Interius autē quæ sunt conuenientia ad impinguandum & humectandum tam qualitatīuè q̃ substantificè, & cum hoc propria in confortatione uisus collige ex regimine præcedente & ex capitulis hectice senectutis & febrilis. Sed exterius applicanda sunt balnea aquæ dulcis tepidæ, in quibus non fudent, & illa aqua est super caput infundenda. Viçetur balnea aerea & aquarū calidarum, olea etiam humida exterius applicita, sicut amygdalinum & uisolarū conueniunt, & similiter in naribus & auribus iniecta: oculis autē lac & propriè humanum uel asinum imponatur frequenter, & in summa recuratur ad capitula de hectica senectutis & febrili. Sed inter cætera attendat capitis humectationi cum infusione lactis super ipsum, et epithimatione ipsius cum eo, & cum infusione decoctionum humectantium laudatarū in melancholia & mania. Hanc tamen curā integrè pertractat Rasis in hoc cap. Curationes agitudinū specialium, siue cōmuniū, siue propriarū, scilicet, quibus nocetur oculus, haberi possunt ex his, quæ dicta sunt superius, & ex dicendis inferius. Curatio uerò nocumēti uisus per cōmunitatem ad neruos opticos, quod secundum plurimū est destructio uisus est malè possibilis. Et ideo cum Auī. posuit causas & signa destructionis uisus non subiungit curā reputans eam impossibilem. Quia tamen alii qui saltem duo per me curati fuerunt, quibus accidebat destructio uisus subito propter oppilationē neruorum opticorum, curam subiungā, imò me Ioan. Arcul. scribente hoc cap. cōiunx cuiusdā uerò Veronensis, quæ ex dolore defuncti filij in una nocte excitatem incurrerat humiditate propter dolorē & cerebri constrictionē expressā ad neruos opticos, scilicet, curata est. Cuius signum est, quia perfricationē oculorum secundum modum superius recitatum pupillæ non dilatabantur aut confringebantur. Subiungam itaq; modum curationis per me seruatum. In primis iniunxi illis dicam ualde tenuem, ita ut nihil eis concesserim nisi aquam mellis per quatuor dies, & etiam quod nullo modo moueretur, imò quod non loquerentur timens nemotus amplius faceret fluere

materias ad locum, ad quem fluere inceperant. Faciebamq; ipsos dormire capite eleuato quasi sedendo. Et si non habebant uentris beneficium cum supposito aut clysteri leui iubebam feces educti, qui duo in quarta die sanati sunt. Multos alios curauī, quos post multos dies suæ cæcitatē uisitare incepti, & nullum eorum sanauī, in quibus sic processī. Primò minorauī materiam cum pilulis de hiera simplici & agarico. Deinde digelsi cum melle ros. & oxymelle simplici distemperatis cum aqua betonice & fœniculi. Deinde eradicaui cum pilulis cochij: Et aliquando aliquibus eorum habentibus habitudinē sanguineam cum rubedine oculorum & tumore uenarum, feci phlebotomiam ex cephalica. Deinde superioribus in quibus uidebam phlegma abundare. Iterabam digestiū cum oxymelle scyllitico & syrupo de stecade cum aquis superscriptis, & iterū eradicaui cum cochij, deinde diuertebam cum masticatorijs & gargarismatibus, & tandem cum caputpurgijs per nares. Vltimò his non conferentibus feci cauterium in commissura coronali usq; ad oisī superficiem, quod dimisi apertum donec os squamatum fuerat. Exterius super parte anteriori capitis apponebam medicinas resoluentes & caput confortantes. Curā autem nocumēti uisus ex alijs causis per cōmunitatem pendentes, hic nō subiungam ne omnia capitula in uno perstringam, &c. Cura autem debilitatis uisus per essentiam in oculo, licet ex multis causis pēdere possit, quarum cura perquirenda est ex superius dictis, & ex inferius dicendis, hic solummodo cura perstringenda est triū causarum. Prima quando prouenit propter humiditatem turbidam in tunicis & humoribus. Secunda propter turbulentiam & nimiam crassitiem spiritus uisibilis. Tertia propter paucitatem & nimiam subtilitatem eius. Cura ergo debilitatis uisus propter humiditatem turbidam cōpletur quatuor intentionib. Prima est euacuatio integrata ex minoratione, scilicet digestionē, & eradicatione, ut superius dictū fuit, licet in hoc casu magis ppria oculis exhibēda sunt, sicut pro minoratione pilulæ de hiera simplici aut cochij, per eradicationē addendæ sunt pilulæ lucis, Sed pro digestionē cū melle ros. oxymelle simplici, aut scyllitico miscetur aqua fœniculi, rutæ, & similia. Syrupus in hac causa proprius, s. maioranæ, beronicæ, gariophilatæ, melissæ, chelidonis, ana. M. s. radicū fœniculi, petroselinī, an. ʒ. i. sem. anisi, fœniculi, endiuic, rutæ, an. ʒ. s. eufragiæ ʒ. i. s. sacch. ʒ. 15. & fiat syrupus, cuius dosis est ʒ. i. s. cū ʒ. 3. aquæ decoctionis harū rerū. s. senæ, eufragiæ, sem. fœniculi, florū boraginis, ana. ʒ. s. bulliant in ʒ. 3. aquæ ad consumptionem tertie partis, & coletur, et hoc in autumno, sed in uere loco senepo natur acorus & stecas. Et post purgationem ordinariam frequenter utatur pilulis lucis cum mirobalanis kebulis conditis. Secunda intentio est diuersio cum masticatorijs, gargarismatib. caputpurgijs per nares. Et his nō conferētib. fiat cauteriū in commissura coronali. Tertia intentio est materiæ turbidæ ab oculo resolutio & ipsius per lachrymaseductio, ad quod optimè cōfert puluis Rasis in hoc cap. Itē colliria de fellib. magnificanē in hoc casu. Sed attēde q̃ sella sunt quadruplicia. s. reptilium. Inter quæ acutissimum est fel uiperæ, super cuius administratione non est prescribendum nisi in modicissima quantitate & cum max

xima

xima cautela. Ex eius enim impositione quorundam oculi sunt dissipati. In secundo gradu acuitatis sunt fella autum, sed maxime earum quae uiuunt ex rapina. In tertio gradu sunt fella quadrupedum, sed inter hec magis acutum est fel leopardi & leonis, & minoris acuitatis est fel porci. In quarto gradu sunt fella piscium & minoris acuitatis ceteris. Tu uero incipe ab his quae sunt minoris acuitatis, dummodo sint propria, & in casu laudata. Verum etiam fella in acuitate distinguuntur secundum quod sunt animalis ieiuni aut depasti, quod est minus acutum. Collyria autem appropriata & approbata ab authoribus in fine capituli subiungam, & cum hoc quaedam electuaria in hac dispositione & in sequentibus propria. Quarta intentio est debitum regimen sex rerum non naturalium superius memoratum precipue in cibo & potu quae in hac dispositione debent paucificari, & ad siccum declinare. Vnde uidentur brodiales & omnia uaporosa caput & oculum replentia, &c. Nocumentum autem uisus propter superfluum crassitiam & turbulentiam spirituum exigit duplicem intentionem generalem. Prima est sanguinis clari & subtilis generatio, quae est materia spiritus. Secunda ipsorum spirituum clarificatio & subtilitatio. Primum duplici regimine perficitur. Primum est debitum regimen sex rerum non naturalium superius memoratum maxime in cibo & potu. Vnde in hoc casu sunt eligendae carnes laudabiles generantes sanguinem subtilem & clarum, sicut auium laudatarum magis quam quadrupedum, & similiter uinum subtile cistolum aut album non uaporosum, oua sorbilia, & breuiter sanguinem crassum & turbidum generantia uitentur. Secundum regimen est medicinale per quod sanguis iam genitus, licet sit turbidus & crassus subtiliatur & clarificatur. Ad quod faciendum duo sunt genera medicinarum secundum quod sanguis dupliciter potest fieri turbidus. Vno modo in substantia sua. Alio modo per admixtionem aliorum humorum ipsum turbidantium. Primi modi turbulentiae conferunt medicinae a proprietate sanguinis clarificantes, inter quas praecipui & famosi sunt lupuli, qui uia cibi & medicinae possunt exhiberi, capillus ueneris & fumus terrae. Et sunt multae compositae inter quas sunt duae praecipuae, scilicet, decoctio capillorum ueneris, & sumiterra, quarum descriptionem require a Mesue in suo antidotario. Carnes autem uiperarum secundum quod preparantur in lepra in hoc casu, & in illo, cuius statim rememoratio praecessit. In nocumento uisus ex humiditate turbida sunt praecipuae. Aliud est genus medicinarum soluentium & separantium humores turbidos a sanguine, sicut sunt res, & mirobalani, & agaricus in separando cholericos, & phlegmaticos, & possumus miscere haec cum superius praescriptis a proprietate sanguinis clarificantibus, imo etiam quaedam propria in uisus confortatione calida aut frigida secundum quod est expediens proposito nostro. Est qui quaereret quae uirtus est ista clarificatiua sanguinis est ne uirtus tertia: Est tertia, est ne uirtus solue determinatur humorem, scilicet sanguinem, & non est uirtus solutiua, licet secundum plurimum reperitur in medicinis solutiuis. Secunda intentio principalis est ipsos spiritus iam genitos depurare a uapori-

bus secum commixtis, & ipsos turbidantibus, & ipsos etiam in sui substantia subtiliare, sicut de sanguine est dictum, quae duo perficiuntur prohibendo uapores a stomacho, & a toto transire ad caput cum fricationibus & alijs generibus diuersionum, & cum confortantibus stomachum, & claudentibus os ipsius, & uaporibus reprimentibus, de quibus omnibus supra. Secundum perficitur cum peccinationibus & capitis fricationibus stomacho ieiunio & celebrata digestionem integre. Tertio cum his quae in loco ponuntur ipsos uapores resoluuntibus, de quibus partim dictum est, sed uberius dicitur inferius. Perficitur haec intentio, secundum principaliter cum his, quae a proprietate substantiam spiritus clarificant & subtiliant, & uirtutes membrorum principalium & oculi confortant sicut sunt triseriae, de quibus actum est, & quaedam etiam electuaria, de quibus agitur, & multa odorabilia inter quae praecipuus est odor maioranae siccae.

Cura autem debilitatis uisus propter spiritus paucos & nimium subtiles perficitur. Primum per debitum regimen sex rerum non naturalium, & praecipue cibi, & potus, quae in hoc casu debent esse multae nutritimentae & humidae & aliquantulum crassae & compactae, non tamen turbidae sicut sunt carnes electae quadrupedum, & pedes uitulorum, & quaedam fercula sicut hordei, faris, rizi, frumenti, speltae. Et in hoc casu conuenirent carnes caprinae & uinum mediocriter potentiae, cistolum bene clarum, sed non subtile. Secundum perficitur cum confortantibus uirtutes membrorum principalium, sed non multum calidis neque subtiliantibus, sicut sunt gemmae, triseria, descriptione Mesue capite de debilitate uisus, superius posita saccharum rosae, & si opus fuerit calidis, eligat triseria minor, theriaca, mithridatum, quorum caliditas si uideatur superflua alteret cum saccharo rosae, aut triseria statim memorata. Mirobalani tamen, ut uult Mesue, in hac re sunt praecipui. Regimen autem confortandi spiritus secundum nouos modos dixi in capite de melancholia.

Hic nunc subiungam descriptiones quorundam medicaminum in debilitate uisus. Primum est uinum artificiatum cuius est haec descriptio. R. uini nouiter expressi lb. 50. euphrasiae M. duos, saluiae domesticae rutae, maioranae, chelidoniae, rorismarini, betonicae, seminis anisi, sceniculi ana. M. s. cinnamomi. 3. s. misce, & permittit bullire cum quo uino poterunt sumi electuaria theriaca, triseriae pulueres & similes medicinae in causa frigida & humida. Est enim uehiculum medicinarum ad caput & oculos. Puluis ex inuentione Gentil. Recipe foliorum betonicae, rutae, euphrasiae, seminis anisi, cinnamomi, zingib. cardamomi, seminis sceniculi, petroselinii, fileris montani, origani, hyssopi, cubebae, liquiritiae ana. 3. duas, sacchari optimi ad pondus omnium, sumatur de eo medium coctear in mane cum paucis uini supra scripti. Sed in causa calida utendum est triseria superius descripta ex inuentione Mesue, uel utendus est huiusmodi puluis. R. mirobalanorum citrinorum. 3. i. chebulorum, indorum, belliricorum, emblicorum, ana. 3. i. terantur in uase lapideo tribus diebus omni die bis semper aspergendum cum aqua rosae, & permittendo siccari, de quo puluere accipiat, 3. i. sandali rub. coriandri praeparati ana. 3. i. euphrasiae 3. i. misce, de quo puluere potest accipi medium cholear alternis diebus cum succo rosae.

aut cum paucis vini suprascripti subtriplici ad aquam rosaceam, hic etiam pulvis potest fieri solutius addendo turbitum, & zingib. aut diagridium secundum exigentiam necessitatis, & potest dulcorari cum saccharo rosaceo. Nunc subiungam quaedam collyria de magis expertis. Primum & facile est Gentil. Recipe antimonij preparati, tuthie preparatae, ana cum aqua foeniculi quantum sufficit, fiat collyrium.

Secundum est Geargi de Solo, auis dicta pica excetetur in furno donec possit pulverizari & pulvis subtilissimus ex ea oculo imponatur, qui fit cum succo foeniculi, misceatur, aut aqua rosacea erit conueniens huic proposito. Tertium est Mesue superius memoratum ex succo foeniculi cum nimis auri aut auro chalcinato, cum argento uiuo, non cum mordicantibus, cui si addat 20. pars fellis galli, ut uult Mesue, erit magis resolutiuum & absteriuum. Et ad hoc confert coholum superius memoratum auctoritate eiusdem, sed magis in causa calida. Aliud est Ruf. 8. licium & contere contritione multa cum succo foeniculi depurato usque dum fiat, sicut mel, & recondere in uase uitreo, & quidam posteriorum addiderunt ad omnem 3. eius fellis galli aut perdicis. 3. 2. Tuthia quoque sola. Primum cum aqua pluuiali lota & exsiccata. Deinde cum aqua foeniculi trita & exsiccata. Tertio cum aqua sampsuci similiter trita & exsiccata. Quarto cum aqua iasfaraizon oculis imposita optime confortat. Aliud ex inuentione Mesue conferens super calefactione oculorum, & debilitati uisus causa humiditatis subtilis & acutae & mordicationi & pruritus in oculis, 8. tuthie carmenae lotae in aqua pluuiali, deinde in aqua ros. pluries 3. 10. fricata, mirobalanorum citrinorum cum aqua ros. 6. licij, 3. 2. 3. zingiberis, piperis longi, an. 3. 1. alpergantur cum succo agrethae & conterantur cum eo deinde exiccantur & pulverizentur & fiat alcohol. Potest etiam fieri collyrium liquidum miscendo cum aqua ros. aut succo foeniculi secundum quod tuo proposito est conueniens. Aliud posuit ab Auic. de quo dicitur quod tanti existit iuuaminis quod oculo talem efficit ne ei noceat in solem aspicere. 8. lapidis fantici, id est marchasitae, lapidis magnetis, lapidis baris, id est, aluminis albi, seding, id est, ledenegi siue lapidis haematitis, calamenthi sicci conditi, quod quidam elleborum dicunt, quidam succum cucumeris asinini. Sed Simo Ianuensis dicit esse quandam herbam qua utuntur tinctorios non reperta apud nos, omniuius an. partem 1. fellis uulturis, fellis uiperae ana. parte 1. misce. Tu de collyrio crede quod uis. facilius est dicere quam facere, ego in oculo humano non audeo ponere. Et hoc teneas consilium in medicinis oculis imponendis, ut semper a leuioribus incipias gradatim ascendendo ad acutiora, ne sequatur nouissimus error peior priore. Attamen de modo utendi felle uiperae dicam in cap. de imaginationibus. oleum balsami in hoc casu magnificat secundum quosdam, & dicunt quod meliorat oculum, aut conseruat in eadem dispositione quam reperit, sed sufficit una gutta, & hoc in dispositione frigida.

DE TUMORE PALPEBRARVM.
Cap. XXVIII.

Epithimetur ex epithimate quod in ca. de ophthalm. nominauimus. Tumor palpebrarum. Alutisfar. Inflatio oculi. Inflatio coniunctiue

sunt nomina synonyma hanc passionem significantia, de qua diuersi auctores sub his diuersis nominibus determinant. Quae diffinitio est apostema palpebrarum oculi cum intumescencia notabili ut plurimum coniunctiue communicans secundum Iesum Hali. Et propterea ipsam appellat inflammationem coniunctiue tractatu primo, cap. 42. Et in hoc differt ab hordeolo nodo & plerisque alijs apostematibus palpebrarum.

Species sumuntur a causis corporis, ex quibus generantur, quae secundum Auic. sunt quatuor, uentosa aquosa, phlegmatica, melancholica. Non enim potest hanc passionem a sanguine aut a cholera provenire, quamquam plerique alij dicant ipsam ab omni humore posse provenire. Quod uidetur rationabilius, magis consonum menti Rasii qui curando hanc passionem dicit quod epithimetur epithimate in capite de ophthalmia nominato. Et certum est epithima illud magis conuenire in materia calida quam frigida, fit enim ex siccitate membrae, ros. aloes, licio, sandalo rubro, faufel croco orientali, ana dissolutis in succo coriandri, aut endiuiae, aut aqua rosacea. Respondent tamen hunc humorem ex sanguine aut cholera provenientem uocari rosarium, sed haec nomina omitamus. Potest autem provenire a causa primitiua mouente antecedentem in coniunctam.

Signa huius passionis absolutae, quia in initio sui apparet frequenter sicut punctura acus, muscae, aut micis cum pruritu, deinde statim palpebra notabiliter tumescit. Sed quae provenit ex sanguine est cum tumore & duritie tensiva colore rubeo tendente ad obscurum dolore extensiuo & pulsatio & alijs signis phlegmonis. Quae uero ex cholera minoris est tumoris, tensionis, cum dolore magis acuto & colore rubro, claro uel ad citrinum tendente, & alijs signis heripetulae. Sed quae ex uentositate euenit subito secundum plurimum magis declinans ad lachrymale domesticum, sicut & cetera, & est sine grauitate, neque mutatus est color palpebrae, & est cum tumore notabili in quo non remanet uestigium impressionis, & cum pauculo dolore. In phlegmatica autem licet color non mutetur, tamen est durities minor & remanet uestigium impressionis per aliquod tempus cum nullo dolore. Similiter in aquosa est mollities maior quam in phlegmatica, siue dolore in qua licet facilis fiat impressio, tamen citius remouetur quam in phlegmatica, & minus cito, quam in uentosa, neque color palpebrae est mutatus, uel est mutatus ad albedinem, tam in phlegmatica quam in aquosa. In melancholica uero est durities notabilis non tamen sicut in cancro & sephiros cum ad tantam exiccationem huius aegritudinis materia non prouenit, non enim in tam paruo tempore accideret, uidemus enim crancros & sephiros ad tantum tumorem non nisi longo tempore provenire. Unde hanc melancholiam quodammodo mixtam arbitrari debemus cum alijs humoribus augmentum uelocitantis. Et tumor hic secundum Auic. communicat supercilij & maxillae, sed magis maxillae, quia grauis est descendere & cum colore fusco & pauculo dolore, &c. Pronogisticum. Primum haec aegritudo secundum A. consequitur ophthalm. & uariolas. Quod Gentil. exponens dicit propter seriem textus Auic. debere intelligi de melanch. & causas assignat, quas omitto, quae euenit secundum ipsum post curationem ophthalm. & uariolarum,

larum, quod credo nequaquam conuenire intentioni A. neque experientia, sed intelligendum est quod sequitur ophthalmiam & uariolas, id est, quod euenit postquam haec passiones inchoatae sunt, uidemus enim per sepe inchoata ophthalmia multa materia fluente per partem exteriori palpebras tumescere. Similiter in augmento uariolarum & in statu uidemus palpebras esse adeo tumidas, ut non possint aperire oculos, non obstat nisi cum materia ophthalmia & uariolarum sint calidae plurimum hoc apostema esset calidum, quod repugnat dictis A. nisi uelit hoc apostema quandoque esse calidum maximum quod sequitur alias aggritudines, & sit per uiam defluxus nisi forte initiatiue sit frigidum. Prognosticum secundum. Hic tumor palpebrarum curatur secundum plurimum si bene tractetur. Si uero imperite perducit plerumque ad cancrenam materia existente multa & calida, existente autem melancholia plerumque ad cancrum & sephiros, &c. Cura tres exigit intentiones generales. Prima est circa causam antecedentem complendam per euacuationem, diuersionem, fluxus interceptionem. Secunda est circa causam coniunctam complendam re percussione principio conueniente, resolutione declinationi conueniente, re percussione et resolutione simul conuenientibus, augmento & statui, et hoc si incedat in uiam resolutionis. Si autem in uiam maturationis loco resolutionis applica maturantia. Tertia intentio duas exigit intentiones particulares, scilicet correctionem accidentium & debitum regimen, quae omnia fiant sicut in ophthalmia. Sed est dubium non paruum, an phlebotomia & re percussio conueniant in hac passione. Quod non arguitur ex intentione Auic. neque phlebot. neque re percussione conuenientem, quam intentionem approbat Gentil. in expositione capituli de alinitiphac. Hanc opinionem manifeste ponit Iesus Hali uetans phlebotomiam & re percussione, a quo Auic. totum hoc caput accepit. In oppositum est Rasis. Ex cuius dictis non explicite sed implicite comprehendere possumus phlebot. & re percussione competere, cum doceat curare hanc passionem medicamine re percussiuo posito in capitulo de ophthalmia. Et confirmatur, quia in cuiuscunque apostematis principio competunt re percussio nisi in casibus exceptis. Et certum est quod hic non est ex illis, & in apostemate sanguineo omnes concedunt phlebotomiam potest autem palpebra apostemari a quocunque humore sicut & oculus. Resolutione huius dubij dicendum quod aliqua est manifesta differentia in causis huius passionis inter Auic. & Iesum Hali ex parte una, & Rasis & plerumque alios ex parte altera. Volunt enim primi hanc passionem solum ex quatuor humoribus tam dictis provenire. Alij praeter hos quatuor humores frigidos arbitrandum ex cholera & sanguine provenire posse. Est secundum differentiam quam Iesus Hali exprimit, quod secundum plurimum non provenit haec passio per uiam defluxus. Sed ophthalmia contra secundum plurimum provenit per uiam defluxus. Ex quo inferitur secundum Iesum Hali & Auic. qui sequitur ipsum, scilicet neque phlebot. neque re percussione competere, tum quia materia est frigida non bene curabilis per phlebot. tum quia non defluit ad oculum sed congegitur non coniuncta. Sed secundum alios auctores ponentes ipsam provenire ex humoribus calidis qui secundum

plurimum defluunt ad oculum, & non congegitur, dicendum est phlebot. & re percussione competere, multo minus tamen competunt re percussio super loco quam in ophthalmia, ex eo quod palpebra est membrum ignobile in comparatione ad oculum, propterea uitandum est ne re percussio applicata super palpebra re percussione materiam ad oculum & eo magis quia secundum plurimum huius passioni coniuncta communiter praecipue secundum Iesum Hali, ergo multo etiam magis debemus esse solliciti de coniuncta quam de palpebra, sicut & in synanche, in qua simul materia est interius, & extra solum, interius applicamus re percussio, exterius autem attractio. Et forte propter hanc causam dixit Iesus Hali generaliter siue sit factum hoc apostema per uiam defluxus siue per uiam paulatim factae congestiois re percussione non competere. Sed nunc ad medicinas locales ueniamus distinguentes modum curationis. Si hoc apostema fiat a causa primitiua ut contusione, debemus in principio administrare albumen oui contusum cum oleo rosae, & interius albumen oui cum aqua rosae. postea secunda die oleum rosaceum cum uittello oui si dolor affuerit. Si uero non fuerit epithimabimus cum oleo rosaceo desuper aspergendo puluerem myrti, demum procedere ad resolutionem sanguinis contusi, sicut exigunt canones, interius autem ueniamus ad sief album & tandem ad caetera competentia in ophthalmia secundum tempora sua. Et si ibi fuerit atarfacti ut plurimum est, cura bimus curatione eius, sicut superius dictum est. Si autem apostema exterius tendat in uiam maturationis maturabimus & aperiemus, ut docemur in canonicis uniuersalibus. Si autem proveniat a causa antecedente, scilicet sanguine fluente ad palpebram in principio re percussio cum medicamine Rasis cuius descriptio est in capitulo de ophthalmia, aut cum aqua rosae oleo rosae, aceto, bolo armeno simul mixtis. Et si materia fuerit cholericis his proterimus addere aliquem succum frigidum sicut semperuiuae aut solatri, quae consilio meo magis applicanda sunt super fronte & temporibus quam super palpebris. Procedentibus autem temporibus resolue aut matura, aut cum mixtis procede sicut in phlegmone & eripellate & auctores praecipiant commiscendo medicamina huic membro magis propria. Si uero materia fuerit uentosa cum subito fiat secundum plurimum manifestum est re percussio sua non competere. Sed secundum Iesum Hali nihil a principio faciendum est, si in prima die, sed in secunda si egritudo non est curata lauet facies & oculus cum aqua calida & dieta subtilietur. Si tamen oportuerit applica sacculum ex milio, et sale, & cimino torrefactis. Sed Gerardus de Solo docet administrare farinam milij cum aqua foeniculi. Si uero materia fuerit phleg. aut aquosa epithimanda sunt palpebrae ex aloecum succo foeniculi. Et si fortius uis resolue applica sief rub. leue distemperatum, cum aqua foeniculi aut pluuiali, aut aqua fabrorum, & chimolea cum pauco aceti, si uis magis resolue cum pauco lixiuij. Descriptio sief rub. Rasis in suo antidotario. R. floris aris usti, qui fit in minera aris 3. 3. colcothar usti. 3. 2. aris usti 3. 5. myrrhe, croci, an. 3. 1. piperis. 3. s. fiant ex eis collyria cum uino albo. Hoc enim est resolutiuum efficax. Aliud ex inuentione nostra satis domesticum. Reci-

pe aloes, myrrhæ, licij, acatij, sief memithæ, ciperi, croci orientalis, boli armeni, ana misceantur cum aceto, & succo foeniculi, aut addatur parum lixiuij si uis magis resolueret, & in materia multū aquosa, potes permiscere cum aqua fabrorum & addere chimoleam. Si autem materia fuerit melancholica, mollifica primo, deinde resolue, aut cū mixtis procede sicut cum mucilagibibus maluaifci, foenugræci, lini, & pinguedine gallinæ, quibus, si uolueris magis resolueret adde bdellium, aut ammoniacum in aceto dissolutum. Et tu ex cura apostematum scitoticorum collige medicamina huic dispositioni conuenientia addendo aliqua propria secundum exigentiam particulæ patientis, &c. Tertium autem regimen ex sæpe dictis potest esse manifestum, & textus clarus est.

DE INVERSIONE PILORVM
palpebrarum. Cap. XXIX.

Si pilus fuerit unus aut duo, alijs palpebrarum pilis cum mastiche, aut oleo seni sunt annectendi, aut radicitus euellantur, & loca à quibus euulsi sunt cum ferro acuto, aut acu adurantur. Si autem multi fuerint, necesse est cauo palpebræ incidatur. Loqui tamen de hoc, nostri libri mensuram prætergreditur.

Pilus à pelle dicitur, quia ex pelle procedit. 1. ethiologiæ, capite primo, sicut capillus dicitur capitis pilus. Pilus est diffinitiuè pars corporis inanimata, tenuis, rotunda, longa, dura, flexibilis, in poris cutis secundum radicem fixa, ab exhalatione fumosa terrestri, uiscosa unctuositate participantem, genita à calido adurente ad poros cutis eleuata, sed à complexione cutis & aeris in pilum densata ad decorem tutelamq; corporis atq; ipsius ab huiusmodi fumosis exhalationibus mundificationem finaliter ordinata. Ex qua diffinitione elicere potes causas pilorum scilicet materialem, efficientem tam incitatuam quam completiuam, & causam materialem in qua & formalem atq; finalem. Pili autem palpebrarum quadrupliciter possunt male disponi, aut paucificantur, quia tenues, aut curti, aut pauciores debito generantur, aut multiplicantur modis contrarijs, aut inuersantur in oculum non seruantes debitum situm. Et hæc inuersatio tamir uocatur, aut non debite colorantur, ut quia producuntur albi, aut alterius coloris non naturalis, cum debeant esse nigri. Paucificantur autem propter defectum materiæ terrestri unctuosæ, aut defectu aggetis, aut paucitate calidi, aut ex defectu cutis. Ex defectu quidē materiæ quia consumitur, sicut accidit in ægritudinibus exiccantibus, ut phthisi, hectica, & similibus, aut quia materia pilorum in pediculis conuertitur, quæ ab illis postquam geniti sunt etiam consumitur, aut quia materia pilorum à præsentia alterius materiæ acutæ aut salis consumitur, sicut in alopetia aut ex defectu caloris cum paucificatur, sed hoc rarissimè est causa defectus pilorum palpebrarum aliorum aut multoties cum uideamus in omni ætate, in

omni complexione pilos palpebrarum debite generari. Defectus autem ex parte cutis est aut propter oppilationem pororum cutis & stricturam, aut nimiam dilatationem, siue extempore siue generatione contractæ sint, aliquando accidit propter ulcera, corrosiones manifestas, & pustulas in palpebris existentes ex quibus sit pilorum casus, sicut & in cæteris membris. Et ex contrarijs causis tam efficienti quam materiali, ex qua & in qua accidit pilorum multiplicatio. Inuersantur autem pili in oculum, aut quia pori exitus pilorum sunt obliquati uersus oculum directi, aut ex generatione, aut ex tēpore, aut quia palpebra ipsa est contracta & iam uersus oculum curuata, aut quia radix unius pili nascens in poro alterius sub radice eius non potens exire directe propter impedimētum radices alterius pili curuatur interius uersus oculum. Male autem colorantur pili, aut propter ægritudines consumētes, unde ex defectu humidi dealbantur sicut segetes cum maturefcunt humido deficiente dealbantur, & hæc albedo incipit ab extremitate pilorum: dealbantur secundo pili propter præsentiam materiæ phlegmaticæ putrentis in radice eorum, sicut accidit in canicie, aut propter præsentiam albaras aut morpheæ in cute pilorum, secundum cuius colorationem etiā pili colorantur, & hic color incipit à radice pilorum tendens paulatim ad eorum extremitatem. Sed ad propositum redeūdo, cum quatuor sint hæc dispositiones pilorum solum una, scilicet inuersatio dicitur ægritudo cum sensibiliter lædat operationes, & est plerūq; causa ophthalmiæ & prauarum ægritudinum, est enim morbus in situ, alię autem dispositiones non sunt ægritudines, licet periclopepēdeat ab ægritudinibus, aut causis præternaturalibus. Et ex his liquent hæc dispositiones & causæ earū. Signa autem manifesta sunt cum sensui subiaceant.

Prognosticum. Hæc dispositiones curantur cum malæ dispositiones pilorum non nisi à forti agenti possint rectificari, sustinent autem pili, & cutis pilorum fortes medicinas sui duritiæ & uiscositatis multum resistentibus, &c. Cura paucificationis pilorum in duobus consistit. Primo in remotione causæ pilos paucificantis. Secundo in contractione uel attractione materiæ pilorum generationi proportionatæ. Si ergo causa paucitatis pilorum fuerit humidi consumptio & exiccatio cum humidis, & resistentibus, curanda est. Si autem propter præsentiam pediculorum ipsos remoue, & intersece & materiā generationis ipsorum consume, ut docet Auic. 3. tertij. tract. 3. cap. 1. Et Ras. 2. contin. Si uero fuerit præsentia materiæ acutæ & falsæ in origine pilorum cura curatione alopetiæ. Si uero fuerit propter ulcera aut pustulas in cute pilorum consumentes materiam generationis pilorum & poros oppilantes aut ipsos corrodescentes cura curatione alshaphati. Si uero fuerit nimia strictura aut dilatatio pororum à generatione contracta nō recipit curā. Hic aut solummodo debemus inniti circa secundum, scilicet circa attractionem materiæ terrestri unctuosæ subijciendę pro generatione pilorum. Ad quod faciendū quasdam subiungam medicinas, hoc tamē præmissis q; medicinæ facientes nasci pilos sunt diuersorum modorum. Quædam enim agūt à proprietate occulta, ut lapis lazuli & lapis armenus. Quædam à caliditate trahendo materias pilorum uersus poros, cōcurrente etiā quadam proprietate sita

cut spica nardi, & celtica. Quædam faciunt hoc quædam stippritate confortatiua partium membri unde calor uigoratur, sicut laudanum, & cætera. Quædam faciunt hoc non generando pilos de nouo, sed ipsos genitos cõseruando, sicut medicinx stippricæ & uiscosæ. Quædam faciunt hoc remouendo malitiam materierum corrodentium. Et istæ sunt diuersæ secundum quod materiæ corruptæ egent rectificatione, siue exicatione, siue absterfione aut resolutione, aut corrigendo aliquod genus malitiæ complexionis. Et istæ sub primo regimine continetur, quædam ad hoc iuuatiue sunt tenendo alias medicinas in loco, sicut medicinx uiscosæ sui uiscositate faciēs alias medicinas palpebræ adhærere sicut mel. Et si infertur, quia medicinx uiscosæ oppilant poros, ergo prohibent generationem pilorū oppilando, negatur consequentia nō enim omne uiscosum est oppilatiuū, sicut mel, & si fit aliquāter oppilatiuū, maior tamen est conferentia ex parte aliorum q̃ hoc paruum nocuentū. Descripio conueniens ad pilorum generationem. ℞. lapid. armen. lapid. lazuli. ana. cum melle incorporent & applicentur. Secundum magis efficax, est stercuris muris adustum aut non adustum cum melle confectum. Tertium magis iuuans in causa cal. scilicet, ubi est pruritus, rubedo & corrosio, est ut granatum cum sua totalitate decoquatur in aceto donec dissoluatur, & super locum ponatur. Et hoc quidem magis confert prohibendo casum pilorum, q̃ eorum nouam generationem procurando. Medicinx autē prohibentes orum pilorum postq̃ euulsi sunt, multæ ab authoribus recitatur. Vna est ex rubigine ferri cum salua distemperata uel limatura ferri cocta cum aceto, uel ferrum calcinatum, siue crocus ferri coctus cū aceto. Secundū est sanguis ranæ propriè in cænētis habitantis. Tertium est tinea canis seu lendinis canis contusæ & loco applicatæ. Quartū est cum frigidis stippricis & obilitantibus. Quintum est cum sief de uitriolo ex inuentione Iesū Hali conferente pilul. additis, silach scabiei ungulæ, sebel. ℞. gummi arabici, dragaganti, aloes, succorini, uiridis æris, arsenici rubei, colcothar, æris ustri trium piperū, sedenegi, amyli, rubææ tinctorum, bataturæ, æris ustri, ana. 3. 2. sanguinis draconis, acatiæ, ana. 3. 1. 5. tutiæ, spicæ, licij, gallæ ustræ, ana. 3. 1. cadmiæ argenti, cærusæ myrrhæ, ana. 3. 1. salis ammoniaci, ana. 3. 4. dissoluatur arsenicum cum aqua rutæ, & succo pomi citrini, alia bene puluerizata misce & fiat sief. Sed certè dicant omnes quicquid uelint, ego adhuc non inueni medicinam in hac re conferentē, sicut nec Galenus ut testatur 10. de simplici medic. Nam cum plures expertus fuerit non inuenit aliquas in hac re conferentes, &c.

Cura autem inuersionis pilorū quinq; modis perficitur, de quib. tres tanguntur à Rasi in presenti cap.

Primus est inuiscando pilos inuersatos cum pillis naturalib. cū mastiche aut oleo feni, id est, de illa regione quod uiscosum est. Sed inter cetera, ut refert Auic. in hoc præstantior est gumma pisciū. Sed caue ne pili inuersi superet pilos rectos, & trahant ipsos in oculū. Secundus modus est per cauterium actuale factum, in modum acus curuæ, debet ergo palpebra inuersari, & ipsius extremitatem debemus capere inter duos stilos ex utraq; parte ligare, & pilos inuersos cum mo-

leta dentata extrahere. Deinde oculum tueri cum pasta, ut dicit Iesū Hali, oculo superposita, sed melius fiet cum cortio in aqua rosata infuso, oculo superposito, & ita acum illam curuam ignitam in poros pilorum extractorum infingere semel, aut pluries & satis profundè, donec tota caro porri sit combusta, postea lacte applicito super loco dolor mitigetur, & post mediam horam aut quartam stili soluantur, ut palpebra ad situm naturalem redeat, deinde cum prohibentibus ophthalmiam medicetur.

Tertius modus est positus à Rasi, scilicet incisio, sed hoc penes authores tripliciter potest fieri. Aliqui incidunt palpebram interius parum distanter ab origine pilorum, & secant satis profundè ad hoc, ut caro orta in scissura propellat, & inuerfet palpebrā alterius, & hic modus est satis inanis, & carens ratione, alij autem scindunt cutim palpebræ exterius aliquā partē ipsius eleuando ad modū unius alutæ, & deinde cõsolidant unum labrum cum alio ueniendo aut sutura, aut alio ingenio, ut palpebra post cõsolidationē remaneat aliquid exterius inuersata. Modus autē capiendi pellem aptior est, ut cum piccarolis eleuetur, & comprehendatur inter duos stilos subtilissimos secundum eam quantitatem, quæ uidetur tibi necessaria ad hoc, ut palpebra remaneat aliquid inuersa, adeo ut pili non ingrediatur in oculum, deinde stili stringant ex utroq; capite notabiliter, & pellis ista intercepta, scilicet cum forcice super stilis scindatur, deinde anteq̃ stili remoueantur, figatur acus una uel plures immediatè sub stilis utrūq; labrū uulneris cõprehendendo, deinde stili remoueant & fiat punctū unum aut plura secundum necessitatē, quæ remaneat usq; ad cõsolidationē perfectā. Et si remanere non possent inuiscetur unum labiū cum alio cum medicinis ad hoc proprijs. Et hic modus est ex inuentione nostra. Alij incidunt totaliter extremitatē palpebræ, in qua nascunt pili inuersata ipsa palpebra prius intercepta inter duos stilos, ut dictū est superius, sed non pauca apparebit deformitas. Quartus modus non tactus à Rasi est cum sutione. Et est ut liget primò palpebra inter duos stilos ad modum iouetæ circa mediū ipsius, & cum acu perforetur prope pilū inuersum ab intra, ad extra ita ut puncta acus ueniat exterius ex directo pili inuersati in margine aliorū pilorū, & cum acus est fixa in palpebra nondū ex toto penetrās, figatur pilus inuersus in foramē acus, & si non potest aliter infligi, capiat capillus duplicatus, & figat ita duplus in foramen acus, & cum illa duplicitate, quæ ab authoribus uocatur ansa, capiatur pilus inuersus, & trahatur donec pilus ingreditur foramen acus, & postq̃ ingressus est trahatur acus exterius simul cum pilo inuerso, & ibi permittat cõsolidari, sed bonū est ut inuiscetur exterius cum uisco aut alio glutino, ut non possit redire, & hic est modus omnium pulcherrimus. Et sicut dixi de uno pilo ita fiat de reliquis si plures sint. Sed caue ne per idem foramen multotiens acus reiteretur: est enim causa quod foramen illud fiat latū, unde pilus subtilis non remanebit laterib. adhærens, & ex hoc cõprehendere possumus in actu practico quod quanto acus est subtilior tanto est aptior, dummodo hæ operationes cū ea possint perfici. Vltimus modus recitatus ab authoribus, quem non approbo, est ut euellatur pilus, deinde cum prohibentibus eius generationem procedat,

scilicet, cum medicinis suprascriptis, quarum adhuc nullam inueni, cui uidere possim. Vltima dispositio pilorum est corū nō debita coloratio ad quam remouēdam duplex est intentio. Vna remouere ægritudinē aut causas à quibus dependet illa mala coloratio, scilicet, causas canicie, aut morphæam, aut albaras, si ab eis pendet quæ faciliora sunt dictū quàm factū. Sed quomodo remouentur require à Rasi s. huius, et ab Auic. 7. quarti. Quod si remouere non possunt restat ultima intentio, scilicet, coloratio illorum pilorum cum tincturis colorantibus secundum exigentiam pilorum naturalium suorum, sed præstantius est, ut sint nigri quàm alterius coloris, licet in plerisque dispositionibus reperiantur rubei, quas tincturas collige, ubi supra in locis allegatis, & ex iam dictis patet literæ expositio.

DE AQUA DESCENDENTE IN
oculo. Cap. XXX.

Q Vandoq; aqua descendens in oculo, imaginatio, phantasia, apparitio, sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem, de qua diuersi authores sub his diuersis nominibus determinant, licet strictè uim uocabulorum consideranti appareat quod hic terminus aqua descendens in oculo sit inferior ad alios tres cum non omnis imaginatio sit aqua descendens in oculo, sed bene contra. Sed utamur hoc uocabulo largè sicut utitur Rasi in præsentī capitulo. Hæc dispositio distinctiue est uisio corrupta oculorum qui sentiuntur coram uisu, ac si ipsi sint mixti in aëre, & hic colorem accipimus largè, ex quo fortè inferitur, quod propriè loquendo hæc dispositio non est ægritudo, sed accidens ægritudinis loquendo de ea, quæ comparatur ad nocumentum. Est enim accidens oppilationis quæ est morbus in uia cuius oppilationis causa est aliquod corpusculum interpositum inter crystalli demæ res distincte uisas. Sed contra, hæc uisio corrupta siue comparetur ad nocumentum, siue non, per se & immediate lædit operationes alicuius uirtutum cerebri quia per ipsum & per se immediate corrumpitur iudiciū, quia iudicatur aliquod esse in medio coram uisu quod non est, siue istud iudiciū attribuamus sensui communi siue cogitatiue. Ad quod respondetur, quod hæc uisio corrupta comparata ad oppilationem est accidens, sed comparata ad iudiciū quod corrumpit est morbus, aut causa saltem morbi. Si autem hæc uisio corrupta sit de his, quæ non comparatur ad nocumentum, dicendum est quod non est accidens morbi, neq; morbus, neq; causa morbi, quamuis actio sit corrupta, sed non corrupte lædit, & corrumpit iudiciū, sed non corrupte lædit. Sed contra, eodem modo & æqualiter & æquè intense corrumpitur iudiciū, per uisionem non corrupte læsam pendente ab acuitate sensus, sicut per uisionem corrupte læsam pendente ab oppilatione, ergo qua ratione hæc pendens ab oppilatione corrumpit iudiciū, eadem ratione pendens ab acuitate uisus etiam corrumpit iudiciū. Pro solutione huius dictæ, q; aliud est uisionem esse corruptam, & aliud corrumpit læsam. Ad uisionem enim corruptam sufficit quod iudicetur aliquem colorem esse coram oculis qui non sit, sed ad uisionem corrupte læsam requi-

ritur præter hoc ut sit error circa sensibilia communia aut propria communiter occurrentia, circa quæ cum debitis circumstantiis non debet esse error. Primum accidit in homine acutissimi uisus. Sed secundum accidit in his, qui habent uapores crassos in oculis. Et ad formam argumenti cum dicitur, æqualiter & æquè intense corrumpitur iudiciū per uisionem non corrupte læsam pendente ab acuitate sensus, negatur, ut patet ex fundamēto iam dicto, imò non ualeat hoc argumētum, uisio Sor. respectu aliquorum obiectorum est corrupta, & uisio Platonis sibi sani respectu nullius obiecti est corrupta, neq; alio modo læsa respectu obiectorum quæ potest uidere, ergo melior est uisio Platonis, quàm Sor. quia uisio Platonis respectu illorum obiectorum est ablata respectu quorum uisio Sor. est corrupta, quod est deterius, &c.

Species imaginationum sunt duplices. Quædam non comparatæ ad nocumentum quæ non sunt nisi in oculis acutissimi uisus. Quædam comparatæ ad nocumentum, quæ sunt in oculis mediocri aut obtusi uisus. Pro cuius intellectu est sciendum quod omnium imaginationum causa immediata est obiectum aliquod non paruum, aut saltem non paruum ea paruitate, quæ est medium inter res distincte uisas, & crystalloidem posito quod obiectum aliquoties uidetur, sed non distincte comprehenditur. Si ergo hoc obiectum sit minimū siue in oculo sit, siue in medio extrinseco non uidetur nisi à uisu acutissimo, licet non distincte comprehendatur, & hoc est duplex, quod dupliciter situatur. Aliquando est in medio extrinseco corā pupilla sicut sunt atomi, à quibus aer quantumcūq; purus non denudatur, nec etiam aqua nec alia media denudantur. Et aliquando situantur in oculo, & sunt quidam fumi siue uapores minimi ab oculis resoluti, à quocūq; enim membro ferè semper aliquid resoluitur. Et hi fumi uidentur in uisu acutissimo sicut & atomi, de quibus sermo præcessit. Et hæc imaginationes prouenientes ex tanta acuitate uisus non comparantur ad nocumentum, cum non sint morbus neq; alia res præter naturam, nec ipse oculus est læsus in complexione, compositione, unitate, nec in aliquibus particulis ipsum integratibus, nec etiam per communitatem. Et simile huic quod dictum est de uisu accidit in sensu auditus, & est apud Rasim secundo continentis, & Iesum Hali. tractatu tertio, capite primo. Fit enim aliquando tinnitus & sibilus quod est actio corrupta, non comparata ad nocumentum propter acuitatē auditus audientis, minimum sonitum existentem in organo auditus propter uaporem minimum in eo motum, à quo organū auditus non denudatur. Aliquando audienti sonitum minimū in aere, aut in alio medio extrinseco, à quo aer quantumcūq; quiescens non denudatur. Aliquando fit propter crassam uentositatem in organo auditus existentem, & hæc ad nocumentum comparatur. Imaginationes autem comparatæ ad nocumentum sunt ab obiecto existente in ipso oculo comprehenso à uisu mediocri uel obtuso, siue sit uapor crassus, siue sit uestigium alterius generis: est enim causans aliqualem oppilationē & hoc obiectū licet comprehendatur aliquo modo: non tamen distincte comprehenditur. Et hæc imaginationes sunt duplices. Quædam sunt propter nocumentum tunicarum, scilicet

scilicet corneae, aut telae araneae, propter aliquod uestigium in aliqua ipsarum derelictum, aut ex ægritudine, aut ex aliqua causa præternaturali, quæ quâvis sit in cornea, non tamen uidetur ab homine in oculo aspicienti, licet comprehendat ab ægro, cuius rei causa est, quia non uidetur ab oculo aspiciente propter suam paruitatem, sed comprehenditur ab ægro ex eo quod impedit debitum transitum specierum uisibilium, minimum enim existens in pupilla, quod à nullo oculo aspiciente acutissimi uisus uideri potest, potest multum impedire transitum specierum uisibilium: nam ad hoc quod res & si sit maxima sicut coelum uideatur, oportet formam eius recipi in pupillam, & tandem in crystalloide, minimum ergo impedimentum existens in pupilla aut in crystalloide potest impedire uisionem magnæ partis coeli. Aliquando hoc nocuentum est in humoribus, scilicet, albugine aut crystalloide: frequentius tam in albugineo, cum omnem impressionem sui subtilitate facilius suscipiat. Et hoc erit dupliciter. Aut propter rem aduenientem ipsis humoribus, siue sub forma uaporis, siue sub forma humoris qui uapor siue humor mixtus cum albugineo et crystalloide reddit ipsos non peruios aut non peruios ea perueritate, quæ debet esse, & quæ sunt ceteræ partes eorum. Unde si aliqua pars ipsorum fiat imperuia, & oppilet totum foramen pupillæ, tunc est cæcitas, sicut quando cataracta perficitur. Si non oppilet partem: tunc si est in medio, res non uidetur, nisi secundum latera et non secundum medium. Si autem sint in aliquo latere res non uidentur secundum illud latius, imò apparent diminutæ. Si autem illa pars sit peruia, sed non peruietate consimili primæ, tunc apparent diuersæ imaginationes secundum ipsius diuersitatem. Si enim tædat in citrinum, apparent imaginationes citrinæ & obiecta omnia citrina. Si autem ad rubrum declinet, apparent rubea, & sic de alijs coloribus. Et hæc quæ ueniunt ad oculum sunt simplicia, aut uapor aut humor. Si uapor tunc provenit à toto sicut in febribus & crisiibus, aut à stomacho, aut à cerebro per uenas, & arterias & neruos, aut ipse uapor ab ipso oculo resoluitur, & coram crystalloide situatur. Si uero sub forma humoris hoc maxime est à cerebro, sicut in rheumatismis per uias neruorum, uenarum, & arteriarum. Aliquando uero hi humores alterantur & efficiuntur non bene peruij, non propter rem aduenientem, sed quia mutantur in substantiam suam, aut propter caliditatem subtiliantem aliquam partem ipsorum, et conuertentem ad naturam aeris, unde illa pars apparet alba siue lactea: aer enim commixtus humido aqueo facit colorem album faciendo spumam, tertio & quinto de generatione animalium, & 21. particula problematum, problemate primo. Aliquando mutantur à frigidityte congelante & incrassante, unde fit color albus aliquando ab humiditate tenebrante, aliquando à siccitate incrassante, uel inspissante.

Diuerificantur enim species imaginationum multipliciter. Aliquando secundum colorem, ut quia apparent citrinæ ipsis penditibus, à fumis cholericis, aut ipsis penditibus à uaporibus phlegmaticis, aut uestigijs albis peruijs, ita aliquando apparent rubræ aut nigræ ex similibus causis. Sed hic nota quod si uestigiū sit non peruium cuiuscumque coloris sit, semper imagi-

natio apparebit nigra, cuius causa in sequentibus assignabitur. Aliquando distinguuntur imaginationes ratione quantitatis, quia quædam magnæ, quædam parvæ secundum quantitatem uaporis aut uestigij situati inter crystalloidem & res uisas. Aliquando distinguuntur ratione crassitiei, aut subtilitatis ratione uaporis, aut uestigij crassi, aut subtilis. Aliquando distinguuntur secundum figuram, quia quædam apparent cimicales, quædam muscales, quædam capillares, & sic de singulis, secundum uarias figuras rei situatæ inter crystalloidem & res uisas. Aliquando apparent sursum moueri, aut deorsum, aut lateraliter secundum uaporum uarium motum.

Ad euidentiā eorum quæ dicta sunt, cadunt hic duo dubia. Primum. Vtrum res non peruia situata post crystalloidem uersus cerebrum, possit esse causa imaginationum. Et arguitur quod sic, uapores eleuati in febribus aut crisiibus sunt causa imaginationum cum perueniunt ad cerebrum: causant enim aliquando phrenesim non ueram, ergo questio uera pro parte affirmatiua. Secundum, hi uapores eleuati, uel existentes in parte anteriori cerebri mouentes spiritus motu inordinato sunt causa uertiginis aut scoromiae, & per consequens imaginationum: imaginantur enim homines corpus suum moueri, aut res aliquas circa corpus suum moueri, et eo magis quia scoromia interpretatur obtenebratio uisus. Tertiū res non peruia existens in humore uitreo, potest uideri per crystalloidem sicut & res existens in albugineo, ergo cum malè uideatur poterit esse causa uisionis corruptæ, & per consequens imaginationum, &c. Assumptum probatur, quia sunt omnia necessaria ad uisionem, scilicet, obiectum medium crystallois uidens lumē tam extrinsecum quam ipsius crystalloidis. Quartum species reseruata in memoratiua, aut in aliqua uirtutum cerebri potest peruenire ab ultimo uentriculo ad medium, à medio ad primum, à primo ad crystalloidem, & sic poterit uidere per crystalloidem, ergo à fortiori aliquod corpus non peruium existens in crystalloide, uel post crystalloidem poterit uideri, & si malè uidebitur erit causa uisionis corruptæ & imaginationum, assumptum est Auer. 3. colligit. in cap. de accidentibus sensus, uisus, & in lib. de sensu & sensato. Et confirmatur, quia illa species perueniens à cerebro ad oculum obuians uaporibus existentibus, in uitreo inficietur secundum naturam illorum uaporum, ergo perueniens ad crystalloidem, sic infecta erit causa imaginationum sicut species exteriorum obiectorum peruenientes ad crystalloidem, inficiuntur secundum colorem uaporum aut humiditatis extraneæ existentis in albugineo, et sunt causa imaginationum, ut referunt omnes. In oppositum autem est Auer. dictum quod causa imaginationum est res non peruia inter crystalloidem & obiecta exteriora, non autem post crystalloidem. Pro solutione huius questionis præmittendum imaginationes esse duorum modorum, quædam enim pertinent uirtutibus cerebri, scilicet, sensui communi, imaginatiuæ, quæ apparēt tam in luce, quam in tenebris, tamen homine uidente, quam non uidente, & de istis non est questio nostra sed questio nostra est de imaginatiuibus quæ appropriant uisui, & non fiunt nisi homine uidente. Et circa hunc modum est duplex responsio. Illi enim qui tenent uisionem fieri in crystalloide quæ est communis opinio,

dicunt quod res non peruia post crystalloidem non est causa imaginationum, tum quia non est medium inter res uisas & crystalloidem. Sed respondendum est ad duo argumenta, scilicet ad tertium & quartum facta ante oppositum questionis. Vnum probat, quod hec res non peruia uidetur à crystallino, quia sunt quatuor requisita ad uisionem, scilicet obiectum, quod est ipsa res non peruia, medium diaphanum, scilicet, ipse humor vitreus, crystallois uidens, & lumen sufficiens. Dicitur quod non est medium sufficiens. Et si arguitur quod est medium diaphanum sicut & albugineus. Dicitur quod nec vitreus, nec albugineus sunt soli medium sufficiens ad uisionem colorum nisi concurrat medium extrinsecum, de hoc tamen clarius in sequenti questione. Ad aliud argumentum cum dicitur species transiens à cerebro ad crystalloidem obuians uaporibus existentibus in uitro inficietur secundum naturam uaporum quibus obuiabit, ergo sic infecta uisa à crystalloide erit causa imaginationum rubearum aut citrinarum, &c. secundum naturam rei inficientis. Ad hoc dicitur quod hæc est species multum immaterialis & multo magis denudata à conditionibus materialibus, quam sint species uenientes ab obiectis exterioribus cum obuiant uaporibus existentibus in albugineo, & etiã hæc species potest esse causa uisionis, quia multum est immaterialis absque hoc quod transeat per medium extrinsecum, & hoc tenendo opinionem Auerrois. Sed secundum opinionem tenentem uisionem fieri in cruciatione neruorum opticorum est duplex responsio, scilicet, una quæ magis placuit Gentili qui dicit quod hæc res non peruia post crystalloidem non est causa imaginationum ex eo quod ipsa non potest uideri, nec aliquo modo comprehendi per uisum, cum cuiuslibet quod debeat aliquo modo uideri siue bene, siue malè, oporteat species plus depurari & modificari in crystalloide, et etiã quia hæc res non est medium inter cruciationem neruorum, & obiecta exteriora ex eo, quod uisio post crystalloidem non fit secundum rectitudinem linearum, nec secundum formam pyramidis, sed fit quia species uisibiles in crystalloide iam depurate suscipiuntur in spiritibus, & deferuntur ad cruciationem neruorum in qua fit uisio. Alia responsio quæ mihi magis placet est, quod res non peruia post crystalloidem potest esse causa imaginationum, quia species obiectorum uisibilium transeuntes per hanc rem non peruiam possunt infici secundum naturam huius rei, quamuis hæc res per proprias species non possit uideri, ut ostenderetur in sequenti questione, & quamuis etiã post crystalloidem non fiat uisio secundum rectitudinem linearum, quia spiritus deferretes speciem simul cum specie poterunt infici ab hac rem non peruia, & sic erit causa imaginationum. Et ex his iam aperte liquet, quid sit in hac tota questione tenendum, & quomodo ad argumenta facta in principio questionis sit respondendum. Sed tenentes uisionem fieri in neruis opticis, malè poterunt saluare uisionem fieri in instanti, scilicet, cum spiritus non moueat in instanti à crystalloide ad cruciationem neruorum.

Secundum dubium. Vtrum res non peruia existens in oculo possit uideri. Et arguitur quod non, primo uisibile positum supra oculum non potest uideri, ergo à fortiori positum in oculo non poterit uideri, consequentia tenet & assumptum est philosophi & commen-

tatoris secundo de anima. Secundò ad uisionem requiritur medium extrinsecum, ut uult Auer. 2. de anima comment. 77. ergo res existens in oculo cum non multiplicet species suas per medium extrinsecum non poterit uideri. In oppositum arguitur, quia uapores in oculo existentes uidentur cum de ipsis per uisum faciamus iudicium, ut quod sint citrini uel rubei, &c. Præterea species uenientes à cerebro ad oculum sunt causa uisionis, ut fuit dictum in præcedenti questione ex intentione Auer. Et certum est quod non multiplicatur per medium extrinsecum, ergo multo magis res existens in oculo per proprias species uideri poterit. Præterea lumen positum super oculo & in oculo uideri poterit, ut docet experientia. Imò experimur in nobis ipsis quod si comprimamus oculum in lachrymalis domestico uersus partem syluestrem, siue tenemus oculum clausum siue apertum uidemus aliquod lumen. In hac questione dicunt aliqui quod res non peruia in oculo existens uidetur, sed malè, scilicet, diminutè aut corruptè, sicut tangibile positum supra neruum sentitur, sed diminutè aut corruptè, & causam assignant, quia sunt ipsi, quatuor ad uisum necessaria, scilicet obiectum, lumen medium, intrinsecum, & crystallois uidens. Contra sequitur primò quod res non peruia existens immediate supra crystalloidem non possit uideri, nec aliquo modo comprehendi, cum non multiplicet species suas per aliquod medium, & sic non poterit esse causa imaginationum, quod est contra Iesum Hali, tractatu tertio, cap. de accidentibus crystalloidis. Secundò sequitur quod uicè semper deberet uideri. Consequens contra experientiam, semper enim uideremus aliquod nigrum uel coelestinum. Tertio si uapor existens in oculo, aut aliud uestigium possit uideri ab oculo in quo est, etiã possit uideri ab oculo extrinseco aspicienti, consequens est falsum, nemo enim uidet uapores oculi ægri. Fortè dicitur quod non est similitudo, tum quia uapor existens in oculo est multum propinquus crystalloidi, & magis distans à crystalloide oculi aspicientis, tum quia iste uapor est in medio aqueo in quo species multiplicatè apparent maiores, sicut experimur de oculo uidenti obiectum in aqua. Contra primò quia aliquando imaginationes pendentes à uapore apparent sub forma cimicis, aliquando maiores, ergo licet sit minor distantia inter uaporem & crystalloidem oculi ægri quam inter illum & oculum aspicientem, tamen adhuc poterit apparere oculo aspicienti, sed sub quantitate minore, ut uerbi gratia, sub forma pulicis, nec obstat secunda ratio, quia species transiens de medio defiori in rarius diuertitur à perpendiculari, & propterea si obiectum sit in aqua & oculus uidens sit in aëre, obiectum apparet maius quam si ambo sint in aqua aut in aëre, uapor itaque existens in oculo deberet apparere maiori oculo aspicienti quam oculo in quo est. Quartò principaliter si res existens in oculo uideretur semper debere apparere in eadem distantia, cum ipsa res uisa non moueatur, ut pono, neque crystallois, nec medium mutetur, nec lumen, sed consequens est falsum, quia si oculus habens imaginationes aspiciat in aërem apparet ipsi quod imaginationes sunt in aëre, si in parietem quod sint in pariete.

Quintò principaliter si res existens in oculo uideretur per speciem propriam, sequeretur quod uestigium al-

bum existens in cornea deberet apparere album, sed consequens est falsum, quia quāto est albius, tanto oculo in quo est apparet nigrius, ut docet experientia. Certe istae rationes sunt efficaces, & de necessitate concludunt rem existentem in oculo propriè uideri non posse ab oculo in quo sunt. Cum ergo aliquo modo comprehendantur ab oculo in quo sunt, ut docet experientia, quia si uapores sint citrini apparent imaginationes citrinae, & si rubi rubear, oportet ut subiungamus modum secundum quem res existens in oculo comprehenditur. Dico ergo quod res existens in oculo aut est per uia, aut non per uia. Si per uia aut per uicem simili per uicem oculi, & tunc non uidetur, neque est causa imaginationum &c. Si autem sit per uia per uicem non simili per uicem oculi, tunc uidetur. Et est causa imaginationum, sed non uidetur per species proprias, sed per species obiectorum extrinsecorum, quae species delatae ad crystalloidem transeunt per hanc rem taliter per uia insciuntur secundum naturam huius rei, & sic obiecta apparent citrina aut rubea &c. secundum colorem huius rei in quocumque loco fuerit haec res, siue immediate super crystalloidem, aut tela aranea, aut albugineo, aut cornea. Et simile huius accidit sicut experimur in radijs solaribus transcurrentibus per uicem, quia apparent colorati secundum colorem uicis. Si autem haec res sit non per uia, tunc nullo modo uidetur nec per se nec per accidens, sed bene comprehenditur per potentiam superiorē, ut sensum communem aut cogitativam eo quod obiecta extrinseca apparent nigra, aut obscura, aut perforata, aut diminuta secundum illam partem a qua species ad partem oculi non per uia multiplicantur. Quibus si uis nunc restat ut respondeamus ad rationes adductas post oppositum quaestionis. Duae enim rationes ante oppositum nihil aliud probant nisi quod uisibile positum in oculo, aut super oculo non potest uideri nisi in lumine propter suam materialitatem, & hoc per species proprias, cum quo tamen stat quod per species obiectorum exteriorum color existens in oculo uideri possit. Ad primum post oppositum cum dicitur, quod per uisum iudicamus uapores citrinos aut rub. &c. iam apparet qualiter sit respondendum. Ad tertium & secundum uolo proponere responsum in fine quaestionis. Tamen cum dicatur quod lumen positum super oculo, aut in oculo potest uideri, conceditur, negatur tamen consequentia cum inferatur, ergo etiam res non per uia posita in oculo aut super oculo etiam poterit uideri ex eo quod lumen est multum immateriale, nec ad hoc ut uideatur exigit medium extrinsecum, sed color est multum materialis, nec aliquo modo uideri potest per speciem propriam nisi species sua delata sit per medium extrinsecum, ut de materiali ad immateriale reducat, & quia tactum est in illo argumento quod nobis comprimetur. oculum in lachrymali domestico apparet aliquod lumen, oportet ut huiusmodi apparitionis caudetur in compressione oculi facta in lachrymali domestico & non in alijs partibus oculi, est lumen crystalloidem ideo apparet in forma circuli, quia sit reflexio ab ipsa uia perforata, & non sit reflexio in parte in qua ipsa est perforata. Et si quis argueret contra, quia semper istud lumen deberet apparere quia semper crystallois multiplicat lumen suum ad uicem, & semper

flectitur ab uia. Dicitur quod licet semper multiplicet lumen, tamen ipsa crystallois mota per compressionem fortius ipsum multiplicat, aut quia moueat, aut quia mota magis appropinquat ipsi, scilicet uiae, unde facilius fit reflexio sicut experimur quod nobis mouetur in semel lucidum, apparet magis sui luminis multiplicatio, & etiam maior sui luminis reflexio. Ita etiam hoc apparet lumine solis cadente super aqua quae aqua quanto magis agitur tanto lumen magis multiplicatur, & tanto magis a parietibus circumstantibus reflectitur. Et si quis diceret etiam ex compressione aliarum partium oculi, et non solum a lachrymali domestico deberet apparere hoc lumen cum similiter moueatur ipsa crystallois. Dicitur quod non tantum moueretur sicut si fiat compressio in lachrymali domestico, et etiam si moueatur ipsa crystallois per compressionem in alijs partibus, tamen non mouetur uersus uiam, sicut ex compressione in lachrymali domestico. Ad quartum cum dicitur rationabile positum supra sensum siue supra organum tactus aut in organo tactus sentit, ergo positum supra oculum aut in oculo debet uideri, tenet consequentia a simili, & assumptum est manifestum ad experientiam. Respondetur quod non est simile, quia uisus est potentia magis immaterialis quam tactus, propterea exigit ad hoc ut color uideatur etiam ut multiplicet species suas per medium extrinsecum ut de materiali ad minus materiale reducat, non sic est de tangibili, quia tactus est potentia multum materialis, & propterea non exigitur medium extrinsecum, sed sufficit intrinsecum. Et propterea dicitur aliqui, quod si tangibile sit positum supra sensum siue supra nervum, nervus non sentit secundum partem immediatam ipsi tangibili, sed secundum partem sequentem, & ipsa pars immediata tangibili gerit uicem medij. Ad secundum cum dicitur ex 3. collig. de accidentibus. sensus uisus quod species delata a memoratiua ab aliqua uirtute intrinseca cerebri ad sensum communem, & a sensu communi ad uisum uel auditum est causa uisiois & auditionis &c. ergo a fortiori species multiplicata ab obiecto existente in oculo erit causa uisiois, negaretur consequentia apud uolentem sequi. Auer. ex eo quod species perueniens a cerebro ad oculum est multum immaterialis non indigens medio extrinseco ad hoc scilicet ut ad immateriale reducat. Sed species rei existentis in oculo est multum materialis indigens medio extrinseco ad hoc ut ad immateriale reducat, & sit conueniens obiectum sensus uisus. Et sic secundum Auer. haberemus concedere homines uidere & audire, & exercere omnes operationes sensus in somno sicut in uigilijs. Sed contra sequitur quod si in lumine contingit uidere, consequens falsum contra philosophos et perspicuos, consequentia probatur, quia species patris tui iam defuncti in memoratiua, aut in uirtute phantastica reseruata, aut ab aliqua potentia cerebri cognitiua comprehensa potest deferri ad organum auditus, & sic fiet uisio eius, & auditus uocis eius tam in somno quam in uigilia, tam in luce quam in tenebris. Sequitur secundum quod non ens propriè & uerè uidetur & auditur, quia species & simulachrum coloris & figurae patris tui existens in crystallois representans patrem tuum est causa sufficiens ad ueram uisionem. Similiter species uocis eius comprehensa per auditum est causa sufficiens ad ueram auditionem

æquè bene sicut si uox patris tui aut color eius existet coram te multiplicaretur per medium ad organum uisus & auditus. Tertiò sequitur quod color non est obiectum uisus, nec sonus, auditus, consequens falsum contra omnem scolarum philosophorum. Et consequentia probat, quia nihil est color, nec obiectum uisus, nec sonus, nec obiectum auditus nisi illud sit, sed hic color patris tui, & hæc uox eius non est, nec potest esse, ergo sequitur quod color non est obiectum uisus, nec uox auditus.

In oppositum est Auer. cuius hic est textus. Sed fit modo contrario, quia motus incipit in uirtute imaginatiua propter formam receptam de foris in uigilia aliquo tempore & illa est remota, & propterea mouet primo sensum communem, & communis particulares sensus, tunc sentiunt res quasi essent extra, et sicut hoc fit in somno eodem modo fit in uigilia propter multam similitudinem circa aliquam rem. Et per hoc confirmantur uirtutes animæ, aut propter aliquam similitudinem fixam in corpore, aut propter timorem, aut tristitiam, quia resoluitur quidam uapor & ascendit cerebrum, & in ipso imprimi forma res cogitata, & ascendendo superius mouet spiritum animale, et deducitur iste motus usque ad uirtutem imaginatiuam, & mediantem ipsa mouetur sensus communis, & ille mouet particularem sensum, & sentitur res ac si esset extra, & uulgus credit quod hoc fiat ab angelis aut daemonibus. Et huius demonstrationes declaratae sunt ibi, & hæc quidem sunt accidentia quæ superueniunt omnibus sensibus. Et fortè hæc est causa quod plerique homines se dicunt in uigilia uidisse & audiuisse mortuos loquentes, et referunt uerba audita. Et referunt aliquando se uidisse daemones. Tu in hac materia tene quod uis pro nulla parte sunt demonstrationes. Ego tamen pro parte mea uolo credere Auer. Sed respondeamus ad rationes adductas in contrarium. Ad primum cum infertur quod sine lumine contingit uideri, conceditur de lumine extrinseco, sed non de intrinseco ipsius crystalloidis & spirituum uisibilium. Et si quis diceret quod si quis esset cæcus aut priuatus auditu posset ne uidere aut audire per huiusmodi species delatas à cerebro ad organa istarum potentiarum. Dicitur quod non, ad quacumque enim sensationem requiritur potentia sentiens. Ad secundum cum infertur quod non ens uidetur & auditur, uerè conceditur quod æquè bene auditur & uidetur, sicut si obiectum esset in præsentia, imò quod plus est non ens, nec potest esse, nec quod unquam fuit, nec quod unquam erit propriè uidetur & auditur, nam quodcumque potest per uirtutem imaginatiuam imaginari, potest etiam uideri & audiri speciebus illis delatis ab imaginatiua ad hos sensus exteriores, & per ipsos comprehendens, per quos representatur forma & similitudo, ac si obiecta essent in præsentia, quauis accidat error & decipiatur homo credens has res uisas & auditas esse coram ipso cum non sint &c. Ad tertium negatur consequentia, sed bene uerum est quod color qui non est nec potest esse, & similiter sonus qui non est &c. sunt obiecta uisus & auditus, nec ualet hoc argumentum, hoc uidetur aut est obiectum uisus, ergo hoc est, sicut non sequitur, hoc imaginatur, ergo hoc est. Et si infertur quod arguitur à tertio adiacente ad secundum, qui secundum logicos est optimus modus arguendi &c. Dicitur quod non arguitur illo modo, sed debet

argui, hoc est obiectum uisus, ergo hoc potest obijci uisui. Sicut non sequitur, hoc est obiectum uirtutis imaginatiuæ, ergo hoc est, quia esse obiectum alicuius potentia non est nisi comprehendere per ipsam. Sed non sequitur, hoc comprehenditur per aliquam potentiam, ergo hoc est. Aliter dicitur quod à tertio adiacente ad secundum non tenet uniuersaliter argumentum cum terminis ampliatiuis. Sed fortè quis instabit. Quia hæc uisio de qua sermo præcessit est corrupta, quia per ipsam iudicatur obiectum esse in præsentia quod non est, ergo non est uera & perfecta. Secundò, quia hæc est differentia inter sensus exteriores & interiores, quia exteriores complent operationes suas in præsentia obiecti, interiores uerò tam in præsentia quam in absentia, ut est de intentione Aristotelis. 2. de anima. Ad hoc respondetur quod ista uisio in se non est corrupta, quia per species ad uirtutem uisuiam à cerebro delatas optime comprehenditur forma, & simul ad hunc rei per species illas representantur. Sed pro tanto dicitur quod est corrupta, quia est causa quod imaginatio corruptatur iudicando aliquid esse in præsentia quod non est, nec sequitur, hæc uisio est corrupta hoc modo, ergo non est uera & perfecta, sicut uisio fumi per uisum acutissimum est uisio corrupta, & tamen uera. Ad secundum dicitur, quod uerum est quod ordine recto sensus exteriores sentiunt in præsentia obiecti, sed ordine retrogrado non est inconueniens, quod sentiant in absentia obiecti, sicut ordine retrogrado imaginatiua, aliquando imaginatur per species delatas à memoriatiua. Hoc enim modo fit reminiscencia. Et tamen certum est quod quocumque modo imaginetur imaginatiua, est uera & perfecta imaginatio, ergo & similiter speciebus delatis à sensibus interioribus ad exteriores. Posset tamè quis oppositum determinationis sensatæ defendere, & fortè probabilius & conformius opinioni communi. Et dicere quod ad uisionem ueram requiritur præsentia obiecti. Tu uerò eam parè teneto, quæ magis tibi consona erit. Hæc enim dixi nunquam audita nec lecta, tu uerò in quibus erratum est corrige, &c. Signa imaginationum absolute sunt ipsæmet imaginationes. Signa imaginationum propter acuitatem uisus quæ non comparantur ad nocumentum sunt tria. Primum, quod sunt leues & materiae nullo modo uisui nocentes secundum quod sunt diversorum modorum & figurarum. Secundum, quod atomi in aëre existentes sunt diuersi, & secundum quod fumi in oculo existentes sunt diuersi à quibus oculis non denudatur. Tertium quod aliquando defunctæ imaginationes in duobus casibus, scilicet, aut cum aër non est bene clausus, aut cum homo non aduertit, extra hos casus semper comprehendunt. Signa autem imaginationum quæ comparantur ad nocumentum sunt his contraria. Signa uero imaginationum per communatatem à toto sicut in febribus aut crisi sunt ipsæ febres, aut crises, quibus auctis augentur imaginationes & diminutis diminuantur, & secundum, quia sunt communes utriusque oculis. Signa imaginationum per communatatem à stomacho sunt. Primum ipsa stomachi nocumenta quibus auctis augentur etiam imaginationes & diminutis diminuantur. Secundum, quod sunt communes utriusque oculis. Tertium, quod augetur tempore repletionis stomachi, & præcipue rebus uaporantibus, & propter malos motus sumptus ciborum.

bo, & diminuitur in uacuitate stomachi, et ipso in-
anito & famelico, nisi pendeant ex cholera in quo ca-
su frequenter augetur cholera tempore famis ad sto-
machum repente, & per sumptionem cibi modera-
ti, frigidi, stipitici sedantur. Quartum est, quod per e-
uacuationem ipsius stomachi uomitu aut secessu mi-
nuuntur, & ex contrariis causis augentur, &c. Signa
imaginationum per communitatem à matrice aut a-
lijs membris particularibus sunt nocumenta matri-
cis, & aliorum, quibus auctis augentur, & diminutis
diminuuntur. Et sunt communes utrique oculis &
menstruis, & alijs humiditatibus à matrice debite flu-
entibus minuuntur, ipsi retentis augentur. Et simili-
ter de superfluitatibus aliorum membrorum. Si-
gna imaginationum per communitatem à cerebro
quæ secundum plurimum minantur cataractam ma-
gis quam imaginationes per communitatem ab alijs
membris, sunt ipsa capitis nocumenta, quibus au-
ctis augentur, & diminutis diminuuntur. Et sunt ali-
quando communes utrique oculis. Aliquando pro-
prii uni oculo, secundum quod uapores aut materiæ
caput replentes sunt in una parte cerebri, aut in utrius-
que dextra & sinistra. Quod cognoscitur per graue-
dinem & alias læsiones unius partis tantum, aut am-
barum. Secundum signum, quia hæ imaginationes se-
cundum plurimum augendo procedunt, & in cata-
ract. transiunt multo magis quam per communita-
tem stomachi propter, . . . causas. Prima, quia uapo-
res seu materiæ cerebrales attrinēt magis naturæ aqueæ,
& cōformiores sunt ipsi cataract. quam uapores sto-
machales. Secundum quia nocumenta stomachi facili-
us remouentur quā nocumenta cerebri. Tertiū, quia
materia existens in cerebro facili etiam fluit ad mem-
bra supposita, scilicet oculos & cetera instrumenta sen-
sum. Signa uerō imaginationum per essentiam in
oculo quibus distinguuntur ab illis quæ sunt per cō-
munitatem sunt. Primum, absentia nocumentorum
aliorum membrorum oculis communicantium. Se-
cundum, præsentia nocumentorum ipsius oculi, uel
quæ saltem præcesserunt. Tertiū, quod secundum
plurimum sunt proprii uni oculo. Quartum, quod
sint continuæ à quibus oculus nunquā absoluitur.
Quintum quod non recipiunt facilem mutationem
sed aut stant uniformiter, aut si augentur augendo
procedunt, aut si minuuntur minuendo procedunt.
Signa uerō propter nocumentum corneæ sunt.
Primum, ægritudines in cornea præcedentes, scilicet
uleus albugo & similes, ex quibus derelictum est ali-
quod uestigium occultum. Secundum, quod non re-
cipiunt facilem mutationem, ita ut nunc augeantur,
nunc minuuntur. Sed aut stant uniformiter, aut si au-
gentur augendo procedunt, & si diminuantur, dimi-
nendo procedunt. Tertiū, quia sunt continuæ à qui-
bus oculus nunquā absoluitur. Quartū, quia nō perdu-
cunt ad cataractam. Signa imaginationum per essen-
tiam in albugineo sunt ipsa nocumenta albuginei cū
privatione nocumentorum aliarum partium oculi,
quæ nocumēta sunt aliquod genus malitiæ cōplexio-
neria. Verum mala complexio sica quæ cognoscit
ex eo quod tempore famis & inanitionis augetur &
etiam, licet sit causa imaginationum, Mala aut cōple-

xio calid, raro perducit ad cataractā, sed tñ aliquan-
do, scilicet cum aliqua particula humoris albuginei
subtiliatur, & in aērē conuertit, pars autem aërea ge-
nita per calid. & mixta cum parte aquea est causa co-
loris albi, sicut in spuma, licet hæc propriè non erit ca-
taracta, sed bene ualde similis cataractæ, ita ut medi-
cus male possit distinguere inter hanc & cataractam.
Et fortè quod hæc per approximationem infrigidā-
tium tam exterius quā interius ipsa parte aërea increassa-
ta, & ad naturam albuginei reducta poterit curari, &
reputabitur mirabile. Mala autem complexio frig. et
humid. est illa quæ secundū plurimū est causa, ut ima-
nationes trāseant in aquā & uerā cataract. trib. modis.

Primò contrahendo aliquam partem ipsius albu-
ginei, ita ut per congelationem acquirat albedinē &
fiat non peruia, aut propter humid. obscurantem fa-
ciendo ipsam non peruiam. Sed est difficile uidere u-
trum hæc propriè sit dicēda cataracta, & utrum cum
acu possit deponi. Secundò, retinendo uapores pro-
prios & alienos, scilicet per communitatem, & ipsos
in aquam conuertendo cui concordat glosa Alman.
in hoc cap. Tertiò, debilitando digestiuam, & etiam
expulsuā ipsius albuginei, ita ut nutrimentū eius siue
uerè nutriatur siue non, non debite conuertatur in ip-
sum albugineum, sed generetur aliqua pars non per-
uia, & erit defectus ultimi actus qui uocatur assimilatio.
Aut fortè, quia superfluitates in unaquaq; dige-
stione refecandæ debilitata expulsiua non resoluunt,
sed remanētes conuertent in humid. aquam quæ erit
uera cataracta genita per uiam paulatim factæ conge-
stionis, sicut & illa quæ erit per retentionem uaporis
proprii increassati in aquam, dicitur uera cataracta &
genita per uiam paulatim factæ congestionis &c. Se-
cundum signum, quia hæ imaginationes sunt conti-
nuæ à quib. oculus nunquā absoluit. Tertiū, quod
non recipiunt facilem mutationem, sed aut stant, aut
si augentur in augendo procedunt, et si minuuntur mi-
nuendo procedunt. Quartum, quia apparet quædam
obfuscatio in pupilla tam ipsi ægro, quā oculo aspiciē-
ti, licet cornea appareat bene tersa & peruia. Quintū,
quia secundum plurimū perducunt ad cataract. ma-
ximè illæ imaginationes quæ pendunt à mala cōple-
xione frig. & humid. & hæc semper agendo procedunt.
Signa uerō imaginationū per essentiam in tela aranea
& crystalloide sunt ipsæ imaginationes absq; nocu-
mentis aliarum partium oculi. Secundum, quia nō re-
cipiunt facilem mutationem. Tertiū, quia sunt cō-
tinuæ. Quartum, quia non perducunt ad cataract. Et
in summa cataracta non est nisi in ipso albugineo, ut
infra ostendē, licet possit adhærere tunicis. Signa au-
tem quibus cognoscuntur imaginationes ductes ad
cataract. ab alijs sunt, quia ductes ad aquā sunt pro-
prii uni oculo secundum plurimū, & sunt cōtinuæ, &
augmentando procedunt & apparet oculo obfusca-
tio tam ipsi ægro quā aspiciēti. Et apparēt sicut cādele
duplices aut similes rei luminosæ lumine extrinseco
recepto in uaporib. aqueis crassis. Et aliquādiu reten-
to donec comprehendat à crystalloide, aut forti lumi-
ne, scilicet ipsius crystalloidis & spirituum uisibiliū
reflexo ab ipsis uaporibus crassis ad crystalloidem, et
non pertrāseunt duo menses secundū Alman. quod
cataracta completur. Et secundū Ralim secundum cō-
tinentis, & lesum Hali, tract. tertio, cap. de imagina-

tionib; non pertranseunt tres menses aut quatuor. Et secundum Auicennam sex menses quod cataracta cōpletur: cataractarum autem non perducentium ad aquam sunt signa contraria. Sed ne cui mirum uideatur quare auctores ita diuersos terminos posuerūt, nec uidentur concordēs, quia hoc inuentum est experiētia, unde secundum quod diuersi auctores diuersa tempora experti sunt, ita etiam diuersa tempora scripserunt quare diuersitas potuit accidere ratione diuersorum regiminum, diuersorum temporū, diuersarum regionum, diuersarum complexionum. Auic. uerō tēpus eligit longius. Sed scias quod aliquādo cataractae accidunt nullis praecedentibus imaginationibus, humilitate ad albuginē delata ferē subito per neruos opticos aliquando ea die, uel secunda qua apparent imaginationes apparet aqua ex eadem causa, aliquando plurib; diebus apparēt imaginationes quae continuē augendo procedūt, & sic fit aqua secundum plurimū ante duos menses, per uiam, scilicet paulatim factae cōgestionis, aut quia uapores aliunde delati ad albugineum incassantur, & in cataractam conuertuntur. Quandoq; uerō pertranseunt sex menses & amplius antequam imaginationes in aquam uertant, sed hoc est rarissimum. Attēde tamen duo, quod plures sūt imaginationes ducentes ad aquam per communitatē a cerebro q̄ per essentiam in oculo. Et fiunt plures per essentiam in oculo quā per communitatē a stomacho aut ab alijs membris. Sed de non perducētib; ad aquam contrarium iudica. Vnde licet uapores stomachi aut aliorum membrorum possint ducere ad cataractam, hoc tamen rarum est, frequenter tamen faciunt imaginationes non ducentes ad aquam.

Prognostica ex iam dictis satis innotescunt. Iam enim uisum est quare imaginationes proueniunt ex acuitate uisus, quae non comparantur ad nocumentū, & quae comparantur ad nocumentum. Et inter comparatas ad nocumentum, iam notae sunt illae quae sunt male perducētes ad cataractam. Et similiter quae licet noceant uisui, non tamen perducunt ad cataractam. Sed quia aliquando ad imaginationes sequuntur cataractae. Et quia Rasis in praesenti capitulo aliquid de ipsis loquitur, ideo pro completiori doctrina de cataractis est agendum.

DE CATARACTA.

Cataracta ergo descensus aquae, aqua descendens in oculū gutta, suffusio sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem. De qua diuersi auctores sub his diuersis nominib; determinant. Dicitur cataracta a cataractin, quod idem est quod decrito, oculus enim cataracticus est qui de missu aquae obstrusus est. Dicitur aqua ad similitudinem aquae fluidae in principio, In processu autem dum confirmata est dicitur ad similitudinem aquae congelatae. Et ex eadem causa dicitur gutta. Dicitur enim descensus aquae siue aqua descendens ex eo quod frequentius fit per uiam defluxus quā per uiam paulatim factae cōgestionis. Et ex eadem causa dicitur a G. infusio siue suffusio. Et diffinitiuē est oppilatio ex aqua inter corneam & crystalloidem situata uisum impediens. Licet aliqui alij aliter diffiniant, quod est macula pannicularis intra oculum coram pupilla, per quam uisus prohibetur, ex humid. extranea in o-

culo existente, temporis diuturnitate & frigid. oculi congelata. Et haec diffinitio propriē diffinit cataractam confirmatam. Et ex prima diffinitione quae est artificialior collige quod cataracta est morbus in uia & non in numero ut quidā opinati sunt, nō enim sensibilib; laedit operationes pro quanto est aliquid superadditum partibus oculi. Nam si illa aqua esset in profundo albugine non coram pupilla, non laederet sensibilib; operationes, & tamen aequē bene esset aliquid superadditum partibus oculi, sed quia est coram pupilla prohibens uisum laedit operationē principalem oculi, & propterea morbus in uia, nō autem in numero. Ex quo cōcipe quod aqua est causa morbi scilicet oppilationis, ipsa enim oppilatio est morbus, & laesio operationis uisus est accidens. Ipsa tamen aqua licet non sit morbus in numero, reducit tamen ad morbum in numero &c.

Sed circa dicta cadit dubium nondum discussum, cuius dubij solutio est multum necessaria ad curandū cataracta operatione manuali, scilicet in quo loco cataracta situetur, & per consequens ad quem locum debeat peruenire acus pro depositione cataractae. In quo dubio auctores & doctores multum fuere discordes. Aliqui namq; ut Azaraius cap. de aqua. Hali Abbas 9. theoricæ, & tertio eiusdem. Et similiter Galenus 3. techniq; Et Gilbertus cap. de aqua, uolunt aquam situari inter uueam & crystalloidē, & per consequens acum pro deponendo cataractam debere penetrare usque ad intra uueae. Econtra uerō Iesus Hali, A. Mesue, Albucasis afferunt aquam cōrineri inter uueam & corneam, & consequenter acum non debere perforare uueam sed solum coniunctiuam, & scleroticam coniunctiuā immediatam, & ita immediatam ut appareat una sola, sicut & cornea manifestē apparēt cōiunctiuā unī ipsi solum differentibus secundum peruietatem & imperuietatem.

Pro cuius dubij solutione praetermittendum cataractam dupliciter sumi, scilicet communiter & propriē. Cataracta communiter sumpta est oppilatio aquosa, prohibens uisum, unde ubiq; potest esse oppilatio aquosa prohibens uisum ibi potest esse cataracta. Vnde non solum ante crystalloidē, sed in crystalloide & post crystalloidem, scilicet in uitreo retina & secundina sclerotica cōiunctiuā neruis opticis potest esse oppilatio aquosa prohibens spiritus uisibiles uenire ad crystalloidem, & sic potest esse cataracta communiter sumpta, quae tamē ab oculis aspicientibus non uidetur, quam aliqui appellant guttam serenam, sed fortē melius est conformando sedictis autorum appellare guttam serenam cataracta apparentem, connotando quod cum haec sit oppilatio ultra crystalloidē prohibens transitum spirituum ad oculum, sed licet de nominib; omitamus. Cataracta autē propriē sumpta est oppilatio aquosa prohibens transitum specierum uisibilium ab obiectis exteriorib; ad crystalloidem, & haec ab oculis aspicientibus uideri potest. Vbiq; ergo potest esse haec oppilatio potest etiam esse cataracta propriē sumpta, de qua est quaestio nostra. Cū ergo haec oppilatio aquosa possit esse in toto ambitu a cornea usq; ad crystalloidem, imō etiam in superficie ipsius crystalloidis, sequit quod in toto hoc spacio potest esse cataracta propriē sumpta. Et sic aliquid quando erit in superficie crystalloidis. Aliquando ad-

herens telæ aranæ siue uersus crystalloidem siue uersus uueam. Et potest esse in qualibet parte albuginei & in foramine uueæ & in ultima parte albuginei adhærens corneæ. Quod autem in his omnibus partibus potest esse oppilatio aquosa manifestum est quia in omnibus his partibus possunt esse imaginationes aquosæ, ad quas sequuntur cataractæ ut supra determinatum est.

Præterea in omnibus his partibus, per uiam paulatim factæ congestionis potest cataractæ fieri, tum ex nutrimento harum partium non bene conuerso, tum ex superfluitate nutrimenti non bene resoluta, tum etiâ ex uaporibus, qui ad quamcūq; harum partium communiciari possunt, possent etiam in omnibus his partibus, per uiam defluxus à capite, cataractæ generari, nam potest fluere materia ab almochari ad coniunctiuam quæ existens in coniunctiuâ potest refundere ad albugineum, & tunc colligetur cataractæ inter corneam & uueam. Et in hoc casu cum sit per uiam defluxus ab almochari laudant auctores sectionem uenarum temporalium aut frontaliū. Potest etiam materia humida deriuari à dura matre ad scleroticam, & consequenter ad corneam, & ab ipsa ad albugineum, & tunc situabitur cataractæ inter corneam & uueam, potest etiam tertio materia humida in pia matre cōtenta deriuari ad secundinum & uueam & ab ipsa refundari ad albugineum, & tunc si refundet ad intra uersus crystalloidem cataractæ situabitur inter crystalloidem & uueam. Si uero ad albugineum refundat uersus corneam, tunc cataractæ situabitur inter corneam & uueam.

Si uero hæc humiditas refundet ab extremitate circuli ipsius uueæ, tunc directè erit in ipso foramine uueæ. Si uero materia humiditas sit in cerebro, & profluat ad nervos opticos, & à nervis opticiis ad retinam et telam aranæ, & refundet à tela aranæ uersus crystalloidem, tunc adhærebit superficiem telæ aranæ & crystalloidis. Si uero refundet uersus uueam, tunc situabitur in extremitate albuginei apud telam aranæ, & forte adhærebit telæ aranæ. Ex his itaq; manifestum est in omnibus his partibus, posse generari cataractam, ipsamq; posse situari tam inter crystalloidem & uueam q̃ inter uueam & corneam. Ex his etiam manifestum est quomodo aliquando totus albugineus aut maior pars eius est una cataractæ ipso albugineo alterato, & propter aliquam ægritudinem factæ albo et inperuio, aut propter multam humiditatem ad ipsum a capite decurretem ipso similiter factæ albo & inperuio, hinc est quod aliquando totum quod apparet de oculo est albu. Sed iam restat ut soluamus quasdam rationes sensibiles contra utramq; opinionem. Primum contra Azaruium & ceteros tenentes cataractam situari inter crystalloidem et uueam, & operatorem cum acu debere perforare coniunctiuam scleroticam & uueam ut perueniat ad ipsam cataractam, nam ex hac operatione deberet sequi exitus albuginei per foramen acus, consequens est contra experientiam, ergo positio falsa. Secundo quia cataractæ non posset extrahi per sectionem corneæ in parte inferiori, consequens est contra experientiam. Et A. in cap. proprio, & cōquendo opinionem istorum quæ in parte uerior est quam opinio contraria. Ad primum quod albugineum cum sit aliquoties uiscolus propter strictionem foraminis, acu scilicet existente subtili sicut debet esse al-

bugineus non potest exire, quia extracta acu quamprimum foramen clauditur, etiam quia hoc argumentum æquè bene procedit contra opinionem contrariam cum acus secundum opinionem suam etiam penetraret ad albugineum. Præterea hæc ratio est contra eos, quia aliquando cum punctura acus aliquid de albugineo extrahitur. Ad secundum dicitur quod non omnis cataractæ curatur per sectionem corneæ, sed solum illa quæ est immediata ipsi corneæ & quæ est fluida.

Et forte quod in hoc casu esset melius ut illud instrumentum esset perforatum ita ut cataractæ possit suggi, & hoc instrumentum esset cōueniens ad extrahendum saniem existentem ad intra corneam. Sed contra opinionem A. & ceterorum sunt quinque rationes non faciles. Prima quia si cataractæ continetur intra corneam & uueam non posset apparere dilatio & contractio uueæ, quod tamen est signum semper apprens in cataractæ curabili, & probatur consequentia, nam cataractæ opponitur ipsi uueæ uel ipsi foramini uueæ, & cooperit ipsum. Cum ergo non sit diaphana non poterit ab aspiciēte uideri ipsius dilatio aut contractio aliter non prohiberet uisum. Secunda, quia cataractæ curabilis non deberet semper apparere ex directo pupillæ, imò aliquando supra, aliquando infra, aliquando deorsum, aliquando dextrorsum, aliquando sinistrorsum secundum quod accidit aquam colligi. Consequens contra experientiam, quia cataractæ curabilis semper apparet solum ex directo pupillæ. Tertia ratio, quia cataractæ deberet multoties apparere maior quam pupilla, immo æquè magna sicut tota cornea, cum accidat aliquando multam humiditatem coagulari totam corneam occupantem, consequens contra experientiam, quia apparet ferè semper ad quantitatem pupillæ saltem cataractæ curabilis. Quarta ratio, quia acus imposita perueniens ex directo corneæ cum cornea sit diaphana in omni tēpore sui deberet uideri in qualibet parte, sed consequens est falsum, quia non uidetur nisi ex directo pupillæ, cuius signum est quod operatores perforant uueam unde acus solum apparet ex directo pupillæ &c. Quinta ratio sumitur ex difficultate operationis quæ ferè æquatur impossibilitati. Est enim difficillimum perforare coniunctiuam et non uueam sibi immediatam in ea parte in qua sit perforatio cuius maxima apparet difficultas ex eo quod aliqui sunt experti in oculis mortuis, & nunq̃ possunt perforare solum coniunctiuam, ita ut penetrarent cum acu inter coniunctiuam & uueam ad uacuum coram pupilla, ergo multo minus in oculis uiuis, qui dolent & non ita quiescunt tempore operationis. Istæ quidem rationes ut uides sunt apparenter concludentes contra A. Iesum Hali, & alios hanc uiam sequentes. Et forte si multoties operari fuissent, mutassent opinionem. Credo ergo propter rationes prædictas quod secundum plurimum cataractæ deponibiles est ad intra uueam, aut in circumferentia foraminis uueæ, licet etiâ aliquando contineatur intra corneam et uueam, ut ante probatum est. Et credo quod absolute melius sit et de positioni cataractæ, congruentius ut operator cum acu perforet uueam, nam hoc modo faciliè deponet cataractam quæ erit intra uueam in quacunque parte fuerit, immo etiam si esset immediata telæ aranæ. Ca-

uendum tamen summopere in curatione ne moueatur & disrumpatur tela aranea, sic enim necessarium uisus impediretur, est enim post crystal. principalissima particula concurrans ad uisionem, nec est ut quidam somniauerunt, quod cataracta deponibilis adhæret telæ aranæ & simul deponitur cum tela aranea. Et dicunt quod hæc est causa propter quam semel deposita cataracta in uno oculo nunquam alia generatur in eodem, potest etiam cum hac operatione facile deponi cataracta quæ est prope uueam uel in ipsius foramine, & quæ est ultra foramen uueæ adhærens corneæ penetrando acur per foramen uueæ usque ad corneam, non autem ita facile secundum modum Iesum Hali & A. poterit deponi cataracta ea, scilicet maximè quæ est ad intra uueam ut patet consideranti, quæquam Iesus Hali dicat quod per foramen uueæ contorquendo acur intramittitur cuspis acus, & cataracta existens intra uueam potest trahi extra uueam, & poni sub cornea. Et dicit quod in extractiõe dilatabitur foramen uueæ, deinde ex se claudetur sicut in exitu foratus aperitur collum matricis, deinde post exitum clauditur. Sed facilius est dicere quàm facere. Et pro opinione contra Iesum Hali, A. & ceteros est operatio omnium modernorum qui deponendo eas perforant uueam & eligunt hunc modum tanquam aptiorem & faciliorem ad quem minor dolor & remissiora sequuntur accidentia, secuti enim fuissent primam si fuisset conueniens. Artes enim factæ sunt per additamentum & cuiuslibet est addere quod deficit. i. ethi corum. Sed tamen quia rationes contra A. & Iesum Hali concluderant cataractam deponibilem nunquam contineri inter uueam & corneam, ideo ad rationes illas est respondendum. Ad primum cum infertur quod non posset uideri dilatatio & contractio pupillæ cataracta posita inter uidentem & uueam, negatur consequentia quia cataracta deponibilis debet esse aequaliter transparentis, & à lumine irradiabilis. Vnde habentes ipsam aequaliter uident lumen, licet non uideant colores &c. Vnde uuea mota aequaliter poterit uideri licet difficulter. Ad secundum cum infertur quod non deberet semper situari ex opposito pupillæ, sed aliquando magis supra uel infra. Conceditur ut plerumque accidit unde propter hanc causam aliquando cataractici uident medietatē inferiorem unius rei, aliquando superiorem, aliquando dextram, aliquando sinistram. Ad tertium cum infertur quod aliquando deberet occupare totam corneam. Conceditur & tunc illa cataracta nullo modo est peruia nec illuminabilis & apparet regere totam corneam, & non est deponibilis uel raro. Si autem sit à lumine irradiabilis tunc magis irradiatur in ea parte in qua est subtilior, sed est subtilior in circumferentijs corneæ quàm in medio ipsius, et ideo in medio ipsius apparet magis terminare uisum, et sic habere magis rationē cataractæ, in circumferentijs autem licet sit, quia non terminant uisum, non habent rationem cataractæ, & hæc est causa propter quam cataracta uidetur minor in loco lucentissimo quàm in loco obscuriori sicut etiam ea quæ continetur intra uueam uidetur minor, scilicet quia propter disgregationem luminis foramen uueæ constringitur & in obscuro dilatatur. Ad quartum cum infertur quod deberet uideri cuspis acus cum est ex directo corneæ & non solum pupillæ, conceditur, sed non

apud operantes modernos qui perforant usque ad uueam, uel perforant uueam, non enim uidetur nunc nisi ex directo pupillæ. Ad ultimum argumentum sumptum ex difficultate operationis dicitur quod hæc operatio est difficilior, sed tamen non est impossibilis. Et si arguatur quia in oculo mortuo non potest fieri, ergo minus in uiuo dolente, & non ita bene quietente, negatur consequentia, quia in uiuo hæc tunica magis distat calore spirituum dilatante & quodammodo replente inter tunicam & tunicam quo consumptio corrugatur, & magis sibi inuicem appropinquant. Signa autem quibus distinctè comprehendipotest an cataracta sit inter uueam & corneam an post uueam an in foramine, subiungam cum agitur de signis &c. Species cataractarum quandoque sumuntur à quantitate. Quia quædam sunt magnæ oppilantes totam pupillam ut ex nulla parte remaneat discooperata, & tunc obiecta extrinseca secundum nullam eorum partem comprehendere possunt, & aliquando est ita magna ut ferè occupet totum oculum albugineo toto propter aliquam agritudinem factam in peruiis, est enim totus una cataracta. Et similiter similitudo humiditatis per totum albugineum à cerebro deriuatur. Quædam sunt parue oppilantes solum partem pupillæ et tunc obiecta uidentur secundum eam partem secundum quam pupilla est discooperata. Vnde obiectorum aliquando uidetur dextra pars & non sinistra. Aliquando superior & non inferior. Aliquando solum uidetur circumferentia, imò in medio existimantur sicut obscura siue perforata, licet eadem obiecta ut dicit A. quæ secundum unum situm non uidetur totaliter ipsorum situ mutato totaliter uidebuntur. Aliquando species cataractæ sumuntur à colore. Et sunt quatuor in genere, albus phlegmatici proportionatus, rubeus sanguini, citrinus, aut uiridis datus, cholerae, niger melancholicæ. Sub colore albo continentur sex species, scilicet cataractæ. Primò coloris æreæ aut æthereæ. Secundò coloris margaritalis. Tertiò coloris albi uergentis ad citrinum siue plumbei. Quarto coloris albi tendentis ad uiridem. Quintò similes argento uiuo non solum in colore sed etiam in motu, nam ex quacunque oculi palpitatione, imò ex motu spirituum agitantur et mouentur ex eo quod illa aqua est fluida non condensata. Sextò sunt gypseæ ipsoplegmate multum inspissato. Sub colore autem rubeo attestante sanguini continentur rubæ, claræ, siue aureæ, non enim reperiuntur aliquæ quæ proprio sanguinis coloris attestentur. Quædam prudenter à sanguine sunt albæ saniosæ ipso sanguine in sanis ueris, quod tamen raro accidit, nam si uertatur in sanis sanies descendit in albugineo sua grauitate & non stat coram pupilla, aliquando sunt citrinæ aut remissæ aut intellæ. Et aliquando uirides claræ & hæc pendunt à cholera, aliquando sunt melancholicæ, aut nigrae aut uiolaceæ, aut uirides obscure, quancumque color uiridis obscurus non solum pedere possit ab humore sic colorato, sed etiam multitudine aquæ, aqua enim multa profunda sicut experimur in fluuijs apparet uiridis obscura. Color enim niger non semper pendet ab humore nigro, sed aliquando apparet in pupilla propter luminis diminutionem & non est uera nigredo, sed obscuritas. Tertiò sumuntur species cataractæ à modo substantiæ. Nam quædam sunt subriles nōdum inuiscare sicut acci-

Signa sunt cataractarum

dit in principio cataractarum non confirmatarum. Quædam sunt adeo incrassatæ & inuiscatæ ut sint quodammodo in pannum uersæ, & multum adherentes, quædam sunt mediæ inter has quæ solæ sunt cum acu deponibiles. Sumuntur & quartæ species cataractæ. Nam quædam sunt cum oppilatione nerui optici aut alicuius partis ultra crystalloidem. Quædæ sine oppilatione. Quinta diuissio, nam quædam situantur inter corneam & uueam, quædam inter uueam & crystalloidem, quædam in circūferentia foraminis uueæ, ut antea dictum fuit &c.

Signa cataractæ absolute sunt ipsæmet cataractæ quæ à domestico artis facile comprehenduntur habet uisum acutū. Differunt enim ab albugine & alijs uestigijs existentibus in cornea, quia hæc sunt in superficie corneæ extrinseca cataractæ ultra corneam. Differunt à sanie retro corneā quia sanies in parte inferiori corneæ apparet ad modum lunellæ, & si cooperit totam corneam dicitur cataracta, similiter partem corneæ ex directo pupillæ. Signa cataractæ quæ diuersificantur secundum quantitatem nota sunt ad uisum & ex relatione ægrī. Signa cataractæ diuersificantur secundum colores nota sunt cuiusque bene uidentur, nā & si aliquando color obscurus per priuationem luminis reputetur niger, & à non bene considerante reputetur pendere à melanch. tamen si quis exercitatus bene aspiciat comprehendet diuersitatem inter colore nigrum uera nigredine & obscurum. Signa cataractæ distincte secundum uel penes modum substantiæ sunt duo. Primum quia si quis fricat oculum cataracticum & immediate post aspiciat in oculo, & uideatquam dilatari tantum ut una pars appareat ab altera diuidi & separari tunc est nimis subtilis. Si autem appareat dilatari & non separari & postea immediate ad suum sitū cōsuetum redeat, tunc est mediocris et cum acu deponibilis. Si autem per frictionem nullo modo moueatur, est nimis indurata non curabilis. Secundū isti experimenter ponunt corum super oculo, & fortiter sufflat, ut illud corum motum fortiter commoueat oculum, & immediate aspicientes in oculum iudicant per motum cataractæ aut priuationem motus secundum quod statim dictū fuit. Sed consilio A. hæc experientia non est sæpe tentanda, nā est ex eis quæ conturbant aquam, & facit curam cum instrumento distictilem. Signa distinguuntur utrum sint cum oppilatione alicuius partis ultra crystalloidem aut non sunt quia oculus alter debet claudi & comprimi, tūc si per compressionē apparebit dilatatio aut constrictio pupillæ alterius oculi est signum oppilationem non adesse, spiritalibus, trāscentibus. de uno oculo ad alterū. Si uero fiat dilatatio & constrictio, adest oppilatio, uel uno oculo cōpresso alter oculus in quo uis experiri fricetur & uideatur utrum pupilla dilatetur & constringatur. Verum hoc signum fallit si cataractæ crassæ essent in ambobus oculis tunc enim pupilla propter inuiscationem à cataracta non poterit moueri, & si mouebitur non comprehendetur ab aspiciente, fallit secundum quando quis pateretur alintisar, aut cōcundum signum est quia secundum plurimum ubi non est oppilatio integra uidetur aliquis splendor cum oculus est in loco lucentissimo constitutus & præcipue si uenerit de obscuro loco ad clarissimum, aut si sub-

trō magnum lumen præsentatum fuerit. Signa cataractarum situatarum inter corneam & uueam sunt impedimentum uisionis uueæ, nam si cataractæ sint laterales non irradiabiles à lumine uuea nullo modo uidetur, si uero sunt irradiabiles foramen uueæ aliquo modo uidetur & in loco clarissimo tamen cum difficultate. Secundum signum, quia apparent non solum oppilare corneam ex directo pupillæ, sed interdum multo maiorem partem aut totā corneam præcipue si aspiciantur in loco tenebroso. Tertium, quia secundum plurimum sunt aliquantulum laterales non in directo ipsius pupillæ sed aliquando magis à dextris, aliquando à sinistris, superius uero magis aliquando, aliquando magis inferius, licet sint pupillæ communiantes, quia aliter non essent cataractæ. Quartum signum quia pupilla est & apparet strictior consuetio ipsa cataracta impellente uueam interius sua corpulentia. Vnde foramen apparet minus, sed opposita signa sunt omnino, cum cataracta est intra uueam, quia uuea clare uidetur etiam in loco non multum lucenti. Apparet solum ex directo pupillæ & nunquam occupare maiorem partem quam sit pupilla licet aliquando minorem & foramen uueæ secundum plurimum apparet maius consuetio ipsa cataracta sua corpulentia expellente uueam, unde foramen dilatatur. Signa cataractæ existentis in circūferentia foraminis sunt omnia signa iam dicta quando est intra uueam, aut maior pars eorum. Sed est unum signum distinctiuum sensibile, quia foramen uueæ apparet minus remotū ab oculo uidente quam ipsa cataracta, si ipsa cataracta sit de albis sicut ut plurimum est, nam in æquali distantia color niger apparet propinquior quæ albus.

Prognostica. Primum cataracta maxima quæ ferretotum occupat oculum non est curabilis. Secundum. Cataractæ acutæ, scilicet margaritales declinatæ ad uiride cineritiæ siue plūbeæ sunt curabiles. Sed similes argento uiuo secundum Græcos facile curantur. Gypseæ uero & similes argento uiuo non sunt cum acu deponibiles. Aureæ citrinæ non uehementis citrinitatis difficile curantur. Sed inter se citrinitatis non curantur. Sed nigrae uiolacæ, plumbeæ, uehementis nigredinis non curantur. Virides obscure non curantur. Virides clare difficile curantur. Cataracta mediocris substantiæ cum acu deponibilis est, subtilis substantiæ nondum confirmatæ cura medicinis aliquando curantur, licet raro, non autem cura acu deponi possunt. Nimis autem incrassatæ quæ non mouentur per compressionē neque cum acu neque medicinis sunt curabiles. Cataractæ quæ sunt cum oppilationē nerui optici integre sunt incurabiles, sed sine oppilationē curabiles. Et cataractæ quæ post casum aut egritudinem cerebri aut propter percussione in capite siue in oculo accidit sit difficilis curatio eius. Cura quia imaginationes et cataractæ multum sunt affines, de ambatu cura simul agendū est hoc premisso quod hic non intendo curare imaginationes proueniētes ex acuitate uisus, quia non comparant ad nocumentū nec intendo ponere curam earum quæ pendunt à siccitate quæ remouentur per humectantia interius & exterius applicita, quia de ipsa actum est sufficienter in capite de debilitate uisus. Ad quod recurre neque hic intendo ponere curam imaginationum proueniētiū ex uestigijs derelictis in cornea ex albugine, ulcere, & alijs ægritudinibus

ægritudinibus in ipsa præcedentibus, nam de earum cura sufficienter dictum est supra. Hic ergo solum intendendo ponere curam imaginationum ducentium ad aquam & ipsius aquæ inicientis aut perfectæ siue sint per communitatem siue per essentiam in oculo.

Cura itaq; harum imaginationum et aquæ inicientis per communitatem à toto, aut à stomacho aut à capite & nervis opticis quinque exigit intentiones curativas. Prima euacuat. Secunda diuerit. Tertia regit membrum mittens. Quarta oculum confortat ne materiam aliunde suscipiat, & si quid susceperit resoluit & euacuat. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium & annexorum. Prima intentio cõpletur eisdem instrumentis, de quibus in cap. de debilitate uisus prouenire per communitatem dictum est, hoc addito quod euacuationes pro cura imaginationum & aquæ inicientis sunt multoties reiterandæ frequenter ex minoratiuo, digestiui, & eradicatiui, euacuantes diuersos humores, & secundum humoris exigentiam à quo pender imaginatio siue cataracta, qui tamē ut plurimum est phlegmaticus uel aquosus, raro cholericus sanguineus aut melancholicus. Et propterea raro in hoc casu competit phlebotomia aut alia sanguinis euacuatio. Et si materiæ peccantes fuerint in stomacho, uomitu possent euacuari, sed cum timore & magna obseruatione materia præcipiretur ad nervos opticos aut ad oculos itaq; capite existente pleno nullo modo fiat, & cum hoc facilius semper debet esse uomitus. Secunda intentio, scilicet, diuersio perficitur cum fricationibus, ligaturis, clysteribus, pedum lotionibus, & si materia fuerit in capite cum gargarismatibus, masticatorijs, caput purgij per nares, quæ tamen postponenda sunt quantum est possibile ne propter uiciniam materiam ad oculum præcipitent. Et his non sufficientibus cum laqueatione in suprema parte colli terminata ad occiput, & cum cauterio in parte posteriori capitis, scilicet, in cornu capitis ex directo oculi patientis, & cum cauterio in commissura coronali, & si materia fuerit sanguinea, quæ raro est, cum phlebotomia uenarum noceat, & uenarum post aures, & frontaliū & temporalium si opus fuerit, imò laudat Auic. in hoc casu incisionem articularum temporalium, quod similiter de uenis temporalibus est intelligendū, ubi materia fluat ad oculos per partem extrinsecam quæcunq; sit materia, de quibus omnibus sufficienter actum est in capitulo de debilitate uisus, ad quod recurrit. Tertia intentio perficitur in confortando digestiua & expulsiua eius, ut si stomachus fuerit in causa, quod tamē raro est in imaginationibus ducentibus ad aquam, licet imaginationes non perducentes ad aquam per se peccauerit. Debet enim confortari cum interius & exterius applicitis post sufficientem euacuationem & diuersionem, ad quod in causa frig. & hum. quæ est ut plurimum, iam laudata est triphera minor, & chebuli cõditi, & multa superius nominata in debilitate uisus, in quo casu maximè os stomachi debet confortari ipsum corrugando, & claudendo in fine mense cum cytonijs aut piris conditis, aut coriandris præparatis, de quibus in cap. de debilitate uisus. Similiter caput est confortandum cum electuarijs de quibus supra, ad cuius & etiam oculorum confortationem opime cõfert maiorana sicca odorata. Quarta intentio perficitur cum collirijs superius dictis

in cura debilitatis uisus propter turbidam humiditatem in oculo, crassitiam & turbulentiam spirituum, ad quæ recurrit, & accommoda huic loco siue huic cap. Inferius etiam subiunguntur multa colliria experta & in hoc casu laudata. Ad hoc etiam conferunt electuaria & triphera, & mirobalani cõditi, de quibus omnibus supra. Ultima intentio exquirere pertractata est in cap. de debilitate uisus, sed in hoc casu amplius subtilianda est dieta, ita ut secundum Auic. solum comedant semel in die, nō bibant uinum, sed aquam mellatam aut saccharatam non comedant humida brodiaia, sed stent contenti assatis aut frixis, euitent omnia euaporantia, & omnia præbentia nutrimentum crassum, & morentur in aëre secco, & declinante ad calidum secundum plurimum, & aspectus rerum uiridium maximè in hoc confert, & præcipue fortis & longus aspectus in oculo asini syluestris fortiter disgregat aquam subtiliā & resoluit, &c. Cura autem imaginationum & aquæ inicientis per essentiam in oculo perficitur cum eisdem intentionibus, et instrumentis de quibus amplè dictum est in curatione debilitatis uisus propter humiditatem turbidam existentem in oculo ad quæ recurrit & huic cap. accomodat inferius autem ut dixi, statim subiunguntur colliria in hoc casu propria, resolutientia uapores atq; aqua in oculo iam collectam, et ipsam cum lachrymis educetia sicut etiam superius dictum fuit. Sed attende tamē quod est differentia aliqualis inter localia administrata pro cura imaginationum, & inter ea quæ administrantur pro curatione aquæ iam inicientis. Prima enim debent esse leuiora. Secunda acutiora, quanto difficilius est resoluer aquam quàm uapores, sed in omnibus tamen incipe à leuioribus gradatim procedendo ad fortiora secundum quod ordo medicinalis exposcit, sed iam ad textus expositionem accedamus, deinde subiungemus ultra medicinas Rasii alias in hoc cap. proprias, & ultimò ponemus curam cataractæ confirmatæ cum operatione manuali, relinquentes curam cataractæ induratæ, & in panniculum solidi uersæ, quæ nullo ingenio est curabilis.

Quandoq; uidetur alicui quod ante se habeat cimices uel alia parua corpora subtilia & radiofa, quod aliquando causa stomachi, aliquando ex proprio nocumento ipsius oculi contingit. Ideoq; differentia inter hæc duo desideranda est. Neq; pro paruo est habendum cum hoc accidens euenierit. Ex eo namq; quod causa stomachi accidit nō est multum timendū quod oculo nocumentū inferat. Ex eo uerò quod ex proprio uitio contingit ualde timendū est, hoc enim aquæ principium existit. Hæc autem passio dū recēs est et in principio curabilis est, Sed cum iam ad perfectionem deuenierit sanari

nari non potest, nisi cum incisione, & fortasse etiam incisio prodesse non poterit.

Quapropter differentia inter hæc duo prædicta diligenter est inuestiganda quæ est prout dicemus. Quando imaginationes quæ uidentur utriusque apparent oculo, existimandum est hoc contingere ex uitio stomachi, & contra, cum imaginationes in hora fastidij, & in hora malæ digestionis plura solito uidentur: In hora autem famis & laboris pauciora apparent, existimandum est etiam hoc ex stomacho esse. Et si ex quo istæ imaginationes acciderunt, duo præterierunt menses aut plures, & in pupilla non fuerit uisa conturbatio, existimandum est hoc ex stomacho esse. Quando autem istæ imaginationes tibi aggregatæ fuerint, pilulas cochias in potu tribue. Et si passio omnino remouetur, iam existimationes prædictæ certificata erunt. Si autem uno tantum oculo apparuerint, & uno modo in horis omnibus permanferint, existimandum est uitium aquæ adesse, præcipue cum in pupilla non fuerit obfuscatio, obfuscatio namque si fuerit in pupilla, dubitatio iam tunc erit sublata.

Hic Rasis agit de imaginationibus, quas appellat aquam descendentem in oculo cum frequenter sint aquæ initium. Diuidit hic textus in duas partes, in prima agit de ipsa theorie, in secunda practice ibid. Cum autem hæc passio. Prima in tres, in prima ponit diffinitionem imaginationum, in secunda ibid. Quod aliquando causa stomachi, ponit duas species imaginationum, in tertia ibid. Quando imaginationes. Ponit signa distinctiua inter utraque speciem. Dico quod in prima parte ponit licet non explicite diffinitionem imaginationum, quæ tu supplet ordinem, ut supra dictum fuit. Sunt enim imaginationes uisio corrupta, cincti, aut rerum si milium, aut aliorum corporum subtilium, radiosorum, aut non radiosorum, quæ scilicet, apparet coram oculis, licet non sint. Et ex his concipere potes quasdam species imaginationum sumptas à colore figura aut quâritate de quibus supra. In secunda parte ponit duas species imaginationum, unam per communitatem à stomacho, aliam per essentiam in oculo inter quas est, ut ipse dicit sollicitè distinguendum, nam licet ex ea quæ uenit per communitatem à stomacho non sit multum timendum tamen multum timendum est ex ea quæ prouenit per essentiam in oculo, cum hic frequenter sit aquæ principium, quæ in eius principio aliquando cum medicinis est curabilis; cum autem con-

firmata est non curabilis nisi cum incisione, id est, de positione quæ sit cum acu, aut incisione quam faciunt quidam perforando corneam in parte inferiori, & extrahendo cataractam de qua infra. Et fortasse aliquando etiam non confert aliquod ingenium curationis, & propterea diligenter est inuestiganda differentia inter utramque imaginationem, ut ab initio cura conueniens possit adhiberi. Sed circa hanc partem nota quamuis sint multæ species cataractæ præter suprascriptas. Rasis breuitati indulgens tetigit solummodo duas frequenter euenientes, de omnibus tamen superius actum est plenè. In tertia parte ponit signa distinctiua inter utramque speciem, scilicet, inter imaginationes quæ sunt per communitatem à stomacho, & illas quæ sunt per essentiam in oculo ponens quatuor signa distinctiua. Primum, quia imaginationes per communitatem à stomacho sunt communes utriusque oculo. Secundum, quia multiplicatur & augentur in hora fastidij, id est, abominationis cibi, scilicet, nausæ subuersionis, & uomitus, & huiusmodi nocumtorum stomachi ex repletionem ipsius prouenientium. Et in hora malæ digestionis, id est, corruptæ aut diminutæ. In hora autem famis & laboris, id est, inanitionis quæ labore sequitur diminuuntur. Tertium signum est, quod si præterierit duo menses aut plures, scilicet, tres aut quatuor secundum quod dicit ipse Rasis, secundo continentis, aut 6. secundum quod dicit Auicenna. Et non fuerit in oculo perturbatio suppleuius, existimandum est has imaginationes esse causam stomachi. Quartum signum, quia prouenientes à causa stomachi facile sunt curabiles per exhibitionem pilularum cochiarum educentium materias, à quibus pendent. Sed forte præstantius esset in hoc casu exhibere hieram picram simplicem aut compositam. Modus tamen curationis istarum sufficienter positus est. Et ex quatuor signis contrariis concipe quod sunt per essentiam in oculo. Existimandum est, scilicet, iudicio uerissimi non tamen certo, quamuis enim omnia signa arguentia imaginationes esse ducentes ad aquam apparuerint, non tamen certè iudicandum est nisi cum hoc obfuscatio in oculis & tenebrositas affuerit: nam quandoque imaginationes istæ postquam inceperunt curantur absque hoc quod perducant ad aquam aut naturam, aut medici beneficio, &c. Deinde cum dicit.

Cum autem hæc passio in oculo propria fuerit, prohibendum est infirmo, ne cum uentosis minuat ex collo sanguinem, nec ex brachio, nec comedat pisces, nec omnia quæ humectare possunt. Venter uero frequenter soluendus est ex pilulis cochij. Et æger ex calefactiuis & desiccatiuis nutriendus est. Hydromel præterea in potu est ei tribuendum. Et in oculis si est de fellibus mittendus. Si est de fellibus, quod proficit aquæ in principio & dilationi pupillæ & eis qui post occasum solis non uident, et tenebrositati uisus

uisus quæ ex humore. Recipe fellis gruis, fellis saboth, fellis hircini, fellis ancipitris, fellis aquilæ, fellis perdicum, omnium siccorum unum aut plura, sumantur q̄s de omnibus drach. 10. isforum siccorum, euphorbij, colocynthidis, sagapeni, omnium ana drach. 5. trita ag gregentur, & ex suc. foeniculi teneri & mittatur in oculum.

Ponit curam aque initiatis, ex cuius curatione elicere potes tres generales intenciones superius declaratas. Prima euacuatio est quam facit, non quidem phlebot. aut uentosis ex eo quod rarissimè accidit in hoc casu quod sit conueniens sanguinis extractio. In quibus tamen casibus accidit, dictum est superius, sed cum euacuatis phlegma & aquositate, sicut sunt pilulæ cochitæ non una uice sed sæpius exhibedæ. Secunda intentio est regimen uitæ cum calefacientibus & exiccantibus facilis digestionis non uaporosis nec prebentibus nutrimentum crassum, unde abstineat à uino et bibat hydromel, id est, aquam mellis. Tertia intentio est cum localibus & maximè cum collyrio ex fellibus cuius descriptionem ponit, scilicet & fellis saboth, id est, uarioli & c. hoc tamen collyrium est acutum ualde. Vnde consulo ut in primis leuiora tententur de quibus statim dicitur. Sed quia A. secundum unam expositionem Gētil. laudat fel uiperæ, secundū aliam uituperat, licet credam quod intentio eius fuerit laudare & non uituperare. Attēde septem conditiones obseruandas si uolueris ipsum applicare. Prima quod eligatur fel uiperæ non uenenosæ, saltem extremæ, scilicet talis qualem comedere possemus, cuius electio tangitur quarto canon. fen. tertia, capitulo de cura lepræ. Secunda conditio est quod tale fel misceatur cum alijs medicinis frangētibz acuitatem eius sicut dragagantum, gummi arabicum & similia & ipsum in perua quantitate. Tertia est quod corpus sit bene mundificatū. Quarta quod non sit puer, sed de uenerit ad complementum ætatis ut tunice eius oculi non sint multum molles aut passibiles. Quinta quod tunice oculi non habeant aliquam ulcerationem nouam nec antiquam nec malam complexionē calid, aut apostema nec aliam debilitatem accidentalem. Sexta quod homo nō sit multum famelicus nec habeat corpus multum inanitum ut nō trahatur intus aliquid fellis. Septima quod cum collyrizatur oculus, habeat os plenum aque ut si quid per foramina narium redundet & ingrediatur os non transglutiat, sed recipiatur in aqua & expuatur. Si ergo tanta sit spes in hoc felle, ut dixit A. cap. de debilitate uisus, & ut quidam referunt se expertos fuisse administrare obseruatis septem conditionibus suprascriptis. Fel secundum Rasim debet esse exiccatum, non humidum, nam resolutis partibus humidis remanet in reliquo fortior impressio. unde si nolueris tātam impressionem melius est ut eligatur humidum. Sed iam præter medicinas Rasii & eas quæ dictæ sunt supra in cap. de debilitate uisus ad resoluendum humiditatem turbidam in oculo subiungam quasdam in hoc cap. proprias, Ex A. elice quatuor, Prima est succus

foeniculi cum oleo debite incorporatis. Secūda est alcohol cum semine alkem quod est ultimum in resoluendo aquam, alkera existimo scilicet, aliter dictam centrum galli, siue galli crystinam & gallientum uulgari scarlosa. Tertia est caput hirundinis adustum cum melle confectum. Quarta est oleum balsami collyrizatum. A. etiam laudat odorem samplici, id est, maioranæ & præstātius est ut sit sicca. Ex glosa Rasii elice hanc descriptionem. & salis ammoniaci, opoponacis, añ. 3. 1. dissoluantur in lacte siccum. Gerardus de Solo accipit fellis, balsami ana. 3. 1. ellebori albi, piperis ana. 3. 1. puluerizanda puluerizentur & misce cum aqua distillationis raphani. Mesue collyrizat cum aqua rutæ mixta cum sagapeno aut cum succo foeniculi mixto cum felle, hircino melle & sagapeno quod est ultimum. Sabor accipit fellis hircini exiccati in uase æneo granorum lauri excorticorum ana. 3. 5. sagapeni. 3. 1. gummi. 3. 1. miscentur cum melle pauco & urina pueri non polluti. Iesus Hal, comedat fel uacæ mixtum cum asla foetida & pauco balsami. Sed attende quod in oculo non sit aliqua ægritudo prohibens horum acutorum approximationem sicut mala complexio calida, ulcus aut apostema. Et ex bona præparatione ad resolutionem aque est ut ante horum administrationem anhelat aliquis diu in oculum patientem postquam masticauerit semen foeniculi, aut piper, aut allium, aut simile acutum, postquam anhelationem immediatè subsequatur collyriatio cum aliquo de suprascriptis, aut fomentum primo oculum aqua cal. decoctionis foeniculi, aut infundat oculum in aqua cal. decoctionis foeniculi in uase uiridi, nec solum ad hoc conferunt exterius applicata, sed interius sumpta, sicut sunt electuaria dicta superius in debilitate uisus ex humiditate turbida & propter crassitatem spirituum, & sicut hæc trazea quam consulit Tadeus. & sem. foeniculi, anisi, ameos, fileris montani, zinzib. gariophylorum, cubeborum piperis longi, nucis muscatæ, radicum chelidoniz, euphragiz, rutæ, betonicæ, aliz, regiz, & similia fiat puluis miscendo cum saccharo, aut cum sufficiente quantitate mellis, fiat elect. non tamen quod si cataracta fuerit cholerica aut sanguinea cōueniunt pro resolutione ipsius remissiora calida tam exterius q̄ interius applicata. Et similiter diuersificanda sunt medicamina secundū tēpora anni, & cōplexionem corporis, & oculorū. Et propterea positz sunt diuersæ medicinz, tu utere his quæ magis tuo proposito seruiūt.

Iam superest ut ponamus modum deponendi cataractam cum acu quæ deponēda non est nisi sit substatie mediocris & boni coloris, ut antea fuit dictum. Si ergo fuerit nimis tenuis, incrassetur cum cibus et potibz, præbētibz nutrimentū crassum, non tñ caput multū replentibz. ne cataracta augeat. Concedunt ergo in hoc casu pisces, carnes crasse, rixū, frumentū, et similia incrassantia nō multū uaporatā. Imò etiā in hoc casu si caput nimium repleat, euacuandū est tam euacuationibus communibus, q̄ proprijs, & incrassata cataracta sufficienter præmissis euacuationibus etiam & phlebotomia, scilicet, si propter multitudinē sanguinis uideat opportuna, & patiēte bene disposito, tam secundum corpus, q̄ secundum animam, ut quia nō sit rufficulosis, aut habens aliam ægritudinē, nec iracundus, aut habens aliud accidens animi molestū. Et similiter

similiter oculo non habente aliam ægritudinem, procedatur ad operationem, postquam æger quieuerit per duos dies post euacuationes suprascriptas, ipso tamen habente beneficium uentris quotidie, aut naturaliter, aut medicinali auxilio, scilicet supposito, aut etiam clysteri, ipso etiam interim utente dieta tenui, aut saltem mediocri. Et si timeatur fluxus materiæ ad oculum per partes extrinsecas, ut quia aliàs sit consuetudine fluere approximetur fronti & temporibus aliquod stipticum ex dictis in ophthalmia. Et tunc operator præparatis necessarijs, scilicet acu argentea, cuius hæc est figura. Et si delatæ corti noui in albumine oui bene confuso infusa, & aliqua petia subtili linea ueteri circumdata, quæ similiter madefacta sit, & si uideatur albumen oui esse nimis tenax addatur parum aquæ rosacæ, quod fortè melius est ne in separatione dolorem faciat, & similiter fascia sit parata. Et sit tempus temperatum sicut uer aut autumnus, aut fiat temperatum artificialiter, neq; sit uentusum aut nebulosum. Et sit luna, scilicet decrefcentis & non in arietem, sitque æger ieiunus non multum famelicus in loco clauo constitutus, sedens super una bancha equitando. Et operator sedeat super eadem altius aliquantulum facie sua uersa uersus faciem ægri. Et cum cruribus suis amplexetur coxas ægri, & habeat sub pedibus eius duas banchas uel duo scabella firmiter fixa, quibus tempore operationis inniti possit, & minister sit post ægrum stans rectus, ut possit uidere operationem, cuius pectori æger adhaereat & teneat palpebram superiorem eleuatam cum indice aut medio digito, & medicus inferiorem palpebram deprimat sinistram cum manu sinistra, dextram cum manu dextra, & sic oculo aperto operator sufflet in eo ter aut quater postquam masticauerit foeniculum, ut cataracta motum cum calore recipiat & depositioni obediat, deinde præcipiat patienti ut uertat oculum uersus nasum & teneat ipsum firmum, & tunc in nomine Dei præmissio signo crucis intromittat acum per medium coniunctiuæ distanter à cornea per medium digitum, aut plus, aut minus, secundum oculi magnitudinem intromittendo acum & perforando intus donec penetret uueam, & immediate cum senserit acum esse in loco uacuo uertat acum uersus foramen pupillæ, ne aliquo modo rangat crystallinam. Et caueat ne nimis intromittat acum, communis enim quantitas eius quod de acu intromittitur est quantitas digiti parui. Et propterea bonum est ut illa parte acus usque ad quam debeat intromitti uel parum altius sit aliquod signum fixum, ut margarita aut simile, uel sit in ea parte deaurata, aut aliter colorata, & quando uidebis acum per corneam, aut si non uidebis credis ue risimiliter peruenisse ad cataractam, quoniam cum cataracta est in foramine uueæ, aut inter uueam et corneam non potest uideri acus, quamuis acus perueniat ex directo foraminis uueæ, licet quandoque per eam sit post foramen uueæ uersus crystallinam, puncta acus uidetur dare cum est ex directo foraminis, uueæ. Et tunc deponat ipsam trahendo paulatim cum suauitate ad partem inferiorem, & eam sic deponat, teneat tãto tempore quod diceret ter pater noster, aut unum miserere, deinde paululum acum tra-

hat & uideat si ascendat, & si reascendit iterum eam deponat totiens quod inferius remaneat: faciendo tamen omnia cum suauitate, & cauendo tactum crystallinæ aut telæ aranæ, & similiter dilatationem uueæ & perforationem corneæ. Si autem cataracta non potest deponi ad partem inferiorem, quia fortè adhæret parti superiori, deponat ipsam ad partem superiorem, aut scilicet, ad dextram aut sinistram in qua parte deposita quiescit. Et propterea dixit Auic. quod medicus ante depositionem debet experiri mouendo cataractam cum compressione ad quam partem magis declinet, & ad eam partem deponere, ad quam uisa est in motu suo declinare. Et tunc acum extrahat intornando eam sicut ipsam intromisit, & tunc ad extollendam artem ostende sibi aliquod obiectum, & interroga quid est hoc, ut circumstantes admirentur & magnificent opus tuum, & propterea bonum est, ut oculus sanus sit coopertus ante operationem, & non solum propter hoc sed propter alia.

Tutius tamen est, ut cum adhuc tenes acum in oculo & deprimis cataractam, ut ostendas obiectum, de quo dictum est, deinde clausa palpebra superpone cortum quod antea præparasti, & ligentur ambo oculi ut unus alium non moueat, & educatur cautè ad lectum propinquum, & præcipiatur quies, silentium, obscuritas, & iaceat in lecto super ceruicem capite eleuato, & parum comedat & bibat aquam coctam, & comedat mollia non indigentia masticatione sicut pistoriana hordei, aut oua forbillia, sed non prima aut secunda die, sed tertia aut quarta, & sic deinceps. Et utatur regimine in frigidatiuo prohibente apostema, et usque ad quatuor dies non mutetur nisi de tertio in tertium, aut saltem nisi singula die semel, & transactis quatuor aut quinque diebus, singula die bis semper imponendo albumen oui conuassatum cum pauca aqua rosacea, & sic fiat usque ad nouem dies. Deinde paulatim redeat ad cibum & potum & operationes sibi consuetas paulatim illuminando aerem in quo moratur, &c.

Duo autem sunt accidentia quæ superuenire possunt, quibus est subueniendum, unum, scilicet cum operatio sit alterum post operationem. Primum, cum operatio sit aliquid sanguinis potest resudare coram pupilla, quia fortè pungitur uuea aut cornea, ut illum sanguinem omni tuo posse simul cum cataracta deponas aliter erit nouissimus error peior priore. Secundum quod post depositionem aliquando superuenit dolor tum ex ophthalmia superueniente, tum ex uulnere quod malignatur. Cura ergo ophthalmiam cum sief albo & reliquo regimine ipsius, ulcus etiam in principio cum sief albo, & deinde paulatim addendo sief de plumbo & reliquum regimen eius. Et tempore uehementis doloris non oportet quod oculus teneatur uehementer compressus. Et si superuenit pruritus, qui tamen sub dolore reponitur, subueniatur cum aqua rosacea tepida, qua non sufficiente aliquid thuriæ præparatæ ei addatur. Et tandem si multum molestat cum iam securi fuerimus ab apostemate, imponatur collirium nostrum suprascriptum in capite de pruritu & rubedine palpebrarum. Aliqui tamen ex Græcis antiquis, ut recitat Albucasis & Auic. faciebant foramen subtus, scilicet corneam, quod fortè melius est facere in coniunctiua cum acu canulata, ut sugendo extrahant cataractam, quæ operatio est inconueniens

nisi aliquibus obseruatis conditionibus. Prima, ut aqua ipsa sit citra uueam et non ultra. Secunda, quod illa aqua sit fluxibilis non confirmata, & quod hæc operatio fiat paulatim, ne simul albugineus extrahatur, & hæc est propria cura saniei retro corneam. Multa, hoc dixi in capite, quia communiter est male cognitum.

DE NYCTILOPE AC AGILOPE.

Cap. XXXI.

NYctilops, sequibare, amicalopes, suberrati, asse, tenebrositas, sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem, de qua diuersi autores sub his diuersis nominibus determinant. Ab Hali Abbate 9. theo. 13. cap. dicitur sequibare. A Rasi 9. conti. asse. Ab Auic. & Rasi nyctilops quasi noctis passio, siue uisus obscuritas. Et diffinitio est actio diminutæ læsæ, ita ut euanescat uisus in nocte, id est in obscuro, & uideat in die, id est in claro, & debilitetur in fine eius. Et e contra haliar, glaucosis agilops, sileua, sunt termini synonymi significantes dispositionem nyctilopi contrariam, glaucosis quidem, quia accidit habentibus oculos glaucos: sic enim appellatur quinto de generatione animalium: secundo cap. & tertia aphorismorum, ultimo aphor. Et est actio diminutæ læsæ, ut non uideat in die sed in nocte, quod non est absolute intelligendum, ut nullo modo uideat in die, sed diminutè, cum non possit tenere oculos apertos & lumen multum tolerare, nec e contra quod uideant in nocte perfecte, sed non ita impediuntur in nocte sicut in die in comparatione ad oculos sanos, siue temperatos, imò fortè melius uident in die quàm in nocte. Sicut etiam non est intelligendum de nyctilope, quod nullo modo uideat in nocte, sed quod melius in die quàm in nocte in comparatione ad oculos sanos, quamquam defendi possit quod aliquis nyctilops melius uideat in loco lucentissimo, & melius toleret aspectum solis, quàm oculus temperatus, & similiter aliquis aliaricus melius uideat in nocte, quàm oculus temperatus. Ex quo tamen non sequitur, quod uisio absolute sumpta sit perfectior in ægro aut distemperato, quàm in sibi sano aut temperato. Sed bene uisio respectu determinati obiecti aut medij, aut breuiter cum circumstantijs quibusdam limitata non absoluta. Et ex his diffinitionibus inferre possumus, quod hæc dispositiones, scilicet nyctilops & haliar non sunt ægitudines, sed accidentia ægitudinum, à quibus immediate pendet, &c.

Species harum dispositionum sunt, aut quia operationes sunt multum læsæ aut parum, id est quod istæ dispositiones præternaturales sunt remissæ aut intensæ, sunt recentes aut chronicæ, sunt per essentiam in oculo aut per communitatem licet omnes istæ improprie species appellandæ sint.

Causæ harum dispositionum licet plurimæ sint, ad hunc tamen modum unitatis reducuntur, quia causa immediata & adæquata nyctilops est requisitio multi luminis ad uisionem cum hoc quod oculus potest ipsum tolerare. Et e contrario causa immediata & adæquata haliar est requisitio non multi luminis ad uisionem cum hoc quod oculus non potest multum lumen tolerare. Et ex hoc sequitur quod illi, qui nihil uident nisi lumen magnum, quamuis non

possint nisi lumen magnum tolerare, sicut habentes ulcus in cornea, & quibus uuea egreditur, non sunt dicendi haliarici, sicut e contra, neque sunt dicendi, scilicet nyctilopes, qui nihil uident nisi lumen, quamuis multum lumen tolerare possint: utraq; enim est uisio colorum, licet diminuta. Causæ autem nyctilops & haliar etiam sumuntur à tribus, scilicet, aut à tuncis oculi, scilicet, cornea uuea, et tela aranea, aut à humoribus, scilicet albugineo & crystalli, aut à spiritibus. A cornea quidem cum est nimis crassa aut nõ bene perula. Hæ enim dispositiones sunt causæ nyctilops, sicut contrariæ, sicut nimia tenuitas cum plurima peruietate sunt causæ haliar. Nimia autè crassitudo corneæ secundum plurimum est ex multa humiditate, siue ex tempore, siue ex generatione contracta. Et e contra tenuitas corneæ est ex siccitate secundum plurimum: Imperuietas autem corneæ potest sequi omne genus malæ complexionis, & multas etiam alias ægitudines, de quibus omnibus amplè dictum est in cap. de debil. uisus. Verù ulcus superficiale, licet faciat corneam imperuiam est quandoq; causa haliar, oculi non potente multum lumen sustinere, cum hoc tamen quod non sit ita imperuia, ut non possit uidere, quod etiam ferè accidit in omni ophthalmia.

Eadem causæ nyctilops & haliar, sumuntur ex dispositionibus telæ araneæ, ut de cornea dictum est ex uuea, quia aut est nimis nigra reddens totum oculum obscurum & est causa nyctilops, aut e contrario parum nigra reddens totum oculum glaucum, et est causa haliar. Similiter si foramen eius sit multum strictum, siue naturaliter, siue præternaturaliter est causa nyctilops, & e contra si nimis latum est causa haliar, quamquam contractio pupillæ naturalis sit causa, ut melius uideat in claro & obscuro, quàm pupillæ dilatatio, comparando tamen uueam ad reliquam melius uidet, habens pupillæ contractionem in claro quàm in obscuro, & e contra habens dilatationem pupillæ. Ab albugineo uero cum est multus in quantitate aut non bene peruius est causa nyctilops sicut contrariæ dispositiones sunt causæ haliar.

Causa autem multiplicans albugineum secundum plurimum est humiditas, scilicet cum præsentia materię sanguineæ aut phlegmaticæ, sicut causa paucitatis est siccitas, sicut accidit conualescentibus, & qui passi sunt longas ægitudines unde in his oculi efficiuntur glauci, & ipsis ad sanitatem redeuntibus multa humiditate reallumpta, efficiuntur nigri, &c. Causæ autem imperuietatis albuginei dictæ sunt supra in capite de debil. uisus, & capite de imaginationibus. Ex crystalli, uero, quia si fuerit magna & multum lucens, aut uersus superficiem oculi est causa haliar. Contrariæ dispositiones sunt causæ nyctilops. Ex spiritibus uero, quia si fuerint multi crassi aut turbulenti, sunt causa nyctilops, contrariæ dispositiones, paucitas, subtilitas cum claritate sunt causa haliar. Vnam causam nyctilops scribit Iesus hali, scilicet nimius aspectus solis, & rerum albarum, sicut accidit agentibus in niue, & e contrario longa mora in tenebris est causa haliar, quod totum resoluitur in crassitatem & subtilitatem, paucitatem & multitudinem, unionem & disgregationem spirituum, & etiam assuetudinem quandam, uirtutes enim naturales necessitatem aliquam assumentes fortius operantur. Et ex his

his iam apparet solutio multorum problematum. Primum, propter quid habentes oculos nigros sunt frequentius nyctilopes, & habentes glaucos & uarios, sunt frequentius haliartici. Secundum, quare aliqui existentes in claro bene uident in obscuro, aliqui, male & e contrario aliqui existentes in obscuro bene uident in claro, aliqui male, aliqui bene utroque modo, aliqui male utroque modo, quamquam omnes existentes in obscuro, melius uideant in claro, quam existentes in claro uideant in obscuro. Tertium, quare habentes multitudinem colorum in oculis suis sunt apti ad hoc, ut fiant nyctilopes, & similiter anfractuosi in oculis suis, ut dicit Auic. per anfractuosos intellige oculos in quibus apparer quaedam profunditates obscuræ, hæ enim arguunt aut paruam peruietatem humorum, aut tunicarum, aut crassitiam & turbulentiam spirituum cum paucitate. Quarto, quare oculi eminentes sunt proni magis ad haliar e contra concaui ad nyctilopes. Causæ autem nyctilopis & haliar per communitatem à stomacho capite & toto corpore sumuntur, sicut dictum est in cap. de debilitate uisus, & cap. de imaginationibus, sed certè non causant nyctilopem, neque haliar, nisi inducendo nocumentum per essentiam in oculo, de quibus sermo precessit, aut ipsa augendo. Signa autem nyctilopis & haliar & specierum & causarum earum, siue sint per essentiam siue per communitatem, siue corporæ, siue primitiue, sumuntur eodem modo, sicut in debilitate uisus dictum est, & non immerito: hæ enim sunt species debilitatis uisus, imò ferè ex eisdem causis proueniunt, ex quibus uisio delonge & non de prope, & e contra proueniunt. Prognostica. Haliar consequens subtilitatem spirituum, & paucitatem, & causas inanientes secundum plurimum deterior & minus corrigibilis cæteris paribus, quam nyctilops, consequens nocumenta telæ aranæ, & crystallodis raro uel nunquam sunt corrigibiles. Nyctilops consequens confractionem foraminis uueæ præternaturalem, est magis timenda quam haliar consequens eius dilatationem præternaturalem, &c. Sed tunc circa hoc dubitatur. Vtrum homo per aliquam dispositionem naturalem, aut præternaturalem posset uidere in umbra & tenebris. Et arguitur quod non, quia sine lumine non contingit uidere, igitur quæstio falsa pro parte affirmatiua, tener consequentia, & assumptum est philosophi & coment. 2. de anima, com. 67. Præterea Auic. in com. de sensu & sensato dicit: lux non est in oculo per naturam oculi, sed intrat ipsum ab extra. Et si inesset ei de eius natura, tunc in obscuro uideret. In contrarium est Auic. cap. de haliar 3. tertij, & consicritur leones, serpentes, catæ, bufones, &c. ut dicunt philosophi, & docet experientia, ergo etiam homo tener consequentia, quia homo quadam uirtualitate continet fractiones & perfectiões omniū, ut inquit Arist. in lib. ad Alex. etiā quia uidemus in homine fieri mutationes ex multis ægritudinibus, ut Auic. 1. tertij & Gal. 3. inte. & Arist. 30. proble. prob. 1. Inquit enim quod ex melancholia quadam facti sunt cæces, & exemplificat de Sybilla & Bacchide. Et quidam facti sunt poetæ, sicut Maracus Siracusanus, &

recitat Concil. ibidem se habuisse à medico fideli, quædam mulier illiterata dum esset melancholica latinum congruum loquebatur, qua sanata locutio illa literalis euauit, & multa etiam similia in nostris temporibus referuntur, quæ certè mirabilia uidentur, quam quod homo uideat in tenebris. Et nouissimè nostris temporibus fuit Paduæ quædam mulier nominata Angariel, de qua mirabilia prædicantur. Pro solutione huius quæstionis præmittendum primò, quod medici per umbram intelligunt medium dimi nutè illuminatum, sicut est in nocte, per tenebram uerò medium omnino luce priuatum. Philosophi autem quiditates rerum proprias indigantes per tenebras intelligunt luminis priuationem, & per umbram tenebram remissam: tenebra enim luminis priuatiue opponitur, unde non gradus luminis est tenebra infinita, reliqui uerò gradus luminis inter gradum infinitum, & non gradum habent tenebram admixtam.

Ad propositum credo tenendum esse nullum animal posse uidere in medio summè illuminato: uisibile enim tantæ excellentiæ cuiuscunque animalis uisum corrumperet, imò etiam neque in medio multum propinquo illi quod summè illuminatum est. Inter animalia tamen est differentia. Quædam enim sunt lumen intensum tolerantia, sicut scilicet aquilæ, uultures, & similia, & multo intensius quam homo. Et sicut tolerant lumen intensius quam homo, ita uident magis delonge, licet fortè de prope, & obiecta minima melius uideat homo, & similiter in umbra siue in lumine remissiori melius uideret homo quàm huiusmodi animalia, quod totum prouenit ex crassitie maiori spirituum uisibilibus, & humorum in his animalibus quàm in homine, imò dicitur quod uultures uident cadauera distantia per quingenta miliaria. Quædam animalia sunt melius uidentia in obscuro quam homo, imò uidentia in medio omnino lumine exteriori priuato, sicut leones, serpentes, cati, lupi, buffones, licet non omnino uideant sine lumine, habent enim lumen intrinsecum, quod est lumen crystallodis, & consequenter spirituum uisibilibus qui generantur ex spiritibus animalibus in crystalloide, quod lumen est adeo intensum, ut illuminet medium sibi propinquum & facit ut colores sibi propinqui potentia uisibiles, actu uideantur. Et hæc animalia optime uident de prope, & obiecta minima sibi propinqua, & multo melius quàm homo licet fortè in claro, & delonge melius uideat homo, quam hæc animalia quod totum prouenit ex maiori subtilitate spirituum cum claritate in his animalibus, quam in homine, & similiter ex maiori paruitate humorum, & tunicarum, & maiori paruitate, & claritate crystallodis: sunt autem quædam animalia quæ neque in claro, neque in medio multum obscuro uident, sicut uespertilioes quod prouenit ex paucitate spirituum cum pauca claritate ipsorum, & similiter crystallodis licet fortè satis mediocres sint in crassitie & subtilitate, & hæc male uident delonge & de prope, sicut & homines qui habent paucos spiritus uisibiles, & male claros. Ad propositum ergo cum queritur, utrum homo sine lumine exteriori possit uidere per aliquam dispositionem naturalem, aut præternaturalem. Tenendum est quod non, ut existimo quamquam Gentilis contrarium arbitretur nam frustra est illa potentia, quæ nunquam reducitur

ad actum nunquam autem est auditum neque uisum, neque scriptum quod homo sine lumine exteriori uideat, & suas posset exercere operationes in tenebris, quamquam aliqui in medio multum remissè illuminato uideant, habentes, scilicet, subtilitatem spirituum & humorum cum claritate & magna paruitate, & si cum hoc habent multitudinem spirituum uisibilibus bene uident in claro & in obscuro, & bene de prope & de longe. Et si quis instaret, quid prohibet etiam similem dispositionem in oculo humano reperiri in crystalloide, scilicet ualde lucente, & consequenter spiritus uisibiles in ea genitos ita lucidos, sicut in animalibus superscriptis, nam certum est crystalloidem humanam esse lucidam, & eius luciditatem posse intendi, & certum est quod magis & minus non uariant speciem, quamuis enim crystallois humana fieret, ita lucida sicut crystallois serpentis uel leonis, siue à natiuitate, siue ex tempore non propter hoc desineret esse humana, neque mutaret speciem, quia hæc dispositio non est essentialis illis speciebus quibus inest, nec forma specifica aut proprietas insequens speciem: sicut enim esset propria uini speciei & non communis tot speciebus. Amplius dicit Auic. quod haliartici uident in tenebris & umbra, & nisi sit superfluum per tenebras intelligit medium omnino lumine carens. Ad hoc respondetur, Ad primum dicitur quod sicut omnium naturarum constantium determinatus est numerus magnitudinis & augmenti, z. de anima, sic omnium natura constantium determinatus est terminus intensiōis, quamuis neque magnitudo maior aut minor, neque intensio maior, aut minor uariant speciem, & consequenter dicendum quod luminositas illa non est forma essentialis, neque specifica improprietas uni speciei propria. Sed est forma accidentalis insequens complexionem, & modum mixtionis pluribus speciebus communicabilis, sed non speciei humanæ. Simili enim argumento posset probari odoratum hominis, posse intendi ad gradum odoratus canis, & similia, quæ satis reputantur absurda. Sed iam restat ut respondeamus ad argumenta in oppositum. Et quia omnia argumenta tam ante oppositum, quam post adducta aliquantulum tendunt contra determinationem questionis, ad omnia est respondendum. Ad primum igitur cum dicitur quod sine lumine non contingit uidere conceditur, sed animalibus de quibus supra sufficit intrinsecum sine extrinsecum, homini uero præter intrinsecum requiritur extrinsecum. Et ad Auer. in com. de sensu et sensato, cum dicitur quod lux non est in oculo per naturam oculi intelligit de oculo humano, & plurimarum specierum, non de omni oculo, & intelligit de luce sufficienti ad uisionem sine lumine extrinsecum. Certum est enim quod tam in oculo humano quam cæteris inest lux, scilicet per naturam, sed quibusdam sufficit ad uisionem lumen intrinsecum, quibusdam uero non, quorum animalium diuersitas à nobis facillè comprehendendi potest, nam illa animalia, quorum oculi adeo in tenebris lucent, ut à nobis uideri possint, & non solum oculi, sed os & caput, & medium sibi propinquum possint in tenebris uideri. Et quanto plus de medio sibi propinquo illuminant, tanto melius in tenebris uidere possunt. Et si instetur, ergo etiam obiecta eorum lumine illuminata, & ad tantam distan-

tiam deberemus uidere sicut ipsa. Dicitur quod aliter qua uidentur, sed non omnia, nec ad tantam distantiam cum minima illuminatio propter suorum oculorum dispositionem sit eis sufficiens, ad uisionem non homini. Ad argumenta post oppositum respondetur. Ad auctoritatem Auic. in cap. de haliar. dicitur quod per tenebras intelligit medium remissè illuminatum sicut in nocte ualde obscura, sed per umbram intelligit medium obscurum magis tamen illuminatum, sicut est immediate post solis occasum. Ad secundum dicitur quod homo, scilicet uirtualitate quadam continet actiones omnium animalium, id est, quod quicquid faciunt cætera animalia naturali instinctu, homo uiribus suis intellectus, & aliarum potentialitatum animæ coadiuuantibus organis corporeis facere potest. Sicut enim quædam animalia in aquis nant, & pisces capiunt, & merces nauibus hinc inde ferunt. Et si aues per aerem uolant, similiter & homines per artem columbis utuntur ad portandum litteras subito ad loca scilicet distantia. Ex his itaque & similibus concludi potest, quod homo uirtualitate quadam continet actiones omnium animalium. Ad tertiam rationem arguentem mirabiles effectus euenire in quibusdam ægritudinibus maximè in mania & melancholia, quam ut homo uideat in tenebris. Conceditur. Sed ulterius dicitur conformiter loquendo secundum fidem, quod hi, scilicet effectus non solum inuim ægritudinis & causas resoluendi sunt naturales, sed in causas supernaturales, scilicet in dæmones, aut angelos, qui cum anima humana coniunguntur. Cui opinioni consentit Auic. i. tertij, & quarta sexti naturalium. Et Sybilla Erithrea tenetur de Christo prophetizasse, sunt autem prophete ex coniunctione superioris intelligentiæ cum anima humana, ut Auic. loco superscripto, quamquam astrologi hos effectus in causas cœlestes referant, ut apparet in cenitiloquio & tertio quadripartiti. Debachide autem multa poetice referuntur, quibus non leuiter credendum est. Et forte Arist. 30. problem. probl. 1. multa de his poetice locutus est, quamquam uisus sit hos & similes effectus, aut in melancholiam, aut in ebrietatem resolueri, ostendens per longum processum ex melancholia & ebrietate omnino similes effectus provenire.

De Maraco autem Siracusano qui postquam maniam incurrit, factus est poeta. Dicitur quod non est inconueniens aliquem propter maniam fieri acutioris intellectus, & saltem in aliqua re determinata melius speculari, quam in sanitate humiditate cerebri resoluta, quæ antea uires intellectus obtundebat. Sicut & superius de intent. Aristot. concessum est aliquem oculum ophthalmicum acutius uidere, quam ipsum sanum, & sic Maracus Siracusanus, factus maniacus, numeratus est inter poetas, cum antea ad poesim, scilicet hebetiorem habuerit intellectum. Licet non credendum sit ipsum ante maniam omnino poetes inexpertum fuisse. Sic enim miraculosum fuisset, & in causas supernaturales resoluendum. Eodem modo in proposito nostro concedo aliquem haliarum melius uidere in tenebris quam ipsemet antequam haliar incurrisset, non tamen posse uidere omnino sine lumine exteriori per aliquam dispositionem aut ex tempore aut ex natiuitate acquisitam nisi supernaturaliter, qui

qui enim fecit uidere cæcum natum, poterit facere quod homo uideat sine lumine exteriori. Et ex his iam manifestum est quid ad cætera respondendum sit. Si enim uera sunt quæ medicus fidelis retulit Petro Apponenſi de muliere illa quæ prius illiterata facta maniaca congruè loquebatur, quæ sanata locutio literalis euauit, manifestum est ipsam fuisse dæmoniacam. Similiter etiam dico de muliere Parauina, quæ ideo Angariel nominata est à nomine dæmonis à quo uexabatur. Sed consulo tibi ut in similibus non facile credas, homines enim plerumque sunt mendaces ducti quadam auditate magna & inusitata prædicandi. Ego enim cum à 25. annis & citra fuerim diligens horum inquisitor nondum uidi aliquos effectus, quos non potuerim in melancholiam referre. Et etiam Petrus Apponenſis, qui fuit diligens omnium rerum investigator, non dicit se hæc miranda uidisse, sed audiuisse. Et fortè Aristot. cum multa talia audiuisse, & non uidens tempore suo aliquid, quod non posset in causas naturales resolvere, ideo omnia talia in ebrietatem & melancholiam resolvebat, ut in longo processu patet 30. problematum, problemate primo, &c. Excusamur à prosequendo curam nyctilopis & haliar secundum omnes earum causas propter ea, quæ dicta sunt in capite debilitatis uisus, cuius curam prosecuti fuimus secundum omnes eius causas & species. Est namq; manifestum quod nyctilops & halia sunt species debilitatis uisus pendentes ferè ab eisdem causis à quibus pender uisio de longe & non de prope, & similiter de prope & non de longe, unde hic perstringemus curam nyctilopis solum proueniens propter humiditatem turbidam in humoribus, & propter spiritus crassos & turbulentos, cuius causa remotior potest esse, & est sæpe humiditas corporis superflua, aut alicuius membri oculo communicantis, maxime stomachi, aut capitis, & ponam etiam curam nyctilopis propter longum aspectum rerum albarum, & lucetium, & similiter ex paucitate spirituum & subtilitate, cuius causa remotior est sæpe siccitas corporis superflua, aut alicuius particulae oculo communicantis, & similiter curam haliar scilicet propter longam moram in tenebris, &c.

Cura itaq; nyctilopis propter humiditatem superflua turbidam in humoribus oculi, & propter crassitatem & turbulentiam spirituum si sit non solum per essentiam in oculo, sed etiam per communitatem exitus istas intentiones, de quibus dictum est in debilitate uisus, à simili causa quas huic cap. accommoda. Vnam tamen tantum hic prosequar, scilicet, resolutionem humiditatis humores oculi turbidantis et in crassantis, necnon resolutionem uaporum spiritus in crassantium & turbidantium cum localibus huic dispositioni proprijs. Et quia Rasis ponit in hoc cap. plures medicinas huic dispositioni proprias, ideo capitulum Rasis exponamus prius, deinde præter medicinas Rasis, alias subiungamus, &c.

AD hoc utile existit epar caprinum scindere & ponere super unam sectionem piper longum, & cooperire ipsum

ex alia sectione pipere longo in medio existente, deinde ponere ipsum in furno & dimittere ipsum donec assetur & desiccetur, quo facto piper longum quod in medio erat sumatur & bene teratur cum paucis musco, deinde ex liquore qui ex epate assato expressus fuerit, aspergatur & siccetur & in oculo mittatur. Aut fel caprinum cum melle mixtum in cortina super ignem misceatur, deinde radius in eo illinitus immittatur in oculum. Quod autem ad hoc magis ualet est, ut si es de fellibus in oculum mittatur. Si autem hæc non suffecerint uenter soluat. Et sanguis ex duabus cephalis & ex fronte minuatur. Et regimen subtilietur.

Diuiditur hoc cap. in quatuor partes. In prima ponitur unam medicinam. In secunda ibi. Aut fel caprinum ponitur aliam. In tertia ibi. Quod autem ad hoc, ponitur tertiam. In quarta ibi. Si autem hæc non, ponitur scilicet quid agendum sit his localibus non sufficientibus. Primum est ut epar caprinum scindatur per medium & melius est ut in eo fiant plures scissuræ, & in medio scissurarum ponatur piper longum crasso modo conculsum, & bene iungatur partes adinuicem, & assetur in furno tandiu donec sit bene coctum: non sit tamen exiccatum, quo facto, piper longum quod erat in medio sumatur & subtilissimè teratur, & misceatur cum paucis musco, quod sit sub sexcuplū aut sub octuplū ad piper, deinde hic puluis cum succo qui ex epate assato exprimitur, misceatur optimè in modum collyrii incorporando, ex quo collyrio est aliquid in die saltem quater in oculo imponendum.

Hoc quidem collirium calefacit, exiccatur, & resoluit humiditatem & uaporem, humores, & spiritus subtiliat, oculum confortat, spiritus & humores illustrat. Magis tamen conforme est menti Rasis, ut hic puluis postq; fuerit liquore epatis hircini cōspersus, siccetur, & in oculum mittatur: epar enim caprinum siue hircinum quocumq; modo administratum cōfert in hac dispositione sua occulta proprietate, siue postquam assatum est, aut elixatum comedatur, & præcipue cum aliquibus in hac dispositione proprijs sicut est piper longum, sal indum, euphrasia, semen feniculi, filer montanum, & similia, siue dum assetur aut elixetur nyctilopi suffumigetur, siue collyrium modo superscripto ordinatum, oculo imponatur. Sed dicitur quod epar hirci magis cōfert uiris, capræ uero mulieribus. Et similiter, ut refert Auic. epar leporis est in hac dispositione conueniens, similiter præparatum.

Secunda medicina Rasis est, ut fel caprinum cum melle, scilicet mixtum in curcuma uel in aliquo uase simili super ignem misceatur, donec bona fiat mixtio, & stilus in cuius extremitate sit aliquid cotti isto me-

dicamine illinitus ponatur in oculo. Tertia medicina est collyrium de fellibus in præcedenti cap. à Rasi positum: In ultima parte dicit Rasis, quòd si hæc nō sufficiunt uenter soluatur, & sanguis ex duabus cephalicis & fronte minuatur, & regimen subtilietur, dans per hæc uerba intelligere tria ex intentionibus positis in cap. de debilitate uisus, scilicet euacuationem perficiendam tam phlebotomia, quàm pharmacia, diuersionem & debiti regiminis ordinationem. Causa autem quare aliquando sola localia ad curam sufficiunt est, quia humiditas hæc aut hi uapores sunt per essentiam in oculo, non aliunde communicati, &c. Cum autem materia aut uapores aliunde communicantur scilicet à stomacho, cerebro, aut à toto requiruntur præter localia intēctiōes, quæ ordinatē in cap. de debilit. uisus positæ sunt. Et sunt. Prima euacuatio complenda per phlebotomiam utriusque cephalicæ si sanguis fuerit in causa et fuerit nyctilops utriusque oculis & complenda etiam per pharmaciā si alij humores fuerint in causa. Secunda est diuersio, quam Rasis per phlebot. uenæ frontis dedit intelligi. Et tu supple omnia genera diuersionum de quibus in cap. de debilitate uisus longo sermone actum est. Tertia est membri communicantis regimen, sicut ibidem dictum est, & oculi confirmatio, ne recipiat. Quarta est humiditatis in oculo exinsetis resolutio, quæ per angulos lachrymales educitur, ipsorumque humorū & spirituum subtiliatio & illustratio. Quinta est debitum regimen sex rerum non naturalium, & annexorum, sicut ibidem longo sermone positum est, &c.

Cura autem nyctilopis propter crassitatem spirituum & turbulentiam exigit duas intentiones generales, de quibus in debilitate uisus actum est. Quarum una est sanguis subtilis & clari generatio qui est materia spiritus. Altera est ipsorum spirituum subtiliatio & illustratio, quæ qualiter compleri debeat, & cum quibus ibidem sufficenter dictum est. Illuc ergo recurre. Sed nota qd. Auic. & Mesue appropriant in hac dispositio ne uinum uetus purum uinosum ante cibum, scilicet, per mediam horam, aut unam horam iam perfecta cibi præcedentis digestionē, & iam perfectis euacuationibus & diuersionibus, de quibus sermo præcessit, et sit in pauca quantitate, scilicet duarū 3. aut circa: hoc enim datur ad spiritus & humores subtiliandos. Et si exhiberetur immediatē post sumptionē alicuius electuarij, aut pulueris in hac dispositione proprij, de quibus in debilit. uisus, propter humiditatem turbidam, & propter crassitatem & turbulentiam spirituum acutum est præstantius. Et posset exhiberi etiā per tres horas ante cibum aut pluries, dummodo esset perfecta digestio cibi præcedentis, loco huius posset exhiberi uini artificiatum in isto cap. descriptum. Nota secundò qd. Mesue in nyctilope proveniente ex multitudine sanguinis, facta phlebotomia ex cephalica, præcipit phlebotomiam uenarū lachrymalium, id est, quæ sunt in lacrymalibus domesticis ad euacuandum causam coniunctam. Similiter sanguinem extrahi ex uenis narium aut cum sanguisugis, aut cum instrumento facto ex setis porcinis, aut cum sustibus herbe quæ sanguinaria uocatur. Vbi tamen hæc duo fieri debent, prius sanguis ex naribus est prouocandus, deinde ex angulis lachrymalibus, ex quibus eliciuntur tres intentiones, scilicet euacuatio, diuersio, & causæ coniunctæ re-

motio. Quarta autem intentio, scilicet humiditatis & uaporum resolutio, & humorū, & spirituum subtiliatio & illustratio perficitur non solum cum his, quæ in oculo ponuntur, sed etiam cum interius sumptis, sicut herba adhib. id est, euphrasia, cubebæ, fœniculus, chebuli conditi, nux muscata condita, triphera pulueres, electuaria, uinum artificiatum, epas hircinæ comestum, carnes uiperarum præparatæ, ut in lepra & multa alia, de quibus dictum est in debilit. uisus, & plerisque alijs capitulis. Sed præter collyria superius descripta ex intentione. Rasis est collyriū expertum ex intentione Alexandri. &c. fucci fœniculi depurari partem 1. mellis, fellis hircini, ana. partem s. expertū est, cui si admisceatur ex stercore cocodrili 1. illius serpentis & stercore stellionis, an. partis 1. quarta pars, sanat in paucis diebus, &c. Similiter laudat cohōl ex pipere longo, zingib. & spica. Cura autem haliar propter paucitatem et subtilitatem spirituum, & humorum perficitur duplici regimine. Vnum est debita administratio cibi & potus, & aliarum rerum non naturalium quib. multum de sanguine laudabili & aliquatulum crasso, non tamen turbido generatur, qui est materia spirituum uisibilium & humorum oculi. Secundum est confortatio uirtutū naturalium, ut ex cibo bonus chylus, ex chilo bonus sanguis, ex sanguine multi spiritus & humores aliquantulum crassi, sed non turbidi generentur, de quibus actum est sufficienter in debilitate uisus, ad quod recurre. Et hi debent multum dormire & esse ociosi animo & corpore, & multum humectari qualitatiue & substantiæ, & debent uti mirobalanis & triperis ex illis factis ad confortandum spiritus & uniendum, sed sint permixtæ cum aliquibus humectantibus. s. syrupo aut saccharo uiolato. Et uestes & opera sua cum egrediuntur domum transeuntes per medium lucidum debet esse nigra, & locus habitationis debet esse mediocris coloris maximè uiridis. Et in summa totū regimen ad frigidum, aut ad tempericū actuius. Et raro conueniunt euacuationes nisi adsit humor præter modū spiritus subtilians, qui euacuandus est cum lenib. in quibus sint mirobalani aut eorū uirtus. Et si longū essent acturi iter per loca alba aut lucentia, portent uelum nigrū coram oculis.

Cura autem nyctilopis propter longum aspectū rerum albarum & lucentiū, & similiter haliar propter longam moram in tenebris & aspectū rerum nigrarum perficitur. Vnde in nyctilope fiat transitus paulatim de medio claro in obscurum. Et e contrario in haliar de obscuro in clarum. Et magis succelsiue & paulatim, qd. in nyctilope de claro in obscurū cum lumen fortius imprimat, quàm tenebra. Demū hoc regimine non sufficiente procedatur in haliar cū multiplicanti. & incrassanti. spiritum & humores, & in nyctilope cum subtiliantibus spiritus & humores, & ipsos illustrantibus sicut iam dictum est, &c.

DE DILATATIONE PUPILLÆ.

Cap. XXXII.

Dilatatio pupillæ, alinthisar sunt nomina synonyma significantia hanc dispositionem, de qua diuersi authores sub his diuersis nominibus determinant. Quæ diffinituē fecundū Auic. est ut fiat foramen uuæe latius quàm est à natura. Et contra constrictio est ut sit foramen uuæe strictius, quàm

quàm consuetum sit, ex quibus inferitur quòd utraq; earum dispositionum est morbus in uia, ut quia uia delationis specierum nimis dilatatur aut constringitur, imò aliquando uia aufertur foramine penitus obstructo, &c. Duplex est alinthisar siue pupillæ dilatatio, quædam naturalis, quædam præternaturalis, id est, reddens oculum ægrum uel neutrum. Et hæc iterum est duplex, quædam ex tempore, quædam ex generatione contracta. Quarum utraque est duplex, quædam magna, & interdum adeo magna, ut constringatur corneam, quædam parua non multum transcendens limites sibi naturales. Eædem species & diuisiones constrictiois, pupillæ possunt assignari, cum quædam similiter sit naturalis, quædam præternaturalis. Et præter naturalium quædam ex tempore, quædam ex generatione contracta. Et utraq; duplex, nam quædam magna & interdum ita magna, ut foramen penitus obturetur, quædam parua non multum recedens à limitibus naturalibus.

Causas dilatationis aut constrictiois naturalium non oportet assignare, cum ipsi non debeatur curatio, sed præseruatio uel reductio, quæ non sunt præsentis propositi. Vt plurimùm tamen dilatatio naturalis insequitur humiditatem & multitudinem albuginei, & constrictio causas his contrarias. Causæ autem dilatationis & constrictiois præternaturalium quandoq; sunt per cõmunitatem, quandoq; sunt per essentiam in oculo. Sed quia necessariũ est in his dispositionibus uueam lædi, aut per essentiam aut per cõmunitatem, placet nunc ordine resoluendo hos effectus in causas propinquas, & propinquas in remotas, & remotas in remotiores. Causæ itaq; immediate harum dispositionum sunt aut mala complexio, aut apostema aut solutio continui, aut mala compositio, sicut malus situs est causa tam dilatationis quàm constrictiois, ut clarius insequentibus. Et si mala complexio, secundum plurimum est aut humida aut sic. Et si humida, aut sine materia, & sic mollificando est causa constrictiois, aut cum materia subtili paralyticæ, & sic etiam est causa constrictiois, aut cum materia crassa spasmate. Et tunc illa materia aut est imbibita in parte uueæ terminata ad foramen eius, & sic ex causa constrictiois, aut in parte uueæ terminata ad secundam, & sic est causa dilatationis. Si uero in tota uuea est causa constrictiois. Si uero fuerit complexio sicca, aut est non proportionata ad materiam, & sic non est causa dilatationis nec constrictiois, aut proportionata ad materiam, & hæc dupliciter, aut inaniens & ita ut sit causa constrictiois partium, & constrictiois partium adinuicem. Et tunc si est in parte terminata ad foramen, est causa constrictiois, & si est in parte terminata ad secundam, est contrahendo causa dilatationis. Si autem sit uniformiter per totum est causa constrictiois. Si uero sit siccitas cum præsentia ad foramen, & sic est causa constrictiois, aut in parte terminata ad secundam, & sic est causa dilatationis, aut in tota, & sic est causa constrictiois. Mala autem complexio calida & frigida non faciunt secundum plurimum dilatationem, aut constrictioem nisi immediatè, licet imaginabile sit frigiditatem im-

mediatè partes contrahere in ea parte in qua est, & sic esse mediatam causam dilatationis aut constrictiois ut supra, & si sit per totum est causa constrictiois: si uero sit apostema, aut est in parte terminata ad foramen, & sic est causa constrictiois, aut in parte terminata ad secundam, & sic est causa dilatationis, aut in tota & erit causa constrictiois. Solutio autem continui est causa harum dispositionum, & per se, soluendo uueam, unde si soluat in parte foraminis dilatatur, cui non est cura, & si in parte posteriori constringitur, & per accidens attrahendo humores & apostemando, & dilatabitur, & constringetur secundum differentiam loci apostematis, ut antea.

Causæ autem harum dispositionum mediatae aut sunt in albugineo, aut sunt inter uueam & corneam. Si in albugineo aut quia superflue humectatur & multiplicatur, & sic in quantum humectatur est mollificando uueam causa constrictiois, licet in quantum multiplicatur est causa dilatationis extendendo eam, aut quia superflue exsiccat & paucificatur, & sic ratione siccitatis est secundum plurimum causa dilatationis, licet ratione paucificationis sit causa constrictiois.

Si uero causa sit inter corneam & uueam, scilicet, humiditas retenta est, impellendo uueam ad interiora secundum plurimum est causa constrictiois. Si uero causa per cõmunitatem sit remotior, aut est in cerebro, aut in alijs membris, licet secundum plurimum sit hæc cõmunicatio à cerebro, sed à quocunq; membro fiat communicatio est secundum alterum trium modorum, aut per simplicem alterationem, aut per uaporum transmissionem aut humorum. Et quocunq; modo sit, non potest uuea dilatari aut constringi nisi propter aliquod nocumẽtum impressum in ipsa à membris sibi, scilicet communicantibus quod non est aliud, nisi aut mala complexio, aut apostema, aut aliud ex nocumentis, de quibus sermo præcessit, aut saltem aliquis modus malæ compositionis sicut est in compressione uueæ ab humore contento inter corneam & uueam, aut extensio eius ab humore albugineo ipsam sui multitudine dilatante. Et si quis consideret, hæc causa reducit ad morbum in situ, &c. est enim malus situs immediatè causa dilatationis, aut constrictiois. Causæ autem primitiue sunt sicut percussio capitis aut oculi.

Signa dilatationis et constrictiois absolute nota sunt ad sensum. Signa naturalium & præternaturalium sumuntur ex perfectione operationum oculorum, aut ex earum læsione præcipue uisionis, quæ est principalissima eius operatio. Signa accidentalium & earum quæ sunt à generatione contracta, habentur ex relatione cognoscentium ægrum & dispositiones oculorum suorum. Signa uero causarum siue sint per cõmunitatẽ, siue per essentiam, siue ab humiditate, siue à siccitate, aut à quacunq; causa dependant, habentur ex his, quæ longo sermone dicta sunt in capite de debilitate uisus. Sed circa signa distinguenda inter dilatationem & constrictioem pupillæ cadit dubitatio non parua.

Vtrum dilatatio pupillæ faciat res uideri minores quàm sint, & contra, constrictio maiores. Et arguitur quòd non, quia quanto res representantur sub cono maiori apparet maior, & sub cono acutiori minor, sed in dilatatione pupillæ res representantur

sub cono maiori & in constrictione sub minori, ergo questio falsa pro parte affirmatiua, tenet consequentia, & maiorem declarat experientia, quia aliter non potest solui, quare res de longe uisæ apparent minores & de prope maiores. Et hoc etiam est, sicut principium in perspectiua, minor etiam declarat, quia lineæ uisuales peruenientes ad crystallinum per uiam latam faciunt angulum magis latum. Et contra per uiam angustam coangustantur, et faciunt angulum acutiorem. Amplius species receptæ in spiritu magis disperso amplius disperguntur & dilatantur, & contra in spiritu unito constringuntur. Sed in dilatazione pupillæ spiritus est magis dispersus, & contra in constrictione unitus, ut omnes concedunt, ergo in dilatazione pupillæ res debet apparere maior, & contra minor in constrictione. In oppositum est Auic. tertia tertij, cap. de alinthisar sic dicit: Et quandoq; est amplitudo oculi naturalis & nocet uisui, uidet enim res minores q̃ oportet. Et Azaruius in cap. de dilatazione dicit de proprietate huiusmodi ægritudinis, est & eius signū, quia uidentur res minoris corporis quàm uerè sint. Et in cap. de strictura dicit: Signum huius ægritudinis proprium est, quia uidentur ei res maiores quàm uerè existunt. Idem scribitur pluries secundo continentis, unde autoritate Butegni: Si pupilla sit stricta patiens uidet res maiores quàm sint. Hinc multæ assignantur solutiones, sicut est in rebus dubijs consuetudo, cum nulla sit certa ei integrè satisfaciens. Prima est originaliter Iesus Hali resoluens hos effectus in fortitudinem & debilitatem uirtutis uisualis, nam quia in dilatazione uirtus uisus est debilior propter spirituum dispersionem res apparent minores. Et e contrario in constrictione, quia uirtus uisualis est fortior propter spirituum unionem res apparèt maiores. Sed certè hæc solutio stare non potest, non potest enim assignari causa quare ex fortitudine uirtutis con surgentis ex unione spirituum propter stricturam pupillæ debeat esse error in uisione. Absurdum enim est quod fortitudo uirtutis faciat errorem in uisione, sic enim oculo temperato deberent res apparere maiores q̃ sint, & fortè propter hanc causam Auic. solum dixit amplitudinem naturalem esse causam, ut res minores appareant, nullam faciens mentionem de constrictione. Præterea cum in dilatazione & constrictione naturalibus, q̃ præternaturalibus uirtus uisualis debilitetur in comparatione ad oculum temperatum in utrisq; debet obiecta apparere minora quàm sint. Præterea potest esse tanta debilitas in oculo pupillæ constrictæ, sicut in oculo pupillæ latæ, ergo in utroq; obiecta apparebunt maiora quàm sint, quod implicat, antecedens facillè deduci posset. Secunda responsio est Gen. siue recitata per eum, quod quia in dilatazione spiritus uisibilis est rarus & dispersus non potest species uisibilis in eo multiplicari multiplicatione quæ fit cum terminatione, quod requiritur ad hoc ut aliquid in alio uideatur, & ideo res potest uideri in aqua, & non in aere. Cum igitur species ibi taliter non multiplicentur, oportet quod res non diminutè uideantur, & sic minores quàm sint. Et e contrario quia in constrictione propter multam spirituum coadunationem species possunt multiplicari cum terminatione, ideo apparent maiores. Et huius exemplum est, quia in serenitate hyemali minutissimæ stellæ ap-

parent, quia species earum possunt recipi terminatiuè in aere crassiori, quæ stellæ non apparent in serenitate æstatis propter aeris raritatem. Sed certè hæc ratio nihil aliud cōcludit, nisi quod aliqua obiecta possunt uideri in constrictione pupillæ propter specierum unionem, quæ non possunt uideri in dilatazione, propter disgregationem, sed tamen si ab utroq; oculo eadem obiecta uidentur, potius concludit, quod obiecta in dilatazione pupillæ debeant apparere maiora, cum species magis dispersæ transeant ad pupillam. Et e contrario in constrictione minora cum transeant magis unita, Sed fortè dicit Gen. hanc instantiam facere pro opinione sua, nam omne obiectum quod ab aliqua potentia definit uideri, prius uidetur sub maiori quantitate, postea sub minori donec paulatim apparenter decrecendo euanescat, ergo in proposito si propter dispersionem specierum uisibilium definit uideri, sequitur quod continuè minoris, & maioris quantitatis apparebit, ergo dispersio specierum uisibilium quæ est in dilatazione pupillæ est causa, ut res minores appareant. Ad quod dicendum, quod responsio Gentilis esset bona, si maior præassumpta esset uera, scilicet quod omne obiectum quod ab acuta potentia definit uideri, prius uidetur sub quantitate maiori postea sub minori, sed licet sit uera de omnib. quæ definiunt uideri propter distantiam, non tamen est uera de omnibus quæ definiunt uideri propter disgregationem spirituum & specierum uisibilium in dilatazione pupillæ, nisi scilicet obiectum continuè maneat in eadem distantia, neq; de obiectis quæ definiunt uideri propter cataractam cum in dies paulatim cōfirmatur, nec habet ueritatē in his quæ definiunt uideri propter nimiam propinquitatem, aut propter tenebras. Et breuiter credo q̃ non habeat ueritatem nisi in his, quæ definiunt uideri ex eo quod conus pyramidis specierum uisibilium non potest attingere crystallinum cum prius attingeret ex eo quod ille conus continuè factus est acutior, & acutior, & paulatim diminuendo processit donec deueniret ad non quantum, siue non gradum, quod non est nisi propter distantia, aut quia obiectum continuè diminuendo processit, aut quia mediū paulatim fit densius, & propriè si fiat densius uniformiter, difformiter extremo densiori terminato ad crystallinū, radius enim transiens de medio rariori in densius conuertitur ad perpendicularem. Sed restat ut respondeatur ad experientiam Gentilis, quia stellæ minutissimæ non apparent in serenitate æstivali, quæ apparèt in serenitate hyemali. Dicoq; propter subtilitatem aeris species disperguntur, ita ut conus suæ pyramidis non potest attingere crystallinum. Dico etiam quod si aer ultra modum densaretur stante æquali diaphaneitate conus pyramidis illarum stellarum minutissimarum non posset attingere crystallinum. Vnde ad bene uidentum requiritur, quod in medio sit commensurata densitas, & raritas, non enim si totus aer esset ita densus sicut crystallum, aut uitrum, possemus uidere aliquam stellam, tamen cum toto hoc dico, quod illæ stellæ siue magnæ, siue parue, quæ uidentur in serenitate æstuali non apparent minores, quàm ipsæmet appareant tempore hyemis, ut patet ad experientiam de stellis nobis cognitis, quod tamen deberet esse secundum Gentilem, unde appareret quod hæc experientia

rentia sit magis contra opinionem quam pro opinionem. Nam neque potest Gentilis in huiusmodi causae assignatione intelligere, quod in spiritu unito species terminatiue recipiantur per modum cuiusdam reflexionis sicut exemplum suum de his quae possunt uideri in aqua, & non in aere uidetur sonare, quia si uisio fiat in crystallino, uel ultra crystallinum secundum quod tenent omnes, deberent habentes hanc spirituum unionem propter terminationem speciei & reflexionis ad extra deterius uidere, quam habentes spiritus dispersos, ipsi speciebus non ita bene potestibus transire ad locum in quo perficitur uisio. Neque potest intelligere quod ille species terminatiue receptae in spiritu, postea per spiritum deferantur ad crystallinum, quia exemplum suum de stellis minutissimis uisis in serenitate hyemali, &c. non esset ad propositum, quia & si illae species melius terminatiue recipiantur in aere densiori, non est in illo aere spiritus delator illarum specierum sic determinatarum ad oculum nostrum, nisi forte diceret, quod aer ille est immediatus oculo nostro in cuius superficie sunt spiritus delatores. Sed tunc oportet concedere, quod si aer immediatus oculo nostro esset subtilissimus, tunc stellae minutissimae ita male apparent in serenitate hyemali sicut aestuali, sed omitamus in hoc longius processum, quam statueram. Credo tamen quod haec opinio haberet bonum intellectum, licet non fuerit clare recitata & explicata per fundatores eius. Tertia causa recitata per Gentilem est. Propter quam est praemittendum, quod habentes latitudinem pupillae sunt debilis uisus debilitate tali, quod indigent non multo lumine, quia disperseretur spiritus uisibilis, & egent forti motu ex parte rei uisae mouentis, nam res debiliter mouens non causaret modum motus sufficientis ad uisionem & ideo uidemus quod dissoluti in uirtute tractatiua non percipiunt nisi fortia tangibilia.

Secundum quod praemittere oportet est quod lineae uisuales quanto sunt magis centrales tanto sunt fortiores. Et quanto sunt magis laterales tanto sunt debiliores, sicut etiam dicimus de radio qui est centralis quoniam rectus est fortior. Ex quibus apparet quare habens pupillam latam uidet res minores quia maximè uidet res sub lineis rectis fortiter imprimantibus & non sub lineis lateralibus, & e contrario habens pupillam strictam quia fortis est uisus uidet sub utrisque. Sed haec causa non potest dare modum quare in strictura pupillae res appareat maiorimò deberet solum apparere sicut est uel secundum quod est, etiam ex hac causa habetur quod in dilatatione mediū centrale rei apparet & non apparent extrema quod est contra experientiam, sic enim quadrata triangula apparent rotunda, praeterea in constrictione uisus uirtus est debilis in comparatione ad pupillam comparatam, ergo in constrictione obiecta debent apparere minora, quam sint ex fundamento praesumptum & in sola temperata, aut sibi uicina debent obiecta apparere quanta sunt, quare haec solutio licet apparet sit longe à ueritate distans. Haec etiam causas recipiantur terminatiue, quod difficile est defendere. Si enim est pars in oculo in qua species recipiantur terminatiue, ista est crystallinus humor & tela aranea. In spiritu autem recipitur solum delatiue nisi quis for-

san diceret quod in spiritu quia est delator proximus ad uisionem etiam terminatiue recipiatur.

Quarta causa est propria Gentilis, sumpta ex quodam dicto Aristotelis 31. problematum, problemate octauo, ubi quaerens propter quid obtuse uidentes scribunt literas paruas, dicunt quod scribunt literas paruas, quia constringunt siue coadunant palpebras, unde species rerum uisibilium recipiuntur in oculo sub angulo acutiori cum foramen transitus specierum coangustetur ob clausuram palpebrarum, & simile etiam est in his, quae habent latas pupillas, scilicet, cum à lumine intenso eorum spiritus amplius disgregetur. E contrario euenit in habentibus pupillam strictam, nam dilatant palpebras, quia spiritus constrictus & densus multa luce indiget, & ideo species potest uenire ad oculum sub forma pyramidis lata & spiritus densatus recipit illam speciem sub modo latiori, sicut recipitur species in aere crasso. Sed contra sequitur ex primo dicto quod habentibus pupillam magnam deberent res apparere minores secundum longitudinem & non secundum latitudinem, consequens est falsum, & contra experientiam, consequentia probatur, quia angustatur foramen transitus specierum secundum longitudinem & non secundum latitudinem. Sequitur ex secundo dicto, quod quia species recipiuntur in spiritu densato ex paruitate pupillae quod res debeant apparere minores ex eo quod radius siue species transiens de medio rariori in densius conuertitur ad perpendiculararem, & sic representatur sub cono acutiori, & e contrario, recepta in spiritu rariori dilatatione pupillae deberet apparere maior, quia species transiens de medio densiori in rariis diuertitur ad perpendiculari quare cum haec solutiones quaesito non satisfaciunt, oportet alium modum soluendi inuestigare. Dico ergo quod aut comparatur oculo in sui dilatatione & constrictione, naturalibus aut praeternaturalibus. Siquidem primo modo cum oculus habens pupillam latam sit debilis uisus, & e contrario pupillam strictam sit fortis uisus secundum plurimum representantur res habenti pupillam latam minores quam sint ob uisus debilitatem, & e contrario habenti stricturam ob fortitudinem uirtutis uisus representantur res secundum quod sunt. Et propterea A. loquens de dilatatione pupillae naturalis, dixit quod in ea res apparent minores, & in capitulo de constrictione pupillae non dixit quod appareant maiores, non enim est credendum quod fortitudo uirtutis uisus sit causa erroris ipsius.

Contra, quicumque gradus potentiae uisus reperitur in constrictione pupillae, aequalis reperitur in dilatatione, ergo quantum est ex parte uirtutis nulla debet esse disparitas in uisione, tenet consequentia, & antecedens est manifestum, cum tam in dilatatione quam in constrictione signanda sit latitudo potentiae uisus à gradu correspondente uisus temperatae usque ad non gradum, licet in dilatatione & constrictione naturalibus sit solum signanda latitudo terminata à temperamento ad certum gradum inclusiue, qui gradus terminans latitudinem est aequalis in dilatatione & constrictione.

Dicitur ad hoc, quod antecedens est uerum, attamen quia ex equali lapsu in constrictione non ita debilitatur uirtus sicut in equali lapsu in dilatatione, medi-

*In dilatatione pupillæ
apparere minores quam in
constrictione maiores*

ci ascripserunt hunc defectum dilatationi & non constrictioni. Si uero comparatur oculi in sui dilatatione & constrictione præternaturalibus cum secundum plurimum dilatatio insequatur humiditatem superfluum per quam incrassantur humores præcipue albugineus, similiter tunicæ & spiritus & contra constrictione insequatur siccitatem per quam subtiliantur humores tunicæ & spiritus nisi illa siccitas ad ultimū perueniat per quam possent humores incrassari resolutis partibus subtilibus & remanentibus terreis, tenendum est secundum plurimum in dilatatione res debere apparere minores, & e contra in constrictione maiores ex eo quod si esset transitus de medio rariori in densius conuerteretur ad perpendicularem, unde conus sue pyramidis efficitur acutior, & sic species uisibiles transeunt ab aere ad oculum cuius spiritus tunicæ & humores sunt incrassati propter humiditatem superfluum faciunt conum sue pyramidis acutorem, & propterea repræsentant res minores quam sint, & e contra species transeunt ab aere ad oculum cuius spiritus tunicæ & humores sunt subtiliati faciunt conum sue pyramidis latorem, & per consequens repræsentant res maiores quam sint, uel saltem concluditur quod & si in constrictione sequere siccitatem subtiliant humores, & non semper appareant res minores quam sint, saltem de necessitate apparent res maiores quam appareant in dilatatione consequente humiditatem incrassantem & cætera. Vbi autem dilatatio proveniret ex alijs causis, & similiter constrictione non est necessarium problema illud uerificari.

Quod autem constrictione secundum plurimum insequatur siccitatem, dicit Auic. in cap. de constrictione, sic inquit, & plurimum accidit hoc accidens ex siccitate. Ex quo syllogizare possumus secundum plurimum dilatationem insequi humiditatem, quod etiam clarius plurimi auctores experientia testantur. Hanc solutionem si placet accipe, aut male dicta corrige. Hæc etiam solutio posset ampliari ad dilatationem & constrictionem naturales. Sed contra species transiens de aere ad quemcunque oculum transit de medio rariori ad densius, ergo res semper debent apparere minores. Ad hoc dicit quod in oculo temperato est commensurata densitas faciens pro optima uisione, & ut obiecta appareant quanta sunt. In reliquis autem labentibus ab hac, scilicet densitate temperata accidit ut res appareant maiores aut minores quam sint.

Iam superest, ut respondeamus ad argumenta adducta in principio. Ad primum cum dicitur, quod quanto res repræsentantur sub cono maiori, apparent maiores, & sub minori minores. Conceditur, & negatur minor, quia licet ratione dilatationis pupillæ res possit repræsentari sub cono maiori, tamen ratione incrassationis & densitatis humorum tunicarum & spirituum conus pyramidis constringitur, & sic res illa apparet minor. Et in constrictione pupillæ contra euenit propter subtilitatem humorum, tunicarum & spirituum. Ad secundum dicitur quod si ratione dilatationis spiritus debeat dispergi & ratione constrictionis pupillæ magis uniri, attamen ratione incrassationis spirituum & tunicarum et humorum in quibus spiritus continentur sunt minus apti in dilatatione pupillæ dispergi quam in constrictione.

ne. Secundò negatur consequentia. Spiritus sunt magis dispersi in pupilla lata quam instricta, ergo species debent transire ad crystalloidem magis dispersas, plurimum enim facit ad unioem specierum densitas medijs intrinsicis quàm faciat ad dilatationem dispersio spirituum. Sed ubi cum dilatatione pupillæ essent spiritus, humores, & tunicæ subtiliati, & e contra cum constrictione incrassati sicut potest accidere, omnino contrarij effectus euenirent, & multo magis cum duæ causæ ad eundem effectum producendum sese iuuarent. Ex quo etiā concluditur quod ubi dilatatio pupillæ & incrassatio humorum, & c. essent quæ potentes ad contrarios effectus producendum, effectus tamen producendus gradu medio cor responderet, & sic obiectum repræsentaret sub quantitate quam habet, & idem in constrictione deduci posset, & tu considera.

Prognostia. Primum dilatatio naturalis deterior est quàm constrictione naturalis, imò non reputatur mala nisi modum excesserit, & c. Certum est enim medicritatem in dilatatione & constrictione esse laudabilem & temperamento pertinere, & e contrario extrema uitiola & distemperata. Aequalis tamen lapsus à temperamento in dilatatione est deterior quàm aequalis lapsus in constrictione. Et e contrario constrictione præternaturalis cæteris paribus est deterior quàm dilatatio, & quia prouenit in uisus ablationem. Et quia communiter pendet à siccitate & inanitione quibus difficillimè succurritur. Et e contrario dilatatio ab humid. & causis repletibus quibus facillime succurritur. Secundum prognosticum. Hæ dispositiones à natiuitate contractæ aut longi temporis, siue confirmatæ non sunt remouibiles, & minus remouibilis est dilatatio quàm constrictione cum dilatatio sit morbus diminutionis consequens defectum materię aut uirtutis informatiue. Et e contrario constrictione sit morbus augmenti. Tertium. Si dilatatio tanta fuerit ut ad coniunctiue circumferentiam proueniat & e contra constrictione tanta fuerit ut foramen penitus oppiletur raro aut nunquam curam recipit. Quartum. Hæ passionis sequentes sodam aut alias cerebri ægri tudines difficillimè curabiles sunt, quia ægri tudines cerebri ad istas criticè terminantur. Quintum. Hæ passionis pendentes à percussione, & similibus causis primitiuis si magnæ sint, difficillimè curantur, aut nunquam. Si uero paruæ aut mediocres facillimè, si enim disrumpitur ueua non recipit curam.

Quam pupilla, hoc est, foramen quod est in nigredine oculi adeo dilatari uidetur, ut undiq; pertingat ad albedinē, fueritq; hoc post uehementem cephalææ dolorem parua est habenda fiducia in eius cura. Sed si dilatatio parua fuerit tunc assidua solutio uentris ex cochijis multotiens & si defellibus in oculos est mittendus. Quod si pupillam post percussione dilatari contingat

ri contingat, non est inde timendum, quia remouebitur, & fiat itaq; emplastrum ex farina fabarum & camemila & uisco cum uino & aqua.

Rasis in praesenti capite determinans de dilatatione pupillae siue alinthisar, tria facit. In prima parte determinat de dilatatione pupillae consequente cephalicam. In secunda ibi. Sed si dilatatio, Ponit curam dilatationis pupillae non ualde magnae propter humiditatem superfluum existentem in oculo aut propriam aut communicatam. In tertia ibi. Quod si pupillam. Ponit curam dilatationis sequentis percussione. De prima parte dicit. Cum pupilla, id est foramen, scilicet quod est in nigredine oculi, id est, uuea adeo dilatatur, ut undique circa perueniat ad albedinem, id est, coniunctiuam, fueritq; post uehementem capitis dolorē, parua est fiducia in eius cura, tum propter eius magnitudinē, tum quia est critica, unde a capite semper noua deriuat materia. De secunda parte dicit, quod dilatatio pupillae consequens humiditatem oculi superfluum, aut propriam aut communicatam curatur frequenter exhibendo pilulas cochias cum debita tamen interpolatione, ne uirtus terreatur. Secundum ponendo in oculo siue de fellibus, cuius descriptio praecessit in cap. imaginationum. In tertia parte curat dilatationem sequentem percussione inueniens facilem eius curam cum hoc emplastro. Recipe farinae fabarum, quae est frigid. & sic. repercussiuā & partim resolutiuā. 3. 2. chamemillae calid. & sic. in primo resolutiuae siue attractiuae 3. semis, euisc. id est, althaeae calid. & sic. resolutiuae et doloris sedatiui 3. 1. cum aqua et uino nigro stiptico, in quibus chamemila et althaea coctae fuerint fiat emplastrum, quod quidem competit non statim a principio, sed post tertiam aut quartam diem cum sit partim repercussiuū partimq; resolutiuum. Sed contra quia Auic. 3. tertij cap. de alinthisar, dicit quod alinthisar sequens percussione non habet curā. Respondetur quod Auic. intelligit cum dilatatio est magna, & proprie si sit cum fractura uueae: Rasis autem intelligit hic cum est parua & sine fractura uueae. Cura dilatationis & constrictionis pupillae conueniunt si pendeant a causis similibus, unde si pendeant ab humiditate superflua aliunde oculo communicata sex requiruntur intentiones. Prima est euacuatio secundum humoris exigentiam, si enim fuerit sanguis in causa fiat phlebotomia ex una cephalica, uel ambabus si ambo oculi fuerint laesi. Si uero pendeant ab alijs humoribus fiat euacuatio secundum humoris exigentiam respiciens tam membrum mittens quam receptiuo aliquoties reiterata, non tamen ita frequenter, ut uirtus terreatur, de quibus dictum est in cap. debilitatis uisus. Auic. tamen assignat terminum decem dierum, scilicet inter euacuationem & euacuationem.

Secunda intentio est diuersio complenda materia existente sanguinea cum prouocatione haemorrhoidentio, menstruum, sanguinis narium, si eorum reuenerit fuerit in causa. Item cum uetustatione, phlebotomia, nocere, & aliarum, de quibus sermo praecessit. Si uero aliae materis peccauerint fiant diuersio

nes aliae conuenientes, & propriae usque ad ipsa cautela si oportuerit.

Tertia intentio est regimen membri mittentis complendum cum euacuacione, diuersione ipsius, conformatione, ne huiusmodi materiam multiplicet, sed expellat per loca conuenientia.

Quarta intentio est resolutio causae coniunctae quae secundum plurimum est humiditas phleg. quae completur cum alcohol ex tuthia. Item cum collyrio ex succo foeniculi, cui addi posset parum fellis gruis aut hoc di, aut tantumdem mellis. Auic. uero laudat hoc. 12. fellis hoedi, fellis gruis an. aureos 2. croci. 3. 1. piperis 170. gran. suc. liquiritiae aur. 5. & tertiam, ammoniaci, aur. 2. mellis quantum sufficit, terantur terenda cum aqua foeniculi, & miscendo cum melle fiat collyrium. Ad euacuandum etiam causam coniunctam confert phlebotomia uenarum quae sunt in lachrymalibus domesticis.

Quinta intentio est correctio accidentium inter quae cauendum est ne dilatata pupilla unius oculi altera dilatetur, & propterea iubet Auic. fieri alcohol alteri oculo cum tuthia preparata ne dilatetur sicut prius.

Sexta intentio est debitum regimen quod debet ad siccum inclinare, & ad calidum secundum plurimum, uerum materia existente sanguinea declinet ad frigidum, inter cetera laudat Auic. aquam ciceris cum oleo sesam. Si uero pendeant haec passionēs a siccitate, tunc adhibeatur omne regimen intrinsecū & extrinsecum humectatiuum qualitatiue & substantiue, & in summa regatur regimine hecticae.

Et inter cetera aliquando fiat fricatio oculi & partium circumstantium, ut nutrimentum trahatur ad oculum, sit tamen breuis. Si uero pendeat a percussione, Prima intentio est diuersio cum phlebotomia cephalica eiusdem lateris secundum plurimum. Et si oportuerit apponantur ventosae cum scarificatione in spatulis, aut nocrea, aut in his locis sanguisugae applicentur. Secunda, fiat repercussio ponendo in oculo, & super oculo aquam albuminis oui cum aqua rosacea per duos dies aut circa, deinde super oculo ponatur emplastrum Auicennae, ex farina fabarum sine corticibus & farina hordei ana 3. una, cum aqua foliorum salicis & endiuiae, aut ponatur lana infusa in uittello oui & oleo rosaceo, cum pauco uino stiptico, & tunc in oculo lac distilletur. Et post hoc emplastrum, oculo superponatur emplastrum Rasis magis resolutiuū & tunc in oculo distilletur sanguis turturum, columborum, aut pullorum, postremo autem cum materia amplius non fluit administretur collyrium factum ex tuthia, croco & myrrha ana, cui si oportuerit addantur aliae medicinae magis resoluentes, de quibus dictum est in tarphati, & similiter exterius apponantur magis resolutiua, &c.

DE FISTULA LACHRYMALI.

Cap. XXIII.

Hoc est ultimum cap. de passionibus oculorum in quo Rasis agit de fistula lachrymalis. Et iuxta morem nostrum primo uidenda sunt quid nominis, et quid rei. Sed quia fistula lachrymalis ut plurimum sequitur apostema lachrymalis, ideo de ipso a nobis prius agendum est. Apostema lachrymalis penes A. dicitur bachelus, & est apostema secundum plurimum factum in lachrymalis domestico.

Huius enim quatuor sunt species secundum qua-

tuor humores, phlegmaticum sanguineum, cholericum & melancholicum. Verum Auic. de duobus tantummodo loquitur, scilicet phlegmatico quod est de genere glandularum, siue sit cum chisti siue sine chisti, & de sanguineo. Ex eo quod ista duo sunt secundum plurimum euenientia, scilicet phlegmaticum quidem propter multa phlegmata à cerebro ad lachrymale domesticum rheumatizantia. Sanguineum etiam accidit frequenter propter uicem quæ est in lachrymali domestico, à qua facillè egreditur sanguis illius apost. factius. Et hoc apostema dicitur exitura bothoralis. Apost. enim quæ sunt in hoc loco sunt secundum plurimum exituræ incipiendo, licet secundum plurimum fuit difficilis suppurationis, & propterea ex longa mora frequenter putrefaciunt os, ut aliquam particulam, scilicet panniculum aut charthilaginem. Apostemata uerò cholericæ & melancholicæ rarius accidunt in hoc loco. Et hæc exitura bothoralis existens secundum plurimum sanguinea est duplex. Est enim quædam magis superficialis subiacens uisui, quædam magis profunda non subiacens uisui, sed cum compressione sentitur, & est deterior. Arguit enim aut crassitiem materiæ, aut debilitatem uirtutis expulsiuæ, & est tardioris suppurationis quam prima secundum plurimum corrumpens os, aut aliam particulam intrinsecam.

Causæ horum apostematum sunt primò quatuor causæ generales, scilicet fortitudo membri expellentis scilicet cerebri secundum plurimum, præsentia materiæ & latitudo uiarum, debilitas membri suscipientis cum aptitudine ad recipiendum propter carnis spongiositatem, & propterea hic locus scilicet lachrymale domesticum frequentius apostematur quam syluestris. Causa autem efficiens est sanguis secundum plurimum, deinde phlegma, postea cholera aut melancholia, licet secundum plurimum hæc apostemata sint mixta. Signa huius apostematis sunt tumor, durities, dolor, grauitas, ophthalmiam consequens, & similiter fluxus lachrymalis. Cognoscitur autem sanguineum, aut quia rubeum purpureum cum tensione dolore extensiuo, & notabili tumore secundum plurimum, cuius rubedo per compressionem non dealbatur. Cognoscitur phlegmaticum, quia album cum paucio aut nullo dolore, & si est cum chisti facillè impellitur de loco ad locum, & parum est aptum terminari per suppurationem. Cognoscitur cholericum, quia rubeum clarum uel tendens ad citrinum cum pauca tensione & duritie paucaq; eminentia, & dolore pungitiuo, cuius locus rubeus albescit per compressionem, & est cum multitudine lachrymarum, scilicet callidarum. Cognoscitur melancholicum, quia tendens infusum cum duritie multa & paucio dolore. Hæc apostemata secundum plurimum generantur per uiam defluxus per partes exteriores, & secundum plurimum suppurantur, & tandem rumpuntur, aut intra oculum, aut ad extra per cutim, aut utrinq; materia existente multa & acuta, aut rumpuntur ad nares ossa putrefaciendo & perforando, ita ut interdum putredo comunicetur colatorio, aliquando corrumpuntur chartilagines palpebrarum aut panniculus cooperiens eos, aliquando nullum istorum corrumpitur apostemate existente pineali, ita ut solum cutis rumpatur. Prognostica, Corruptentia os & præ-

cipuè os colatorio sunt cæteris difficiliora quæ rarissimè aut nunquam curantur. Pinealia autem facillè curantur, mediocrum iudicium est medium.

Sed nunc dicamus de fistula lachrymalis. Nam fistula lachrymalis & algarap sunt termini synonymi. Et secundum continentis dicitur algarap transumptum à quodam instrumento, siue uale non habente nisi unum foramen per quod aqua infunditur, licet interius sit amplum. Sed nota quod fistula accipitur dupliciter communiter scilicet & propriè, fistula enim communiter sumpta dicitur de quocunq; apostemate cauernofo, & taliter sumitur hic, propriè autem sumpta est ulcus cuius fundum est amplum, & orificium strictum cum duritie & nodositate partis intrinsecæ. Hæc autem fistula dicta algarap aliquando dicitur lachryma propter multitudinem lachrymarum. Et à Simone lanuensi, egilops. Et ab Azarauio abraçot. Et hali Abbate cornu uel corna. Et secundum continentis, autoritate G. ægilops. Species eius sunt quæ aliquando est superficialis, aliquando profunda. Et hæc est duplex, aliquando cum corruptione ossis & panniculi, aliquando sine. Item aliquando cum duritie & abstractione, aliquando sine.

Causæ sunt apostemata iam dicta cum erumpuntur. Item diuturnus fluxus lachrymarum. Signa fistulæ est resudatio, uirus, aut saniei. Item etiam egressio ipsius manifesta per compressionem super lachrymale. Egreditur enim aut per oculum, aut per nares, aut per aliquot foramen cutis. Item malus color, & mala dispositio illius partis nec non fluxus lachrymarum & dispositio ad ophthalmiam. Cognoscitur quod sit superficialis ex apostemate præcedente superficiali & facillè scilicet paucis diebus erupit. Et cognoscitur e contra quod sit profundum ex apostemate profundo, scilicet cui tardata est eruptio. Cognoscitur quod sit cum ostracositate ex longitudine temporis, & quia per tactum sentitur durities manifesta præter consuetudinem. Cognoscitur quod sit cum corruptione ossis per tactum cum proba argentea aut plumbea, & per uirus quod egreditur cum est subtile tendens in citrinitatem. Cognoscitur aut putredinem esse comunicatam colatorio, per uirus foetidum, subtile, citrinum, per os egrediens.

Cognoscitur quod chartilago oculi sit corrupta per uisum. Quod autem panniculus sit corruptus cognoscitur, quia facilliter proba penetrat in ipsum.

Prognostica ex dictis facillè innotescent. Hoc tamen affirmare potes, quod hæc fistulæ communiter sunt chronice, tum propter continuum defluxum ad lachrymale domesticum, tum propter motum oculi & lachrymalis, tertio quia non potest fieri ligatura conueniens in ulceribus, quarto quia medicinæ debiles non imprimunt, sortes uerò nocent oculo, &c.

Cum angulus lachrymalis resudat, et cum premitur, sanies et uirus ab eo egrediatur, fistulam pati intelligitur. Quæ cum cauterio curatur. De hoc tamen loquutus plus est quam huic nostro libro attineat. Nos tamen iam ei adinuenimus medicamen,

men, quod si adhibitu fuit, ipsam per multos menses adeo tardare facit, ut aeger sanus uideatur. Medicamen autem illud est. Recipe aloes, thuris, sarcocolle, sanguinis draconis, balauftiae, antimonij, aluminis, omniū ana partes aequales, ziniar quātum est quarta pars unius, fiant ex eis sies. Cumq; necesse fuerit fistula in tantum prematur, ut quicquid saniei in ea cōtinetur egrediatur.

Deinde infirmus super latus in quo nō est fistula iaceat, & de praedicto sies aliquid dissoluatur in aqua de qua in angulo lachrymali tres guttae aut quatuor intimantur magno existente interstitio inter projectionem unius guttae & alterius, quo facto aeger per tres sic iaceat horas. In mane quoque sequentis diei similiter fistula bene praematur, & fiat eadem cura, quod per hebdomadam unam fieri conuenit, & etiam tam diu donec a fistula nihil egrediatur cum premitur. Ex hac namq; cura locus multis mensibus siccus permanebit. De curis oculorum quantum huic loco necessarium esse putauimus, iam satis dictum esse credimus. Alia uerò quae sunt de curis quae per ferrum exercentur dimittamus, quia multis indiget medicaminibus. Sunt autem quaedam ex eis quae in locis in quibus de decoratione tractabimus, & sanitatis custodia continentur.

Diuiditur hoc cap. in quatuor partes. In prima parte notificat ipsam fistulam. In secunda ibi scilicet quae cum cauterio, innuit ueram curationem fistulae. In tertia parte ibi. Nos tamen adiuuimus, ponit curationem fistulae mendosam. In quarta ibi. De curis oculorum, excusat se ab ulteriori determinatione de passionibus oculorum. Quae dicit in omnibus istis receptam quae optime confert in exiccatione fistulae & eorum consolidatione. Aloe namq; est calidum in secundo, sic. in tertio, paucae mordicationis tione secundum Serapionem, autoritate Galeni in de simplicib. centesimo nonagesimo sexto. Secundo est thus calidum in secundo, siccum in primo abstergens obscuritatem uisus, replens uulnera profunda, & incarnata apud Dioscoridem libro primo

simplicium 71. Tertio est sarcocolla calid. in secundo, sicca in primo corrodens carnem mortuam, & restituit rans corrosam. Quarto est sanguis draconis frigid. & sic. in tertio secundum Serapionem, conglutinans ulcera & plagas. Quinto sunt balauftiae frigid. & sic. in primo ualde stypticae, restringentes incarnantes & consolidantes. Sexto est antimonium frigid. in primo, sic. in secundo destruens carnes putridas ulcerum, mundificans sordes eorum & consolidans ea, prohibens pustulas fieri in combustione ignis, consolidans ulcera a combustionem facta mixtum cum cerussa & mumia. Septimo est, alumen habens multas species, hic uero sumitur alumen de rocha calidum et siccum in tertio, constringens fluxum sanguinis, desiccans ulcera. Octauo est zinar, corrosiuum, forte calidum & siccum in quarto. Ex his ergo apparet quanta sit uirtus huius antidoti in huiusmodi, scilicet fistulis & alijs in quibus est humiditas, scilicet superflua.

Dicit autem Rasis hoc debere imponi postquam aliquod sies ex his distemperatum est cum aqua decoctionis gallarum, existente magno interstitio, id est, spacio inter prohibitionem unius guttae & alterius, ut optimè possit ad profundum penetrare, quapropter foramen debet esse prius bene dilatatum, & ulcus bene abstersum, & seruare reliqua, quae in textu dicta sunt. Apoplethmatis lachrymalis, & simpliciter fistulae eiusdem triplex est regimen, scilicet uniuersale quod debetur causae antecedenti, & particulare proprium causae coniunctae, tertium est regimen commune utriusque. Primum exigit tres intentiones, scilicet euacuationem, diuersionem, & fluxus interceptionem, quae omnes complendae sunt, secundum quod dictum fuit in ophthalmia. Secunda, scilicet particulare quod debetur apoplethmati si sit genitum peruiam defluxus, & terminetur per uiam resolutionis exigit tres intentiones, repercussionem in principio, in medio repercussionem mixtam resolutioni, sed in fine resolutionem tantum. Repercussio quae debetur, in principio sunt leuia, sicut in materia calida, aqua rosacea, aqua albuminis oui, lac & oleum rosaceum permixtum cum aceto quod bullierit usque ad acetum consumptionem, & superponatur lachrymali peria infusa in eo, cauendo, tamen ne aliquid eius oculum ingrediat. Si autem materia sit frigida, huic aliquid bdelij in aceto dissoluti permisceat, & desuper ponatur, postea gradatim addatur ammoniacum, succus foeniculi. Et si apparet durities, parum mucilaginis althaeae, aut foenugraeci, & similia, tandem ammoniacum in aceto dissolutum cum decima parte atramenti, id est uitrioli, est conueniens resolutionum, nux rancida contrita & superposita est ultima. Si uerò tendat ad maturationem adiuuetur cum diachylon, & similib. postea rumpatur. Sed consulo tibi ut non expectes eruptionem fiendam a natura, sed tu erumpe cum cauterio, aut cum sagittella, & distanter ab oculo, & si minus tarda fuerit maturatio erumpe ante maturationem completam ne ex longa mora partes intrinsecae corrumpantur, & fac foramen latum ut conuenienter possis perficere omnes operationes in hoc casu opportunas. De maximis enim erroribus & tardantibus curationem est paruitas foraminis. Quod si fuerit ruptum cum sagittella, imponatur pro prima uice, aut etiam duabus uicibus stuelli stupei in albu-

mine oui infusi iuxta consuetudinem. Si uero cum cauterio ponatur uitellum oui in oleo rosaceo infusum duobus diebus. Postea quomodo cunctum ruptum sit, perueniatur ad mundificandum siue ad mundificandiam. Et ex convenientibus est mel ros. aut oxymel simplex. Et ex proprijs est lanugo inuenta in canna prope radicem permixta cum melle rosaceo, aut oxymelle, fortius istis est unguentum Aegyptiacum remouens carnem mortuam. Et adhuc fortius est hoc. Recipe mellis uiridis, aeris, aluminis, ana, & misce. Et conueniens ad mundificandum, & exiccandum, & consolidandum est medicamen Rasis positum in litera, &. Si uero os sit putrefactum necessarium est ipsum amouere, aut cum cauterio actuali quod ordinetur secundum exigentiam ossis remouendi, & orificium ulceris, communis autem modus est, ut defendat totus oculus, & etiam labia orificij cum petijs lineis aut corro infusi in aqua rosacea, aut albumine oui, aut in aliquo succo frigido quod semper faciendum est cum uoluerimus uti aliqua medicina caustica, & deinde instrumentum bene ignitum ponatur usque ad os bene adhærendo ipsi ossi, semel, bis aut pluries secundum exigentiam, & propterea sint parata plura instrumenta taliter ignita & semper fundum ulceris à sanie aut à sanguine abstergatur, ne operationem impediat, post hoc albumen oui cum oleo rosaceo & uitello oui cōcūsum ponatur intus & desuper & in oculo ponatur sief album cum albumine oui, lacte, aut aqua ros. ne oculus ophthalmetur, & super oculo etiam cottum perialinea circumdatum in aqua rosacea infusum, & fronti & temporibus repercussiu appliceantur. Si uero ager abhorreat cauterij actuale dilatato orificio ulceris cum sectione, aut tenris de sponsia, de medulla mellegæ, uel sambuci, uel gentianæ procedatur ad squamationem ossis, & remotionem substantiæ corruptæ, aut ostracofæ cum medicinis incipiendo à leuioribus, sicut est alumē de roca combustum, & peucedanum est proprium in squamatione ossis, & fortius est uitriolum combustum, & potius est euphorbium, uitriolum tamen aliquanto tempore cōtinuatum super osse est mihi expertum, fortius autem in omnibus & infallibile est cauterium factum ex capitulo, sed inueteratum ualde, ut amplius in aqua non cōuertatur, si enim quantitas grani frumenti super osse ponatur potest squamari non solum hoc os, sed etiam cetera ossa, & est mihi expertum. Auic, tamen laudat diebardich & secundum aliquos sic hoc modo. *℞. bdellij, ammoniaci an. 3. s. dissoluantur ad ignem, & projiciatur desuper uiridis aeris. 3. 2. plus si uolueris facere ipsum acutius.* Aliter describitur à Rasi secundo continentis. *℞. arse nici citrini partem unam, aeris usti partem s. salis ammoniaci partes quatuor, infundantur in aqua calcis per hebdomadam & exiccantur in sole, deinde sublimentur & referuetur quod sublimatum est in uase uitreo, & est multum acutum.* Aqua quoque separationis auri ab argento si in eo cottum in extremitate stili infundatur & applicetur. Et similiter aqua dissolutionis cauterij, & hæ aquæ leuiter possunt applicari cum extremitate stili in quo uis, & per foramen canulæ potes intrinittere stili in cuius extremitate sit cotru in huiusmodi aquis infusum. Et sic per facies operationem tangendo locum corruptum & nocebis

fano. Ex his ergo omnibus collige sex intentiones curatiuas. Prima est dilatio orificij ulceris, secundum cauterizatio donec mortificetur caro scilicet fistulosa & os corruptum, aut alia substantia, scilicet purtrida, tertia est absterio & eleuatio partium causticarum ad quam intentionem perficiendam ponatur mundificandiam, de quibus supra, transactis duobus diebus, in quibus uitellum oui cum oleo rosaceo mixtum potest imponi, quarta est generatio carnis, quæ debet fieri cum notabiliter exiccantibus propter humiditatem ulceris superfluam & propterea non denudentur à pauca quantitate uiridis eris. Et ad hoc perficiendum ualeat medicamen Rasis in litera, quinta est sigillatio perficienda cum unguento de lithargyrio, & quandoque cum alumine combusto, sexta est acciditum correctio, scilicet doloris & ophthalmiæ, scilicet minuendo & temperando oculum cum frigidis & circa frontem & tempora, repercussiu apponendo, & propriè dum fiunt operationes fortes & dolorosæ, &c. Vltimum regimen commune utriusque causæ respicit accidentia, de quibus dictum est. Et secundum regimen sex rerum non naturalium uariandum secundum exigentiam intentionum, de quibus supra, sed fit dicta magis tenuis & dedinans ad frigidum quanto accidentia sunt fortiora, & quando per facies aliquam operationem dolorosam ex iam dictis. Cura uero mendosa in textu posita fuit & sufficienter ordinata, &c.

DE PASSIONIBVS AVRIUM, ET PRIMò de anatomia. Cap. XXXVIII.

Actum est in præcedentibus de passionibus cerebri & neruorum & oculorum. Hic agitur de passionibus aurium. Et iuxta consuetudinem præmittam anatomiam auris, & modum regiminis conseruatiui eiusdem, imò potius præseruatiui, deinde ad curandas eius ægitudines accedam iuxta seriem capit. Rasis. Auris dicta est ab hauriendo eo quod per aures doctrinam haurimus. Nam per auditum maximè efficiuntur scientes, primo mera physice, & in libro de sensu & sensato, secundum accidens uero ad prudentiam auditus plurimum cōfert, sermo enim audibilis existens est causa disciplinæ, quare infra concludit quod sapientes à natiuitate utroque sensu præditi sunt, priuari autem sunt cæci, muti, & surdi, licet enim sensus uisus de se magis conferat ad scientiam quæ auditus, per accidens tamen magis confert auditus, & unusquisque nostrum in seipso facile potest iudicare. Auris descriptio est membrum infirmale charitilaginosum, rotundum, subtili panno uelatum cum quibusdam eleuationibus anfractuosis habens foramen similiter anfractuosum, non rectum perueniens usque ad extremitatem foraminis ossis petrosi, in quo est neruus audituus in modum panniculi contextus duræ matri continuus, in quo spiritus audibilis complantatus continetur, & ante ipsum subtili cōtiguus est aer stans, uelica quadam circumdatus ad audiendum finaliter ordinatum. Est enim membrum instrumentale & organicum ratione operationis nobilis facientis ad bene esse indiuidui, & esse compositum, fuit autem charitilaginosum, ut esset sonorum, & non fuit factum ossiosum ne casu aut percussione frangeretur, neque factum fuit carneum aut panniculare.

niculare, quia non bene seruasset figuram, & compositionem sibi necessariam, & fuit rotundum, ut esset bene capax aeris, & deinde sonorum, habuit autem anfractus ad similitudinem ostraci limatiarum, ut melius fieret aeris, & inde sonorum reuerberatio. Fuit autem uelut pāculo duro subtilissimo, qui secundum uerorem sententiam est genitus ex uillis nerveis ortum habentibus à quinto pari neruorum cerebri, aut ex uillis ligamentibus ortum habentibus ab osse petroso, ut auri haberet debitum sensum & cum hoc bene resisteret exterius occurrentibus. Fuit autem foramen eius anfractuosum non rectum, ne uentus aut aer dispersiatur aut fortis sonus subito sine modificatione ad organum auditus perueniret, neruus autem auditus est pars principalissima, in qua fit auditus sicut crystallis respectu uisus in oculo, & spiritus coplantatus est instrumentum auditus, sicut spiritus uisibilis ipsius uisus, & aer stans circūdatus uelica, quod totum uocatur miringa, auditus est medium intrinsecum specierum, sicut albugineus est medium intrinsecum specierum uisibilium, & foramen auri ab Auic. est appellatum assarmach, sicut foramen uuee dicitur pupilla, in quo uniuntur species soni, sicut in foramine uuee species uisibiles, non est autem nisi hæc differentia, quia foramen uuee est coopertum cornea, non autem foramen auri. Illud enim fuit necessarium in oculo, ne albugineus exiret. Similis autem necessitas non est in auri. Est autem ad audiendum ordinatum tanquam in sinem, quous enim auri habeat alias operationes naturales ministrantes, & ministras & uitaes. Et quis sit deputata ad expurgandum superfluitates cholericas cerebri, ut patet in cerumine aurium, quod per eam egreditur: attamen principalissima operatio est audire, & non est cerebrum euentare sicut quidam existimauerunt, neque etiam per aures respirare, quod Aristoteles reprobat primo de historis animalium.

Ex quibus patere potest anatomia auri. Fuerunt duæ, ne nocita una auditus impediatur, patet etiam numerus partium componentium aurem, scilicet charitago, panniculus, foramen, aer stans cum uelica sua, neruus auditus, & spiritus coplantatus. Patet secundò situs, quia fuerunt in alto constitutæ ut essent proximæ cerebro, quod propter uisum debuit esse superius pars corporis, fuerunt in lateribus constitutæ, & non ante propter oculos & instrumenta gustus & olfactus, quæ hunc locum sibi uendicarunt, & non fuerunt postæ posteriorius, quia nimis fuissent distantes à sensu communi, quare, &c. Fuerunt autem immediatæ sub tonsura capillorum, quia si fuissent magis supra ab ipsa fuissent uelatæ, & ab his quæ in capite geruntur. Patet etiam substantia, quia charitago, & sicce complexionis quantum ad complexionem innatam, licet quantum ad influentem sit calida & humida, patet etiam quantitas & figura & iuuamentis, & etiam apostema. Ex quibus inferitur quod ea, quæ ponuntur in auri debent esse actus tepida non frigida. Nisi forte in casu excessiue caliditatis præternaturalis quod rarissime contingit, neque multum calida.

Circa hæc duo cadunt dubitationes. Prima quia uideretur quod unus sonus debet iudicare duo, cum à duabus auribus per duos neruos, qui scilicet nunquam

uniuntur, species soni ad sensum communem deferantur, si uera est communis sententia quod nerui optici uniuntur, ne unum uisibile iudicetur duo. Secunda dubitatio quoniam quintum par neruorum oritur à posteriori cerebro, imò omnia paria præter duo prima, ut est manifestum his qui uiderunt anatomiam, ergo species soni debent deferri ad cerebrum posterius & ad memoratiuam, non autem ad sensum communem, & sic sensus communis non erit index obiectorum sensuum exteriorum. Ad primam respondetur quod unus sonus non debet apparere duo, quia duo nerui, scilicet auditui uenientes ad duas aures uniuntur in origine ipsorum, & sic fit unio specierum delatarum per ipsos neruos. Contra si illa unio neruorum in origine sua sufficeret ad unionem specierum audibilium à pari sufficeret unio specierum uisibilium in origine neruorum opticorum, & sic frustra esset altera unio circa medium ipsorum.

Ad hoc dicitur, quod prima unio sufficeret, scilicet ad unionem specierum, secunda tamen unio non est frustra cum sit facta non solum propter unionem specierum uisibilium, sed etiam ut spiritus uisibilis possit cito deferri de uno oculo ad alium, cuius signum quia per compressionem unius oculi, pupilla, scilicet alterius dilatatur: secundum iuuamentum est, ut per illam unionem seipsos melius sustentent, ut uult Auic. prima, primi, doctrina, scilicet de anatomia neruorum cerebri autoritate Gal. hoc autem non fuit necessarium in auditu, cum pauciores spiritus ad audiendum sufficiant. Et quia duæ aures sunt in duobus lateribus oppositis situatæ ad inuicem ualde distantes. Ad secundum dicitur, quod à loco coniunctionis neruorum audituorum transit uia, occulta tamen ad sensum communem, orti autem fuerunt à cerebro posteriori, ut essent duriores, sic enim fuit expediens pro operatione sua, & quia sunt multum expositi extrinsecus alterantibus, nec de hoc mireris, nam & species tangibilium deferuntur à neruis manuum & pedum ad sensum communem non immediatè, sed per multa media. Primò enim deferuntur ad nucham à qua illi nerui originantur, deinde ad cerebrum posterius, à quo nucha oritur: & inde ad sensum communem, qui est in cerebro anteriori, non tamen prius deferuntur ad memoriam, quam ad sensum communem, ut manifestum est. Regimen autem conseruationis auri siue præseruationis est, ut tueamur auri complexionem cauendo ab extrinsecus occurrentibus, sicut aere, uento, aqua & similibus potentibus aurium eucrasim corrumpere. Conseruemusque earum compositionem prohibendo, ne foramen oppiletur ab his quæ possunt aures ingredi, sicut aqua, lapilli, cimices, & similia. Et ne etiam ab intrinseco oppiletur sicut à cerumine, sanguine aut alia humiditate, uermibus aut carne, scilicet interius orta.

Ad hæc autem duo prohibenda optimè confert oleum amygdalarum amararum debite calidum, si in utraque auri tres guttæ semel singula hebdomada imponantur ipsis auribus bene abstergis, & sine dolore à cerumine & reliquis superfluitatibus in ipsis existentibus, cuius olei extractio cum cortice, postea procuratur. Ad conseruandum autem unitatem & prohibendum apostemata & bothor in eis optimè confert, si memithæ cum paucis aceti similiter instillatur.

Et cauendum est à repletione & satietate nauſcatiua, & propriè à ſomno ſuper repletione, &c.

DE DOLORE AVRIVM.
Cap. XXXV.

Hæ pars ægritudinis aurium diuiditur in ſex partes, ſecundum quod Raſis ſex facie capitula. Primum cap. eſt de dolore auris circa quod ſunt quædam notanda iuxta morem noſtrum. Quid nominis auris ſatis manifeſtum eſt. Doſor autem auris eſt triſtis ſenſatio tactiua eiſdem rei ſubito materialiter imprimētis, &c.

Species doloris quandoq; ſumuntur à particula patiente, aut quia quidam eſt exterius in charitagine auris, quidam interius in foramine, aliquando communicans neruo auditiuo, aliquando ſumitur à dolore in ſe, & ſic ſunt quinque ſpecies doloris communiter euenientes, ſcilicet pungitiuus, pruritiuus, extenſiuus, grauatiuus, puſſatiuus. Item quidam intenſus, quidam remiſſus, quidam criticus, quidam non criticus. Et quilibet dolor eſt actio corrupta, & propterea eſt accidens alicuius morbi, licet etiam quandoq; ſit morbus cum quandoq; ſubito interficiat, ſicut apoplexia apud Auic, cap. proprio. Eſt autè & alia actio corrupta auris, de qua infra, quando unus ſonus pro alio apprehenditur, aut apprehenditur ſonus eſſe in medio, qui non eſt, inter quas duas actiones corruptas eſt differentia. Prima, eſt enim actio corrupta tactus. Secunda, auditus, licet utraq; actio corrupta ſiat in eadem parte organi, & cum eiſdem inſtrumentis adæquatis numero, complexione & ſpiritu auditiuo. Et per unammet cauſam imprimentem in organum auditus, ſcilicet uentofitatem & æquè primo tempore, nec obſtat famoſum dictum Ariſt. & comperatoris 2. de generatione q; ab uno in quātum unum non prouenit primo niſi unum. Iſti enim duo effectus non proueniunt ab eiſdem cauſis in quātū una eſt enim potentia auditiuā à tactiua, realiter diſtincta, & etiam ſpecies ſonora quæ eſt immediata cauſa unius, diſſert à mala complexione aut ſolutione continui, quæ eſt immediata cauſa alterius, &c. Cauſæ doloris auris aut ſunt per eſſentiam aut per communitatem, quæ cuiuslibet doloris cauſa immediata ſit mala complexio aut ſolutio cōtinui exiſtens in membro dolente, aut in membro ſibi communicante, unde non eſt inconueniens eſſe dolorem in aliquo membro in quo non ſit mala complexio, aut ſolutio continui, licet illius doloris cauſa immediata ſit mala complexio aut ſolutio continui exiſtens in altero membro ſibi communicante. Mala autem complexio factiua doloris auris plurimū eſt calid. aut frig. ſine materia aut cum materia cuiuſcunq; generis & frequenter cum cerumine auris lædente qualitate aut quantitate. Mala aut complexio calid. aut eſt à cauſa extrinſeca ſicut ab aere calid. aut aqua calid. & propriè cum ſuccedunt cauſis inſtigidantib. Et ſimiliter mala complexio frigid. eſt ab aere, aut à uento, aut ab aqua frigida, & ſimilibus, & propriè cum ſuccedunt cauſis caleſcentibus, aliquando etiam pendent à cauſis corporeis ſicut in febris & alijs diſpoſitionibus. Cauſæ autem ſolutæ continuitatis ſunt caſus, offenſio, aut percuffio, aut aliquod animal, aut alia res ingrediens aurem, aut nata in ea, aut uentofitas extendens, aut

humor aliquis corrodens, aut putrefaciēs & tandem ulcerans aurem, aut apoſt. cum rumpitur & frequenter cerumen auris tam ſua quantitate q; qualitate. &c. Apoſtemata enim & bothor ſiue puſtule cauſant dolorem auris mediante tam mala complexione, q; ſolutione continui, hæc autem apoſt. ſecundum plurimum ſunt calida, ſanguinea aut cholerica, aliquando tamen ſunt frigid. phleg. & melanch. Et poſſunt fieri tam per uiam deſluxus, q; per uiam paulatim factæ congeſtionis. Cauſæ autem doloris auris per communitatem, aut ſunt à toto ſicut in criſi aut febris, aut à membro particulari ſicut ſtomacho, epate, matrice, frequentius tamen à cerebro, & à quinto pari neruorum cerebri, &c. Signa doloris auris habentur ex reſultu ægri. Quod ſi referre neſciat, quia forſè inſans, tangantur loca uerſimiliter dolentia, quod ſi dolor erit in aure ex tactu dolor creſcet & ploratus & lamentatio. Et etiam quia forſè præter conſuetudinem aliqua humiditas ſluit ex aure, aut forſè illa quæ fluere conſueuit eſt retenta. Signa uerò cauſarum primitiuarum tam malæ complexionis q; ſolutæ continuitatis ſunt ipſarum præceſſio & nocumentum inde ſecutum cauſæ proportionatum, ſicut exempli gratia, præceſſio uenti, aeris frig. aquæ & propriè aurem ingreſſæ, & frigiditas inde in aure manifeſtè ſenſata. Et ſicut præceſſio aeris calidi & ingreſſio lixiui aut aliterius calidi in aurem cum manifeſta eius caliditate. Et ſicut præceſſio percuffionis caſus & offenſionis ſequente fluxu ſanguinis aut ſaniei ab aure. Cognoscitur autem dolorem pendere ab animali, aut ab alia re aurem ingreſſa aſpiciendo in aurem ſub radijs ſolaribus & etiam ſi eſt animal ſentitur commotio ipſius punctio & ſonitus magnus in eius commotione. Et ſi eſt uentofitas dolor eſt extenſiuus non grauatiuus & auditur ſonitus manifeſtus & clarus non qualis in apoſtemate, aut in materia nō apoſtemate in quibus eſt ſonitus, & fragor quidam conſuſus. Cognoscitur autem mala complexio calid. ex præceſſione ſcilicet cauſæ caleſcentis, & quia caliditas in aure ſentitur, tu uatur à frigidis & in hora fridiori diei, nocetur à calid. & in hora calidiori diei. Econtrario ſunt ſigna malæ complexionis frig. & ſi eſt ſine materia eſt ſine grauitate, ſine tumore, ſine obturatione foraminis, & præceſſit aliqua ex cauſis primitiuis ſecūdum plurimum & non multum impeditur auditus. Sed cum præſentia materiæ adeſt grauitas & tumor, & foraminis obturatio & magis pender à cauſa corporea & impeditur auditus ſi ſit in profundo. Soluta autem cōtinuitas manifeſta cognoscitur per exitum ſanguinis aut ſaniei. Sed apoſtema cognoscitur per grauitatem, dolorem continuum, & tumorem & obturationem foraminis niſi ſit in parte ualde inſinſeca, & tunc dolor eſt ualde intenſus & adeſt grauitas & febris continua. Et ſi calidum ſit ſanguineum, adeſt magna grauitas, & tumor & durities, & rubedo tendens in obſcurum. Et ſi ualde profundum ſit, dolor eſt intenſiſſimus cum alienatione & interdum motibus ſpasmus, & ſyncopi, & frig. extremorū. Et febris eſt intenſa & interdum cū rigore & horripilatione, in extrinſeco enim febris eſt leuis ſicut ephimera. Si autem ſit cholicum adeſt dolor pungitiuus non ita extenſiuus & grauatiuus ſicut in primo cum calid. mordaci & intenſa, & non eſt tibi tumor magnus, neque magna

gna foraminis obturatio & rubedo est clara quæ per compressionem delitescit. Phlegmaticum autem est cum paruo dolore, pauca febris, neque color membrum est mutatus à colore sibi consueto & est cum leuitate. Melancholicum autem est cum duritie & cum dolore tendente in fuscum, & cum maturatur crescit febris, dolor etiam fit magis pulsatiuus, & cetera accidentia crescunt, sed eo maturato, omnia minuuntur, & eo corrupto sanies egreditur & multotiens ex insperato cum medici multotiens decipiantur non credentes esse apostema, & non est differentia inter materiam apostemantem, & non apostemantem, sed solum imbibitam nisi quia in non apostemante, est minor tumor, minor dolor, minor obturatio foraminis, minor febris, imò secundum plurimum non est febris, & cetera accidentia sunt remissiora, raro tamen accidit, ut sit materia imbibita non apostemans. Species autem materiarum cognoscitur ex signis superscriptis. Et iterum ex signis communibus sumptis ex ætate, complexione, forma, & tempore anni, arte, regimine præcedente, & similibus. Cognoscitur autem dolorem pendere ex cerumine, quia foramen auris eo plenum est, & ex extractione eius dolor recedit. Cognoscitur autem quod sit per communitatem à toto uel à parte, ex nocumento totius uel partis præcedente, cum cuius augmento augetur, & diminutione diminuitur, & si sit per communitatem à cerebro secundum plurimum, non solum auditus leditur, sed etiam gustus propter propinquitatem originis quinti paris nervorum cerebri præbentis auditum, originis tertii & quarti paris præbentis gustum & sensum linguæ, & dolor criticus cognoscitur ex ægritudine præcedente, cum cuius doloris augmento materia permutata sedatur ægritudo præcedens sicut sedatur phrenesis materia ad aurem permutata.

Prognosticum primum Auic. peruersior dolor auris est qui fit ab apostemate profundo calid. & propriè cum est cum feb. inseparabili, perducit enim ad permissionem intellectus, & quandoque interficit subito sicut apoplexia, cum enim est in nervo auditivo ob fortem dolorem fit cerebri contractio, & per consequens meatuum oppilatio & prohibitio transitus spiritus animalis ad membra mouenda ex quo prohibito anhelitu sequitur suffocatio & mors, & hæc est potius epilepsia quam apoplexia cum in contractione tanta cerebri necesse sit uniuersum corpus contrahi, secundum plurimum tamen non interficit & frequètius interficit adulescentes quam senes, quia in senibus est sensus obtusior, propter cuius obtusior nem toleratur quousque suppuretur. Sed in pueris ob acuitatem sensus non potest tolerari quousque sanietur. Si autem suppuretur cum cæteris signis laudabilibus speratur euasio, nullum tamen usque ad 55. ætatis meæ annum uidi mori ex auris dolore, & c.

SI cum dolore qui fit in aure fuerit inflatio, & pulsatio, ex cephalica erit minuendus. Et oleum rosaceum aut oleum de floribus salicis tepidum cum pauco

aceto est immittendum. Lac quoque ita calidum ut ex mammilla egreditur, erit distillandum multotiens. Venter præterea ex mirobalanis, citrinis, et scammonia et aloë uehementer soluat, quod hoc modo fit.

Rec. mirob. citrin. drach. 20. et poluerrizati in 2. lib. aquæ coquantur, donec ad duas tertias unius lib. reddantur & colentur, Post hoc sumantur aloes drach. 1. scammonia 6. pars drach. 1. aggregentur cum rob de cytonijs, & fiant ex eis pilulæ, quæ per duas horas ante decoctionem sumantur, deinde bibatur decoctio. Quod si dolor non quieuerit parum opij in oleo rosaceo resoluti in aurem mittatur, & si pulsatio redierit, & tribus diebus perseverauerit oleum sesaminum in quo anatis aut gallinæ adeps fuerit resolutus in aurem sæpe mittatur, ibi nanque est pustula, quæ maturatione indiget. Cum autem dolor quieuerit, putredo iam est collecta, ideoque pus subito ex insperato egreditur de aure.

Diuiditur hoc cap. in partes tres. Nam in prima parte Rasis ponit curam doloris auris ab apostemate siue pustula calid. licet in hac parte comprehendatur cura doloris à mala complexione calida siue apostemate. In secunda ibi, scilicet. Cum autem dolor in aure, ponit curam doloris auris à mala complexione frigid. cum materia. In tertia ibi. Si autem cum dolore, ponit curam doloris pendens à uentositate. Prima iterum in duas, nam in prima ponit signa doloris auris ab apostemate calido, in secunda ibi. Ex cephalica. Ponit curam. In prima parte ponit duo signa apostematis calidi in aure. Primum est inflatio faciei, & maxime partis circumstantis aurem & ipsius auris propter præsentiam sanguinis aut cholerae mixtæ cum sanguine, ex quo etiam debet sequi aliquis rubor faciei. Secundum signum est pulsatio, id est dolor pulsatiuus, & c. dolor namque pulsatiuus est in apostemate calid. & propriè sanguineo etiam in sui principio, & maxime cum est presentia arteriarum, qui dolor postea tempore maturationis multo magis augetur. Secunda pars diuiditur in tres, nam in prima ponit curam conuenientem in principio. In secunda ibi. Quod si dolor. Ponit curam quando dolor nimium excreuit.

In tertia ibi. Et si pulsatio. Ponit curam apostematis quando maturatur.

In prima parte Rasis curat apostemata in sui principio tribus generibus remediorum. Primum est phlebotomia ex cephalica cuius causa nota est. Se-

cundum genus est applicatio localium, sicut olei rosacei aut olei de floribus salicis quod est frigidum & humidum, cum pauco aceto, scilicet quarta parte, secundum immittendum in aure est lacita repidum, sicut ex mammilla egreditur frigid. & humid. doloris sedatiuum, & hæc ponuntur in aure, et circa ipsam. Tercium genus remediorum est ventris solutio cum decoctione mirrob. citrinorum, quorum sumantur 3. 20. & puluerizati crasso modo bulliant in 2. T5. aque ad consumptionem duarum partium, secundum solutiuum est aloes 3. 1. quod soluit phleg. & choleram cum 6. parte 3. 1. scammonæ quæ potissimè soluit choleram ex his cum rob. de cytonijs, id est, cum succo cytoniorum inspissato per decoctionem, fiant pilulæ, scilicet 7. quæ per duas horas sumantur ante decoctionem. Hæc enim medicinæ potissimè soluit choleram. Sed tempore moderno in regione nostra sufficeret medietas istorum solutiuiorum, existimo tamen quod in regione Rasis corpora sint robustiora indigentia fortioribus solutiuis, sicut & in regione Teucrorum, datur magna quantitas scammonæ & canone. Ratio autem Rasis, quare dat pilulas ante decoctionem per duas horas est, ut sint iam actuatæ, & inceperint iam trahere humores ad stomachum & ad intestina. Et deinde superueniente decoctione adiuvetur & feliciter ipsarum operatio, tardius enim actuantur quam medicinæ liquidæ. In secunda parte existente fortissimo dolore docet permiscere parum opij, ut puta 3. s. cum 3. s. olei rosacei de quo duæ guttæ instillantur in aure. In tertia parte redeunte & crescente dolore pulsatio & perseverante aliquanto tempore docet maturare, & hæc debent apponi tam interius quam exterius, & litera satis patet, nam cum maturatur dolor excrecit, sed pustula maturata dolor sedatur iuxta aphorif. Circa generationem saniei, &c. Deinde pustula rumpitur & sanies ex aure egreditur ex insperato, quia fortè nec medicus nec æger crederet esse apostema.

Cum autem dolor in aure sit post fastidiosam satietatem, aut post ventos frigidos oleum in quo ruta aut capæ coctæ fuerint, in aure distilletur. Et si hoc non suffecerit oleum in quo turbiti coctum fuerit distilletur. Aut oleum de lilio sumatur & cuique uncia 1. ex eo misceatur, euphorbij recentis drach. 1. & castorei dra. 1. Sed si hoc non suffecerit ueter pilulis cochijs soluiatur. Patiens quoque balneum ingrediatur in quo sudet. Vinum quoque uetus et fortè ei tribuatur.

In secunda parte principali ponit curam doloris auris à mala complexione frigida cum præsentia materiei phlegmaticæ. Et posset diuidi hæc pars in quatuor partes secundum quatuor genera remediorum. Primò enim ponens signa doloris à mala complexione frigida, quæ sumuntur à causis suis, scilicet quod euenerit post fastidiosam satietatem & ventos frigidos. Et supplere uos alias causas infrigidantes.

Ponit primò curam cum iniectione oleorum calefacientium & exiccantium, quorum quedam sunt calida in quarto gradu, sed tutius est incipere à leuioribus & propriè non facta purgatione. Secundò soluit uentrem cum pilulis cochijs, à quibus regulariter operando esset incipiendum. Tertiò ponit curam per balneum ad corporis exiccationem, calefactionem, & materię resolutionem, quod balneum potest esse tam aerium quam aqueum, & propriè ex aquis calefacientibus, & exiccantibus siue sint naturales siue artificiales. Quartò exhibet uinum uetus ad calefactionem, & exiccandum, resoluendum & confortandū, & debet esse in pauca quantitate. Et similiter totum regimen declinet ad calidum & siccum.

Si autem cum dolore auris sonitus & tinnitus fuerint, atque uentositas panicum siue milium in sartagine torrefactum, calidum multoties superponatur. Auris quoque super uaporem aque in qua sint coctæ, mentastrum & stecas arabicus & sambucus, teneatur. De castoreo præterea & euphorbio in oleo sambacino dissolutis quorum unumquodque quatuor grana hordei ponderet in aurem mittatur.

In hac ultima parte curat dolorem auris à uentositate, & quæ dixit sunt manifesta. Ultima tamen medicina sic perficitur. 2. castorei, euphorbij ana gran. 4. olei sambacini, id est, iuiufemini 3. 2. misce & duæ aut tres guttæ in aurem instillantur & etiam partes circumsistantes inungantur.

Pro curandis aggritudinibus aurium ante omnia. Sciendum est quod multis modis medicinæ possunt auribus applicari. Primò fomentando aurem cum lana, cotto, petijs, spongij, aut filtris infusis in aliquo liquore & expressis & applicitis. Secundo modo recipiendo fumum aut uaporem cum emboto aut sine. Tertiò sub forma emplastrorū & unguentorū. Quartò sub forma puluerū. Quintò quo frequentius uisumur sub forma liquoris instillando aliquid in profundum auris, circa quem modum sunt octo canones obseruandi. Primus quod auris pro posse aliquantè præmundificetur cum cotto aut re simili & leuiter ne dolor inferatur, ut medicinæ possint in profundum penetrare. Secundus canon, ut quæ instillantur sint ualde liquida aut liquidis admixta. Tertius ut non sint ualde calida aut frigida actualiter, sed tepida propter debilitatem miringe, & nerui auditui non sustinentis excellentias istas qualitarum actualium, licet medicinas potentialiter tales in quarto gradu facilius sustineant, & propriè siccissimas. Quartus est, ut ea quæ instillantur sint pauca quantitatibus, sufficiunt enim duæ aut tres guttæ propter paruitatem & stricturnam foraminis. Quintus est, quod dum imponuntur, iaceat super aure, scilicet contraria aliquantulum siue aliquandiu, scilicet donec liquor ad profundum descenderit, nam propter tortuositatem, stricturnam, & aliqualem distantiam non ita cito descendit.

descendit. Sextus, ut instillatum non longo tempore retineatur in aure, sed procuretur frequenter ipsiuseductio ne putrescat. Et cum educitur iaceat super eadem aure, & etiam cum cotto eadem auris leuiter mundificetur. Septimus, quod quæ instillantur non sunt facile putrescibilia. Octauus, quod frequenter reiterentur, scilicet ter aut quater in die naturali. Nam postquam pauca quantitas debet imponi & paucio tempore debet impositum remanere iuxta canones superscriptos, sequitur quod aut non fiet actio, aut oportet medicinas frequenter instillare.

Cura doloris auris ab animali ingresso aurem uel nato in ea, & lapide, aqua, & similibus cadentibus in aure, & à casu, offensione, ulceribus & à uentositate patebit ex capite sequenti.

Cura autem doloris auris à mala complexionem calida aut frigida sine materia, siue pendeat à causa primitiua siue corporea est. Vt primò causa remouatur. Secundo nocumentum ex ipso derelictum cum contrarijs sicut frigida cum applicatione pannorum calidorum necnon medicinarum calidarum tam interius quam exterius. Et similiter calidis cum frigidis interius & exterius applicitis semper aurem sibi confortando. Tertiò prohibeantur humores à fluxu si timeatur ne fluant ad aurem cum euacuantibus & diuercentibus. Quartò corrigantur accidentia si qua corrigenda sint, sicut instantia uigiliarum, & similia secundum ipsorum exigentiam. Quintò ordinetur debitum regimen secundum exigentiam malæ complexionis sibi impressæ, & accidentium. Quæ autem sint medicinarum calefacientes aut infrigidantes propriè in dispositionibus, auris. Et quæ sint medicinarum solutiuæ opportunè in his dispositionibus, apparebit in sequentibus.

Cura doloris auris pendens ab humore apostemate, aut non apostemate, est uarianda secundum quod dolor est criticus aut non criticus, & secundum quod extrinsecus aut intrinsecus, et secundum quod est intensus aut remissus. Si iste dolor fuerit non criticus & intrinsecus pendens à materia apostemante exigit septem intentiones. Prima est euacuatio. Secunda diuersio. Tertia, repercussio, quæ debetur principio. Quarta est repercussio mixta resolutioni auturationi quæ debetur augmento usque ad medium status. Quinta est pura resolutio quæ debetur à medio status usque ad finem declinationis. Sexta est accidentium correctio. Septima est debitum regimen rerum non naturalium uariandum non solum secundum diuersitatem materiæ, sed etiam secundum exigentiam intentionum, de quibus dictum est. Et hæc omnia intelliguntur in cura regulari. Sed in dolore extrinsecus auris non competit repercussio. Est enim membrum satis ignobile & reputatum ad recipiendum superfluitates membri nobilis, &c. Vbi uero dolor esset ualde intensus ad eius sedationem ante mi. Quando ad diuersum trahere uolueris membri à quo protrahis dolorem prius sedato, quo sedato ad curas ordinarias secundum 7. intentiones superscriptas est redeundum. Si ergo dolor fortis sit à causa calida hæc remedia facies uel aliquod ipsorum quorum plurima sunt de intentione Mesue, cuius serè totum caput hoc scribam declarando, quæ declaratione indigent. Qui albumen cum lacte mulieris tepido im-

positum auri, & partibus circumstantibus cum petijs aut cotto superpositum. Item oleum rosæ tepidum per se aut ablutum cum aceto quantum est oleum, deinde bullitum ad aceti consumptionem, aut permixtum cum succo cucurbitæ, & bene cum ipso conuassatum, oleum de florib. salicis, secundum eandem doctrinam oleum nenupharinum, oleum de semine cucurbitæ, oleum papaueris si dolor est uehementis per se aut cum aliquanto camphoræ. Est enim sedatiuum tum remouendo malam complexionem calidam tum etiam stupefaciendo, lac mulieris solum mox cum mulgetur, aut cum succo solatri aut cum aqua coriandri humid. Mucilago psyllij cum oleo rosæ conuassata, aut mucilago sem. cytoniorum, oleum de gribret, id est de mandragora, quādo dolor est acutus cum lacte mulieris mox cum mulgetur, lenticulas, scilicet stantes in superficie aquarum coctas, scilicet cum mica panis cataplasmas, succus hyoscyami fortes sedat dolores, etiam stupefaciendo, lactuca agrestis secundum omnem modum administrationis est medicamen bonum. Similiter succus solatri & papaueris & mandragoræ & salicum & turionum uitis, id est, teneritatum extremitatum uitis & similia hamech. Ad dolorem auris à caliditate. Recipe olei rosacei partes duas, olei amygdalarum dulcium partem unā, aceti partes tres, fac coqui lecto igne usque ad aceti consumptionem cola & administra tepidum. Item accipe foliorum cucurbitæ aut ipsius cucurbitæ succum, & misce cum oleo rosaceo, diu conuassato, & utere. Et aliquid istorum addere potes apud dolorem fortem parum opij scilicet pros. 3. quinque aut decem grana.

Sed ad dolorem auris à causa frigida administratur oleum nardinum, id est, de spica, costinum, sampsiuci, rutaceum, amygdalarum amararum, chamæmilinum, anethinum, laurinum, de litio, de chierij, chrysomelinum, de behen, de cherua, oleum cinnamomi, quodcumque eorum proprietatem habet ad dolorem auris à causa frigida aut uentosa. Fundamentum autem & materia præparationis eorum artificialiter est cæpæ concanum, in quo oleum impositum oportet decoqui cum facilitate super cinere prunarum, & ex rebus admixtis sigillantibus ipsis, uirtutes mirabiles cum bonitate decoctionis in cæpæ cum eis est ruta propriè, & succus radices qui comeditur, id est, raphani, & spica, & sampsiucus & sceca, & est species absinthij, & pauatur quod sit santonicum, scilicet herba lumbricorum siue semen eius, alias semen cinam. & chamæmilla, & galbanum dissolutum in succo porri per se, & aillum, & castoreum, & piper, & suth, id est gallia muscata, & succus cæpæ, & succus fassion, id est prassij, & succus asphodeli & euphorbium, & uterque elleborus, & propriè albus, & non est inconueniens in huiusmodi permixtionibus admisceri modicum mellis, & deinde tepidum distilletur.

Si autem dolor est fortis ex miscibilibus bonis est opium cum paucis castorei & croco, aut philonium cum lacte, aut trochisci stellæ, aut trochisci croci, deinde remouenocumenta narcotici, scilicet cum eis, quæ scis, de quibus statim dicetur.

Ex euaporatorijs autem sicis est milium, aut panicum & sal, calefacta & superposita, aut bacca lauri cum melle paucis calefacta & superposita, aut pulgium cum melle & olibano, aut granum lauri &

olibanum cum succo rutę. Et hęc maximē valent in dolore uentoso. Et dixit Gal. facelletur ex fursure cum uino coctio, & oleo spicę aut rutę. Cępę marinum cōtusum cum oleo aut butyro coctum est expertum. Euaporatorium autem humidum fit cum aquis decoctionis rerum quę maturant, & carmināt & mollificant sicut melliori propriē & aneti, & chamęmilę, & scēnugręci & uolubilis, & foliorum caulium & seminis eius, & herbę uenti, id est paritarię & sampuci, & absinthij & similia, singulariter aut cōiunctim, ita ut recipiatur uapor eorum per canulam cuius una extremitas sit fabricata super uas in quo res coquantur, & alia extremitas applicetur auri. Et quandoq; est necesse ut misceatur his rebus aliquid ex stupefacientibus, ut sedetur uehementia doloris, & tunc fiat ista cum cautela. Remouent autem nocumenta narcotici uapores superius dicti cum modico, scilicet castorei, & piperis, sicut scis. Gal. linimentum quod administratur & sedat dolorem auris. Accipe medullam ceruinam, aut medullam cruris iuueni & ceram ana. 3. s. olei amygdalarum amararum, succi poligonię, id est uirgę pastoris & a multis uocatur sanguinaria & corrigiola ana quantum sufficit, fiat unguentum, & inungatur in circuitu auris. Est enim mirabile. Vel radices raphani cum oleo & decoque & distilla ex eo in auribus & cum lana calida auri applicita. Et uermes qui sunt sicut media faba. Et inueniuntur sub lapidibus. Aut uermes plurium pedum coquantur in oleo ex oliuis immaturis, & distillentur ex eo in aurem, est enim expertum. Fit autem similiter ex scarabeis & ex lumbricis terrestribus. coctis cum oleo omphacino. Oleum similiter de scorpionibus est ad istud sublime. Item fel tauri cum adipe anatis est iuuamenti mirabilis ad dolorem auris a causa uehementer frigida. Hęc omnia sunt de intentione Gal. quę experientia confirmauit. Hic multiplicauit tot medicinas in sedatione doloris auris, quia uehemens dolor ipsius est pernitiosus, &c. Dolo autem sedato uel remisso, procedatur ad curam ordinariam secundum septem intentiones suprascriptas. Pro prima igitur intentione quę est euacuatio. Si humor peccans fuerit sanguis, aut sanguini mixtus, si materia non fuerit ualde multa, fiat phlebotomia ex cephalica eiusdem lateris. Materia autem existente plurima, fiat phlebotomia ex cephalica lateris contrarij deinde ex eodem latere. Vbi autem uideretur epar esse in causa aut alia membra naturalia, fiat primò phlebotomia ex basilica, deinde ex cephalica eiusdem lateris si oportuerit. Vbi autem matrix & retentio menstruorum fuerint in causa, primò phlebotometur saphena eiusdem lateris, deinde cephalica eiusdem lateris si oportuerit. Hauriatur autem quantitas sanguinis secundum exigentiam circumstanciarum iuxta doctrinam superius datam. Mēue tamen propter multam ægritudinis acuitatem præcipit multam sanguinis extractionem, aut una uice aut pluribus. Post hoc si oportuerit euacuetur humor peccans cholericus, scilicet cum his, quę dicta sunt in textu, aut cum electuario succi rosę & similibus. Verum materia existente ualde calida, & propriē apostemante, lenientia frigida sunt potentiora, sicut manna aut casia cum decoctione prunorū, tamar. uiol. &c. Phlegmaticus uero cum cochij. Melancholicus cum indis & simili-

bus, quibus aliquid cochiarum sit admixtum. Est non fit opus phlebotomia ab istis euacuationibus est inchoandum. Diuersio iuxta secundam intentionem fiat cum clysteribus, lotionibus brachiorum & curium, uentofationibus, diuersionibus per nares, gargarismatibus, & phlebotomijs uenarum, quę sunt iuxta aures, non autem masticatorijs, dolorem enim augerent & materiam magis ad locum attraherent. Tertia intentio perficitur cum repercussiuis impositis auri, super aurem, circa aurem, dummodo materia non sit criticę expulsa, non sit uenenosa, non furiosa, non plurima, non expulsa immediate a cerebro, non ualde tenax crassa & uiscosa, non ibidem paulatim coacta neque fluat ad partem extrinsecam auris, aut ad locum emittorium illi proximum, repercussiuia autem possunt esse multa, ut parerem iam dictis. Sicut in materia calida oleum rosaceum cum quarta parte aceti, aut oleum rosaceum cum tantundem aceti, a quo acutum per decoctionem sit resolutum. Et multa ex suprascriptis in sedatione doloris. Sed in causa frig. oleum amygdalarum amararum, aut de spica, aut chamęmilinum, & similia non apta, sed aliquoties stiptica, primò conuassata cum tantundem aceti, deinde bullita usq; ad aceti consumptionem. Et hęc applicentur per totum secundum aut tertium diem. Et post hoc tempus permiscenda sunt iuxta quartam intentionem repercussiuia cum resolutiuis & mollificantibus. Vnde in causa calida suprascriptis addatur mucilago, sem. citoniorum, aut sem. lini, aut scēnugręci, aut oleum amygdalarū dulcium. Et materia non existente multę caliditatis ad epar anatis aut gallinę. Et ex ualde bonis est mucilago sem. malua uisci, medulla cruris uituli, butyrum, & sint pauce caliditatis. Et quanto magis procedatur uersus statum, multiplicentur hęc mollificantia & resolutiua, ita ut transacta sexta uel septima ponantur sola resolutiua & mollificantia, de quibus dictum est, donec materia resoluatur aut maturetur iuxta quintam intentionem. Et in toto curę processu attendatur summo opere sedationi doloris, iuxta doctrinam superius datam, eligendo, scilicet ex medicinis suprascriptis, quę magis uidentur conuenire, habendo respectum ad qualitatem materię & tempus ægritudinis & ad intentionē quam queris. Et nota quod auri imponenda nō debent esse omnino humida, etiam si imponantur gratia sedationis doloris, aut maturationis, quia complexio auris est siccissima, cuius conseruationi cum siccis semper pro parte intendendum est. Et propterea Gal. s. de ingen. san. reprobatur medicum ponentem in aure nimis maturatiua, quib. communiter utimur in maturatione reliquorum apostematum. Et in maturando apostemate ualde calido, diachilon minus est ualde proprium, & propriē cum oleo de alcanna, diachilon autem magnum utrunq; magis confert in maturando apostemate frigido. Ioan. Mēue. Emplastrum conferens ad maturandum & resoluendum apostema auris cal. non multę caliditatis. s. farinam hordei, decoque eam cum rob. & oleo chamęmilino. Aliud. s. farinę fabarum, fol. uiol. florum chamęmilę, farinę hordei, althęe, melliori, decoque cum aqua & oleo chamęmilę, & rob. & superpone. Auicē. cęsopi cerorum cuius iuuamentum est sublime, ad apostemata auris maturans

turans & sedans dolorem. R. adipis gallini, butyri
ouini seu uaccini loti, ceræ citring, adipis caprini, mel
lis, olei de lilio, cœopi humidî, ana. partes equales, fiat
ex istis cerotum & repidum in aure mittatur, & hoc
ualet in materia frigida, scilicet non uehementis frigi
ditatis etiam suppositum & linitum in circuitu, & est
expertum. Aliud eiusdem, capæ album elixum &
cum butyro contritum & superpositum, est propriū
in causa, scilicet frigida. Confectio Rasis emplastri
satis boni ad dolorem aurium apostematosum aposte
mate mixto. R. bdellij, adipis caprini, ana. 3. 3. faring,
sœnugræci, farinæ sem. lini, radices althææ, radices li
lij, ana. 3. 5. chamæmilæ, meliloti, ana. 3. 1. croci. 3. 1.
vitellum unius oui conficiat sic: chamæmila, melilo
tum, radix althææ, radix lilij decoquantur in aqua be
ne usque dum decocta sint, bdelliū uero dissoluatur in
aqua decoctionis herbarū, & ex omnibus his fiat em
plastrum addendo rob, olei sesamini ana. 3. 2. butyri
quod sufficit. Et apud necessitatē addatur opij, 3. 2. &
est mirabile. Et quandoque ponitur pro opio papaue
ris albi, 3. 6. Multa etiam dicta sunt supra, in sedatio
ne doloris, quæ ad hunc locū etiam accommodari pos
sunt. Et memento quod butyrum nō habet aliquod sibi
compar in maturando apostema aurium, mollifican
do, resoluendo, & sedando dolorē, & propriē in cor
poribus teneris, maturato autem apostemate intētio
est ut rumpat, & deinde curetur cura ulceris, de quo
rum curatione agetur in cap. sequenti. Si uero apo
stema non fuerit in loco ualde profundo, & apte pos
sit fieri, cum sagittella scindatur. Vbi uero esset pro
fundum, aut ager nollet incidi, rumpatur cum medi
cinis, & ex leuiter rumpentibus est capæ album co
ctum permixtum cum butyro & fermento, & si præ
dictis addatur allium coctum est efficacius, aut radix
ireos decocta, & capæ narcisci, id est lilij habentis flo
rem album in giro, & in medio crocē, aut purpureū
cum radice rotunda sicut bulbos, & semen nigrum &
oblongum coctum cum aqua, & mixtum cum melle
& oleo liliorum alborum & butyro, & est efficax ual
de. His autem si addatur parum limi columbini effici
tur præstantius, &c. Sexta intentio est corrigere ac
cidentia tam præsentia sicut instantia uigiliarum, syn
copim & similia, quæ futura sicut surditatem, &c. quo
rum curatio ex proprijs cap. positis, & ponendis est
men est, ut aer inspiratus declinet ad cal. frig. aut tem
peramentum secundum exigentiam materiæ facien
tis apostema & febris magnitudinem. Cauendum
tamen est ne auris qualicunque apostemate laboret, læ
datur ab aere circumdante frigido, est enim frigidum
inimicum omnibus nervosis, & diæta sit tenuis & de
clinans ad frigidum in causa cal. & propriē apostema
te. Caueat a uino & carnibus nisi in declinatione,
comedat pristinam, hordeaceam, panem lorum, & o
bra aliquando parum uini ueteris, & diæta declinet
ad cal. & sic. Et si esset apostema frigidum aut non bi
declinet ad cal. aut sit ualde permixtum, & totū regimen
munier septem horarum & non super aure, scilicet
dolente, nisi forte cum esset tempus eruptionis aposte
matis, aut esset ruptum quiescat, & fricatione uicem
suppleant exercitij, procuret omnes euacuationes na

turales, & sit sperans & gaudens fugiat accidentia ani
mi molesta & excessiua. Si autem dolor cum apo
stematē aut sine esset in parte intrinseca auris, aut pro
pe aurem, non est necessaria tanta sollicitudo in eua
cuatione, diuersione, nec ibi competit repercussio, imò
procedendum est cum mollificantibus & resoluenti
bus, & reliquo regimine de quo supra.

Si autem dolor fuerit criticus, tres requiruntur inten
tiones. Prima, est crism adiuuare. Secunda, acciden
tia corrigere. Tertia, est debitum regimen ordinare.
Prima autem intentio quinque modis completur. Pri
mus modus est debilitare inimicum uirtutis, scilicet
materiam, qui modus perficitur digerendo & euacu
ando, & hæc debent fieri ante crism. Secundus mo
dus est confortando uirtutem & membra principa
lia, & multiplicando sanguinem & spiritum, qui est
expeditus per crism. Et hoc debet fieri ante crism, in
crisi, & post crism exhibendo ea quæ sunt facili digesti
onis & conuersionis, boni chimi, paucarum super
fluitatum, cauendum tamen est tempore crisis cum
hæc exhibentur, ne natura à crisi impediatur, & pro
pterea est tutius huiusmodi ante crism exhibere. Ter
tius modus est præparando uiam sicut mundifican
do aurem à cerumine, & superfluitatibus in ipsa exi
stentibus sicut mundificamus intestina à fecibus. Et
hæc faciēda sunt ante crism, et etiam in crisi si expedie
tur.

Quartus modus est stimulo uirtutem expulsi
uam, sicut in crisi per intestina, supponimus ergo sup
positorium aut clystere aliquod stimulo expulsi
uam. Sic & in proposito poneremus digitum in au
rescalpendo aliquantulum, aut aliquod simile facien
do. Et hoc fieri debet ante crism si tardauerit, & in cri
si si postquam incepit sit pigra & lenta. Quintus mo
dus perficitur attrahendo materiam, sicut in crisi per
intestina fricamus hypochondria, & illa, & quandoque
supponimus clystere attractiuum materiæ cuius cri
sim speramus. Sic in proposito, scilicet fricamus
quandoque aurem & emplastra superponimus attra
hentia, & etiam uentosas si expedierit. Sed cauenda
sunt duo. Primum ne dolor nimis excrescat. Se
cundum ne materia extrahatur supra illud quod ne
cessarium est & operatio membri destruat. Et pro
pterea hæc attractiua ut plurimum sint leuia & dolo
rem mitigantia sicut euaporatoria facta cum spon
gijs & filtris, & emplastra potius dilatantia poros,
quàm fortiter attrahentia nisi forte materia esset uene
nosa aut furiosa. Et si timeremus crism impediri in
his casibus, deberemus fortiter attrahere etiā cum uen
tosis magis eligentes uitam hominis cum surditate,
quàm mortem. Si tamen propter huiusmodi attra
hentia dolor nimis excresceret, ut ad syncopim deue
niret, & huiusmodi accidentia extrema hæc dimitten
do procedamus cum superscriptis leuibus dilatanti
bus, & dolorem lenientibus potius eligentes ut ager,
ui ægritudinis moriatur, quàm quod ipsum interi
mamur. Emplastra autem huiusmodi & fomenta
tam leuia quàm fortia, ex superscriptis eligantur.
Fermentum enim, galbanum, ammoniacum, aristo
lochiam, radices lilij, & similia sunt de fortiter attrahe
ntibus. Secunda intētio, scilicet accidentium correctio
est, ut dolor modum excedens leniatur, non cum fri
gidis repercussiuis aut stupefacientibus, sed cum mol
lificantibus, de quibus supra, Reliqua accidentia cu

butyri ueni.

7 attualiam fori

rentur secundum quod oportet, crīsim nō impediendo. Regimen autem sex rerum non naturalium iuxta tertiam intentionem est, ut aliter ordinentur ne crīsim impediānt, imō adiuuent, &c. Sit aer leuiter declinans ad cal. aut ad frigidum secundum exigentiam causę doloris. Viter excellentiā in qualitatibus primis. Et sit boni odoris mediocriter illuminatus. Caveat tempore crīsis à cibo & potu, nisi quantum sit expediens pro custodia uirtutis. Et propterea si cibus est necessarius sit paucus, boni chimī, paucarum superfluitatum, facilis conuersionis. Caveat à somno. Nisi quātum est expediens pro custodia uirtutis in hac crīsi & cæteris, nisi in ea quę sit per sudorem. Euacuaciones naturales spontaneas natura inuitante procuret. Non multum stimulet natura ipsa non inuitante ne ipsam à pugna diuertat. Quiescat animo & corpore ne naturam à crīsi diuertat. Si ergo sit crīsis euacuacionis cōpleta, bene est. Si uerō incōpleta suppleatur per illud quod aptius uidebitur. Si autem sit crīsis permutationis intendatur postea resolutio & maturationi, non autem percussioni secundum quod dictū fuit, & maturato apostemate rupturū iuxta doctrinam superiorem.

DE VLCERE AVRIVM ET SANIE.
Cap. XXVI.

VLCUS est solutio cōtinui cū sanie. Et dicitur cum sanie ad differentiam uulneris, quod est solutio cōtinui sine sanie, &c. Ex quo infertur quod ulcus est morbus in unitate, sicut & quælibet solutio cōtinui, & per consequens est morbus communis tam simplicium, q̃ compositorum, sicut & unitas communis est utrorūq; complexio autem appropriatur simplicibus sicut compositio organicis. Sanies autem descriptiue est superfluitas quartę digestionis ex toto genere præter naturam. Et est duplex, scilicet laudabilis & illaudabilis. Prima habet quinque bonas condiciones. Prima est enim alba, quia debet assimilari membrīs radicalibus siue spermaticis, quę cōcurrunt ad ipsius generationem. In ipsis enim principaliter fundatur calor innatus, qui est instrumentum ipsorum ad ipsius generationem. Secunda lenis, id est uniformis in partibus suis, hæc enim arguit bonam proportionem uirtutis naturalis digerentis digestionem, quę sit in nocituo ad materiam digerendam, & propterea uniformiter patitur à calore digerente & non diuersificatur in partem obedientem, & non obedientem, neq; in modo substantiæ, neq; in colore, neq; in reliquis.

Tertiò æqualis, id est mediocris substantiæ non multum subtilis aut crassę seruata proportionem ad membrum in quo fit & ad humore ex quo fit, non enim est dubium quod in neruo osse & cartilagine, & uniuersaliter in membro quanto est densior substantiæ generatur sanies subtilior, & e contra in carne & membrīs mollibus generatur sanies crassior, & ex humore crassiori crassior, & ex subtili subtilior.

Quartò non debet esse multi foetoris, sed tamen aliquantulum, per hoc enim significatur dominium coloris innati licet non absoluitur ab extraneo, id est, putredinali. Iuxta sententiam Auic. tertiā, quarti cap. de iudicijs saniei. Pro cuius declaratiōe primò nota, quod ad digestionem laudabilem quæ sit in iuuatiuo

solum concurrat calor ut naturalis, sicut in digestionem qua chylus ex cibo generatur, sanguis ex chilo, humiditates secundę ex sanguine, membrū aut pars membri ex humiditatibus secundis. Et e contrario in putrefactione concurrat calor solum, ut extraneus. Sed in digestionem in nocituo qua exempli gratia generatur sanies, concurrat calor partim ut naturalis, partim ut extraneus. In generatione saniei laudabilis concurrat magis ut naturalis. Sed in generatione saniei male foetoris concurrat magis ut præternaturalis. Ex quo sequitur, quod inter aliqua media inter has concurrat æqualiter, ut naturalis & putredinalis, ut effectū comprobatur. Tertiò nota, quod non est inconueniens quod calor membri in quo fit sanies sit omnino naturalis. Calor enim qui à membro suscipitur in materia sananda est partim naturalis, partim extraneus, sicut cum generatur sanies ex sanguine in concauitate uenarum in homine sano non exercitato iuxta sententiam Auic. summa de urinis. Sane præterea non exercitatus mingit urinā sicut sanies, et est ei euacuatio laudabilis, & propter hoc remouetur lascitudo, quæ ei ex dimissione exercitijs acciderat. Nota quartò non esse inconueniens eundem calorem numero in humido putrente esse præternaturalem omnino humido quod putrefit, & naturalem omnino uermi per putredinem ex illo humido generando, licet materia adæquata illius uermis non putrefiat. Quintò sanies debet esse mediocris quantitatis non diminutę neq; superflue in relatione ad membrum in quo fiet, & ad quantitatem ulceris: sanies enim potest esse laudabilis in colore, substantia & in singula conditionum superscriptarum, & in pluribus ipsarum, bonum enim habet rationem finiti, malum uerò infiniti, secundo ethicorum.

Causa saniei materialis est humor primus, & proprius sanguis & humiditas secunda. Causa efficiens instrumentalis est calor innatus. Efficiens principalis est uis animę digestiua. Finis ut paretur expulsiōni materia. Et sanies licet plurimum reperiatur in ulceribus & exituris, reperitur quandoq; tamen in aure & alijs membrīs absque ulcere & exitura, sicut uidemus in quibusdam multiplicari saniem in aure absque ulcere, & exitura, & per longum tempus, & hæc est sanies generata in concauitate uenarum cerebri quę expellitur ad aures per orificia uenarum ad ipsas terminata, de qua Auic. 4. primi. cap. tertio.

Vlcera auri duplicem recipiunt distinctionem, scilicet in particula patiente, & in se, à particula quidam patiēte, nam quædam sunt intrinseca auri, quædam extrinseca. Et quę intrinseca, quædam sunt in cartilagine, quædam in miringa & neruo auditui, quædam in osse petroso. Et hæc aliquādo sunt superficialia, aliquādo profunda, quę aliquādo propter sui profunditatem possunt dici cauernę & abscessiones. In se autē distinguuntur, quia quædam sunt minora, quædam sordida, quædam uirulenta, quædam putrida, quædam corrosiua, quædam fistulæ, quædam cum apostemate, mala complexione aut dolore quædam sine, quædam antiqua, quædam noua.

Causę

Causæ ulcerum sunt apostemata aut bothor, cum rumpuntur nec non humores acuti. Primò superficialiter imprimentes, deinde paulatim se profundantes. Et similiter cerumen aurium & uermes & res extrinsecæ cadentes in aures, aut ibidem natæ paulatim corroderentes aut putrefaciennes. Et similiter casus, offensus aut percussio uulnerantes aurem, ad uulnus enim sequitur ulcus.

Signa, ulcera auris cognoscuntur ex sanie inde egrediente. Verum non est sufficiens signum, cum iuxta superius dicta possit sanies à cerebro ad aurē sanam derivari, siue in cerebro sano genita sit, siue sit ex apostemate in cerebro rupto profluens. Frequentius tamen decidit ab ulcere auris siue ulcus illud sit factum ex apostemate auris sine nullo præcedente apostemate. Inter quæ est differentia. Cum enim fuit sanies ex apostemate rupto in cerebro aut in aure, primò sanies in magna quantitate effunditur, deinde paulatim donec consumpta sit & præcesserint signa apostematæ auris aut cerebri, de quibus supra. Si autem sanies genita sit in cerebro sano adest incolumitas cerebri, et auris, & illa sanies fluit in primis pluribus diebus in magna quantitate, postea paulatim donec consumpta sit, & postea aliquando iterum reaggregatur & iterum fluit, imò ipsius uolenta retentio facit uertiginem aut alias cerebri aggritudines. Si uero sanies sit ex ulcere facto in aure ex uulnere aut ex humore, aut ex alijs huiusmodi paulatim corroderentibus aut putrefaciens illa sanies paulatim incipit fluere, deinde sicut ulcus excrescit sanies augetur quousque ulcus sit proximum consolidationi, tunc enim incipit minui. Sed uera signa ulceris auris, sunt dolor, ardor & punctio cum sanie, & propriè apud tactum & immisionem alicuius acuti, & aliquando sanguis simul cum sanie egreditur. Causæ uero ulcerum ex ipsarum præcensione declarant. Si ulcera sunt exterius sensu subiacent. Si uero interiora & sunt in neruo adest aut præcens dolor intensius. Et si sint in osse cognoscitur ex sanie, quæ est subtilis, tendens in citrinū, et ex morbi antiquitate. Et si filus potest immitti, certum propter dolorē intensissimum, nisi neruo corrupto aut eam ex complexione. Et quæ profunda sunt signoscuntur. Vlcera munda cognoscuntur ex sanie laudabili. Sordida ex crassitie cum multitudine eius quod egreditur. Virulenta ex subtilitate sanie, putrida ex sanie foetente. Corrosiua quia aliquando post saniem egreditur sanguis, fistulæ ex diuturnitate ulceris & sanie uirulenta, & carne callosa & magis solito indurata, &c. Prognosticum. Primum ulcera munda sunt ad neruum consolidata relinquunt nocuumtamentum rō uel nunquam curantur. Vlcera prouenientia ad os rāda. Tertium. Vlcera profunda corrosiua aut putrida frequenter sunt perniciofa, cum frequenter se profundunt usque ad cerebrum.

DE CVRA.

Cum pus ab aure egreditur, hydromel tepidū multotiens in una die in

aure est distillandum. Deinde hoc medicamen optimè faciens ad hoc est immittendum. Quod recipit sarcocollæ, aloes, & sang. draconis, thuris, scorix ferri, ziniar, ex eo in aceto dissoluatur, et in aurē mittatur, & lichenium melle illinitum in prædictis intingatur, & sic inde mittatur, patiens itaq; ex hoc medicamine & hydromelle medicetur, donec sanus sit.

Diuiditur hoc cap. In duas partes. In prima ponitur curam per mundificantia. In secunda ibi. Deinde hoc medicamen. Ponitur curā per consolidantia. In prima parte mundificat ulcus auris cum hydromelle, sed debet esse pauca quantitas, ut 12. aquæ 3. 4. & mellis 3. 1. bulliant simul despumando usque ad consumptionē tertiæ partis uel medietatis donec habeat aliquantulum tenacitatem & tepidum instilletur multotiens, scilicet saltem quater in die naturali. In secunda parte ponitur curam per consolidantia describens medicamen conuenientissimum ad hoc. 12. sarcocollæ cal. in secundo & sicca in primo, habens uirtutem consolidandi et corroderendi carnem mortuam, & specialem proprietatem habet ad ulcera auris, ita quod si lichenium illinitum melle cum sarcocolla puluerizata immittatur auri saniosæ, sanat usque ad aliquot dies. secundo can. simplic. nono. secundo ponit aloes calidum & siccat in fine secundi. ualens in ulceribus difficilis consolidationis, tertio est sanguis drac. frigid. & sic. in tertio apud Serap. sed apud Auic. in secundo multum ualens ad glutinandum ulcera & uulnera, & contemperat caliditatem aliorum: quarto ponit thus siue olibanum à monte Olibano dictum, calidum in secundo, siccum in primo, consolidans & habens proprietatem ad aurem & sedans dolorem auris. Quinta ponitur squama ferri frig. & sic. in tertio, & siccior omnibus squamis. Ultimo ponit ziniar, id est, uiride aeris, cal. & sic. in quarto mundans uulnera sordida prohibens ambulatiua. Et potes sic dosare. 12. sarcocollæ, aloes, sanguinis dracōis, thuris, ana 3. s. scorix ferri, 3. i. ziniar, gran. 6. dissoluantur cum aceto non multū acuto, & est acetum frigidum & siccum prohibitum putrefactionis, & ambulatiōis ulcerum, & sit aggregatum mediocris, scilicet spissitudinis, & ex eo, duæ aut tres guttæ tepidæ in aurem distillantur, postea lichenium illinitum in melle in prædicto puluere intingatur, & in foramine immittatur; hoc enim ad curam ulcerum sufficienti hydromelle mundificando, & hoc mundicando & consolidando, &c.

Pro cura ulcerum auris, & etiam reliquorum ulcerum est in primis sciendum, quod medicinx quibus frequenter indigemus in ulcerib. aliquando sunt corrosiue, aliquando absterfiue, aliquando carnis generatiue, aliquando consolidatiue, aliquando cicatrizatiue. Medicina enim corrosiua est, cuius proprietas est ut consequatur ex eius resolutione & ulceratione, quod de substantia membri minuat, sicut flos eris, & hæc cal. & sic. in quarto. Sed medicina absterfiua est cuius proprietas est, ut moueat humiditates uiscosas,

& congelatas ab orificijs uenarum pororum in superficie membri, ita ut elonget eas ab eo, & hæc est cal. & sic, circa secundum gradum, cum quadam substantia subtili, sicut mel. Medicina generatiua carnis est illa, cuius proprietas est ut conuertat sanguinem superuenientem uulneri in carnem, propterea quod æquat complexionem eius & coagulat, & hæc est communiter sic, in primo cum temperamento actiuarum, aut saltem proportionem ipsarum ad membrum paucae stipticitatis, paucae abstersionis, sicut thus. Consolidatiua uero siue incarnatiua est quæ exiccat & inspissat humiditatem stitem inter duas superficies uulneris propinquas, ita ut conuertatur ad conglutinationem, & uiscositatem, & adhæreat una earum alteri sicut sanguis draconis, & aloes, & hæc est sicca communiter in secundo cum proportionem actiuarum ad membrum cum stipticitate & uiscositate absq; abstersione. Cicatrizatiua uero siue sigillatiua est medicina quæ exiccat superficiem uulneris, ita ut fiat cortex, & ista communiter est sic, in tertio cum stipticitate absq; abstersione & absq; multa mordicatione, & est cum temperamento actiuarum sicut cortex pini, licet quandoq; caliditas superflua exiccado per accidens faciat hanc operationem sicut alumen & uitriolum.

Notandum secundò, quòd quia auris est membrum ualde siccum naturaliter in ulceribus eius comperit medicina siccor, quàm in alio membro nostri corporis aliorum paritate supposita, &c. Quanto enim membrum ulceratum aut lapsum ad humidum est magis siccor naturaliter competit medicina intensius sicca quàm in membro naturaliter humido lapsò æqualiter ad humidum, iuxta Auic. quarta, quarti tractatu primo cap. de medicinis facientibus nasci carnem, cuius ratio est, quia cum nihil agat ultragradum proprium, & à proportionem æqualitatis aut minoris inæqualitatis non proveniat actio, non poterit medicina minus sicca quàm sit membrum, cui applicatur ipsum exicare. Cum hoc tamen tenendum est, quòd in corpore & membro humido naturaliter, sed æqualiter præternaturaliter lapsò ad humidum, corpore naturaliter sicco, potentius sicca competunt q̃ in corpore sicco naturaliter, præternaturaliter lapsò ad humidum. Cuius ratio est, quia ubi est maior resistentia maior requiritur potentia, &c. Sed in corpore humido lapsò præternaturaliter ad humidum maior est resistentia, cum exiccantibus resistat humiditas naturalis & præternaturalis. In corpore autem sicco resistat tantum humiditas naturalis. Est autè inter hæc differentia, quia potètia rei insequitur multitudinem formæ. Intentio autem habet attendi penes distantiam à non gradu. Nunc autem reducendo ad actum practicum possumus in corpore sicco approximare intensius sicca sicut aristolochiam, sed in pauca quantitate, & in corpore humido possumus approximare remissius sicca, sicut thus & in multa quantitate. Contra tamen hanc determinationem sunt difficiles instantiæ quas nunc theoricis dimitto. His itaque præmissis, primò ponam curam saniei auris uenientis à cerebro ad aurem absq; ulcere auris, secundò ponam curam ulcerum auris.

Procuratiue primæ dispositionis quatuor existunt intentiones. Prima est euacuatio, & propriè à cerebro perficienda cum phlebotomia & alijs

generibus euacuationum secundum quam dictum fuit in capitulo præcedenti. Secunda est diuersio & propriè à cerebro cum caput purgij & gargarismatibus multoties iteratis, de quibus in multis capit. dictum est. Tertia est cerebri confortatio ne ralem materiam multiplicet, quapropter confortetur eius digestiua, & expulsiua cum interius sumptis odoratis & capiti applicitis. Ut in causa frig. diamuscum, & diambra, & similia. Et in calida saccharum ros. cum paucis speciebus, diamusci, aut pliris arcticis. Odorata autè in causa frigida sunt sicut nigella torrefacta aut puluis ireos. Quibus potest addi parum musci, ambrae, gariophili, aut galie muscatae, & similia. Et in causa calida odorantur rosæ, & poma artificialia, quorum præcessit rememoratio in cap. de catharro. Applicata autem capiti sunt sicut lotiones ex lixiuio factio ex cinere stipitum caulium, in quo bullierit bachara scena, & stecas arabicum, et propriè in causa frigida. Sed in causa calida, aut non lauetur caput, aut cum lixiuio paucissimæ acuitatis in quo bullierint ros. & bachara, & applicentur capiti sacculi ex milio torrefacto, sale, corticibus citri, maiorana, gariophili, uernice, gallia muscata, &c. Et in calida, ex rosis & sandaraca, & his non conferentibus fiat cauterium actuale in commissura coronali, iuxta doctrinam in multis cap. positam. Quarta intentio est auris mundificatio & confortatio, non autem stipticatio, imò potius prohibitio ipsius ab ulceratione lauando ipsam cum uino decoctionis mellis & rosarum, & si timeretur ulceratio instillantur duæ aut tres guttæ sief, & menthae, cum pauco aceti, & similibus. Et si timeretur obduratio mundificetur cum tentis, & ex cotro, & aliquando oleum amygdalarum amararum instilletur.

Cura ulcerum auris si munda fuerit & in corpore mundo, præter correctionem accidentiū & regimen uitæ, duas tamen exigit intentiones curatiuas. Prima est ulceris mundificatio, secunda consolidatio, quæ qualiter debeant perfici, apparet in textu, & ex dicendis clarius apparebit. Si uero ulcus auris fuerit cum mala complexione, apostemate, aut dolore uermèti principalis est intendendum curationi illorum non neglecta cura ulceris, qualiter autem curetur, patet ex dictis in præcedenti capitulo. Cura uero ulcerum auris malignorum, scilicet putridorum, corrosiuorum, fistularum cum corruptione olis octo exigit intentiones curatiuas. Prima euacuatio, secunda diuersio, tertia fluxum intercipit, quarta substantiam corruptam, scilicet putridam corrosam, aut induratum, aut aliter infectum remouet, quinta mundificat, sexta substantiam deperditam generat tadem cicatrizans, septima accidentia corrigit, octaua ordinat debitum regimen. Euacuatio autem iuxta primam intentionem compleretur phlebotomia si oportuerit, & alijs euacuationibus integratis ex minoratiue iuxta doctrinam præcedentis capituli. Sed attende qd digestiua debent rectificare membra, & propriè cerebrum ipsius malas dispositiones corrigendo & ipsum confortando, ut fiat minera humorum laudabilium, debent etiam corrigere humores præparando ipsos euacuationi, aut ad benignum reducendo, ipsorum namq; malicia in quali aut in quanto multum impedit curationem ulcerum.

Secunda

Secunda intentio, scilicet, diuersio perficitur cum his quæ dicta sunt in præcedenti capitulo, ex diuertibus ad propinqua, imò fortè pro parte eradicantibus materiam malignā aurium est phlebotomia uenarum quæ sunt post aures.

Tertia intentio, scilicet, fluxus interceptio perficitur approximando repercussiuā & confortatiā circa aurem, oleum ros. rude, id est, factum ex oleo omphacino, & ros. syluestrib. albis, cui si opus est addatur acetum, et bolum armenum, aut terra sigillata, aut alia huiusmodi. Quarta intentio, scilicet, substantiæ corruptæ remotio perficitur instillando in aurē, unguentum ægyptiacum dissolutum cum pauco aceti aut uini, est enim mirabile. Et fortius isto ubi esset multum de substantia corrupta, & cum quadam sensu obrusione, & uiridis gris, aluminis, mellis, añ. dissoluantur cum pauco aceti. Aliud, & flor. aeris, tubel aeris, id est, squamæ aeris, añ. 3. 2. succi porri, mellis, añ. 3. 4. urinæ puræ, quantum sufficit, terantur usque dum fiant sicut mel, lichinium melle inunctum, deinde uitriolo subtilissimo puluerizato linitum, & in aure impositum optime ualeat ad remouendum carnem putridam & callosam, & ad squamadum os si ad ipsum peruenire possit. Non est tamen credendum quod ad ipsum perueniat propter tortuositatem foraminis. Et uiride es si militer applicitum esset conueniens, & fortius remouens carnes corruptas & callosas quas attingit. Sed si caro corrupta esset in profundo, aut os squamatione indigeret, esset melius huiusmodi in forma liquida instillando applicare, sicut dissoluendo alumen aut uitriolum, aut uiride aeris in aceto, & ex eo repido duas aut tres guttas instillare aut aliquem ex medicinis superscriptis. Sed esto memor nō frequentare ista acuta sufficiat escaram uerisimiliter factam ex horum impositione eo quod neque uirus, neque sanies egreditur secundum quod consuevit dimitte huiusmodi acuta, & si dolor est, infunde lac tepidum. Et si nō est dolor, quod comprehendes in eo quod egreditur aut quia fortè mundificando cum corto inuenies ipsam, aut partem eius in extramitate corti, postea procede ad quintam intentionem, scilicet, ad mundificationem, aut si forte cum lacte aut hydromelle iam dicto sit facta mundificatio procede ad sextam, scilicet, partis deperditæ approximationem, secundo attende in horum acutorum mine dissolutio cum aceto aut oxymelle, deinde hoc non sufficiente, administres unguentum ægyptiacum, Auicenna tamen ponit curam quorundam medicorum qui obturant foramen auris optime, ut sanies nō possit exire, & faciunt eum dormire supra contrariā partem ut sanies recta descendat ad carnem glandosam, quæ est in profundo auris, ut ibidem retenta tumescat locus ille quem tumefactum scindunt, deinde curant mundificando cum his quæ necessaria sunt. Non confer putrefacere neruum audituum & durā matrem. Sed si natura materiam ad illas, scilicet, partes, glādo fas quæ sunt sub aure deriuauerit, & ille locus intumuerit materia suppurata, & etiam ante perfectā maturationem incide, & cura deinceps illud ulcus secundum

dū quod oportet, quia facilius, postea ulcus auris con solidabitur. Postea est necessaria tibi quinta intentio, scilicet, mundificatio, uel propter remotionem escaræ: non enim in his casibus est remouenda escara cum putrefactiuis, uel si remota escara non appareat locus mundificatus propter multitudinem eius quod egreditur aut ipsius malitiā, hæc perficienda est cum hydromelle, aut uino bullito cum melle, aut oxymelle simplici, aut scyllitico si sanies fuerit crassior & uiscosior, quæ possunt immitti per siringam, aut cum catathir si uolumus ut cum fortitudine impellatur ad profundum, si enim melius lauat. Postea procedatur ad sextam intentionem, scilicet, partis deperditæ restaurationem, & tandem ad cicatrizationem quæ perficienda est cum his quæ sunt mediocri exiccationis sine multa mordicatione, sicut olibanum aut cortex eius dissolutus cum uino, aut sarcocolla & olibanum soluta in uino & melle pauco, & est expertum. Similiter myrrha & aloë dissoluta in uino, & sandaraca in hoc est mirabilis, & propriè trita cum uino & melle, & instillata, & immissa cum lichinio. Ex consolidantibus autem siue cicatrizantibus est licium cum sief memithæ. Similiter sang. drach. sief memithæ, sarcocolla, myrrhæ, aloës, spumæ maris, corticis olibanis, aluminis usti, añ. 3. 1. terantur contritione ultima cum melle & uino, usque dum fiat in termino mellis fluentis & distilla & utere cum lichinio, mundificat, cicatrizat, & substantiam deperditam restaurat. Et adhuc intentionem est medicamen Rasis positum in litera, & superius declaratum, Ioan. Serapionis modus confectionis scorice ferri, cuius iuuamentum est sublime ad exiccandum & consolidandum. Accipe scoriam ferri, laua eam cum aceto forti, postquam triueris eam uehementer, deinde siccetur super latere calido, postea iterum tere, & laua cum aceto & exicca, & fiat hoc sepius donec fiat pulvis subtilis, decoquatur postea cum aceto decoctione uehementi usque dum habet mellis spissitudinem, & distilletur ex eo in aure, aut intromittatur cum lichinio. Et si uolueris hoc medicamentum esse magis abstersiuum adde modicum mellis. Septima autem intentio, scilicet, accidentium correctio est, ut corrigatur dolor & surditas, & alia secundum quod dictum fuit, & dicitur in capit. sequentibus. Octaua intentio, scilicet regimen uitæ est, ut acie declinet ad sic. cum temperamento actiuarum. Et cibus & potus similiter minuantur, & propriè dum timemus fluxum humorum ad locum, & dum intendimus minorationem & mundificationem ulceris iuxta tertiam, & quartā & quintam intentionem. Cum autem uolumus iuxta sextam intentionem partem deperditam restaurare cibo abundantiore utatur, et semper sit boni chimi, facilis digestionis, paucarum superfluitatum, declinans ad siccum non uaporatiuus, dormiat super aure contraria immediate cum imposita sunt medicamina, deinde transactis duabus aut tribus horis dormiat super aure ægra, procuret omnes euacuationes naturales & propriè mundificationes capitis per os & nares quiescat corpore & animo. Si uero ulcus non sit putridum aut corrosiuum, neque fistula, neque cum osse aut alia substantia corrupta, sed sit uiulentum aut sordidum solum exiguntur septem ex intentionibus superscriptis, non enim requiritur quarta quæ est substantiæ corruptæ remotio: Illæ autem intentiones

perficiuntur super hoc attendendo, scilicet, quod uirulentū indiget multa exiccatione, pauca absterfione. Econtrario sordidum multa absterfione, & non tanta exiccatione sicut oxymelle, scyllitico, & similibus.

DE SONITU ET TIN-
NITU. Cap. XXXVII.

Circa rubricam est sciendum quod reperiuntur isti termini apud autores sonitus, tonitus, tinnitus, & sibilum, qui aliquando significant sonos, aliquando corruptionem auditus. Sed secundo modo hic accipitur sonitus siue tinnitus: de sonitu enim primo modo sumpto qui diffinitus est qualitas, de tertia specie qualitatis per se primo perceptilis ab auditu causata in aëre, scilicet, moto à duobus corporibus duris & planis, aut ab aliquo eorum uicem gerente, ordinata ad secundum aliquid, non est hic sermo. Sonitus autem est terminus communis ad alios tres importans quacumque huiusmodi dispositionem corruptam auditus. Tonitus significat corruptionem auditus qua apprehenditur sonus grauis & fortis. Per sibilum autem corrupte apprehenditur sonus acutus. Sed per tinnitum sonus medius inter hos sicut sonus pluiarum & foliorum arborum, & huiusmodi. Est autem hæc dispositio dicta uocabulo generali sonitus, descriptiue, auditus corruptio in qua apparet homini audire sonum aliquem ex motu facto in aëre exteriori, qui est interior in miringa auditus, sicut enim motus & inundatio in aëre exteriori, scilicet, cum speciebus soni representat sonum qui est & apparet exteriori. Sic etiam motus & inundatio in aëre interiori representat sonum, qui apparet exteriori propter consuetudinem percipiendi illos sonos qui sunt exteriori & apud Auic. eius comparatio ad auditum est sicut comparatio imaginationis ad uisum. Sicut enim ex uapore aut alia re non per uia coram crystallino apparet homini, quod uideat aliquid obiectum exteriori. Ita ex inundatione aeris interioris propter uapores effusos ad aurem, apparet homini, quod audiat aliquem sonum exteriori qui non est. Ex quo inferitur, quod hæc dispositio dum est præter naturam, est accedens alicuius morbi, licet etiam possit dici morbus cum immediate impediat operationem sensus communis siue imaginationis. Est autem hæc operatio corrupta duplex. Vna scilicet, non comparata ad nocumentum quæ prouenit ex bonitate auditus in aure etiam temperata, sicut quando apprehenditur sonitus uaporis subtilis, à quo auris nunquam denudatur quantumcunque sana, ac si sonus ille esset exteriori: hæc enim est actio corrupta cum apprehendit sonum esse exteriori, qui non est, non autem est corrupte læsa, cum illic nulla sit læsio in aliqua materia auris neque in spiritibus, neque per essentiam, neque per communitatem. Est autem alia actio corrupta auditus, quæ etiam est corrupte læsa, quia est cum nocumento auris de qua est sermo in præsentiarum. Comprehensio autem sonitus minimi existentis in aëre, à quo aer quantumcunque quietus non denudatur quæ fit ab aure optimi auditus, & non ab aure obruti auditus non est operatio corrupta neque corrupte læsa. Licet hæc actio in aure debili, acuti auditus sit diminuta per intentionem, & si senserit uaporem minimum facientem opinari sonum esse exteriori, erit non solum per intentionem læsa, sed etiam

corrupte læsa, loquamur autem hæc de actione corrupte læsa, hæc enim curatione indiget, &c.

Causa huius est duplex. Vna sumpta ex parte auditus uirtutis. Altera ex parte obiecti & causarum mouentium. Et per uirtutem audituam intelligo potentiam animæ cum instrumentis suis. Auditus ergo aliquando est nimis acutus propter malam dispositionem organi, & reliquorum instrumentorum, ut sentiat quemcunque minimum sonum ut uaporis existentis in aure, aut minimum sonum existentem in medio exteriori per quem homo turbatur, & à melioribus operationibus impeditur. Et hoc prouenit aut ex dispositione foraminis, sicut quando foramen auris est nimis largum, aut non debite tortuosum, quapropter inundatio sonora non debite modificatur, aut est miringæ auditus cum est nimis tenuis, & aer stans nimis subtilis. Cum enim ad sonum percipiendum sit necessarius motus & aeris inundatio, si causa soni sit exteriori uterque aer interior & exterior mouetur. Si uero causa soni sit interiori, tantum aer intrinsecus mouetur. Requiritur enim ad quemcunque sonum percipiendum medium intrinsecum motus ipsius aeris medijs intrinseci, qui aer si fit tenuis et subtilis à quocunque minimo uapore mouetur, cuius motus & inundatio perueniens ad neruum audituum, est causa perceptionis motus siue soni. Aut tertio, quia neruus audituus est texturæ nimis tenuis & naturali hum. siue conuenienti priuatus, quare factus debilis patitur à qualibet inundatione aeris extrinseci et minima: primum autem, scilicet, latitudo foraminis & non debita tortuositas est à generatione cui non est cura, secundum & tertio potest esse à generatione, & etiam ex tempore sicut frequenter accidit consuescentibus, & his qui nimis abstinent, humido resoluti et aere intrinseci subtiliari. Quapropter deficit humiditas naturalis sensum aliquantulum obtundens. Et textura facta est rarior debito, quapropter facilius patitur, & aer intrinsecus subtilitatus ex omni causa mouetur. Aliquando prouenit ex spiritibus nimis subtilibus, & ex complexione in corpore illo nimis ad sicum declinante, quapropter neruus audituus factus debilis patitur à quocunque minima inundatione aeris intrinseci, sed sicut patitur debilis calorem & frigus à quacunque minima causa calfaciente & infrigidante, sic aer intrinsecus à quocunque minimo uapore mouetur. Et foramine auris existente lato aut non debite tortuoso omnis minima inundatio aeris extrinseci communicatur aeri intrinseci, qui aer extrinsecus contiguatur pelliculæ continenti aerem intrinsecum contiguum neruo auditui. Et tale aer interior apud Auicem, est uapor effusus in cœcauitate illa. Sed ex causis contrariis fit auditus obrutus, ex parte autem obiecti & causarum mouentium. Causæ huiusmodi corruptionis auditus sunt uetustas & uapores crassi aut multi, qui propter suam crassitatem aut multitudinem non solum mouerent aerem infraeam subtilem, sed etiam crassum. Hæc autem uetustas et uapores quandoque sunt in aure ex humore, scilicet, ibidem existente in hos uapores & uetustitatem relictam. Quandoque ex apostemate, quod in aure suppuratur multis uaporibus, à materia dum suppuratur resolutis mouentibus aerem connaturalem, & consequenter neruum audituum. Quandoque uero hi uapores sunt aut ri aliunde comunicati, aut forte etiam humores, quæ communicatio

communicatio quandoque est à toto, sicut in febribus, & propriè in principio paroxysmorum uaporibus interius retentis, et non exhalantibus, etià sicut in chrisi, & propriè per uomitum à materia agitata, uapores scilicet, resoluti perueniunt ad aures. Et sicut in uehementi fame calore conuerso circa humidum, & eas in uapores conuertite, & sicut aliquando retentis fluxibus, consuetis, uapores, & materia ad cerebrum et aures deriuantur, & sunt causa sonitus auris & surditatis, sicut contra, fluxus uentris aliquando liberat à surditate, iuxta aphorismum 57. quartæ particulæ. Quibuscumque aures surdesunt in febribus, his solutio superueniens, aut sanguis de naribus fluens, aut uenter turbatus soluit ægritudinem. Quandoque uero his uapores & etià humores ad aures delati sunt per communiatem à membro particulari, et maximè à cerebro. Materia enim superflua et uapores in cerebro congesti, aut aliunde ad cerebrum deriuati faciliè auribus communicant, & propriè per quintum par neruorum cerebri aut per uenas et arterias à cerebro ad aures ueniens. Aliquando communicatio fit à stomacho, aliquando à matrice, & sic de cæteris membris, &c. Causæ autem primitiue sunt sicut aer frigidus retinens uapores, aut aliquæ medicinæ quatuor proprietates est, ut retineantur uapores & uentositates in partibus cerebri. Et sicut uentus aurè ingrediens. Similiter cibi & potus uaporosi & propriè perflus, & propriè meridianus aures & caput replendo & maximè post crapulas, & similiter retentio euacuationum consuetarum, & maximè per os & nares, & exercitium forte conuertens humidum in multos uapores, qui ad cerebrum & aures deferuntur. Et inter accidentia animi ira potest esse causa huius corruptionis auditus. Similiter causæ primitiue extraneæ, sicut casus, percussio & offensio adueniens auri & capiti mouendo spiritus & uapores fortiter & inordinatè, licet sint magis causa uertiginis.

Signa sonitus cognoscit ex relatu egri. Et si sit propter fortitudinem auditus cognoscit per carentiam omnium causarum præternaturalium, & ex perfectione operationis audituæ. Et quia non legitur à mediocribus sonis, imò non nisi à fortibus & excellentibus. Si uero sit ex acuitate auditus absque fortitudine, cognoscit per carentiam uentositatis absque fortitudine, repletionis, & legitur à mediocribus sonis, sed excellentes tollere non potest. Et si est ex latitudine foraminis aut paucitate tortuositatis illud sensui subiacet aspiciendo in aurem: Et est à generatione contracta. Et si est à terribilitate miringæ, subtilitate aeris stantis & spirituum, ra scit, quia deterius se habet ex uigilijs, exercitio et abstinentia, & contrarijs dispositionibus, melius se habet. Et si hæc causæ fuerint à generatione semper sic se habebunt. Et secundum plurimum eius complexio declinat ad siccū: et si sunt ex tempore hoc nocumentum sibi euenit post præcessionem alicuius dispositionis ægritudinalis in qua fortispositio uerisimiliter subtilitatis & exiccatis. Signa obiecto & causis imprimantibus sunt signa multitudinis uaporum, uentositatum & repletionis, & abundantia causarum acuitatis auditus, de quibus sermo præcessit. Sed quod sit per essentiam in aure aut in ce-

rebro cognoscit, quia sonitus est ferè continuus, per communiatem uero, quia est interpolatus, & excreuit cum cumento dispositionum à quibus pedit, & decreuit cum earum decremento, & si ex uentositate existente in aure sonitus est clarior, estque auris sine grauitate. Si uero in aure sit presentia humoris, qui continuò in uentositatè resoluatur est grauitas in aure & diminutio auditus, & fortasse sonus non ita est clarus. Si uero sit ex apostemate quod suppuratur in aure, ad sunt signa apostematis, & maturationis eius, & sonitus est magis confusus, & si sit cum communiatem cerebri, ad sunt nocumenta cerebri, scilicet, dolor aut grauitas & nocumentum pluribus sensibus communicatur secundum plurimum. Vtrum autem sit per communiatem à toto, aut à membro particulari, & quod sit membrum communicans cognoscitur per nocumentum totius, aut illius membri per cuius nocumentum uel nocumenti augmentum augetur sonitus, & per cuius decrementum decreuit. Cognoscitur autem utrum uentositas sit in aure aut cerebro, uel communicate ab inferioribus, per formam & modum ipsius uentositatis. Si enim appareat sonitus ascendens, tunc generatur in inferioribus & ad superiora eleuatur. Si uero apparet sonus circumuolutus & quasi reflexus in seipso, tunc sit in aure & cerebro. Sibilus autem significat uentositatè paucam cum impetu motam. Tonitus autem uentositatem multam & crassam cum impetu motam. Tinnitus autem qui inter hos medius est dispositione siue causam mediam signat. Causæ autem priuatiue ex earum præcessionem cognoscuntur &c.

Prognostici. Corruptio auditus natia secundum plurimum non est corrigibilis. Chronica & antiqua difficulter corrigitur. Recens autem secundum plurimum faciliè corrigitur. Pro declaratione dictorum querenda sunt aliqua. Primum. Nunquid sicut auditus læditur per intensionem. Ita est uisus & quæcumque alia operatio animalis possit lædi per intensionem. Ad quod dicitur quod stante fortitudine uirtutis nulla istarum potest lædi per intensionem. Sed cum debilitate uirtutis bene possunt lædi per intensionem, ut supra declaratum fuit de auditu. Debilitas autem & fortitudo uirtutis ex resistentia parua uel multa excellentibus, sensibilibus, arguitur, secus autem in appetitiua & similibus, possunt enim lædi per intensionem etià cum fortitudine ipsarum, potest enim appetitiua magis appetere quam uirtuti digestiue cōueniat aut nutritiue, in quas ordinatur, sed non potest uisui nec auditui melius aut acutius uidere aut audire quam cōueniat sensui cōmuni aut cogitatiue aut intellectui in quas ordinatur. Secundum dubium utrum aer connaturalis intrinsecus permute uel semper sic permaneat in corpore naturaliter disposito. Ad quod dicendum quod aer ille connaturalis non est de genere aeris extrinseci, sed est uapor qui propter finem à natura ibidem genitus est, & resolutionem recipit & restorationem sicut & spiritus. Tertium dubium, nunquid ad percipiendum sonum præter motum aeris extrinseci & intrinseci requirantur species representatiue soni sicut ad uidendum requiruntur species coloris. Ad quod dicendum, quod præter motum duplicis aeris iam dicti requiruntur etiam species soni, aliter non uideretur cur magis ex motu aeris deberet reputari sonus acutus quam grauis, nec distinguerentur uarij concentus & harmoniæ quæ sentiuntur

ta, scilicet stupefacientia & humectantia & in crassantia absque stupore melius est à non stupefacientibus inchoare sicut est nutrimentum humidum, crassum & viscosum, & instillatio olei uioli. aut de sem. lactucae.

Quibus non sufficientibus. procedat ad stupefacientia inchoando à leuioribus. sicut est oleum de kengi, & est species hyoscyami permixtum cum oleo rosaceo. Et his non sufficientibus. ponatur parum opij, scilicet à duobus granis usque ad quinque cum una 3. olei ros. aut olei de amygdalis amaris, quæ prius conuassata sint cum aceto, & bulliant donec sit resolutum. Si uero sonitus pendeat à causis primitiuis, sicut percussione, uento, ebrietate, & cæteris quorum præcessit rememoratio, cura est remouere causas primitiuis & nocumenta earum cum contrariis super aures & cerebrum confortando. Si uero sit per communitatem à toto sicut in febribus, & crisi intentio est cura febris & perfectio crisis ad quam perficiendam si natura sufficeret bene est, si uero non sufficeret adiuuere. Melsei uero auctoritate filij Zacharie appropriat in debilitate auditus sequere feb. oleum decoctionis absinthij cum oleo ros. instillatum in aures. Si uero sit per communitatem ab aliquo membro particulari sicut frequenter à stomacho, corrigatur uocumetum membri illius euacuando, diuertendo, eius complexionem permutando si lapsa fuerit, & ipsum confortando, et cum hoc intendatur confortationi cerebri cum oleo de myrto, & confortationi auris cum oleo de amygdalis amaris. Si uero sonitus sit per essentiam in aure sicut ab apost. quod maras curet cura apost. de qua supra. Si uero pendeat à uentositate & uaporibus, crassus, humore crasso, repletionem capitis, aut etiam totius, intentionis sunt quinque.

Prima est euacuatio integrata ex minoratiõe, digestionem, eradicationem etiam iteratis si expedierit, & quæ sint digerentia & euacuantia, ex suprascriptis parere potest. Secunda est diuersio, complenda cum clysteribus, & tandem cauterijs in commissura coronali si expediret. Tertia est causæ coniunctæ resolutio, aures & cerebrum confortando & eius discrasiam corrigendo. Sed in huiusmodi intentionis executione duo canones obseruentur. Primus ut ante huiusmodi intentionis executionem duæ primæ intentiones sint absolute sufficienter, imò exquisitè, nã localia & propriè instillata & maxime caliditatis excellentis ante suprascriptarum duarum intentionum complementum magis obfunt quæ inuent nisi forte materia existente paucissima. Secundus ut à leuioribus inchoetur & gradatim ad fortiora procedat, et ante ab exterius applicitis, quæ ab his quæ in aure ponuntur, & ante ab his quæ sub forma solida in aure applicantur quæ ab his quæ instillantur. Ex his ergo quæ ad hanc complendam intentionem applicantur sunt faculi, fomenta, suffumigia, item ea quæ in aure sub forma solida applicantur & instillata, ex faculis est qui fit ex milio & sale torrefactis & aliquantulis uino potente aspersis, auri & partibus circumstantiatis, ex fomentis præstantissimum est quod ponitur à Rasi in rextu, chamaemila enim, melilotum, famiganum, ftecas arabicum, mentastrum singulariter & cunctum sunt propria in huiusmodi dispositione, spongia siue filtrum in aqua decoctionis horum infusum & calidum auri & partibus circumstantibus ap-

plicitum & sæpe iteratum optime ualeat.

Ex his etiam cum emboto & sine potest fieri suffumigium. Et post horum applicationem & etiam ante potest poni in aure parum muscati cotto inuolutum, & efficacius est si secum aliquid castorei admisceatur, retha quoque ex radice raphani, ex musato aut castoreo aspersa & inuoluta auri imposita est conueniens. Ex his autem quæ instillantur est castoreum cum oleo ros. aut de amygdalis amaris dissolutum, aut cum oleo rutaceo aut de spica, succus etiam porri cum oleo ros. & lacte muliebri permixtum in causa minus frigid. & his addatur castoreum si oportuerit. Vltimum et fortissimum ex inuentione Mesue coferens sonitui auris & grauitati auditus propter crassam uentositatem, & materiam frigidam & crassam. gr. ellebori albi, castorei, costi ana. 3. i. rutæ, nitri piperis longi ana 3. i. partes 2. euphorbij. 3. i. tertiã. Deinde. Recipe succi radicis quæ comeditur, succi porri, olei nardini, chamomælini, anethini, de amygdalis amaris ana 3. i. coquantur ad succorum consumptionem, cola et utere, expertum est. Corrigan autem accidentia iuxta quartam intentionem secundum quod oportet. Regimen autem iuxta quintam intentionem declinet ad liccum, & secundum plurimum ad calidum.

Caveat à uento & pluuijs, neque stet sub radijs lunæ aut solis nisi forte in declinatione aut paucissima existente materia. Statio & ambulatio sub sole concedi potest ad resolutionem residui superfluitatum. Teneat caput satis calidum, & totum corpus præcipue auris læsa aliquo operimento tegat. Et in orificio auris aliquid coti muscati teneatur obturans ipsum, sed non inferens dolorem. Viter ebrietatem & satietatem nausearum, caueat ab euaporantibus, & à uino, nisi forte in declinatione. Caveat à somno meridiano, & à somno supra repletionem, & dormiat secundum plurimum super latere contrario auris læsæ. Procuret omnes euacuationes naturales. Caveat à uomitu, non enim conuenit nisi opus esset stomachum euacuare à superfluitatibus facientibus & fouentibus hanc dispositionem. Inter cætera procuret uentris lenitionem.

Exercitium non conuenit in principio sed in declinatione. Viter accidentia animi molesta, sicut iram, & quæ præcipitant materias ad caput &c.

DE GRAUEDINE, DIMINVTIONE SIVE ablatione auditus. Cap. XXXIX.

Circa rubricam sciendum quod apud autores reperiuntur isti termini. grauedo auditus, defectus auditus, siue tarax siue tarsen et guarè. Grauedo auditus propriè accepta est diminutio auditus. Sed defectus auditus dicit tam diminutionem quam ablationem. Surditas autem dicit ablationem auditus consequentem defectum foraminis auditus, siue illud sit creatum solidum à natiuitate, siue illa surditas & soliditas acquisita sit ex tẽpore. In tarax autem siue tarsen & guarè inuenio autores uarios. Sed dicamus nos quod guarè est ablatio auditus ex defectu nerui auditui, sed tarsen siue tarax est diminutio auditus et sic conuertitur cum grauedine auditus. De terminis non est hic faciendum, aliquando enim unus istorum accipitur pro altero. Sed ut generalizemus magis capitulum dicamus, quod intentio Rasis est hic determinare de grauedine auditus largo modo sumpta siue de defectu

Et qui diffinitiuè est diminutio auditus uel ablatio. De corruptione enim auditus & lésione ipsius per intentionem actum est in præcedenti capitulo.

Grauedo autem auditus, quædam est à generatione contracta, quædam ex tempore, & quædam antiqua, quædam noua (noua autem intelligo, infra duos annos).

Causæ: quædam sunt per communitatem, quædam per essentia. Per communitatem quidem aut à toto sicut in febribus in quibus uapores ad aures deferuntur, & quandoque materia criticè ad aurem permutatur, aut à membro particulari sicut à cerebro, cui materia scilicet uapores & uentositates facillè permutatur ad aurem, & propter uiciniam, & quia sunt tanquàm emporium cerebri aut à membro uicino, sicut in dentibus, cum oriuntur aut cum dolent, & quædam à membro longinquo sicut à stomacho & ceteris. Et communitas totius & horum membrorum aliquando est sine crisi aliquando cum crisi. Et cum sit crisis, aliquando materia criticè permutatur ad aurem et sit grauedo auditus difficilis diu remanens post crism. Aliquando fit crisis absque hoc quod materia permutetur ad aures, sed solum materia agitata per quemcunque locum fluat multi uapores eleuati ad aures grauant auditum. Hæc autem grauedo facillè recedit crisi completa. Aliquando succedit grauedo auditus ad retentionem fluxuum uentris sicut eccontrario fellæ egestionis superuenientes soluiunt surditatem 4. aphor. consimiliter potest esse in retentione quarumcunque euacuationum consuetarum. Causæ autem per essentiam aut sumuntur à foramine cum oppilat aut à causa extrinseca sicut à faba, uermine, lapillo, aqua, & huiusmodi, aut à causa intrinseca sicut ab apostemate, cerumine aurium, & ab alio humore, & à uerruca & carne orta, aut à principio generationis, aut ex tempore quibus sit oppilatio, aut integra, aut diminuta, aut sunt in neruo aut propter malam complexionem cuiuscunque generis, & maxime frig. sine materia, & cum materia cuiuscunque generis, aut propter malam compositionem sicut est oppilatio ex tempore, aut à generatione contracta, quapropter spiritus audituus non potest ad aures peruenire. Et forte non est neruus in foramine ossis petrosi. Et si est forte creatus est absque foramine. Et hoc frequenter est causa ablationis auditus à natiuitate. Et quandoque læditur neruus à solutione continui, aut noua aut antiqua. Et quandoque propter apost. in ipso neruo de quo sermo præcessit. Defectus etiam spirituum scilicet cum sunt crassi & pauci est causa grauedinis auditus, & similiter paucitas spirituum, & corporis exiccatio & cōsumptio. Signa: grauedo auditus per communitatem cognoscitur ex præcessionem alicuius ægritudinis aut dispositionis rotius aut partis, cum cuius augmento augetur grauedo auditus, diminutione minuitur, quod ante illam dispositionem auditus erat incolumis, & communitas cerebri cognoscitur, quia secundum plurimum non solum læditur auditus, imo multi sensus, & quandoque uirtus motiua, cognoscitur autem quod sit cum crisi, quia ægritudo præcedens terminatur aut minuitur. Et si materia terminatur ad aures sit grauedo auditus difficilis remanens post crism. Si uero materia ad aliud membrum permutetur aut expellatur finita crisi remouetur grauedo auditus. Cognoscitur autem quod sit per essentiam, quia nulla adest dispositio totius aut alterius me-

bri uerisimiliter factiua huius grauedinis, & si adit oppilatio in foramine cognoscitur aspiciendo in aure sub radijs solis. Et cognoscitur etiã causa oppilans. Cognoscimus autem causam esse in neruo audituus ex carentia cuiuscunque alterius dispositionis uerisimiliter facientis grauedinem auditus, & secundum plurimum est cum dolore. Sed mala complexio, solutio continui, apostemata, uentositates cognoscitur per signa propria dicta in capite de dolore auris, & capite de ulceribus aurium. Et si adit oppilatio in neruo, cognoscitur ex carentia omnium aliarum dispositionum, & quia fortè præcessit plenitudo capitis, apostema, aut alia causa uerisimiliter oppilans, & quia sentitur grauitas & propriè cum se prosternit in oratione. Et si est surditas à natiuitate cum bonitate foraminis auris cognoscitur illud esse, aut quia deficit neruus in osse petroso, aut quia creatus est solidus absque foramine aut humiditas oppilans ipsum ingressa est.

Cognoscitur autem spiritus esse crassus, quia auditus est diminutus non ablatus, & ex carentia aliarum causarum.

Diminutio autem auditus consequens siccitatem & paucitatem spirituum cognoscitur ex præcessionem causarum corporis exiccationem, cum tornatilitate faciei. Causæ autem primitiue seipsas ostendunt, & notamenta ab illis derelicta sibi proportionalia &c.

Prognosticum. Surditas à natiuitate non est curabilis, antiqua supra duos annos difficillimè curatur, noua aliquando facillè, aliquando difficulter secundum causæ fixationem &c. Dubitatur. Vtrum plures sint muti quàm surdi. Ad quod dicitur quod à natiuitate plures sunt muti quàm surdi. nam omnes surdi sunt muti, eo quod ipsis non audientibus non possunt discere formationem literarum & syllabarum nec dictionum. Multi autem sunt muti à natiuitate propter defectum in neruis mouentibus linguam qui ueniunt à septimo pari neruorum cerebri, qui tamen non sunt surdi, nullo existente defectu in quinto pari neruorum cerebri & in ceteris organis & instrumentis quæ deseruiunt auditui.

Sed eccontrario ex tempore plures sunt surdi quàm muti, uidemus enim ex decursu ætatiuo & etiam ex causis ægris occurrentibus plurimum lædi uisum & auditum, non autem linguam, neque quantum ad gustum neque quantum ad motum, de ipsa enim natura & nerui sollicita sunt, & ordinati, ut multæ arteriæ & nerui multum crassi à pluribus partibus cerebri ueniant ad linguam, scilicet à tertio & 4. pari ad dandum gustum & à 7. pari ad dandum motum, sed ad aurem pauci nerui, pauca arteriæ, & uenæ ueniunt, & multum subtiles ordinatæ ad ipsius nutritionem, & cum auris sit membrum paruum & exangue, uenæ autem debuerunt esse parua per quarum extremitates purgatur naturaliter humor cholericus in aure repletus qui est cerumen aurium ordinatum sua exiccatione et calefactione ad auditus conseruationem. Lingua autem est membrum magnū, & carnosum, multo indiget nutrimento propterea uenæ eius magnæ fuerunt, & quia multos habuit musculos propter plurimos motus eius, multi ad ipsum ueniunt nerui, natura enim fuit multū sollicita de lingua & propter gustum sine quo non contingit animal diu uiuere, & propter motum lingue cum deseruiat masticationi, et etiam lingua est magis

magis posita in loco tuto, oculi autē & aures magis extrinsecus occurrentibus, propterea facilius læduntur quā lingua, quare ex tēpore plures sūt surdi quā muti.

Cum in auditu contingit grauitas, considerandam est, an sit ibi sordities quæ uocatur cera quæ sit in aure, quæ si inueterauerit mundetur, aut cum medicinis secundum quod prædiximus, aut cum cura manus. Si autem sordes non affuerit, & uenerit hoc post satietatem fastidiosam, quæ eam præcessit, aut ægritudinem acutam, auris pōnda est super uaporem aquæ, in qua ea quæ prædiximus cocta fuerint traiectorio interposito quousque uapor ascēdat, quod hoc modo fieri conuenit. Res istæ in curcuma habente os acutū coquantur, deinde traiectoriū ori circumæ superponatur, & ne uapor egredi possit, pannis inuoluatur & auris super os traiectorij ponatur. Et istud si est in aurē mittatur, quod. Rec, colocyne. drach. i. baurach tertiam drach. i. castorei, aristolochiæ rot. suc. absinthij, omnium ana drach. s. costi quartam drach. i. euphorbij. s. drach. unius, fellis uaccini quantum sufficit ad prædicta conficienda, fiant ex eis sies. Cumque necesse fuerit. i. in oleū de amygd. amaris auri resolutum immittatur, hoc ualde utile existit dolori pbleg, & uenositati & sonitui, et tonitruui qui ex crassio humores. Si autē auditus debilitas post ieiunium uigilantē contingit, fueritque facies extenuata et oculi cōcaui, æger balneum sæpe ingrediatur, Et largiori cibo ac potu utatur. Et in somno fiat profundior. Super caput quoque aqua tepida cum oleo fundat donec sanetur. Quod si post phrenesim contingat ex medicinis primis curetur.

Diuiditur præfens cap. in partes quatuor. In prima enim ponit curam grauedinis auditus pendens a cerumine aurium. In secunda ibi. Si autē sordes non affuerit. Ponit curam eius quæ pender ab humiditate in organo auditus infusa siue inuisata quæ secundum

plurimum frigida est. In tertia parte ibi. Si autē debilitas. Ponit eius quæ fit ex inanitione & consumptione corporis & paucitate spirituum audibilium. In quarta ibi. Quod si post phrenesim. Ponit curam eius quæ sequitur phrenesim aut alias capitis ægritudines. Depri- ma dicit, quod si proueniat ex sordities quæ uocatur cera in aure diu retenta & indurata, curada est cū medicinis & operatione manuali. In primis igitur ægro constituto cum aure sub radijs solaribus extendatur auris, ita ut foramen rectificetur, & cum instrumento argenteo communiter consueto auris ab illo cerumine purgetur cauendo, scilicet quātum est possibile ne organo auditus nocumentum inferatur, ideo fiat cū omni suauitate. Quod si cerumē multum profundū fuerit, & induratum & mollificetur & abstergetur primò aliquoties lauando aurem cum hydromelle calido, postea immittendo duas guttas aut tres olei amygdalarum amararum, deinde sequenti die fiant tēta ex cotto longo subtiles cum quibus auris in profundo sufficienter mundificetur, illas tentas circumducendo, ut melius cerumen adhaereat. De secunda parte dicit, quod si surditas sequatur satietatem fastidiosam, ex qua communiter multiplicantur humores frigidi aut suplere aliquam ægritudinem chronicam, aut aliquam ægritudinem acutā, & sint humores frigidi in aure retenti, tunc suffumiganda est auris cū emboto posito super orificio curcumæ habētis strictum orificium, cuius extremitas subtilis ad aurem perueniat, & in curcuma bullierint herbe superius posite in tinnitu & in sonitu, & suffumigium illud fiat stomacho ieiuno, primò per quartam partem horæ, deinde per amplius spaciū usque ad mediam, semel aut bis in die, quatuor aut quinque diebus continuis, deinde immediatē post hoc suffumigium, hoc sies distemperatum cum oleo amygdalarum amararum auri iniiciatur. ii. colocynthis. 3. unā, quæ est calida in tertio, sicca in primo, mundificans aurem, resoluens & incidens, & trahens materiā ex profundo auris, baurach, 3. i. pro hoc sale accipimus sal nitrū quod est siccum in tertio, exiccat & subtiliat, castorei calid. & sic in principio quarti gradus, aristolochiæ rotundæ calid. in tertio, sic, in secundo, quæ est subtiliatua & attractatiua ex profundo & appropriatē abstergit sordes auris confortans auditum, succi absinthij, calid. in primo, sic, in secundo, surditati appropriati, ana. 3. s. costi quarta tertie unius calid. in tertio sic, in secundo attrahit ex profundo, & confortat omnia neruosa, euphorbij calid. & sic. in quarto, sextam tertie unius, fellis uaccini calid. & sic, in quarto, quantum sufficit ad conficiendum sies.

In tertia parte dicit, quod si debilitas auditus contingit post ieiuniū & uigilias, fueritque facies extenuata & oculi concaui, sicut accidit his qui passi sunt longas ægritudines, æger sæpe balneum ingrediatur, scilicet, aquæ dulcis, & ampliori cibo utatur, totus, et precipue caput humectetur qualitatiue & substantiue.

In quarta parte dicit, quod si contingat post phrenesim curetur cum medicinis primis, per phrenesim intellige quodcunque apostema siue cal. siue frig. capitis, & magis ampliando quācunque ægritudinem materiam ipsius: si ergo quod auri communicat ex capite, fuerit cerumē aut similis materia cholericā, curet ipsam extrahendo secundū quod in prima parte cap-

dictum fuit. Si autem fuerit materia frig. infusa in organo auditus curetur, secundū quod dictum est in secunda parte cap. Si uero corpus sit consumptū, præter modum resolutum per has ægri tudines curetur cum humectantib. secundū quod dictum est in tertia parte cap. quæcūq; curetur, curabitur cū medicinis primis, id est, quæ dictæ sunt. Hic non oportet ordinare curā surditatis quæ pendet à cerumine aurium: nā satis est ex suprascriptis manifesta. Neq; curā eius quæ pendet ex siccitate, nā sibi unica debetur intentio, quæ est humectatio qualitatiua & substantifica, de qua sepe supra dictum est. Neq; oportet ponere curam eius quæ provenit ex carentia foraminis, aut ex carentia nervi auditui, aut nervus ipse creatus fuerit solidus, hæc enim nō recipiunt curam & est communiter surditas à generatiōe cōtracta, scilicet, ex defectu uirtutis informatiue. Neq; oportet ponere curā eius quæ fit in senib. ex decursu ætatis propter paucitatem & crassitatem spirituum, & exiccationem substantificā nervi auditui & multitudinē humiditatis superflue, quia non recipit curam. Neq; curā illius quæ provenit ab apostemate solutione continui & uapore siue uentositate: nam de his in capitulis præcedentibus sufficienter actum est. Neq; oportet ordinare curam eius quæ pēdet ab oppilatione propter uermes in aure, scilicet, existentes, aut alia corpuscula quæ aurē ingressa sunt, quia de his in duobus cap. sequentibus agetur.

Supereft ergo, ponamus curam surditatis quæ pēdet à mala complexione siue materia in organo auditus existente, siue sit ibi paulatim congesta aut alium de deriuata.

Cura ergo surditatis à mala complexione sine materia quinq; exigit intentiones, scilicet, alterationē perficiendam cum contrarijs, aut prohibitionem humorum à fluxu, correctionem accidentiū & regimen sex rerum non naturalium: Prima intentio si fuerit mala cōplexio calida perficitur iniiciendo aliquid olei rosari cum aceto bulliti ad acetū consumptionē, & si frigida fuerit calefaciēdo cum pannis calidis, & cum infusione olei de amigdalīs amaris, de spica, de balsamo, de costo, laurino, raphanino, de staphisagria, & similibus, & eisdem intentionibus perficiatur. Secūda intentio, scilicet, auris confortatio completur, & etiam tertia intentio, si huiusmodi sint aliquāliter stipitica, ubi si opus sit, fiant euacuationes & diuersiones secundum opportunitatem. Ex accidentibus, corrigendus est dolor, de quo in principio cap. Regimen autē sex rerum nō naturalium declinet in contrariū discrasie.

Si uero fuerit mala complexio cum materia aliunde transmissa sex exiguntur intentiones, scilicet, euacuatio, diuersio, regimen membri mittentis, materie cōiunctæeductio & resolutio, & cum hoc discrasie alteratio, accidentium correctio & debitum regimen. Euacuatio autē fiat in materia frigida, cum hieris & cochis, et agarico, in calida cum decoctione fructuum, pilulis assaieret, & pilulis aureis, & digestiua propria ex capitulo de soda perquiratur, et multotiens est necessarium iterare euacuationes, & propriē quando fit surditas ex retentione choleræ uel cuiuscūq; alterius humoris fluere consueti, cuius redudatio fit ad aures iuxta Hippocr. 4. Aphorismorum. Medicamen mirabile in soluendo humores crassos frigidos, optimē conferēs ad surditatem, & mirabile ad uerriginem &

epilepsiam, menstrua potenter educit. *℞.* salis ammo. piperis, añ. 3. 2. euphorbij, 3. unam, dabis ex eo quatuor aut quinq; grana cum ouo sorbili aut hydromelle, et melius est multiplicari numerum euacuationum & minore quantitate, ut uirtus conseruet & proueniat maturatio. Diuersio autē fiat cū gargarisimib. caput purgij per nares, & masticatorijs secundum quod in pluribus capitulis dictum est usque ad uesticantia & cauterium in commissura coronali, omnes euacuationes diu consuetæ prouocent si facta sit retentio. Regimen autē membri mittentis si aliquid sit in causa perficiatur euacuatio, discrasiam eius corrigendo & ipsum confortando, & de hoc sepe dictum est, plurimum enim in surditate cerebrum est in causa. Materie autem coniunctæeductio quæ secundum plurimum est frigida perficitur cum exercitio, & propriē per loca sicca, & arenosa, & stomacho ieiunio. Item cum uociferatione & clangorib. tubarum, & ceterorum instrumentorū musicalium, & cum balneatione in aquis thermarum et salis, imò aqua maris, si licet, instillata confert, & cum suffumigij & liquoribus in aures injectis, de quibus in litera, & etiam cum medicinis siccis in aures retentis. Sed pro hac intentione perficienda aliqui cān. obseruentur præter cān. generales ab initio positos. Primus, ut hæc imponenda ordinentur secundum exigentiam discrasie & humoris peccantis. Secundus, ut inchoetur à leuioribus, & gradatim procedatur ad fortiora. Tertius, ut primò tententur exterius applicita quā impoſita, ut prius sicca quæ non penetrent in profundum auris, postea humida. Quartus obseruetur an propter horum administrationem sequatur iuuamentum & continueatur, an sequatur nocumētum & omitantur: est enim difficile bene metiri huiusmodi medicinas quæ ponantur in auribus. Multotiens enim magis nocent quā cōferant. Ex conuenientibus ergo ad hoc in causa frigida est muscus corti inuolutus, & in aures retentus, item frustum raphani secundum foramen auris figuratum castoreo & musco aspersum, item suffumigij de quo dictum est, item oleum amigdalorum amararum, nardinum, costinum, oleum balsami. Euaporatorium bonum est, ut calefiat urceus in quo distillatur oleum oliuarum, & sit cum amurca sine oleo, & sumum recipiat per trajectorium, & succus, scilicet, ab sinthij cum sale est leuis & proprius, & urina capre habet in hoc proprietatem. Aliud leue & expertum. *℞.* gariophili, 3. s. & masticis, grana 2. sem. porri, grana 6. puluerizentur crasso modo, & bulliant in 3. s. olei de ruta, & repidum insillatur, & pulpæ colocythidis, & succo cucumeris afinini aut radici eius inest proprietas mirabilis cum aliquo distorum oleorum & ex eis est oleum nardinū cum castoreo & pulpā colocythidis partibus æqualibus confectis cum felle uaccino & expertus est puluis ellebori albi cum aceto distillatus in aurem, aut missus in aurem cum lichinio item ellebori albi, castorei, pirethri nigri, añ. coquantur in uino potēti cola, & distilla de oleo in auribus, & spoliū serpentis cum aceto, & uino confert cum proprietate sua, ut oleum decoctionis eius. In causa calida confert oleum ros. cum aceto bullitum ad acetū consumptionem. Item succus granati reducatur in cortice suo cum paucō aceto thure & oleo rosato, & decoquat donec aliquāliter inspisset, & in maiori caliditate

caliditate succus lactucæ & solatri cōfert, & ex uapori-
bus cōuenientib. est aqua calida sola, uel in qua bul-
liant res in frigidates ut folia uitis, salicum, &c. Cor-
rigatur autē dolor sicut supra dictum fuit in primo ca-
pite, & regimen ordinetur in contrarium discrasie, &
particulariter perquiratur ex capitulis præcedentib.
Surditas autē pendens ex nervo aut carne addita, raro
propter loci nobilitatem curam recipit: interdum ta-
men curetur cum administratione medicaminis acu-
ti una uice post aliam usque dum cōsumatur, sed esto
memor ut id paulatim fiat & in longitudine dierum.

DE VERMINIBVS AVRIVM ET PAR-
uis animalibus. Cap. XL.

Cum in aure fuerit titillatio, & pruritus, & dolor, et deinde ceciderint uermes ab aure, immittatur auri succus mē-
tastri, aut foliorum persicorum, aut oleum
de nucleis ipsorum, aut aloes in aqua dissol-
uatur & mittatur, hæc enim uermes auris
& parua animalia ingrediētia ipsam quā-
do erunt in aure & in ulceribus nascuntur
interficiunt.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. In prima
ponit signa uermium & huiusmodi animalium in aure
existitum. In secunda ibi. Immittatur. Ponit curam
de ambabus partibus simul. De prima dicit quādo in
aure sentitur titillatio quædam, id est, motus quidam
agitatio parua &c., adest pruritus quæ est una de
decem & quinque speciebus doloris. secunda prim. &
dolor, scilicet, alius qui secundum plurimum est pun-
gitius, & aliquando maximus & ipsa mollis cū per-
uenit ad nervum auditivum, & etiam cum maxima
uermis ab aure egreditur, hæc manifesta sunt signa ibi
adest uermes, uel similia animalia parua sicut puli-
ces, cimices, sanguisugæ parue, & similia. Vermes au-
tem ibi nascuntur ex sanie, aut ex alia humiditate ibi-
ficat & alia animalia illis similia, & hi uermes quādo
sensibiliter lædūt operationes sunt morbus in nume-
ro sicut & uermes in intestinis. In secunda parte dicit,
& ponit curam complendam quinque intentionibus.
Prima uermes educit. Secunda si uermes educi nō pos-
sunt ipsos interficit. tertia interfectos educit & aures
mundificat. quarta corrigit accidētia, quinta ordinat
regimen. Prima intentio completur situata aure egra
sub radijs solis immittendo in orificio auris cottū in-
sternperatis in lacte, aut in melle, aut in penidijs cū lacte di-
dulcia enim & pingua mouetur uermis. Et post hoc
sternutationem commouere ore clauso & naribus ut
impetus & commotio magna fiat ad partes auris, cū
quo excutiantur uermes exterius. Si uero fuerit san-
guisuga quod fortē cognoscetur aspiciendo aurē sub
radijs solis, tunc sanguis columbæ in orificio auris im-
ponatur, & si non separaretur, quia fortē iam adhæsit a-
licui parti dissilietur in aurem aqua salita aut lichiniū

& immediatē separabit, & tunc cū motu sternutatio-
nis aut tussis facilius poterit educi. Secunda intentio est
uermes interficere, quam intentionem complet Rasis
cum succo mentastri calidi & sicci in secundo, multū
proprio ad interficiendum uermes, similiter cum suc-
co de folijs persicorum similis complexionis & uirtu-
tis etiam eos interficiens sua amaritudine, similiter cū
oleo de nucleis ipsorum, aut aloē cū aqua dissoluto,
distillando ex his duas aut tres guttas in aurē, & hæc
cum hoc quod uermes interficiūt etiam aures a sanie
& humiditatibus extraneis mundificant, & nō sinūt
in ea fieri putrefactionem. Et breuiter omnia amara
acuta, acetosa, sunt in hoc præstantia, & cum hoc si ha-
beant singularem proprietatem contra uermes, ma-
gis conueniunt sicut absinthium, alpharasion, id est,
radix mori secundū aliquos, sed credo quod sit praf-
sum uel centaurea, & fortius his est calamethū. Hæc
enim aut aliquod eorum si bulliant in uino aut aceto,
sunt ultima, succus tamen ipsorum est potētiior, necat
enim uermes & dolorem sedat, & similiter succus cap-
paris, succus radices mori, succus cucumeris agrestis
cum radice eius, & succus lupinorum amarorum, &
ex bonis miscibilibus cum eis sunt fella aut euphorbi-
um, & oleandro inest proprietates mirabilis ad hæc.

Dixit Galenus, si cætera non cōferrent, sulphur ui-
uum & calx uiua teratur, & cum melle conficiantur,
& cum aceto in aurem instillantur, & alkitrā distil-
latum in aurem eos perneat, & per alkitrā aliqui in-
telligunt resinam pinī, aliqui picem, aliqui gummi ce-
drini, quælibet est bona. Quādoq; permiscemus pla-
centia uermibus cū eis qui eos necant, sicut mel cū ali-
quo supra scriptorum. Auic. ponit hoc medicamen-
tum. uini. 3. 2. mellis, 3. 3. olei, 3. 1. misce cum albumine
duorum ouorum fiant tepida, & imbibantur lanē, et
impleatur auris & cubet super aurem, & non dormi-
at, deinde subito rapiatur quoniam uermis egredietur.
Tertia intentio est ipsos interfectos educere, impleat-
ur ergo auris una uice post alia ex uino & oleo trepi-
dis, & cum stuellis ex cottō factis circumducendo edu-
cantur, & cum hæ intentiones complentur, dormiat
aeger super aurem agra, ad hoc etiam ualet immissio a-
quæ mellis, & propriē uiolenter cum catathir, & po-
stea exiccatio cum stuellis de cottō. Quarta intentio,
scilicet, accidentium correctio completur sedando do-
lorem aut curando ulcera ex putredine uermium de-
relicta secundum quod in capitulis præcedentibus di-
ctum est. Quinta intentio, scilicet, debitum regimen
perficit ut cōdo amaris, salis, acutis, & acetosis, & ipsa
masticando masticata in ore tenēdo & odorādo, etc.

DE HIS QUAE IN AVRES EXTRINSE-
cus cadunt. Cap. XLI.

Qum aliquid in aure figitur, oleum
tepidum est immittendum, & pati-
ens balneum ingrediatur, ibi moram faciēs
donec corpus eius mollescat. Deinde na-
rib. insuffletur condisi, & teneatur anhe-
litus ne sternutatio sequatur: forsit enim
sic egredietur. Si autem fuerit difficile,
& non

et non exierit, erit necesse ut cum ferro auri immisso extrahatur. Quod etiam in naribus est faciendum si quideas ingressum fuerit, quod extrahi non possit. Quod si aqua aurem intrauerit, capite ad partem auris illius inclinato saliat eger. Quod si non exierit prouocetur sternutatio, ut diximus. Deinde oleum tepidum multotiens immittatur. Neque hoc pro paruo est habendum et præcipue si res malam habens qualitatē ingressa fuerit, ex ea nanque grauis sequitur dolor.

Diuiditur hoc capitulum in tres partes. In prima ponitur modus extractiōis rerū duarū fixarum in aure. In secūda ibi. Quod si aqua. Ponit modū extractiōis rerū liquidarū. In tertia parte ibi. Nec hoc pro paruo est. Facit medicum diligentem in huiusmodi rerū extractiōe. In prima parte innuit duas intentiones. Prima est foraminis mollificatio et dilatio et etiam mollificatio rei, quæ ingressa est aurem, aut ipsius cōminutio si fieri possit instillando in aurē oleum tepidū et ægrum ponendo in balneo scilicet, aquæ dulcis, & maximè fomentando aurē cum philtro aut petia infusa in aqua tepida, caue tamen ne res quæ est ingressa aurem per humectationem crescat, sicut faba, phaseolus, cicer & similia, in his enim ab olei instillatione & fomentatione cauendum est. Secunda intentio est ipsius rei extractio prouocando sternutationē cum conditi, aut elleboro narib. insufflato, ore & narib. clausis, ut cum impetu aere inspirato, uersus aurē moto, illa res ab aure excutiat. Si autem cum sternutatione exire non poterit, extrahat cum instrumēto congruo cum quo etiam extrahuntur res narem ingressæ cuius instrumenti figuram uides in margine, & cum hoc etiam extrahuntur lapilli in uirga retenti. Sed bene caueat operans quomodo ipsum applicet ne in profundum rem extrahendam impellat. De expertis per me in extractiōe rerum infixarum in aure est, ut lacerta uiua aut nouiter mortua applicet cum capite suo auri, & liget sic per tres horas retenta, & cū eam amouebis inuenies rē infixā adherentē capiti lacertæ, & hoc ualet in extractiōe cuiuscūque rei ubi quæ fixa. In secūda parte dicit, quod in extractiōe aquæ, & rerū liquidarum debet eger saltare capite incuruato super aure ægra & liquor exibat, & si non sufficiat prouocet sternutatio ut prius. Vltius dicit quod medicus nō debet esse negligens in extractiōe huiusmodi rerum, et propriè cū sunt affectæ mala qualitate, causant enim interdum dolorem fortem et alia pessima accidentia. Ingenia autē in extractiōe huiusmodi rerum humidarum penes Auicē. et alios, sunt plurima. Primum est cū embula, id est, canula perforata, cuius extremitas bene cotto circumdata in aurem ponatur ut bene adhaereat, deinde cum ore potenter fiat succio, exibat enim ne detur uacuum. & simile huic est cathar cum sua extremitate in aure immisum. Secundus modus

est ut spogia facta subtilis per fortem constrictionem cū extremitate ponat in aure; exiccabit enim humiditatem illam & simile huic est medulla meligæ, aut fustes anethi, aut papirus palustris cum extremitate ponatur in aure, postquam bene per constrictionem fuerit subtiliatum, ut crescendo bene foramini adhaereat. Deinde alia in extremitate cotto circumdata usque ad tertiam partem sui accendatur ignis, qui procedat ardendo usque prope aurem, ægro iacente super aure; erga, & subito extrahat & exibat aqua. Tertius modus est ut am ne detur uacuum, accipiat uesica, & in collo uesicæ sit canula posita & bene ligata, & in residuo uesicæ sint tres circuli æquidistantes bene adhaerentes & ligati cum uesica siue confecti, & uesica hæc cum circulis suis conflingatur uersus collum suum, & canula in aure ponatur cotto secundū extremitatem suā circumdata, & postea uesica elongetur tenendo canulam bene firmā, & exibat aqua ne detur uacuum, & ad hoc optime faceret follis paruus, cuius canula esset auri portio nata, his duabus intentionibus peractis. Sequitur tertia quæ est accidentium correctio maxime de loris cuius cura supraposita est, & imponatur in aure oleum, et propriè de amigdalibus amaris si aqua ingressa fuerit, & si lichenium aut aliud calidum oleum rosmarinum instilletur, & idē facit, & ordinē regimen secundū exigentiā accidentiū & intentionē, &c.

DE AGRITVDINIBVS NASI. ET PRIMO DE ANATOMIA EIUS. Cap. XLII.

INXTA ordinē à nobis præmissum habemus duos præcognoscere. Primum est anatomia nasi. Secundum est modus congruus applicandi medicinas pro cura passionum nasi. Quantum ad primum nasus descriptiue est membrū instrumentale in suprema parte corporis situm ad longum ex duobus ossibus tribus chartilaginibus, & duobus musculis compositū, duo habens foramina usque ad colatorium penetrantia ad euentandum cerebrum, odorandum, distinguendum literas, & superfluitates à cerebro euacuandum, finaliter ordinatum est enim primò membrum instrumentale siue organicum, quia compositū, & ad plures operatiōes faciētes pro bepe esse indiuidui ordinatū, est autem in suprema parte corporis situm ut esset cerebro proximum, est autem factum oblongum: scilicet nim melius deseruit ad operatiōes de quibus infra, est autem compositum ex duobus ossibus figuratis secundum formam duorum triangulorum, & secundum eorum angulos iunguntur colatorio, secundum bases iunguntur inferius, ita ut nasus sit maior & latior inferius quæ superius. Hæc autem ossa fuerunt subtilia, ut scilicet essent leuia neque fuerunt multum dura, quia magna fortitudine non indigebant merito operationum in quas ordinantur. Fuit etiam nasus compositus ex tribus chartilaginibus, duabus, scilicet, extremitatibus duorum ossium, quorum iuuamentum fuit triplex. Primum generale ne membra molliascut cutis & musculi immediatè ossibus duris coniungerent, secundū fuit, ut nares starent aperte, et possent dilatari & stringi secundum necessitatem aeris attracti & expulsi: si enim fuisset solum os non potuisset dilatari & stringi. Si uerò caro & panniculus non fuissent nares dilatatae propter molliem substantiæ. Tertium iuuamentū, ut quaterent in epulsiōne superfluitatum

superfluitatū, sic enim adiuvat ad ipsarum expulsi-
onem. tertia uero chartilago est in medio nasi diuidens
ipsum per mediū secundum longum, et est durior su-
perius quā inferius. Hoc autē factū fuit ut in naso essent
duo foramina, ut superfluitates expulsiæ à cerebro se-
cundum plurimum transeant solum per alterum fo-
ramen & reliquum attractioni & expulsiōi aeris li-
bere subseruiat.

Si enim non fuisset nisi unum frequēter superflui-
tatibus à capite descenditibus per nasum fuisset im-
peditus transitus aeris. Et fuit compositus ex duob.
muculis paruis, ut sua magnitudine non impediret
alios muculos qui sunt in genis deseruiētes motui
laborum & aliarum partium faciei. Fuerunt autē for-
tes ut fortitudine supplerent quod deficit in magni-
tudine, & ortū habuerūt à genis, quapropter nares uer-
sus ipsas contrahunt secundum uoluntatis imperium.
Habit autē duo foramina peruenientia ad colatorij
quod est in osse basilari, est enim ibi perforatū. Et simi-
liter perforati sunt panniculi regentes cerebrum, ex i-
psius directo usque ad carunculas mamillares quæ sunt
in extremitatibus duarū partium uentriculī anterio-
ris. Hoc autē factum fuit ut superfluitates à parte ante-
riori cerebri possent expelli per nares, ut etiam species
odoris & etiā fumalis euaporatio aeris permixta pos-
sent per foramina narium & colatorij & duorum pa-
niculorum deferri ad carunculas mamillares qui sunt
organum olfactus. Subdunt autem postea in diffini-
tione quatuor iuuenta ad quæ natus ordinat. Pri-
mū est ad euentandum cerebrum quod facit mediāte
multo aere in ipso contento, quem modificat, ut mo-
dificatus transeat ad cerebri euentationē, licet maior
pars aeris per ipsum attracti deferatur ad cordis euen-
tationem. Secundum iuumentum est, ut multus aer
in ipso contentus receptius specierum odoris & fu-
malis euaporationis melius ad odoratum deseruiat.
Tertium ut per ipsum, scilicet paulatim expulsum, secū-
dum exigentiam literæ etiam distinguantur, nam ta-
liter deferuit natus iuxta A. 1. primi, cap. de anatō-
mia ossium nasi, ad distinguendum literas qualiter de-
seruit foramen magnum fistulæ ad distinctionem so-
perfluitates, & ipsas expellendum quæ à cerebro de-
fluunt per nares. Cum enim manibus sit narium con-
strictio, aer per loca angusta impulsus expellit cū ui-
li, figura, quantitas, numerus partium, substantia. Ex
quo etiam patet complexio, est enim frigida & sicca
complexionis. Et colligantia, colligat enim cum cere-
bro, colligat etiā cum ore & gutture, quia per illa fo-
ramina est transitus ad guttur, colligat etiā cū ocu-
lis, quia in superioribus partibus, ossium nasi sunt fora-
mina quæ ad oculos terminantur, quapropter alco-
hol possum in oculo gustatur, aliqua parte ipsius re-
fudante ad os per foramina narium. Potest autem pa-
positionis, & unitatis & apostemata cuiuscunque ge-
neris, & hæc sufficiant de anatomia.

Secundum autem perficiendum est modus appli-
cationis medicinarū pro quo sciendū quod aliquan-
do applicantur capiti, & præcipue parti anteriori &
maximè ad diueredum à naso, aliquando applicant
ori sub forma masticatorij, aut gargarisatis. Ali-

quando applicantur naribus, quadrupliciter, aut infun-
dendo eas liquidas in naribus, capite conuerso ad poste-
riora & melius est, saltem medicina existente acuta, ut
os sit plenum aqua, secundò naribus suggunt, tertio
sub forma odoris & suffumigij applicantur, quarto
sub forma pulueris insufflantur. Sciendum tamen est,
quod si medicina fuerint acutæ sequitur odor & do-
lor nasi et capitis cui oportet subuenire cū attractio-
ne siue iniectione lactis & similibus sedantium acui-
tatem & dolorem remouentium.

DE SANGVINE A NARIBVS FLV-
ente. Caput. XLIII.

Hæc quinta pars de passionibus nasi habet
quatuor cap. quorū primū est de fluxu san-
guinis narium. Quid nominis satis notum
est. Sed fluxus sanguinis nariū descriptiue est exitus
sang. per nares siue immediatè ueniat à naribus, siue ali-
unde, pro cuius notitia ut ueniamus ad secundum, sci-
licet ad species siue modos fluxus sanguinis narium
prima distinctio. Sciendum est quod sanguis ali-
quando egreditur immediatè à uenis quæ sunt in na-
ribus aliquando à uenis & arterijs longinquis, sicut
ab arterijs retis mirabilis cum rumpuntur, aut ab ali-
is arterijs & uenis quæ sunt in cerebro. Nonnunquam
rupta uena in pulmone sanguine impetuose expulso
cum tussi, aliquando egreditur simul per os & nares.
Item accidit sanguine impetuose uomito. Sanguis ta-
men ex naribus propriè secundum omnem intencio-
nem medicorum dicitur de illo qui immediatè egre-
ditur de naribus aut cerebro siue rete mirabili. Secun-
da distinctio. Fluxus sanguinis aliquando est paruus
sicut distillans, aliquando multus & impetuosus, ali-
quando medius inter hos. Tertia distinctio. Aliquan-
do est à uena, aliquando ab arteria. Quarta distinctio.
Aliquando est periodicus, aut de mense in mensem,
sicut aliquando accidit mulieribus, quibus retenta sunt
menstrua. Hic enim supplet uicem fluxus menstrualis.
Et aliquando habet alios periodos, secundum quod
in diuersis temporibus tantus congregatur sanguis,
ut sufficiat ad fluxum, aliquando est sine periodicis.
Quinta distinctio. Aliquando huiusmodi fluxus est
criticus aliquarum ægritudinum præcedentium, ali-
quando non criticus. Sexta distinctio. Est aliquando
iuuatiuus, aliquando est nocuus. Iuuatiuus quid est
existente multa plethoria cum uenæ sunt tensæ, color
rubeus præter modum, & facies tumens, imminet e-
nim periculum aut fracturæ uenæ aut suffocationis
subitæ. Similiter cum sanguis esset nimis acutus licet
etiā esset mediocris quantitatis. In his enim casibus
fluxus sanguinis ex naribus optimè cōfert. Est enim
iuuatiuus in multis ægritudinibus quæ sunt apud cri-
tice terminari per fluxum sanguinis narium, sicut a-
postemate cerebri & proprio calido & sanguineo aut
cholericò in soda ex sang. prouenire & in synache &
peripneumonia aut pleureti et apost. epatis & in mor-
billis & uariolis & feb. synocha, & febre tertiana &
causone in quibus maxime cholera esset mixta cū san-
guine. Sed dicit A. 1. tertij cap. de fluxu sanguinis na-
rium, quod pleureti est apta melius & frequentius
terminari fluxu sanguinis narium quam peripneu-
monia, cuius causa quia secundum plurimū sit pleure-
ti à sanguine cholericò qui est aptus per nares expelli

Et

Et etiam uena arterialis deferens sanguinē ad pulmonem, minorem habet colligantiam cum uena chilia ascendente quā uenae pectoris ab ea ramificatae, dicit tamen A. etiam uena chilia ascendens à qua ramificatur uenae disseminatae per pectus est proximior uenis narium siue quae terminantur ad nares quā pars uenae chilia à qua ramificatur uena arterialis deferens sanguinem ad pulmonem. Dicit tamen A. 2. quarti de iudicijs fluxus sang. narium, quod peripneumonia terminatur per fluxum sang. narium, & quod pleuresis quātum ad hoc iudicium est medium, quem passum credo sic esse intelligendum, scilicet quod pleuresis rarius terminatur per fluxum sang. narium quā multa alia apost. ut uerbi gratia rarius quā apostema cerebri & synanche, frequētius tamen quā peripneumonia, ego tamen cum uiderim centum pleureses & multas peripneumonias, nunquā uidi nisi unam pleuresim sanguinis fluxu terminari. Nullam autem uidi peripneumoniā sanguinis fluxu terminari, sed bene multas phreneses siue apost. calid. cerebri. Et fortē etiam quod apost. epatis & propriē existētia in gibbo & frequētius terminantur per fluxum sang. narium quā pleuresis cum truncus uenae chilia trāseat per gibbum epatis. Et fortē hoc intellexit A. in proprio capite de fluxu sang. nariū, cum dixit, iuuatur eo praecipuē aggritudinibus acutis & in apost. intrinsecis & propriē sanguineis & cholerici in cerebro, deinde in epate, postea in uelamine, id est, diaphragmate, et per uelamē etiam possumus intelligere pleuram, ex hoc ordine Auic. possumus elicere sententiam praedictam. Aliquādo hic fluxus est nociuus sicut quando superfluit, tunc enim in cholerici facies citrinatur cholera furente & ebulliente et residuū sanguinis adurente, & in phlegmaticis facies pallidatur, & fit plūbea phlegmate multiplicato, & in melanch. fit facies fusca, & plerumque in omnib. istis facies tendit in colorem mortui spiritu paucificato, & extremitates in frigidantur & cadunt in syncopim, & interdum moriuntur, & praecipuē cum magna quantitas in paruo tēpore egreditur, sicut 25. lib. licet mulierē uiderim euasisse postquam ab ea egressae sunt 25. lb. sang. per matricem in tribus diebus, sanguine autem in multa quantitate sed paulatim fluente & in pluribus diebus, debilitatur epas, & peruenitur ad hydropem & corpora uehementius preparata ad fluxum sang. narium sunt corpora citrina subtilis sanguinis, & iuuatur ex eo qui temperatus est.

Causae fluxus sanguinis narium sunt multiplices, scilicet secundum quod differenter sanguis egreditur. Aliquando enim aperiuntur uenarum orificia. Aliquando uenae soluuntur, aut secundum longum aut secundum latum totaliter, aut secundum partem. Aliquando sanguis egreditur refudando. Orificia autē uenarū à quib. potest sanguis refudare, licet sint multa ferē ad uniuersam cutim terminata, unde aliqui per hunc modum sudarūt sudore sanguineo, sicut de Christo credimus, licet illud etiam potuerit esse per refudationem à uenis. Triā tamen sunt loca famosa in quibus frequēter sanguis egreditur per orificia uenarū ad illa loca terminata, scilicet nasus, anus et matrix. Causae autem aperiōnis uenarum siue orificiorū. Quaedam sunt primitiuae, sicut aer calidus, statio sub sole, balnei ingressio, cibi et potus calefacientes, reple-

rio multa ciborum, motus uiolentus, furor & ira, similiter percussiones, casus, & offensiones, clamores, leuationes ponderum, iterum aliquae medicinae sicut aloēs, scamonea, & similes. Et aliquae sunt corporeae sicut multitudo sanguinis, aut ipsius acuitas & subtilitas, feb. calefacientes, debilitas uirtutis retentiae & similia. Causae autē solutionis uenarum sunt iam dictae primitiuae & corporeae, similiter ulcera corrodentia. Causae autem refudationis sanguinis est caliditas & subtilitas ipsius & dilatio pororum & raritas texture &c.

Signa quaedam sunt prognostica sicut splendor apparens in utrisque oculis & lineae albae, & rubedo, & citrinitas, & propriē post sodam & reliquas aggritudines, de quib. supra, aptas fluxu sang. terminari, ipsae enim aggritudines sunt signa fluxus sanguinis futuri, spendor tamen apparens in utrisque oculis potest ineligi ex parte aegri & ex parte aspicientis in oculum, utroque modo nunciatur fluxum sang. futurum, pruritus autē & titillatio accidens in naso cum signis iam dictis significat iam fluxum sanguinis proximum. Signa autem quod sanguis egredietur ex naso immediate sunt, quia per approximationem alicuius licheni constringentis ad intra nares faciliē sedatur, secundum quia nullo loco capitis dolor percipitur, si uero sanguis sit ex cerebro in aliqua parte determinata dolor percipitur & non faciliē sedatur fluxus sang. imò in naso posita nihil conferunt. Quod autem sit ex ruptura uenae in cerebro, & non ex refudatione cognoscitur, quia multus est & crassus, proueniens autem refudando paucus & subtilis. Quod autem sit ex arteria cognoscitur, quia calidus rubeus cum claritate subtilis, et est cum spuma frequenter & impetuose egreditur.

Sanguis autem ex uena est rubeus tendens in fuscū, crassus, siue spuma, cū paruo impetu egreditur. Quod autem sit periodicus cognoscitur, ex determinata periodo seruata, quod autē sit criticus cognoscitur, quia sequitur alias aggritudines, & cum ipso ut plurimum terminantur, quod autem sit iuuatiuus cognoscitur, quoniam sequitur bona conferentia, et bene toleratur, contrariorum contraria sunt signa. Causae autem primitiuae & corporeae seipsas ostendunt, quod autem sit ab ulceribus cognoscitur, quia post saniem sanguis egreditur, & significat ulcus ambulatiuū, scilicet corrosiuum aut putridum.

Prognostica. Primum. Fluxus sanguinis narium ex fractura arteriae in cerebro difficulter curatur, & secundum plurimū malē terminatur, & propriē si frangatur arteria rete mirabilis. Secundum est A. Et scias quod quandoque uiuit homo fluxu sang. nariū usque quo egrediantur 20. lb. & usque ad 25. lb. deinde moritur, licet ut antea dixi, uiderim superuixisse mulierē, cum tribus diebus egressae fuerunt 25. lb. sanguinis.

Ex his quae sanguinis de naribus fluxum retinent, est suc. albedorogi cum camphora fuerit in eo resoluta naribus immixtus, confert enim ei qui hanc passionem incurrere solitus est, ante eam iniectus, aut

aut in hora agritudinis. Aut sumatur gipsum cinis chartæ de panno gallæ, sang. draconis, calcis gezi, & puluerizata naribus insufflentur. Aut lichinium in eis intinctum mittatur in aures. Aut alumen iam meni puluerizatum, ut alcohol cum amilo eiusdem quantitatis naribus insuffletur.

Hoc capitulum de sang. fluente ex naribus, diuiditur in tres partes. In prima ponit quedam medicamina naribus imponenda. In secunda ibi. Quod si adhuc uehementer, curat fluxum sanguinis per diuersionem. In tertia ibi. Medicamen quod uehementer ualet, ponit aliud medicamen naribus imponendum.

Prima pars potest diuidi in tres partes, secundum quod tria sunt medicamina, de quibus facit mentionem, partes parebunt. Primum medicamen est suc. albedorogi, id est, ozimi maioris siue basilicoidis, de quo uerbi gratia sumatur. 3. 1. & misceatur media drachma caphoræ. Et si maior esset caliditas sit 3. 1. confert enim, ut dicit Rasis in textu curando, & perseverans folia magna & stipitæ satis longum & est commune, secundum minus habens folia parua, redolens odorem gariophil. & dicitur ozimum gariophilatū, tertium habes etiam folia satis magna redolens odorem citri & dicit citrarium. De maiore est hic sermo. Retinet enim sanguine à forma specifica, non à qualitate manifesta. Imò quia calidum est fortasse magis adiuuare ad sanguinis prouocationem. Et ideo secunda eius caliditatem, stuellus itaque in eo infusus & naribus immisus optime iuuat. Secundum est hoc. Recipe gipsi frig. sic. & stipitici, cineris chartæ de panno calid. sic. & stipitici, dicitur de panno ad differentia chartæ, de papiro palustri super qua antiqui scribebant, gallarum frigid. & sic. & stipiticarum, sang. draconis frig. & sic. & stipitici et inuiscatiui, calcis calid. et sic. in quarto, & causticæ, zezi, id est uitrioli calid. & sic. in quarto, omnium ana 3. 1. & puluerizata subtilissime naribus insufflentur. Aut lichinium ex cotto prius infusum in albumine oui, deinde isto puluere aspersum naribus immittatur.

Ultimum medicamen est alumen iam meni, calidum & sicum & stipiticum subtilissime puluerizatum & mixtum cum æquali quantitate amyli retinentis sua inuiscatione.

Quod si adhuc frequenter manauerit superiores ad interiorum partes apud ascellas cum insita & coxa apud inguina ligentur, & testiculi sunt ligandi similiter. Si uero passio inualuerit, phlebotometur cephalica eiusdem partis de qua fluit sang. Si autem nec hoc modo strictus fuerit, magnæ uentose cum igne superponantur acutari

ab ea parte de qua fluit sang. Medicamen quod uehementer ualet ad sanguinem constringendum, sumatur calx al. & leuis qua utuntur aurifices & sæpe naribus insuffletur sine interpolatione & lichinium album. oui illinitum, ea inuolutione & naribus immittatur.

In hac secunda parte curat fluxum sanguinis diuerrendo, primò sine euacuatione, secundo cum euacuatione, scilicet phlebotomia, & patet. Et in ultima parte docet assumere calcem, qua scilicet utuntur aurifices & naribus frequenter insufflare uel in lichinium in albuiue oui illinitum, & postea ipsa inuolutum naribus imponi &c.

Pro ordinatione curæ fluxus sang. narium, sciendum quod fluxus criticus non est constringendus. Imò adiuuandus nisi uirtutem debilitet. Similiter fluxus factus à natura stimulata ipsius multitudine, aut etiam ipsius acuitate cum mediocri quantitate eius non est restringendus. Imò in exitu 4. 15. est aliquando ergo iuuamentum non paruum, quo fortasse præferuat ab apostemate uel ruptura uenæ, uel morte subita & similibus. Reliqui autem fluxus sunt secundum plurimum restringendi. Et etiam iam dicti, cum nimium exuberant.

Cura ergo fluxus sang. narium triplex exigit regimen. primum uniuersale, secundum particulare, tertium commune utriusque. Primum completur quatuor intentionibus. prima sanguinem infrigidat et incrassat, caliditatem membrorum reprimens, secunda diuertit, tertia uias & meatus quibus sanguis ductur ad nares, constringit, quarta causam fluxus remouet.

Prima completur ex his quæ actu & potentia, aut utroque modo infrigidant interius et exterius applicatis, ut si epar sit in causa, aut cerebrum propter superfluam calid. & similiter uniuersum corpus infrigidetur cum aceto, aqua rosacea, suc. semperuiuæ, solatri & similibus, quæ sint actu & potentia frigida, sed sint propria membris quibus applicatur, & si totum corpus sit in causa, totum corpus in aqua frigida infundatur, uirtute & reliquis cõsentientibus, & interius sumatur syrupum de papauere & similia, præcipue infrigidentur testiculi cum aceto & aqua ueri frigoris. Secunda intentio, scilicet diuersio perficitur stringendo fortiter adiutoria prope ascellas & coxas, prope inguina & mamillas in radicibus suis, & testiculos quæ ligaturæ sint dolorosæ, & sæpe remutentur. Item ponatur uetosa super epate si fluat ex nare dextra, & super splene si ex sinistra, et super utroque si fluat ex utraque, & ponatur super sumine & super spatulis & super nocræ, nam cõferunt. Item diuertatur sanguis cum phlebotomia. Et si fuerit magna repletio in toto fiat ex sa phena uel ex alijs uenis pedis eiusdem lateris. Et si epar fuerit in causa phlebotometur basilica. Si uero repletio fuerit parua aut à furcula supra phlebotometur cephalica dextra aut sinistra, & fiat semper phlebotomia subtilis & hauriatur quantitas sang. secundum quantitatem repletionis & tolerantie uirtutis, imò li pothymia si superuenerit, esset efficax remediū stringendo.

gendo sanguinem. Sed consulo quod si fluxus dat inducias ut quia non sit impetuosis uel fortassis sit periodicus, quod potius reitere phlebot. quod magna quantitas una uice extrahatur, sed impetuoso & non dante inducias iudico contrarium. Sed Mesue durbitans à qua istarum duarum intentionum sit inchoandum, in actu pratico, dicit & bene. Quod si fluxus sanguinis est propter calid. & subtilitatem inchoetur à prima. Si uero propter multitudinem tantum, aut multitudinem cum acuitate simul à secunda est inchoandum quamuis eadem hora sit ad ambas festinandum. Tertia intentio scilicet constrictio ductuum & uiarum perficitur cum frig. actu & potentia, & stipricis applicitis super loca uiarum & transitus sang. ad nares, & cum debita constrictione, quapropter applicetur acetum & aqua ros. & similiter suc. frig. tam dicti singulariter aut coniunctim circa collum ut oppilentur & claudantur uenae, deferentes sanguinem ad caput, hoc idem fiat circa frōtem & tempora, & si opus sit maioris constrictiois supra scriptis possunt addi bolum armenum, terra sigillata, sang. draconis, albumen oui, trochisci de karabe de terra sigillata & similia. Quarta intentio, scilicet remotio causae perficitur hoc modo. Nam si cholera fuerit in causa calefaciens, subtilias, mordicans, & stimulans uirtutem expulsiuam euacuetur cum decoctione prunorum, tamarin, mirob. citrin. cum pauco cassiae aut mannae. Si uero aquositas esset in causa educat cum decoctione aut suc. ieros et similibus, sint tamen admixta cum mirobalanis chebulis, bdellio & similibus constringentibus. Et in hoc casu prima intentio iam dicta non habet locum. Et tertia intentio complenda est calidis, & sic stipricis inuiscantibus, sicut cum thure, mastiche, alumine, nuce cupressi & similibus, quae tam in decoctione, quam in substantia possunt applicari ad constringendum uias & transitus. Et nota quod ubi fluxus esset periodicus, aut daret inducias, haec intentio quae est quarta deberet esse prima, sed in fluxu non dante inducias debet esse quarta &c.

Secundum regimen, scilicet particulare siue locale completur cum medicinis naribus impositis constringentibus secundum unam aut plures harum quinque uirtutum. Prima est uirtus infrigidatiua congelans sanguinem & incrassans. Et istae sunt sicut opium, hyoscamus, camphora, maderagora, papauer, folatrum, semen lactuca & suc. eius, semper uia. Aliae sunt cauterizantes, facientes escaram, sicut arsenicum, calx, colchotar, calchantum, aes ustum, flos aeris & similes, & Cauterium actuale ubi conuenienter potest applicari, obtinet principatum. Coagulatui uero sunt sicut farina uolatilis, albumen oui, charta combusta, spogia marina combusta, pili leporis & coagulum eius, fumus thuris & thus, aloes, gypsum, gummi assum, dragagan. combustum, pennae combustae, & rasura lebetis terrei qui saepe steterit ad ignem. Aliae sunt uehementer stipricae, ut rosa, semen eius, suc. barbae hircinae, galle, suc. palme, balauitia, cortices granatorum, alume, hematites, myrrha, karabe, sang. draconis, bolum armen. terra sigillata, acatia, suc. rubi, suc. foliorum pironum & similes. Aliae em à proprietate retinet, sicut stercus asini odoratum insufflatum. Similiter stercus porci, suc. porri, suc. basiliconis, menta & plurahis similia. Cerebella autem gallinarum comesta in magna

quantitate retinent sanguinem fluentem de pelliculis cerebri. Et secundum sententiam Gal. quinto de ingenio sanitatis, thus & aloes incorporata cum albumine oui, ita ut habeant mediocrem spissitudinem, sicut mel excedunt omnes medicinas in constrictione sanguinis fluentis ex pelliculis cerebri. Et in hoc medicamento secunda uirtus aloes quae est inuiscatio reducit ad actum, & non tertia per quam aperit orificia uenarum. Vbi contra, si in potu fumeretur tertia reduceretur ad actum, & non secunda, uel saltem magis operaretur per tertiam quam per secundam. Secundo res tamē medicinae & ceteris praeligenda sunt stipricae inuiscentes, restringentes à forma specifica. Frigide enim congelantes corrumpunt spiritum & calorem innatum, sed in approximatione cauterizantium est timor de casu escarae, & de fluxu uehementiori. Iste uero medicinae aliquando applicatur sub forma pulueris, & sunt subtilissimae puluerizandae, & elaborandum est ut bene adhæreant. Aliquando approximatur stuellae siue tentae infusae in ipsis & elaborandum ut bene obturent nares, & multum ad superiora transeant, neque remoueantur nisi postquam de fluxu sanguinis securi sumus.

Sunt tamen aliquae medicinae quae portatae, uel suspensae collo, stringunt sang. sicut iaspis & similia. Tertium regimen respicit accidia, subueniatur ergo debilitati uirtutis cum uino, aqua carniū & similibus. Item si sanguis transfret ad pulmonem procuretur eius extractio, & melius esset ut transitus eius ad pulmonem prohiberet frequentem extractione eius quod descendit. Et similiter prohibeatur eius transitus ad stomachum, & si transfret uomitu educatur, & si transfret ad intestina cum solutius, & sang. discoagulans per os sumptis, & cum clysteribus &c. Regimen autem sex rerum non naturalium declinet ad frigida & sic, scilicet aer, & cum hoc sit boni odoris, unde iter naturae in loco habitationis folia pironum, citoniorum, mespilorum, sorbarum rubi & similia, & sit aer aliquatenus obscurus. Et pauca etiam habeat uestimenta & non stricta, & proprie circa collum. Et nihil teneat in capite, & stet capite euato. Cibi sint similiter huius intentionis frigidi, sic stiprici, uiscosi. Et bibat aquam calide beatam.

Et comedat pedes & extremitates animalium, & pisces uiscosos, somnus sit multus, sed interruptus, ne sanguis declinet ad pulmonem, uel ad stomachum, & dormiat capite euato, procuretur uentris solutio cum clysteribus leuibus & similibus non agitantibus. Nares autem non demuet, aut demuet minus quam potest. Sit quietus animo et corpore, ita ut uix loquatur, & caueat ab ira, furore, gaudio, timor tamen adiuuat ad constrictiōnem.

DE VLCE RIBVS NARIVM. Caput XLIII.

Quid nominis & quid rei ulceris narium sunt satis ex dictis manifesta. Species autem sunt sumuntur quadoque ex parte mentis bri patiens, quā ex ulceribus. In se ipsis. Primo namque quaedam sunt extrinseca quaedam intrinseca. Intrinseca autem quaedam sunt in alkaiesim & sunt praua, quaedam in colatorio & sunt prauiora. Quaedam in carunculis mammillaribus, peruenientia usque ad ipsam et

rebrī substantiā, & sunt prauissima. Et ubicūq; sunt, aliquādo sunt superficialia, & sunt leuiora, aliquādo se profundant sicut cauernae & abscessiones, & sunt difficilia. Ex parte autē sui distinguuntur. Nam quaedam sunt sic crustosa à quib. ferē nihil emanat, et sunt superficialia pēdentiā à uaporibus aut humorib. aduētis, quaedam sunt humida à quibus notabiliter sanies emanat. Et istorum quaedam sunt munda à quib. sanies laudabiliter emanat, quaedam uirulenta, quaedā fordida, quaedam putrida, quaedam corrosiua, quaedam fistulæ, quaedam cancroſa. Item quaedam horum sunt recentia, quēdam chronica & antiqua. Causæ ulcerum sunt apost. aut boihor quē rumpuntur in naribus. Aut uulnera à causa primitiua illis partibus illata, quæ postea sūt ulcera. Aut humores acuti paulatim se profundantes. Aut uapores acuti ad partes nariū eleuati paulatim excoſiātes donec se profundent. Causæ remotiores sunt quēcūq; possunt hos humores & uapores multiplicare, & hi humores quandoq; defluunt à capite per uiam catarrhi. Aliquando ab alijs conſurgunt partib. & quādoq; in principio cum ueniūt ad membrū non sunt aduſti, sed postea tandē aduſi sicut uidemus multa apost. à principio non cancroſa, quæ tandem ad cancerum permūtantur. Signa. Vlcerā si extrinſeca ſint ſenſui ſubiaceant. Si uerō profundentur, ex ſanie, aut ex crustis deinde egredientibus cognoscuntur, & dolore interiori ſenſato, nam ubi dolor ibi aggritudo.

Et si ſint in Kaieſim frequenter obſtruant nares. Et ſin colatorio ſanies ſortens per os egreditur. Quæ si proueniat ex ulcere & corruptione oſſis eſt ſubrilis. Sed in carunculis māmillarib. nocetur oſſaſtus. Et si proueniat ad cerebrum anterius tandem noceſ ſenſus communis & adeſt febris. Et si profunda ſint & ampla, ex egreſſiōe multæ ſaniei. Si mūda, etiā ex ſanie laudabili. Si fordida ex ſanie craſſa.

Si uirulenta ex ſanie craſſa. Si putrida ex foetore ſaniei.

Si corrosiua ex exitu ſang. cum ſanie, aut poſt ſanem corroſione tendente ad partes ſanas. Cancroſa ex ſignis cancri cognoscuntur, maximē ex dolore ſulmineo cum ſanie ſortentiſſimā inde egrediente. Sed si quæ antiquitate & ſanies communiter eſt ſubrilis quæ aliquando paucificatur, aliquando multiplicatur. Causæ autem ulcerum ſeiſpas oſtendunt.

Prognostica. Primum. Vlcerā extrinſeca superficialia, munda, recentia facile curantur. Secundū. Oculta profunda immūda difficillimē curant maximē oſſib. nariū & colatorio cōmunicata. Putrida uerō corrosiua cancroſa maximē carūculis māmillaribus et cerebro cōmunicantia plurimū ſunt pernicioſa. etc.

Cum in narib. fuerint eſcaræ, cera & oleum, & adeps gallinaceus eis immitatur. Et aquam calidam narib. in mane multoties per aliquot dies odoret. Cūq; puſtula egredi coeperit, lichinium aceto ſorti infuſum in quo ſal poſitum ſit naribus immitatur, ac ſuper eas ſimiliter ponatur,

siccabuntur enim ex hoc, & non prolongabitur earum mora. Quod si ulcera ibi affuerint, unguento de ceruſa curentur.

Diuidit hoc caput in duas partes, primò ponit curam ulcerum quæ ſunt ſicca cruſtoſa. In ſecunda. Quod si ulcera etc. Ponit curā ulcerum humidorū.

De prima dicit, quod cum in naribus ſunt eſcaræ et cruſtæ, primò debet æger odorare frequenter aquam tepidam, id eſt, uapores aquæ calidæ ad nares recipere, poſtea immēdiatē naribus imponere unguentum hoc. ʒ. ad ſipis gallinæ, olei añ. ʒ. s. uel quantum uiſ, ceræ quantum ſufficit, fiat unguentū molle, hoc ter aut quater in die ponatur debite calidum & continuetur quouſq; eſcaræ ceciderint, & poſt earum caſum ſtuellus ex cotto in aceto ſolito infuſus naribus immitatur & aliquoties replicetur, ex his enim medicaminib. æger ſatis citò ſanabitur. De ſecūda parti dicit, quod si ulcera, ſcilicet humida in naribus fuerint curetur cū unguento de ceruſa, cuius deſcriptio notiffima eſt, & propriè apud Meſue, & maximē si ulcera superficialia fuerint, & affuerit ibi mala cōplexio calida.

Horum ulcerum cura triplex exigit regimen, uniuerſale, particulare, & tertium quod eſt commune utriq;. Vniuerſale uerò quatuor completur intentionibus, prima eſt euacuatio, ſecūda diuerſio, tertia regimen membri mittentis, quarta fluxus interceptio. Pro prima intentione complendā maximē attendat cacoſimie totius, & maximē membri mittētis ita ut fiat phlebotomia, aut alia euacuatio ſecundum quod oportet etiam iterata ex ſuis partib. minoratione, digeſtione & eradicatione, quæ qualiter fieri debeat eſt ſatis ex ſæpe dictis manifeſtum. Secūda ſcilicet diuerſio completur cum omnibus aut pluribus generibus diuerſionum de quibus ſæpe dictum eſt: Sed ex proprijs eſt uentofatio aut ſanguifugarum applicatio circa ſecundā aut primam ſpondilē, ſicut ex propriè eradicatib. cauſam coniunctā, eſt phlebot. uenarū naſi.

Regimen autem membri mittētis, quod ſecundū plurimum eſt cerebrum compleſt euacuando ab ipſo diſcratiſm eius corrigēdo & confortādo, quod qualiter fieri debet, patet ex præcedentibus taliter etiā rectificet epar & cetera membra principalia & ſibi deſeruiētia, ut ſanguis delegatus ad nares ſit conueniens in quantitate & qualitate. Intercipitur autem fluxus ungendo nares circum circa cum deſenſuo facto ex bolo armen. aceto, oleo roſaceo, aut ſibi ſimilibus, ſecundum diſcratiſm exigentiam, & ſimiliter ponēdo ſtipſica, fluxus ad nares prohibentia, fronti & temporibus ſi per eam regionem materiæ fluxerint. Secundum uerò regimen, ſcilicet locale, ſi ulcus fuerit cruſtoſum perficitur, 2. intentionibus.

Prima eſt mollificatio cum unguēto in textu dicto, & uapore aquæ calidæ, aut aliqua decoſtione mollificante, prius naribus applicita, & ex proprijs eſt butyrum recens. Et ſi affuerit caliditas miſceatur cum oleo uiolaceo aut mucilagine plilij, aut mucilagine ſem. cytoriorum. Et ſi non fuerit caliditas cum oleo ſefamino, amygd. dulcium, & pinguedine gallinæ, mucil. malua uiſci, ſem. lini & ſimilibus, et eſcara remota inſundat, ſtuellus in aceto ſalito & expreſſus aliquāliter inuoluat unguēto de ceruſa aut retrapharmaco facto ſcili-

cet ex lythargyrio, aceto & oleo, aut cum unguento de thuria & narib. immittat. Si uero ulcus fuerit humidum & mundum solum tres exigit intentiones, primo scilicet mundificatione complenda cum aqua mellis, quod sit subquadruplum ad aqua, & si sit cum signis frigiditatis, cum uino decoctionis mellis & bulliat ad consumptionem tertiae partis. Secundo, carnis generationem, complendam cum his quae dicta sunt in cura ulcerum aurium, ab illo tamen potest demi zinniar cum huic minus sicca debeant quae auribus, & magis sicca quae oculis. Unguentum quoque tetrapharmacum & de cerusa est ad hoc conueniens, & cum hoc conplebit etiam tertiam intentionem quae est sigillatio, et si opus est confortetur cum pauco colcothar aut alumine. In ulcere uero sordido indigemus maiore absterfione, sicut oxymelle simplici, & etiam scyllitico apud maiorem necessitatem, & postea generetur caro & cicatrizetur secundum oportunitatem. Sed in uirulentis maiori indigemus exiccatione, sicut sang. draconis, scoriam ferri, tuthia, cadmia & similibus cum succo plantaginis, quibus apud maiorem necessitatem possit addi aliquid aluminis aut aliquid parui aquae aluminosae, & pauca indigemus absterfione. Et haec etiam cicatrizabit, et proprie si ponatur in forma pulueris. Et si tuthia aut cadmia misceantur cum thure aut sarcocol. cum oleo ros. & cera carnem generabunt. Si uero ulcus fuerit putridum cum carne aut osse corrupto, aut corrosiuum, aut fistula, quatuor exigit intentiones, scilicet, corrosionem aut cauterizationem complendam cum ferro ignito figurato secundum exigentiam partis cauterizandae, & proprie si malitia fuerit magna. Et melius est si ferrum illud ignitum immittat per canulam ferream circumluta luto sapientis siue alchimistarum, aut cum medicina corrosuente, aut caustica. Et ex leuib. est unguentum Aegyptiacum, & fortius illo est quod sit ex uiridi aeris alum. melle ana partib. aequalib. & adhuc fortius est quod sit cauterio facto cum capitello dissoluto, fortissimum autem omnium est arsenicum sublimatum. Sed non ponatur nisi in pauca quantitate, scilicet, ad quietatem grani mellicae, aut grani frumenti. Ex eo tempore quo istae operationes sunt tueant partes circumstantes cum aquis & succis frig. postea procuretur casus escarae non quidem putrefacientibus, sed cum uittello oui, oleo rosaceo, & pauco cerusae, aut cum stuello in lacte infuso, et postea locus mundificet cum aqua mellis, tertio caro generet. Et tandem cicatrizet. Et si esset os disco opertum, teneat ipsius squamatio et ossis corrupti emissio cum alumine aut uittio lo sepe super osse iterato. Si uero ulcus esset occultum, & profundaret ad colatoriu, & ad partes distantes mundificet cum hydromel attracto per nares. Et si opus sit maiori exiccatione addat oxymel simplex aut compositum. Et adhuc apud maiorem necessitatem & ubi esset caro putrida, addatur unguentum Aegyptiacum & per nares suggatur, sed melius est ut capite conuerso ad posteriora per nares huiusmodi instillent etiam fortiter suggendo. Quidam praecipunt filum suggi per nares, & elaborare ut descendat per os, & habeat plures nodos, & in modum serrae trahatur & retrahatur donec locus sanguinet. Quae operatio mihi uidetur satis uana & fortuita, secabitur enim non secundum. Sed forte in hoc posset esse aliquod iuamentum, ut in extremitate filii liget aliqua petia subtilis linea, & unguento

aliquo ungat, aut aliquo liquore ut attrahat superius per filum egrediens, per os, & ibidem dimittatur usque ad sequentem mutationem, & postea in sequente mutatione illi petiae quae secundum aliquam partem remanet extra nares sumat alia petia consimiliter uncta & attrahat, debet autem petia illa esse uncta aut infusa in liquore conueniente ad intentionem quam queris, scilicet, corrosionis, mundificationis, consolationis &c. Sed maxime cum opus est superflua corrodere, aliter & melius possemus primam petiam abijcere & filo interius remanente ad intentionem quam queris, & ad superiora trahere. Dicit enim Mesue quod consuetudinaria ulcera, id est, longo tempore consueta ex defluxu scilicet materiae ad nares quae sunt sicut crustae & bothor rub. coloris, et asperitates curantur cum duob. cauterijs postea inter labia & gingiuas iuxta dentes caninos, & ascendunt hinc inde ad colateralia nasi, & debent fieri cum duobus stilis ignitis, & debent etiam dimitti aperta longo tempore ut materia illuc deriuetur. Filius Zachariae medicamen conferens ulceribus narium. sc. cerusae, lythargi, plumbi usti, ana partes aequales, lauentur pluribus uicibus postquam fuerint trita, deinde fac unguentum cum uino & oleo myrrhino diu conterendo in mortario, nunc uinum, nunc oleum, usque dum inspissetur, & fit mortarium de plumbo, & similiter pistellum et proprie quando ulcus esset cancriforme, & tunc dimittatur uinum & ponatur succ. solatri, cadmia quoque & tuthia sunt in hoc casu praestans. Ex medicinis communibus est ut fumant granata acetosa, sed melius est si uiscus eius contritus cum tota substantia sua, decoquantur in uase aereo post ipsius contritionem donec perueniat ad medietatem, & lineatur ex ea et tenta administret. Tertiū regimen corrigit accidentia doloris quod perficitur cum lacte narib. imposito, aut uittello oui & oleo ros. & similibus mitigantibus ardorem sequentem medicinas acutas. Regimen autem uitae declinet ad ita cum temperamento actiuarum, uerum tempore huiusmodi fortium operationum sicut cauterizatio cum ferro, aut medicinis acutis, sit dieta tenuis, sine uino & carnibus declinans ad frigidum.

DE POLYPO ET HEMORROIDIBUS
nafi. Cap. XLV.

Circa rub. sciendum, quod reperiuntur ista termini haemorrhis, alharabath, polypus qui significant carnes additas in narib. & frequenter hi termini accipiuntur ut synonymi. Sed uim uocabuli consideranti apparebit quod haemorrhis de qua hic est sermo, sit additio carnosae in naribus a qua sanguis facile profluit. Haemorrhis enim graece, fluxus san. latine, hoc autem est quia oritur ab extremitatibus uenarum quae ad nares terminantur. Alharabath uero & polypus importat additionem carnosam in naribus non connotando pronitatem ad fluxum sanguinis sed ex intentione Auic. uidetur posse elici alharabath siue polypum esse carnem duriorē quam sit haemorrhis. Polypus autem dictus est haec aegritudo ad similitudinem carnis piscis qui polypus dicitur, qui tendit in albedine, aut quia habet multos pedes, id est, radices quibus narib. alligat sicut polypus piscis qui propter hac causam multipes dicitur. Et bene consideranti apparebit huiusmodi carnes esse morbum in numero cum sit aliquid additum supra partes narium sensibiles.

sensibiliter lædens operatiões. Polypus siue hæmor-
rhois est duplex. Est enim alter quædam caro mollis
alba aut rub. à qua humid. profluunt sine dolore, ha-
bens radicem gracilem, quæ caro aliquando multum
prologatur donec nares egrediatur. Aliquando trā-
sians per palatum apparet in ore. Sed alter est caro du-
rior tendens in rubedinem uel fuscedinē, à qua minor
humiditas profluit existēs cum dolore, habens radicē
firmiorem, & communiter minus prolongat, & hæc
aliquādo malignata materia propter incisionem aut
approximationem medicinarū acutarum aut ex lon-
gitudine temporis cum malo regimine sex rerum nō
naturalū uertitur in cancerum. Aliquando tamen in
narib. sit cancer, incipēdo, quia incipit sicut faba par-
ua, durus, fusci coloris, cū dolore fulmineo secundum
radicem in profundū affixus, & incipit secundū plu-
rimū in parte inferiori nasi, qui ualde tandem augmē-
tatur donec nares impleat ipsas ualde extendens cum
magna duritie, & communicat collatorio apparēs in
palato cū dolore & duritie, & cū ulcerat emitit uirus
foetentissimū, & in crustant labia ulceris & inuerfant.

Ex his manifestæ sunt species polypi siue hæmor-
rhoidis. Est enim quidam mollis, quidā durus, quidā
paruus, quidam magnus ualde elongatus donec ex-
tra nares pendeat aut in ore appareat, & communi-
ter quanto est mollior magis prolongatur, quidam
antriquus, quidam nouus, & quidam habet radi-
cem suam superius ualde affixam in superiori parte.
Quidam in parte inferiori quæ sensui subiacet, & est
aliquando una caro, aliquando plures quæ habent
radices suas diuersas, & est aliquando cum fluxu san-
guinis aliquando sine. Et Melue ponit quod aliquis
est mollis, foetidus, putridus, qui fortasse nō sanatur,
quod potest esse uerum, quia corrūpit partē in qua.

Causa autē materialis sunt humores à cerebro secū-
dum plurimum deriuati, aliquando in narib. paula-
tim congesti ex nutrimento scilicet ipsorū qui in hac
carnem paulatim, & in longitudine temporis cōuer-
tuntur à uirtute nutritiua aut augmentatiua ad hoc con-
currente sua complexione & spiritu uitali et natu-
rali, ita ut forma carnis inducatur, cuius carnis finis in
quædam morbus est ut noceat operationib. narium,
qui tamen finis est præter intentionem uirtutis, sed si
nis ipsius in quantū caro intentus à uirtute est ut ipsa
conseruetur, humores autem isti qui subijciuntur pro-
minio phlegmat. quib. aliqua pars sanguinis est ad-
mixta nulla participante aduisione. Materia autē car-
nifera durioris tendentis in colorem rub. & aliquando
fufcum, sunt humores phlegmat. et sanguinei per adu-
sionem tendentes in melanch. & quandoq; cum his
permiscetur aliquid cholerae, aut melanch. propter cu-
ius admixtionem aliquando tendunt in fuscū huius-
modi additiones. Materia autē canceri potest esse quæ-
cūq; melanch. adusta, hoc autem non est caro sed a-
bet polypus, cum oppilatione foraminis nasi & im-
pedimento respirationis, & species ipsius manifestæ
sunt ex iam dictis, et signa, distincta inter eas, & signa
quibus à cancro differunt &c.

Prognostica. Primū. Huiusmodi carnes molles al-
be sine dolore facili curantur, timor tñ magnus est cū
sunt hæmorroides de superfluo fluxu sanguinis. Car-
nes duriores cum dolore difficulter curantur & tran-

seunt in cancerum, Secundum pronosticū. Cancer etiā
incipiens, curari non potest nisi tota substantia cui af-
fixus est eradicetur. Illi ergo canceri sunt incurabiles,
qui non possunt propter loci nobilitatem eradicari,

QUum intus in naribus caro su-
perflua mollis et quasi dissoluta,
rubea aut alba exorta fuerit, & nares in-
crassari cœperint, ac ex carne prædicta re-
pleri. Cephalica prius erit phlebot. Dein
de lichinū ex unguēto uiridi quod in cap. de
corrodentib. carnē nominauimus liniendū,
& narib. erit immittendū. Si uerò istud nō
suffecerit, medicamē acutū quod ibi descri-
psimus apponatur, donec ex toto mūdificetur.
Hæc præterea quandoq; curatur cum
ferro radicitus omnino incidēdo. Medici
tamen plurimū in hoc errant, unde ex eorū
cura æger maximū incurrit nocumētum, in
hoc namq; loco cancer plurimūq; exoritur.

Verū cæcer quādo in hoc nascitur loco,
nec tolerat acutas medicinas nec incisionem
quæ cū ferro fit. Imò indiget ut suauiter tra-
ctetur, & medicaminib. lenientib. & phle-
bot. et uētris solutiōe curetur. Cognoscitur
autē an illa accidēs sit cancer, quia est durus
pertingens quandoq; usq; ad palatū. Sed cū
nares sicca sint et duræ, nec sit in eis aliqua
humidit. summopere cauendū est, ne hæc æ-
gritudo aut similis ferro, aut acuto medica-
mine tangatur. Si autē quod in narib. exori-
tur & caro est mollis, fluxerintq; ex eis hu-
mores, & cum nares stringuntur inueniuntur
molles, & cū tangūtur, tactus nō senti-
tur solidus, nō est timendū quin ex medica-
minibus acutis & ferro mederi possint.

Diuiditur præfens caput in partes tres. In prima
notificat hanc ægritudinem. In secunda ibi. Cepha-
lica prius erit phlebotomanda. ponit curam eius. In ter-
tia ibi. Medici tamen, docet quendam errorem euita-
re. Quod dicit in prima parte notum est, per dissolu-
ta, intellige quod habeat radicem & tenuem & exilē.

Quod dicit in secūda parte est etiam manifestum.
Sed unguēta illa corrodētia & cauterizātia require se
primo huius cap. de medicinis quæ carnē superflua re-
mouēt, quorū descriptionē ponā, qñ ordinabo curā.

In tertia parte docet euitare errorem, quem medici

plerunque incurrunt.

In hoc namque loco plerunque fit cancer, aut inci-
piendo, aut permutando, qui neq; curationem cum
ferro, neque fortes etiam sustinet medicinas, immo
medicinis blandientibus, phlebotomia, ventris solu-
tione & conueniente uitę regimine ad frigidum & hu-
midum declinante curandus est. Quapropter signa
distinguentia inter polypum non malignum & po-
lypum malignum tendentem in carne, immo can-
crum ipsum sunt bene cōsideranda. Cum enim fue-
rit durus fusci coloris nō emittens humiditates com-
municatas palato cum dolore fulmineo & radicibus
magnis non gracilibus non est procedendum in eius
cura cum ferro aut medicinis acutis. Vbi uerō adfint
contrarię conditiones cum ferro & medicinis acutis
curari potest. Immo cācer ipse incipiens, exiens sicut
faba parua, nō debet ferro aut medicinis acutis cura-
ri, nisi uoluntas sit ipsum cum tota parte cui affixus
esse eradicare.

Cura polypi septem exigit intētionēs. prima eua-
cuat, secunda diuerit, tertia materiam fluētem inter-
cipit, quarta polypum remouet, quinta consolidat,
sexta corrigit accidentia, septima ordinat regimen.

Prima intētio & secunda complentur cum extra-
ctione sanguinis, secundum plurimum phlebotomia
aut uentofatione, aut sanguisugarum applicatione,
si non toleret phlebotomiam. Prouocatione hēmor-
rhoidarum & mēstruorum si fuerint in causa eorum
retentiones. Et phlebotomia uenarū nocere & ceteris
diuersionibus pręterquā per nares usque ad cau-
terium in commissura coronali. Phlebotomia uena-
rum nasi & fluxus sanguinis narium potius eradicat
quā diuertant.

Fluxus materię intercipitur iuxta tertiam inten-
tionem cum stipticis applicitis fronti & temporibus
si fluat per partes extrinsecas. Si uerō per intrinsecas,
potius nocent quā conserant. Sed cum inciditur
& cauterizatur polypus est conueniens ut fiant huius
modi defensionia fronti, temporibus & circa nasum,
ne ex fluxu humorum propter dolorem loca illa
apostementur.

Quarta intentio perficitur si fuerit ex mollibus tra-
hendo ipsum cum tenacula dētata per quamcunque
partem appareat quantum est possibile, dummodo
non rumpatur. Et incidatur in radice sua ut nihil aut
minimū de eo remaneat, ut cū forfice subtili, stricta,
aut cū raspatório subtili, paruo, cuius sit possibilis in
nares ingressus, aut cum cultello, non ex lateribus in-
cidente sed solum secundum extremitatem suam que
sit lata & optimē incidēs. Et si dubitetur de fluxu san-
guinis huiusmodi instrumenta cum quibus sit sectio
iginātur, postea residuum cum ferro ignito aut cum
medicaminibus acutis, de quibus infra consumatur.
Si uerō abhorrentur huiusmodi operationes, aut ap-
tē fieri non possunt, consumendus est cum medicinis
acutis, quę in radice sua ponantur. Et si pro his ope-
rationibus perficiendis nares nō sint sufficiēter apertę
aperiātur & apertę teneantur cum speculo nasi, cuius
figura est hęc in margine depicta. Deinde stuellus de
cotto inuolutus in unguento uiridi à Rasi descripto
7. huius super radice ponatur. & uiridis aeris, bene de-
purati mel. añ. 3. i. optimē permisceantur. Et hoc etiā
conferit in corrosione carnis in naribus superfluę, &

sic medicetur mane & sero donec fiat escara fortis.
Aliud fortius & citius expediens est ut stuellus inlu-
sus in aqua forti, scilicet, qua separatur aurum ab ar-
gento, aut in aqua dissolutiōis cauterij super radieem
imponatur. Escara autem perfectā procuretur eius re-
motio cum uitello oui, cum oleo ros. mixto donec
cadat, & si tota radix consumpta sit, ita ut separatur
bene est. Si uerō non idē medicamē & eodē modo re-
plicet donec tota cōsumpta sit, & stuelli illi sint cū filo
ligati quod pendeat extra, & aliquādo imponimus
per os & nares super radice polypi styllum in extre-
mitate sua cotto inuolutum, & infusum in aqua forti
sępius replicando donec fiat escara, sed oportet ut
aqua illa sit ualde fortis, sicut illa cuius descriptio est
apud Rasim 7. Alman. cap. de his quę minuant car-
nē. & arsenici citrini, alchali, id est, cineris facti ex her-
ba falsa inuenta in litore maris, calcis uiuę, uiridis æ-
ris, ana, lb. i. agent iuiui, lb. i. salis armon. 3. & terantur
omnia cum aqua donec argentum uiuum sit ex-
tinctum. Et fortē melius est quod aqua illa sit aqua
fortis facta ex calce & cinere, & in summa sit capite-
lum, postea exiccetur, & exiccata iterum terantur,
deinde in alambicho alchimistarum totum sublime-
tur, et quod sublimatum est, in ampulla uitrea totum
referuetur: est enim faciē operationem ignis, & ad
hanc intentionem est calidicon in eodem cap. à Rasi
descriptum, hęc operationem maximē facimus cum
apparet in ore, cum ibi aptē non possint medicinę di-
mitti. Operatio autem Mesue & Auicē, est cum tri-
bus pilis caudę equi nodatis in tribus aut quatuor lo-
cis, & contortis adinuicem, & retractis nunc per os,
nunc per nares in modum serę, quę operatio est satis
fallax & fortuita, cui parum initendum est. Verum
cum polypus est oculus si attrahatur per nares filis,
in cuius extremitate sit sutura petia unguento, aut aqua
ad hoc propriā intincta est causa, ut medicamen ap-
plicetur super polypo, & applicatum remaneat, extra na-
res secunda mutatiōe parti petię, quę remanet extra na-
res suatur alia petia, & similiter per nares trahatur, &
sic fiat quouisque uolueris. Sed melius est ut prima pe-
tia abijciatur, & filo interius remanenti alia petia con-
suatur, & in nares cum eodem filo trahatur, & sic fiat
in qualibet mutatione, quandoq; tamen in auferen-
do polypum procedimus, cum medicinis lenibus ip-
sum in longo tempore auferētib; ex quibus est mee-
dicamē Gal. & ex tribus generibus granatorum par-
tes æquales, & tere ea secundum totalitatem eorum &
extrahe succum ipsorū, & decoque in essentia robre-
nuis, deinde tere substantiam granatorum contrito-
ne multa donec fiat sicut pasta, & fac cum succo cor-
naribus unam post unam liniendo semper cum succo
co prædicto, ita ut attingant radicem polypi, efficiat
enim operationem suam sine dolore, & tandem sar-
nat, & est expertum. Si autem non sufficiēter impar-
meret, adde ex trochiscis alcardicon aliquid parum,
uel ex medicamine in prin. descripto facto ex melle
& uiridi aeris. Confectio trochiscorum alcardicon cō-
sumentium polypum, cancrum, & omnes additiōes ar-
carnium in omnibus locis, & calcis non extinctę, ar-
senici citrini, añ. par. 2. colcothar. flor. aeris, alum. añ.
par. 1. gallarum, balustię, añ. partem s. contere ea in
mortario æneo cū aceto forti contritione multa usq;

ad quinquages, deinde fac eis tres trochi, et in uase uitreo conseruentur in loco frigido & sic, et distempera unū eorū cum uino & utere cū lichenis, est enim expertū. Diofco. medicamentum auferens polypum cancrosum ꝛ. feminis luf, id est, serpentariæ, tere cum succo maiorū gran. tritorū cum cortice suo, & liniatur super polypū, & in circuitu eius. Idem etiam operatur succus radicis eius, & propriè lana ex aliquo eorū imbibita & immissa narib, est enim expertū. Item xylocacta cōtusa & immissa super polypū cum lana aut cotto, cotrollet enim & cadere facit polypum sicut facit cadere uerucas. Similiter nuces cuprelli puluerizate, Et Auiuc. dicit se expertum fuisse attramentum & uitriolum uiride tritum sicut alcohol insufflatum in naso, sed melius est ut aliquid ipsius cum moleta subtilifus per radice polypū ponatur, aut stuellus infusus in oxy-melle simplici, in quo puluis eius sit supra positus, lanar enim si mane & sero aliquibus diebus continuetur. Si uerò dubitetur ne canceretur, aut fortè ne cācer nouus incipiat portet crystallum, et ipso in cibo & potu utatur, nā preferuat à cancro, similiter politrictū portatum. Medicinæ diuersæ posite sunt, ut eis secundū opportunitatem utaris, nunc leuibis, nunc fortib, secundum diuersitatem polypi in duritie & mollitie, et secundum eius resistentiam. Cancer uerò & polyposus cancerosus curatur cum blandientia, sicut cū unguento de cerula, & cum mineralibus, sicut tutia preparata, cerula, cadmia, et similibus, in mortario plumbeo, cum oleo ros. & succo solatri diu agitatis, & pingue-
do cancerum in mortario plumbeo, & cum pistello plumbeo diu malafata, est in hac dispositione propriū: hæc tamen non curant, sed prohibent eius augmentū & ulcerationem. Scribit tamen Auicenna, quod succus expressus ex uua quæ est super extremitate serpentariæ, & cū lana aut cotto impositus destruit omnē carnē additā & cancerū, sed facilius est dicere qđ facere. Cōsolidetur iuxta quintā intentionē sit cancer aut polypus fuerit male nature cum mineralib, de quibus sermo precessit. Si uerò nō malignus sit ex his potest additus, farcocolla, & similia. Accidentia corrigenda maxime iuxta sextā intentionem sunt dolor qui mitigetur cum lacte tepido, uitello oui, & oleo ros. simul mixtis et similib, fluxus stringat cū his quæ dicta sunt. Cortices autē quę qñq; remanēt in narib, educant ster-
tiner ad frigidū & humidū, cum est cancerosus. Et si supra, sed cū hoc etiā sit tenuis, ut caueat tūc à uino & carnib. Si uerò polypus sit benignus declinet ad siccū cum temperamento actiuarū. Cancer autē incipiens, aliteradicant ipsum, & permittatur sanguis egredi mul-
ti, & hæc fiant præmissis uniuersilib, uerū aliqui mor-
denti presuntur quæ omnem polypum & cācerum cu-
rari par. 1. arsenici sublimati par. s. auripus aur minus
secundum quod uis facere unguētum fortius aut deponatur ut bene adhæreat, et quandoq; incorporant
medicina de sapone nigro, et uerum est quod dicit fortis
diebus etiam si minimum sit quod de ipsa ponatur,

& cum apponitur, bonum est defendere partes circumstantes cum succis frigidis & defensivo in forma communij, & uerum est si cancer eradicabilis est, eradicat: si uero non, salte facit curam paliatā, & tota uis est in arsenico. Sed caue, scilicet, ne approximēs mēbris nobilibus, nam fortē eorum operatio destruetur.

DE AMISSIONE ET NOCVMEN-
to olfactus. Cap. XLVI.

Circa rub. sciendū, quod licet amissio olfactus
proprie dicat eius ablationem, & nocumen-
tum olfactus dicat eius destructionem, dimi-
nut. & corrupt. frequenter tamē hi termini accipiunt
ut synonymi. Licet Rasis in presenti cap. per amissio-
nē proprie intelligat diminutionem & ablationem.

Est autem olfactus siue odoratus sensus exterior qua
odores percipiuntur. Cuius nomen eum est triplex,
diminutio scilicet, in qua solus odor intensius per-
cipiuntur, sicut aromaticum ualde, aut fortentissimu,
ablatio in qua nullus percipit odor, & corruptio exis-
tens duobus modis. Aliquando enim percipit odor
esse in medio qui non est. Aliquando unus pro altero
representatur sicut foetens pro aromatico & contra.
Sunt enim aliqui quibus omnia foetent, sunt contra
aliqui quibus omnia redolent et aromaticum spirent
odorem. Quod etiam nocumentum aliquando est no-
um, aliquando antiquum, imò aliquando à genera-
tione contractum. Hoc autem nocumentum frequen-
ter accidit homini, quia organum sui olfactus est debi-
le propter superfluum humiditatem cerebri in compa-
ratione ad multa animalia. Et propter hoc homo pra-
uè odorat, ut dicitur in defen. & sensat.

Causæ nocuementi odoratus quâdoque sunt ex decur
su ætatio, sicut in senib, non solum olfactus læditur,
sed auditus etiam & uisus, & cæteri sensus interiores
& exteriores propter paucitatem spirituum & crassi-
tatem, exiccationem substantificam, & multiplicatio-
nem humiditatum accidentium. Et quicquid est hoc nocu-
mentum propter ægritudines in cerebro, sicut uerti-
ginem, apoplexiam, lithargiâ, & fimiles, & maximè
cum leduntur duo uentriculi anteriores. Et quando-
que causæ nocuementi olfactus sunt in duabus carun-
culis māmillaribus à malicia complexionis sine ma-
teria cuiuscunque generis, quæ tñ secundū plurimū est
magis frig., q̃ cal. et magis hum., q̃ sic, aut cū materia
cuiuscunque generis, sed maximè phlegmatica. Et materiæ
huiusmodi quâdoque sunt apostemates, quâdoque nō.
Tertiō causæ nocuementi olfactus quâdoque sunt in co-
litorio, id est, in foramine ossis basilaris & duorum
pāniculorum propter oppilationē in his foraminib,
factam à uentositate, aut à materia cuiuscunque gene-
ris apostemante aut non apostemate, aut carne ibidē
nata. Et quâdoque defecerunt huiusmodi foramina si-
cut etiam potuerunt deficere cartilæ māmillares ex
defectu uirtutis informatiue. Quarto causa nocu-
menti olfactus potest esse oppilatio in Kaeisim, aut à
materia & propriè à capite rheumatizante. Et dicti-
tur corizza, aut à carne ibidem nata sicut polypo,
hæmorrhoidē, uerruca & similibus, aut apostemate,
quod frequenter est cancerosum. Et quandoque est
oppilatio in foramine illo propter malam compo-
sitionem illorum ossium, aut extempore, sicut cum
premuntur aut rumpuntur propter percussione[m],

casum aut offensionē, aut forte est illa mala cōpositio à generatione cōtracta. Et quādoq; est oppilatio ista à faba, phaeolo, lapide, & huiusmodi, nares ingredietibus, sicut etiam potest esse à uermibus, crustis, & similibus. Et causae horum nocumentorū secundum has quatuor species quādoq; sunt primitiue, sicut aer malus, cibi mali, potus, crapulae, ebrietates, somnus meridians & propriē super crapula, retētio euacuationū consuetarū, & similes. Et causae primitiuae magis extraneae sunt sicut medicinae exterius applicitae, et naribus instillatae inducentes aliquam speciem malae cōplexionis, & propriē in carunculis māmillaribus, Item casus, offensiones, & percussiones, de quib. sermo præcessit. Sed causa corruptionis odoratus, ut aliquis odor appareat esse in medio qui nō est, aut quod omnia appareant foetentia, aut bene redolētia est duplex, scilicet, aut corrupta complexio organi olfactus, scilicet, caricularum māmillarum per quas uis olfactiua corruptē recipit, & corruptē sensui cōmuni repraesentat. At aliquis odor foetens, aut redolēs existens in aliqua partium sensatarū suprascriptarum, uel in kaeifim, uel in foraminib. ossis basilaris & panniculorū, aut in carunculis māmillaribus, aut in cerebro, aut forte in ore stomachi, pulmone & partib. inferiorib. Cuius odoris cā est aliquis humor corruptus aut alia substantia corrupta, aut boni odoris, sicut phlegma dulce existēs in aliqua partiū sensatarū suprascriptarum. Cognoscitur nocumentū olfactus ex relatu egri. Sed quod sit ex decursu statiuo senium ipsū declarat, et paulatim factus euentus eius & nocumētum alijs sensibus commune: si autem sint aegritudines in cerebro signa earum iam præcesserunt, & cum hoc alijs sensus leduntur. Si uerō causa nocumēti sit in carunculis nocumētum odoratus est maxime cōtinuum, neq; apparet nocumētum in cerebro, neq; oppilatio in kaeifim, neq; in foraminibus ossis basilaris & panniculorum, quia forte superfluitates descēdunt per nares sicut cōsueuerunt, neq; adest nausēitas & prohibitio respirationis, & malitia compositionis cognoscit, quia sentit cal. aut frig. aut aliqua alia qualitas in anteriori cerebro ubi sunt carunculae, & quia præcesserunt causae calefacientes, in frigidates. Tertiō, quia leditur à similibus, iuuatur à contrarijs, & materia cognoscitur per grauitatem perceptam. Et si egreditur per colorē, odorem, substantiam, & speciem nocumenti, quod im primit. Et si apostemat, adest febris, dolor, grauitas, oppilatio uerō in foraminib. ossis basilaris, & panniculorum cognoscitur, quia humiditas solita nō egredit, & adest ibi dolor, grauitas cū incolumitate kaeifim & aliarum partium: nō enim est nausēitas et prohibitio respirationis per nares, sicut quādo oppilatio est in kaeifim. Sed causa oppilans cognoscitur aspiciendo in naribus, & propriē sub radijs solaribus naribus cum speculis dilatatis. Cognoscit enim an sit caro, an apostema, aut crusta, aut humor inuiscatus absq; apostemate, & si quid nares sit ingressum inspiciendo cognoscitur per signa propria. Causae primitiuae seipsas ostendunt, quia præcesserunt, & postea huiusmodi nocumentum secutum est. Causa corruptionis huiusmodi odoratus si sit mala complexio sine materia existens in carunculis aut partibus uicinis cognoscitur, quia odor iste semper apparet eiusdē speciei, &

aequē intensus. Si uerō sit in partibus distantibus nō semper sic apparet, & membrum in quo est huiusmodi humor, aut alia substantia corrupta ex nocumentis illius membri comprehenditur, humor autem sine alia substantia redolens coniectura quadam comprehenditur potest quo loco sit, quod patet discurrēti.

Prognostica. Primum. Nocumentū odoratus & propriē ablatis antiqua, aut à generatione contracta est incurabilis. Secundum, quando in aegritudinibus acutis aeger percipit odorem malū sicut pisciū luti, aut alterius rei foetētis, quod nō est merito alicuius agētis obiecti extrinseci, & à nullo circumstantiū comprehenditur cū alijs signis malis, argue mortē. Signant enim debilitatem caloris innati ad quam sequitur putrefactio quae secūdum plurimum est in partibus cerebri.

Cum sensus à quo odorāda percipiuntur amissus fuerit, nec in narib. caro superflua creuerit, & aer ita leuiter ut prius attrahitur, et oculi ac sensus naturaliter existūt, narib. erit insufflandus puluis adeo subtilis ut alcohol, qui fiat ex cōdissi artanita, & sale ammoniaco. Aegro quoq; præcipiatur ut nares uapori ex aceto calido procedenti multotiens apponat. Si autē haec non suffecerint, narib. insuffletur puluis quē nominabimus, cuius descriptio est. Rec. nigellae, fellis gruis, colocynthidis, el lebori albi, omniū, ana. partes aequales. puluerizentur & ponantur in urina cameli arabici quantitate tanta qua cooperiri possit, & ponatur ad solem donec siccetur, deinde fiat ex eis sies, cumq; necesse fuerit unū ex eis lentis habens magnitudinem in oleo sambacino intinctū, narib. immittatur, optimum enim ex hoc existit. Si autē ex eo quod narib. immittitur fortis sequatur dolor, oleum de semine cucurbitae eis immittatur. Et si aqua calida super caput fundatur. Et si forte beat calida ea quae humectant, ut prisa, & quod fit de aqua surf. & de farina, & similia. Et hoc quidem est medicamen ad amissionem olfactus probatissimum, quod sic conficitur. Nigella puluerizetur donec fiat ut puluis, & misceatur cum oleo ueteri, deinde aeger implens os suum declinet

declinet caput retro quāto plus poterit, tunc ex prædicto medicamine aliquāta gutta naribus distilletur. Aegro quoque præcipiatur, ut quantum ei possibile est aerē ex trinfecus interius attrahere nitatur, quod in tribus diebus, tribus vicibus fieri conuenit. Si autē mordicatio superuenerit fiat hoc quod prædiximus.

Diuiditur hoc cap. in partes duas. In prima notificatur nocumentum illud quod intendit curare. In secunda ibi. Naribus erit insufflatus. Curam profequitur. De prima parte dicit, cum sensus olfactus amissus fuerit, id est, diminutus uel ablati, nec in naribus fuerit caro, nec aliud oppilans, cuius signum est, quia aer ita leuiter respiratur sicut prius, & oculi, & ceteri sensus naturaliter sunt existentes, quod arguit nocumentum non esse in cerebro: nam tunc plures sensus essent læsi, ex quibus inferitur nocumentum odoratus esse, aut in tuniculis māmillaribus, aut oppilatio in foraminibus olis basilaris & panniculorum, quæ secundum plurimum proueniunt à mala complexionē frig. & hum. cum materia phleg. tunc utrum est medicinis infra scriptis. Narib. erit. Diuidit pars ista in tres. In prima ponit tria medicamina ad hoc propria. In secunda ibi. Si autem ex eo. Docet subuenire ardori ex huiusmodi medicinis contingentī, & propriē ex ultima. In tertia ibi. Et hoc quidem medicamē, ponit aliam medicinā docens similiter ardori ex ipsa contingentī subuenire. Quod dicit in prima parte fati est manifestū. Condit de quo supra non habemus, sed loco eius accipimus eleborum calidum & sic. in tertio. Arthanica est panis porcinus cal. & sic. in tertio. Et hæc potenter comouent sternutationē prouocando, & cerebrū foluens & attrahens potenter. Hæc recepta potest sic ordinari. i. elebori, arthanice, añ. ʒ. i. salis amm. ʒ. i. prius tamen præcedente euacuatione. Acetum acutū suffumigatum & frequēter odoratū est præstans meuens, tertia medicina præstantior supra scriptis sit ex nigella cal. & sic. in tertio incisua, abstersua, resolutiua uentositatum. Vltima mundificat, aperit oppilationē, ex felle gruis cal. & sic. in quarto, colocynthide, eleboro albo, de quibus superius. De his quatuor accipiantur partes æquales, ponantur in uale aliquo & urina asini post ipsorum puluerizationem. Et dimittantur in sole donec siccentur. Deinde fiant ex eis stief, tudinem, id est, ualde parum distemperatur cum oleo ieiulemīno, & narib. instilletur capite ad posteriora tingenti cum oleo de sem. cucurbitæ narib. tepido infusato, & cum infusione aquæ tepidæ in naribus, & hordei, & cum ferculo facto ex aqua fursur, id est, in

qua fursur fuerit infusum, postea colatū & sufficiēter coctum, & cū ferculo facto ex farina de simula, id est, flore farinæ. Quod dicit in ultima parte est manifestū. Est enim nigella expertissima medicina in hoc casu, et propriē si prius fuerit infusa in aceto forti, postea exiecata siue naribus insuffletur siue odoretur, siue mixta cū aliquo liquore narib. potenter fuggatur, siue corpore supino capite conuerso ad posteriora, uel narib. instilletur siue suffumigetur: hæc enim sola sufficit in mala complexionē frig. & humid. cum materia & siue materia, siue sit oppilatio, siue materia in organo olfactus sit infusa, &c. Superest ut ordinemus curam nocumenti olfactus. Quod si pendeat, scilicet, ex decursu ætatiuo nulla est curatio, nisi ad retardandum eius totalem ablationem cum odore rutæ, nigellæ, & frequenti mundificatione capitis, masticatorijs, gargarismatibus, caput purgij per nares. Si uero pēdeat ab ægritudine cerebri earum cura præcellit. Si uero sit mala complexio caruncularum & partium uicinarum, quæ secundum plurimum est frig. & hum. Si fuerit sine materia causæ conseruantes remoueantur, discrasia cū cōtrarijs corrigatur, sicut frig. & hum. odorando, suffumigando, fomentando, fuggēdo, instillando, embrocando, emplastrando, facellando, & omnib. alijs modis applicando calida et sicca, & propriē circa partē anteriorem cerebri, & super commissurā coronali, & cum hoc in hac dispositione propria, sicut est maiorana, spica, ruta, nigella, & mulcus, & calamus aromar. & fortiora sunt euphorbium & castoreum, olea propria sunt, sicut oleum de ruta, de spica, de costo, de ieiulemīno. Et si fuerit calida remoueat cum frigidis, sicut cū rosis & aqua rosata, coriandro, & aqua eius odorata, atque aceti euaporatione, quibus apud maiore caliditate posset addi aliquid cāphor. et acetum cum his mixtum facit eorum uirtutem magis ad profundum penetrare. Si uero malicia complexionis cum materia aut uentositate fuerit in carunculis māmillaribus & uentriculis anterioribus, & oppilatio in colatorio. Primò materia euacuetur cum chijs & hieris si fuerit frigida, & si fuerit calida cum aureis, & si apostemauerit phlebotometur cephalica, & euacuationes iterum secundum necessitatem. Secundò, materia diuertatur cum diuersiōibus communibus, scilicet, uentofationibus, clysteribus, lotionibus crurium, & similibus, propriē si fuerit communicata à membris inferioribus, & materia existente sanguinea, & propriē apostemante conuenit phlebotomia uenarū nocreæ, & uentose positæ in parte posteriori, scilicet, in nocra & spatulis, & similiter sanguifugæ. Tertiò, materia eradicetur cum masticatorijs, caput purgij per nares, gargarismatibus, et resoluatur cum exterius applicitis, scilicet, facellis emplastris, unctiōnib. fomentationib. embrocis, odorib. & suffumigijs, quæ in omni dispositione cerebrum confortent. Masticatoria & gargarismata supra in multis locis dicta sunt. Caput purgia propria sunt quæ dicta sunt in textu, et similia illis sunt succus radices ieros, in quo puluis pithri sit infusus. Similiter inunctio olei nar. in quo aliquid musci, euphorbij, & castorei sit dissolutū sed parū ualde ponatur de euphorbio: est enim nimis acutū, imò sola istorū calidorū sufficeret infusio absque quod ponerent in substantia, ea aut in quib. possent infundi sunt sicut uinum bonū odoriferū, & aliquod

ex oleis supraſcriptis, & coſulo tibi ut incipias à leuioribus & gradatim ad fortiora procedas, et ſi ante horum inſtillationē aut inſuſionē ſiue ſuctionem odoretur aut ſuffumigetur acerū: eſt enim ualde efficax, & ad oppilationem uentofam laudatur caput purg. ex oleo amygd. amaro montano, & in cauſa calida inſtillantur aquae decoctionis roſarum, coriandri, anethi, & ſimilium, ſacculi ſiant ex maiorana, ruta, ſpica, nigella, muſco, calamo aromat. floribus ieiuſemini, coſto, & ſimilibus. Et ex eiſdem ſiant decoct. in uino & aqua cum quibus fiat fomentatio, & embrocatio, & cum eiſdem poſſunt fieri emplaſtra, & unctioes oleis additis proprijs, de quibus ſupra: ex odorandis autem & ſuffumigandis eſt ruta ſicca, & nigella, et maiorana, muſcus, ambra, laudanū, xyloaloes, & in cauſa calida roſe, ſandalī, poma, & citonia odorifera. Quartò, corrigantur accidentia, ſcilicet, ardor, & dolor conſurgens ex huiusmodi medicinis cum his quae dicta ſunt in textu, & panis calidus odoratus ad hoc optimè conſert. Quintò, ordinetur regimen in contrarium diſcraciae cauendo ab euaporantibus & caput replentibus. Procurentur euacuaciones à natura inſtitutae. Et exercitium eſt conueniens ſtomacho ieiuo, cauendum eſt à ſomno meridiano, & ſuper repletionem & ebrietatem.

Si uerò cauſa nocuenti olfactus fuerit oppilatio in Kaeſim ex humore à capite fluēte, recurre ad capitulum de catharro. Si uerò oppilatio fuerit à uerruca et carne orta in naribus, recurre ad cap. de polypo. Et ſi aliquid intrauerit nares extrahatur ſicut dictum fuit ſuperius in cap. de his quae ingreſſa ſunt aurem. Si uerò mala oſſis naſi compoſitio fuerit à cauſa primitiua os rumpente, comprimente, aut contorquente reducatur ad ſitum naturalem cum ligno rotundo naſo impoſito, cum quo os ſubleuetur, et ad figuram propriam reducatur alia manu adiuuante ad ipſius æquationem. Et poſt reductionem applicentur, opportuna in hoc caſu, ut inquit Auic. Ille autē qui ſentit odorifera & non ſentit foetida, non ceſſet ſibi facere caput purgia, ſcilicet, cum caſtoreo multotiens uſq; quo rectificetur eius diſpoſitio. Si autem omnia ſibi appareant foetida odoret acerum & ſuffumigetur cū eo, & ſuggat per nares oxymel ſimplex aut ſcylliticū cum uino odorifero, aut cum urina aſini, & cum his parum muſci miſceatur, & gariophili, aut galliae muſcatae: & ſi opus ſit fortibus, addantur quaedam comouentia ſternutacionem. Si autem humor ille foetidus fuerit in ſtomacho, aut in alia parte euacuetur,

DE PASSIONIBVS DENTIVM.

Cap. XLVII.

HAec eſt ſexta pars principalis in qua agit de paſſionibus dentiū, &c. Et ante omnia ſunt tria praeſmittenda. Primū eſt anatomia dentium. Secundum eſt regimen conſeruatiuum dentiū. Teritiū regimen uniuerſale curationis paſſionis dentiū. Dentes ergo deſcripti uē ſunt oſſa parua dura in utraq; mandibula conſita numero 32. aut 28. ad locutionem, ſed principaliter ad maſticationē finaliter ordinata. Sunt quidem oſſa parua, quia ſi fuiſſent magna tot numero non potuiſſent in ore & mandibulis contineri, & ſunt duriora ceteris oſſibus noſtri corporis cum ſint ordinata ad conterendum res duras. Et

ſunt in adultis numero 32. ſecundum plurimum, ſcilicet, in ſuperiori 16. mandibula, & 16. in inferiori. In aliquibus autem ſunt ſolum 28. in ſuperiori, ſcilicet, 14. & tot in mandibula inferiori. In quibusdam enim deſciunt quatuor dentes extremi dicti neguegid, & ſunt dicti dentes ſapientiae, naſcuntur enim circa medium adoleſcentiae cum iam homo coire poſſit. Duo anteriores in ſuperiori mandibula uocantur duales, duo alij ab utraq; parte uocantur quadrupli, & iſti ordinati ſunt ad ſcindendum cibum, poſtea ſunt duo canini ordinati ad frangendum cibum in craſſas partes. Poſtea ſunt octo molares, quatuor ab utraq; parte iā dictorum ordinati ad conterendum cibū. Deinde ſunt duo neguegid iam dicti, qui etiam ſunt molares ad conterendum ſimiliter ordinati, & tot ſunt in mandibula inferiori ad eoſdem fines ordinati. Hi autem dentes inſiguntur in foraminibus exiſtentibus in mandibula inferiori & ſuperiori, quibus multum annectuntur mediante additione quadam exiſtente in extremitate dictorum foraminum, & alligantur mandibulae mediae ante carne & ligamentis fortibus. Sex autem primi ſuperioris mandibulae habent radicem unam, & ſimiliter ſex etiam ſibi correfpondentes in mandibula inferiori non habent niſi duas radices: ſuperioris uerò mandibulae molares communiter habent tres radices. Similiter neguegid mandibulae ſuperioris habent quatuor radices. Sed duo neguegid inferiores habent ſolum tres. Quod factum fuit, quia grauado ſuperiorū adiuuat ad exitum, et caſum ipſorum, non autem grauado inferiorum. Secundò, quia plures rheumatismi faciētes ad caſum dentium communicantur dentibus ſuperioribus quàm inferioribus. Fuerunt autem creati tot dentes, & non unus ne nocumentum partis communicetur toti, & ſunt ad locutionem, & diſtinctionem literarum, & ſyllabarum, & diſtinctionem, quapropter carentes dentibus in locutione impediuntur: ſunt tamen principaliter ordinati ad cibum ad obmaſticandum, ut poſſit faciliter deglutiri, imò bona eius maſticatio eſt quaedam digeſtio, ſiue primae digeſtionis initium. Poſt haec ſciendum, quod dens ſentit per neruum uenientem ad radicem eius à cerebro, ſcilicet, à tertio ramo tertij paris neruorū cerebri, quod non conuenit alteri oſſi: hoc autem factum fuit, quia ſoli dentes ſunt diſcooperti & obuiani extrinſecus aliorum, ne ergo ledantur, datus eſt ipſis ſenſus, quāquam efficax argumentum ſit in contrariū, quod dentes non ſentiant niſi ſecundum radicem, cum aliae partes non doleant ex ſolutione continui etiam ſi totaliter ſecentur, ueruntamen apparent dolere ex contractu cal. aut frig. ſed hoc non eſt quod illae partes doleant aut ſentiant, ſed quia ſpecies cal. & frig. multiplicentur uſque ad neruum exiſtentem in radice. Secundò ſciendum, quod dentes habent hoc proprium, quod nulli alteri membro conuenit, quia ipſi creſcunt per omnem decurſum aetatis. Vnde uidemus dentes maiores in ſenio, quàm in iuuentute reliquis membris minoratis. Hoc autem factum fuit, quia dentes ex contritione ſua ſiue maſticatione quotidie minuantur. Si ergo non creſcerent cito deuenirent ſibi quantum. Et propterea dentes qui non habent ſibi correfpondentes multum creſcunt in comparatione ad alios. Ex his eſt manifeſtus ſitus dentiū, quantitas,

numerus, colligantur, quia colligantur cum mādibulis, & cum cerebro & substantia, & per consequens compositio eorū etiā patet, sunt enim frig. & sic. in cōparatione ad medium generis, licet in cōparatione ad medium speciei suae in aliquib. sint cal. & hum. quod comprehenditur per crassitiem & rubedinem naturalem gingivae, in aliquibus cal. & sic. quod cōprehenditur per citrinitatē gingivae, in aliquibus frig. & sic. quod per fuscedinem gingivae cognoscitur. In aliquibus frig. & hum. quod comprehenditur per albedinē gingivae. Iuamenta parēt ex supradictis: possunt autem pati omne genus aegritudinis complexionis cuiuscunque generis cum materia & sine materia compositionis & unitatis cum aliquando scindantur, rumpantur, concaveantur, putrescant, & possunt pati apostema: nā omne membrū quod potest naturaliter augmentari cum nutrimento, cum superfluitate, potest etiam augmentari praternaturaliter, & sic apostemari. Patiuntur etiam malas colorationes & limositates sibi adherentes, & lapides siue gypsum circa ipsos generantur.

Regimen autem conservatiū dentium decem cōpletur canonibus. Primus uiter corruptionem cibi et potus in stomacho, & per consequens omnē causam corruptionis, ut puta ea quae merito suae substantiae corrumpuntur, sicut lac, pisces saliti, & similia, postpositionē cibi subtilis crasso. Motus fortes post cibi assumptionem, & ante descensum eius ē stomacho, nutrimenta diuersa, coitum et balneum post cibum, & similia. Secundus, caueat a uomitu & multo magis si uomere rem acetosam. Tertius, euitet cibaria crassa, viscosa, & propriē dulcia, viscosa, sicut sunt cōfectiones de melle, & ficus siccas. Quartus, uiter res duras ad frangendum. Quintus, congelantia dentes siue stupefacientia fugiat. Sextus, res uehementis frigoris nō conia uehementer calida, & amplius post frigidi assumptionem. Septimus, res dētib. nocentes sua proprietate post cibū ab eo superfluo, quod ingreditur incidenti, sed sit obtrusum cum latitudine quadam, firini, iuniperi, & similia, & hoc faciat absque multa perfricatione ne noceat gingivae ipsam mouēdo aut tūdinem cum quadam stipticitate. Nonus, facta tali mūdificatione immediate post cibum, ut supra lauentur dentes, & propriē cum aliquo ex infra scriptis uicinis mediae uinositatis & saporis mediū inter dulce & acienobilliter stipticis. Et ex conueniētibus ad hoc est utin quatuor libris musti cōditionati, ut supra, post sit de sub racemis, bulliat in eo una libra saluiae recentis incise in frustra mediocria, & non pistata, nec lotae usque ad sufficientem clarificationem ipsius uini, deinde extrahatur et obseruetur in uase bene obturato, uel accipiat cinamomi electi, ʒ. i. mastichis. ʒ. s. galliae mulsae, cubebarum, ana. ʒ. duas, sem. iuniperi, ʒ. i. radices ciper. ʒ. i. s. fol. rorisma. ʒ. 6. contundantur omnia crasso modo exceptis fol. rorisma. & bulliant omnia simul in una brenta uini, ut supra conditionati, & fiat per omnia ut supradictum est, & hoc

multum ualet in passionibus neruorum. Decimus canon. Fricentur dētes suauiter & tempore breui, nam fortis fricatio aut diuturna destruit dentium humiditates naturales, & ad eos trahit rheuma & uapores a stomacho ascendentes, aut saltem ipsos praeparat ad hoc recipiendum, sed fricatio cum aequalitate abstergit dentes & carnem gingivarum confortat, & prohibet lapides seu gypsum circa ipsos generari, & facit oris odore bonum. Et licet Auic. praecipiat fricationem dentium fieri cum oleis calid. frigid. aut mixtis secundum exigentiam, nihilominus, quia fricatio cū oleis est abominabilis stomacho, ideo omīssa fricatione cum oleis fricentur dentes cum infra scriptis cum uadit dormitum, & etiam stomacho ieiunio quocūque alio tēpore ad libitum. ʒ. mellis par. 2. sacch. optimi, par. 1. misce. Item aliud. ʒ. pulueris capitis leporis adusti ad quantitatem auellanae, qui pulvis ligetur in peria lini rara & subtili. Et cum hac peria in qua sit hic pulvis fiat fricatio. Aliud. ʒ. salis usti ad quantitatem auellanae, mellis quantum sufficit ad incorporandum pro electuario cū quo ligato in peria, ut supra fiat fricatio dentium & gingivarum. Ex theriaca quoque fricentur antiqua dētes omni mane semel stomacho ieiunio, scilicet, post coenam per 9. horas, super qua fricatione cū dicta theriaca dormire potest ad libitū. Et nota quod post dictas fricationes non debent lauari, ne uirtus suprascriptorum dentibus amoueatur, & sufficit huiusmodi fricatio semel in hebdomada. Et nota quod medicinae cōseruatiuae dentium debent esse siccae, sed in actiuis temperamento propinquae. Si uero dētes essent notabiliter laesi siue lapsi in actiuis, ad intra tamen latitudinem sanitatis medicinae sint cal, aut frigidi secundum exigentiam lapsus corrigendi. Cauendo tamen ab intente calidis, sicut in tertio gradu aut supra, similiter ab intente frigidis, & ab his quorum sapore dentes stupent, sicut acris, acetosa, aut pōtica. Sed sint medicinae suae exicantes, abstergentes, resoluentes superfluitatem, quae est in eis cum moderatione, & ipsos confortantes cum stipticitate moderata. Et ex frigidis sunt rosae siccae, gallae, Karabe, margaritae, fructus tamarisci & folia eius, cortices arboris mori, & radix acerose. Sed calide natura uel artificio, sicut sal ustum, cinamomū hyssopus sic. flos schinanthi, fructus capparis & cortex radices eius, folium, ma stix, sandaraca, caput leporis ustum, xyloal. mucus, capil. uen. fol. cupressi, fol. iuniperi & cortex radices eius, cornu cer. ustum uel non ustum, mentastrū, cortex arboris pini. Acetum uero licet noceat dentibus sua acerositate, & sua substantia subtili incisua, tamē pōnitur frequenter in medicinis dentium infrigidantibus, quia iuuat ad infrigidandum et penetrandum, licet non ita penetret mixtum infrigidantibus eorum frigiditate penetrationem prohibente, & cum calidis, quia iuuat ad penetrandum & resoluendum substantia sua subtili calida, & nocumentum suum frangitur cum alijs medicinis proprijs dētib. secum mixtis. Medicinae autem dentales, aliae sunt dentifricae, aliae masticantur, aliae liniuntur, aliae sunt sicut pastilli qui ponuntur supra dētes, aut super mandibula, & aliae sunt cum quibus fricantur, aliae sunt cum quibus dens impletur, aliae sunt uaporationes, aliae suffumigationes, aliae caput purgia, aliae distillationes in auribus, aliae sunt euacuantes materiam cum phlebotomia &

& uentosis ex propinquieribus locis, & aliae sunt eradicantes dentes quibus utendū est nunc una nunc altera secundū quod tuo proposito est cōueniens, etc.

DE DOLORE DENTIVM.
Cap. XLVIII.

Circa rubricam dolor dentium quantum ad quid nominis, et quid rei satis manifestus est. Species siue modi ipsius sunt, quia quidam est intensus, quidam remissus, & quidam nouus, quidam antiquus, & quidam continuus, quidam interpolatus, & quidam pulsatiuus, quidam extensiuus, & quidā pungitiuus, quidam perforatiuus, etc.

Causa dolorosa quandoque est substantia dentium, scilicet, mala complexio cal. frig. & sic. sine materia. Et quandoque est cum materia, aut apostemante dentem, aut corrode, aut in ipso uermem generante. Et quandoque causa dolorosa est in neruo existente in rad. dentis, scilicet, aut mala complexio siue sine materia, aut cum materia in eo infusa, aut apostemante. Et solutio continui in eo aut est à uerme pungente, aut à materia crassa & multa extendente, aut ab acuta subtili in substantiam eius penetrante. Et tertia causa dolorosa est in gingiua. Et haec frequentius accidit propter materiam ad ipsam fluentem, corrode, apostemantem, aut carnem superfluam generantem, aut mollificantem: unde fit prona ad suscipiendum materias malas, quae putrescunt in ipsa. Et nocent dentibus putrefaciendo & commouendo ipsos. Siccitas etiam propter priuationem nutrimenti quādoque est causa doloris, sicut in senibus & consumptis ex aegritudinibus siue sint adhuc aegri, siue conualescentes. Et dolor perforatiuus aut extensiuus quandoque est à uentositate retenta in radice dentium. Sed nocimenti principium apud Auic. aut est ex stomacho, aut ex capite, aut utriusque simul. Et si fuerit totum corpus plenum illa materia, tunc cursus materiae ex corpore ad dentes erit ex his duabus uis, Et materia ab his membris aut ab alijs communicatur dentibus, aliquando sub forma uaporis, aliquando sub forma humoris. Et quādoque dolent dentes in febribus acutis secundum semitam continuitatis in malitia complexionis. Et quandoque accidit sub aliquo dēte corroso dolor pulsatiuus, tunc in radice eius est superfluitas non matura, quare apostema illud maturatur, & dolor iuxta posse mitigetur, & cum caetera non conferunt eradicetur dens. Materia autem ad dentes deriuata secundum plurimum est phlegma, & aliquando salsum, deinde sanguis, rarius cholera, rarissime melancholia. Causae autem primitivae sunt percussio, casus & offensus, uentus, aer frigidus, crapula & reliquum regimen malum sex rerum non naturalium, & quandoque fit difficile pluribus hominibus considerantibus suum dolorem discernere partem dolorosam, & multo minus causam sui doloris, quamuis regimen debeat esse diuersum, immo quandoque non distinguunt dentem dolorosum à non doloroso.

Signa. Primo consideres an gingiua patiatur malam compositionem, quod ex malo eius colore potissimum comprehendes, & an sit tumida, sanguinolenta, apostemosa, aut sit in ea corrosio, aut putrefactio, & sanies exeat comprimendo, & tunc iudica-

bis nocimentum esse in gingiua. Si uero nihil tale sit, & comparando ipsam gingiuam alijs non comprehendis differentiam, tunc causa dolorosa erit in substantia dentis, uel in neruo inter quae distingues. nam si fuerit in dente, forte dens erit corrosus aut magis tumidus solito. Et forte uermis erit in foramine quod comprehendes ex dolore interpolato cum motu uermis: & si quandoque nihil tale fuerit saltem dens totus dolebit secundum longitudinem suam, & non secundum extensionem mandibulae, &c. Quod si nocimentum fuerit in neruo dolor caeteris paribus erit magis acutus quā in alijs partibus, & erit in radice dentis, & expādetur in carne rubea, & secundum extensionem mandibulae, & forte dens erit etiam stupidus, & tu quidem comprehendes malam complexionem cal. aut frigid. ex relatu aegri sentientis calidi aut frig. & ex colore tendente in rubrum uel citrinum album & fuscum, & ex calidis praecedentibus & concomitantibus, & quia iuuatur à contrarijs & leditur à similibus, & siccitas cognoscitur per detumescionem & commotionem & praecessionem & concomitantiam causarum exiccantium, et uentosis, & uapor cognoscitur ex permutatione doloris, nisi esset in aliquo loco reclusa: tunc enim faceret dolorem perforatiuum aut extensiuum, & humor crassus cognoscitur cum submersione & mora doloris absque cal. & frig. apparentibus ualde. Sed humor acutus, sanguineus & cholericus cognoscitur ex uelocitate nocimenti cum intensione & alteratione coloris ad similitudinem humoris, & ex sapore & caliditate acuta sensata ab aegro aut à tangente. Et dolor pulsatiuus arguit humorem calidum, & propriè sanguineum aut apostema quod maturatur. Et scies quod initium humoris est ex cerebro, aut stomacho, ex repletionem & nocumēto sensato in uno eorum, aut in ambobus. Causae primitivae seipsas ostendunt.

Prognostica. Primum cum causa doloris est in gingiua non sufficit eradicatio dentis, imò non est necessaria, id est, utilis: & si est in dēte, remouetur dolor cum eradicacione, & si est in neruo, quandoque remouetur dolor cum eradicacione, quandoque non, & non remouetur nisi quia materia inuenit locum amplum in quo expellitur cum prius esset praefocata retēta cum dēte. Si uero materia sit fixa in neruo non sic facili remouetur. Secundum. Fortissimus dolor est qui prouenit ab apostemate quod in radice dentis fortissimum est. Tercium. Ad huiusmodi dolores fortissimos quandoque sequitur syncope aut epilepsia, nocumēto cordi aut cerebro, communicato. Quartum. Cum barba tumescit ex directio dentis secundum plurimum dolor sedatur materia exterius deriuata.

Singiua cum dolore dētiū fuerit sanguinolenta & apostemosa, & rubra, & ritq; apostematia cum pulsatione extrahatur sanguis, cum uentosis, phlebotomia extrahatur prius facta. Deinde in ore alio quādiu acetum, & oleum rosatum teneat, quod postquā eiecerit hoc idem iterū fiat. Post

Post hoc oleum rosatum in ore teneat. Et si ex hoc non euaserit fueritque pulsatio uehementis, & cum inflammatione camphora & pirethrum terantur, & in radicibus dentium ponantur, cumque dissoluta fuerint iterum mittantur. Cottum quoque oleo rosaceo illinitum superponatur. Quod si dolor aliquando augmentetur, & uehementior fiat opij sexta pars drach. i. in oleo rosaceo dissoluatur, ex quo cottum illinitum radici dentis dolentis adhibeatur. Si autem nondum sedetur scalpelletur locus, & sanguisugæ superponendæ sunt.

In hoc quarto tractatu agit de ægritudinibus dentium. Et facit quatuor capitula. Primum est de dolore dentis, quod capitulum trifariam partitur. Primum ponit curam doloris dentis à causa cal. secundò ibi. Gingiua uerò. Ponit curam doloris dentis à causa frig. tertio ibi. Si uerò dens corrosus. Ponit curam doloris dentis à corrosione. Prima in duas. Primò ponit signa quando prouenit à causa calida & propriè sanguinea. in secunda ibi. Phlebotomia ex cephalica. Ponit curam. De duabus primis partibus dicit. Si gingiua fuerit rub. sanguinolenta tumida fueritque apostematatio illa cum dolore pulsatio, qui, ut superius dictum, fuit, maxime prouenit ex apostemate proprio ex latere dentis dolentis, deinde fiat uctosatio cum scarificatione in spatulis ad euacuandum & dissecandum. Deinde teneat in ore acetum & oleum rosaceum quod sit duplum ad acetum, & sint adinuicem bene concussa, & cum fuerit aliquandiu in ore retentum abijciatur illud, & nouum sumatur in ore, & sic tiendum & ad alterandum diserasiam cal. tam membrum quàm humoris. Secundò post hoc teneat in ore solum oleum rosaceum ad mitigandum dolorem: non enim est opus amplius tanta percussione.

Tertio si ex hoc non recesserit dolor, fueritque pulsatio uehementis cum inflatione, quod prouenit ex præsentia materię calidæ in loco, camphora frigida in tertio & pirethrum calidum in tertio, uel in fine tertie simul terantur, & in radicibus dentium ponantur, & cum dissoluta fuerint iterum ponantur. Et ut melius adhæreant possent permisceri cum oxymelle simplici, & cum cotto radici dentis apponi. Hæc autem mixtio fit ut per camphoram fiat caliditatis alteratio, & per pirethrum materia de profundo dentis educatur, & superponatur in oleo rosaceo infusum loco dolenti dolor non mitigetur, imò fiat uehementior, opij sextata pars 3. i. in 2. 3. olei rosacei dissoluatur, ex quo cottum illinitum denti dolenti apponatur. Et apud necessitatem replicetur, cauendo tamen ne deglutatur. Quintò, si dolor adhuc non sedetur, locus scalpetur, & sanguisuga saltem una superponatur taliter ut ma-

teriam quæ est causa doloris exiccet, & ea remota permittatur sanguis fluere. Deinde cum dicitur:

Gingiua uerò si non sanguinolenta fuerit, nec apostemosa, nec dolor cum pulsatione, nec in facie fuerit inflatio, aut dolor acciderit post fastidium ex satietate, et post coenam, comederitque ex cibo frigido multotiens, uenter ægri soluendus erit ex pilulis cochij. Et dolentium dentium radices ex hoc medicamine fricandæ sunt, quod sic fit. Recipe pirethri, sinapis, setaragi indi, baurach, piperis, zingiberis, & ex eis pulueri satis dentium fricentur radices. Cottum quoque eis illinitum super dentium radices ponatur. Postquam æger os ex aceto in quo pirethrum, & mentastrum, & origanum fuerint cocta colluerit de foris, prætere a panicum siue milium in sartagine torrefactum super maxillam est ponendum, aut ex piperis puluere, melle commixto dens, et eius radix fricetur, & si hæc non succederint in dentium radicibus hæc theriaca ponatur. Quæ, R. castorei assæ, piperis, zingiberis, stiracis, opij omnium partes æquales, conficiantur cum melle & administrentur. Æger prætere a per aliquantum temporis à comestione abstineat, maneatque famelicus, & ingrediatur balneum, & utatur motu. Si autem nec sic quiescat, ferrum ignitum radici dentis multotiens apponatur aut eradicetur.

In hac secunda parte principali curat dolorem à causa frigida. Et dicit, quod si non fuerint signa caliditatis suprascripta, sed potius signa frigiditatis, & maxime quia dolor acciderit post fastidium, & satietatem nauseatiam, & post regimen & causas infrigidas, uenter ex pilulis cochij erit soluendus. Et radices dentium dolentium ex hoc medicamine fricandæ, & sinapis, pirethri, septaragi indi, quæ sunt signa quædam minuta similia garioph. cal. & sic, baurach, pro quo accipiat sal nitrum, piper, zingib. de his possunt accipi partes æquales, uel de magis cal. scilicet, in quarto sicut sinapi & piperis minor quantitas accipiat, & elaboretur, ut radici dentium aliquid adhæreat, postquam æger prius dentes colluerit ex aceto in quo pirethrum, mentastrum, & origanum cocta fuerint, & de foris panicum siue milium

torrefactum, & pauco uino & aceto dum torrefit aspersum, & in sacculo positum, & super loco dolente appositum. Item ex pipere puluerizato, & cum melle mixto, dens & eius radix fricentur. Et his non sufficientibus hæc theriaca in radice dentis, & circa dentem ponatur cum stuello corti in ea infuso. 12. castorei assæ pithri, zingib. stiracis, opij, omnium partes æquales, conficiantur cum melle, remouendo causam ac stupefaciendo dolorem mitigat, & dicitur theriaca per similitudinem, quia sicut illa iuuat in passionibus, contra quas inuenta est, sic ista in tollendo dolore dentium, & æger fameat, sitiât, exercitetur, balneum ingrediatur, scilicet stufam aut balneum aliud calidum & siccum & his non sufficientibus stilus ferreus ignitus radici dentis apponatur. Dolorem remouet, & dentem tandem cadere facit, aut eradicetur secundum quod dicitur in cap. sequenti.

Si uerò dens corrosus fuerit, repleatur ex medicaminibus quæ nominauimus, & quæ sunt corrosiua, aut abstrahatur.

Hic curat dolorem dentis à corrosione, aut putredine prouenientem implendo foramen ex medicaminibus ad hoc proprijs quæ aliquando sunt corrosiua, & consumuntia humiditatem putrentem & corrodentem substantiam dentis. Aliquando solum conseruatiua cum proprietate sua & cõuenientia in qualitatibus manifestis primis & secundis, tamen prohibendo ne cibis aut alia res putrens ingrediatur sicut est aurum, & dens extrahatur secundum doctrinam sequentis cap. &c. Cura doloris dentis à mala cõplexione sine materia quatuor exigit intentiones. Prima intentio est remotio causæ facientis aut conseruantis ipsam. Secunda est alteratio ipsius cum contrarijs. Tertia est prohibitio humorum à fluxu. Quarta correctio accidentium. Si ergo causæ fuerint primitiue sicut uentus aer frig. aut calid. & cibi & potus calefacientes aut infrigidantes, crapulæ ebrietates, & huiusmodi remoueantur, & similiter si causæ fuerint intrinsecæ, sicut feb. hydrops, retentio euacuationum conseruarum iuxta posse remoueantur, &c. Secunda intentio perficitur cum contrarijs tam ex parte regiminis medicinalis, quàm ex parte sex rerum non naturalium. In discrasia ergo calida teneat in ore aquam frigidam aut rosaceam, aut aliquam istarum cum tertia parte aceti permixtâ, aut succum aliquem frigidum sicut plantaginis, solatri, semperuiui, & similia, aut aliquâ decoctionem, sicut est decoctio facta ex rosis, myrto & folijs salicis, & similibus, & ex olijs est oleum immaturum, oleum ros. salicinũ, myrtinum, nenuphar. & apud maiorem necessitatem in frigidationis possumus addere pro qualibet 3. succi, aquæ aut olei, s. 3. camphoræ, & apud maiorem necessitatem profundationis, aut repercussionis, aceti, quod sit subtripulum aut subquadruplum ad illud cui admiscetur. Sed in discrasia frigida confert uinum calidum retentum in ore, & decoctiones ex rebus calidis, sicut ex sandaraca, mastice, saluia, hyssopo, zingib. pipere, pithro, & similibus, ex quibus 1. aut plura cum uino decoquantur, & his potest addi acetum pro octaua parte aut decima. Et theriaca & mithrida, super dentibus illinita conueniunt, & aqua

ardens est ultima. Si uerò causa doloris fuerit ficitas pura confert ut fricetur dens cum eis quæ sunt, sicut butyrum & adeps anatis. Et regimen sex rerum similiter ordinetur in contrarium discrasie, &c. Prohibentur autem humores à fluxu si suprascripta aliqua stipticitate participant, aut secum admiscetur acetum. Et si oportuerit fiant euacuationes & diuerse de quibus infra. Et corrigantur accidentia secundum quod oportet, & maxime uigiliet secundum quod dictum est superius, & maxime cum narcoticis, de quibus infra. Et prohibet materiam declinare ad dentes.

Si uerò dolor fuerit à mala complexione cum materia & propriè apostemare, exigitur duplex regimen. Primum tribus completur intentionibus, scilicet, euacuatione, diuersione, & fluxus prohibitione. Prima intentio perficitur cum phlebotomia ex cephalica si materia à capite rheumatizet. Sed si à membris inferioribus cum phlebotomia basilicæ aut saphenærum, & hoc si materia est sanguis aut mixta cum sanguine, & propriè apostemans, & reliqui humores cõ proprijs educantur, de quibus sæpe dictum est. Sed materia calida apostemantē potius conueniunt medicinæ lenitiuæ, scilicet aqua fructuum quæ cum manna aut casia permiscetur. Secundam rem complent uentofactiones factæ in spatulis, fricationes, extenuatum lotiones, curium ligaturæ dolorosæ, & ex diuerterentibus, & similiter eradicantib. materiam sunt incisio uenarum quæ sunt sub lingua, & in labijs & uentofactiones sub mento cum incisione & scarificatione gingiuarum, appositio sanguis in radicibus dentium. Et dixit Gal. quod si teratur allium, et ponatur in palma manus in parte domestica per noctem, & propriè in manu quæ sequitur dolorem dentis, tollit, & experitur est. Tertiā rem complent administrationes prohibentium fluxum materiæ sicut pilulæ opiæ alkaib quas fecit Alex. & posite sunt in cap. de catarrho. Regimen autem particulare diuiditur in curum ueram, & curam mendosam, ut est apud Mesue.

Cura autem mendosa dicitur, quia auferendo sensum sedat dolorem, sed non remouendo causam. Sic ut est suffumigatio facta cum hyoscyamo, & propriè cum cānula ueniente ad dentes posita super emboto. Et experitur est oleum ros. 3. s. cum 3. s. opij, scilicet linitum super dentes. Et loco ol. potest accipi syr. acetosus. Similiter pithrum & camph. æquæ libus protionibus. Et collutio facta ex aceto decoctio ne hyoscy. aut ex radice eius cum aceto & oleo ros. Et solatrum cum aceto est medicamen experitur, & hoc in causa cal. Sed in fri. est hoc medicamē. 3. hyoscy. al. opij. stir. galb. ana. 3. 1. pip. assæ foetidæ, & ex misce cum rob. & liniatur super dentem dolorosum. Castoreum quoq; & opium, ana. mixta cum ol. ros. & distilletur in aurem sequentem dolorem optime confert, & sufficiunt de ambobus duo. gran. simul. Item sagenea, troch. stellæ & philonium, & propriè si fuerit mixtum cum eis aliquantulum opij. Ex sedantibus dolorem illud quo communiter utor est oxy-mel scyllit. cum opio, ut puta, 2. 3. eius cum 1. gran. opij, & cum cotto in hoc inuolutio dens & radix eius inuoluatur. Et hæc sufficiunt pro cura mendosa.

Cura uera autem tribus completur intentionibus. Prima est repercussio conueniens in principio. Secunda repercussio cum resolutione mixta, aut maturat

tionē conueniēs usq; ad medium status. Tertia est resolutio aut maturatio deinceps conueniens. Primò completur cum his quæ repellunt materiam & confortant sua stipicitate, de quibus supra dictum est, saltem in causa cal. quantum est oportunitas. Sed in causa frig. in principio, fiat repercussio cum oleo ros. mixto cum mastice, aut sandaraca, aut cum ramich, id est cum mixtura facta cum passulis & gallis ex qua sigallia muls. & apud Auic. ex rebus forribus ad repercuciendum. Et propriè in materia frig. est alumin. adustum & extinctum cum aceto cum æquali quantitate de sale & administret, & postea collatur os cum uinum, & decoctio gal. in uino & aceto conuenit, & cum uinum est ad augmentum, administrandum est oleum ros. cum uino decoctionis, mast. aut cum uino decoct. passul. aut fœnug. Et sandaracha cum aceto est sublimis iuuamētū, prohibet enim rheumatizationē, strindum est ad resoluētia uel maturatūta sicut uinum decoctum, passul. sicum & fœnug. imò fœcus masticæ & in ore retentæ super dente dolor. maturant & sedant dolorem. Et ex maturantib. sedantibus dolor est ol. decoct. rad. althææ, fœnug. chamæm. melil. singulartiter aut coniunctim, & hoc in causa cal. sed in frig. cōuenit uinum decoctum hyss. alase, id est thymi, & suc. porri cum cotto, loco dolenti aplicius. Expertahabentia singularem proprietatē in sedando dolorem sunt multiplicia, scilicet colluuiōes oris appolita circa dentes suffum exterioris appolita, in aurem insill. Cauterizatiōes dentis & fricatiōes. Ex decoctionib. iuuantibus est acetū decoct. spoliū serpentis cum proprietate sua, & similiter decoct. rad. cappar. in ore retentum, uel super dente dolente appositum. Item cortex & lignum pini bullitū cum aceto, & radix collocynth. & pulpa eius similiter bullita, & acetū bullitum in testa colocynth. Huiusmodi autem quæ sunt cum colocythide quandoq; abhorrentur propter amaritudinem, & elebor. bullitus cum uino est ultimum. Item radix etiā raphani, folia almezereon, pirethrum zing. cucu. asi. harmel. id est ruta agrest. aristol. rot. hæc omnia singulariter aut coniunctim bullita cum aceto conferunt, & propriè in causa frig. Sed ex proprijs applicitis super dentes dolorē sedantibus est pinap. & assa. aut ferapinū, resoluunt enim dolorē congestum. Item oppoponacum cum pirethro, spoliū serpent. combust. & mixtum cum oleo ad similitudinem unguenti, & positum super dentes est mirabile in sedatione dolorosa. Et puluis factus ex origano & nitro super dentes & gingiuas aspersus mox tollit dolorem. Item. & pirethri staph. ana. 3. i. & fiat puluis subtilis, & cum cera incorporetur, ex qua cera dens uanitur. Et ex cōuenientibus leuibus multum iucomprimatur. Ex suffumigatis est semen porri cum pice suffumigatum cum traiectorio ad radicem dentium, tollit dolorem, & uermē occidit. Res autē quæ sunt euaporatio exterioris ad dolorem dentium sunt sicur malua, anethum, althæa, paritaria, camom. & melior. fœnug. sem. lini. sem. caul. sem. porri. &c. Ex his potest fieri emplastr. & similiter ex cape allo cum oleo chamæm. & anethino, aut oleo lilio. Et quandoque fiant euaporationes ex rebus siccis, sicut ex milio

pauco aut sale. Res autem quæ injiciuntur in aures & sedant dolorem, sunt sicut oleum de amygd. dul. & amar. & sambuc. quodcunq; horum coctum fuerit in cape cōcauo postq; secum permiscetur aliquid castorei, aut euphor. & quandoq; aliquid opij apud uehementiam doloris. Auic. confectio experta ad dolorē dentium difficilem & ad corrosiones. & castor. myr. opij, piperis galban. ana. cōficet cum rob. & fac ex eis trochi. & liniantur dentes. Et apud Auic. si causa doloris est uetustitas, resoluatur cum sagapeno galbano & granis alharmel, id est ruta agrest. & cornua cer. com bust. decoct. in aceto scyllit. deinde trita & cōfecta in oxymel. denti applicita sedant dolorē, & propriè ex corrosione etiam epar stellionis positum super dentem corrosum sedat dolorem. Et quandoq; uaporatur barba frequenter & emplastratur, ut ad ipsum trahatur materia: cum enim emplastratur barba, id est, locus exterior ex directo dentis dolentis sedatur dolor, & propriè cum cauterizatur dens cum oleo feruenti illa hora. Cauterizatur autem dens aut cum oleo feruente applicito cum extremitate stili cotto in uoluta, aut oleum feruens cum embuba insillitur in foramine dentis. Sed primus modus est melior, & quandoq; cauterizatur cum extremitate stili igniti, & propriè proueniente ad radicem dentis, aut ad partem putridam aut corrosum. Et bonum est ut gingiua & dentes sani defendantur cum peria in aqua ros. aut aliquo frigido infusa parti defendendæ applicita aut cum pasta, aut simili re uiscosa. Et quandoq; necessarium est ut perforetur dens perforatorio minuto, ut uirtus penetret cauterizatiua ad locum egrum. Et fricantur aliquando dentes ad excusionem materiæ in ipso existentis. Ex cōuenientibus ad fricandum est zing. & pirethrum in oxymelle iussum, & similiter acetum cum sale. Et suffumigationes, & propriè cum traiectorio conueniunt, & maxime si uermis adsit, sicut si fiat ex colocynth. aut granis eius, aut sem. sinapis, aut cape. Tertiū uerò regimen curat accidentia sicut uigilias cum his, quæ dicta sunt in capitulo proprio. Regimen uitæ declinet in contrarium discrasie, & cum sunt huiusmodi cauterizationes declinet ad frigidum & humid. & sit tenuis.

Cura corrosionis dentium tribus cōpletur intentionibus. Prima est euacuatio humiditatum putidarum cum eis quæ dicta sunt. Secunda est resolutio ipsarum ex ipsis dentib. ad quod ualet acetum, decoct. nigellæ cum cotto applicitū, aut nigella trita cum alchitrā, & super dente linita. Et similiter acetū decoct. cappar. aut zing. aut acetum solum, & oxymel scyllit. & est proprium, & epar lacertii inest proprietas in prohibendo corrosionem sicut fricetur dens corrosus. Tertia intentio est confortatio dentis & prohibitio corrosionis cum ex eis linif aut impletur dens corrosus. Et gallia sola prohibet putrefactionem, & caphora sola in causa cal. est ultima. Et hyoscyamo cum styrace mixto inest operatio mirabilis, cum per traiectorium dens corrosus suffumigatur.

Regimen autem implendo dentem corrosum est, ut impleatur in causa cal. cum frigidis, & in frigida cum calidis. Secundū, ut non impleatur cum labore & uehementia ad dente in dolore, & ex proprijs est gallia cum ciperis aut cum mastiche, & eligantur ex suprascriptis cal. aut frig. secundum oportunitatem in

contrarium discrasie dentis, sed ubi non fuerit multus recessus à mediocritate impleatur cum folijs auri.

DE EXTRAHENDIS DENTIBVS.

Cap. XLIX.

Medicamen quodcum in dente cor-
roso ponitur, ipsius sedat dolorē,
aut ipsum constringit. Sumatur chebichben-
gi, & piper, & trita, & alchitram con-
spargantur & impleantur ex eo. Medica-
men quod dentes debiles & qui sint extra-
hendi, ac dolentes eradicat. Cortices ra-
dicum mori & cappari, & pirethrum, &
lac tithimalli atq; lac anabulæ, & arseni-
cum rub. & radix colocynthis sumantur,
& trita ex tanto aceto quod eis sufficiat
conspargantur. Acetum quoq; per heb-
domadam unam simul in die ut prius adda-
tur, post hoc dentes in circuitu scalpentur,
& ex prædictis decies in die epithimentur
donec ad mouendum sint faciles, & sic ex-
trahantur. Aut epithimia fiat ex fece ace-
ti acutissimi per multos dies, & postea ex-
trahantur. Aut ranae fluuiales in oleo co-
quantur donec dissoluantur. Quandoque
neceffe fuerit dentium radices scalpentur,
& ex oleo isto multoties inungantur, donec
facile moueri possint, postea cum instrumen-
to euellendi dentes euellantur.

Causæ eradicationis dentium sunt tres. Prima,
quia sanitas nocuenti eius, & propriè doloris non
speratur, cuius signum potissimum est, quia quam-
uis aliquando medicinali auxilio sedetur, tamen pa-
rum post redit. Secunda quia timetur nocumentum
corrosionis, aut putrefactionis, aut aliud comunicari
dentibus vicinis aut mandibulæ. Tertia, quia fortè
impedit operationes in quas ordinatur, scilicet locu-
tionem aut masticationem, quare consilium est pro-
cedere ad ipsius eradicationem & propriè si causa &
nocumentum sit in substantia dentis. Si autem dens
sit sanus & nocumentum sit in gingiua uerisimilius
est eius eradicationem magis obesse quàm prodesse.
Si uerò causa nocuenti sit in nervo est indifferens
eius eradicatio ad nocendum & iuuandum. Iuuabit
enim primò, quia de materia per eradicationem re-
soluetur. Secundo, quia conuenientius est medici-
nas parti læsæ, scilicet, nervo applicare. Sed nocebit,
quia per dolorem extractionis, materię ad locum do-
lorosum attrahentur quæ erunt causa augmenti do-
loris, & quod communicetur oculo & cerebro, & for-
tasse febrium, syncopis, & epilepsiæ, & propriè si ante

extractionem aderit magnus dolor, & cum hoc
magnus superueniet causa extractionis, quia fortè
dens est ualde firmus & pluribus radicibus affixus
mandibulæ, etiam si dens ipse fuerit apostemofus aut
corrosus. Quare diligenter considera antequam ad
ipsius extractionem procedas, & alia medicamina
prius experire. Quod si consilium tuum omnibus
æquè libratum fuerit in ipsius extractione, hoc facito
quibusdam canonibus. Primus, ut præcedat eua-
cuatio cum phlebotomia, pharmacia, aut utraque se-
cundum exigentiam plethoriæ, aut cacochymia.
Secundus est, ut dolor si fuerit, fortis prius sedetur, &
si non cum alio saltem cum stupefacientibus. Mo-
di autem in extractione dentium sunt tres. Primus
cum ferro, sed prius debet fieri scarificatio gingiua-
rum & ligamentorum circa radicem dentis ligatum
dentem cum mandibula, deinde cum instrumentis
ad hoc proprijs extrahatur, quorum figuras uides in
margine. Secundus modus est cum cauterio actua-
li, ut cum stilo ignito multoties applicito in forami-
ne dentis si quod est, aut si non est circa radicem den-
tis, nam per hoc fortè sedabitur dolor, & cader dens
in processu temporis, & uicem huius supplet oleum
seruēs cum cotto in extremitate filii inuolutum mul-
totiens applicitū denti dolenti, aut cum moleta mul-
totiens applicetur granum olibani seruēs figuratum
secundum exigentiam partis cauterizandæ, & hæc
cum hoc quod faciunt dentem in processu dierum ca-
dere, dolorem sedant. Tertius modus est, cum medi-
cinis ad hoc proprijs, quarum quatuor describit Ra-
sis in præsentī capit. Prima sumatur chebichben-
gis id est apium, & propriè syluestre, & maximè radix,
quæ est calida usq; ad tertium gradum, & sicca in se-
cundo, corrosiua, frangens dentes, & piper calidum
in quarto faciens cadere dentem, consumendo humi-
ditatem substantiam ipsius, & ligamentorum, & tri-
ta incorporantur cum alchitra, id est, piceliquida, & tri-
ta circa secundum gradum posita, ut medici-
nas faciat denti adherere. Impleatur dens corrosus ex
hoc, aut circumuoluatur. Dicitur etiā de apio, quod
appensum collo tollit dolorem eius. Secunda, quia
eradicat debiles dentes, aut dolentes qui sunt extrahi
difficili, & corticum radicum mori frig. & hum. cuius ra-
men fructus est cal. & hum. si dulcis sit: si uerò acerbus
frig. & hum. radicum capparis, de quibus supra, piper
thiri, lactis tithimalli, lactis anabulæ, arsenici rub. cal.
& sic. in tertio, radices colocynt. ana. & trita cum ran-
to aceto quod sufficiat ad incorporandum omnia, in
modum unguenti misceantur & detibus applicentur.
Tithimallus autem habet septem species, quarum u-
na est anabulæ lac autem cuiuscunque speciei ipsius
tithimalli est cal. & sic. in tertio corrosiuum, & faciens
cadere dentes consumendo humiditatem substantiam
eorum & suorum ligamentorum, acetum autem
tem quod singulo die per hebdomadam addi debet,
iuuat ad faciendum uirtutes aliarum medicinarum ex-
penetrare, & cum hoc humidum substantiam ex-
car, & hoc unguentum maximè imprimit dentibus
in circuitu scarificatis, & multotiens applicitur hoc
unguentum cum cotto in eo infuso dentem circundan-
te donec facile moueatur & sic extrahatur. Tertia
medicina est, ut fiat epithimia ex fece aceti acuti, per
multos dies, & propriè scarificatis dentibus, ut prius.

Quarta medicina est, ut ranæ fluuiales in oleo coquantur donec dissoluantur, & scarificatis dentibus ex oleo isto multotiens inungatur donec facile moueri possit, & postea cum instrumento facile extrahatur, imò cū digitis aut sola fili suspensioe aliquantulum impetu in rectitudine ipsam trahendo. Melior tamē est adeps ranæ uiridis habitantis in arboribus, & propriè si misceatur cum lacte tithimalli, cum autem hæ operationes fiunt, dentes alij teneantur ne nocumēta eorum, quæ applicantur eis communicent. Et dentibus euulsis cum ferro teneat in ore acetum infrigidatum decoct. gallarum aut balauft. sed pauca acuitatis, aut cum aqua rosacea mixtum. Et si dolor adsit oleum rosaceū solum, aut decoct. mastichis quomodo cūq; extracti sint, aut lac in ore teneatur.

DE CONGELATIONE ET STVPORE DENTIVM. Cap. L.

Portulaca & amygdalæ amaræ mastificentur, aut his similia. Aut fiat fricatio cum sale. Et masticeatur cera.

Congelatio dentium siue stupor est diminutio sensus tactus accedens dentibus.

Causa eius est mala complexio, secundum plurimum frig. cum asperitate quadam in superficie dentis quæ sit, aut à causis extrinsecis sicut rebus acetosis, acerbis, ponticis, & stipricis mastichatis, aut in ore relictis. Quandoq; uerò ab humoribus uenientibus ad dentes sub forma uaporis, aut humorum à stomacho uel à capite, quæ acerositate uel acredine, uel ponticitate participant. Quandoq; uero ab imaginatione, sicut cum uidemus coram nobis aliquos mastichantes res res acres, huiusmodi imaginatio facit dentes stupefieri, siue hoc immediate faciat, siue mediatè similem humorem, scilicet acetosum, acrem, &c. ad dentes attrahendo. Et quandoq; fit propter nerui oppilationem, aut aliam malam dispositionē siue propter alias causas non faciat huiusmodi stuporem postq; sequitur malam complexionem frigidam. Respondetur qd huiusmodi acetosa & pontica cum hoc quod inducunt givæ superficies, &c. Et fortè bene consideranti apparebit stuporē dentis esse duplicē. Quidam dicit purā diminutionē sensus tactus, sicut qui provenit ex oppilatione nerui, quidam cum diminutione quandam tristem sensationem, quæ est actio corrupta sensus tactus ipsius dentis. Et prima posset cōtingere ex aqua frigida diu applicata. Secunda exigit præter diminutionem sensus causas inducentes huiusmodi tristem sensationem in superficie dentis & gingivæ.

Signa quod stupor sit ex nocumento dentis cognoscitur ex ipsius diuturnitate, & præcesserunt nocumenta dentis. Sed quod sit per cōmunitatem à stomacho, aut capite declarant nocumenta præcedentis ipsæ semetipsas declarant.

Prognosticum secundum plurimum curatur satis facilliter, nisi sequatur malam nerui dispositionem, & præcipuè eius oppilationem & solutam continuitatem, cuius cura sit difficilis. Cura. Mastichatio porulæam remouet sua uiscositate attrahendo quod in

dente impressum est. Et Auic. 2. can. & Serapio dicunt quod hoc facit sua substantia uiscosa remouendo asperitatem ab huiusmodi acerbis & ponticis derelictam. Et similiter hoc facit mastichatio cere casei, & similibus uiscosorum. Amygdalæ autem amaræ masticate hoc faciunt partim sua caliditate, partim sua adhærentia & uiscositate. Sal autem fricatum sua caliditate & siccitate alterando malam complexionem frigidam, resoluendo quod ex humiditate subtili stupefaciente in dentibus est impressum, aut in superficie inuiscatum. Et panis calidus hoc idem facit sua caliditate actuali & adhærentia. Et in summa omnia cal. & sic curant calefaciendo & resoluendo humiditatem dentibus impressam & remouendo malam complexionem frigidam. Et omnia uiscosa sua adhærentia extrahendo quod dentibus est affixum, & quæcunque nerui oppilationem remouent sunt in hoc proficua si ab eius oppilationem confurgat.

De stupore tamen superius est actum sufficienter in proprio capitulo.

Oleum calefactum in panno de super est ponendum. Aut uitellus oui assatus calidus multotiens masticeatur. Aut calidum panem multotiens mordeat. Aut fiat fricatio ex balsamo, aut oleo de lilio syluestri.

Hæc dispositio ab Auic. nominatur eber dētium, & est ut dentes non tolerant calidum, neq; frigidum, neq; durum. Huius enim causa immediata est debilitas dentis, quare facilliter patitur à quibusdam occurrentibus. Causa autem debilitatis est triplex, scilicet frigiditas. Et est secundum plurimum propter complexionem dentium sua simboleitate facile labentem ad frigidum. Et aliquando, sed rarè est caliditas. Et tertio sed rarissimè est nimia dētis sensibilitas cum raritate texturæ ipsius, unde à quibuscumque notabilis impressio facillè patitur. Et frigid. cognoscitur ex colore gingiuo albo uel fusco, sicut calid. cognoscitur ex colore rubeo uel citrino.

Secundo cognoscitur utraq; ex sensatione caliditatis aut frigiditatis. Tertio ex causis præcedentibus. Quarto, quia iuuatur à contrariis & offenditur à similibus. Sed raritas texturæ cognoscitur ex diuturnitate huius passionis, aut fortè quia contracta est à principio generationis cui parum remedia proficiunt.

Prognosticum. Hæc passio cum est à raritate texturæ difficilè curatur. Sed si pendeat ab alijs causis satis facilliter. Secundum, hæc dispositio frequenter nunciat & præcedit dolorem.

Cura. Si sit à caliditate uel frigiditate cum materia, est ut post euacuationem & diuersionem factam secundum exigentiam humoris peccantis, quælibet istarum cum suis contrariis remoueatur, frigiditas quidem, cum panno uel cotto in oleo infuso, & dentibus applicito. Et est primum remedium Rasis.

Secundum est ut uitellus oui assatus donec induretur existens multum calidus masticeatur. Tertium est ut panem calidum multotiens mordeat. Quartum est ut fiat fricatio ex balsamo calido in tertio, aut ex oleo de lilio, pilio syl. calid. in secundo, quæ tamen

actu calida applicentur. Et per huiusmodi intelligere potestis multa alia cal. & pprie uiscositate quadā participantia, quæ etiā proprietatē habeant in sedatione doloris sicut sunt oleagina, remouent enim frigid. & materiā si qua sit resoluunt & dentem confortant. Si uero sit calid. confert oleum rosac. cum camphora uel sandal. Item portulaca masticata, & semen eius & est propria & his similia. Si uero sit à nimia sensibilitate cum raritate texturæ confortetur dens cum moderatē stipticis & uiscosis, & sensus obtundantur, etiā si oportuerit cum leuiter stupefacientibus.

DE ANATOMIA ORIS.

Cap. LI.

Iuxta morem consuetum nobis premitenda est anatomia oris & reliquorum membrorum quæ in ore continentur, præterq; dentium, quia de ipsorum anatomia actum est. Os enim descriptiue est uas uniuersale membrorum locutionis in homine & uociferationis in reliquis animalibus uociferantibus ex sufflatione, ad retinendum cibum donec masticetur & deglutiatur, & retinendum aerem pro euentratione cerebri & membrorum spiritualium, & ad expulsiōem superfluitatū quæ per meri cannam pulmonis & colatorium ad ipsum deferuntur finaliter ordinatum. Labia uero quæ sunt anterior pars ipsius sunt composita ex cute, carne, neruis & panniculo interius tegente, qui est continuus cum palato, panniculo linguæ & meri ad os stomachi. Et propterea ante uomitum propter hanc continuationem tremit labium inferius. Et est designis uomitus proxime futuri. Hæ autem habentes partes labia componentes, sunt adinuicem mirabiliter contextæ, ita ut non possint separari. Hoc autem factum fuit, quia labia debuerunt moueri ad omnem differentiam positionis secundum exigentiam locutionis. Si ergo in ipsis fuissent muscoli pro his motibus necessarij nimis labia fuissent crassa, quod ualde fuisset indecorum. Et propterea nerui fuerunt cum his partibus admodum diuisi, ut cum subtilitate labiorum seruarietur motus uoluntarius. Ex quo patet quod labia sunt calida & humida propter carnis dominium. Et in ipsis sunt quatuor uenæ dictæ alieneri, duæ in labio superiori ab utroq; latere superiori una, & duæ in inferiori similiter partitæ, quarum phlebotomia ualet multum in ægritudinibus oris & partium eius, &c.

DE AGRITVDINIBVS LINGVÆ.

Cap. LII.

Lingua uero est membrum instrumentale in ore constitutum figuræ oblongæ ex carne, panniculo uenis, & arterijs, & nouē musculis compositum ossi lambdæ in parte posteriori alligatum. Ad gustum, locutionem, cibumq; uoluendum pro masticatione finaliter ordinatum. Fuerunt autem tot muscoli in lingua, quia debuit ad omnes differentias positionis moueri secundum locutionis exigentiam. Et habuit plures uenas, arterias & neruos q; aliquid aliud membrum respectu suæ molis. Est autem organum gustus per neruos uenientes à tertio pari neruorum cerebri, & habet motum uoluntarium per neruos uenientes à septimo pari neruorum cerebri. Circa radicem eius ab utraq; parte sunt carnes glandosæ ad hoc ordinatæ, ut humiditatem salualem genera-

rent pro humectatione linguæ, ne tot motibus excutatur. Generatur autem in eis salua ex uaporibus undecunq; ad illas partes eleuatis, et ex rheumatismis à capite descendentibus. Et in illis carnis glandosis sunt duo foramina in quæ posset ingredi stilus, per quæ humiditas salualis ad linguam distillar, & cutis lingue est diuisa in duo media coram commissura corronali. Et inter illa duo est communitas in ligamentis & continuatione. Sub lingua uero sunt duæ uenæ uirides magnæ, ex quibus procedunt uenæ plures, & uocantur raninæ. Et melior linguarum secundum potentiam bene loquendi est commensurata, id est, mediocris in longitudine & latitudine sua, & subtilis ad extremitatem suam anteriorem. Illa enim quæ magna est & lata ualde & crassa, aut parua sicut spalmata, non est conueniens ad locutionem. Et ex his patet linguam esse calid. & humid. in complexionem. Et potest pati omne genus ægritudinis, &c. Et patet eius colligantia cum cerebro, epate, corde, per neruos, uenas & arterias, & cum stomacho mediante meri, & cum pulmone & membris spiritualibus per cannam pulmonis. Et propterea signa sumpta à lingua sunt ferè in quacunq; ægritudine efficacissima. Postea sunt dentes quorum anatomia præcessit. Et postea est palatum habens concauitatem in cacumine superiori ut fiat uocis intonatio & reuolutio agilis cibi quando dentibus conteritur. Et in fine palati est uulua pendens in modum grani uitæ, ideo uocata est uulua existens rara in substantia, & spongiosa, quia principaliter facta est ut superfluitatem descendentem à capite hora rheumatismi recipiat ne ad membra inferiora descendat, & propterea frequenter apostematur. Est etiam formata ut uocem modulat refrangendo aerem qui est materia uocis.

Tertium iuuamentum est ut aerem qui ad pulmonem uadit, & attrahitur per nares & os repercutiendo aliquandiu in ore retineat ne frigidus, sed alteratus ad pulmonem deueniat. Et propterea cōtingitq; habentes abscessum uuluum multum sunt catarrholi, & ideo prohibetur ab auctorib. ne incidatur. Sed si sit putrida uel apostemata debet adurri semper dimittendo tantum de ea ut possit ad supra scripta iuuamenta deferuire, quod posset fieri cum cauterio actuali & c. nula ænea, lutata luto sapientiæ. Et cum potentiam siue cum cannula, siue sine cannula, & cum ista ut puta cotto in extremitate stili imposito, & in aqua forti intincto, & pluries applicito secundum exigentiam siue cum cannula, siue sine cannula, & cum ista etiam potest abscondi si nimis elongatur, & pendens posita sub ipsa aliqua lamina ferrea, super qua adhaereat, & non debet scindi propter multitudinem sanguinis egredientis difficulter constringibilis, & quia difficulter consolidatur propter situm suum & modum substantiæ, unde perpetuo sanies emanat & sequitur fœtor oris perpetuus. Post uuluum sunt fauces dictæ pharynges, & sunt loca ampla, glandosa, ex utraque parte colli apta suscipere superfluitates cerebri imò sunt emunctoria cerebri, ideo frequenter apostemantur, & apostema earum licet non emineat extra, eminet tamen intus, & ideo si os aperitur & in profundo aspicitur. Apparet tumor, & fit ibi una species synanches, quæ in uulgari nostro dicitur gation, & in fine istarum existit principium cannae & meri de quorum anatomia infra dicitur.

DE PVSTVLA LINGVÆ.

Cap. LIII.

PVstula lingvæ quasi parum apostema & bo-
thor lingvæ sunt termini synonymi signifi-
cantes hanc dispositionem, quæ diffinitivè est
pustulæ multiplicatæ in partibus oris. Bothor enim
Arabice idem significat quod pustula latine.

Species harum sunt secundum diversitatem humo-
rum, scilicet sanguinæ cholericæ, phleg. & melanco-
licæ. Item quædam malignæ herpeticæ, quædam pau-
cæ malignitatis. Causæ sunt quædam extrinsecæ si-
cut constitutio pluviæ, calid. & humid. dispositio-
nes ad humorum putredinem. Similiter cibi in sto-
macho corrupti & propriè ad putridum & fumo-
sum, licet etiam corruptio ipsorum ad acerosum ali-
quando possit esse in causa, & propriè corruptio la-
ctis in stomachis puerorum lactentium, siue propter la-
ctis dispositionem, siue suorum stomachorum disera-
tas, aliquando causæ sunt corporeæ duplices existen-
tes per communitatem aut à toto sicut in feb. acutis &
propriè pestiferis. Et sicut in speciebus hydropis, aut à parte, maxime à stomacho & capite propter va-
pores elevatos ab humiditibus putrentibus, in ipsis &
communicatis partibus oris. Et aliquando propter
humores à capite rheumatizantes. Similiter potest fie-
ri communicatio à ceteris membris. Hi autem vapores
ad os perveniētes faciūt pustulas duobus modis,
aut quia fixi in partibus cutis oris quæ subtilis est &
tenuis, postea in crassati reducuntur siue condensan-
tur in humore à quo elevati sunt. Aut quia inficiunt
partes oris quas attingunt taliter ut illarum partium
humores male dispositi faciant has pustulas. Ali-
quando vero causæ sunt per essentiam in ore, scilicet
talis dispositio humorum in unguis oris confectorum
talis ut natura moveatur ad ipsos expellendos, & sic
expulsi faciant has pustulas nulla alia causa corporea
precedente.

Signa harum pustularum habentur ex relatu ægri
& visu, quod sunt sanguinæ ex colore rubeo purpur-
reo cognoscitur, & quod sunt cholericæ ex colore ru-
bo rudente in citrinum, & phlegmaticæ ex colore al-
bo, & melancholicæ ex fusco siue nigro, quod sunt
malignæ cognoscitur, quia procedunt dilatando se
& corrumendo partes vicinas, & quia tendunt in
nigredinem, quod pendeat à causis primitivis de-
clarat præcessio illarum. Et quod sunt per communi-
tatem à toto declarant ægri tudines totius, & simili-
ter quod sunt per communitatem ab aliquo mem-
bro declarat præcessio male dispositionis illius mem-
bri, cum cuius cremeto augetur, & decremento mi-
nuitur. Quod autem sint per essentiam in ore de-
claratur ab absentia aliarum causarum, quæ sunt per
pustulæ nigra huiusmodi multiplicatæ in ægri tudine
nigra acutis mortem in brevi securam pronunti-
at. Secundum. Cum huiusmodi pustulæ maxime
terius in labijs, & circa ipsa magis attinet saluti quam
morti. Significant enim dominium virtutis super
materiam, sicut in casu priori cum nigrae sunt, & inte-
rius factæ significant malignitatem materiæ propter
nigredinem & virtutis impotentiam, quia natura nō

expulit exterius, quapropter oportet ut cito succum
bat. Sed quia ad huiusmodi pustulas sequitur secun-
dum plurimū ulcera oris, de his ulceribus quæ apud
Avic. & Arabes vocantur alchola est agendum.

Sunt enim ulcera existentia in cute oris & lingvæ
cum expansione & dilatazione & eius species sumun-
tur ab humoribus, sicut dictum est in pustulis. Et
malignius omnibus est melancholicum, & fit ex me-
lacholia adusta, sicut phlegmaticum fit ex phlegmate sal-
so, &c. Causæ & signa sumuntur secundum quod
dictum fuit supra in pustulis, non est enim differentia
nisi quod ulcera sunt cum sanie & pustulæ non, nisi ul-
cerentur, & de consuetudine Avic. est ut nominet ea
colaham dum in superficie perseverant. Quando-
que putrefiunt & submerguntur, se profundantia &
dilatantia non nominat colaham, imò ulcera mali-
gna herpetica, & indigent medicinis cauterizantibus,
& possunt huiusmodi ulcera incipere absque præ-
cessione pustularum.

Prognosticum. Omne ulcus veniens in superficie
oris est velox ad dilatandum, propterea quod non
deficit ei calid. inseparabilis & cutis humida lenis, &
sic intellige in ceteris membris similibus, sicut vulva
& ueretro. Reliqua prognostica sumuntur, ut di-
ctum est in pustulis.

Si pustulæ fiant rubæ. Sumantur an-
theræ, amyli, spodij, lentium excorti-
catarij, sem. portulacæ, coriandri sicci, sem.
scenæ de Mecha, omnium partes æquales,
camphoræ parum, ex his pulverizatis fiat
fricatio. Et cum aceto mixta & oleo ro-
saceo in oleo teneantur. Et sanguinis minu-
tio cum umentosis fiat. Albæ uero si fue-
rint pustulæ cum sale & melle fricentur.
Et fiat syrupus acetosus. Aut almuri
in ore teneatur.

Hoc capitulum habet duas partes. In prima po-
nit curam pustularum calidarum, quæ sunt sangui-
næ aut cholericæ. In secunda ibi. Albæ uero.
Ponit curam phlegmaticarum. Et patent omnia.
Anthera est semen rosæ colligendum in autumno ex
quodam fructu rubeo nascente in extremitate rosarij
in cuius parte intrinseca sunt semina dicta anthera cum
multa lanugine, & est frigidum & siccum & stipiticum,
sicut cætera quæ hic ponuntur præter semen portu-
lacæ quod est frigidum & humidum, & semen scenæ
de Mecha, quod est calidum & siccum, & dicitur de
Mecha ad differentiam scenæ de Arabia, quod non
est ita bonum. Camphora autem fit subdecupla ad
quodlibet aliorum. Et melius est ut in regione nostra
sic hæc mixtio sine oleo rosaceo propter abominati-
onem. Quid dicat in secunda parte manifestum
est. Almuri est balsamentum factum ex piscibus sal-
sis cum aceto mixtis & speciebus. Et syrupus ace-
tosus de quo sequitur, maxime fit mellinus, licet eti-
am saccharinus conveniat.

Harum pustularum cura triplex exigit regimen. Primum est uniuersale complendum per euacuationem, diuersionem, & membri mittentis correctionem.

Vnde pro prima intentione fiat phlebotomia, & aliorum humorum euacuatio secundum quod expedit, de quibus dictum fuit sufficienter in multis ex praecedentibus cap. Et communiter euacuantur humores adusti & corrupti. Pro secunda intentione apponatur uentosa iuxta textum in spatulis uel in nocrea uel sub mento, uel apponantur sanguisugae, uel phlebotomentur uenae illarum partium. Et sic discurrere per alia genera diuersionum, ut supra in alijs cap. Pro tertia intentione corrigantur aegritudines totius, sicut febres & species hydropsis & similes, & reliquorum membrorum communicantium, sicut stomachi & cerebri, secundum quod dictum fuit supra.

Secundum regimen completur primo per eradicationem materiae coniunctae, quapropter fiat phlebotomia, aut uenarum sub lingua, aut uenarum aliene rim quae sunt in labijs, aut fiat scarificatio partium laesarum. Et hac intentione opus est cum iam adest materia notabilis quantitas in partibus illis siue ibi congesta sit, siue aliunde defluxa. Si uero non, sed incipit fluere, opus est ut repercutiatur in principio postea resoluatur aut suppuretur.

Singularia uero conuenientia in principio cum opus est in frigidatione & exiccatione, sunt apud A. mirobalan. sem. ros. sief memithae, tragagan, balau. duo sandali, rosae, spodium, sumach, lentes, lutum, armen. capita gran. corticum glandium & cadmia. Item suc. frigid. sicut lactuca, solatri, uirgae pastoris, portulacae, extremitatum uitis, camphorae, rob de ribes, rob acetosae, rob de moris syluest. succ. & rob. gran. & agrestae, & sorbarum, pirorum, & similia stipticorum. In processu conueniunt gallae, fructus tamariisci, ciperum, nux cupressi, folia oliuarum siccar. Et in fine cortices nucis mus. garyophil. mentastrum, gallia, & huiusmodi, quae conueniunt in processu, uel in fine in causa calida. conueniunt in principio in frigida. Et tua interest miscere calida cum frigidis secundum oportunitatem & temporum aegritudinis, & mixtionis materiae: Sed chelidonia, gallae, alchana, id est arbor cypria conuenit in principio, in utraque materia, similiter myrtus & acetum quod secundum plurimum cum his medicinis debet esse permixtum, & chelidoniae cum rebus stipticis inest uirtus mirabilis in alchola, & similiter camphorae, ubi opus sit multa in frigidatione. Si uero huiusmodi pustulae suppurentur, addi uetetur huiusmodi suppuratio cum lacte & proprie asinino retento in ore. Item cum mucillaginibus sem. althaeae maluae, lini almaru, id est, linguae bouinae, semin. citoniorum, aut cum horum decoctione, aut passularum, & apud A. quidam sublimiū medicorum dixerunt non esse aliquid magis ultimum in cura bothor oris quod oleum de schinacho tepidum in ore retentum. Cum autem ex his pustulis facta sunt ulcera, uel forte ulcera inchoarint ab initio, tunc considerandum est, an huiusmodi ulcera calida sint, id est facta ab humoribus per se calida aut frigida, id est facta ab humoribus, per se frig. qui tamen secundum plurimum habent caliditatem accidentalem per adustionem aut putredinem acquisitam. Calidorum quidem cura perficitur tum medi-

cinis superius dictis in causa huiusmodi bothor cal. antequam ulcerentur. Sed eligantur medicinae magis sic. Et ad hoc sunt propria, quae sunt dicta in textu in curatione eorum, quae pendunt a causa calida.

Si tamen notabiliter saniosa uideantur, praecedat mundificatio cum aqua sacchari, aut syr. acetoso simpliciter. Sed frigid. phlegmatica exigunt duplicem intentionem. Prima est mundificatio perficienda cum medicinis absteruis & exiccatis, sicut est oxymel simplex, aut scylit. quae etiam apud necessitatem poterunt permisceri cum aqua oliuarum salutarum. Item potest fieri oxymel cum uino, & potest huic addi modicum aluminis, aut colchotar, id est uitrioli. Secunda intentio perficitur cum exiccantibus, & consolidantibus, sicut uinum stipticum, decoct. gall. cyperi fructus, tamari. nucum cupressi, & similia. Melanchol. uero maligniora praecedentibus exigunt duplicem intentionem. Mundificationem perficiendam autem medicinis multum absteruis, imò uirtute corrosiua participantibus sicut acetum, decoctio gall. aut memithae quae est species chelidoniae, auralemezereon cum melle quibus in decoctione potest addi almu. & colchotar et passulae. Vnguentum quoque Aegypt. cum aceto permixtum est ad hoc efficax si loca ulcerata inungantur. Secundò, ardor mitigetur cum lacte in ore retento, aut cum aqua albuminis oui in ore retenta, aut aqua plantaginis, solatri, & similia. Tertiò consolidetur cum his quae dicta sunt & dicuntur.

Si uero alchola fuerit herpeticum malignum similiter triplicem exigit intentionem. Prima est mundificatio partium corruptarum, cum administratione unguenti Aegyptiaci aut fortioris facti, scilicet ex melle, alumine, uitrioli aeris ana, quibus pro unaquaque uncia addantur 3. aceti acuti, & bulliant, donec habeant mellis spissitudinem, & cum cotto super parte corrupta imponatur. Et aquae fortes & caeterae medicinae corrosivae superius in cura polypi memoratae huic loco accommodantur. Et similiter medicamen corrosiuum postmodum à Rasi in capitul. sequenti de gingiuis sang. & est efficax ad hoc propositum. Vitriolum quoque cum aceto habet mirabilem proprietatem in his alchola cum sint maligna. Similiter administratio floris aris cum colchotar, & gallae in syrupo acetoso. Et gallae coctae cum aceto & sale conferunt omni alchola malignae, & cinis almezereon habet proprietatem mirabilem in alchola etiam maligno, & proprie cum aceto aut oxymelle. Et si os esset contaminatum cauterizetur cum ferro ignito, aut procurentur eius squamationes cum uitriolo, aut alumine combusto. Et hoc cauterium actuale est magis proprium quam caetera in rectificatione huiusmodi herpetes, & optimum est in huiusmodi herpetibus, quousque sedata est malitia ipsorum. Ut frequens fiat collutio oris cum aceto salito tepido, & proprie ante impositionem medicinarum, de quibus supra. Secundò escara remoueat, & dolor mitigetur cum lacte in ore retento, & multoties permutato. Tertiò consolidetur cum his, quae dicta sunt, & dicuntur. Ex expertis in consolidando huiusmodi ulcera cum sunt cum caliditate & superflua est cerusa cum aqua rosacea aut aqua albuminis oui, aut suc. citon. aut uino granatorum, & similia applicita. Sed cauendum est ne deglutiantur.

Ecmineralia frigida propriè & abluta sunt ad hanc intentionè efficacia. Aliud in causa calida. R. sumach ros. sic. ana. 3. i. spodij, balauftij ana 3. s. ramich. 3. i. tere & accipe ex eo parum, & frica locum alcholatum uel puluerem hunc misce cum rob. citon. & fiat ex eis oris collutio frequenter. Aliud frigidius. R. sem. ros. amyli, sumach, sem. porri, lentiũ ex corticatariũ, spodij, alchanae, balauftij ana partes æquales, camphoræ partem i. quartam, ex medietate huius crasso modo contuli fiat decoctio in aqua cum quarta parte uini granatorum, & os sepe colluatur, deinde cum alia medietate pulueris fiat aspersio loci alcholati, & sic frequenter nunc unius, nunc alterius fiat administratio. Sed conferens alchola phlegmatico & huiusmodi. R. memithg. id est, radices chelidonis, corticum radicum capp. colcothar ana partem s. aluminis, balauftiæ, partis unius tertias duas, alchana partem semis, confice cum aceto & melle, & applica.

Si uero alchola fuerit permixtũ ex cholera & phlegmate. R. chelidonæ, hief memithgæ, spodij, sem. planraginis, sem. rosarum, & capitum earum: mirob. citri norum, balauft. foliorum oliuarum syluest. sic. carmezit, id est fructus tamarisci, aluminis, iameni an. te rantur & misceantur, & possent administrari sub forma pulueris, & sub forma unguenti conficiendo cum syr. acetoso simplici. Medicamen conferens alchola nigro & herpetico. R. fol. oliuarum sic. foliorum ranic, ficorum, acaciæ ana 3. 8. aluminis, iameni, colcothar ana 3. 2. croci 3. i. terantur & administrantur, aut sub forma pulueris, aut sub forma unguenti conficiendo cum melle uel oxymelle. Cum autem ulcera hęc sint melanch. confert ut cum alijs misceantur pastulae & semen scenæ de mecha. Hic plures medicinae possunt quibus utendum est, nunc una, nunc alia, secundum corporum & ulcerum diuersitates, in corpore enim magis molli, sicut sunt pueri minus sic. bus minus humidis & minore putredine participantibus. Ecin contrarijs contraria, &c. Vltimum autem regimen exigit duplicem intentionem. Correctionem accidentium perficiendam secundum ipsorum exigentiam. Secundò, debitum regimen quod ordinetur in contrarium discretiæ, debet enim secundum plurimum declinare ad frigidum & siccum.

Et in lactentibus caueatur corruptio lactis, alterando discretam stomachorum eorum, & ipsorum stomachis confortando & nutriendo nutritic. cum his quæ prohibeant corruptionem lactis & sint contraria discretiæ per quam corrumpitur lac. Et diarrhoron cum oxymelle est mihi expertum linitum in alchola puerorum.

DE EXITV SANGVINIS GINGIVARUM. Cap. LIII.

Cum ex gingiuis sanguis subtilis continuè manauerit, utriusque arsenici scilicet rub. et citrini, calcis gallarum, aluminis, omnium partes sumuntur æquales, ex quibus puluerizatis, & cum aceto mixtis parui formantur trochisci. Cumque

necesse fuerit, ex eis puluerizatis sumatur quantum sexta pars drach. i. fricentur ex eo optimè, & permaneat sic parum, deinde teneatur oleum ros. in ore. est enim hoc mirabile ad hanc ægritudinem curandam, & putredinem & herpetem estliomenum qui est in ore.

Sanguis potest exire ex gingiuis duabus ex causis. Aut à causa extrinseca sicut à percussione, casu & offensione. Et de huiusmodi exitu sang. non est sermo hic. Et potest exire à causa intrinseca dupliciter. Aut propter multitudinem sang. quapropter tumescunt gingiuae & uenę scinduntur, aut earũ orificia aperiuntur. Aut subtilitate sua sanguis refudat, & de hoc etiã non est hic sermo, facile enim curatur cum phlebotomia manus & aliarũ uenarum, & scarificatione gingiuarum siue sanguisugariũ applicatione. Sed quandoq; sanguis egreditur propter corrosionem factam in gingiuis in materia acuta cholericã aut sanguinea, phlegmat. falsa, & aliquãdo melancholica adustione participante. Quapropter corrosione paulatim se dilatante & profundante sanguis effluit & magis subtilis propter corrosionem uenarum capillarum, in quibus hic sanguis continetur. Et differt à putredine gingiuarum in qua scilicet gingiuae putrescunt, & caro putrefacta remanet ibi, & non dissoluitur sicut in corrosione. Vnde corrosio provenit à fortiori calido.

Et de sanguine hoc tertio modo fluente, scilicet per corrosionem est hic sermo in hoc cap. Est enim hęc corrosio quandoq; ulcus corrosiuum, quod aliquando est in superficie. Aliquando magis profundat, licet quando est in superficie non appelletur ulcus ppter paucitatem saniei inde egredientis, sicut nec superficialis excoaratio uesticæ aut intestinorũ dicitur ulcus. Sed in ueritate ubicunq; sit solutio continui cum sanie ibi est ulcus. Hęc autem corrosio aut putrefactio siue sit cum sanie, siue sine sanie, aliquando est superficialis, aliquando profunda, imò aliquando ossi mandibulæ communicata. Huius causę sunt proportionales illis quæ dictę sunt superius in alchola, & propriè maligno & herpetico, et similiter signa sunt illis proportionalia.

Prognostica. Si superficiales sunt & in principio facilliter curantur. Si autē sint profundę, & propriè ossi mandibulæ communicatę, difficulter curantur.

Cura quantũ ad regimen uniuersale ex euacuatione, & diuersione, & membrorũ mittentũ rectificatio ne, est proportionalis curę alchola. Similiter quantũ ad regimen locale exigit tres intentiones proportionales illis quæ dictę sunt in alchola herpetico, primò mundificatione siue cauterizationem partis corrose, aut putridę, secundo doloris mitigatione, & partis cauterizatę remotionem, tertio consolidationem.

Prima completur cum illis, quæ dictę sunt superius in alchola herpetico. Sed Rasis in præsentī cap. ponit medicinam cuasticam satis potentem. Cum ex gingiuis sang. subtilis assiduè manauerit, scilicet per corrosionem, utriusq; arsenici, scilicet rub. & citrini. quæ sunt calida in tertio, sicca in secundo, corrosiua & caute-

rizatiua, calcis calid. & sic. in quarto, gallarū frig. & sic. in secundo, aluminis de roca calid, & sic. in tertio partes sumantur æquales. Ex quib. puluerizatis cum aceto mixtis parui formentur trochisci. Quandoq; necesse fuerit ex eis subtiliter puluerizatis sumat sex- ta pars drachmæ unius, cum qua fricentur gingiue optime eis applicādo, & permaneat puluis sic parum super gingiuis, scilicet per quartā partem horæ, dein- de remoueat lauando os cum lacte aut aqua tepida, aut aqua plantaginis. Postea teneat in ore oleum ros. aut lac ad ardoris mitigationem & escaræ (si qua facta fuerit) remotionem iuxta secundam intentionem. Et si opus est mundificetur cum oxymelle aut melle ros. Est enim mirabile illud medicamen causticum ad hanc ægritudinē curandam, & herpetē estio- menium, id est, putrefactionem profundam, quæ fit in ore. Et uos supplete tertiā intentionem, scilicet sub- stantiæ deperditæ restitutionem cum puluere facto ex mirbalanis ablutis cum pauco thuris aut masti- che, & ex his cum melle ros. aut oximelle posset fieri unguentum, aut cum puluere facto ex olibano, sarco- colla, & sang. draconis, ana. Et si post hoc opus fuerit prohibitionē fluxus & confortationē gingiuarū col- luatur os cum aqua decoctionis aut destillationis fo- liorum cupressi. Si autem corrosio fuerit leuior & in- cipiens sufficit alumē extinctū cum aceto, cum duplo sui de sale & cum sauc. id est, utriolo rub. in propor- tione sexquialtera ad alumen, & puluerizentur super gingiua, & est Auic. Secundum leuius, etiam penes Auic. est ut adurantur caratha salita usquequo fiant sicut carbo. Caratha autem siue carathim sunt lubri- ci terrestres, ex quorum puluere sumatur pars una, ros. sic. partes duæ, & mixtæ superponantur. Aliud eiusdem, sumatur myrti, lētium adustarum ana pars una, sumach suriæ ana partes 2, florum squinanti par- tes 3, misceatur & administretur. Hæc omnia sunt ad complendam primā intentionem, postea succedant aliæ intētiōes. Præstātissimum tamen omnium ad complendam primā intentionem est ferrū ignitum, scilicet super parte corrola aut putrida appositū uel applicitum, licet aurū ignitum etiā sit præstantius. Cum autem huiusmodi corrosiones sunt leues suffi- ciunt medicinæ alchola superius dictæ absq; quod sint corrosiuæ. Regimen autem sex rerum non na- turalium communiter ad frigidum & siccū declinet.

DE CASV VVVLÆ.
Cap. LV.

Sciendum quod ægritudines uuulæ sunt quatuor, scilicet apost. ulcus, putredo siue corrosio & casus. Apost. uero licet possit fieri à quacun- que materia, secundum plurimum tamen fit à sang. uel phlegmate. Vlcus uero aut sequitur apost. aut fit à materia ulcerante absq; quod apostemet. Putredo autem siue corrosio fit aut à multitudine materiæ aut eius acuitate & malignitate, & ut plurimum sequitur apostema magnum, aut malignum. Et posset fieri à uaporibus malignis ad ipsam eleuatis. Casus autem uuulæ qui est ipsius præternaturalis elongatio secun- dum plurimum fit à sanguine aut phlegmate & pro- prie aquoso ipsam remolliente, siue hi humores apo- stemet siue non, & est ægritudo in situ. Humores autem isti quandoq; congeriuntur in uuula, sed ut pul-

rimum à cerebro deriuantur. Apostema uero co- gnoscitur per dolorem, tumorem, & duritiem siue extensionem quandam. Cognoscitur autem quod sit sanguineum ex colore rubeo purpureo. Sed cho- lericum ex colore rubeo tendente in citrinum. Phle- gmaticum ex colore albo. Melancholicum ex colore etiam fusco. Mixta autem colorem habent mixtum.

Et cum sanguineo est dolor grauatiuus & pulsa- tiuus. Et in cholerico pungitiuus. Cum alijs au- tem paruis aut nullis adest dolor. Et reliqua com- munia signa sumpta ex ætate, tempore anni, regimi- ne præcedente, & similibus consignant. Et signifi- cant quod sint facta per uiam paulatim factæ conge- stionis paulatim adueniens ipsorum euentus, & lon- gitudinē temporis. Sicut e contra quando sunt per uitā defluxus ferè subito eueniunt. Vlcus autem sensui manifestum est, & sanies inde egrediens manifestat ipsum. Species ipsorum ulcerum sumuntur & cogno- scuntur, sicut dictum fuit in cap. de ulceribus aurium. Putredo autem uuulæ cognoscitur ex nigredine aut uiriditate ipsius cum foetore magno & humiditate foetente inde egrediente, & quia non sentit secundum partem quæ putrefacta est, corrosio autem est cum do- lore, & cum sanguinis destillatiōe sequente corrosio- nē. Casus uero cognoscitur, quia æger sentit aliquid in radice linguae suæ præter consuetudinem insisteri. Et cum aperitur os uidetur ipsius manifesta elonga- tio. Quæ elongatio aliquando est ualde magna, si- cus cauda muris, aliquando parua aut mediocris, & aliquando cum febre, aliquando sine febre. Et humo- res qui sunt in causa ex coloribus suis cognoscitur.

Prognosticum. Apostema cancriforme ipsius, aut non potest curari, aut difficillimè fit in incipiēs sit in ex- tremitate ipsius cum totali ipsius euulsione. Reliqua apostemata satis facili ter curantur, & similiter ulcera ipsius. Putredo autē & ipsius corrosio etiam si pro- funda sit causticando curatur. Sed ipsius elongatio si parua sit nec fit graciliata satis facili ter curatur cum medicinis. Si uero multū elongata sit, & in radice gra- ciliata, & in extremitate sua facta rotunda curatur lo- la incisione, aut causticatione donec magna pars ipsi- us abscindatur. Quod si totaliter abscindatur, lædi- tur uox & sequitur tussis, & secundum plurimum phthisis aut asthma in processu temporis propter de- fluxum catarrhorum ad pulmoem, & quia aer inspi- ratur pro refrigerio spiritualium non modificatur, in frigidatur pulmo secundum plurimum, & ad ali- ma disponitur, & anhelitus cōstrictiōem. Et sequun- tur etiam nocumenta stomachi catarrhis ad stomac- chum descendentibus. Et si totaliter incidatur anteq; graciliata sit, sequitur fluxus sanguineus qui cum di- ficultate constringitur, &c.

Cum æger senserit aliquid radice sue lingue insistere, aut gutturi & cum iubetur aperire os, & extrahere linguam uidetur uuula eius iam esse fluxa & elon- gata. Ramich & sal ammoniacum suman- tur & bene puluerizata cum instrumentis insufflantur

insufflandi super uuulam insuffletur, & ex
eis in summitate prædicti instrumenti ali-
quid ponatur, & radici uuulæ cum eo diri-
gatur & ipsa cum instrumento parum exte-
rius extrahatur. Aut granatum acetosum
cum pulpa sua teratur, & fiat ex ea garga-
rismus. Quod si diu permanferit totali-
ter & elongata fuerit, eiusq; pars superi-
or subtiliata & caput eius rotundum fue-
rit tunc radicitus erit incidenda.

Cauendum tamen ne antequam ita, ut
prædictum sit disposita incidatur, ex hoc
enim sequeretur quandoque sanguinis flu-
xus qui restringi non potest.

Præfens caput in quo agit Rasis de casu uuulæ di-
uiditur in 4. partes. In prima ponit signa casus uuulæ
superius declarata. In secunda ibi. Ramich, & sal
ammoniacum. Curat casum eius quando prouenit à
causa frigida. In tertia ibi. Aut granatum acetosum.
Curat casum eius à causa calida. In quarta ibi. Quod
si diu permanferit. Ponit modum & necessitatem in-
cidendi ipsam. Quod dicit in prima parte est manifestum
ex iam dictis. Sed in secunda parte est sciendum
quod medicamen illud non conuenit in principio, sed
in augmento & statu. Ramich, id est, mixtura facta
ex gallis & passulis ex qua fit gallia muscat. & est satis
propinquum temperamento cum repercussione &
digestione quadam. Sed sal ammon. resolutiuum cal-
idum. Ex his enim æqualiter sumptis fiat puluis
cuius aliquid ponatur in extremitate cannulæ quæ sit
lata secundum quantitatem uuulæ, sed illa extremitas
sit non cannulata & longa ultra partem cannulatam ad
quantitatem digiti parui, & non acuta taliter ut possit
poni sub uuula, & sit illa extremitas aliquantulum curua.
Et cum hac uuula subleuetur trahendo eam uersus os.
Et cum est sic subleuata, puluis qui est in extremitate
cannulæ insuffletur in uuulam, & sic tota hoc puluere
circundabitur, tunc quia sibi adhærebit puluis qui erit in
extremitate non cannulata, tunc quia puluis insufflatus
qui continetur in parte cannulata continua extremitati
non cannulata sibi adhærebit per insufflationem. Fi-
gura huius instrumenti est hic in margine depicta. In
tertia parte dicitur quod cum succo granati acetosi contriti
in ea, est enim frigus, & sic. In ultima parte dicitur, quod
quando diu sic permanferit & multum elongata fue-
rit & gracilis facta, & eius extremitas pendens fuerit
rotundata quæ rotundatio fit ex humiditate ad illam
extremitatem defluxa grauitate sua, natura non re-
tento eius quod suffecerit ad fines in quos ordinatur. Et
cauendum est ut nullo modo incidatur antequam
fuerit sic disposita, sequitur enim fluxus sanguinis
qui fortè non confringeretur propter sectionem extre-
mitatum uenarum quæ ad uuulam terminantur. Et

quia medicinæ non possunt ipsi conuenienter appli-
cari & adhærere. Sed cum est sic elongata & gracilis
facta, uenæ illæ sunt extenuatæ sanguine carentes &
non est dubium de fluxu sanguinis. Præstantius ta-
men est ut cum cauterio incidatur, ut infra dicitur.

Cura harum dispositionum triplex exigit regimen.
Primum est uniuersale respiciens causam anteceden-
tem cõplendum euacuatione, diuersione & membri
mittentis, scilicet cerebri regimine, quæ intentiones
compleantur phlebotomia & cæteris euacuationib.
secundum horum exigentiam. Item uentofatione in
spatulis aut in nocrea. Item phlebotomia uenarum
alienarum, & uenarum quæ sunt sub lingua sicut supe-
rius cap. de pustulis quæ fiunt in lingua, dictum est.
Et similiter caput regatur euacuando discretiorem eius
corrigendo & confortando, sicut sæpe dictum est.
Medius tamen si humor apostematus aut faciens casum
uuulæ fuerit ualde calidus laudat euacuationem cum
aqua fructuum. Et laudat diuersionem cum fricatio-
ne, extensione dolorosa aurium & earum scarificatio-
ne, & phlebotomia uenarum quæ sunt post eas est cõ-
ueniens, & pro diuersione laudat ut capiatur mani-
pulus capillorum in commissura coronali, & ægro
iacente ponas pedes super humeros ægri trahendo ca-
pillis eius fortiter, donec cutis disloceat, ex hoc enim
subito uuula eleuatur. Sed hoc remedium satis igno-
miniosum est. Et subdit quod iam expertum est ut li-
niatur linimento super commissura coronali empla-
strum factum ex succo acatiæ, & hoc in principio, aut
ex acatia cum aceto, aut ex gallis adustis cum aceto,
quoniam eleuant ipsam.

Regimen autem locale apost. uuulæ & casus eius exi-
git tres intentiones. Repercussione conuenientem in
principio. In augmento repercussionem cum resolu-
tione usque ad medium status. Aut repercussione cum
maturatione si tendit in uiam maturacionis. Sed à
medio status ultra resolutionem aut maturacionem so-
lum. Si ergo apost. fuerit multum cal. cum magna ru-
bedine repercutiatur in principio cum multo frigido
sicut suc. solatri, plantag. aut semperuius, cum tatur-
dem aque ros. & aceto quod sit quarta pars torius, &
his possunt addi sandali, & camphoræ apud maiorem
necessitatem in frigidationis. Si uero non sit tantæ
inflammationis sufficienter stiptica & pontica, inter quæ
est differentia quia pontica sunt frigidiora, & magis
terrea quæ stiptica, licet utriusque uirtus minus profun-
detur quæ uirtus acetosi. Et ex conuenientibus est succus
granat. acetosi triti & expressi cum tota substantia sua.
Et si permisceatur cum rosis sic. & semine earum fiet
adhuc maior repercussio. Et in hoc tempore conue-
nit puluis subtilissimus factus ex rosis sandalis & ba-
laust. an. quibus apud maiorem necessitatem in frigi-
dationis potest addi camphora, quo puluere utere
cum instrumento superius descripto.

Et si adhuc fuerit minor caliditas fiat gargarisma
cum succo expresso ex duob. granatis, scilicet aceroso
& dulci contritis & expressis cum tota substantia sua,
& super uuula ponatur puluis factus ex gallis balauit.
& alumine quod sit duplum ad utrumque. Et infusio
sumach optimè contriti in aqua ros. & aceto subtri-
plo ad aquam est conueniens in principio. Et in fine
principij, & principio augmenti est proprium dia-
morò propriè factum ex moris rubi immaturis cum

tantundem aceti & duplo aquæ ros. Et magis procedente augmento conuenit diamoron ex moris celsi, & propriè maturis cum pauciori aceto & aqua hordei aut hordei & passularum, aut aqua decoctionis ramich cum diamoron prædicto. Deinde cum uentum est ad mediū status solum resolutiuū opus est sicut est crocus, gallia muscata, pyrethrum, zingib. cinnam. passul. mir. mel. potest ex his fieri decoctio gargari-zanda. Recipe croci, pyrethri, zingib. cinnam. ana 3. i. passularum 3. s. mellis. 3. 4. bulliant in 2. lb. aquæ ad consumptionem tertiæ partis, & coletur. Et ex superscriptis potest fieri puluis cum instrumento uuulæ applicandus.

Si autem apostema aut casus fiant à phlegmate, utendum est in principio diamaron, aut diamuscum cum subduplo aceti cum aqua decoctionis ramich, id est, passularum & gallarum, quæ aqua sit dupla ad reliqua, aut hæc aqua misceatur cum oxymelle simplici, aut syrupo aceroso, deinde gradatim perueniendum est ad piper, zingib. sal ammoniacum, sinapi, al. muri, cinnamomum, et similia, quibus possumus uti in decoctione ipsarum permiscendo cum oxymelle aut melle ros. aut oxymelle scyllitico. Et possunt huiusmodi cum superscriptis pulueribus misceri in modum electuarij, & applicari cum extremitate pen-næ, & possunt fieri pulueres cum instrumento applicandi. Mesue narrat plures descriptiones.

Prima est filij Serap. 12. balauft. 3. 2. aluminis iame ni 3. 1. croci, 3. s. camphoræ gran. 5. fiat puluis subtili ssimus, & utere cum instrumento post gargarisma factum ex diamoron & aceto, & ualet in causa calid. in principio augmenti. Item aliud ualde bonum. 12. ramich. salis ammon. partem unam aluminis, myrrhæ ana. partem s. fiat puluis & utere cum instrumento, conuenit in causa frigida in augmento.

Aliud ex intentione Mesue. Recipe zingib. cinnamomi piperis, pyrethri, balauft. corticum, granatorum, fol. ros. sem. earum ana. partes æquales, fiat puluis, & utere cum instrumento, & ualet in causa mixta post gargarisma sibi proportionatum.

Auenzoar. 12. piperis nigri & longi, & myrrhæ, salis ammon. ana. fiat puluis, & ualet in causa frigida in statu, & in declinatione. Et nota quod quantum ad huiusmodi localia non est differentia inter curam apost. uuulæ, & casum eius à causa proportionali uel simili, nisi quia magis constringenda conueniunt in casu, & magis indiget subleuatione cum instrumento pulueribus superpositis, imò si esset apostema absque casu non indigemus subleuatione neque puluerib. imò sola sufficiunt gargaris. aut electuaria cum pena administrata. Si uero apostema suppuretur adiuuetur cum gargaris. facto ex ficibus, passulis, dactylis, & materia existente frigidiore addatur radix lilij, & ex fece eorum fiat emplastrum. Et quandoque cum his admiscetur aliquid ex confortatibus membrum ne cadat putrefactio in integrum ipsius, & destruat membrum, sicut balauftia, ramich, myrrhæ, rosæ, ciperi, quodcunque horum magis uidebitur oportere secundum exigentiam materiæ. Postquam autem suppuratum est, aperiatur sicut dicitur in cap. de synanche, & propriè cum sagittela aut instrumento incidente huic operatiōi proportionato, quod habeat additionem quandam distantem à cuspidē per me-

dium digitum, ut non possit profundari ulterius. Post hoc curetur cura ulcerum mundificando cum hydromelle gargarizato, aut cū oxymelle, aut cum melle rosæ mixto cum thure & sarcocolla applicato, cum extremitate stili cotto inuoluta etiam applicata usque ad intrinsecā ulceris. Deinde consolidetur cum uino decoctionis gallarum, cyperi & similibus, aut cum melle rosæ aut oxymelle mixto cum thure & sarcocolla applicato cum extremitate stili, ut supra. Si uero putrefiat uuula, aut præter modum elongetur, & gracilis fiat, ita ut non amplius ad benignum reduci possit, opus est ut auferatur, quæ ablatio licet multis modis fieri possit, præstantior tamen modus est, ut habeatur cānula ferrea satis amplam habens concauitatem, & sit satis etiam crassa, ut non facillè igniatur. Sed extremitas quæ peruenit ad uuulam sit licet media cānula ad quantitatem digiti parui, aut medietatis digiti. Sed extremitati quæ remanet extra os sit annexum manubrium, uel ipsamet desinat in manubrium ex eodem ferro pendens ad inferiora cum quo possit teneri. Situato itaque ægro super una cathedra in loco lucido, & capite ipsius reposito per ministrum existens post ipsum, medicus imponat speculum in ore cum quo fortiter prematur, quam ad inferiora quod speculum per aliquem ministrum teneatur. Post hoc imponat cānulam iam dictam usque prope radicem uuulæ, & cum stilo trahat uuulam super extremitatem non cannulatam, ita ut equitet ipsam & ipsam cānulam magister teneat cum manu sua sinistra & cum manu dextra immitat per cānulam incisorium aureum uel ferrum ignitum ita ut feruat, quod tamen incidat satis oblique, & cum ipso fortiter cōprimendo incidat uuulam, nō tamen radicis, sed relinquat aliquid ipsius, scilicet quantum erat tempore sanitatis, fortasse enim natura sumet ex eo quod remanebit officium aliquod proficuum ad fines in quos ordinata est uuula, & hoc si istud non sit putridum. Si uero tota putrida sit neque tota auferatur, & deinde colluatur locus cum aceto decoctionis aluminis, & gallarum, & procuratur ipsius cauterizatio cum uino decoctionis earum, scilicet granatorum, & similibus. Si autem uuula sit putrens & non pendens, tunc cum instrumento ferreo aut aureo cuius extremitas proportionetur parti cauterizandæ immisio per cānulam cauterizetur & habeatur diuersa instrumenta ignita, nam aliquando oportet ipsam sa instrumenta ignita, nam aliquando oportet ipsam multoties cauterizare mutando cānulam, nunc ad unam partem, nunc ad aliam partem secundum exigentiam partis corruptæ cauterizandæ, deinde procedatur ut supra, uel teneatur in ore lac ad mitigationem ardoris, & partis causticæ remotionem. Si quis autem abhorreat cauterium actuale, ipsam autem rat cum cauterio potenciali, habeatur ergo media cānula, & super ipsam cum stilo trahatur uuula, & cum extremitate stili cotto inuoluta infuso in aqua fortit tangat ipsam fortiter comprimendo, & hoc multoties fiat, deinde teneat lac in ore aliquando donec ferretur, & eodem modo si sit putrida non pendens potest caustificari, postea procedatur, ut dictum est, quousque sanitati restituta sit.

Instrumenta autem pro hac operatione necessaria sunt in hac margine depicta.

Tertium autem regimen duas exigit intentiones, scilicet correctionem accidentium, & regimen sex rerum non naturalium.

Curetur ergo fluxus sang. ex uuuula cum phlebot. cephalicæ, & positione uentofarum super collo, & te neatur in ore iuxta uuulam, succus plâtag. suc. solatri & propriè contusi cum pulueribus costrictiuis, sicut est bolus armenius, sang. draconis, thus, tragagan. & trochis. de karabe, & de terra sigillata, aut huiusmodi pulperes cum aqua albuminis oui permisceantur, & iuxta uuulam teneantur, & omnia sint actu frigida, sicut nix. Et iuxta Auic. administretur medicamen Diogenis, & est hellenifum, aliâs altuesuch. His uerò non sufficientibus cauterizetur profundè cauterio a- etuali aut potenciali iuxta superiorem doctrinam si possit applicari, & aliquandiu teneri adhærēs uuulæ. Secundum accidens est tussis, nocumentum uocis, phthisis, asthma, necnon aliquando nocumenta sto- machi propter catarrhos qui non retinentur, & aer inspiratus non modificatur. Sed his subueniatur lo- cando ægrum in aere temperato declinante ad calid. & siccum, & adhibendo curā catarrhi, de qua supra.

Regimen autem sex rerum non naturalium com- munitur declinet ad siccum, & aliquando leuiter ad calidum, aliquando ad frigidum secundum exigen- tiam discretæ, & tempore operationum fortium, sci- licet cauterizationis & incisionis, dieta declinet ad frigidum & sit tenuis.

DE SANGVISVIGIS QVÆ BI-
buntur. Cap. LVI.

Cum aliquis in gutture suo titilla-
tionem senserit, & sanguis subtilis
inde manueret, existimandum est tunc san-
guisugam in ore esse, & præcipuè si aquam
loci in quo sanguisuga fuerint, hiberit. Os
igitur ægri est aperiendum & lingua extra
benda, & inferius præmenda & guttur in
sole est aspiendum. Et si sanguisuga in lo-
co propinquo pendere uisa fuerit, cum for-
ficibus quibus sagittæ educuntur, extraben-
da erit, quod hoc modo fiat. Caput a quo
pendet est stringendum & sic extrahatur.
Quòd si non fuerit manifesta, æger multo-
ties gargarizet sinapim cum aceto, quia de
loco in quo est mouebitur. Aut fiat gar-
garismus ex aceto, & assa, aut ex aceto, &
assa, & sale. Nigella præterea & sina-
pi trita insufflentur gutturi. Fiat etiam
gargarismus ex succo capæ. Si autem post
eius casum remanserit ægro sanguinis desu-
datio, fiat gargarismus ex apozemate in

quo cortices granati & balaustræ, & su-
mach cocta fuerint. Et gutturi insuffletur
puluis ex balaustris, & thure, & sanguine
draconis, & amylo. Si autem sanguisuga
stomacho annexa fuerit, medicamina qui-
bus uermes expelluntur in potu sumantur.

Ex his etiam quæ sanguisugam exire faci-
unt, est ut ager balneum ingrediatur & mo-
retur in eo, donec magnam patiatursitim
& tunc aquam infrigidatam in niue frigi-
dissimam, scilicet in ore aliquandiu teneat,
cum tepesceri coeperit, eam expellat & ali-
amumat, sanguisuga enim quandoq; uenit
ad os frigiditatem querendo.

Sanguisugæ ingrediuntur guttur cum homo ali-
quando bibit aquā in qua sunt sanguisugæ non ad-
uertendo, aut quia non uidet, sicut accidit iter agen-
tib, tempore noctis. Et aliquando cum homo natat
ore aperto, & propriè hoc accidit quando sunt par-
uæ uix uisibiles, quæ postea magnificant cum mor-
dent & sang. sugunt, quæ sanguisugæ sunt aliquādo
uenenose, aliquando nō. Venenositas aut ex acciden-
tibus inde sequētib, maximè cognoscitur, sicut syn-
copis, tremor cordis, & similia. Et hæc sanguisugæ
quandoq; adherent palato & parti superiori uersus
colatorium. Aliquando partibus oris manifestis.
Aliquando gutturi. Aliquando meri & stomacho.
Et cognoscunt ubique sint ex titillatione & pun-
ctiōe in ea parte, et sang. subtili per os fluere. Sanguis
enim egrediens ex uenis paruis est subtilis in compa-
ratione ad eum qui egreditur ex uenis magnis. Et cō-
firmat iudicium hoc quòd homo memoret se bibisse
aquam in qua huiusmodi habitant, aut natasse in ea,
tunc cognoscitur locus ubi est per sensum titillatio-
nis eius & punctiōis ubique sit. Et si est prope co-
latorium, sanguis in ore egreditur, & non indiget ra-
scatione ad hoc expuatur. Si uerò sit in partibus
oris subiacet sensui, si in gutture sanguis egreditur ra-
scando. Si in meri impeditur deglutio, & uomitus
excitatur. Si in ore stomachi uomitus excitatur absq;
impedimento deglutitionis, et ab his locis sanguis egre-
ditur cum uomitu. Prognosticum. Curatur hæc
dispositio satis facilliter si non sint uenenosæ. Si uerò
uenenosæ fuerint, non sunt absq; periculo.

Quantum uerò ad curam præsciendum quòd ha-
bens sanguisugam debet cauere à clamore & locutio-
ne cum tentatur eius separatio, ne fortè ad cannā pul-
monis precipitaretur, esse enim periculum de suffoca-
tione. Si uerò sanguisuga sensui subiacet capiatur cū
tenacula habente rostrum subtile longum dentatum
cum capite cum quo adhæret & stringatur fortiter &
extrahatur, cum hoc enim solēt ferra sagittarum ex-
trahi. Quòd si uideri non possit, tunc confirman-
dum ex signis scriptis ubi uerissimè sit. Si enim
sit uersus colatorium cum medicinis infra ponendis

fieri debet oris fortis collutio, ut liquor in ore acceptus usque ad colatorium impleatur, aut per uares ad intra os trahatur. Si uero esset in gutture fiat gargarisma. Si uero in meri aut stomacho huiusmodi deglutiantur. Medicinæ autem Rasis sunt istæ. Recipe aceti 3. quatuor, sinapi 3. 2. aut cum aceto tantundem assæ, misceatur, aut cum eisdem tantundem salis dissoluatur. Postea nigella & sinapi trita subtiliter uersus partem ubi adhæret insuffletur. Et sic, cæpæ ualeat optime ad hanc rem, & hæc omnia inimicantur sanguisui gis sua acuitate & foetore & faciunt eas separari a loco in quo adhærent, imò etiam eas interficiunt. Ex bonis citò interficientibus eas est medullæ 3. 1. sem. citrin. cum 3. semis aceti dissoluta & bibita interficit eam maxime si sit in meri & stomacho, & hoc possumus uti gargarizando & etiam os colluendo secundum opportunitatē, & quando est in stomacho & meri omnes medicinæ quæ sunt, contra uermes bibitaræ aut comestæ ipsas interficiunt aut saltem ipsas separant. Et Rasis dicit in fine cap. quod ex his quæ sanguisugam exire faciunt est ut aeger balneum ingreditur qualecunque sit illud, & in eo tantum moretur donec sitiat multum, & tunc aquam in niue in frigidatā siue notabiliter frigidam in ore teneat aliquantulum, & cum coeperit tepescere eam expellat et aliam sumat. Nam sanguisuga quandoque uenit ad os frigiditatem querendo, & cum his absoluta sit prima intentio, quæ est sanguisugæ extractio, aut interfectio, aut saltem a loco cui appensa est separatio. Secunda uero intentio est accidentium correctio. Quorum unum est fluxus sanguinis post sanguisugæ separationem. Cui subueniendum est permittendo primò aliquid ipsius exire ita enim præcepit Auic. quarta primi cap. de sanguisuga postea cum distis in textu constringatur, scilicet cum apozemate, id est, decoctione, in qua cortices granat. balausti, & sumach cocta fuerint, quo utendum est gargarizando aut alijs modis suprascriptis, scilicet bibendo paulatim, aut colluendo taliter, ut perueniat ad locum morsum, & similiter ualet puluis ex balaustia thure, sanguine draconis, & amylo gutturi insufflatis, aut aliter unde fluit applicitis.

Alia accidentia infrequentia uenenositatem corrigantur exhibendo theriacam, aut mitridatum, aut zedoariam, aut terram sigillatam, et huiusmodi quæ contra morsum uenenosum sunt propria. Et ex his patet expositio rextus Rasis, qui diuidendus est in quinque partes. In prima ponit signa sanguisugæ in os ingressæ. In secunda ibi. Os igitur est. Docet modum extractionis ipsius cum sensui subiacet. In tertia ibi. Quod si non fuerit manifesta. Docet ipsam extrahere cum non sensui subiacet. In quarta ibi. Si autem post eius casum. Docet constringere fluxum sanguinis post eius separationem. In quinta ibi. Si autem sanguisuga. Docet occidere uel extrahere sanguisugam in meri & stomacho existentem. Quæ dicit in omnibus his partibus manifesta sunt ex suprascriptis: sunt enim sigillatim superius declarata.

DE HIS QUÆ INTRANT GUTTUR.
Cap. LVII.

QUod aliquid quod guttur ingreditur & infigitur in eo, aut meri sue

rit bolus magnus; aut ei simile de his quæ non habent frustra scissa contenta in eis aut acuta, confert plerumque percutere ægrum in collo posterius & multotiens. Et aquam sæpe trajicere, fortasse enim descendit inferius. Aeger quoque balneum ingreditur. Et oleum multotiens trajiciat quod postquam factum fuerit magnos deglutiat bolos. Quod si non descenderit instrumentum quod illi simile inferius duci consuevit in os mittatur. Est autem instrumentum illud de plumbo quod cum fit reti simile est longum, gibbositatem in se habens.

In hoc capitulo docet Rasis extrahere ea quæ retenta sunt in gutture si fuerit bolus male masticatus siue nulus, aut os pruni, & similia crassa uiam oppilantia, siue fuerit spina aut os acutum & simile, alicui parti gutturis, aut meri affixum. Et primò docet extrahere res crassas uiam oppilantes. Secundo res acutas gutturi affixas. secunda ibi. Postquam factum fuit. De prima dicit, quod cum illud quod guttur ingreditur & infigitur in eo aut in meri, id est isophago siue uia transitus est, bi ad stomachum fuerit bolus magnus: de his quæ non habent frustra scissa, id est, diuisa contenta in eis, scilicet cer gutture aut meri aut acuta infixæ in eis, confert plerumque percussio ægri in collo posterius satis fortiter maxime collo depresso, & humeris eleuatis, sic enim illa res crassa descendet, & iuuat secundo, aquam trajicere multotiens aut oleum & propriè ægro existente in balneo, balneum tamen apud nos non est multum consuetum. Et si hoc modo res crassa oppilans non descenderit tentetur ipsius uomitus digito uel penna in ore imposita, & propriè si fuerit multum in parte superiori. Ad extrahendam autem spinam aut res acutas infixas iubet magnos deglutire bolos, & male masticatos, ut descendentes rem infixam secum decant, et adhuc iuuat bibere sorbitiones uiscosas depasta, & similibus. Et propriè cum impetu. De secunda parte dicit. Quod si cum his non descenderit instrumentum quod huic simile existens interius in gutture reduci consuevit in os immittatur. Instrumentum autem illud est cannula de plumbo habens longitudinem palmæ & crassitiem pennæ, ante perforata multis foraminibus paruis ad modum retis, & propriè secundum partem quæ guttur ingreditur & secundum extremitatem illam aliquantulum curva & ponatur in eam quantum est possibile & trahatur sursum & citius quantum est possibile & trahatur sursum & citius am deorsum impellatur ad omnem gutturis differentiam, adhærebit enim in aliquo illorum foraminum res illa acuta & educetur, & possit hoc instrumentum esse solidum secundum eam partem, quæ tenetur in manu, si autem res infixæ uideatur, est melius ut cum moleta aut tenacula dentata capiatur aut extrahatur. Præter hos sunt multi modi. Primus ut suspendatur, cum filo, carica quæ male masticetur & deglutatur, & postea cum filo extrahatur, & similiter potest fieri cum

tum carne aut spongia condensata in modum pilæ & deglutitur & dimittitur per quartam horam donec creseat, & propter hoc bibatur post eius deglutionem, deinde cum filo extrahatur & est melior cæteris, & 3. nascitur, aliàs raphani uel parū ellebori cum aqua tepida bibira & euomita à proprietate extrahit quod gutturi est affixum. Emplastra quoque mollificatiua & maturatiua exterius applicata iuuant, & propriè cum res infixæ est causa apostematis. Nam apostema te maturato & erupit educitur. Et uidi semel os acutum infixum in gutture exire per cutem exterius in finem duorum mensium. Gargarismata autem cum sunt in gutture & propriè uiolenter facta iuuat ad extractionem. Rasis in continenti dicit quod sterces surrethi cum aqua decoctionis carnis disemperatum & gargarizatum à proprietate extrahit res infixas, si militer facit exterius linimentum. Vltimò si queratur. An sanguisuga aut res similis existens in gutture aut meri sit morbus in numero, & an oppilatio inde proueniens sit morbus. Respondendū est secundum G. q. non, cum eius causæ sint primitiue, & oppilatio inde proueniens immediatè pendeat à causa primitiua. Sed per nes Auic. sanguisuga esset morbus in numero, sicut & uermis ibidem existens in corpore genitus & oppilatio inde proueniens dicitur morbus in compositione.

DE PASSIONIBVS LINGVÆ.

Cap. LVIII.

Superius posita sunt anatomia linguæ. Nunc duo alia circa linguam præmittenda sunt. Primum est, quæ sunt linguæ ægritudines in generali. Secundum est modus generalis curationis ipsarum ægritudinum linguæ. Linguæ igitur ægritudines multiplices sunt secundum quod multiplices sunt operationes linguæ, quæ per ægritudines eius leduntur, scilicet motus linguæ, gustus & tactus. Motus linguæ læditur tripliciter diminutè, ablatè, & corruptè, per quas læsiones impeditur locutio una de principibus operationibus eius diminutè, ablatè, & corruptè, de qua statim erit proprium capitulum. Gustus etiam & tactus similiter tripliciter læduntur. Hæc autem nouemmenta sunt in lingua per essentiam aut per partem sicut ex nouemmento tertij paris neruorum cerebri, & propriè tertij paris neruorum rami eiusdem, qui linguæ delegatur, læditur gustus & tactus, licet quia gustus præsupponit tactum. Et quamuis gustus & tactus sint adæquatè in eadem parte linguæ & perficiantur eisdem instrumentis, stat tamen ab eadem causa notabiliter lædi, imò auferri gustum & non rebrī impeditur motus linguæ & per consequens locutio, aut per communitatem à stomacho aut à membris spiritibus, epate, splene, renibus, uescica, matribus sunt, aut mala complexio, & propriè cum materia aut apostema aut ulcera, & huiusmodi. Ægritudines uero per essentiam in lingua similiter sunt malæ complexiones cuiuscunque generis cum materia, & si quæ & paruitas, mala figura, malus situs. Similiter siue bochor cuiuscunque generis. Malæ autem comple-

xiones linguæ & propriè cum materia siue per essentiam siue per communitatem cognoscuntur ex 7.

Ex sapore amaro, acetoso, falso, pontico, acuto, foetido, & sic de singulis, quorum quidam arguunt calidum, quidam frigidum, & sic humorem calidum aut frigidum. Secundò ex colore rubeo purpureo arguente dominium sanguinis, & ex citrino arguente choleram. Et similiter ex nigro mixto cum citrino ad quem peruenitur ex citrino, aut ex albo arguente phlegmæ, aut ex fusco siue nigro absque citrinitate & rubedine arguente melancholiam. Tertiò ex humiditate & siccitate. Et siccitas quidem sentitur duobus modis, quorum unus est cum claritate superficiæ linguæ, Et hæc est siccitas leuis, & secundum plurimum sine materia. Et secunda est, cum cursu humoris uiscosi profundi qui est in ipsa, quem calor iam exiccavit, & hæc non significant siccitatem in substantia eius, scilicet sine materia, imò humiditatem uiscosam aggregatam in ea, aut ex catarrho aut ex uaporibus crasis, spissis, & hoc est ex eis, quæ faciunt errare medicos, qui cum cognoscunt ex infirmo dispositionem exiccationis oris non discernunt inter istas. Quartò ex asperitate quæ significat siccitatem, sicut planities significat humiditatem.

Quintò ex motu scilicet uelocitate, tarditate, facilitate, difficultate, quod maximè cognoscitur ex locutio neueloci aut tarda facili aut difficili, motus namque siue locutio uelox & facilis arguit caliditatem cum temperata humiditate, sicut contra locutio difficilis & tarda frigiditatem aut siccitatem aut humiditatem superfluam. Sextò ex crassitie linguæ arguitur humiditas, & ex tenuitate siccitas. Septimò ex pustulis & reliquis ægritudinibus calidis arguitur caliditas, ex frigida frigiditas. Reliquæ autem eius ægritudines, scilicet malæ complexiones, solutio continuitatis & apostemata sensui subiacent. Modus autem generalis curationis passionum linguæ est, ut quando sunt per communitatem, fiat euacuatio à membris communibus & ipsorum diserasiæ corrigantur, & tertio fiat ipsorum confortatio ne malas materias multiplicent. Quando sunt per essentiam in lingua, curentur medicinis linguæ proprijs, quarum quædam sunt euacuationes. Cauendum tamen siue ledatur per essentiam siue per communitatem à uomitu quantum est possibile. Secundum genus medicinarum est collutio nes linguæ. Tertium gargarismata. Quartum unctiones & puluerum asperisiones. Quintum ea quæ tenentur in ore siue sint pilulæ quæ debent esse compressæ siue electuaria, & similia. Sextum eius fricationes & oportet ut caueatur in administratione medicinarum oris & linguæ cum fuerint ex genere acutarum quæ nocent gutturi & pulmone & nihil ex his ad illa proficiat.

DE GRAVEDINE LINGVÆ.

Cap. LIX.

Grauedo linguæ, mollificatio eiusdem sunt termini synonymi huius dispositionis quæ descriptiue est impedimentum motus linguæ, locutionem minuens, auferens aut corruptens. Pro cuius descriptionis notitia est sciendum quod motus linguæ tripliciter potest impediri diminutè, ablatè, & corruptè. Et tot modis impeditur locutio una de principibus operationibus linguæ. Minuitur quidè motus linguæ cum homo difficulter aut tardè

mouet linguam. Aufertur cum nullo pacto potest eam mouere. Corripitur autem cum homo intendit mouere ipsam ad unam differentiam, et mouet ad alteram præter uoluntatem. Sicut etiam locutio tripliciter impedit. Aufertur quidem cum homo nihil potest loqui, et hi appellantur muti. Diminuitur cum tardè aut difficulter loquitur. Corripitur cum una litera profertur pro altera, aut syllaba pro altera. Diminutio autem in locutione tripliciter fit. Vno modo quia sunt aliqui qui non possunt incipere loqui nisi primò multum aerem inspirèt deinde cum uelocitate loquuntur. Hoc enim accidit quia musculi pectoris, sed maxime epiglottis sunt debiles. Vnde nisi primò moueantur cum inspiratione multi aeris non possunt debite moueri pro uoce formanda. Secundò sunt aliqui qui non possunt incipere loqui nisi prius multoties moueant labia & linguam. Deinde expeditè loquuntur. Et hi sunt habentes debilem linguam, quam oportet pluries moueri, & similiter labia antequam opportune moueant ipsa secundum exigentiam locutionis formandæ, & hæc dispositio ab Auic. uocatur tarhas. Sunt tercio aliqui, qui postquam inceperunt loqui impediuntur, nec possunt continuare sermonem. Et eorum aliqui nihil proferunt per tempus, tandem postea profenentes quod intendunt, horum autem aliqui sæpe eandem syllabam repetunt antequam dictionem proferant, & hi appellantur trauli. Corruptio autem locutionis est multiplex. Imò indiffinita secundum indiuiduorum multitudinem. Sunt enim aliqui qui non possunt proferre unam literam aut syllabam, sed alteram pro illa proferunt. Et multipliciter uariatur secundum multitudinem causarum indiuiduantium. Aliqui etiam in locutione sua multiplicat fen fen, ten ten. Nonnulli uerò tata sicut pueri. Et aliqui ka ka, & sic de singulis. Et omne impedimentum in locutione præter ablationem nominatur ab Auic. alchael, quapropter omnis tarhas est alchael, & similiter traulitas est alchael, sed non e contrario, pueri autem in principio, sunt albaka, id est, loquentes ta in locutione, quos nos in uulgari sermone uocamus tartaia, qui postea facti uiri rectè loquuntur consumpta humiditate superflua ex decursu ætatiuo. Et hi aliquando post ægritudinem acutam sicut febrem incendentem aut chronicam cōsumentem humiditatem superflua sunt rectè loquentes. Hæc autem dispositiones aliquando sunt nouæ, aliquando chronicæ, imò frequenter à generatione contractæ. Vnde aliqui sunt à generatione muti, & hi secundum plurimum sunt surdi. Aliqui tardè loquentes. Aliqui male loquentes, imediti aliquo ex modis scriptis. Et hæc sufficiant quantum ad quid nominis & quid rei & species grauedinis linguæ.

Causæ uerò quædam sunt primitiue sicut ebrietas, ira, tristitia, timor, uerecundia. Quædam sunt corporeæ, & sunt duplices, quædam per communitatem, quædam per essentiam in lingua & musculis eius. Per communitatem quidem à toto sicut in febribus, & propriè in arsiuis, quibus lingua arefcit & spasmatu spasmo de inanitione, nonnunquam materia permutata ad linguam fit motus eius, & locutio difficilis. Aut à parte sicut à septimo pari neruorum cerebri, qui aliquando oppilatur, aliquando aposte-

matur, & fit quandoque spasmus aut paralytis aut tetanus, & consequenter sequitur difficultas aut impotentia ad motum linguæ. Aut per communitatem à cerebro, sicut in lithargia, & similibus. Et fit defectus in lingua, aut propter humiditatem à cerebro communicatam, aut defectu spirituum, aut per communitatem à stomacho, epate, membris spiritualibus matrice, & cæteris. Per essentiam uerò in lingua aut mala complexio, sine materia aut cum materia cuiuscunque generis, sed secundum plurimum sanguinet aut phlegm. aquosa, infusa in ipsa aut musculis eius, aut à mala compositione, scilicet magnitudine aut paruitate, aut mala figura, aut malo situ, aut à magnitudine ligamenti existentis sub lingua impeditè motum eius aut à soluta continuitate, scilicet uulneribus & ulceribus, derelicta, ut propter apostematam & pulsulas ipsius. Signa. Grauedo linguæ est sensui manifesta. Sed causæ primitiue sunt sibi signa cum consuetudine proventus huius impedimenti lingue et causis similibus.

Causæ autem corporeæ per communitatem cognoscuntur, quia præcesserunt & etiam cum earum augmento augetur grauedo linguæ, et decremto minuitur, & ablatione aufertur. Nisi nocumentum per communitatem sit factum per essentiam. Sed specialiter si sit per communitatem à toto, sicut in febribus arsiuis adest linguæ exiccatio, & forè spasmus, & ipsius contractio sequens inanitionem, & forè materia liquefacta impleti sunt musculi ipsius. Vnde lingua est spasmatu spasmo de repletione. Sed secundum plurimum paralytica & remollita humiditate existente subtili. Inter quæ distinguitur, quia spasmus de repletionem et paralytis ferè subito acciderunt. Sed spasmus de inanitione paulatim. Spasmus autem de repletionem differt à paralyti, quia caliter spasmatu non potest per se, neque per alium facilius moueri, sed paralytica licet non per se, per alium tamen facilius mouetur.

Si uerò sit læsa per communitatem à 7. pari neruorum cerebri, est nocumentum in motu linguæ, quod non est commune alijs operationibus cerebri, aut eorum ab eo. Et cum hoc non uidetur aliqua ægritudo linguæ propria ex scriptis. Nec apparet nocumentum ei comunicatū ab alio membro. Nam cum est per communitatem à cerebro nocumentum est commune pluribus operationibus cerebri aut operationibus eorum ab eo, & si materia à cerebro sit communicata linguæ & musculis eius est spasmatu, aut paralytica completè & secundum partem. Si uerò sequatur defectum spirituum animalium cognoscitur ex debilitate uirtutis animalis in cæteris membris, imò aliam uirtutum aqualiter. Similiter si sint per communitatem alio membro præcessit nocumentum illius membri. Si uerò lingua sit læsa per essentiam nocumentum est continuum, neque præcessit nocumentum alterius membri. Et materia sanguinea significatur per rubredinem linguæ & caliditatem, & tumorem uenarum & alia signa sanguinis. Sed subtilis aquosa per multitudine cursu saliuæ, & paucitatem iuuentutis resolutionis, & iuuentutem ab eo in quo est supertuitas. Item per albedinem linguæ cum palliditate & paucitate caliditatis. Mala autem compositio, scilicet magnitudo paruitas, mala figura, aut malus situs sensui sunt

sunt manifesta. Similiter soluta continuitas & cicatrix. Magnitudo autem ligamenti existentis sub lingua cognoscitur, quia non potest emittere linguam secundum quod oportet, sed remanet curuata cum exterius ipsam emittit. Similiter ligamentum linguae extenditur ferè usque in extremitatem eius. De apostematibus autem linguae agetur in sequenti cap.

Prognostica. Grauedo linguae sequens apoplexiam, lithargia, & similes cum antiquatur, raro & cum difficultate curatur. Quae uero est à natiuitate sequens surditatem, non recipit curam. Et sequens malam compositionem non potest perfecte curari. Quae uero est à natiuitate contracta non sequens surditatem corrigitur, tum ex decursu ætatis, tum medicinali auxilio. Et ferè omnes reliquæ species emendari possunt. Licet omnes secundum plurimum non perfecte curentur, & propriè cum inueterantur.

Qum lingua absque alijs membris grauedinem fuerit passa, & æger neque febrem, neque acutam ægritudinem incurrit, sal ammoniacus, & piper, & zingib, & sinapi album ac pirethrum, & staphisagria, atque origanum, & baurach, & sal indi, & nigella, & sampsucus siccus sumantur, & in aqua coquantur, aut fiat ex eis gargarismus. Caueat tamen pateriens ne ex eo aliquid trahat. Aut æger ieiunus multis diebus gargarizet almuri nabati. Aut fiat gargarismus ex aceto & pirethro. Postquam uero gargarizare cessauerit, sumantur salis ammoniaci, pirethri, piperis, sinapi, omnium partes æquales, & ex eis bene puluerizatis lingua diutius fricetur.

Hoc capit. diuiditur in quatuor partes. In prima curat grauedinem linguae pendentem ab humiditate phlegmatica aquosa musculis eius ingressa. In secunda curat ipsam grauedinem linguae pendentem à paralyti & mollificatione per communitatem à cerebro. In tertia parte curat ipsam exiccatam & spasmatam spatio de inanitione sequente febres acutas & causas huiusmodi inanientes. In quarta causa curat ipsam pendentem à ligamento quod est sub lingua nimis prolongato. secunda ibi. Quod si cum lingua, quo loquela. Si aut loquela, quarta ibi. Et si diu est ex quo loquela. Quae dicit in prima parte nota sunt. Nam præmissis uniuersalibus, quæ Rasis omittit breuiatati indulgens, curat grauedinem linguae cum exicantibus, resoluentibus humiditatem phlegmaticam, quarum quædam sunt notabiliter calida attinentia usque ad quartum gradum, de quibus debet sumi minor quantitas secundum can. dosandi, quia ta-

men bulliunt cum aqua contemperante ipsorum acritatem, possumus accipere de ipsis æqualiter, ut Rasis. salis ammon. piperis, zingib. sinapi al. quia est minus calidum, pirethrum, staphisagria, baurach, loco eius accipitur sal nitrum, origani, salis indi, nigellæ, sampsuci sicci, id est maioranæ siccae omnium, an. 3. i. bulliant in 1. lb. aquæ, ad consumptionem medietatis & coletur, cum qua colatura debite calefacta fiat gargarisma stomacho ieiuno cauendo ne deglutatur. Ipsa quoque debet aliquando in ore teneri absque quod gargarizetur. Secunda medicina est almuri, id est falsamentum Nabati, id est, illius regionis.

Tertia medicina est acetum cum pirethro, quæ facit fluere multum humiditatem ex lingua. Sed post gargarizationem docet fricare linguam cum sal. ammoniaco, pipere, pirethro, sinapi, ana. partibus æqualibus. Sed hæc est acutior medicina qua non est utendum nisi in adultis habentibus sensum obtusum, & hoc quantum ad primam partem.

Quod si cum linguae grauedine auditus aut reliquorum sensuum grauitas fortis affuerit, fiet ægri curatio secundum doctrinam qua paralytis curatur.

In hac secunda parte curat grauedinem linguae per communitatem à cerebro. Et dicit ipsam esse curandam sicut curatur paralytis, de qua superius factum est capit.

Si autem loquela in acutis febribus aggrauata fuerit, & uideris ipsam cum grauitate in loquela extenuatam & abbreviatam, & spasmatam aqua calida, ab alto super spondiles dorsales & auris principia fundatur, & cum oleo fricnetur. Aeger quoque oleum tepidum in ore tenere debet.

In hac tertia parte curat grauedinem linguae sequentem spasmi & arefactionis eius propter febres acutas cum embroca aquæ tepidæ super noca, & spondilibus colli, quæ loca deinde cum oleo, & propriè uiolato tepido ungantur benefricando, ut uirtus penetraret in profundum, & retentione eiusdem olei in ore. Sed decentius est oleum amygdalinum. Et lac est ad hoc conueniens.

Et si diu est ex quo loquela sua minui non cessauerit, uel etiam semper considerandum est an ligamentum quo inferius lingua connectitur maius sit quam debeat. Quod si ita fuerit ex eo parum est incidendum, & zingib. puluerizatum immittendum.

In hac quarta parte curat grauedinem linguae propter longitudinem ligamenti quod est sub lingua, cuius superius signa dicta fuerunt cum sectione ipsius & zegi, id est, uitrioli superpositione in loco secto ne rursus consolidetur. Hæc autem sectio fiat secundum transversum ligamenti, ut totum in latitudine secetur

cum lanceta curua subtili in extremitate. Postea ponatur zegi ad prohibendum consolidationem. Sed apud Auic. imponatur filum cum acu et strictè ligetur, donec rumpatur, & melius est ut sit aurea, iuxta doctrinam sapientum. Fiat autem hæc sectio in loco magis oportuno per cuius sectionem iudicio existimatio uideatur magis ad motum facilitari. Sed hic ultimus modus iudicio meo est melior. Post eius sectionem ponatur in uulnere parum cotti infusi in oleo ros. tepido uel melius in albumine oui, ut partes solutæ distantes conseruentur nec permittantur inuicem reuniri. Conformius tamen uideretur textui Rasis, aliquid deligamento esse secundum longitudinem incidendum. Si causæ fuerint primitiæ remoueantur, & paulatim assuescat proferre homo syllabas, dictiones & literas in quibus maximè difficultatur. Item assuescat loqui coram magnis uiris & magistratibus incipiendo à minus dignis & gradatim ad magis reuerendos procedendo. si timore aut uerecundia in locutione impediatur. Et si pueri fuerint tardæ in locutione ad loquendum irritentur. Et si adulti fuerint aut grandes studeant se exercendo paulatim componere maximè & frequenter proferendo ea quæ sibi fuerint difficilia. Et imitentur Demosthenem uirum eloquentissimum, qui cum ineptè & balbutiendo loqueretur, sumebat in ore lapillos paruos sex aut plures, postea cum studio & conatu loqui studebat. Cumque pluries sic loqui studuisset, postea pauciores in ore loquendo retinebat. Tandem post longam consuetudinem & experientiam talem, sine lapillis, ita clarè & expedite locutus est ut ceteros in pronuntiando superaret. Utebatur speculo magno in quo seipsum frequenter intuebatur, pronuncians in loco secreto orationes quas habiturus erat in publico, & seipsum notans emendabat ineptos aut turpes gestus manus, & pedum aliorumque membrorum motus, oculos & oris, ita ut se totum corrigeret & polirer, deinde cum uocem breuem & submissam, & anhelitus angustiam pateretur, ad littora maris accessit, ubi si se orantem audire uolebat, necesse erat ut altè clamaret. Quibus ingenij limatissimum ac florentissimum fecit. Et propter hoc qui habent anhelitum breuem & angustum studeant anhelitum diu continere. Item longam orationem uno anhelitu uoce sonora producere.

Si grauedo lingue pendear ab humiditate sanguinea aut aquosa sepulta, aut imbibita in lacertis aut musculis lingue cum communitate cerebri, aut sine communitate eius exigatur lex intentiones. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia resoluit & exiccat residuum materis per partem oppositam. Quarta uerò per eandem partem. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat regimen sex rerum non naturalium. Prima quidem perficitur cum phlebotomia ex cephalica si materia fuerit sanguinea. Deinde uenarum quæ sunt sub lingua. Et tertio si expedierit sub mento uentose tur, quæ omnia fiant si expedierit sub mento uentose tur, quæ omnia fiant si materia sit multa: si uero pauca sufficit phlebotomia uenarum quæ sunt sub lingua & uentosatio sub mento. Si uero materia fuerit phlegmatica, aquosa euacuetur euacuatione, post euacuationem cum hieris minoribus in principio, deinde cum maioribus. Et pilulæ cochis sunt conueni-

tes. Et pilulæ de hiera cum agarico. Secundam rem complent fricationes extremitatum, uentosationes in spatulis & administratio clystericorum acutorum iteratis uicibus. Primo leuium, deinde acutorum. Item caput purgia per nares. Tertiam rem complent administratio medicinarum propriarum parti posteriori capitis nocte, & primis spondilibus relictum sufficit, bulliant in uino & aqua, an. cum pauco aceti & approximentur locis iam dictis cum spongia aut filtro debite expressis, postea sequatur aliqua ex unctionibus, cerotis aut emplastris dictis in capite paralysi, quæ omnia ad hunc locum afferantur secundum opportunitatem, & casus aquæ theriacum sulphurearum, & uniuersaliter exiccantium super puppi capitis & primis spondilibus est conueniens. Forma autem cauterizationis si expedierit est secundum hunc modum. Fiant tria cauteria actualia cum ferro aut auro figurata, secundum formam medicamentosis oliuæ, quæ penetrent quantum est medietas ossis oliuæ, secundum longitudinem aut minus, & fiat secundum longum in fontanella puppis capitis, quorum primum sit in noera, id est, ubi caput collo coniungitur, secundum in fine primæ spondilis. tertium in fine secundæ, & fiant duo alia lateralter in radice cranei distantia à medio secundum quantitatem pollicis, & diu conseruentur aperta. Ista tamen polipollentur quantum est possibile, ut non fiant nisi cum cætera non contulerint. Quartam rem complent gargarismata collutiones oris, fricationes lingue, res quæ in ore retinentur exiccantes residuum materis ad quas gradatim perueniatur incipiendo à debilibus, & gradatim procedendo ad fortiora, neque fiant continue, sed per interualla dando etiam aliquando hæc expediuntur theriacam mithridatam & similia, sicut semel in hebdomada debita seruata custodia. Medicinæ autem simplices leues ad hanc intentionem sunt maiorana, saluia, iua, stecca, hyssopus, origanum, costus, alascæ, radices capparis, acorus, sinapium. Sed fortia sunt zingib. cinamomum, sinapium, staphisagria, pirethrum, tria grana piperis, salammoniacus, nigella, euphorbium, & similia: his autem uentose tur faciendo decoctiones, pulueres, pilulas, & similia his secundum exigentiam & castoreum retentum sub lingua & confectum confert mirabiliter. Et ex suprascriptis possunt fieri pilulæ incorporando pulueres suprascriptos cum castoreo cerebithina, assa fetida, laudano, resina, tragachan. & similibus, & sunt efficacissimæ. Item acori conditum & diacori sunt medicinæ præstantes ad hanc intentionem. Item confectio de pirethro & confectio anacardina data per interualla est conueniens sumpta, linita & emplastrata parti posteriori & origini neruorum. Item salis lutium linitum super linguam descriptum in capite de paralysi, & quandoque confectio fricatio lingue cum acetosis stipicis sicut lac acetosum succus fructus acetosum qui non sunt maturi & acutum, & huiusmodi. Et

di. Et nota quodd si timeatur fluxibilitas materiæ sunt stiptica prædictis exicantibus miscenda sicut darclaham, & est flos mali granati permixtum cum rosis. Et sicut flos schinanthi cum spodio. Medicinæ autem Rasis sunt fortes & ultimæ. Et humiditate sanguinea existente in causa conueniunt leuiores & minus calida. Quinta autem intentio est correctio ardoris aut excoarationis linguæ, & similia si acciderit. Sexta autem intentio dici potest ex cap. paralytis, de bet enim digiti ad sicum declinare. Si uero grauedo linguæ sequatur spasmus de inanitione aut magnitudinem ligamenti, quod est sub lingua, cura à Rasi sufficienter posita est, & per me declarata.

Sequens uero malam compositionem non potest perfecte curari, corrigitur tamen ingenij superius dictis in principio curæ positus.

Cura autem grauedinis sequentis solutionem conueniuntis est cura ipsius solutionis, & si cicatrix remaneret, mollificationi & subtrahitioni eius intendat. Apostematam autem linguæ cura ponitur inferius.

DE TUMORE LINGVÆ.

Cap. LX.

Tumor linguæ, magnitudo, inflatio sunt termini synonymi huius dispositionis quæ diffinitiuè est tumor præternaturalis linguæ, inordinatus tantus ut os egrediatur. Est autem hic tumor aliquando apostematosus aliquando sine apostemate, sed hic de tumore non apostematoso agitur. Differt apostematosus à non apostematoso, quia est cum mala complexionem, mala compositionem, solutionem continentis, ex quibus cum coniunguntur prouenit una aggrauatio, cuius unitas saluatur in ordine & dependentia istorum membrorum simplicium adinuicem. Cum enim humores fluunt ad linguam, suscipiuntur in uenis, & postea in poris eius & ipsos extendunt, & sic tumorem faciunt postquam extensionem & tumorem soluitur continuas ipsorum, ita ut ex pluribus poris solutis fiat una concauitas aut plures, ad tur mala complexio propter prohibitam transpirationem, & in hoc ordine & dependentia saluatur quod apostemata est morbus unus. Sed in non apostematoso humores fluxi suscipiuntur in uenis & poris & non soluitur ipsos, est ergo tumor sine soluta continuitate, & per consequens sine apostemate.

Huius tumoris causa coniuncta est duplex, scilicet sanguis dominans aut humiditas plurima phlegmatica. Causæ uero remotiores sunt aliquando primitiui, quæ linguam tumere faciunt, & aliquando morbus ab aliquo animali occultè permixto cibis qui conueniunt, sicut species uespæ aut araneæ, aut scorpionis, & similia. Aliquando sunt corporeæ, sicut multitudinem sanguinis aut phlegmatis in toto, aut in capite ro sanguineus cognoscitur ex colore rubeo cum alijs signis attestantibus sanguini. Et phlegmaticus ex colore albo et multa humiditate phlegmatica ex ore fluente cum exteris signis phlegmatis. Discernitur autem apostematosus à non apostematoso duritie, febre, dolore, non aut quantitate. Prognosticum. Hæc dispositio curatur secundum plurimum si conuenienter tractetur.

Cum contingit linguam adeo inflari, ut præ magnitudine os egredietur. Fricanda est ex capre, aut ex citri acetositate, aut cum ribes, aut ex granato acetoso, donec salua multa ab ea fluat, hoc namque modo detumescit, & ad primam redibit mensuram. Si autem non sufficit fiat frictio ex sale & aceto. Et si nondum sufficit fiat minutio ex utrisque cephalicis prius, & postea ex uenis sub lingua.

Diuiditur hoc cap. in partes duas. In prima ponit remedia localia. In secunda ibi. Et si nec sufficit. Curat hanc passionem per phlebotomiam. totum cap. patet ex dicendis. Cura huius humoris triplex exigit regimen. Primum respicit causam antecedentem complendum euacuatione & diuersione. Vnde materia existente sanguinea fiat phlebotomia ex utraque cephalica propter eius multitudinem. Et si retentio hæmorrhoidarum aut menstruorum esset in causa præmittatur phlebotomia saphenarum, & pro hoc recurre ad ea, quæ superius dicta sunt sæpe. Materia autem existente phlegmatica euacuetur, cum sibi proprijs, de quibus supra. Secunda: diuertantur istæ materiæ sanguinæ cum uentosis in spatulis & nocrea, & phlebotometur uena, quæ est in mento aut sanguisuga uel uetosa ibi apponatur. Sed materia phlegmatica cum caput pur, & dysteribus, & similibus. Secundum regimen respicit causam coniunctam. Primum complendum per materiæ eradicationem, sanguinæ equidem per phlebotomiam uenarum linguæ. Phlegmaticæ autem gargarismatibus aut masticationibus, sed melius est, ut hæc postponantur usque ad statum. Et si quid fluxu est educatur, cum acetositate citri aut ribes, aut uini granati acetosi, ex quibus lingua fricetur aliquatim & in ore teneantur: per hæc enim frig. & sic, & stiptica fiat repercussio, & per acetositatem humiditatis cum salua educatio. In materia uero phlegmatica in principio, approximetur oxymel simplex. In augmento uero in sanguinea addatur suprascriptis rob diamoræ, & in phlegmatica oxymel, parui zingib. aut salis communis, aut salis ammon. & ulterius uersus declinationem misceatur acetum & diamoræ in sanguinea. Et in phlegmatica fiat frictio cum sale & aceto cum cepis, addatur tandem zingib. & sal gemma, & sal ammoniacus & reuertetur ad mensuram suam. Mollificatio quidem linguæ cum accidit pueris, sufficit in ea sollicitudo custodiæ, id est, regiminis in sex rebus, & cibatio ex passeribus & uolatilibus multum bulariis, id est, quæ declinent ad siccū. Quidam homo, ut dicit Auic. iam uetofatus fuit, & percussus est cum scalpello uisus nerui in spondilib. pāniculi coniuncti cū lingua, quare mollificata est lingua. Ex quo arguit præter septimum par neruorum cerebri alios neruos à spondilibus colli orientes cōcurrere ad motum linguæ, & secundò inferunt in actu practico scarifica

tionem esse faciendam in pulpis spatularum non in spondilibus, neque prope spondiles. Tertium regimen sedat accidentia ut puta ardorem sequentem ad medicinas acutas, ut cum lacte retento in ore, & similibus, secundo ordinat regimen sex rerum non naturalium. Quod in sanguinea declinet ad frigidum & siccum, in phlegmatica ad calidum & siccum. Si uero hic tumor pendeat à uenenosis cura requirenda est sexta quarti. Nimis enim prolixus essem si omnia huiusmodi prosequi uellem.

DE RANULA LINGVÆ.
Cap. LXI.

Hæc pafio dicitur glandula, quia ad similitudinem glandulæ in figura, quantitate & duritie, aut quia est uerè glandula, scilicet, apostema phlegmaticum kisti circumdatum mobile facili ter de loco ad locum, & hoc est raro, imò est secundum plurimum caro ibidem nata, ac si noua lingua excreset. Et dicitur ranula ad similitudinem ranæ parue in quantitate figuræ & colore: habet enim colorem album tendentem ad uiridem similem colori ranæ. Hæc autem est similis colori linguae composito ex colore suæ substantiæ qui est albus, & ex colore uenarum quæ sunt in ea quæ tendit in nigrum, ex quibus confurgit color albus tendens ad uiridem. Et hæc ægritudo est proportionalis pueri & infantibus, quia in eis multiplicatur humiditas uiscosa à capite defluens quæ est eius causa.

Species eius est duplex, etenim quedam alba mollis tractabilis, quedam nigra uel fusca dura intractabilis & utraq; est duplex, quedam cum dolore aut alia sensibili læsione, quedam sine, & quælibet est duplex, quedam antiqua, quedam noua.

Signa, & causæ parent ex dictis. Apparet enim, ali quando in loco iam dicto, ac si noua lingua oriretur & quæ est alba, est ab humore phlegmatico uiscoso, & quæ nigra ab humore phlegmatico tendente in melancholiam per adustionem aut per partium subtilium resolutionem.

Prognosticum. Secundum plurimum curatur si conuenienter tractetur. Nisi pendeat ab humore melancholico, Et proprie adustione participante.

Cum sub lingua glandula nociua fuerit, in principio ex sale ammoniaco & gallis fricanda est. Si autem uetusta fuerit, ex medicamine gingiue sanguinolentæ fricanda est, quod est medicamen acutum.

Aeger autem acetum & sal in ore teneat.

Diuiditur hoc cap. in partes duas, primò ponit curationem ranulæ nouæ, secundo antiquæ, secunda ibi. Si autem uetusta fuerit, totum patebit ex dicendis.

Cura post euacuationem & diuersionem, & debiti regiminis ordinationem. Primò est tenenda cum leuibus exiccantibus cum salua pistata, uel succo eius ibidem cum cortio appposito uel fricetur cum origano sale & corticibus granatorum tritis & simul mixtis, postquam frictionem infundatur cortium cum his medicinis cum aceto mixtis & applicetur, & fortius

istis est calcanthum, id est uitriolum ustum, hermodactylum, albumen oui mixta & applicita, uel iuxta restum fricetur cum sale ammoniaco cal. in quarto, & gallis simul mixtis, uel acetum, sal, & flos aris simul mixta applicentur. Acetum etiam & sal ibidem retenta sunt leuia & conferunt in cura. Si autem uetusta fuerit, est auferenda aut cum causticis aut operatione manuali. Rasis autem dicit esse applicandum medicamen superius positum in cap. de gingiuis sanguinolentis, quod tenendum est ibidem per mediam horam aut circa, aut appropinquetur cauterium ex capitulo factum, & eam causticabit in paruo tempore, & tunc temporis defendantur partes circumstantes cum penitus infusis in albumine oui, aut cum succo, plantaginis, & aceto, post eius remotionem applicetur lac aut uiride, aceto, & tandem remota escara consolidetur. Operatio oui, & tandem remota escara consolidetur. Operatio autem manualis est ut capiatur cum uncinio et cum ligetella eradicetur, post eius eradicationem ponatur uitriolum mixtum cum albumine oui. Sed hæc fortia non fiant nisi in illa, quæ sensibilibus dimittere, non est fusca. Si enim est fusca tutius est dimittere, ne conuertatur in cancerum. Et si fluxus sanguinis impediret pro illa uice dimittatur. Et sanguine confectio sequenti mutatione operatio compleatur. Et post extractionem lauetur locus cum aceto per duos dies postea cum aceto decoctionis myrrhæ, donec facta consolidatio.

DE HIS QUÆ NASCUNTUR IN
lingua. Cap. LXII.

Ista ex eisdem sunt curanda, ex quibus curantur alcola, quas nominauimus, et synanche sanatur.

Rasis breuiter se expediens dicit hæc esse curanda, sicut alcola, id est pustulæ linguae, quas superius nominauit, & etiam sicut synanche, de qua in sequenti cap. est acturus. Sed pro integra notitia sciendum est hæc apostemata esse sanguinea, cholerica, phlegmatica, & melancholica. Quæ iterum sunt duplicia, quandoque generantur à melancholia adusta & sunt cancri, quandoque à melancholia non adusta, & sunt de genere sephiros.

Causæ & signa patere possunt ex sepe dictis, quandoque enim generantur ex potu uenenosorum sicut fungi & opij, ac etiam ex morfu, sicut dictum est superius. Prognosticum. Hæc apostemata si conuenienter tractentur, curantur præter melancholicas, quorum secundum plurimum est difficilis eradicatio & præcipue cancri.

Cura similiter exigit triplicem regimen, sicut dictum fuit in tumore non apostematoso: hæc tamen ut locioribus indigent auxilijs. Fiant ergo euacuationes & diuersiones in sanguineo phlegmatico, sicut ibidem dictum est. In cholerico autem & melancholico fiat euacuatio cum proprijs, quæ ex sepe dictis possunt esse manifesta.

Duo tamen hæc attendenda sunt. Primum, quia phlebotomia in quacunque specie horum apostematum secundum plurimum est conueniens. Et similiter phlebotomia uenarum sub lingua ad materiæ eradicationem.

Secunda, ut in his apostematibus, sicut etiam in tumore lingue non apostematoso uomitus caueatur, sed ut

per lingua localia applicanda in principio apostemata sanguinei & cholericum sunt suc. plantag. aqua rosacea suc. solari. suc. semperuiae, suc. lact. & est proprius, quae omnia cum aceto misceantur, quod sit subquaduplum ad succos secum permixtos. Sed in cholerico eligantur ex his quae sunt magis frigida. & humid. quibus etiam minus aceti permisceatur. Similiter decoctiones ros. & aliarum rerum in frigidum, & siccificantium, sicut sumach, myrti, & similia. In augmento autem addatur his decoctio foliorum oliuae & uinum ponticum, & similia, & si tendant in uiam resolutionis. Si uero maturentur, adiuuentur cum melle & lacte, & cum decoctione ficum & passularum foenugr. sem. lini. & similia.

Et posturationem aperiantur cum sagittella, & tandem mundificentur & consolidentur cum melle ros. uino nigro, & sic de singulis. Phlegmatica uero in principio percutiatur cum decoct. myrti, fol. oliuae, uino pontico & aceto, quibus potest addi radix fenic. combust. & puluerizati. et ulterius in processu addatur his sal. zingiberis. & similia superius dicta in tumore phlegmatico non apostemato. Si uero apostemata sint melancholica inchoandum est cum lacte muliebri, asinino & caprino, postea teneatur in ore decoct. daquil. & sicum cum uino dul. & sic procedatur per tempora sua, in cancro autem procedatur cum magis frigidis, sicut cum lacte & oleo rosac. & nucul. psil. & suc. solari. & similibus. Et Auic. recitat historiam Gal. de fene sexagenario habente apostema in lingua cui non fecit phlebotomia, quia non erat confectus, & cum apposuisset quaedam localia non uolebat obedire quia fatuus erat, & tandem dixit se somniasse tenere in ore succ. lactuc. ex quo uidebatur sibi in somniis esse liberatus, quod Gal. illi contum succum illum esse medicinam singularem in hoc casu quod etiam multotiens expertus sum.

Curatio autem uera cancri & similiter sephiros puri non est nisi eradicatione ipsorum cum tota substantia linguae in qua sunt, & etiam auferendo aliquid de parte sana, & proprie in cancro, quae res difficillima est & secundum plurimum impossibilis. Dieta autem in sanguineo declinet ad frigid. & sicc. In cholerico ad frigid. & humid. in phlegmatico ad calid. & sicc. in melancholico non cancroso ad calidum & humidum, sed in cancroso ad frigidum & humidum.

DE ANATOMIA GUTTURIS.

Cap. LXIII.

Postquam Rasis in parte praecedente egit de passionibus oris. In hac parte agit de passionibus gutturis, de quibus Auic. determinat, rursus dictum fuerit. Iuxta ordinem praemissum praestanda est anatomia gutturis. Est enim guttur spatium in quo sunt meatus, anhelitus & cibi, in cuius principio est uuula pendens ex palato, & a lateribus duae amygdae & sub uuula galfamat & epiglottis, & canna pulmonis, post quas uersus spondiles est meri. De anatomia uuulae fuit superius dictum. Et similiter pro parte de anatomia duarum amygdarum, quae iuxta sententiam Auic. sunt duae carnes natae in radice linguae tendentes ad superiora, ac si ipse sint duae auriculae paruae, & sunt nervosae, ut

sint fortiores, quarum iuuamentum est ut adiuvient, ut aer penetret per epiglottim ad cannam pulmonis. Algalamat uero est caro paniculosa & pro parte cartilaginosa annexa palato sub uuula cooperiens caput cannae, id est orificium epiglottis, ut cibus ab ore possit super hoc cooperimento transire ad meri quod est situm in parte posteriori, aperitur autem homine loquente. ridente aut canente. Et propterea si tunc temporis cibum deglutiat uel porum, transit ad epiglottim, homo sit angustatur, & tussit donec quod ingresum est emiserit. Anatomiam uero epiglottis cannae pulmonis & meri dicemus posterius.

DE SYNANCHE SEV ANGINA.

Cap. LXIII.

Circa rub. huius capitis, sciendum quod reperiuntur isti termini, synanche siue synachia, cynanchia siue synanche significantes hanc dispositionem, de qua hic agit Rasis, quae diffinitur est apostema in gutture anhelitum impediens uel deglutionem aut utrunque. Parasyanche, & paracyanche sunt termini synonymi significantes paruam synanchen, & propterea appropriantur synanchiae, quae est in musculis extrinsecis & non intrinsecis ipsius meri & epiglottis, licet apud Salernitanos. Synanchia dicatur quando est intus & non apparet extra. Cynanchia uero, quando est solum foris. Squinancia quando est intus & foris iuxta uersum suum. Syntus, cy uero, foris, sicut tenet utrunque. Dicitur autem in diffinitione quod est apostema, nam licet possit accidere impedimentum in deglutione & anhelitu ex alijs causis existentibus in gutture, illud tamen non dicitur synanchia. Sicut si praefocaretur homo ex coemestione fungorum aut aliorum uenentorum, aut ex congelatione sanguinis in aliquibus uisceribus, aut si iste operationes impediretur propter dislocationem alicuius spondilium colli, maxime primae & secundae ad interiora quae dislocatio potest esse tam a causa extrinseca, quam a causa intrinseca, & proprie in pueris propter debilitatem ligamentorum suorum. Similiter & si spasmareretur aut paralytarentur musculi meri, aut epiglottis propter quae istae operationes impedirentur sicut est possibile nullo existente apostemate, tunc non diceretur synanchia, imò est possibile quod fiat praefocatio & impediatur anhelitus propter nocumētum lacerti, quae est in interiori parte epiglottis, quamuis meatus non sit oppilatus, & plurimae sunt aliae causae, quae possunt impedire deglutionem & anhelitum, quae tamen non faciunt synanchiam, quia non apostemant.

Species synanchiae, quandoque sumuntur ab humoribus, quandoque a locis in quibus fiunt. Est enim quadruplex, scilicet sanguinea, phlegmatica, choleric, melancholica, quae tamen rarissime accidunt. Cuius causa est, quia ista passio fit ualde cito & secundum plurimum per uiam defluxus. Raro autem humor melancholicus propter sui crassitiam & paucitatem cito permutat de loco ad locum, neque huiusmodi apostema melancholicum posset, nisi in longo tempore congeri. Attamen uult Auic. hanc synanchiam melancholicam tam incipiendo, quam permutando maxime ex apostemate sanguineo aliquando posse generari. Sunt etiam quatuor species distinctae secundum loca,

Nam aliqua fit in musculis extrinsecis ipsius epiglottis versus partem anteriorem gulae. Et aliquando fit in musculis extrinsecis ipsius meri siue versus epiglottim, siue versus spondiles colli, & similiter etiam aliquando fiet in musculis spondilium colli. Tertiò aliqua fit in parte intrinseca ipsius meri. Quartò aliqua fit in parte intrinseca epiglottis & cannae pulmonis. Et quòdque fit in pluribus partibus simul. Auic, uerò nominat unam speciem famofam praefocationis quae dicitur canina. Nam patiens ipsam gerit similitudinem canis sub aestu solis fatigati. Emittere enim linguam, tenet os apertum, habet anhelitus succedentes sicut canis taliter fatigatus. & hoc est secundum plurimum in parte intrinseca epiglottis & cannae. Et ex his inferitur apostema duarum amygdalarum non propriè synanchias appellatas. Cuius causa est, quia secundum plurimum leuiter impediunt deglutionem aut anhelitum, sed dignius appellantur para cynanchiae. Causae coniunctae sunt humores iam dicti. Sed frequentius sanguis, quia eius maxima abundantia in uenis & arteriis colli est repta, deinde phlegma, plurimum ex eo à cerebro deriuatur, rarius cholera, rarissimè melancholia.

Causae antecedentes sunt repletio aut totius, aut capitis, aut partium circa guttur, similiter debilitas illorum membrorum.

Causae primitivae sunt indebitum regimen sex rerum non naturalium, & propterea multiplicantur in uere frigido & humido, & aliqui cibi à proprietate eam generant, sicut andacocha, id est, trifolium. Item balneum, exercitium fortè & in consuetum corpore repleto, & similia. Terminantur autem sextupliciter, quia aut resoluitur, aut suppuratur, aut induratur, aut permutatur, uel ad cutim exterius, uel ad pulmonem, uel ad cor, uel ad stomachum, uel ad cerebrum, aut putrescit, aut interficit maximè suffocatio.

Signa communia. Omnes synanchiae sunt impedimentum deglutionis aut anhelitus, & secundum plurimum utriusque; aliquando tantum, ut potius cum non potest deglutiri per nares egrediat. Signa autem sanguineae si sensui subiacet est color rubeus, purpureus, tensio durities, dolor fortis, extensiuus, grauatiuus, & quòdque pulsatiuus, sapor rei dulcis atque stantis dulcedini sanguinis aut similis sapor uini & constrictio anhelitus uehemens, & reliqua signa sumpta ex complexione & habitudine sanguinea & tensione uenarum faciei & colli, & similia.

In cholerica color est rubeus tendens in citrinum dolor pungitius aut mordicatus, pauca tensio & durities, sitis linguae, citrinitas & ariditas parua, anhelitus constrictio & uigiliae, & apparet quòd fit in loco aliquid acutum mordicatum: dolor tamen cholericae minor est dolore sanguineae & caetera attestantia cholericae. Phlegmaticae dolor est paruus obtusus, sapor phlegmatis salus cum caliditate & viscositate, quoniam hoc phlegma est corruptum & putrefactum, albedo linguae & faciei, paucitas sitis & paruitas inflammationis, multa humiditas ex ore profluens & caetera signa phlegmaticae. Et quòdque prosterntur lingua cum mollificatione, & raro accidit cum ea apostema in glandulis, & non sunt cum ea febris, & prolongatur spatium eius ad quatuor dies, & quando nititur habens eam possibilibus est de-

glutio, quoniam penetrat deglutitum in mollitiem. Melancholicae uerò color fuscus, paruus dolor, sitis, citas linguae, durities, tardus euentus, eius sapor ponticus, & caetera signa melancholicae. Et quòdque fit incipiendo, & quòdque permutando ex apostemate sanguineo. Signa illius quae est in musculis extrinsecis epiglottis versus anterius est, quia comprehenditur per uisum & tactum tangendo cutim exterius ex directio epiglottis, nam sentitur durities, & leui tactu causatur dolor, & aliquando color apostematis communicatur exterius, & est magnum impedimentum in anhelitu paruū in deglutione non potest uideri aspiciendo in ore. Illa uerò quae fit in musculis extrinsecis meri, & facta in musculis spondilium comprehendit uisu fortiter comprimendo linguam, sed magis impedit deglutionem quā anhelitum, & facta in musculis extrinsecis epiglottis versus meri, etiam comprehenditur uisu fortiter comprimendo linguam. Sed magis impedit anhelitum quā deglutionem, facta autem interius in meri non comprehenditur aliquo modo per uisum, & magis impedit deglutionem quā anhelitum. Sed facta in epiglotti etiam non uidetur, & magis impedit anhelitum quā deglutionem. Nota quòd si fiat in parte inferiori meri, potest impedire deglutionem non impediendo anhelitum sicut facta in canna distanter ab epiglotti multū impedit anhelitum, imò secundum plurimum suffocat quousque impedit deglutionem. Sed in parte superiori propter magnam connexionem utriusque in quocunque fiat, utriusque notabiliter operationem impedit. Signa uerò causarum primitiuarum sunt ipsarum praecursio. Signa uerò apostematum quae sunt in amygdalis ex loco consumuntur, facile enim subiacent uisui, & etiam cum digito tangi possunt. Signa terminationis ipsius sunt, quia si resoluitur febris, & caetera accidentia complètè remittuntur, neque apparet alterius membrini cumentum. Si uerò suppuratur intenditur febris, & dolidor, & propriè pulsatiuus & caetera accidentia, deinde parum quiescunt circa quartum diem, donec tandem rumpatur, siue à natura, siue ab arte. Si uerò induratur resolutis partibus subtilibus & crassis remanentibus, in primis fit alleuiatio, decreuit febris, & caetera accidentia, & remanet tantum grauitas, & dolor, & impedimentum deglutionis aut anhelitus longo tempore & fortè per annū. Et quòdque materia lapidatur. Et aliquando res dura sicut lapis egreditur. Si uerò permutetur, illius apostematis delitefcunt noua accidentia praeter febrim, & cum hoc sequitur permutamentum in alio membro ad quòd materia permutatur. Vnde si permutatur ad pulmonem, sequitur tussis & pulsus fit uisus, anhelitus postea constringitur cum in principio permutationis fuerit dilatatus, & sequuntur caetera accidentia peripneumoniae. Si uerò pulsus fiat spasmosus permutatur ad neruos. Si uerò ad cor fit pulsus diuersus, debilis, tremor cordis, & syncopis, & festina mors. Si uerò ad stomachum sequuntur noua cumenta stomachi cum remissione sequitur dolor capitis, alienatio, & caetera accidentia phrenetice, de quibus supra. Si uerò ad cutim crescit in carne dolor, durities, tumor & rubor: si materia sit calida, cum remissione noua cumenta synanchiae. Si uerò non permutetur, sed potius materia dilataetur propter suam multitudinem

multitudinem, tunc cum cremento nocementorum
tunc crescunt accidentia synanchiæ. Si autē putrefiat
crecit feb. & cætera accidentia & partes putridæ, quæ
sensui subiacent, liuēt, aut nigrescunt et foetent. Si ue
rō interficit absque alia ex supradictis terminationi
bus tunc est, aut quia corpus non nutritur deglutio
ne impedita, aut præfocatur anhelitu propter aposte
ma impedito.

Prognostica. Primum. Omnis synanche est acuta
et uelocis terminationis ad mortem uel ad salutem
nisi ad duritiem terminetur, tunc enim quando chro
nicatur. Velocissimæ autem terminationis, & pro
priæ ad mortem est quæ est in parte intrinseca epiglot
tis, ita ut quandoque in 24. imò in 12. horis præfocet.
Et cum hac frequenter est exitus amborū oculorum,
& egressio lingue cum debilitate motus eius. Sed in
pluribus est terminatio inter quartum & septimum.

Secundum. Illa synanche est deterior, quæ appa
ret interius & exterius occupans omnes partes, post
quam sequitur in malitia, quæ non apparet interius
nec exterius, deinde quæ apparet interius & non exte
rius: minus mala quæ apparet exterius & non inte
rius. Tertiū. Illa synanche est ualde mala cum qua pro
hibetur anhelitus omnino si æger resupinet & si non
redupinet fit anhelitus difficilis. Illa autē cum qua im
peditur deglutio, imò aufertur absque magno impedi
mento anhelitus est secundum plurimum salubris, si
conuulsiō illa cum qua multum impeditur anhe
litus cum paucō impedimento meri est secundum plu
rimum mortalis, & mortalior est illa, quæ plurimum
impedit anhelitum absque aliquo impedimento deglu
tionis, quam quæ simul impedit anhelitum & deglu
tionem. Significat enim apostema in canna pul
monis quod est deterius alijs partibus, quàm in epi
glotti. Quartum. Quando tanta fit anhelitus con
strictio ut reductis humiditatibus ex pulmone fiat spu
ma, tunc non est spes in ipso, nec oportet ut curetur.

Cum tamen quandoque accidat ut præfocatus spu
met, scilicet ex alijs causis, deinde sanetur. Quintum.
Cuiuscumque præfocati facies fit uiridis & denigratur
fuit oculorum, tunc moritur, & similiter quando
minoratur pulsus & infrigidantur extrema.

Sextum. Crassities lingue & ipsius denigratio est ex
signis ualde malis. Septimum. Quando est cum
natæ uagans & non seruans periodum, tunc mors se
minat, quoniam feb. facit ægrum indigere anhelitu
magno. Octauum. Dictum est in signis mortis ue
locis, quod si quis præfocationem patitur, & altera
tur color postremi colli eius ad rubedine sua consueta
ad albedinem aut ad uiriditatem & sudant æsellæ &
ingruina eius sudore frigido, moritur inter spacium
duorum dierum. Nonum. Si permutetur ad pul
monem in septem diebus pereunt. Si uero hos effuge
runt salui sunt. Sed quæ permutantur ad cor semper
interficiunt. Signa uero spei sunt si permutatur ru
bedo ad exteriora, multotiens enim aperit oculos
& sanatur, & similiter quando alteratur eorum anhe
litus & incipiunt anhelare anhelitu breui, cuius causa
est, quia in uehementi constrictione habent anhelu
rum longum, quoniam propter stricturam uiarum
aerem paulatim intrare faciunt. Cum ergo abbrevie
tur, remouetur causa præparans ad longitudinem, &

redeunt membra ad dispositionem naturalem, & si
militer quando permutatur materia ad lacum oppo
situm facit sperare, & quando accidit dolor perietie
rans anno uno aut duobus in gutture, significat pe
trosam superfluitatem in partibus gutturis.

QUum in deglutendo sentitur an
gustia, adest passio quæ synan
chia uocatur, cuius grauitas aut leuitas se
cundū angustia quātitatē deprehēdi potest.

Diuiditur hoc cap. in partes duas. In prima po
nit signa synanchiæ. In secunda ibi. Cum traijciendi,
ponit curam. De prima parte dicit. Cum in de
glutendo sentitur angustia, tum ex dolore in deglu
tendo, tum ex anhelitus constrictione adest synan
che, & uos supplete reliqua signa superius dicta con
cludentia ibi adesse apostema. Huius autem synan
chiæ grauitas est maior aut minor secundum quantita
tem angustia, id est, nocementi in deglutendo &
anhelando, sed maxime in anhelando.

Cumq; traijciendi angustia fuerit in fa
cie & oculis rubedo & repletio, in princi
pio curationis cephalica phlebotometur.

Et gargarismus ex succo granati muci cū
carnositate sua fiat, aut ex rob mali macia
ni acetosi, aut ex rob mori de semine. Et
post hoc fiat gargarismus ex aqua rosacea,
in qua sumach fuerit infusum. Quod post
quam per tres dies sic factum fuerit, & uen
ter ex succo fructuum, sicut prunorum, ta
mar. cassia fist. & teremabim solutus fue
rit, fiat gargarismus ex apozimate ficuum
citrinarum, & passularum, aut ex medulla
cassia fist. cum hydromelle. Quod si passio
inueterauerit ex gargarismis & insuffla
tione fortium medicaminum, quæ dicturi
sumus, curanda erit.

Hic ponit curam. Et diuiditur in tres partes. In
prima curat synanchen à causa calida. In secundo ibi.
Si autem in facie non fuerit rubedo, Curat synanchen
à causa frig. in tertia ibi. De his præterea ponit me
dia malæ synanchiæ. Quæ dicit in hac parte sunt ma
nifesta. Innuit enim curationem uniuersalem cum
phlebotomia cephalica, & cum decoct. fructuum, &
manna, & cassia ad euacuandum choleram, quæ in
his casibus cum frigidis lenientibus debet educi & nō
cum medicinis exoluentibus. Recepta autem sic
huiusmodi. s. prunorum tamar. ana. ʒ. s. incidan
tur crasso modo, & bulliant in 9. ʒ. aquæ ad consum
ptionem duarum partium & coletur, cum qua cola
tura trahatur cass. ʒ. s. manna, ʒ. i. aut decem. ʒ. flo.

rum calsię cum suprascripta decoctione misceantur.

Et quantum ad curam particularem innuit intentiones tres. Prima est percussio cum quatuor medicinis frig. & sic. & stipt. & in litera descriptis, quæ debent aliqua potestate & acredine participare, ut profundius imprimant, loco macianorum acrius, de quibus supra, accipiamus succum pomorum immaturaorum, aut succum pomorum rub. acrium, mora sunt duplicia, sunt enim mora rubi quæ sunt magis stipt. magis conuenientia in principio, & mora celsi magis conuenientia in augmento & utraq; sunt duplicia matura conuenientia in augmento, immatura magis in principio. Et ex maturis quædam sunt acetosa frigida, & humida, & apud quosdam frig. & sic. conuenientia magis in principio, quædam dulcia conuenientia in augmento, & statu. horum ergo succorum aut rob utere secundum quod oportet. Secunda est resolutio cum lenitione quadam aut maturacione: quæ tamen debent esse mixta cum percussione, & proprie si apostema tendat in uiam resolutionis. Si uero per uiam maturacionis aut sufficiunt sola maturatiua, aut sint mixta cum paucis percussiuus. Vnde cum decoctione ficuum passularum, & cet. sit admixtum aliquid diamoron aut dianucum. Tertiò est resolutio pura conueniens à medio status, deinceps cum medicinis ponendis in fine cap. Si uero apostema tendat in uiam maturacionis adiuetur maturatio, et postea eruptio secundum quod dicitur in ordinatione curæ.

Si autem in facie non fuerit rubedo, fluxeritq; ab ore saluæ multitudo, & æger fuerit humectatus in principio soluat ur uenter ex chochijis. Et fiat enea ex chysteri acuto quod in cap. de apoplexia nominauimus. Cum passio tamen inceperit fiat gargarismus ex syru. acetoso, aut cum hydromelle, pip. & oxymelle. Deinde ex almuri Nabati fiat etiā gargaris. ex hydrom. et sinapi.

Quæ dicit in hac secunda parte sunt manifesta, & magis ex dicendis manifestabuntur.

Et de his præterea quæ malæ squinatix conferunt, sunt ut ex uenis quæ sunt sub lingua fiat minutio, & uento sã absq; scarificatione in collo ponantur, & epitimetur collum ex melle, ana, donec uesticæ in eo generentur, & fiat gargaris. cum sinapi. Et fiat gutturi insufflatio ex hoc medicamine, quod sic fit, sinapi, sal ammoniacus, pithrum, nitrum assa, piper, mentast, sumantur, et ex eis cum hydromelle fiat gargaris.

In hac ultima parte innuit intentiones quatuor, scilicet eradicatione materiæ cum phlebotomia uenarum quæ sunt sub lingua, secundo meri & epiglottis dilationem cum uentosis apposis in collo, & proprie

super secunda spondili ad facilius anhelandum et deglutendum, tertiò diuersione cum melle, ana. cal. & sic. in quarto uesticante apponendo proprie supracunda spondili per spacium 8. aut 10. horarum, donec uesticæ factæ sint quæ aperiantur & aperte renentur, ultimò intendit resolutionem cum medicinis in textu descriptis quæ sunt ille, de quibus facta est mentio superius. Cura synanchiæ triplex exigit regimen. Primum debetur causæ antecedenti, secundum causæ coniunctæ, tertium commune utriq;. Primum habet tres intentiones, euacuationem, fluxus prohibitionem, & diuersionem. Euacuatio autem fit solis peccet sanguis, ut alij humores cum sanguine dominante, aut etiam si omnes humores æque proportionabiliter creuerint est phlebotomia, quæ repletionem existente in toto fiat ex uena communi. Et si repletus fuerit fluxus hæmorrhoidalis conuersus aut menstrualis fiat ex saphenis, & si epur fuerit in causâ generans sanguinem acutum fiat ex basilica, quæ cumque harum prius phlebotomata fuerit, phlebotometur postea cephalica eiusdem lateris, & si ad neuritis declinauerit synanche, phlebotometur cephalica extra, aut dextra & sinistra simul. Quantitas autem sang. hauriendi constante uirtute & multa existente repletionem est usq; ad syncopim exclusiue qui in calibus fortibus non dantibus inducias est continuam extrahendus, donec uideatur sufficere. Si autem uirtus non toleret aut ægritudo dederit inducias, est huiusmodi phlebotomia, partienda, ut uerbi gratia prima hora extrahatur à 6. usq; ad 12. 3. sang. deinde per 8. horas aut 12. horas hauriat à 4. 3. usq; ad 8. Et postea si oportuerit à 3. usq; ad 6. & melius est ut hæc sint ex diuersis uenis incipiendo à remotis & ueniendo ad propinquas, & ultimò ad cephalicam eiusdem lateris, & quacumq; harum phlebotomata, aut pluribus, phlebotomentur (si ægritudo nō manifestetur sanauerit) uenæ quæ sunt sub lingua, & permittatur sanauerit per se stringi nisi multum exuberauerit. Et si repletio solum fuerit à furcula, supra phlebotomentur, solum cephalicæ, & prius cephalica lateris oppositi, deinde cephalica eiusdem lateris. Quod si pauca fuerint sicut uerisimilis est in illis qui frequenter incurunt synachen sufficit phlebotomia cephalicæ eiusdem lateris à quatuor 3. usq; ad 6. postquam per duas aut tres horas si oportuerit phlebotomentur uenæ sub lingua & maxime si in eis apparuerit plenitudo.

Si autem cholera cum sanguine abundare contigerit soluat ur, & ante phlebotomiam si plurimum abundauerit & etiam si uenter fuerit stipticus soluat ur. Sed post phlebotomiam secundum plurimum, & soluat ur cum medicinis infrigidantibus & lenientibus sicut cum decoctione prunorum, tamariniol. mirob. & similibus addendo calsiām & manuiol. Et apud maiorem necessitatem infrigidationem. Et apud maiorem necessitatem secundum necessitatem & nullo pacto soluat ur cum medicinis exolutantibus. Et similiter si alij humores peccauerint cum sanguine facta phlebotomia educatur phlegma cum cochijs & hieris, & melanchol. cum epithymo, sena, & pilulis indls, & similibus. Pauci enim sunt calis in quibus fit excusatio à phlebot. Secunda autem intentio si materia fuerit calida, subtilis periciatur comedendo & tenedo in ore diacodion & sumendo syr. de paupere

ne liberati fuissent, licet forte non ita celeriter, arramē in casibus arduis credo illa magis obesse quam iuuare & ad argumētā de apost. cerebri & aliorū dico quod in illis applicant reperculsiua exterior, quia non possunt applicari interiori sicut in synachia. Et si infietur quod A. iubet in synachia approximari reperculsiua super commillura coronali, sicut suc. acatie, ergo multo magis poterunt gulæ applicari. Negatur consequentia, est enim inter commilluram coron. & guttur colligantia quedam qua fit ut medicinæ ibi applicatæ iuuent in passionibus gutturis. Sicut & mirabilis est quod in filluris laborum medicinæ appositæ sumini & ano conferant. Conferentia ergo in sanguinea sunt illa quatuor reperculsiua in textu posita. Ex communibus autem est aqua ros. cum quarta parte aceti, & suc. solat. cum sem. ros. est ad id mirabile, est similiter suc. cyth. sorbar. zarar. id est, genus piri paruum. Et apud Siculos arbor eius uocatur zarore, & non est forba neq; mepsila, & albelach, id est, species dactylorum & propriè lyestrum & immaturorū, & quandoq; cum istis ad uigoriandum operationem suam admiscetur balauft. gal. sem. alumen & similia, & suc. agrestis inspillatur & mixtus cum pyrdictis medicinis liquidis est iuuamenti sublimis, & similiter fucus sumach inspillatur. Quod si materia fuerit cholericā conferunt hæc quæ diximus facta magis infrigidantia cum eo quod est propriè suc. solat. sandali & camphoræ, & mucil. psilij & similia stipitica, pontica, aut acetosa. Et apud Mesue quedam ex his non tantum gargarizata, sed etiam bibita sunt iuuamenti sublimis. Sicut uerbi gratia rob de papauere bithum est sublimis iuuamenti uehementiæ doloris synachia & præfocationis, & propriè cum aqua sumach. Et similiter lac quod mulgetur ex sem. papaueris & propriè cum aqua ros. aut sumach, & ex eis est suc. solari depuratus & bibitus mane & sero secundum mensuram duarum testarum oui, similiter mucilago psilij cum coriandro & gran. i. s. camphoræ. Sed hæc propriè complement intentionem secundam regiminis uniuersalis & ualent in sedatione doloris & uigiliariū sicut dicit in regimine tertio. Sed in phlegmate in principio conuenit si phlegma fuerit uiscosum syrup. acetosus aut oxymel simplex gargarizata cum decoctione myrsi aut gallarum aut cum diamoron & aceto cum aqua ros. Et si phleg. fuerit aquosum conuenit decoctio myrsi, thuris, gall. aluminis aut alicuius istorum cum diamoron aut dianucum prædicto. Et si fuerit melancholica gargarizetur decoctio liquiritiæ & passulorum cum diamoron aut lac cum diamoron aut dianucum. Sed in augmento calid. cum aliquo aut aliquibus ex prædictis superius misceatur dianucum. Et quanto magis procedit augmentum tanto plus minoratur frigida, acria, acetosa, pontica & stipitica, et addantur resoluentia & lenientia sicut decoctio liquiritiæ, passul. dactil. aut ficum aut lac cum diamoron & dianucum cum diamoron aut dianucum. Et lac solum est optimum sedans dolorem deinde, & fit caprinum aut afininum, & mucilago, sem. cytoniorum, & sem. maluaui. lenit & sedat dolorem. In ultimo status gargarizetur cum lenientibus & resoluentibus simul licet est decoctio prædicta cui apud maiorem necessitatem resolutionis addatur aliquod modicum cineris hirudinum.

dit secundum. Pro secunda intentione locet in aëre tem-
perato nō fumeo neq; uēroso mediocriter illumina-
to, & teneat corpus satis bñ panis coopertū secundū
exigentia tēporis. Sed caput mediocriter calid. in spe-
cia sua consuetudine ut neq; aestuet neq; frigat. Sō-
nus eius sit interruptus & sint ibi astantes fideles et di-
creti qui expergefiant ipsum cum sentiunt eū ore-
gmonizare et faciant ipsum spuerē, deinde ad somnū
redire, & dormiat sedens capite ad alterum latus decli-
nante & distanter à cibo per horam. Sollicitè pro-
cure omnes euacuationes à natura institutas præci-
pue assellet bis aut semel in die natura aut arte, & de-
mueret nares, non tamen fricetur caput saltem in prin-
cipio, nullo pacto moueatur neq; loquatur neq; sit i-
bi strepitus personarum, sit sperans & gaudens, & ui-
det animi accidentia superflua, prima die nō bibat ni-
si aquam saccharat. aut hordeaceam, aut mellitam, si
materia fuerit frig. secunda die comedat pisanā hor-
deaceam in die uel panem lotum in aqua, & non bi-
uat uinum, neq; comedat carnes aut oua. Et sic conti-
nue quousq; incipiat declinatio qua incipiente come-
dat pisanam hordeaceam aut panem lotum in bro-
dio pulli & poma cocta, tandem ipsa magis declinan-
te concedantur oua forbilia, & tandem uinū limpha-
tum, & carnes, et brodiū cicerum est conueniens pro-
priè in materia frig. Et de hac cura hæc sufficiunt.

DE ANATOMIA PECTORIS.
Caput. LXV.

Quia hic agitur de passionibus pectoris
& membrorum spiritualium iuxta cō-
suetudinem præmittenda est anatomia
descripti uenter medius contentius membrorum
spiritualium superius ad fureculā, inferius ad diaphrag-
ma terminatum. 88. habet musculos ad eius motus
ordinatos, 24. costas à 12. spondilibus ortum habent-
es interius circumdatas pāniculo pleura ad mō-
tus, & motus musculorū eius est animatus, id est, uo-
bus pectoris qui nerui in somno non oppilantur nec
quiescunt. Diaphragma uerò est pāniculus in medio
neruosus cum quo pulmo coniungitur, in circunfe-
rentiā carnosus ad anhelitum & diuidendum natu-
ralia à spiritualibus & ad expellendum quæ in mem-
bris naturalibus sunt digna expulsiōe finaliter ordi-
natum, et eius motus partim est naturalis, partim ani-
matus adueniunt ipsi, nerui sensitiui et motiui à quar-
to & quinto pari neruorum nuchæ. Pleura uerò est
panniculus durus undiq; regens costas ad continen-
dam immediatè membra spiritualia, & ut panniculi
orientur finaliter ordinatum, media istius uerò est
panniculus unus, imò potius duplex diuidens pectus
secundum longum, ortum habet à pleura ad suspen-
dendum pulmonē & prohibendū transitum meri de
una medietate pectoris ad alterā finaliter ordinatus.
Pulmo uerò est membrum instrumentale in pecto-
re contentum ex trachea arteria, uena arteriali & arte-
ria uenali, carne molli, spongiosa & panniculo inuol-
uente compositus ad anhelitum & cordis euentatio-
nem principaliter ordinatus ad anhelitum merè natu-

raliter concurrens, licet ad ipsum causandum sit agēs
principale. Trachea autem quæ est prima pars eius est
longa, rotunda, in gutture constituta contigua meri
& ori secundum partem eius superiorem quæ uocatur
epiglottis, ex annulis cartilagineis & pāniculis in-
uoluentibus & ligamentis adiuicem annulos conti-
nuantibus qui secundum partem posteriorem meri cū
quadam pellicula cōtinuantur ad deferendum aërem
ad pulmonem & exterius referendum ad uocem secū-
dum eius extremum superius ordinata. Epiglottis ue-
rò est cannæ principium ori contiguū, & cum supre-
ma parte meri multum colligatum ex tribus cartila-
ginibus & 20. musculis, & panniculis inuoluentibus
cōpositum ad uocem principaliter ordinatum. Est e-
nim hic epiglottis in suprema & anteriori parte gut-
turis constituta ut ipsa cum sit uocis instrumentum sit
proxima ori in quo perficitur locutio cum uox in lo-
cutionem ordinetur, & fuit facta tota cartilaginosa,
ut esset sonora. Est autem multum annexa cum meri
ut cum meri eleuatur ad cibum attrahendum ipsa se-
cum eleuetur ne remanēs inferius deglutitionem impe-
diat. Vna eius cartilago est antierius & uocatur scu-
talis siue dipealis ad modū dipei. Posterior uerò uer-
sus meri uocatur nomen non habes. Tertia autem est
in medio earum in qua est lingua fistulæ ad modulan-
dum ordinata, dicitur autē hæc epiglottis fistula, quia
est ordinata in cantū sicut fistula ordinatur in sonū.
est autem ex uiginti musculis composita quia ordi-
nantur in motum eius uoluntarium secundum exi-
gentiam uocis formandæ, & duodecim sunt interius
& octo exterius, & ad istos musculos adueniunt duo
nerui dicti reuerfui, in uno quoq; latere cannæ est u-
nus, & oriuntur à sexto pari neruorum cerebri, cuius
una pars descendit ad cor iuxta arteriam aortæ & ex-
inde incipiunt ascendere superius usq; ad epiglottim.
Etiā nerui reuerfui diuidunt in hos 20. musculos dā-
tes eis sensum & motum, & isti sunt propriè nerui uo-
cis. Alij uerò descendentes de quibus dictum est
sunt nerui uocis & aliarum operationum. Hi autem
nerui fuerunt reuerfui, & non directè uenerunt à cere-
bro ad epiglottim quatuor ex causis positis à G. in li-
bro de motibus liquidis. Vna causa, ut essent fortio-
res, cum sunt principium magni motus. Nūc autem
quāto sunt sicciores, sunt duriores & fortiores, siccit-
atem autē acquirunt quāto magis à cerebro distāt.
Secūda causa ut cerebro modicè moto moueretur e-
piglottis secundum imperium eius, sit hoc autem me-
lius per hoc quod d nerui illi sunt situati ad modum fre-
ni, quibus utitur cerebrum sicut miles utitur freno
& habenis.

Tertia causa quia licet uox dependeat à cerebro tā-
quā à principio uoluntarij motus, dependet tamē
à corde tanquam ab eo in quo firmatur cōceptus, uel
in quo est principium conceptus cerebri, & ideo cum
sit cōmunis operatio cerebri & cordis, nerui qui sunt
instrumenta uocis debent communicari cordi & ce-
rebro. Sed hæc duæ causæ sunt rhetorice. Quarta cau-
sa melior est cæteris, quia nerui debent peruenire ad
musculos iuxta principium ipsorum, & nō iuxta fi-
nem. Principium autē musculorum epiglottis est uer-
sus partem inferiorem, quare &c. Pāniculi autem inuol-
uentes epiglottim & cannā pulmonis ortum habent
à pleura & ad istos & panniculum inuoluentem pul-

tua musculorum pectoris cum adiutorio aeris impetuose expirari. Et quia tussis est ad expellendū nociua non est dispositio hominis perfecte sani. Notandum primò quod partium pectoralium quinque assignantur motus siue actiones. Prima est anhelitus æqualis. Qui completur principaliter per uirtutem attractiuam, & expulsiuam naturalem ipsius pulmonis naturaliter attractantis & expellentis aërem. Secundò per uirtutem duplicem ipsius diaphragmatis naturalem & animatam, de qua supra coadiuuantē pulmonem ad supra scriptam operationem. Tertiò per uirtutem animatā quorundā musculorū pectoris. Et quauis hæc duæ uirtutes diaphragmatis & musculorū prius concurrant ad anhelitum, et incipiant mouere pectus ad culum motū sequat motus pulmonis, sicut de spongia inter manus recta quæ dilatatur cū manus dilatatur & cōstringitur cōstringitur, ut explicat Gal. quinto de interioribus, cap. secundo, tamē cum toto hoc fiat quod principalis pulmo concurrat ad anhelitum, quæ diaphragma aut musculi pectoris, cum hæc membra pulmonis anhelando deseruiant. Secunda actio est flatus aeris maior & impetuosiore solito anhelitu & æquali, & hæc actio supponit primam, scilicet, anhelitum æqualem & tres motores iam dictos ad anhelitū æqualem concurrentes. Et præter hos exigit lacertos quatuor inter costas, & etiam cooperientes costas inter uocis, ut uult Gal. 4. de interioribus cap. de nocumentis, & tertio de iuuamentis, cap. 1. cum ad anhelitum æqualem sufficiant musculi pectoris extrinseci, & hæc operatio secunda potest fieri dormiendo & diuiniendo secundum necessitatem in statem expellendi spirituum euentatione. Tertia actio est flatus cum aliquo aeris expirari & reperculsi in tribus, charas primas, & omnes motores scriptos, & cū hoc motus lacertorum existētium in gutture. Quarta actio est uox quæ comprehendit tres præcedentes, & cū hic exigit motum lacertorū epiglottis pro uoce forlata comprehendens & supponens quatuor dictas, & omnes motores supradictos & cum hoc exigit motum linguæ, ut uariet & diuidat uocem & completibus, & sunt dentes, labia, nares, palatum, ut 4. inter, cap. de nocumentis uocis, qui motus linguæ fit per neruū secundo quod patuit superius de intentione Auic. & 4. de interioribus, cap. 3. circa princ. & sic patet quod istæ actiones partim sunt naturales, partim sunt animatas uoluntariæ. In primis tribus actionibus uirtutem uoluntariam & diaphragmatis superat motum uicinatum superat naturalem pulmonis, & partem naturalem superat motum uoluntariam, in partem naturalem superat motum uoluntariam, ut uoluntaria superat naturalem pulmonis & partem uicinatum, quod patet, quia secundum imperium uoluntatis loquimur, & desistimus à loquela. Et ex his patet quod quatuor primæ actiones concurrunt in

tussi. Nā in flatu cū actu aliquo & motu lacertorū gutturis, & lacertorum pectoris, & cum hoc etiam fortem motum lacertorum epiglottis.

Hic est dubiū satis difficile. Nunquid tussis sit propria passio pulmonis, ita ut non possit fieri per alterius membri nocumentū non nocito pulmone. In qua quæstione tenendum est tussim esse propriam passionem pulmonis ad hunc intellectum, quod per nullius alterius membri nocumentum potest fieri tussis nisi pulmo lædatur, uel aliquo modo ad expellendum nociua irritetur, siue per essentiam siue per communitatē, unde Auic. 10. tertij. tractat. 4. cap. de signis pleuretis in princ. capituli inquit: Et tussis quidem non accidit nisi propterea quod pulmo lædatur ex uicinitate, & hanc eandem sententiā reperies ab eodē decima tertij, in multis locis quæ gratia breuitatis omitto. Idem Auerrois tertio colligit. cap. de ægritudinibus pulmonis. dicit enim quod propria ægritudo pulmonis est tussis, & Galenus sentit idem secundo de crisi, & tertio de interioribus, ult. cap. Et breuiter omnes autores quātum ad hoc in eandem coincidunt sententiā, & semper intelligendum est de tussi inuoluntaria, quia de tussi uoluntaria dicendum est oppositum, & unusquisque potest in seipso experiri. Sed contra, tussis cōpletur cū motu pectoris & diaphrag. & principaliter res expellenda per eorū motū expellitur, quæ per motum pulmonis ergo si ex læsione pulmonis solius accidit tussis multo magis ex ipsorū læsione. Et cōfirmat, si propter læsionē pulmonis pectus mouet, & facit tussim ut nocumentū expellat à pulmone, ergo multo magis mouebitur propter nocumentum proprium, ut ipsum à se expellat. Cum unumquodque membrum sit magis sollicitum de comodo proprio quā de alieno, & eo magis stat robur huius argumenti, quia pulmo de intentione Galeni, ut supra, nullum habet motum nisi quem recipit à pectore. Amplius Rasis in hoc cap. inter causas tussis ponit res infrigidantes pectus & lacertos eius. Item in apostemate eparis fit tussis sicca, & non nisi per mordicationem inductā in diaphragma, tertio pronosticorum, commento. 3. Præterea spiritum sanguinis à pectore fit cū maiori tussi et longiori quā spiritum sanguinis à pulmone de intentione omnium autorum, aut ergo fit tussis antequā sanguis tangeret uel lædat pulmonem, & habetur intentum, aut solum dum ingreditur pulmonem, & tūc non uidetur ratio, quare tussis debeat esse maior & longior, quā si spiritum sanguinis esset à pulmone. Et confirmatur, quia autores assignantes causam huius dicunt quod sanguis exiens de pectore uenit à longiori seu distantiore loco, quā exiens à pulmone. In summa tenenda est sententiā scripta, quod ad tussim necessarium est pulmonē aliquāter irritari, aut de per se, aut de per accidens, aut per essentiam, aut per communitatē, ita quod si solus lædatur alijs non læsis, neque per essentiam, neque per communitatem fit tussis propter naturalem subordinationem ipsorum ad pulmonem: si uero ipsa lædatur nullo modo læso pulmone non fit tussis. Huius sententiæ habemus duo signa. Primum, quia si esset maximum ulcus aut apostema in pectore quod nullo modo penetraret non esset tussis: attamen ex omni modico nocumento pulmonis aut canne sequitur tussis. Secundū signum est, quia non fit tussis nisi me-

*causæ sunt pectus & pulmone
non pectus pectus*

rito illius membri cui communicatur aer propter expulsiōem nocuenti eius. Sed aer nulli membro cōmunicatur nisi pulmōi ad hanc intētionem, scilicet, ad expellendum nociua, quare &c. Sed ad argumenta in oppositum respondetur. Ad primum concedit quod completur tussis propter motū pectoris & diaphragmatis, & res expellenda expellit per illa, tamen dico quod hec sunt principaliter per pulmōem quā per hæc membra coadiuvantia. Et ad confirmationē difficilem dicitur negādo, quod si pectus mouetur ad tussim propter nocumētum pulmōis, multo magis mouetur propter nocumētum propriū, quia licet pectus sit magis sollicitum de nocumento proprio q̄ de alieno. Tamen nunquā moueretur ad faciēdum tussim nisi prius pulmō sentiret nocumentum & sentiens hoc exigeret motum pectoris in adiutoriū, quia in hoc subordinatur pulmōi, & nō pulmō pectori. Et quamuis pulmō nullum habeat motū nisi quē recipit à pectore. Attamen pectus neq; diaphragma unquam mouebitur ad aliquem motū nisi pulmōe prius illum motum exigente. Ad Rasim dicitur, quod causæ infrigidas pectus faciunt tussim quia infrigidat pulmōem. Et similiter de apostemate epatis, quod nunquā faceret tussim nisi nocumētum cōmunicatum immediatē diaphragmati aliquo modo cōmunicaretur pulmōi, & de spūto sanguinis à pectore dicitur, quod tussis est maior & longior, cū iste sanguis est crassior, & etiam si esset æquē subtilis multa sit tussis, est enim maior, longior cum iste sanguis est crassior, & etiam si esset æquē subtilis, multa sit tussis antequā pectus ingrediatur. Illud enim est difficilius q̄ quod postquā ingressus est exercetur.

Tussis est quædam sic, & est sine spūto, quæda humida existens cum spūto. Et utraq; est duplex, quæda multum frequens quædam rara. Item quædam laboriosa & fortis & quædam facilis.

Causa tussis est duplex primitiua & corporea. Primitiua sicut aer frigidus, aut uentosus, maximē uentus septentrionalis exprimēdo, australis replēdo, & multiplicat tussis in hyeme & uere hyemali, & cum æstas est septentrionalis parū pluuiofa, & est autumnus meridionalis pluuiofus, multiplicat tussis in hyeme. Similiter uapores acuti inspirati sicut piperis, & similia sunt causa tussis mordicando pulmōem, & similiter sapor cibi acuti acris aut acetosi ualde, & res bibite aut comestæ quæ cannā pulmōis ingrediuntur, causæ uerò corporeæ sunt duplices per communitatem & per essentia. Per communitatem aut à toto sicut in febre, aut à parte sicut à cerebro ex defluxu materierum ad pulmōem, quæ materiæ cum distillant super cannā pulmōis non faciunt tussim secundum plurimum, sed tunc maximē faciunt tussim cum figitur in aliqua parte mordicando, aut aeris transitū oppilando. Similiter per communitatem ad pectus sicut in pleuresi & empyimate, aut per communitatem ad diaphragma cum apostematur aut ulceratur, & quodq; per communitatem à stomacho, epate, splene, cū apostemantur aut oppilantur, ipsa enim taliter intumescunt faciunt tussim comprimēdo diaphragma, & pulmōem, & quandoq; materiā transmittendo, à reliquis etiam membris corporis potest accidere tussis communicādo materiā, uapores aut malam cōplexionem pulmōi, Causæ autem per essentiam aut

sunt mala cōplexio sine materia frigida, aut sic, aut est materia cuiuscūq; generis sanguinea, phlegma, cholericā & melancholicā, sed rarius, quæ materiæ aliquādo imbibuntur, aliquādo inuisant, aliquādo oppilant, & apostemant, aliquādo resolutis partibus subtilibus in petra densantur. A solutione quoq; continui sicut ab ulceratione pulmōis fit tussis sicut in phthisi, & similiter à uulnere facto ab aliqua causa primitiua. Causæ autem tussis sic, sunt quæcūq; causæ faciunt tussim ab ipsa sententia materiæ in pulmōe sicut causæ primitiue corporis, aut facientes malam cōplexionem comprimendo. Materia quoq; existente in pulmōe accedit tussis sic, quando est nimium subtilis aut nimis crassa, inepta excreationi quæ postea cum reducit ad medium per digestionem facit tussim humidam, proprie re multoties in principio apostematum pulmōis aut quando sunt aliæ materiæ in pulmōe non apostemantes est tussis sicca quæ postea digesta materia efficitur humida. Apostemata autem pulmōis dura sunt ferè semper cum tussis sicca. Materia quoq; cōstituta in uenis pulmōis sua acuitate aut multitudine simulando facit tussim sic, & quandoq; causa tussis sicca est debilitas uirtutis expellentis.

Signa causarum primitiuarū tussis sunt ipsarum præcessio. Signa uerò tussis per communitatem à toto sicut in febre, sunt quod post febrem secuta est tussis cū quorum augmento augetur, & diminutione diminuitur, & ipsis recedentibus recedit, etc. Cognoscitur esse per communitatem à capite per signa catarrhi, de quibus supra in proprio cap. Et cognoscitur esse per communitatem à pectore & diaphragmate sicut accedit in apostematibus, & ulceribus eorum per signa pleuresis, empyimatis, & ulcerū ipsorum, de quibus infra, & maxime per excreationē spūti sanguinolenti, saniet, & huiusmodi. Cognoscitur autem esse per communitatem à stomacho, splene & epate sicut accedit in apostematibus & oppilationibus ipsorum de quibus infra, & maxime quia tussis huiusmodi est sicca proueniens potissimum a compressionem diaphragmatis & pulmōis. Similiter cognoscitur esse per communitatem à ceteris membris propter uapores, & malam cōplexionem pulmōi communicatam, quia præcellunt ex gritudines ipsorum, & cū augmento ipsarum augetur tussis & diminutione diminuitur, et quia tussis est sicca continua & magis laboriosa, quā illa quæ est per cōmunitatem, sed quæ est à mala cōplexione calida, frigida aut sic, sine materia est tussis sic, & quia præcellunt causæ calefacientes, infrigidas, aut exic. & lædunt ex similibus, iuuatur à contrariis, & caliditas cognoscitur & sic, ab aegro sentit. Sed materia sanguinea cognoscitur per rubedinem faciei & tensionem uenarum, & saporem sanguinis in ore sensatū. Et quia forte sanguis excreatur, sicut cholericā amarum, sitim, & per citrilitatem faciei citrinam, saporem amarum cognoscitur tatem eius quod excreatur. Et phlegma cognoscitur per palliditatem faciei cum albedine, sapore insipido aut salso cum humiditate superflua oris & pauca sputa melancholica uerò per colorem faciei fuscum & locum ponticum in ore, & tardum euentum eius, & cognoscitur ex signis peripneumonie de quibus infra. Subtilitas

tilitas uero materiae cognoscitur ex subtilitate, & fluxibilitate eius quod expellitur, & quia subito accidit sicut contra uiscosa ex signis contrariis. Quod aut sit ab ulcere sicut in phthisi cognoscitur ex signis phthisis, de quibus infra. Vultus aut pulmonis cognoscitur ex sanguine excreato, & ex causa primitiua quae uultus intulit. Sed apostema durum comprehenditur, quia tussis est sic diuturna cum signis caeteris peripneumoniae. Quod autem materia ad intra uenas contineatur cognoscitur, quia si multa est, adest resio uenarum & repletio. Si uero acuta sunt signa cholerae, de quibus supra, & haec tussis est sic. Tussis autem pendens a lapide in pulmone genito cognoscitur per eius excreatū, & causis calefacientibus & exiccantibus proportionatis generationi ipsius.

Prognostica. Primum tussis intensa frequens & diuturna deducit ad sputū sanguinis propter rupturam uenarum. Secundum, tussis praegnantis frequenter prouocat abortum. Tertium, tussis excrecens in febribus, aut post febres augmentū & recidiuā significat.

Q Vum tussis acciderit fuerit quae spera & sicca, & cum rubedine & calore agro muraba uiol. & ptisana tribuenda erit, fabas quoque excorticatas, et spinachias, cum oleo de amig. dul. in comestione accipiat. In ore uero semper tenere debet pilulas bichichias. Aqua aut quam bibet syrup. uiol. est admiscenda. Pilulae bichichiae. Rec. suc. liquiritiae. sacch. al. amborū an drach. 10. amili, dragachan. amig. dul. excorticatarum omnium an. drach. 5. ex his cum mucillagine sem. citonij conspersis informantur pilulae.

Diuiditur hoc capitulum in partes tres. In prima ponitur curam tussis a causa cal. In secunda ibi. Quod si cum tussis antiqua, ponitur curam tussis inueteratae & propter catarrhalis. De prima parte dicitur. Quod cum tussis fuerit a causa calida, quod comprehenditur, quia est cum asperitate, & est sicca, & sine sputo, aut quia est a mala complexionem cal. aut sic. sine materia, aut cum materia subtili, quae non facile excreatur nisi postquam digesta est, & cum rubedine, scilicet faciei, & linguae, & cetera, quod comprehenditur ex febre, aliquando ex amaritudine, & similibus arguentibus caliditate, tunc datur agro muraba uiolaceū, id est, conditum de uicioribus, scilicet, hordeacea, & comedat fabas sine dat, & incassat, & spinachia conueniunt, quia frig. et hum. & proprie cum oleo amig. dul. humido, & leniente quae interpretantur pilulae ad tussim, nam *βίχχισ* graece, tussis latine, ideo bichichium medicamen ad tussim: haec autem descriptio in textu satis manifesta est.

Quod si cum tussi multum affuerit sputum, quod cum expuendo expelli non potest nocumētum infert, sed neque feb. neque uehemēs uentris solutio ipsam comitantur. Ex his troch. dandum erit infirmo. Rec. sem. fenic. sem. opij, suc. liquir. capil. ueneris, amig. omnium partes aequales ex his cum mucillagine, sem. lini conspersis informantur trochis. ex quib. drach. 3. tribuantur. Decoctionem autem qua in hac aegritudine utendū est in cap. de catarrho iā descripsimus, cui tamen drach. 5. capilli uen. sunt addendae.

In hac secunda parte curat tussim pendente a phlegmate dicens: Quod si cum tussi affuerit sputum multum, id est, magna quantitas materiae expuendae, quae tamen non facile potest expui propter crassitiam & uiscositatem suam non existente febre, nec uentris solutione, dantur ex his trochiscis agro, 3. 3. scilicet, in mane stomacho ieiuno debita seruata custodia cum decoctione superius dicta in capitulo de catarrho. Cui decoctioni factae, scilicet, ex passulis, ficub. liquiritia, et huiusmodi, addantur in decoctione 3. 5. capil. uen. qui sunt multum pectoralis temperati in actiuis declinantes ad sicum, & ualde aperitiui. Simplicia autem ingredientia trochiscos in litera descriptos satis nota sunt: possunt autem hi trochisci, 3. 3. permisceri cum 3. 3. huius decoctionis, & totum calidum in potum exhiberi, possunt etiam ex trochiscis fieri pilulae, postquam sumptione sumantur. 3. 3. decoctionis praedictae.

Quod si tussis antiqua & nocina fuerit adeo ut aegrum in nocte dormire non permittat, pilulae styracinae sunt dandae, quae. Rec. mirrh. styracis, opij, omnium partes aequales, informantur ex his pilulae ad lupi norum similitudinem ex quibus una aut duae patienti tribuantur, in potu uero sumat syrup. de papauere, & comedat semen albi papaueris cum saccharo. Qui hanc praeterea patitur aegritudinem uitet in comestione acetosa, salsa, pontica, acris, atque amara, suffumigium ad antiquam tussim & sputum foetidum, Rec. aristolochiae, mirrh. styracis, galbani, omnium partes aequales, arsenici rub. ad pondus omnium, omnia puluerizata ex butyro uac. conspergantur ex quibus magdaleones ad pilulae paruae similitudinem informantur,

hum frig. Secunda uero intentio completur cum pilulis de hiera simplici & tertia parte agarici preparati. Item cum pilulis de agarico descriptione Mesue & si uolueris simul euacuare à capite & pectore misceantur pilulæ cochiae aut de hiera composita Gal. cum pilulis de agarico. Minoratur etiã & diuertitur huiusmodi materia cum clysteribus acutis aut leuibus, secundum exigentiam & allquando uomitu. Sed tertia intentio completur cum medicinis educentibus materiam à pectore sicut loch de pino, loch sanum & expertum, & multa quæ dicentur in asthma. in hac intentione.

Quartam intentionem complent medicinæ exiccantes residuum materiæ in pulmone relicta, quarum administrationes penes Mesue est secundum duos modos, scilicet aut lambendo aut bibendo, aut uaporando, & ex his est lambere 3. 1. ex mirra cum melle, faciliat enim anhelitum et consumit humiditates & ad hoc ualeat styra & oppopanax si sumantur cum ouis aut melle. Item sagapenum factis ex eo pilulis cum aqua rose uig, ex inchoando est à parua cõstituta paulatim crescendo, ex uaporibus aut ad rullum antiquam est illud quod dictum est à Rasi in fine huius capituli de tussis. Aliud, Mesue. 2. arsen. citrin. aristol. rot. ana fac formas similes auelanis cum butyro uac. recenti. Aliud eiusdem. 3. styra. cis. mirra. thuris. gall. ana 3. 1. arsen. citrin. ad pondus omnium, fac formas similes auelanis cum butyro uac. Et si timeres administrationem arsen. loco eius administraretur tantundem sulphuris, imò aliquando ad hanc intentionem exhibetur sulphur cum melle aut uittello oui & dialuphur descriptione Mesue est proprium. Sedat enim statim tussim antiquam. Sed cum huiusmodi administrantur siue sumantur, siue lambantur, siue suffumigentur, obseruentur hæ conditiones. Prima, ut materia existens in pectore sit paucifera à natura uel ab arte, iteratis euacuationibus communibus & propriis. Secunda quod non adsit febris, saltem notabilis. Tertia quod uirtus sit satis confans. Quarta quod administraretur stomacho ieiuno. Quinta, quod inchoetur à pauca quantitate gradatim ascendendo ut experiamur quomodo aeger bene toleret. Sexta quod si suffumigatio cum emboto ore aperto, & egro bene tolerante ter aut quater in die. Septima si sequatur constrictio anhelitus, aut febris, augmentum corrigantur cum humidis, pectus dilatantibus, et frig. aut in actiuis temperatis sicut aqua hordei, liquir. passularum & similia cum iulep ut facc. uiol. huiusmodi medicinæ cõferunt in phthisi, asthma, & empyimate & proprietio, scilicet correctio accidentium completur secundum ipsorum exigentiam. Si ergo adsint uigilæ & tussis sit præter modum infesta dentur somnifera sicut mul aur aliqua ex pil. infra scriptis. Recipe styra. cis. liquir. thuris. masticis. opij. croci. suc. liquir. ana fiat pilulæ sicut cicer, & dosis est ab una usque ad tres, sed intra duo grana opij. his si uolueris magis calefacere pectore non sunt danda opiata nisi post euacuationem, & data sunt per interualla, & cibo digesto aut ferè digestsio & si adsit constrictio anhelitus intendatur ipsius dilatori secundum quod dicitur in asthma.

Et nota quod opiata sicut philonium Romanum iu-

uant ad dilatandum anhelitum præfocatum, & si excreuerit febris corrigatur secundum quod oportet. Et in toto curæ processu attendatur ad sedationem tussis, ad confortationem pectoris, pulmonis cum medicinis ad hoc propriis & regimine cõuenienti sex rerum non naturalium. Est enim hoc necessarium maxime quando recipiunt materias aliunde. Et ex propriis mirabilibus est rob. aut syrupus ex suc. gran. myrti cõpletorum, et hoc in tussi calid. sed in frig. misceatur cum modico mirræ, & croci, & pulmõis uulpis sic. est iumentum sublime in tussi calid. & frig. sed in calid. detur ex eo suc. & puluerizato aur. 1. cum syrupo myrtino. In frig. uero cum aqua mellis, huius etiam interitiõis est crocus cum syrupo myrtino, aut syrupo de hyssopo in materia frigida, similiter sandaracha cum melle & nux cupressi cum uino & melle, & ista cum hoc quod confortant pulmonem, sicut catarrhum, & grana pini confortant, mundificant & anhelitum dilatant. Ex medicinis autem quæ magis tussim sedant pectus & pulmonem cõfortant, sunt theriaca, mithridatum, diamusculus & similia, quibus per interualla utendum est. Sexta autem intentio, scilicet sex rerum non naturalium regimen. Aer sit temperatus in actiuis declinatis ad sic. Sit parcus in cibo & potu, & cibi sui sint uentris lenitui pectus dilatantes & confortantes non acetosi, salsi, pontici, acres aut amari, sed potius dulcedine participantes sicut cappares conditi cum oleo amygd. dul. pauco aceto, & propriè passulato, & pauco mel. aut facc. aut uini cõcti. Itè radix porri. Ex ferulis cõuenit blitis, brodium cicerum, cicer a fracta siue kisticerum, uittelli ouorum sorbillum, carnes tenebræ propriè leporis, gazelli, pullorum & reliquarum auium bene conditionatarum, & pulmones animalium sunt proprii & propriè uulpis, & hericij porcini, et panis sit bene fermentatus in quo sint sem. anisi, foenic. potus sit uinum subtile, antiquum, pauca quantitate, & uinum dulce & hydromel est bonus potus. Ex fructibus passulæ, ficus sic. & gran. pini dactili, & comestio ficuum sic. cum amygd. et nucibus abscondit illam quæ est antiqua, uiter somnum supra cibum & diurnum, & dormiat cap. eleuato ad alterum latus declinante ut uideatur magis federe quam iacere, exercitetur stomacho ieiuno, & à paruo & tardo incipiat gradatim augendo exercitium, procuret omnes euacuationes à natura institutas, sit gaudens & sperans, iram, timorem, tristitiam, & desperationem fugiat. Et nota, quod si aliquando contingerent intentiones contrariæ, sicut sistere catarrhum cum incrassantibus, et educere materiã contentã in pectore cum abstergentibus, et subtiliantibus, opus est, aut miscere subtiliantia cum incrassantibus quæ tamen non sint fermentata sicut syr. de hyssopo, & de myrto, aut syr. de hyss. cum aqua decoct. thuris, iuuubarum & similia, aut uti diuersis medicinis sicut diuersionibus per nares, uescicatorijs, aut cauterijs ratione cathari & syr. subtiliantibus ratione materiæ contentæ in pectore, & possunt etiam retenta in ore contrariarum intentionum inuicem permisceri, sicut loch de pino cum bol. armen. euacuationes autem sunt utriusque intentioni cõmunes. Si uero tussis sit per cõitatem à pectore sicut in pleuresi & empyimate, aut per communitatẽ ab epate, stomacho, aut ab alijs membris duplex exigitur cura. Prima quæ debet membro cõmunicanti. Altera debet pul-

9 calanthe pistum

vinum dulce

moni. Prima autem completur secundū exigentiā ægritudinis quæ est in membro communicante quæ proprijs cap. perquirant. Secunda autem debetur pulmōi in qua est habēda cōsideratio. Nam illud quod communicatur pulmōi aliquando est sola mala cōplexio aut mala compositio sequens compressionem memb. uicini, aut uaporis, & in his casibus duplex est habenda intētio una est alteratio discrasie pulmōis communicatæ, altera pulmōis cōfortatio quæ qualiter complendæ sint ex scriptis est manifestum. Mala autem compositio, pulmōi communicata à memb. uicino non potest corrigi nisi corrigendo dispositionē membri communicantis. Si uerò illud quod cōmunicatur pulmōi fuerit materia calid. aut frig. saniosa aut non saniosa, cura perficienda est secundum quod dictum fuit superius, est enim ostensum quibus ingenijs & auxilijs in materia calid. & frig. procedendum est. Mala autem complexio in pulmōe cuiuscunque generis sine materia exigit alterationem cum contrarijs & ipsius pul. confortationem, quæ qualiter debeant compleri patet ex suprascriptis, & mala complexio frig. immaterialis rectificatur in momento cum retentione anhelitus; & frig. curantia malam complexionem calid. superius posita sunt in tussis à materia cal: sic, autem curantia malam complexionem hum. sunt sicut, bol. armen. tragachā, gummi arab. hyf. capil. uen. cinamom. & similia, et sic. si fuerit sine feb. curatur cum lacte caprin. aut asquino. Si uerò cum feb. aut aqua hor. pīfana hor. sorbitionib. & amygd. dulcib. liquir. retēta in ore & similia. Si uerò tussis sequatur apōst. pulmōis aut solutione continui eiusdem cura ponetur inferius in proprijs cap. Si uerò materia existens in uenis pulmōis faciat tussim sic. eius cura phlebot. basilicę perficitur, aut prouocatione fluxus sang. narium, hæmorrhoidalibus aut menstrualibus, similiter uentris solutione secundum exigentiā humorum peccantium materia prædicta. deinde cum medicinis pectus excreando mundificantibus quæ ex suprascriptis patere possunt, hæc tamen parum conferunt, cum difficile sit illas per se creatū educere nisi forte aliqua pars extra uenas refudaret.

DE ASTHMAE.
CAP. LXVI.

Circa rubricam notandum quod reperiuntur isti termini, asthma, cōstrictio anhelitus, difficultas anhelit. dyspnœa, orthopnœa. Asthma græcè, cātus latinè, & hæc ægritudo dicta est asthma eo quod secundū plurimū quidā sonitus siue canrus in respiratiōe auditur. Cōstrictio anhelitus differt à difficultate eo quod in cōstrictione (sicut uocabulū sonat) uia per quam debet aer inspissari, & expirari pro cordis euctatione & mūdificatione est stricta quæ strictura pendet immediatē ab aliqua specie oppilationis. Difficultas autem anhelitus est quando cum difficultate pectus dilatatur, & cōstringitur propter nocumentum in membris mouentibus pro anliti causando sicut in musculis pectoris, aut diaphragmate, aut neruis uenientibus à nucha ad musculorū pectoris compositionem. Aut fortē propter nocumētum in ipsa nucha, aut in cerebro, ex quo infertur secundum plurimum cum difficultate est coniunctam cōstrictionem, licet non e contrario & hæc difficul-

tas dicitur dyspnœa sicut cōstrictio anhelitus. Asthma dicitur orthopnœa quia scilicet oportet pro anhelitu complendo pectus stare rectum. Orthos enim græcè, rectum latinè. Anhelitus uerò preparatiōis est, quando oportet hominem preparari ut possit habere anhelitū. Et ex hoc infertur quod omnis orthopnœa est anhelitus preparatiōis, & nō contra, licet aliquādo anhelitus preparatiōis approprietur cuidam speciei cōstrictionis anhelitus. Asthma autem dupliciter sumitur, scilicet communiter pro quocunque nocumento anhelitus cum frequentia à quacunque causa proueniat, & sic describitur ab A. 10. tercij. Est ægritudo pulmōis cum qua patiens non inuenit excusationem ab anhelitu frequenti, sicut est anhelitus quo laborat præfocatus aut festinatus. Est enim ægritudo pulmōis cum semper sit necessarius in alio mate pulmōnem lædi per essentiam aut per communitatem. Nam sicut anhelitus est principaliter operatio pulmōis sic nocumentum in anhelitu est principaliter eius passio. Et est necessarium in omni asthma te esse anhelitum frequentem sicut est anhelitus festinatus, id est, exercitati aut præfocati, siue à causa intrinseca siue extrinseca, sicut à cōstrictione colli. Non tamen necessarium est in asthma anhelitum esse uelocem aut magnū sicut uirtute existente debili aut propter inobedientiam instrumenti. Quapropter si anhelitus esset magnus & uelox & non frequens non diceretur asthma. Et ex his patet quod asthma est actio quia actio læsa, licet etiam sit ægritudo cum hac impediatur operationes & proprii cordis euctatio. Pendet aut immediatē secundum plurimum ab oppilatione coartatoria, attenuatoria aut carnosa ipsius pulmōis quæ est ægritudo in uia siue in receptaculo, posset tantum teneri quod asthma est oppilatio ad quam sequitur huius frequentia anhelitus & esset magis consonum uerbis Auic. & consequenter esset morbus in uia aut in receptaculo. Asthma autem propriè sumptum sicut accipitur à Rasi in proprio cap. describitur quod est anhelitus cōstrictio cum frequentia propter materiam inuisatam in pulmōe secundum plurimum cum sonitu & cantu, & ex his patet quod licet in peripneumonia sit asthma, non tamen peripneumonia est asthma cum sit apostema.

Duplex est asthma: quoddam uerum & est materiale, & propriè à materia in pulmōe contenta. Quoddam nō uerum & est immateriale. Item quoddam antiquū, quoddam nouum, quoddam asthma secundum, quoddam sine periodis, & uerum asthma secundum plurimū est periodicum, cuius periodici rationis causa est materia in determinato tempore congregata catarrhizans ad pulmōnem, siue fluat ad eum per cannam pulmōis à capite, siue fluat ad eum per uenas & arterias aut à capite aut ab alijs membris nostri corporis siue paulatim in eo congerantur. Causa quandoque per essentiam, quandoque per communitatem, & quādoque est primitiua. Per essentiam quidem aut à mala cōplexione sine materia siue à siccitate coangustante et oppilante, quandoque à siccitate corrugante. Aliquādo ab humiditate superflua mollicante & faciente oppilationem attenuatioris. Aliquādo à caliditate augente necessitatem euctationis. Sed secundum plurimum est cum materia, & propriè phlegmatica aut in pulmōe cōgesta aut alle-

unde deriuata licet ab omni materia fieri posset. Hæc autem materia continetur aut in canna pulmonis & ramis eius, aut in uena arteriali aut arteria uenali, & ramis earum per uniuersum pulmonem ad minima diuisis, aliquando in spongiositate pulmonis & carne molli, & quandoque pendet asthma à fumis, quandoque à uentositate in pulmone aut in pectore contenta, quæ si in pectore contineatur prohibet pulmonis dilatationem, & sic aëris inspirationem. Si uero in pulmone prohibet ipsius contractionem & sic prohibet magis expirationem. Aliquæ uero in causa sunt ulcera & apostemata ipsius per communis aut à toto sicut in febribus & hydropse, aut membris particularibus, sicut capite, nucha, neruis, spondilibus, pectore, diaphragmate, epate, stomacho, splene, matrice & similibus.

A capite quidem secundum plurimum propter catarrhum. A nucha uero propter oppilationem non potentibus spiritibus trahere ad musculos pectoris & diaphragma, sic anhelitus difficilis. Et similiter per communis à neruis ueniens ad compositionem musculorum pectoris & ueniens ad diaphragma addandum ipsi motum & sequitur frequenter spasmus aut eorum paralysis. A spondilibus autem colli & pectoris cum dislocantur maxime ad intrinsecam, quæ dislocatio aut fit paulatim à causa corporea sicut gibbus, aut subito sicut in casu aut percussione. A pectore autem creatum est nimis paruū aut à uentositate, apostemate, ulcere, et sanie, aut alijs materijs in ipso contentis, à diaphragmate similiter propter apostemata, aut ulcus eius, ab epate uero, stomacho, et splene cum intumescunt propter apostema aut propter oppilationem & compriment diaphragma & pulmonem aut sibi materiam uaporis aut malam complexionem communicant. A matrice autem aut quia mouetur ad superiora, aut cum impletur foetu, uno aut pluribus, aut est molata aut communicat ipsi uapores malignos aut uentositatem & sequitur præcocatio.

Causæ autem primitiue sicut sunt percussiones, catarrhes, & offensives, similiter in causa potest esse aëris incitæ, & cæteræ res non naturales indebitè applicatæ. Maxime multiplicat in hyeme & proprie in humidis, & antris, & cauernis, & est familiaris his qui circa metalla operantur, et utitur odore sulphuris colophonæ, id est, picis græcæ, & picis naturalis, & qui constat argentum uiuū, & qui terunt lapides pro uiro cõficiendo et curant per elongationem ab huiusmodi.

Signa asthmatis absolute sunt anhelitus frequentia, & quia non potest iacere supinus propter casum unipartitis pulmonis super alteram, quapropter uia expirationis confringitur. Et secundum plurimum in processu pallescit eorum facies & tandem sunt cachectici.

Signa asthmatis à mala complexionem sine materia est leuitas pectoris sine exensione, & grauedine sensata in partibus spiritalibus. & si fiat tussis, est sine spūto, & mala complexio calida, cognoscitur ex sensatione cauentibus, & ex anhelitu, & pulsū magis uelocibus. & frequenter à frigido, & nocetur à calido.

Signa autem frigiditatis sunt, frigus, sensata in spiritalibus, pulsus & anhelitus parui, tardi, sed frequentes præcessio causarum infrigidantium, iuuatur à calidis, nocetur à frigidis.

Signa siccitatis sunt asperitas siccis, præcessio causarum exiccantium, iuuatur ab humidis, nocetur à siccis, & pulsus est durus ferrinus. Sed humiditatis sunt signa contraria. Si uero sit præsentia materiæ in pulmone adest grauitas, & secundum plurimum sentitur sonitus in respiratione proprie quando materia continetur in trachea arteria. Species autem materiæ cognoscuntur per saporem & colorem cum excreatur, & similiter cognoscitur crassities & subtilitas. Et si sit in canna pulmonis sentitur grauitas & oppilatio in partibus gutturis, & sic excreatur facilliter cum tussis parua & respiratione. Si uero sit in ramis paruis tracheæ arteriæ distantibus à canna non fit sereatus nisi cum tussis multa. Si uero materia contineatur in uena arteriali, aut arteria uenali frequenter est asthma sine tussis, & si fiat tussis est sine spūto, & fit pulsus tremulus maxime quando materia continetur in arteria uenali propter tremorem siue pulsū cordis tremulū, cui pulsus arteriarum proportionatur, & hoc asthma perducit frequenter ad tremorem cordis confirmatum, & syncopam, & mortem. Si uero materia contineatur à carne molli fit sereatus secundum plurimum cum tussis multa & laboriosa. Si uero asthma pendeat à uentositate sentitur extensio siue grauitas quæ aliquando permittitur et si sit in pectoris spatio, id est, inter pulmonem & pectus fit difficilis inspiratio & pulmonis dilatatio. Si autem contineatur in pulmone fit difficilis expiratio & pulmonis contractio. Si uero asthma pendeat ab apostemate, aut ulcere pulmonis signa ponentur inferius in capite, de peripneumonia & phthisi. Si uero asthma sit per communis à toto sicut in febribus, & hydropse, præcesserunt huiusmodi aggritudines cum quarum augmento augetur asthma, & diminutione diminuitur, & est asthma sine spūto. Si uero sit per communis à cerebro catarrhizante, ad sunt signa catarrhi de quibus supra. in proprio cap. & fit subito secundum plurimum, id est, in paruo tempore & e contra quando materia cõgeritur in pulmone non fit nisi in longo tempore. Et si sit per communis à nucha, aut neruis adest spasmus aut paralysis uniuersalis, aut particularis, & si sit per communis à spondilibus, adest dislocatio spondilium, & proprie ad interiora nouiter facta à casu, percussione, aut offensione, aut adest dislocatio spondilium antiquata sicut accidit in gibbis, quæ ad quamcunque differetiam fiat est secundum angulum curuileum, & si ad interiora est, comprehenditur, quia gibbositas est in pectore. Si uero sit per communis à pectore sicut à pleureti & emphyymate ad sunt signa ipsarum de quibus infra & nunquam fit tussis nisi cum materia ingreditur pulmonem. Si aut sit per communis à splene, epate, stomacho, cum intumescunt propter apostema, oppilationem, & similia ad sunt signa nocuenti ipsorum de quibus infra, & similiter si sit per communis à matrice, causæ autem primitiue seipsas ostendunt. Prognosticum. Primum, asthma materiale frequenter ducit ad peripneumoniā, quod cognoscitur ex superuentu febris cum prius non fuerit & cæteris signis peripneumoniæ. Secundum, asthma est insanabile in senibus & in iuuenibus ualde difficile. Tertium, longitudo asthmatis ducit ad nocuenta epatis, & hydrope. Quartum, asthma periodicum quandoque propter opinionem interficit.

Cum

Cum aliquis assidue patitur tussim et aerem attrahit, quando eadem fit post cursum aut post uehementem motum, & cum iacet supinus est ei deterius, sed cum sedet est ei melius, decoctio ei danda est, quæ. Rec. ficuum citrin. drach. 10. dact. maiorem humid. habentium. sem. opij. sem. feniculi, cap. pil. uen. liquirit. hys. prassij. omnium ana drach. 5. coquantur in 3. lib. aquæ dul. donec redeant ad 1. & coletur.

De hac uero decoctione tribus diebus ægro in potu tribuatur cum pondere duorum aureorum huius confectionis. quæ Rec. suc. liquiritiæ, hys, cap. uen. omnium drach. 10. cordumeni, piperis, amyg. amari. aristol. ros. sem. urticæ omnium ana drach. 5. mellis despumati, quantum sufficit, hæc enim confectio superfluitates quæ sunt in pectore mirabiliter expellit & est optima. Danda itaq; per hebdomadam unam continuo, deinde æger postquã comederit sinapim & mel, uomere cogendus est et uenter ex his pilulis soluendus, quæ Rec. agarici gran. hor. 18. collocynt. interioris, gran. hor. 6. elleb. gran. 4. succi liquir. drach. 5. fiant ex eis pilule & sufficiunt ad dosim uenæ. post hoc quoque iterum redeat ad bibendam confectionem & decoctionem sumendam, & postremò ad uomitum & uentris solutionem ut prius, hoc sæpe faciendum est donec æger sanitati restituatur. Interim tamen a cibis crassis & stipt. & acet. abstineat.

Hoc caput de asthma diuiditur in partes duas. In prima notificatur asthma. In secunda ibi, decoctio enim danda, ponit curam. Prima pars est nota ex scriptis. Secunda uero diuiditur in quinque. In prima ponit curam per unum digestiuum, & sputi pro-uocatiuum anhelitus & facilitatiuum. In secunda ibi. Deinde æger. curat per uomitum. In tertia ibi. Et uenter. curat per solutionem uentris. In quarta ibi. Post hoc quoque. iterum redit ad easdem medicinas. In quinta ibi. Iterum tamen. ponit dietam. Quæ dicit in prima parte nota sunt, permiscet enim decoctionem digestiuam preparantem materiam ad expulsionem per

secretum cum medicina sputum prouocante fortiter subtiliante, abstergente & incidente, uirtutemque expulsiuam pulmonis stimulantem, ut simul digerendo euacuet per sputum, & hæc medicina proprie conuenit in asthma uero, pendente à materia phlegmatica, crassa, uiscosa, in pulmone cōgregata & simplicia sunt satis nota, prassium, id est, marrubium, cordumeni apud quosdam cardamomum, sed apud Ioannem Serapionem cui credendum est, carui agrestæ.

Ista autem medicina danda est per hebdomadam, licet decoctio non sufficiat nisi pro tribus diebus, certe decoctiones non debent fieri pro pluribus diebus, cum facili putrescant. In secunda parte curans per uomitum præcipit ægrum prius comedere sinapim & mel ad subtiliandum, & incidendum, & abstergendum phlegmata in stomacho contenta, postea uomitum prouocare, scilicet cum penna aut digito in ore impolito, aut fumendo aliquid uomitiuum ex describendis inferius dum curam ordinabimus. Vomitus enim in febri paratis ad ipsum est conuenientior quam uentris solutio. Tum quia euacuat à pulmone per uiam propinquantiori, tum quia stomachus est lacuna phlegmatum.

In tertia parte curas per uentris solutionem præcipit pilulas sumendas cum custodia euacuantes à pectore, & à capite phlegmata & etiam à membris naturalibus, elaterium, id est, succus fructus cucumeri alutini. Inter tamē uomitum & solutionem debet tempus notabile mediare ut uirtus restauretur in quarta parte posito alicuius temporis intervallo, ne natura ex nimis continuo usu medicinarum terreatur, docet res ad medicinas iam dictas eodem ordine qui dictus est. Vltimò ponit dietam ostendens à quibus cauendum est.

Asthma pendens à mala complexionem frigida sine materia curatur cum retentione anhelitus & inspiratione aëris calidi & applicatione panorum & sex calidarum exterius et cum regimine medicinali & sex rerum non naturalium declinante ad calid. et confert decoctio fenugræci cum passul. Sed cum regimine contrario curatur pendens à mala complexionem calid. sine materia, & est in ueritate species malitiæ anhelitus & non restrictio.

Et confert saccharum uel iulep aut syr. uiol. cum aqua hor. & curat cura hæctice febrilis. Si uero pendat à siccitate & sit cum feb. putrida datur frig. humectantia non putrescibilia sicut aqua hor. syr. uiol. & similia frig. & humid. interius et exterius applicata & in ore retenta. Si uero sit sine febre aut saltim sine febre putrida lac caprinum & asininum sunt præstantissima, et administratæ aëri & omne regimē medicinale et sex rerum humectantium, & curetur cura hæctice febrilis, si sit coniuncta calid. & cura hæctice senectutis si sit coniuncta frig. Si uero pendat ab humid. excietur tam regimine sex rerum non naturalium quam medicinali aut aëre sic dieta tenui et exiccante, paucio somno, exercitio sumpto & similibus. Et similiter ordinatur regimen medicinale in contrarium discrasie. Si uero asthma sit pendens à materia in pulmone contenta quæ secundum plurimum est phleg. exigit 7. intentiones. Secunda ad quartio materiæ. Tertia subtractio eius. Quarta diuersio. Quinta educatio proprie cum sputi prouocatione. Sexta exiccatio residui in pulmone contenti. Septima correctio

correctio accidentium. Pro prima intentione. Sit aer temperatus in actiuis declinās ad sic. hac consydera-
tione semper habita quodd si asthma sit catarrhale &
causa catarr. fuerit calid. declinet parumper ad frig. Et
e contrario, si causa fuerit frig. declinet ad calid. & sit
boni odoris, & si opus est rectificetur artificialiter se-
cundum temporis exigentiam, & mutatio regionis
& proprie humid. ad sicciorem plerumq; confert. Pa-
nis sit ex optima farina frumenti non omnino à fur-
furibus depurata, bene fermentatus, aliquantulum salitus,
qui non comedatur dū est calid. neq; transacta quar-
ta die, in quo si ponat aliquid anisi aut fœniculi, mel-
lis, aut sacchari, est præfatio. Vinum eius sit album,
dulce, antiquum, aliquantulum dulce, aut aliquid vini
dulcis commisceatur cum uino antiquo subtili & pa-
rum bibatur, sed nec post cibum neq; inter unā ciba-
tionem & alteram est bibendum neq; aquam neq; ui-
rit in causa, & etiā absq; catarrho si fuerit hominū cō-
suetudo bibere uinum limphatum, & non bibat mul-
tum subitō, sed in pluribus uicib. parum pro uice etc.
Carnes sint facili digestiōis, boni chimi, paucarum
superfluitarum, & sic, sicut aues bene conditionatæ sa-
tis notæ. Et ex quadrupedibus caro gazellæ, leporis,
hœdi castrati annalis, pulmones uero animalium con-
ueniunt cū proprietate sua, proprie pulmo uulpis &
hœnicibus porcini. Item piscesculi petrosi, ex ferculis cōue-
nientissimus, & his non sufficientibus ad lubri-
cantem cū brodio, & capreas salitæ stimulantur lu-
bra cum his quæ dilatat anhelitum sicut mel & crocus,
butyrum, saccharum, & oleum amygd. dulcium cauē
parcus in cibo et potu, nā fames et sitis moderate sunt
ridianus nisi aliqua occasione somnum nocturnum
omiserit, & distans à cibo per duas horas. & dormi-
rarum nō cōtinuus, sed interpolatus, & cum euigilat
sua caliditas cum puluinaribus aut alijs pannis. Ex-
ercitium suū sit gradatim de remissio ad intensum de-
breui ad longum, ita tamen ut non multum intenda-
loca decliua & arenosa, & exercitium sit iucundum.
Item laudatur leuatio uocis & ipsius gradatio de bre-
uistomacho ieiuno.

Procurat omnes euacuationes à natura institutas,
præcipue per sternutationem & demucationem nari-
um, & mundificationem per scretum. Et si uomitū
curando natura tentaret adiuuandus est, imò pro-
facienda, aliqui præmittuntur canones obseruadi in
cura asthmatis & cuiuscunq; ægri tudinis ab oppila-
tione pendens. Nam si oppilatio fiat à multitudine

cura est euacuatio de qua diceb. Si uero à viscositate
curat incisione. Si uero à crassitie, curat subtiliatione.
Sed in subtiliatione crassi duplex est periculū. primū
ne subtiliatum sit nimis remissum, ita ut solum rari-
ficet nihil resoluendo, tunc enim crassum maiorem lo-
cum occupando plus oppilabit. secundū ne subtilia-
tium resoluat subtile, & crassum indurando petrifi-
cet. Quapropter cum necessaria est resolutio crassi si-
ant cum resoluētib. leuib. sicut chamæmilla, melilo-
rum, et similia. Et si opus est fortibus resoluētib. his
admiscenda sunt mollificantia humid. participantia
actuali & potentiali, sicut exempli gratia uaporato-
rium humid. & sic, præstantius. Pro quibus intelligē-
dis est sciendum. Primò quodd humor quanto est cras-
sior tanto est aptior ad petrificationem. Et similiter
quanto uiscosior. Vnde plures lapides ex phlegmate
quàm ex melanch. generant. Secundò quanto medi-
cina resoluens agit à maiori proportionē in humore
resoluendum, tātò citius indurat & petrificat, ut si ad
resoluendum sufficeret chamæmilla calid. in primò, tu
administres calamentum. Tertiò quando medicina
participat multa siccitate. Et idem dico de quocunq;
alio resoluente disproportionato materiæ resoluē-
dæ sicut aer calid. exercitium, ieiunium, & balneum,
et omnia applicita. Quartò quando humor lon-
gam moram in loco contraheret, siue ex angustia lo-
ci siue in renibus siue sit inuiscatus sicut in uescia, si-
ue non possit expelli nisi ascendendo, sicut in pul-
mone hæc longa mora propter actionem caloris fa-
cit ut humor induretur & petrificetur. Quintò
quando humor retinetur in loco intensi caloris, sicut
in pulmone hæc omnes causæ faciunt ut humor indu-
retur & petrificetur & contrariæ prohibent petrifica-
tionem. Ad propositum redeūdo sunt multæ ex his
causis petrificationis in pulmone asthmatico, uero a-
sthmate. Est enim humor crassus & uiscosus siue ab i-
nitio talis sit in pulmone aggregatus, siue sit factus ta-
lis ex actione caloris. Secundò est longa mora, tum
propter loci angustiam saltem in aliquibus partibus
pulmonis, tum quia oportet humorem euacuandum
ascendere. Tertiò est intensus calor. Propter has om-
nes causas, medicinæ asthmatis uerū non debet esse ual-
de calid. nec multæ sic coniunctæ, imò humectanti-
bus permixtæ. Et cum hoc etiam habentes proprie-
tatem singularem in confortatione eius. Ad quod et-
iam facit, quia pulmo est membrū molle, facile passi-
bile, non tolerans medicinas acutas sine nocumento.

Quapropter inferitur primò quodd pro digestione
& mundificatione materiæ ab ipso indigemus medi-
cinis remissæ calid. lenitiuis applanatiuis & humi-
dis, absterfuiis, & incisiuis. Et si aliquando medicinæ
notabiliter calid. necessariae sint, sicut hyssopus, pra-
sifum & similes, est eorum calid. remittenda cum frig.
secum mixtis, & similiter siccitas sua cū humid. sicut
facit Mesue et cæteri autores cū componūt huiusmo-
di syropos. Inferitur secundò esse uitandas medicinas
multum exiccativas licet frigidas. Tertiò uitandas ef-
se medicinas multum frigidas sicut opium, papauer,
hyoscyamus & similia, incrassant enim & congelant,
& prohibent expulsionem. Et dicit A. in cap. de asth-
mate antiquos non fuisse ufos opio, hyoscyamo uel
mandragora nisi intentio sit per illud prohibitio ca-
tarrhi cum multiplicetur, imò nec pilulo, nisi quod

deus uult gloriosus et excelsus quasi dicat p[ro]p[ri]o uti-
tur aliquando propter suam singularem proprietate.
Quarto uitadas esse medicinas multum subtiliatiuas
et incisuias, siue modo A. subtiliatiuas et incisuias pu-
ras, adducunt enim quandoq[ue] labor earum & inobe-
dictia materia ad uulnera in pulmone. Quinto uitadas
esse medicinas prouocantes ualde propterea quia
extrahunt subtile & remanet crassum. Sexto cum cras-
sities epatis coniungitur astmati, sicut accidit frequen-
ter asthma prolongato, permiscendas esse medicinas
pectoriales cum medicinis epatis, que sunt sicut eupa-
torium & absinthium. Et istud quod coniungit inter
duas res simul uehementer habeat proprietate singu-
larem in utriusq[ue] membris, sicut rubea tinctorum & a-
ristolochia. Idem est iudiciu[m] de nouementis aliorum
membroru[m] cum asthma coniungitur. Septimo ubi
necessaria sit resolutio, siue subtiliatio materiae & inci-
sio. Incisio debet subtiliationem superare, patet, quia
prohibet indurationem & facit ad expulsionem. Vn-
de 10. tertij, s. cap. sit studium cum incisioe plusquam
cum resolutione. Octauo, quia asthma est aegritu-
do chronica sunt permittenda medicinae & eiusdem
generis, & potetiae, quoniam inter medicinas & cor-
pora sunt proportionem que non comprehenduntur nisi
cum experimento, cum experieris pluries consequeris,
id est, colliges quod magis sit iuuatiuum. A. in cap. pro-
prio. lre. 4. primi, cap. 1. Imo in una medicatione me-
dicinam permittit, quoniam ab eo quod consuetum
est non sit passio, & uni quidem corpori, & uni mem-
bro in una hora, & altera inest proprietates ab una me-
dicina pati, & non ab altera. Et propter istos sermones
sapientes practici in curis aegritudinum chronicarum
ordinant plures medicinas eiusdem uirtutis diuersa-
rum tamen compositionum, & unam exhibent qua-
tuor diebus aut sex, postea alteram, & sic faciunt coal-
ternationes. Non in aegritudinibus chronicis facien-
da sunt interpolationes, uerbi gratia inter unum ordi-
nem medicinarum digestiuarum & similiter euacua-
tium, secundum ordinem aliarum mediabunt 6. uel
8. dies in quibus aeger utetur sola dieta, & quanto aeg-
ritudo magis prolongabitur magis interponetur tem-
pus ne natura ex continuo usu medicinarum terreatur
& abominetur. Decimo si causa antecedens & coniu-
cta aduersentur, exempli gratia, catarrhus quia indi-
geat in crassatione & materia in pectore concreta subti-
liatione, incisione, & abstersione incitabit. expulsio-
nem procedatur secundum alterum tertium modoru[m].
Aut enim attendat dispositioni magis infestae, & pro-
prie si sine curatione illius altera curari non potest, si-
cut secundum plurimum est catarrhus, postea attendat
materiae iam fluxae, aut secundum cum aliquibus in-
strumentis attendatur catarrhus, ut puta cum diuersio-
nibus, & his quae in ore tenentur, & cum alijs instrumentis.
attendatur materiae iam fluxae, ut puta cum bibitis, et
his quae lambendo sumuntur & cum exterius pecto-
ri applicitis. Aut tertio eodem instrumentum, quod ex di-
uersis componatur, sicut quando permiscemus aliquan-
do syr. de hyssop. cum syr. de myrto, aut de iuiubis,
natura enim sagax digerit in crassantia contra materia[m]
fluentem & subtiliantia contra fluxam, sicut etiam in
augmen. apost. miscemus reperculsiua cum resoluti-
uis, & in hemitritaeo aquam hord. cum pipere. Dige-
stiuia autem taliter conditionata sunt foenugraec. pas-

sul, ficus sic. daetyli pingues, mel in materia frigida, sed
in calida, hordei, uiol. iuiub. sem. cyton. & similia con-
facc. & ex his possunt fieri decoct. & syr. secundum exi-
gentiam. Et sem. maluae, cyton. sunt optima in causa
calida, sem. maluae, in causa frigida. Et si uolueris in calida
& abstergere his addemus parum oxymel. simpli-
cis. Aquae autem sunt aqua mellis, aqua hor. si uolue-
rimus temperare aliorum calidit. Et si uoluerimus li-
tere catarrhum cum his permiscemus syr. de iuiubis,
de myrto, aut aliquid syr. de papauere. Et si uolueri-
mus facilitare anhelitum aromatizemus cum pauco
croci, aliquando facimus aquam ex decoctione iui-
barum, liquiritiae, hordei, passularum, sicutum sic qua
permiscemus cum syrupo factis ex suprascriptis. Et ad
has intentiones sunt loch & electuaria, ut 2. tragadia.
frigid. loch de pino ana 3. i. pulpari, sebesten 3. s. co-
ci gran. s. fiat electuarium spissum cum syr. uiol. & de
hyssopo ana quantum sufficit, & incorporando sine
igne. Et hic secundum necessitate potes addere daety-
los maturos, passulas. Imo parum boli armen. apud
opus constringere catarrhu[m], nam bolus armen. apud
Auic. est mirabilis iuuamenti in prohibendo catarrhu[m]
& in exiccando humiditates pectoris, sed constringit
& diffultat anhelitum, nisi misceatur cum leni-
bus in magna quantitate. Ego autem saepe misceo unum 3.
boli armen. cum 1. 3. loch de pino. Et de proprijs est
nula cocta, comesta sola, aut cum alijs cibis aut cum melle
permixta. Similiter aqua distillata aut decoctio eius-
dem medicinae superius scriptae in cap. de tussi ad huc lo-
cum afferant. Et medicina Rasis superius in textu ex-
posita est efficax, & ultima ad phlegma crassum. Co-
sulo tamen propter causas dictas superius ut secundum gra-
plurimum leuioribus utaris, & si opus est fortibus & do-
datim ad alia ascende. Ex uere aut maturatibus & ego mi-
misticis apud Mesue est ius galli antiqui, & ego mi-
ceo aliquando cum syrupo secundum exigentiam. lre.
syr. recipiens foenugraeci & passularum, anule, ana
partes aequales, est iuuatiuus ualde. Et ex unctio-
nibus convenientibus ad hanc intentionem est oleum amygd.
chamom. anethi, & de Keiri citrino, laurini, de iros,
sed magis tempore mundificationis. Et ex his copiosius
fieri possunt addendo etiam mollificantia secundum
exigentiam sicut mucillaginē, foenugraec. althaeae, & fiat
in unctio cum fricatione conuenienti. Si ergo uideris
perponas. Tertia intentio est euacuatio. Si ergo conueni-
plentudo sang. fiat phlebot. ex basilica, aut conueni-
si repletio appareat in toto. Aut ex sapientis si fuerit
in causa retentio mestrui aut sang. haemorrhoid.
Veru[m] phlebot. secundum plurimum ab initio debet fieri.
Postea digesta materia conueniunt propria soluti-
ua, quae secundum plurimum debent esse facilia, in qua
etiam A. finiant humiditatem, quae sunt in pulmonibus, cori-
cum facilitare & aequalitate. Finiunt aut humiditates
cum digerentibus. prouocantibus. spiritum & exiccantibus.
Oportet ergo omnia ista esse facilia aequaliter operan-
tia circa partes crassas & subriles. Solutiua ergo con-
uenientia sunt sicut cassia, agaricus epythym. polio-
& charta. & fortiora sunt colocynthis, & electuarium
cucumeris asii. & hierapi, diaphanicon, sebesten, passulae,
Indu. pilulae de agarico, sed leuissime sebesten, passulae,
uiol. & si cerebrum communicer miscantur coctis
aut pilule de hierapi. cum pilulis de agarico. Troc. au-
tem de uiol. conueniunt in materia calida, imo potius in

In mixta. 1. folia uiol. mediocrium in exiccatione & humectatiōe 3. 6. turbit electi 3. 4. suc. liquiritiæ, terrenabim ana 3. 2. scammonæ correctæ 3. 2. fac trochiscos. Valent ad constrictiōem anhelitus et leniūt naturam & pectus mundificant & dosis est 3. 1. usq; ad 3. 2. cū aliqua decoctione pectorali & sunt boni saporis. Sed existente febre & propriè corpore existente debili melius est solvere cum cassia aut māna. Et ex his trochiscis potest addi aliquid tanquam calca. scilicet 3. 1. distemperentur autem electuaria solutiva cum aquis proprijs scilicet uiol. hor. excorticati, cap. uen. hyssopi, farfag. id est, pulmonarij, aqua mellis aut alij huius decoctionis composita ex reb. pectoralib. Et in hac intentione obseruentur hi canones. Primus est iam dictus ut fiat solutio cum facilitate & equalitate. Sed hic nota quod materia euacuanda est duplex.

Quædam enim est coniuncta coangustata in meatib. et carne spongiosa pulmonis & huiusmodi cum solutivis non est multum speranda euacuatio, neq; cū vomitijs, sed ex secreatu. Quædam uerò sub forma causæ antecedentis, & hæc cū resolutivis est educenda, aut cū uomitijs. Propterea dicit Auicenna in capite de asthma si materia est plurima, scilicet, supra illam, quæ est sub forma causæ coniunctæ, tunc necessaria est purgatio, scilicet, cum medicina solutiva. Si aut fuerit solutiva quæ sub forma causæ coniunctæ non est educenda pharmacia, sed per secretum. Secundus canon, ut sit digesta subtilis, ducta ad mediū per infractiōnem, crassa et uiscosa, per subtilisationem et incisionē. Tertius, ut nō fiat euacuatio tēpore paroxysmi asthma. Quartus, ut reiteretur euacuatio cum difficultate materia educatur, & non nisi pluribus euacuatiōibus. Sed inter unam euacuatiōem, & alteram interponatur tempus notabile, ut uirtus nō debilitetur, imò tum provocari. Sed intellige mediante notabili tēpore ne addat debilitati. Et secundò quod corpus sit satis facile ad uomitū. Vomitiua aut sunt sicut bus 3. oxy mellis simplicis cōpositi aut scyllitici secū dum fortioris, aut minus foris uomitū exigitiam. Et ex fortiorib. est suc. raph. in quo steretur infusus elcorus 12. usq; ad 24. horas. Quintus canon, ut euacuatio fiat cum medicinis trahentib. à lōginquo, quæ tamen non sint multum agitatiuæ. Agitatio nāq; facit constrictiōem anhelitus, quam ipsi, materijs quilibet & maxime præparatus secū dum arte Mef. Item colocynthis, sed in parua quantitate sicut apparet in omnes esse consolatæ secū dum arte Mef. suc. aut cucum. asin. magis ualeat ad educendum aquositate. Septimus, ut eligantur medicinæ expertæ, quapropter illæ quæ posita sunt ab autoribus sunt tutiores. Sed primus, ut medicinæ huiusmodi euacuent à membris mittente, scilicet, à capite aut quodcūq; aliud fuerit, quā à pulmone recipiente. Quarta intentio, est fricatione pectoris, & aliorum membrorum, aut manū, aut mantili asperso rubificante cutim, attrahente materiam de profundo ad superficiē. Ad quam si sequatur lassitudo remoueat ungendo partes dolentes cum oleo chamomelino, & similibus. Item uē-

rosatiōes in spatulis & natib. Clysteria quoq; sunt ad hanc intentionē. Et si catarrhus esset in causa fiant caput purgia per nares, de quib. sufficienter dictū est in cap. de catarrho. Et fiant apud magnam necessitatem uelicationes & cauteria, & in commissura coronali. Quinta intentio est educatio propria cum spūi prouocatione, & cōplentia hanc intentionem sunt multiplicia, quædam lenientia, quædam remollientia cū abstersione, & hæc duo genera magis complent tertiā intentionem, scilicet, digestiōem, quædam irritantia cum incisione & abstersione aut acuitate, quædam abstergentia cum proprietate, quædam mundificatia cum proprietate, quædam ampliatiua uiarum, quædam sunt subtiliantia. Lenitiua quidem sunt uiolæ, pruna, cassia, uitelli ouorū, iuscula pinguis, iulep & sirup. uiol. saccharum uiol. & sebesten, & liquiritiæ. Remollientia uerò cum abstersione quædam sunt sicut butyrum, foenumgræcum, malua, althæa, semina earum, & mucilagines ipsarum, ficus sicca, passula, grana pini, & sunt propria. Irritantia uerò cum incisione & abstersione sicut sirup. aceto. species oxy mellis, scilicet simplicis, cōpositi, scilicet scyllitici. Sed incitantia acuitate sunt sicut sem. urtica infusum in aceto, sem. nasturtij infusum in oleo amig. dul. sinapis, piper, diatrion pipereon. Sed abstergentia cū proprietate sunt sicut mel hyssop. & sirup. eius, halce, id est, thymus, prallium, organum, calcan. crocus cum melle, laurus secū dum omnem modum administratiōis est ualde expertus, enula & suc. eius, aristol. rot. species centaureæ, quarum maior ualeat in paroxysmo, minor in quiete, loch de pino, loch sanum & expertum, loch de scilla, capares salitæ. Item porrum cum melle, item iris mundificat pectus efficaciter, & iuuamentum decoctionis calamenthi cum ficibus, & passulis in extractione humorum crassorum ex pectore, & pulmone, & dilatazione anhelitus est sublimis. Et huius intentionis est thymus & gran. lauri cum melle & sirup. de hyssopo & prallio. Sed mundificantia cum proprietate qua pulmo confortatus expellit à se nocua sunt liquir. capil. uen. pulmo uulpis, & erici, campestris, porcini, theriaca, mithridatum, diamusculum dul. & amar. Sed ampliatiua uiarum sunt crocus, & capil. uen. & sunt dilatantia anhelitū, & istis duobus generibus uti debemus à principio usq; ad finem, componēdo tamen illa cum medicinis proprijs ad intentionem quam uolueris complere, tumentur enim pulmonem et faciūt uirtutes aliarum citius ad pulmonem penetrare. Sed subtiliantia sunt sicut ammon. oppop. & sagapenum cum aqua rutæ, & ista cōueniunt post digestiōem & minorationem, similiter mundificantia sine acuitate, dicta sunt superius. Medici autem prudentes & experti multoties componunt adinuicem medicinas diuersarum intentionum secundum necessitatis exigentiam. Et taliter facit Rasis in præsentī cap. permiscens decoctionem cum electuario, & apud Gal. decoctio passularum enuc. & foenugræci cum modico castoreo, scilicet, 3. 3. decoct. cum 3. s. castorei, frequenter data commodius operatur. Item gutta ammoniaci mixta cum oxymelle potenter liberat. Item decoct. hyss. cum melle & ficibus, item crocus cum melle aut cum melle & ficibus. Ex medicinis cōpositis conferentibus stricturæ anhelitus & difficultati sunt mi-

chridatū, theriaca, athanasia, diamusculus, philoniū, & est propriū. Vñtio conueniens in hac intentione est hęc. 3. cerę citring, 3. 1. olei de Keiri, et proprię citrini, 3. 4. adipis anatis, & galling, mucil. fœnugr. & sem. li ni, añ. 3. 5. styracis, 3. 6. fiat eorū bona aggregatio, & cū eo debite calido ungat pectus. Et si oportuerit magis calefacere his adde hyslopū humidam, & materia existente cal. ungant cū oleo uiolac. oleo amigd. dul. añ. 3. 1. mucilage pſili, 3. s. cū pauco cerę, & si materia sit mixta, misce in cōpositione calida cum frigidis. Sexta autē intē. est exiccatio & cōsumptio residui humid. in pulmone contentę. Pro qua intentione cōplēda recurrit ad cap. p̄cedēs de tussis intētiōne quartarib; enim dicit quantū est oportū. Sed pro septima intentione corrigenda est sitis cū bibitis & retētis in ore, quę tamē sputum non impediāt, imō facilitēt, sicut aqua hordei uel sacchari potata, liquiritia in ore retenta, pruna bñ matura, anguria, & similia. Sed instantia uigiliariū cum diapopleone applicito frōti & temporib; & philoniū rom. quantitate, 3. s. exhibitum inducit somnū, & sedat anhelitus p̄focatiōē. Sed cōstrictio anhelitus, quę tēpore paroxysmi asthmatis adeo crescit, ut p̄focet diligētī curatiōe indiget. Primō siue infirmus in aēre libero ad frig. declinante, neq; habeat circa gulā, neq; circa pectus aliquid frictū, ideo stet aliquādo pectore p̄ panis disco operato, & sedat super cathedra quę ab utroq; latere habeat ligna satis alta & satis distantia, quib; cubitis possit adherere, ita ut pectus sit latū, & altum cū brachijs dilatatis se apodiet alicui ligno ut stet apodiat pectore dilatato, uel apodiet cubitos supra genua sua, uel super disco aliquo se inclinando uersus faciē, uel cū manib; se appendēdo ad locum altū, et undiq; pectus dilatet. Necessitas enim respirandi docebit sitū cōuenientē & paucissimē cibis ante paroxysmū & etiā in paroxysmo, & sit cibis sicut p̄fana hordeacea, & denſ lenitiua dilatatiā anhelitū, sicut aqua hor. exorticati cum croco & saccharo uel iulep uiolac. aut fiat aqua cum passulis, liquiritia, & similib; leuib; Nā iuxta Mes. autoritatē potius blandiendū q̄ curandum: peruenit enim interdum ad p̄focatiōē excitatiōne medicaminū laboriosorū. Postea ueniendū est ad fricationes, extremitatum ligaturas & huiusmodi diuertētia. Et uentosę postq̄ circa spōdiles pectoris dilatāt anhelitum. Demū si expedierit p̄pter multitudine sang. fiat phlebot. basilicę. Alię uerō euacuatiōnes, scilicet, uomitus et solutio nō fiāt in paroxysmo. Sed si nō possit habere bñficiū uentris fiat suppositorium aut dysteroleue, licet sit difficile dysterizare p̄pter sitū, & somnus sit interruptus. Et si paroxysmus prolongat usq; ad quatuor dies uentoseur inter spatulas cum scarificatione, & ponat rubificatiā uel uescicatoria super pectore. Et in paroxysmo cōfert leuissimā euitatio cū flabellis. Et apud Auic. in primo cap. sumat baurach, loco eius utimur aliqua speciei salis acuti, 3. 4. cū 3. 2. nasturcij in 3. s. aque mellitę cōfert enim statim apud uehementiā p̄focatiōis & cōstrictiōis anhelitus. Et uiuat in schiatica. Credo tamē tutius esse pariri hanc medicinā in duab; aut plurib; uicib; Et reliqua accidētia curent secundum quod oportet. Si uerō asthma p̄det ab alijs materiē. in pulmone cōtēntis, scilicet, sang. cholera, uel melāch. quod raro euenit, procedat ē eisdē intentionib; Sed materia exi-

stente cholerica declinet regimen magis ad frigid. & humid. Sed melancholia existente in causa notabiliter ad humid. sed ad cal. & ad frig. secundum quod est adusta uel non adusta. Si uerō sanguinis fuerit in causa declinet aliquid ad frigidū cū temperatiōe passuariū uel prope. In asthma autē & cōstrictiōe anhelitus p̄pter uapores fumosos dominantes in corde, & ab humorib; existentib; in arterijs cordis, cōfert apud Auic. phlebot. & melior est illa quę fit in latere sinistro, scilicet, ex basilica sinistra. In cura uerō asthmatis ex uērositate penes Auic. exigunt tres res, quarū una est resolutio uērositatis cū facilitate, quod fit cum subtiliatiuis notis. Et secūda est apertio oppilationis ut inueniat quod inobediēs est ex ea ad dilataciōē ut inueniat quod inobediēs est ex ea ad imuendū meatū. Et ex eis quę conferunt ad hoc est imuētiō cū oleo de neridē, oleo laurino, oleo rutaceo. Et ex emplastris iuuatiuis est, ut anethū, & samplūcus, & chamgila decoquant, & uapore cū eis pectus & ambo latera. Et ex his quę in potu sumūt est sagena, omorufia, & etiā sagapenū & oppopanax, & sit potio cuiuslibet eorū aureus unus. Et q̄q; potest hęc dōse necessaria euacuatio cōmunis humoris a quo uērositas eleuat. Si uerō in causa sint ulcera, & apostemata intendat principaliter eorū curatiōē, & cū hoc artem dat dilataciōē anhelitus, cōfortatiōē pulmonis p̄tati prouocatiōē, & ceteris secundū quod oportet. Si uerō sit per cōmunitatem a toto sicut in febrib; & hydropē attendat principaliter curatiōē illarū dispositionū. Et in febrib; uapores diuertant ad extrema fricationib; lotionib; crurib; & huiusmodi, et uiuent cū aēris frig. inspiratione. In hydropē aut cōstrictiō anhelitus uehementis superueniens cū prius non fuerit est signū mortis festing, cui parū profunt remedia. Si uerō sit per cōitatem a capite, scilicet, ex catarrho, elaborē in prohibēdo catarrhū, & secundū in faciēdo spūere quod aggregatū est. Et cura patet ex sup̄p̄tis. Illius autē quod est per cōmunitatem a nucha, aut neruis quod secundum ueritatē est species difficultatis anhelitus & nō cōstrictiōis, radix curę est remediū dispositiōis membri cōmunicantis. Et cum hoc intendere dilataciōē anhelitus & pulmonis cōfortatiōē. Si uerō p̄deat a paruitate pectoris, cū talis nō sit remouibilis beneficio medici, regēdus est regimen p̄seruatiōe prohibēdo catarrhos & repletiōes, & nō centia pectori & pulmōi. Si uerō sit per cōitatem a spōdilib; diaphragmate, pleura, epate, stomacho, matrice, & sic de ceteris, radix est cura dispositiōis membrorum cōicantiū si fieri potest. Attendat tamē dilataciōē anhelitus, cōfortatiōē pulmonis, modū cōfortatiōē, et huiusmodi secundū quod oportet. Si uerō p̄deat a causis primitiuis multoties curatur per cōfortatiōē ab ipsis, imō hęc sit prima intentiō, & secūdo remoueat dispositiō in pulmone impressa cum cōtrarijs secundū quod oportet. Et ex his possum p̄tere curationes reliquarū specierū malitię anhelitus.

DE PLEURESI. CAP. LXVIII.

Pleuresis dicta a pleura panniculo regente costas interius, ex eo quod in ipso fiat secundum plurimum. Aliter dicta brisen, quasi pectoris apostema, licet proprię pleura gręc sit costa latens. Est enim duplex scilicet, uera & non uera, siue pura & non pura secundum Auic. Vera autem pleure-

si siue pura est diffinitiuè apostema calidū in panniculis aut lacertis pectoris intrinsecis. Non uera aut siue nō pura est apostema cali. in panniculo aut lacertis extrinsecis. Ex quo inferitur, quod si apostema sit uetustum, aut etiā ex humoribus frigidis per essentiam quibus nō acciderit caliditas per accidens, sicut sephiros purum adubeleth phlegmaticum non est dicēda pleuresis. Sunt enim pāniculi intrinseci pectoris tres, scilicet, pleura tegēs costas interius, mediastinum diuidens pectus secundum longum in dextrum & sinistrum, & diaphragma aliter dictum metaphrenō diuidens naturalia à spiritualibus, in quibus potest fieri pleuresis uera. Lacerti quidam sunt intrinseci aut mediantes inter costas, in quibus etiā potest fieri pleuresis uera, quidam extrinseci in quibus & panniculo tegente costas exterius sit pleuresis non uera.

Causa coniuncta pleuresis sunt quatuor humores scilicet, cholera frequentius siue sang. cholera. Deinde sang. purus. Rarō enim phlegma. Rarissimē melāch. Erit quandoq; sunt adusti, quādoq; non, sed semper sunt calidi cū hanc pleuresim faciunt per se, aut per accidens per putrefactionē, aut saltem per adustionem, & propterea pleuresis semper est apostema cal. Verū cumdum plurimū acuta, à per se uero frigidis frequent chronica. Causa antecedens sunt humores huiusmodi in cerebro aut membris spiritualibus, aut naturalibus contenti, qui ad membra supra scripta catarrhizantes, aut deriuati huiusmodi causant apostema, debilitate fortitudine membrorum expellentium, tamen propter debilitatē uirtutis digestiue & expulsiue in membris istis, hoc apst. quādoq; paulatim cōgētur atinens tunc magis pleuresi frigidae per e. regimē in sex rebus non naturalib. & annexis in aere precipue, ut in frigida, & c. Pleuresis aut s. modis terrefit et corrumpitur, aut induratur, aut permutatur. Resolutio autem, aut est insensibilis per poros cutis, & hoc est rarō, aut est sensibilis, licet non propriē resolutio dici debet cum paulatim resudando ad pulmonem cum tulli expellitur et hoc frequēter. Maturatur autem cum retenta materia & non paulatim euacuatā, sit exiura & sanies in sinu colligitur. Sed putremul cum parte membrum circundante corrumpitur, & sit cancrena ascahilos, & eadē est iomenus que terminatio est mortalis, & hæc terminatio ab autoribus non ponitur. Aut induratur per resolutionem partium subtiliū, et hoc rarissimē. Aut permutatur, & hoc multipliciter. Quādoq; enim ex approximatione ingreditur in principio materia retrocedit et uenas permutatur ad superiora, & sit apostema in faucibus rebrum & sit phrenesis secundum plurimum mortaliū, aut ad neruos inducens paralytism, aut aliam humorem interdu subitō p̄focans sui multitudine, quādoq; paulatim cū materia non est tanta, sed uirtus deficit à spuro, aut ex defectu sui, aut ex lāsione infurmenti, aut materię inobedientia, operatio nanq;

spuendi duab. completur uirtutibus, quārum una est naturalis maturatiua & expulsiua & altera uoluntaria. Et quando non confortantur ambæ possibile est, ut deficiat à mundificando. Quādoq; est faciens peripneumoniam mortalem secundum plurimum aliquādo phthisim inducens, aut immediatē, aut mediantē peripneumoniam, quod potest esse ante maturatiōnem & post. Aliquando permutatur ad cor syncopin & mortem festinā faciens. Aliquādo ad empyima materia super diaphragmate collecta secundū plurimum post pleuresis eruptionem, quæ si non mundificatur in 40. diebus à die rupturæ transit in phthisim. Quādoq; permutatur resudando ad uenam chilis & consequenter ad uescicam, & cum urina expellitur, quādoque ad intestina & secessu expellitur quæ duæ permutatiōes salubres sunt. Et cōmuniter post digestiōne eueniunt. Quādoq; ad subascellas. Quādoq; ad cutim pectoris. Quādoq; ad inguina. Quādoq; ad iuncturas membrorum inferiorum ibidem plerumque faciens apostema quod persæpe transit in fistulam, & c. Pleuresis autem quædam est in dextera tere existens communiter salubrior, sed tardioris terminationis, quædā in sinistro minus salubris, sed uelocioris terminationis, & quæ est in diaphrag. omnibus est periculosior, & magis molesta. Deinde in mediastino. Deinde in musculis intrinsecis. Deinde in pleura. Deinde in panniculo & musculis extrinsecis, & facta à sang. est deterior, quā à cholera sed tardioris terminationis. Et quæ ab humoribus adustis & uenenosis perniciosior, & à melancholia deterior, q̄ à phlegmate & tardioris terminationis. Hæc autem pleuresis habet quatuor tempora uniuersalia, si salubris sit penes accidentia distincta: si uero mortalis tria, principium, aug. & statum, sed penes alterationē materiæ frequenter quatuor quādoq; pauciora: sed hæc tempora penes accidentia & materiæ alterationē cōsiderata secundum plurimum non coincidunt. Hæc dispositionem consequuntur hæc accidentia, instantia uigiliarum, & aliquādo subeth, somnia terribilia, & molesta, & phrenesis uera aut nō uera ex uaporib. aut humoribus ad caput delatis, dolores neruorum & contractiones spasmos; his repentibus ad neruos. Syncopis, tremor cordis, & huiusmodi ad cor delatis. Fluxus uentris, aut creticus, aut symptomaticus, aut ex debilitate uirtutum naturalium, aut ex irritatione materiæ, sitis, fluxus sang. nar. superfluens & al chola, & c.

Signa quædam significant pleuresim, ipsam distinguentia à multis pallionibus sibi similibus, quædam eius puritatem, aut impuritatem, & consequenter particulam patientem, quædā quod salubris sit aut mortalis, quædam causas ipsius, quædam tempora ipsius, quædam longitudinem & breuitatem, quædam ipsius terminationem siue permutetur siue non. Signa ueræ pleuresis sunt quinq;. Primum febris continua propter cordis uiciniam. Secundum dolor pungiuius sub costis quoniam membrum est panniculolum. Et quādoque est extensius propter multitudinem materiæ. Tensio enim significat multitudinem, & punctura fortitudinē in penetratione & mordicatione. Tertiū est constrictio anhelitus, paruitas & frequentia propter coarctationem factā ab apostemate. Quartū est pulsus ferrinus cuius quidē diuersitas au-

subest malum. Econtrario somni incolunitas bonū mentis alienatio pessimum, paruitas sitis bonū. Tremor sub thorace in pleuresi significat commixtionē rationis propter cōmunitatē diaphragmatis cum cerebro. Ex signis malis est ut profundentur exituræ procedentes à pleuresi absq; sedatione feb. & non sit sputum bonum, significat enim mortem propter reductionem materiæ ad profundum. Et cum in pleuresi sputum ualde malum, nisi ibidem modicum sit de materia: significat enim aut debilitatē uirtutis, aut quod est mala aut fraudulenta. Inquit Hippocrates, multoties est sputum bonum facile, similiter & anhelitus, & reliqua signa sunt mortalia sicut illa in qua, scilicet, dolor tendit ad posteriora, & est eius dorsum sicut dorsum uerberati: si tamen pertransit septimum, ut plurimum euadit. Et quando adest sputum diuersarum materiæ aquosum, deinde dolor fit uehementior moritur satis cito, aut si non cito moritur, sanatur. Et quando sequitur pulsatio à furculis extensa usq; ad crura, & est urina aquosa et nō est sedamen, nec sputum, nec alia euacuatio, est mortalis propter declinationē materiæ ad caput. Si autem pertransit septimū sanas, & ut plurimū cū pleuresis ualde acuta pertransit septimū sanas. Conferētia medicaminū & regni bona toleranda bonum, contraria uerō malū.

Signa harum. Cum nō est sputum, aut est sputum subtile, aut paruum, aut id quod nominat salua tūc est principū principij. Cum uerō subrubeat aut subcitrinum, tūc est finis principij. Et cum augmentatur accidentia & sputum, & incipit remoueri à subrubedine aut subcitrinitate in albedinem, tūc est augmentum. Et cum sputum iam est album æquale plurimū, & c. & accidentia remittuntur, tūc est status quo ad alterationem materiæ, declinatio quo ad accidentia. Et cum sputum minuitur uel incipit minui, accidentia remitti notabiliter tūc est declinatio. Cumq; sputum totaliter remouetur & cessant accidentia, iam cōpleur declinatio. Ex his inferi, in ea pleuresi, quæ terrā accidentium & materiæ non coincidere. Imò autem & statum respectu materiæ comprehendit augmentum & statum accidentium. Et status & declinatio respectu materiæ comprehendit declinationem accidentium. Secus in ea quæ terminatur ad maturationem, coincidunt enim secundum plurimum utraq; tempora: tūc enim est declinatio cū est perfectè matura, & tūc iam remittunt accidentia. Et ut ex his conciperem huiusmodi confert ad curā. Si enim terminet ad putrefactionē, tūc est principij. Cū parū spuit aut indigestū. Cumq; sputū augeat & incipit fieri liuidū est augmentum respectu materiæ & accidentium. Cumq; multiplicat, aut est iam uiride, aut nigrū, est status respectu materiæ & accidentiū cui nō subsequitur declinatio.

Signa causarum sumuntur ex colore sputi, ex dolore, ex febre, ex paroxysmis febris, cōplexione & habitudine sputi, ex tempore anni, & ex regimine precedente. Cum sputum est rubeum aut subrubeum est ex sanguine. Cum est tendens ad citrinitatem est ex cholera. Et cum album non existente adhuc digestionē facta est ex phlegmate. Et cū est tendens ad nigredinem & plumbeitatem non propter putredinem aut causam extrinsecā est ex melanch. Si autē colores sint mixti, tūc humor

est mixtus. Ex dolore, quia si dolor est ascendens, tūc est ex humorib. calid. Si descendens, est ex humorib. frig. Et minor est dolor ex frig. q̄ ex calid. Et magis pungitiuus ex cholera, ex alijs fortē magis extēsiuus. Ex febre, quia maior febr. est ex calid. q̄ ex frig. Sed ex paroxysmo, unicuiq; enim humori inest periodus quæ sibi conuenit i. quart. cap. de feb. apostematum. Afflictio sang. ferē uniformis. Phleg. motus quoridianus incipiens uersus serō. Cholera de tertio in ter. incipiens in manē. Melanch. de quarto in quar. incipiens in uesperis. Ex cōplexione & habitudine, quia pleuresis proportionatur secundum plurimum cōplexioni. Et ita ex regimine precedenti & temporib. anni, quia in uere magis à sang. & ab omnib. humorib. similiter. In æstate uerō magis ex cholera. In hyeme uerō magis ex phlegmate. In autumnio uerō magis ex melach. & ex humorib. adustis. Et tu omnia signa consydera & adinuicem compara. Signa resolutionis. Cum terminat nulla apparente manifesta euacuatione gradatim tamen procedens per tēpora quo ad accidentia tūc resoluitur. Si autem terminatur per paulatim factam euacuationem cum sputo usq; ad finē quod est secundū plur. in uera, tūc est quia paulatim recipit materiā, quæ ab apost. deciditur sua spōgiofitate cū pectus constringit. Et sic trāsit materia de uenis paruis ad magnas, & de magnis ad maiores, donec deueniat ad trachēā arteriā, siue truncum magnū eius existentē in collo, et tandē expellit ad extra coadiuuatē tussi, & tandē rascatione cōcurrentib. etiam uirtutib. naturalib. maxime digestiua et expulsiua. Si autē materia retrocedat ex approximatione percussiuā, aut propter phlebot. aut aliam causam, & materia uenas reingressa ad benignum reducit, cognoscit, quia post principij non uidet sequi aliud tēpus. Si autē terminat ad putrefactionē sputum apparet liuidum, et tandem uiride & nigrum multū foetēs cū reliquis signis malis, & magno anhelitus foetore. Si uerō induret cessat febris, nec apparet aliqua euacuatio manifesta nisi diminuta, cessat dolor, præsertim pūgitiuus et extēsiuus, sed remanet dolor grauatiuus & ferrinitas pulsus, & anhelitus constrictio minuitur sed non auferit, et diu remanet secundū hunc modum & ita multū chronica efficit. Si autē transit ad cancerū, augebitur febr. aut saltem nō minuitur, & sequitur dolor quidam fulmineus cum grauedine, & si ulcerabitur, emittitur per sputum uirus nimium foetēs. Si uerō permuratur ad aliquod membrū puta caput, apparebit urina tenuis alba cū mentis alienatione, & ut plurimū ueter restringit. Si uerō ad pulmonē ut faciat peripneumoniā cessabit dolor lateris, et cōstrictio anhelitus augebit, & febris, subsequēter accidentia reliqua peripneumoniz, de quibus infra. Si autē sui multitudine suffocet subito oppilado meatus pulmonis, apparebit ultima anhelitus cōstrictio, subita pulsus, scilicet, uehementis diuersitas, rubedo faciei cū nigredine, sudor plurimus, ore gmo multus in respiratione, et anhelitu succedēs. Si autē post peripneumoniā ruptam remanebit ulcus in pulmone, aut ipsa materia quæ paulatim transit per pulmonem ulceratum, tunc res efficit chronica & apparebit pulsus & tremor cordis, & pulsus uehementis diuersitatis: non tamen cum ultimata anhelitus cōstrictione, & tandem

synopsis et mors festina. Si autem permutteretur ad nervos; apparebit aliqua nervorum aegritudo, ut stupor, tremor, spasmus, paralysis, etc. cum alleviatione doloris sine manifesta evacuatione. Et quando contractio anhelitus sit vehemens & febris non sit fortis, est significatio spasmi iam inchoantis. Si vero permutteretur ad fauces ad subscellum, ad inguina, ad iuncturas, & ad alia membra extrinseca cognoscitur ex tumore & dolore illius membri ad quod terminantur, & ex mitigatione doloris in loco pleurefis, aut ex sedatione ceterorum accidentium eius. Si vero maturatur cognoscitur, quia sputum non est velox facile copiosum, nec mundificatur in 14. dieb. & dum maturatur vehemens sit dolor, febris et siccitas lingue, alienatio, & difficultas, & anhelitus contractio, & eius duplicitas apud dilatationem cum paruitate, & etiam tussis sine sputo propter materiam inobedientiam & spissitudinem velaminis & virtutis debilitatem. Cum vero facta est collectio quiescunt febr. & dolor, & augetur gravitas. Cumque rumpitur accidit tremor diuersus & dilatur pulsus cum diuersitate sui, & cadit virtus & debilitatur anhelitus, & multoties accidit febr. vehemens, quia materia mordicat membra ad quae effundit aut per quae transit. Sed post rupturam si non mundificatur in quadraginta diebus a die rupturæ perducit ad phthisim. Et ruptura saniosa in die 7. vel ante, raro evenit, sed secundum plurimum tardatur eruptio usque ad 40. aut 60. Et quanto plus fuerint accidentia collectionis vehementiora, erit eruptio velocior, & quanto plus fuerint leuiora, erit eruptio tardior, & proprie febr. exstincta de summa accidentium & similiter dolor. Et quando apparent accidentia fortia cum constantia virtutis, nec alia euacuatio manifesta sufficiens, tunc nihil timeas: est enim eorum eventus causa collectionis non propter aliam causam. Si vero virtus erit debilis & materia multa, subito moritur propter suffocationem et resolutionem caliditatis innatae. Si vero virtus fortis aut materia non tantæ quantitatis accidit in primis debilitas manifesta forte cum lipothymia aliqua syncope, & est pulsus debilitatus, tardus, dilatatus, & rarificatus propter resolutionem virtutis cum evacuatione & extinctione calid. innatae, & accidit tremor quem sequitur febr. causa mordicationis facta a materia corrumpe. Deinde materia quiescit in coactione pectoris sequitur quibusdam diebus alienatio, cum gravitate tamen manifesta super diaphragm. deinde malignata materia & nocumto communicato pulmone, & membris circumstantibus. crescunt accidentia tussis febr. inquietudo, defectio virtutis, appetitus, etc. Et cum videris egritudinem sedari sine sputo, tunc minuitur materia cum urina aut ægestione, & sic apparebit aut urina crassa, aut fluxus ventris materiam chol. subtilis, aut alia manifesta euacuatio. Quod si nihil ex his appareat, & videris tensionem ad mirach. hypochondria & cutem, cum gravitate indicabit exituram apud inguina & crura, quod est vehemens significatio incoelutatis & euasione, &c. Longitudinem aut brevitem status, quod idem est siue salubris aut mortalis declarat aegritudo ipsa, causa eius, particula patiens, ætas, complexio, tempus, regio & accidentia eius. Aegritudo ipsa se acutam communiter ostendit, est enim ut plurimum media inter peracutas & tropicas, eius enim

status est communiter circa septimum & terminatur frequenter in decima quarta aut ante: si vera pleurefis sit, frequenter tamen cum non est vera pleurefis, aut si vera est ex humore frigido per essentiam, est ex genere morpiciari, aut chronic. & sic causa eius, ipsius statum declarat: est enim breuior ex choler. & ex sang. & ex lang. quam ex phleg. et ex phleg. breuior quam ex melancholia omnium semper paritate supposita. Particula etiam patiens si sinistra fuerit, cordi propinqua, statim propinquior ostendit, & communiter quanto propinquior la est nobilior, ceteris paribus, tanto status velocior. Ideo velocior est status cum est in mediastino, aut in diaphragmate quam in pleura & maxime cum est mortalis. Aetas vero, complexio, regio, tempus, anni si calida sint, abbreviant: si frig. sint prolongant. Accidentia vero eius quanto vehementiora fuerint tanto secundum plurimum ipsam breuiorem significant, & proprie si sit mortalis. E contra vero quanto remissiora paulo longiorem ipsam significant, nisi ex materia paulo citate ipsiusque benignitate provenit, quod raro est, & per accidentia intelligo febrim, contractionem anhelitus, dolorem, alienationem, instantiam vigiliarum, inter cetera tamen sputum est efficax signum longitudinis aut brevitatatis. Si ergo in prima die expuerit aliquid subrubrum aut subcitrinum, aut sputolum est ut turritati attinens, licet non maturum sperandum est ut maturetur in quarto, & terminetur in septimo. Si autem non expuerit in die primo, nec maturatur usque ad quartum, sed in quinto aut circa tunc terminabitur, & quod ex 14. Si autem non expuit nisi post quartum, & quod ex 14. aut non sit maturitas, tunc res prolongatur usque ad 14. aut supra, si cum fiducia adsint bona signa virtutis, ætatis, & appetitus, & bonæ tolerantia, quibus deficiantibus, eger deficiet in via. Si autem non expuit usque ad 7. aut expuat aliquid in quo non appareat vestigium maturationis, si sit vera pleurefis & materia acuta, ut plurimum morietur ante 14. si virtus sit debilis. Si autem sit fortis, desideria bona, somnus incoelutis, & anhelitus, urina matura, etc. transiet 14. sed morietur post illum, quoniam virtus non est tanta ut possit expectare usque ad 40. & 60. in quibus plurimum indicamus aegritudinem terminandam in 14. Deinde apparebit sputum nigrum aut viride, aut aliquod seum accidentia, & morietur in 7. Non vera aut pleurefis ex materia acuta, & etiam vera pleurefis ex materia non acuta potest terminari etiam post quartum diem, tam ad bonum quam ad malum. Si vero pleurefis ex materia acuta non transit, scilicet, 30. diem nisi sit recidivatio, & c.

Signa prognostica quibus temporibus ætatibus constitutionibus multæ pleureses & peripneumoniæ substituantur sunt. Horum ergo quædam sumuntur a corporis coelestibus, quorum consyderatio pertinet astrologico. Quædam ab ætatibus, temporibus anni, ætatis impressionibus, quorum consyderatio medico pertinet. Ratione ergo ætatis frequentius accidit primis senibus, quam his qui in alijs ætatibus constituti sunt, licet 25. annis vel circa usque ad 70. ann. Erin hyeme frequentius quam in alijs, & in constitutione boreali frig. & sic. quam in australibus, aut in ceteris. Quando enim fuerit hyems borealis notabiliter frig. & sic. & c. pus vero præcedens austrinum & pluviosum hyeme

in pleuresi & peripneumonia expectare oportet.

Cum aliquis sub costis suis dolorē sentit pungiuiū, & propriē quādo sic-
cam patitur tussim & febrim, expedit, ut si
dolor super partem costarum & furculam
tendat, fiat minutio ex basilica eius partis
in qua est dolor. Nisi totum corpus multo
sang. repletū fuerit: tunc enim ex latere con-
trario sang. detractio faciēda est. Aegri-
tudo quoq; si iam per aliquos dies infestaue-
rit egrum à principio sui phlebot. à parte
dolente faciēda est. Quod si dolor inferius
ad partem costarum posteriorem tendit, uē-
ter ex decoctione quam in cap. de rheuma-
tismo descriptus, est soluendus, Melius
tamē est ut phlebo. fiat, deinde aqua hor. cū
sacch. assidue tribuatur. Et si uideris tuf-
sim eius uehemētis siccitatis, da ei in dilucu-
lo omni die de iulep, deinde da ei in potu a-
quā hordei, & si eger fuerit debilis nutria-
tur cum pane de sacch. Si autem fortis fue-
rit, aqua hord. usq; ad diē quartū sufficiat.
Quandoq; scire coeperit decoctionē quā
in cap. de rheumatismo nominauimus, quo-
tidie sumat, antequam aquā hord. bibat do-
nec sanetur. Si autem feb. & acuitas perse-
uerent, & eger in excreatione difficultatē
patiatur, detur decoctio quā in cap. de asth-
mate nominauimus, quod similiter est faci-
endum cum saniei sit excreatio. Quod si in
princ. passiois quod excreatur, nigrum, aut
ualde citrinum apparet, et sic permanserit,
& feb. non quieuerit, nec calor usq; in diem
septimū, timor osum est. Et si cum hoc toto
aeris attractio non alleuiatur, & in pecto-
re affuerit oregmō, aut in maxillis rubedo,
et in oculis labor est morti propinquus. Si
autē exterius in latere apparuerit rubedo,
aut appostematio & cū premittitur locus do-
let, ponatur de super uentosa, aut emplastrū
ex sinapi & ficibus, & dimittatur ibi do-

nec locus ulceretur. De his uerō quæ ex er-
rore stolidorum ad augmentū nocumēti ac-
cidunt hāc aegritudinem patientib. est quod
cū dolor sentitur in principio sub costis, exi-
stimant crassam fore uēcositatem, ideoq; ele-
ctuariū diamyscum, aut eis similia agro tri-
buunt eumq; interficiūt, hāc passio uocatur
birsen, cuius causa est apostema quod ori-
tur interius sub costis hypochondriorum.

Diuiditur hoc cap. in partes octo. In prima notifi-
cat pleuresim. In secunda ibi. Expedit ut si. Curat per
euacuationem. In tertia parte ibi. Deinde aqua hord.
Curat per digestiua conuenientia in princ. cum tussis
est sic. In quarta parte ibi. Et si eger fuerit debilis. Cur-
rat per dietā. In quinta ibi. Quādoq; scire coeperit.
Curat per digestiua & mūdificantia cum sputo, cum
tussis est hum. In sexta parte ibi. Quod si in principio
passionis. Ponit signa malæ pleuresis, & secundū plu-
rimū perniciosē. In septima parte ibi. Si autē exterius.
Ponit curam pleuresis, quæ exterius ad cutim permu-
tatur. In octaua ibi. De his uerō. Docet euitare errorē
plerunq; medicis contingentem. Quæ dicit in prima
parte nota sunt, & uos supplete reliqua duo signa ge-
neralia pleuresis, scilicet, pulsus ferrinū, & anhelitus
constrictionē. In secunda parte curat per phlebot. bāsi-
licæ eiusdē lateris corpore nō existēte repleto. Sed ip-
so existēte repleto. Primō, per phlebot. basilicæ cōtra-
riæ partis uel lateris oppositi in princ. Secundō per
phlebot. basilicæ eiusdē lateris in augmēto quæ phle-
bot. maximē cōueniunt dolore ascendēte ad furculā
& costas superiores. Sed dolore descendēte ad costas
inferiores docet soluere uentrem cum medicina leni-
tiua superius descripta in cap. de catarrho, sed tamen
absolūtē, siue dolor ascēdat siue descendat magis lau-
dat phlebot. q̄ pharmaciam. De his tamē inferius di-
cetur quantum est opportunum. In tertia parte dige-
rit in princ. cū aqua hord. exhibita frequenter. Sed ubi
tussis sit omnino sine sputo, dat in diluculo, id est, an-
te ortum solis per unā horā aut duas, iulep scilicet, fa-
ctum de aqua cōmuni cū multo sacch. deinde per du-
as horas post dat aquam hord. ad educendum quod
per iulep est abstersum, et cum hoc ad infrigidandum
& humectandum. Credo tamen aquā hord. cū sacch.
utranq; intentionem complere. In quarta parte cibāt
pleureticum debilem cum panata sacch., sed melius est
ut panis sit lotus ter aut quater. Fortem uerō cibāt
cum aqua hord. sola usque ad quartum diem, scilicet,
usq; ad statum accidentium inclusiue. Sed consu-
lo ut tēporib. nostris utatur ptisana hord. subtili cum
sacch. In quinta parte digerit & mūdificat cum iam
screatus incoeperit, sed nota sunt omnia: nā materia
existēte calidiori & subtiliori exhibet primō, scilicet
in diluculo decoct. dictā in cap. de catarrho factā, scilicet,
cū ficib. citrin. numero 5. iuiub. numero 10. feb.
numero 20. passul. 3. 10. liquir. 3. 5. coquantur usque
ad dissolutionem, & colentur, scilicet, in 3. lib. aquæ,
et dentur ex hac omni die 3. 3. cum 5. 3. murabo. uiol.
& sacch. uiol. et per duas horas post dat aquam hord.

ad

Curā pleureſis duplex exigit regimē, ſcilicet, ten-
tatiuū & curatiuū. Regimen tentatiuū eſt quo nobis
acquiritur notitia, ſcilicet, an ſit pleureſis, an dolor uē-
roſus, quòd quā ſecundum plurimū medicis & me-
diocriter exercitatis innotēſcit, raro eſt opus hoc regi-
mine. Verum Meſ. ut appareat ex proceſſu ſuæ opera-
tionis non ſolum uenotariſet, ſed etiam humoreū in-
trēdit reſoluere ſi paucus ſit, ita ut excuſemur à tranſeun-
do ad aliud genus curatiōis. Cōperit ergo materi-
e exiſtere pauca & apta per poros cutis reſolui. Turtius
aut eſt primò inſepere à calefactorijs humidis ex qui-
bus eſt philtū ſiue ſpongia in aqua cal. infula & opti-
mē expreſſa, & peria linea ſubtiliſſima circumuoluta,
& tori loco dolēti applicata, & his iter iterata ſem-
per poſt infulationem iplius in aqua calida, & optima
expreſſione, & circūuolutione cum peria ſicca, & hoc
ſi uideremus iplius conferentia. Si autē dilataſta mate-
ria dolor augereſ. ab hac operatione deſiſtendū eſt, et
ad curam pleureſis procedendū ut infra. Debet autē
ſuper loco remanere tanto tēpore uidelicet, donec ca-
lor iplius tepelcat, et deſinde reinfundū in aqua calida,
ut ſupra quòd aptius fieri poterit ſi duæ ſpongiæ aut
duo philtā habeantur huic operationi deſideruentia:
una enim remota quāprimū altera ſuperponi po-
terit et apponatur debite calida, ſed non acutē ſiue in-
tenſe. Et conueniens ad hoc eſt ſacculus ex furfuribus
frumenti magnus ſecundum loci dolentis quantitatē
bullitū in aqua, leui ebullitiōe & loco dolenti poſt ip-
ſius fortem expreſſionē applicatus, & ſecundū neceſſi-
tatem reiteratur ut ſupra, & his efficiacior eſt ſpongia
ſiue philtū infulum in aqua decoct. infraſcripte, &
altheæ, ʒ. ʒ. maluarum M. ʒ. ſem. lini, ʒ. ʒ. ſorum cha-
mæmel. melioſi, anethi, m. M. ʒ. radices lotæ & non
abraſæ extractæ ab iſpis mediū illi bulliant ſimul cū
reliquis medicinis in aqua fluuiali quantum ſufficit,
uſq; ad ſufficientē decoct. maluauiſci, & fiat ut ab in-
itio diſtū fuit. Paritaria quoq; cū oleo in patella mor-
tificata, et loco dolenti ſuperpoſita eſt ad hoc effiacax,
& reiteretur ſecūdm neceſſitatem ut ſupra. Et ex ſiccis
autem uaporatorijs eſt facellatio facta ex milio, ſa-
le aut furſure debite calefactis & applicatis, ut ſupra.
Et ſi uoluerimus reſectoria media inter ſicca & hu-
mida aſpergimus reſ ſupraſcriptas, cū eas caleſcimus
uino aut aqua, aut aceto, aut ex his ſimul mixtis: dein-
de in ſacculis ponemus aut prius ex his faciemus ſac-
culos quos calefacimus ſuper lateribus calid. aſperſis
cum ſupraſcriptis, aut ipſos ſacculos in fundum ſis
huiusmodi debite cal. & poſt ſufficientem expreſſio-
nem applicabimus, ut ſupra. In reſoluendo autem cū

Sed pro parte mea hancuiam sequar quam nunc
subscribam, Solum in quatuor casibus mihi videtur
esse facienda phlebotomia de faphenis à principio
principiante. Primus, quando corpus esset multum se-
repletum, & materia peccans verisimiliter multa. Se-
cundus, quando esset venenosa, aut uenenositate atri-
uens,

nens, & multum corrupta & putrida. Tertius, quando timeremus raptū ipsius ad membra superiora, scilicet nobilia. Quartus, quādo proueniret aut cum ea adellet retentio alicuius euacuationis consuetæ à membris inferioribus, sicut retentio menstruum, sanguinis hæmorrhoidalis, consolidatio ulcerum crurum antiquorum, laqueatio uenarum.

Sed in cæteris casibus omittenda est. Quid enim cōfert phlebot. saphenæ in pleuresi facta per uiam paulatim factæ cōgestionis, aut etiam per uiam defluxus ubi membrum mittens esset epas, aut ab epate supra, nam ab epate infra non esset materia peccans, cum nō euacuet hæc phlebot. nisi ab epate infra quarta primi cap. de phlebotomia. Præterea ubi materia esset pauca & corpus inanimum, nec esset conueniens reiterare phlebotomiā, nōne præstātus est ex brachio phlebotomare, præterea phlebotomia pedum multo plus debilitat, quā phlebotomia brachiorū. Stante ergo pari utilitate, scilicet utriusque tutius est ex brachio phlebotomare.

Non ergo nisi in quatuor casib. suprascriptis est facienda phlebotomia saphenæ. Et debet fieri ex saphena eiudem partis nisi in repletionem modum excedere in quo casu uult Mesue fieri ex saphena opposita. Sed fortè melius esset phlebotomare utraque saphenas simul incipiendo à contraria, & post ipsam phlebotomia uena basilica opposita in latitudine nisi fortè materia existeret uenosa aut ualde corrupta, & timeremus ipsam trahere uersus cor phlebotomando basilicam sinistram, in hoc enim casu fortè melius esset phlebot. basilicam eiudem lateris præcedente phlebot. saphenæ. Sed post phlebot. basilicæ oppositæ docet A. phlebot. communem eiudem lateris oppositi, quod uerū esset in maxima repletionem ubi scilicet esset necessarium multiplicare tot phlebot. diuersas, quod rarò euenit, cū nō sit reiteranda phlebot. nisi ex magna causa ne materia congeletur, in cæteris autem casibus præter suprascriptos notabili existente repletionem debemus incipere à phlebot. basilicæ oppositæ communiter usque ad 3. dies inclusiue, sed in prima et secunda die expediat ex basilica eiudem lateris phlebotomamus. Si uerò pauca esset repletio, aut iam transiisset tertia dies, melius est phlebot. basilicam eiudem lateris. Sunt tamen imaginabiles casus in quibus nullo modo cōferat phlebot. Vt puta in pleuresi ex cholera pura multum distante à natura sang. nec apta educi cum euacudao sang. timeremus multū cholerico in quibus liter in phleg. puro, & corpore phleg. ne perducere sunt puri cōmuniter, imò permixti cum sang. aut apti educi cū sang. Et quia cōmuniter omnes humores phlebot. euacuat, cū omnes in uenis cōtineant, propterea faciemus semper in pleuresi & cæteris apost. intrinsecis facimus phlebot. nō tamē sic facimus in febre, cū nec opus sit in feb. sic diuertere sicut in apost. optimū autē diuersum est phlebot. &c. Si autem phlebot. non poterimus aut ratione ætatis aut debilitatis aut in natis, aut in curaturis genui, etiā aliquādo cholera aut aliō humore multum dominante oportebit

præmittere solutionem, & deinde sang. minuere. In pluribus tamen præstantius est primò minuere, cum phlebot. sit omnium humorū euacuatua & optimè diuertat, quæ plerumq. sola sufficere, ubi alij humores non sint in causa, sed sit copiosa iuxta quantitatem repletionis & tenorem uirtutis & alia quæ phlebot. cōsentiant aut dissentiunt &c. Si autē alij humores peccent cum sanguine, esto quod sint prædominantes aliquantulum fiat primò phlebotomia sed minus copiosa, deinde quā cilius fieri possit sequatur uentris solutio. Si autē alij humores peccent sine peccato sanguinis, sint tamen apti educi cum phlebot. nec multū distantes à natura sanguinis præmittatur pharmacia, deinde quā primum sequatur phlebotomia, ubi autem non peccent cum sanguine, & sint multum distantes à natura sanguinis, simus cōtēti pharmacia sine phlebotomia, ut in præcedētibus casibus dictum est, quemadmodum nec in erysipelate extrinseca ex cholera pura competit phlebot. iuxta præceptum Auic. tertia quarti capite proprio.

Pharmacia autē si humor cholericus in causa fuerit siue præcedat aut subsequatur phlebot. aut fiat sine phlebotomia, fiat cum solutiuis benedictis lenientib. & non stipticis iuxta sententiam Mesue & Auic.

Quapropter ineptè operatur quidam uisr magnæ experientie qui fortia exoluentia exhibent uolentes prohibere augmentū apostematis notabiliter minorando materiam. Sunt enim causa quod humores agitati & non digesti fluant amplius ad locum dolentem, & sic apostema augmentent. & febrem, & corpus amplius calefaciant.

Item uirtutem debilitant & interdum fluxum qui non facile sistitur, prouocant qui secundum plurimū pessimus est in pleuresi, neq. etiam solutiua debent esse stiptica ne derelinquendo uestigium stipticitatis spiritum prohibeant, quod est sumopere cauendum, propterea neq. miroba. neq. rheumbarbarū aliquo modo cōuenit sicut opinatus est Gordonus in hoc casu exhibens rheumbar. Nec ratio sua alicuius est momentū cum dicit, ideo exhibendum esse rheumbar. cū optimè cholera euacuet & relinquat uestigium stipt. qua prohibetur fluxus uentris in hac passione suspectus: imò stiptificando prohibet uentris lenitatem, debet enim uenter esse lenis, sed non lubricus, debet enim assellare bis in die. Sit ergo solutiū huiusmodi in materia cholerica. ꝛ. mannae ꝛ. i. suc. uiol. pulparū, sebest. ana ꝛ. s. feri caprini quantū sufficit, pro potione misce aut loco feri caprini aqua decoct. uiol. iuiub. sebest. quantum sufficit, & loco mannae si non habeatur potius cassia sed in minori dosi. Istud solutiū sumat in aurora cum custodia, deinde non assumat lauatiuum aliquod. Si uerò fluxum uentris accessurū timeret in pleuresi, tunc nec hoc nec aliud solutiū assumat, maxime autem solutiū uti debet dolore descendente ad hypochondria. Virtute uerò existente debili non cōsentiat phlebotomiæ nec solutioni, de qua supra, tunc diuerte et aliqualeter euacua cum dysteribus lenitiuis medijs aut etiam acutis, in quibus cassia aut agaricus ingrediatur secundum exigentiam, aut aliud huiusmodi, & propriè dolore descendente ad hypochondria quibus utatur singulis diebus aut alternis secundum necessitatem. Vbi autem timeretur fluxus uentris nullo huiusmodi utatur. Alleviatio enim uentris

tris à fece & uetustate excusar ab additione nocumen-
torum in hac egitudine. Et si pleureis quidem fuerit
phlegmatica, euacuetur sumendo cassia 3. 6. agari-
ci preparati 3. s. cum decoctione liquir. passul. hyf. cū
paucō melle. Si uerō fuerit melach. sumat cassia cum
fena & epithymo cum horū decoct. nec non buglossē
& pauco facc. uel trahatur cassia cum decoct. sena, &
epith. & aliquorum pectoralium, ubi autem timere
fluxus uetris nullo modo utatur aliquo solutiuo. Di-
uersum & acuitatis humoris æquatiuum iuxta se-
cundum intentionem 12. fol. lactuce M. 1. malua M.
2. salicis uitis ana M. 2. florū uiol. M. 2. nenuphar. cha-
mæmil. añ. M. 1. incidantur aliquantulum & bulliant si-
mul in aqua fluuiali quantum sufficit pro lotionē
amborum crurium, sed flores uiol. & nenupharis po-
nantur in sine ad bulliendum. In hac decoctione debi-
tē calida lauentur stomacho ieiuno & fricetur primò
pedes & crura à genu infra, deinde eadem hora imme-
diatē manus & brachiū à cubito infra ipsi pleurē op-
posita, licet fortē regularius sit primò lauare brachia,
deinde crura, hoc uerò diuersu utat singulo die sto-
macho ieiuno saltem semel, sed hora qua non assumit
clystere suprascriptum aut fiat alia ex euacuationib.
suprascriptis aut diuersionib. descriptis. Diuersionē
autem cum uetosis ad cutim & ad partes extrinsecas
positis super loco dolente nō laudo, nisi natura id per
se primò tentauerit, in quo casu adiuuanda est cū uen-
tosis, cum scarificatione & sine, & cum rubificantib.
loco appositis sed maximē hanc operationem debet
præcelsisse tam phlebot. diuersuā quā euacuatū,
nec non minoratio materiæ cum solutiuis de quibus
dictum est & dicitur, & etiam ipsius eradicatione si fieri
potest. Tertia autē intentio, scilicet repercussio perfici-
tur cum exterius applicitis & non interius & dome-
sticē repercussiuis non fortibus, et solum in principio
incipiente & nō in augmento usq; ad duos dies cō-
muniter, exceptis semper calib. qui excipiuntur quar-
ta primi, de cura apost. ut quia materia nō sit ueneno-
sa nec multum corrupta, non sit crassa & inepta reper-
cussioni nec timeatur reditus eius ad pulmonem, cor,
cerebrum, & huiusmodi membra magis nobilia nec
corpus sit repletum ualde. Et quia frequenter defunt
conditiones suprascriptæ repercussiuæ communiter
omittuntur. Repercussiuum autem domesticum est
quo utebatur G. factū ex cera alba & oleo rosaceo si-
mul mixtis, & pluries lotis cum aqua ros. Repercussiu-
ua autē Mesue sunt satis fortia super quib. nō præsu-
merē, præcipue quæ sunt cū ros. aceto, balauft. In ma-
teria tamē choler. subtili licetius possumus uti reper-
cussiuis q; in materia crassiori adiuuant em in crassan-
do pro parte ad digestionem, oleum ros. esset satis ad
hoc conueniens, aut mixtū cum oleo uiol. &c. Quar-
ta intentio completur cum digerentibus tam interius
quā exterius applicitis. Materia autē existente cho-
ler. cōuenit huiusmodi. 12. syr. de uiol. de iuiub. añ. 3.
1. aqua decoct. hordei, iuiub. feb. & uiol. añ. 3. 3. mil-
ce, sed uiol. ponantur in sine, hoc digestiuum cali. su-
mat in hyeme, æstate uerò tepidum in aurora & etiā
in uesperis per 2. horas ad minus ante cenā quatuor
dieb. cōtinuis & dormiat si potest post eius sumptio-
nem, sed non amplius 2. horis, similiter in sero per 1.
horam dormiat, & sufficit si huiusmodi syr. cum a-
qua hor. distemperentur.

Si uerò maiori extinctiōe opus sit addatur syr. de
nenuphare. Et si adhuc pluri frigidatione opus fuerit
addatur mucil. pilij, 3. s. rescindantur autem omnia
quantum est possibile, quæ cōstringunt sicut portul.
papauer. lactuca, & similia. A quæ uerò conuenien-
tes in materia choler. sunt aquæ citrulli, cucur. melo-
nis Indi quæ solæ cum facc. aut suprascriptis syr. mi-
seri possunt. Si autē materia peccans fuerit sang. sint
digestiua maioris absterfionis et minoris alterationis
sicut syrapi suprascripti cum aqua hor. seu sem. com-
munium frig. iuiub. feb. & similia. Digerentia autē
exterius applicita sunt oleum uiol. et amygd. dulcium
secundum quantitatem quæ uidebitur, in his debi-
tē calid. infundatur peria linea subtilis & cum ea ut-
gatur particula dolens, deinde super ipsa extendatur
& debet facies cum fascia subtili ueteri, 2. reuolutio-
nib. Si uerò materia sit phleg. exhibeatur aqua mellis
cui si opus fuerit admisceat oxymel simplex, syr. de
liquiritia, & huiusmodi. Si uerò melancholia addatur
his syr. de buglossa uel de pomis dulcib. Et pariformi-
ter exterius addant suprascriptis aliqua olera pecto-
ralia magis calid. attinentia. de quibus infra, sicut ole-
um chamæmel. Quinta autem intentio, scilicet causæ
antecedētis eradicatione perficitur phlebot. & pharma-
cia, phlebot. ergo basilica eiusdē lateris si opus erit
rata plebot. & hauriatur sang. secundum tenore uir-
tutis & quantitatis repletionis, sed non fiat nisi ex for-
ti causa ne materia cōgeatur & sputum prohibeatur
& fiant communiter trāfacta die tertia, obseruatis ce-
nonib. suprascriptis in prima phlebot. Deinde si uer-
rit materia peccans præter sanguinē pharmacia edo-
cat proportionata uirtuti & materiæ peccanti, ut pu-
ta quando aliqua ex ea quæ suprascriptæ sunt in loci
da intētiōe obseruatis canonibus ibidem descriptis
hoc obseruato quod inter hanc phlebot. & pharma-
ciam cadat dies medius in quo uirtus restaurari possit
sit. Sed semper memor sis ne uentrem nimium lubri-
cus. Sexta autem intentio est ut causa coniuncta, &
reli digeratur paulatim, per sputum mundificatur, &
etiā pro parte insensibiliter resoluatur semper ex
uēdo iuxta posse ne suppuretur. Mundificatiuum 12.
liquir. rasæ & mundæ à cortice suo 3. s. hor. granat-
cat. 3. s. sebestē. 3. 1. iuiub. 3. 2. uiol. M. 2. suc. granat-
dul. 3. 6. aquæ uiol. 15. 4. facc. candidi, penidionum,
diadragan. ana 3. 1. s. incidatur incidenda deinde si-
mul bulliant ad leuem ignem usq; ad consumptionē
tertiæ partis aque, & fiat iulep lōgum, uiol. tamē ad-
dantur in sine ad bulliendum, de hoc iulep tepid. aut
calid. gargarizet & teneat in ore lambēdo, cui si opus
fuerit amplius mundificare et digerere addatur suc. li-
quir. 3. 1. sem. malug. sem. malua uif. sem. cōmunium
frig. añ. 3. s. & de eo bulliēdo fiat iulep lōgum. Et si
amplius fuerit opus mundificare & digerere addatur
mellis uiol. 3. 1. &c. Mundificatiuū cum sputo effica-
cius supra scripto, et digestiuū 12. diadragachati frig.
Nicolai 3. 3. mucil. sem. malua, & malua uif. & cy-
toniorū, añ. 3. 2. manna 3. 2. mellis, uiol. 3. s. reforme-
tur confectio in forma mediocriter liquida. Si uerò
sanguis fuerit in causa, requiritur maior absterfio &
minor infrigidatio.

Et si materia fuerit uiscosa, aliqualis incisio, ad quæ
omnia

omnia confert oxymel cum suprascriptis mixtum & pro complendo hanc intentionem exterius ungitur ut infra. *℞.* Oleorum, uiol. amyg. dul. chamæmilini, butyri ana. *℥.* i. misce, in his oleis debite cal. infundatur petia lini subtilis uetus & inūgatur particula, petia illa taliter infusa super extendatur & fascietur, nec non fomentatio facta, scilicet ex aqua decoct. maluarum, sem. lini, paritariae, foenugraeci, maluauif. & similibus. Minuit enim dolorem & sputum accelerat postquam sequatur inunctio, aut emplastrum subsecuens. Maturatiuum adiuuans, scilicet ad mundificandum & doloris sedatiuum. *℞.* foliorum uiol. *℥.* i. mucil. althææ, sem. lini, foenugraeci, ana. *℥.* s. florum chamæm. meliloti, ana *℥.* s. oleorum uiol. amyg. dulciū, butyri recentis sine sale ana quantum sufficit ad impingundum farinae hordei partes duas, farinæ sem. lini partem unam, ita quod sufficiat ad infusandum, flores bulliant in sufficienti quantitate aque ad faciendum bullitionem sufficientem pro emplastro, deinde omnia simul misce ad lentum ignem & fiat emplastrum, &c. Super apost. loco dolente emplast. hoc repidum apponatur & quandoq; iteretur bis in die. Si uero phlegma fuerit in causa adhuc requiritur minor infrigidat. & maior incisio, & absterio sicut hydromel cum oxymelle simplici & syr. deliquiritia quibus etiam aliqua ex suprascriptis possunt admisceri & potest fieri aqua mellis cum scib. passulis, & liquir. nec non loch de pino addatur suprascriptis. Si uero melancholia fuerit in causa conglolla, cui oxymel addi potest si fuerit opus incidere. Et si magis infrigidare uis, ponantur uiolæ in decoctione, aut addatur syrupus uiolaceus: & si magis cytoniorum, maluaufici, & sicus sic, pingues, & loch de pino cum syrupo, debuglosa, melle uiol. oxymel leuissimum, & cum mucilagine, semine maluauifci, semine maluar, & semine cytoniorum, sit ad hoc sublidencia à maturantibus & remanentibus asperitatem tur infrascripta. Recipe olei uiolarum, amygdalauiufci, foenugraeci, sem. lini misce, quibus si erit opus butyro. Sed in materia melancholica intendatur magis mollificationi, & in phlegmatica magis absterfioni. Vnguentum leue competes in pleuresi ex megræci, lini, butyri recentis, medullæ cruris uiriuli, olei amyg. dul. liliorum alb. ana. *℥.* s. croci. *℥.* i. misce. Septima intentio, scilicet correctio accidentium compleatur, ut infra, si fuerit instantia uigiliarum, prius molauentur crura & brachia trahendo inferius cum decoctione dicta, in secunda intentione ex folijs lactu papaueris albi & nigri, & etiā feminis hyoscyami, & ungantur exterius tempora & frons cum diapo. puleon addito etiam opio si oportuerit. Et detur etiam apud necessitatem syrupus depapaueris factus ex semine papaueris, & non ex cortice, sed cum cautela ne compingat sputum quod esset detur, & si hoc timeretur detur cum aqua mellis, aut

aqua decoctionis passularum, aut similibus. Subeth, si accidar curetur odorando acetum acutum, & ponendo petias in eo infusas circa frontem, et tempora, & apponendo uentosas parti posteriori descendendo & faciendo clysteria ad hoc propria & fricationes fortes, trahendo inferius ligaturas & recurra tur ad caput de subeth. Subueniatur autem phrenesi, si non sit uera, inducendo somnum, lauando crura & brachia, ut supra in sedatione uigiliarum super commissura coronali fiat embroca, aut fomentum cum decoctione suprascripta pro cruribus & diuidatur pullus columbinus per medium et aspergatur puluis hyoscyami albi, & tepidus ponatur super commissura & dimittatur per horam. Si autem uentre existente stiptico, sicut est ut plurimum in tali casu leniatur, primo uenter cum clysteribus lenitiuis & etiam cum acutis si oportuerit, & fiat phlebot. quādo materia est in ascensu, ex saphenis, et ponantur uentosæ in spatulis & natib. cum scarificatione, sed postq; ascendit uirtute consentiente fiat ex cephalica, aut phlebot. uenæ frontis, aut fluxus sang. narium prouocetur, & super caput ponatur embroca, de aqua suprascripta. Et unctiones in primis alterantes, & somnum inducentes & in processu aliquantulum magis resolutiuæ. Si uero materia reparat ad caput & neruos fiant fricationes in latere contrario, & super locis læsis fiat unctio cum oleo chamæmel. & liliorum al. debite calid. & inuoluantur faldellæ lanæ suc. & fiant diuersiones debite per clysteria, &c. Si uero accidar syncopis ex uirtutis debilitate subueniatur exhibendo modicum uini dulcis lymphati cum aqua hor. aut uiol. & contusi pulli aut brodij consumpti. Si uero ex raptu humorum aut uaporum ad cor fiat diuersiones omnibus modis suprascriptis, & confortetur cor et spiritualia cū odoribus bonis. Sitis uero sedanda est cum humectantibus & uehementiam inflammationis extinguentibus sicut aqua citrulli, melonis indi, mucilago psilij & consimilibus, uerum oportet ut non sint frig. actu, & oportet ut misceas secum aliquid ex abstergentibus subtiliter, ut lenifceatur sputum, sicut facc. aut suc. granatorum dulcium. Et si fuerit sitis à caumate spiritualium administretur libertas aeris temperati declinantis, scilicet ad humid. Si autem fuerit ab ebullitione cholere rub. confert syr. acetosus & uiol. cum aqua plurima, sedat enim sitim etiam aqua hor. facta, scilicet secundum ordinem & debitam artem. Fluxum sang. à naribus contingentem si fuerit creticus nō debemus restringere nisi modum excedat, & si fuerit non creticus propter exuberantiam sang. confert tunc phlebot. & cetera quæ requirenda sunt in proprio cap. & similiter ex ebullitione magna cum exstinguentib. & ebullitione sedantibus procedendum, ita tamen ut non compingatur materia & sputum prohibeatur. Fluxus uentris si accidar in principio morbi est secundum unū duorum modorum, aut propter multitudinem materiæ presentia regulationis naturæ & non est restringendus, sequitur enim ex hoc anhelitus facilitatio & delitescetia feb. & est significatio bona, aut est propter multitudinem materiæ præter hoc quod reguletur à natura, imò est sicut egurgitans, & est significatio mala, & proprie cum non sedatur per ipsum cōstrictio anhelitus & feb. inflammatio, tunc enim superueniet forte

mors in 4. uel ante, nec hic est restringendus nisi modum excedat, sed obuiandum malæ qualitati humoris siue occultæ siue manifestæ impediende naturam ut regulare non possit, & natura ipsa fouenda est, ut non cadat. Si autem accidat fluxus in fine morbi aut præcedente morbo est similiter secundum alterum duorum modorum. Aut enim est creticus expellente natura nocuum, & separante post debitam digestionem, & sequitur ipsam incolumitas, & non est restringendus, nisi modum excedat, aut accidit ex debilitate membrorum naturalium, scilicet prostratione, digestiua, & contentiua eorum, & sequitur ipsum mors. Huic autem subueniendum confortando utramque uirtutem cum interius & exterius applicitis, ita tamen ut spiritum non prohibeatur. Alchola autem uel oris excoarriatio si proveniat à uaporibus febrilibus, acutis, siue à uaporibus eleuatis ab humoribus putrescentibus, aut in membris naturalibus, aut in spiritalibus, aut ab ipso ulcere in pectore, aut pul., & denotat multam ipsius ulceris corruptionem, subueniendum est cum his, quæ dicta sunt in cap. proprio, cauendo semper, ne remedia localia sint stiptica multum impedienda sputum, quod esset deterius. Conuenit ergo retentio lactis in ore, & gargaris. cum eo & decoctio iuiub. dia. & huiusmodi in utroque conferentia. Regimen sex rerum non naturalium iuxta octauam intentionem. Sit aer in actiuis temperatus potius declinans ad calidum quæ ad frigidum, sed tendens aliquantulum ad humidum. Viretur aer uentrosus & uaporosus, & fumosus & si persue humidus & aquosus, & similiter æstuosus & siccus. Vbi autem esset magnum cauma in spiritalibus & siccis ardens & huiusmodi accidentia cum cal. superflua possent aliquantulum ad frigidum, & humidum declinare, nec sit suffocatus, uaporibus plenus, maxime existente spiritu anxio, ut cum anhelitus sunt subsequentes & sit mediocriter illuminatus. Veruntamen si est spiritus anxius et uideatur infirmo quod suffocetur sit magis illuminatus, & sit redolens odore remisso non intenso. Sit eius somnus communiter septem uel octo horarum & magis nocturnus, uerum etiam in die dormire potest, sed non incipiat dormire nisi saltem distanter à cibo per unam horam cum dimidio. Et dormiat non reuolutus, sed quasi sedens, & in situ secundum quem minus à dolore molestat, uerum iam cere super latus ægrum magis adiuuat ad spuum. Sit eius corpus magis inanitum, quam plenum, unde sollicitudine euacuet omnes superfluitates catarrhales per os, nares, & sit sollicitus ad tussendum, spuendum, & non parcat dolori, habeatque pro posse bis in die beneficium uentris, scilicet ante prandium & coenam, naturaliter aut medicinali auxilio cum clysteribus, uel suppositorio, uerum si solum assellet in die semel sufficiet, similiter urinam non retineat, nec sudorem stringat natura inuitante, quiescat, non excercitur, uerum fricationes suas à pectore infra supplent uicem exercitij & diuertunt ad inferiora, fiant ergo aliquando stomacho ieiuno, nisi senserit se debilitari, parum loquatur, & uoce submissa. Sit gaudens sperans, solitudinem, timorem, tristitiam, gaudium magnum, uerecundiam, & omnes animi passionem excedentes euitet. In dietando ad quatuor respiciendum est, scilicet ad morbum, causam eius, accidentia ipsius, eusque distantia à statu, aut propinquitatem, secundo ad

fortitudinem uel debilitatem ægri, tertio ad eius consuetudinem, quarto ad ipsius repletionem, & inanitionem. Quanto enim morbus est intensior & accidentia saueriora & statui propinquior competit magis tenuis diæta.

Causa uero morbi magis indicat de qualitate diætæ quam de quantitate. Fortitudo uirtutis indicat minus de cibo exhibendum esse, licet plus pro uice. Econtrario uirtutis debilitas, consuetudo indicat quantitatem continuam, quam discretam cibi, iuxta aphorismum 17. primæ particule, & sub his duobus etiam ætas & cætera intelliguntur: frequentius enim pueris & decrepitis exhibendum est. Iuuenibus plus pro uice sed rarius, senibus primis minus, & rarius, quam cæteris. Repletio etiam multum esse attendendum indicat, contra uero inanitio, &c.

Sed pone quod sit pleurexis cholerica uel sanguinea, mediocris intentionis, cuius status debeat esse in septima, secundum quod & plurimum euenit, in corpore mediocris fortitudinis mediocriter repleto, ætatis à 19. usque ad 70. in prima die naturali nihil debet comedere, sed solum bibere aquam hordeaceam, uel aquam sacch. solum, aut cum iulep aut syr. uol. ita ut aqua sit tripla aut quadrupla ad iulep, quæ sit facta secundum artem, ut accipiat hordei bene conditionati, mundi à cortice exteriori, quod prius fricetur cum panno asperso uehementer pars una, aquæ bene conditionatæ partes uiginti, decoquatur lento igne sine fumo ad consumptionem medietatis aut duarum partium auferendo spumam. Hic enim est potus medicinalis abstergens, lauans, spiritum faciliens, uentrem lubricans, oppilationes aperiens & urinam promouens. Si uero uelimus ut sit potus tantum, fricetur primo fortiter & excludantur cortices interius & bulliat una pars eius cum octo partibus, deinde quæ una bullitione, & projiciatur aqua illa, deinde pone super ipsum aquæ calidæ lib. 20. & decoque cum facilitate usque ad lib. 10. Sitim enim & etiam alpe ritatem sedat, inflammationem extinguit, pectus & pulmonem & guttur lenit, uentrem lubricum facit, præcordia humectat, & sputum faciliat, hæc cuncta magis competit ubi esset pectoris ergo istarum, siccitas, inflammatio maior, de aliqua ergo istarum, quæ magis facit ad propositum, bibat ut supra, aut sola, aut cum iulep, aqua uero sacch. sit ut accipiantur lib. 3. sacch. optimi, & 20. aquæ decoquatur ad consumptionem tertiæ partis, aut medietatis. Secundo uero die comedat prisanam hord. factam scilicet aut ex farina hordeacea debite cocta cum aqua, aut secundum Mesue, ut hæc aqua ultima descripta per uentriorem decoctionem refundendo adhuc parum potest parum circa decem partes aquæ inspersit aliquantulum ter quousque habeat mediocritatem hoc in proposito, & liquidum, & est cibus laudabilis hoc in proposito, & qua sumat in prandio & coena. Tertia etiam die comedat hanc prisanam altero ipsorum modorum factam, scilicet in brodio pulli parui. Et similiter in die quarta & quinta. Die uero sexta & septima in quibus est status ægritudinis & accidentia factam in aqua iterum redeat ad prisanam primam modicum facit, & non in brodio cui potest addere modicum sacch. optimi ad libitum. Die uero octaua & nona cum incipit declinatio redeat ad prisanam in brodio pulli cum

cum sacchi, sed pullus sit maior. Decima & undecima adhuc pullus sit maior & sumat ptisanam cum pluris saccharo. Sequentibus uero diebus potest dare ptisanam cum pulpis pulli cōtusi cum saccharo usque ad 14. & post 14. iam ferē totaliter declinante ægritudine incipiat comedere præter ferculum primò de extremitatibus pulli. Deinde ulterioribus diebus ex partibus maioris nutrimenti, & incipiat bibere parum uini aquosi cum aqua sacchi, & tandem de uino dulci cum aqua prædicta. Sed nunquam bibat uinum nisi cum ægritudo ferē totaliter declinauerit, & præcipue dulce, sed solum aquam, de qua in principio. Sed uolentibus ptisanam detur temporibus proportionatis amygd. aut lac seminum communium frigid. cum brodio pulli aut panatella, ita ut panis sit quinque lotus cum aqua calid. quam uis Galen. prohibuerit dari panem & fermentatum & non fermentatum, sed corrigatur lauando cum aqua calida, ut supra. Aut detur brodium consummatum absciendo partes unctuosas cum saccharo, aut sine saccharo. Aut cucurbita in brodio pulli, aut aliq. ex maluis, blitis, & spinachijs. Similiter aucta pars in declinatione, ut supra de pullo, & si ne & quæ sorbilia concedi possunt; poma autem cōsta conceduntur in fine mensis, & granata dulcia.

Ex confectionibus conuenientibus in declinatione est marzapanis ex amygd. saccharum & aqua uiol. & pinæ præparatæ confectæ, & passulæ transmarinæ. Et secundum maiorem distantiam status post accensum diem est in crassanda diætā, ut puta si debetum pulli cum ptisana, & sic continuabimus usque ad undecimū diē, deinde usque ad quatuordecim, demus ptisanā solum, postea declinante ægritudine redibipra. Si uero materia fuerit phlegmatica, uel melanitis & status sit æque propinquus cum suprafcriptis in crassabimus & subtiliabimus ut ante, sed faciemus diuersitatem in qualitate ciborum. Nam in prima dabimus potum solum, scilicet aquam mellis reuicid. aut multi mellis secundum maiorem aut minorem calid. quæ sit secundum hunc modum. 8. mellis dari 15. 1. aquæ cisternæ 15. 9. bulliant simul ad lentum ignem sine fumo ad consumptionem tertie partis & despumetur optimè & coletur, aliquando accipimus partem unam, mellis & decem uel duodecim aquæ secundum maiorem aut minorem inflammationibus est brodium cicerum, aut ptisana cōcta in brodio cicerum, aut in brodio caulium, aut in brodio buglossæ, & boraginis, si materia fuerit melancholica, & kistiporum cicerum, quæ omnia possunt declinare ægritudine ad contusum pulli & pisces & uidiacius possemus in crassare in pleuresi phlegmatica. & melanchol. cum secundum plurimum status sit distatior à principio, quam in sanguinea aut cholerica, & in his passulæ & pinæ præparatæ magis conueniunt. Et hæc diætā est regularis. Attamen aliquando com-

pellimur irregulariter dare uinum & contusum in statu quando uirtus dissoluitur & deficit. Attēde tamen quod pueri frequenter sunt cibandi à decimo anno & infra. Et senes à septuagesimo supra oportet cibare frequentius, & præcipue infantes & tanto pluries quanto sunt animosiores & habentes plus de caliditate, & similiter decrepitos cum nō possint multum cibum digerere una uice. Dabimus ergo infantibus quater in die naturali, decrepitis ter uel plurimum. Similiter si pleureticus fuerit à principio supra modum repletus stabimus contenti solo potu duobus diebus & si multum fuerit inanitus à principio, statim incipiemus à ptisana hor. Si autem resolutio non fuerit possibilis, imò tendit ad hoc ut suppuretur, quod maxime signatur ex eo quod non mundificatur in quatuordecim diebus, imò crescunt accidentia cum debeant minui, scilicet dolor feb. difficultas & cōstrictio anhelitus, tussis, tunc attentè consideremus an cum prædictis accidentibus, etiam auctis ster fortitudo uirtutis an non. Si primū expecta suppurationem, si secundum, mortem. Ars uero producendi ad suppurationem, & ex suppuratione ad sanitatem sex exitus intentiones curatiuas. Prima quidem est apostem. maturatio: secunda ruptura eius: tertia abstergio & mundificatio: quarta incarnatio. & tandem sigillatio: quinta correctio accidentium: sexta regulatio uitæ. Intentionem primam complent res calefacientes temperatè & communiter humectantes cum uiscositatē quadam prohibente, scilicet fortem resolutionem ne separetur humidum à sicco, sed remaneat sicco permixtum, ut sit æqualitas in toto & eueniat æqualis maturatio per totum, & hoc interest inter medicinam maturatiuam & resolutiuam, est enim resolutiua priuata uiscositatē ne fiat retentio materie.

Imò fiat eius resolutio per partem post partem & attinet magis caliditati & siccitati, quam humiditati. Mollificatiua autē attinet magis hum. quā aliqua istarum & minus calid. nec est inuiscatiua, imò pororum dilatatiua, propter enim ad hoc, ut humorum æqualitate resoluatur, & quod non remaneant partes terrestres in fine, & maturationum quædam administrantur interius, quædam exterius. De interius applicitis temperatè maturantibus est aqua decoctionis ficuum sic. aut da. aut utrorumq. aut aqua decoctionis ficuum sic. passularum, fenugræci cum aqua & uino cocto aut sine eo. Et possunt addi semina malua uisci & malux. Et si fortiori opus est, ut in materia phlegmatica crassa, addantur radices lilij in decoctione, &c. Si uero materia in caliditate excedat accipiantur semen malux, cyton. uiol. hordei, & coquantur in aqua sufficienti cum saccharo, & addatur etiam semen malua uisci & lini si amplius maturare necesse fuerit. Possunt etiam fieri ex suprafcriptis, aut alijs mixtis cum his trochif. loch. electuaria calid. aut frig. secundum necessitatem cum mucil. sem. lini, aut sem. malux, aut seminis malua uisci, aut cyton. & exhiberi cum syrupo uiol. aut aliqua decoctione delectabili & ex his teneat aliqua in ore, gargarizet & bibat & sumat actū calid. Ex maturantibus aut extrinsecis quædam sunt embrocationes ex decoctione maluarum, althææ, fenug. sem. lini, & similibus. Et administraretur potius cum filtro quā cum

spongijis. Et cum sedare dolorem oportuerit addantur aliqua ex anodinis aliquantulum resoluta, sicut paritaria, melilotum & anethum, Et si fortius maturare uolueris radices ireos & ex mucilagine suprascriptorum cum adipe gallinæ & anatis possunt fieri unguenta. Et diachilon cum mucilaginibus est efficax, & possunt fieri emplastra, & sunt efficacia ualde cum malua uisco, farinis ad hoc proprijs, pinguedinibus, oleis & cæteris quæ in emplastris maturatiuis poni consueverunt. Et ex fortibus ualde conuenientibus in materia phlegmatica aut melanch. sunt folia caulis in emplastro addita. Et adhuc fortius radices ireos aut aliquid de galbano dissoluto in rob. Et adhuc fortius si addatur aliquid ex fimo columbino, imò hæc sunt causa ut materia ad cutem quandoq; trahatur, sed incipiendum semper à leuioribus, habendum respectum ad qualitatem materiæ & accidentia, & gradatim ascendendo, & cum perficit hæc prima intentio quiescat in aere temperato declinante ad calid. Et sint eius cibi maturantes sicut ferculum ex malua, blito siue sicta, atriplice cum oleo amygd. & ius cicerum abiecta prima aqua, & kist, & brodium frumenti, & ius caulium, & in secunda mensa ficus sicce, passulæ sine interioribus, daçt yli, poma dulcia elixa.

Secunda intentio perficitur, aut cum medicinis ad hoc proprijs, aut cum motibus partim apostemata conuallantibus aut extendentibus. Ad quam intentionem non est perueniendum nisi præcedente maturatione & iam exiturato apostemate, quod signatur ex remissione doloris & feb. & multiplicatione grauedinis in loco collectionis. Medicinæ autem sint calidæ lenientes, subtiliantes, sicut secundum Mesue syrupus de hyssopo, de prasio, & eius efficacior est syrupus herbæ benedictæ cum melle, aut decoctio eius sumpta cum modico fermenti secum distemperati & cocti, & fortius est suc. eius cum fermento & melle. Et fortius eis est si addatur modicum baurach, & propriè cum natura est fortior & feb. est remissa. Et in hoc casu laudat Auicenna. theriacam & mithridatum ad erumpendum cum conseruatione caloris innati.

Exterius autem applicetur emplastrum factum ex benedictæ cum butyro, adipe antiquo & melle, & adhuc fortius si addatur fermentum & simus columbinus. Et fortius si addatur baurach. Emplastrum etiam factum ex radice malua uisci, ireos recenti, simul coctis & præparatis cum axungia ueteri & far. forni græci, & sem. lini, & oleo liliorum alborum, est ad hoc efficax & domesticum satis. Et addatur fermentum & simus columbinus & baurach si oportuerit. Motus autem ad hoc conuenientes sunt tussis fortis, uomitus uiolentus, & iacere super latus ægrum & subitò se ad sanum uoluere, uel e contra. Et in hac hora sint cibi eius sorbitiones fermentatæ cum melle & pti sana ex farina frumenti & panis bene fermentatus, passulæ & ficus sicce, grana pini cum ficibus & amygd. & daçt yli sunt proprii. Et si cum his, quæ dicta sunt, apostema non rumpitur opus, ut aperiat cum ferro, aut cum cauterio, sed quia difficile est inuenire locum saniei cum ferro perforando, aut cum cauterio nisi aliquis tumor aut qualitas mutata appareat exterius. Præstantius est, ut à tali operatione abstineas, nisi locus saniei per aliquod huiusmodi ri-

bi manifestetur, & in casu etiam quo manifestetur tuius est primò cauterizare cum cauterio possibili usque ad costas aut prope, ita ut cauterizatio sit satis magna & incidens secundum incellum costarum. Deinde cum phlebotomia perforare usque ad locum saniei. Et si cum phlebotomia prima uice non inueniatur, iterum perforetur secunda uice & tertia in loco cauterizato imò in distinctis locis loci cauterizati donec inueniatur. Illud enim ferè sine dolore fieri poterit iam loco mortificato, ut supra. Debet enim in hac operatione paulatim incidere ne cum phlebotomia penetret interius & sanies in pectore colligatur & fiat empyima. Et propterea huiusmodi operatio non est multum tardanda ne interius fiat eruptio. Et fortè ad hanc operationem conuenientius est pilum paruum ut sanies paulatim extrahatur iuxta canonem, ne uirtus deficiat, & consideretur qualitas saniei. Si enim æqualis alba cum paruo fectore fuerit cum bona tolerantia bene sperandum est. Si uero cõtrarium malum. Et procedendum est egrum rescindendo secum, dum quod oportet & quantum oportet cum uino, Quæ ferculis, carnibus laudabilibus, & huiusmodi. Qualiter autem hoc uulnus factum sit tractandum uideatur cap. de empyimate. Tertiam rem complementur stergeria, lauancia, & mundificancia, hoc prius diligenter inuestigato quòd quandoq; sanies expellitur per pulmonem cum tussi, & aliquando ingreditur uenam magnam resudando tandem ad epar. Et quandoq; expellitur ad renes. Quandoq; per concauum epatis transit ad intestina, quæ omnia sensus manifestè distinguit. Aliquando in uacuitate pectoris colligitur & ibidem diu retenta perducit ad malas ægritudines. Nisi enim mundificetur in 14. diebus perducit ad phthisim, ex mundificantibus autem per os & tandem per uiam pulmonis sunt aqua sacca, aqua hordeacea, aqua mellis, syrupus deliquiritia, de hyssopo, oxymel simplex & tandem decoctio radicis lilij coelestis cum suprascriptis & syr. loch de cauib. & loch de seilla, & plurima in asthma conferentia. Exterius autem applicetur quæ resoluunt insensibilem materiam in pectore contentam, & cum hæc adiuuent ad sputum, sicut decoctio halassæ, id est, thimi hyssopi, & ireos, quibus posset addi lignum balsami spica, & acorus, huic, id est, aristolochiæ rotundæ, quæ decoctio debet calida administrari cum spongis in ipsa infusis & optime expressis super loco congregationis saniei & post eorum applicationem ter uel quater excicetur locus cum panno calido. Et ungatur locus cum oleo de lilijis, de spica, de anetho, de balana, de cypero, & fortius est oleum de ireos, de balano, de quibus omnibus si queratur maior resolutio, & excicatio addatur sulphur & asphaltum, id est, bitumen iudaicum, & aggregentur cum melle, & adiuuet ad penetrationem, aut prius iungatur oxymella, & propriè scillitico & desuper aspergatur puluis factus ex suprascriptis, his autem arsenicum, id est, auripigmentum, si opus est fortiori resolutione addi potest. Si uero appareat materia ad uias urinæ deriuari adiuuetur cum decoctione radicis apij, sparagi, feniculi, sem. communibus alchechengi. Item cum brodio cicerum & similibus urinam prouocantibus. Si uero ad intestina deriuetur adiuuetur cum me-

dolla carthami, cassia, manna, & huiusmodi cum
clysteribus trahentibus ad intestina & mundificantibus
sicut decoctione agarici, carthami, hyssopi, aristo-
lochiae cum debita mellis quantitate & huiusmodi.

Sunt tamen quaedam quae sumpta per os adiuuant
expulsionem per omnes vias suprascriptas, sicut ius
galli antiqui iuxta doctrinam Mesue capite proprio
defure gallorum & gallinarum. Item aqua mellis,
liquiritiae, hyssopi, capil. ueneris diuisim & coniun-
ctim. Item cassia, manna, & cetera. Et ex me-
dicinis magnis administrandis cum morbus chroni-
catur sunt mithridatum, theriaca, athanasia, quae per
omnes adiuuant vias, medicinis autem extremis si-
cut de piperibus, de arsenico, & sulphure & similibus
non est utendum nisi cum cetera non contulerint in-
cipiendo a dosi pauca & minori quae ab authoribus
scripta sunt praecipue a Mesue in capite de asthma &
gradatim ascendendo seruatis canonibus ab eodem
scriptis in capite proprio de pleuresi, & de asthma,
sed his non est utendum nisi cum in pulmone & pe-
ctore est superflua humiditas non corrigibilis per su-
prascripta, et feb. est remissa & uirtus constans, & pri-
us suffragis utendum est, sicut si ex arsenico & sul-
phure & croco fiant formae similes auellanis cum adi-
perenum caprae, & ex una earum posita super pru-
nis recipiat fumus per os.

Si autem aliquid horum oportuerit dari per os, de-
tur 3. s. sulphuris cum ovo sorbili, aut detur diasulphu-
ris descriptione Mesuerantundem cum aqua mellis
semel aut pluries secundum exigentiam, & si quid no-
cument acciderit ex exicatione aut calefactione cor-
rige cum contrariis secundum canon. Mesue.

Cibi eorum sunt ius cicerum, ius caulium, farina
hordei, ius galli antiqui. Condiunturque cibaria sua
cum saccharo aut melle, aut oleo amygdulium, &
nisi febris obster aromaticetur cum pipere, sed de-
clinante materia ad intestina dentur, quae uentrem
taxant sicut malua, bleta, atriplices & betonica, quae
dicuntur & leureng, uel leuloga. Declinante uero ma-
teria ad vias renum sparagi, bauciae, id est, pasticana,
& in secunda mensa dactyli, passulae, pineae praepara-
tae, amygdalae, necnon poma dulcia, similiter cyto-
nia declinante materia ad vias urinariae. Potus autem
sit uinum dulce, aqua mellis, aqua sacca, aqua hordei,
& uinum de passulis, uinum alchifures, &c. Si au-
tem materia in coacuitate peccoris colligatur ad nul-
la, ut supra in secunda intentione dictum fuit. Aut
cauterio actuali uel potenciali, & tandem cum sagitel
incidatur absque cauterizatione, locus autem inci-
dendus est ubi aliquis exterius tumor apparuerit, &
inter quartam & quintam costam distanter a spondi-
libus per quatuor & septem digitos in latere in quo
per signa comprehenditur sanem fuisse collectam et
paulatim sanies extrahatur, & locus mundificetur,
ita ut si opus fuerit iniiciatur aqua aut uinum, melilo-
tum cum cathair, id est, stringa, & tandem curetur, ut
infra in capite de empymate.

Quartam rem complent medicinae incarnantes tam
interius quam exterius applicitae, sed aliquando opor-
tet uti incarnantibus, aliquando redire ad mundifi-
cantia secundum quod necessitas expostulat, aliquan-

do simul miscere ex conuenientibus lac asinae, caprae,
uaccini, & pecudinum plus incarnat, quam capri-
num aut asininum, & generaliter lac pluris casei & mi-
noris serofitatis est magis incarnatiuum, & e contra
magis mundificatiuum, aqua hordei decoct, cancro-
rum fluuiatum secundum artem praeparatorum,
sacca, ros. bolum armen. secundum omnem modum
administrationis, & multae aliae medicinae, quae repe-
riuntur in capite de spuro sanguinis aut phthisi. Ci-
bi autem complentes quartam intentionem sunt a-
ues paruae degentes in arboribus, pedes & partes ui-
scosae uitulorum, porcorum, & huiusmodi, & ex fer-
culis conueniunt tri. pannicium. hor. frumentum,
kist fabarum, prisa ex farina frumenti, amyllum, &
hordeum rizi, & lac coctum, & fercula quae cum la-
cte fiunt. Caseus recens non salitus aut pauci salis,
potus autem sit uinum mediocriter stipticum aut ui-
num dulce, aqua calibeata, aut aqua fluuiatis infusio-
nis gummi Arabici, & rob myrtini & syr. eius, &c.

Quintam rem complent auxilia sedantia acciden-
tia superuenientia totius curae processu, quae sunt do-
lor feb. tussis uehemens constrictio anhelitus, angu-
stia, sitis, uigiliae, abominatio cibi, quae tempore ma-
turationis suspecta sunt, sed maturata materia sus-
pecta sunt magis post eruptionem aut diu remanentia
mortalia & praecipue dolor feb. constrictio anhelitus
angustiae, solent enim haec accidentia iuxta doctrinam
Hipp. maturato apostemate remitti & ipso erupto
adhuc magis remitti saltem post primam & secun-
dam diem, demum sicut materia paulatim mundifi-
catur, ita in dies paulatim emittitur. Si ergo contra-
rium horum acciderit, quid aliud assignare possunt ni-
si morbi summam malignitatem & profundam cor-
ruptionem, praecipue si sanies quae egreditur sit fo-
etens, mali coloris & substantiae. Verum sunt aliqua
accidentia minus suspecta sicut uigiliae, sitis, appetitus
defectus, quae possunt habere alias causas quam ulce-
ris malitiam & profundam corruptionem, quae cau-
sa possunt remoueri & corrigi. Sed si sequantur ulce-
ris malitiam, aut sint complicata cum alijs acciden-
tibus seuioribus omnino desperandum est, haec au-
tem accidentia corriguntur remouendo eorum cau-
sas, quod ex proprijs eorum capitulis consyderan-
dum est. Sextam rem complent debitum regimen
sex rerum non naturalium exigentiam s. intentio-
nem suprascriptarum, de quo sufficienter actum est in
regimine pleuretis per resolutionem.

Si autem permittetur ad putredinem, ad corruptio-
nem, quod apparet ex signis ab initio dictis obuian-
dum est prohibendo causam antecedentem, ne tran-
seat in coniunctam omni auxilio superius dicto, sci-
licet phlebotomia, euacuatione, &c. circa quas in hoc
casu debemus esse audaciores cum fere certum mortis
immineat periculum, & festino auxilio opus sit, &
eum adiuuare, ut causa coniuncta extrahatur per spu-
tum & resolutionem insensibilem, et in hoc casu com-
perit oxy mel simplex cum adiuuet sputum & sua a-
cerolitate corruptionem prohibeat.

Si uero induretur procedendum est cum mollifi-
cantibus interius & exterius, interius autem cum sa-
uonea quae comedatur & in ore retenta deglutatur,
& cum decoctione, sem. malua uisici maluae, cyron,
passul. sicuum sicca, & huiusmodi molificantium ex

qua aliquid post aliquid bibatur, in ore teneatur & cum ea gargarizetur, & exterius applicentur, quæ mollescant ex his quæ in apost. schirótico conferre consueverunt præter acetum, & cum hæc sint propria membro cui applicantur, scilicet pectori, & hæc ex proprijs requirantur cap. Si uero permuteur ad cancrum nulla fiducia salutis habenda est, sed cum frigid. & hum. est procedendum, & cura blanditiua. Si uero permuteur ad neruos, cerebrum, cor, &c. dicta est cura, supra in correctione accidentium. Si uero permuteur ad exteriora, natura iuuanda est cum attrahentibus & tandem cura apost. extrinsecorū est procedendum. Si uero ad pulmonem & phthisim procedendum est cura phthisis, si uero ad peripneumoniā tunc procedendum cura peripneumoniæ, de qua infra. Sed obuiandum est omni ingenio possibili ne mutetur ad pulm. euacuando, diuertendo, etiam cum uentosis super loco pleuretis applicitis cum scarificatione & sine, & similiter quando permuratur ad loca nobilia.

DE PERIPNEUMONIA.
Cap. LXIX.

Peripneumonia dicitur ethimologicè quasi prope pulmonem, & est diffinitiuè apostema calidum in pulmone, siue hæc caliditas insit ei per causam essentialem siue accidentalem per putrefactionem aut adustionem. Ex quo infertur quod nodus aut glandula, aut alia huiusmodi adubeleth phlegmatica aut apost. aquosum, aut phlegmaticum molle, aut sephiros purum aut non purum, quibus non insit caliditas notabilis, nec per se, nec per accides, esto quod sit in substantia pulmonis, non sunt peripneumoniæ quapropter distincta de huiusmodi Auic. facit capita. Facit tamen capit. de bothor in pulmone, quod est pustula parua calida pulmonis, quod ratione paruitatis non appellat peripneumoniā, licet posset dici peripneumonia parua. Generatur autem peripneumonia dupliciter per uiam paulatim factæ confectionis cum materia ex superfluitate nutrimenti. Aut ex nutrimento ipso paulatim congeritur facies apostema, quod in dies paulatim augetur, donec notabiliter excreseat. Et hoc est secundum plurimum, chronicum, aut per uiam defluxus, aut à cerebro humiditate ad pulmonem catarizante, aut à gutture cum synache mutatur ad pulmonem uel ad peripneumoniā, aut à partibus pectoris cum pleuretis mutatur ad peripneumoniā. Frequenter etiam sit in pulmone apostema per uiam defluxus humoribus aliunde defluentibus & in pulmone congregatis nulla ægritudine præcedente. Et ex his infertur peripneumoniā quandoque fieri incipiendo, scilicet, nulla ægritudine præcedente quandoque permurando, scilicet, ex alia ægritudine.

Causæ autem coniunctæ peripneumoniæ sunt quatuor humores. Verum frequentius generatur à phlegmate, deinde ex sanguine, raro ex cholera, rarius ex melancholia. Sicut contra pleuretis frequenter ex cholera, raro ex phlegmate, quod non est absque ratione: cholera enim facilliter penetrat in rem densam, sicut est panniculus, & in eo retinetur, non autem sic phlegma sua crassitie penetrat in rem densam, sed bene in rem raram in qua sua crassitie facillè

retinetur. Esto enim quod cholera facillè penetrat in rem raram, tamen ab ea sua subtilitate facillè euaporat & resoluitur, quare, &c. Est autem duplex secundum Mesue uera & non uera, siue propria & ex æbdeng, id est nota: uera siue propria, ut dicit Mes. auctoritate Galeni, est quæ sit ex phlegmate, cum frequentius eueniat propter causas suprascriptas, & minus mortalitatis. Et proportionatur superfluitati nutrimenti ipsius pulmonis, quæ phlegmatica est, licet nutrimentum sit cholicum. Quamuis quidam opinentur contrarium, maxime.

Concil. differentia 100. reprehendens Mes. dicens rem superfluitatem nutrimenti pulmonis esse phlegmaticam cum potius sit cholicum, debet enim proportionari nutrimento suo quod est sang. choler. Et consequenter secundum Concil. haberemus dicerem peripneumoniā genitam per uiam paulatim factæ confectionis esse cholicam & acutam, quod est contra sensum. Licet concederet Concil. peripneumoniā genitam ex superfluitate accidentibus, pulmonis, quæ inest sibi à catarrhis descendentibus, & à uaporibus à toto ad ipsum eleuatis esse secundum & à plurimum phlegmaticam. Sed sequendo Mes. respondendum est superfluitatem nutrimenti esse contrariam ipsi nutrimento, sicut nutrimento osis contrariatur medulla. Vnde quia nutrimentum pulmonis est cholicum eius superfluitas est phlegmatica. Sed contra hoc sunt multæ instantiæ, de quibus aliis. Sed in summa secundum Concil. concedere habemus omnem peripneumoniā genitam per uiam paulatim factæ confectionis esse cholicam aut à sanguine acuto, sed per uiam defluxus humoris phleg. quandoque cholicam secundum naturam humoris fluentis, licet secundum plurimum phlegmaticam propter causas suprascriptas. Sed secundum Mes. si per uiam paulatim factæ confectionis generetur, ex nutrimento esse semper cholicam aut sang. si autem ex superfluitate nutrimenti, esse semper phlegmaticam, si uero per uiam defluxus quandoque phlegmaticam quandoque cholicam.

Signa quædam significant genus ægritudinis, scilicet ipsam peripneumoniā eam ab alijs dispositionibus distinguunt, quædam causas eius, quædam quod salubris sit aut mortalis, quædam tempora eius, quædam modos terminationis, quædam longitudinem & breuitatem, &c. Terminatur autem quinque modis, ut supra de pleureti. Aut enim resoluit uel insensibiliter uel sensibiliter cum eius materia paulatim per spū uel euacuatur, aut induratur, aut permuratur, uel ad cancrum, uel ad neruos, uel ad pectus, & transit in pleurit. uel ad exituras manifestas, aut eius materia per uiam aut putrefit, ut superius in pleureti, &c.

Significant peripneumoniā ipsam feb. acuta, & cæteris paribus acutior quàm in pleureti propter cor dis propinquitatem: maior tamen aut minor secundum causam facientem ipsam. Constrictio anhelitus uehemens & maior quàm in pleureti. Alrus tamen uelox & frequens est anhelitus secundum feb. magnitudinem, & est cum magna necessitate euentandis, ita ut arbitretur se ex proximo suffocari. Et quandoque infirmus coactus erigitur & stat erectus secundum eam positionem, quæ orthopnæa uocatur, & multo

tiens non potest bibere & non nisi male loqui. Dolor extensius & grauius, non pungitius, sicut in pleuresi, & est dolor extensius in pectore toto, licet magis in ea parte in qua est apostema, procedens ex profundo ad partem thoracis, et ad dorsum secundum incessum mediastini, & panniculi tegentis pulmonem, pulsus secundum plurimum undosus & diuersus multum, frequentior & rarior secundum necessitatem. Hæc diuersitas prouenit propter uehementem pugnam naturæ contra morbum, & contrario non tamen semper est undosus, ut puta in peripneumonia choleræ aut melancholicæ. Nec potest dormire super dorsum, nec super latera, nec super faciem, sed oportet ut dormiat sedens, licet secundum plurimum minus molestetur dormiendo super dorsum, quam super latera. Et coloratur lingua secundum naturam calidi apostematis, licet secundum plurimum sit inuiscata & adhaereat ei digitus tangentis, & propter multitudinem uaporum ascendentium ad superiora quandoque in crassatur collum ut appareat, sicut uenter plenus uento, ut uidi. Et propter hanc causam rubescunt maxillæ, ut uideantur tinctæ. Et secundum plurimum apparet plenitudo & extensio in tota facie & collo, & oculi rubescunt & tumescunt ut uideantur apostemari. Tussis in principio sicca sine sereatur, sed procedente ægritudine cum sereatur pluri, aut pauciori secundum quantitatem materiæ & eius digestionem, & uirtutis fortitudinem. Urina ruffa aut subruffa, spumosa, liuida secundum plurimum. Et quandoque subingualis, & hic sereatur est frequenter spumosa propter conclusionem aeris respirati sub humiditate quæ expellitur & propter uaporum multitudinem. Aliquando aduenit subeth materia existente phlegmatica aut sang. cum multa uaporatione. Aliquando farræ in materia cholerica. Signa causarum facile elici possunt ex his, quæ dicta sunt in signis causarum pleuresis. Signa salutis & mortis etiam sumuntur ex his, quæ dicta sunt in pleuresi. Fluxus ramentis sanguinis, non est adeo efficax signum in significando salutem peripneumoniæ sicut pleuresis, propter diuersitatem materiæ, quæ est crassior in peripneumonia, unde est eius crisis aptior per inferiora, scilicet per anum uel matricem, & quia non est tanta colligantia pulmonis cum uenis narium sicut pectoris, ut ex anatomia patet. Et propterea fluxus menstruum, aut sang. hæmorrhoidalium, aut crisis per urinam, aut per fluxum uentris est communiter signum bonum in peripneumonia plus quàm in pleuresi. Hoc tamen diligenter attende quod peripneumonia secundum plurimum est mortalis, pleuresis uero e contra secundum plurimum est salubris. Signa terminationis facillime conueniuntur ex his, quæ in pleuresi dicta sunt, uerum si dicitur, & sit in pectore dolor pungitius, & est terminatio salubris secundum plurimum. Signa longitudinis & breuitatis sumuntur ex dictis in pleuresi, sed frequentius reperit peripneumonia longior, quàm pleuresis cum communiter pendeat ab humore crassiori, quàm pleuresis. Cum prolongatur peripneumonia perducitur ad tumorem pedum & hydropem frequentius propter nocuentum epati communicatū. Signa etiam temporum proportionabilia dicta

sunt in pleuresi. Accidit in pulmone apostema durum nullo modo cal. nec per se, nec per accidens saltem caliditate notabili, quod est uel phlegmaticum, sicut dubeleth, scilicet nodi aut glandulæ, aut melancholicum, cuius signum est constrictio anhelitus, quæ in dies augetur secundum apostematis augmentum tussis frequens sicca, & caloris paucitas, & grauitas sensata, constrictio anhelitus qui quandoque alleviatur, deinde redit. Et quandoque accidit apostema molle phlegmaticum in pulmone, cuius signum est constrictio anhelitus, salua plurima, humiditas multa in lingua & partibus oris, lenitas pectoris, paucitas caliditatis, liuiditas faciei tendens ad colorem plumbeum. Et quandoque accidit in pulmone bothor, id est pustula parua calida differens à peripneum. sicut partium à magno, licet ratione suæ qualitatris sit apta facere accidentia peripneumoniæ, de quibus supra. Attamen ratione paruitatis suæ non facit ea neque meretur nomen peripneumoniæ, licet possit dici peripneumonia parua. Signa cuius sunt grauitas non multa, constrictio aliqualis anhelitus cum uelocitate & frequentia, caliditas in pectore sensata, & inflammatio corporis absque febre, notabiliter sensibili, est enim neutralitas aut febris parua, ita ut totum corpus non calefiat notabiliter, licet partes propinquiore apostemati amplius calefiant. Et quandoque congregatur in pulmone aquositas siue apostemans, siue non, quæ quia non est cum caliditate notabili non meretur dici peripneumonia, cuius signa sunt commotio delatere in latus. Cum enim infirmus se resoluit de latere ad latus sentitur ab infirmo, & forte auditur à circumstantibus sonitus aquæ commotæ, febris leuis aliquæ caliditate putredinali in ea accensa, constrictio anhelitus, sputum subtile aquosum, color faciei albus, liuidus cum apostemate undinali extremitatum, & breuius est ut dispositio hydropica, de qua posset esse dubium quomodo ibi congregata sit, an per uiam defluxus, an per uiam paulatim factæ congregationis, &c. Est præterea dubium cum sit multæ quantitatis & fluxibilis ualde sicut aqua, & in meatibus trachæ arteriæ, & spongiosis partibus pulmonis contenta, quomodo non subito suffocet patientem penetrando ad partes angustas, & prohibendo transitum aeris ad cor. Ad quod pro nunc dicendum pulmonem esse diuisum in duas medietates, scilicet, dextram & sinistram mediante mediastino diuidente pectus per medium, potest ergo aqua in una medietate contineri, & per alteram fieri inspirationem & expirationem, sed de his satis pro nunc. Accidit apostema in canna pulmonis, quod quandoque ulceratur, cuius signa sunt febris remissa cum materia in ea parte collecta, quæ ex natura morbi non posset esse multa, dolor & pulsatio dorsi ex directo spondilium à 12. spondili supra, & à 5. infra, quia in ea parte canna pulmonis situatur, quæ sensibilis est mediante panniculo, quo regitur pruritus in corpore propter uapores dispersos per corpus. Alio pruritus in constrictione narium, & naribus ipsis propter ipsorum propinquitatem ad cannam pulmonis, & rauedo uocis, causa nota est, & sputum paucum, quia membrum est densum in quo non nisi pauca materia spumabilis potest contineri. Et si ulceratur, est odor oris

foetidus, & representatur in ore sicut odor piscium.

Prognostica, peripneumonia ut plurimum est mortalis, omnis peripneumonia cholericæ est mortalis, peripneumonia facta ex synanchia aut pleuresi est mortalis secundum plurimum, quia aut interficit in spatio 7. dierum, aut efficiuntur empyici & tandem phthisi ci iuxta Aphor. & c. licet ut plurimum si transierit 7. est salubris, sed tamen rarissime transeunt 7. peripneumonia diuturna perducit tandem ad nocumentum epatis, ita ut erret eius digestiua, & tumescunt pedes & crura & interdum uenter. A pleuritide aut peripneumonia habito, diarrhoea superueniens malum.

Cum homini superuenerit feb. & in anhelitu tantam patitur constrictionem, ut se prefocari putet, & in maxillis ita uehementis sit rubedo, ut tinctæ uideantur, & anterior pars pectoris dolet & tussis adest, et quod cum screeatione emittit, existit spumofum, & in pectore sentitur grauitas sine punctione & sine calore cui omnia hæc accidunt, acutum in pulmone patitur apostema, & uocatur hæc passio peripneumonia. In principio igitur curationis eius basilica est minuenda, deinde æger ex his quibus medicatur pleuresis est curandus.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. In prima ponit signa. In secunda ibi. In principio ponit curam. In prima parte ponit sex signa, febrem scilicet continuam, constrictionem anhelitus maximam, maxillarum notabilem rubedinem, uaporibus petentibus superiora, tussim frequentem, screeatum spumofum propter magnam ebullitionem subtiliantem materiam, & conuertentem ipsam in uapores, qui retenti sub materia uiscosa, eleuant ipsam in diuersis partibus facientibus ampullas. Ad quod adiuuat aeris respiratio per loca angusta, cuius pars sub materia illa retinetur faciens ampullas, in pectore sentitur grauitas & extensio sine punctione, & sine alia specie doloris, quia pulmo non sentit nisi per panniculum inuoluentem, per quem apostemate existente in substantia pulmonis non sentitur nisi extensio, & per panniculum suspendentem, scilicet mediastinum per quem non sentitur nisi dolor grauius, & per eandem causam non sentitur calor in parte apostemata. Si autem materia communicaretur alteri istorum panniculorum sentiretur dolor pungitiuus, & calor: quæ dicit in secunda parte nota sunt.

Cura peripneumoniæ similis est curæ pleuresis quo ad omnes intentiones curatiuas dictas in capitulo de pleuresi, quas omnes huic cap. peripneumoniæ accommoda secundum exigentiam ipsius terminationis, similiter eadem antidota sunt utrique communia, oportet tamen ut medicinae exterius applicite, iuxta sententiam Auic. sint magis profundantes in peripneumonia, cum sit à cute distantior quam pleu-

resis ad quarum profundationem duo iuuant: una est forma medicinarum, nam uirtus emplastri magis profundatur, quam uirtus unguenti, & uirtus embrocæ quam fomenti. Secundum, in medicinis peripneumoniæ ponatur aliquid acuitatem habens subtilium partium sicut modicum aceti acuti, sit enim ita modicum, ut penetrare faciat & sputum non prohibeat, neque prohibeat permutationem peripneumoniæ ad pleuresim. Et oportet ut sit maior sollicitudo ad mundificandum cum sputo, quod ualde difficile est, quam in pleuresi, non propter loci distantiam, sed propter nocuenti magnitudinem ad materiam inobedientiam. Ad quod iuuat statio super loco infirmo. Tertiò, ut cum auxilijs nostris magis intendamus euacuare & diuertere ad inferiora, quam in pleuresi. Et propterea prouocatio hæmorrhoidarum ac menstruorum est utilissima & ultima in peripneumonia. Sicut fluxus sanguinis narium est ultimum in pleuresi. Et longè melius est phlebotomare saphenas in peripneumonia, quam in pleuresi, cuius causa potissima est, quia peripneumonia communiter est crassior magis petens inferiora.

Cura peripneumoniæ cholericæ, quæ almeftir dicitur, est difficilis, est enim ægrotudo peracuta plurimum occidens in 7. uel ante, & in hac opus est pluri extinctione, quam in pleuresi à simili causa propter mentis caliditatem & cordi uicinam. Dentur ægroti per os extinguentia fortia & in quantitate notabilis & actu frigida, sint tamen stringentia aut compingentia, sicut aqua melonis indi, cucurbitæ, mucilaginis psyllij, aqua solatri, & huiusmodi, & exterius non ponantur emplastra, sed unctiones, sicut oleum uiolaceum aut epithimata, quia & si emplastra frigida sint tamen calorem reflectendo, interius calefaciunt, & potest fieri exterius epithima cum aqua uiolacea, & modico aceti, queritur enim maior extinctio, quam resolutio, sicut in erysipellate puro & similiter quam regimen reliquum magis ad frigidum declinet quam in pleuresi. Cura autem & regimen reliquorum apostematum pulmonis, quæ non dicuntur peripneumoniæ, cum in eis non sit caliditas notabilis, neque nec per accidens est similis curæ peripneumoniæ. Seu cæteris paribus cum magis calid. procedere possumus, quam in peripneumonia.

Si enim sit melancholica curetur cura pleuresis melanch. de qua supra. Si uero phlegmatica à phlegma crasso curetur cura pleuresis phlegmat. & procedatur cum multum humid. mollificantibus, aut parum sic remissè calefacientibus. Si uero à phlegmate subtili aquoso cum calefacientibus magis & aliquantibus. In cantibus, sputum calefacientibus, sputum facilitantibus omni enim huiusmodi dispositione sputum subilatum est, ut in crasso & uisoso iuuatur cum subilantibus et incidentibus. Verum aquositas in pulm. congregata indiget proprijs educantibus, aquositate ad quod precipue est suc. ieros cum educat aquositate & sit medicina pulm. & pprie 3. 2. cū aqua mellis & in hac audacius procedere possumus cum cal. interius et exterius exiccantibus usque ad sulphur & asphaltum, & similia exterius applicita, & interius etiam medicamen de ar. sen. & sulphure, de quibus apud autores in cap. de asthma & etiā superius in curatione pleur. sufficien-

tera etum est, ista tamen apost. multum chronicantur præter bothor, & plerumq; perducunt ad malum exitum nisi diligenter curentur. Cura bothor in pulmone similis est curæ peripneumonæ aut pleureis sanguineæ, sed propter paucitatem materiæ & paruitatem eius est facilis curationis & citæ curationis, licet ut plurimum suppurentur, propterea ipso erupto regendus est æger diligenter cura ulceris, de qua supra in pleureis cum terminatur per suppurationem, actum est sufficienter, ne aucto ulcere & malignato transeat ad phthisim. Ex uariolis enim quandoq; fit phthisis, ut aliquando uidetur. Et propterea minus malum est pro honore medici & utilitate ægri, oēs ægritudines aliquantulum pluri periculi existimare, quam pauciores, ut & ipse diligens sit omnes præmeditās finitros euentus, omniaq; symptomatica occurrere potentia ut ipsis secundum exigentiam succurat & ne aliquando dicat non sic putabam, homo enim est præstantissimus omnium quæ sunt infra concavum orbis lunæ qui semel periens non amplius reuiuiscit, nisi in die nouissimo, sunt & aliæ rationes quæ diligenter animaduertenti possunt facile innotescere, &c.

Apost. in canna pul. eodem modo curatur sicut in peripneumonia & pleureis, de quarum cura sufficienter actum est, hoc addito quod medicinae exterioris applicatæ, debent poni posterius super spondilib. & anteriis in medio pectoris ex directo partis cannae apost. Secundo quia medicinae quæ per os sumuntur debent potius in ore teneri, gargarizari, & lambi q; bibi, ut ex ipsis aliquid ad canna pulmonis transeat. Et si deglutium paulatim debent deglutiri, nam cum meri sit proximum cannae pulmonis in longa mora sui incesus, & per meri melius uirtutes eorū possunt cannae pulmonis communicari. Et propterea quæ deglutuntur alicuius corpulentia & uiscositatis esse debent ut diu in transitu morentur, licet etiam bibita & comesta uiuent, sicut etiam in peripneumonia.

DE EMPYIMATE.
Cap. LXX.

Empyima est collectio saniei in pectore, siue super diaphragmate in spatio inter pulmonem & pectus, aut in una medietate tantum, aut in ambabus, quamuis collectio cuiuscunq; humiditatis etiam si saniosa non esset, posset largo modo empyimata dici, sicut collectio aquositas, ut iam uidi phlegmaticæ & san. &c. Huius causa multiplex est, aut cararrhus effusus ad pulmonem, & tandem ad pectus aut materia synanches permutatæ ad has partes, aut apostema ruptum in pulmone, aut ulcus pulmonis, aut pleureis quæ post maturationem rumpitur, aut saltem quæ non debite mundificatur, aut effusio saniei ad pectus propter uulnus extrinsecū, aut propter uenarum intrinsecarum rupturam, aut aggregatū humiditatis in pectore quæ postea sanatur, siue aliunde per uias occultas, potest etiam sanies per occlusos meatus à multis partibus corporis ad pectus derivari, sicut in Ioanne Boiardo. Cumq; materia in pectore colligitur terminatur uno quinq; modorū. Aut enim subito præfocat sui multitudine, aut putrefit pulmo, & facit cadere in phthisim, & hoc secundum

plurimum, aut mundificatur cum spūto facile succurrente, aut mundificatur ex uia uenæ magnæ & arteriæ magnæ ad uescicam cum urina crassa, & est cursus eius prius ex uena ad epas, deinde ad renes. Et quandoq; ad intestina cum egestione, & sunt ambæ laudabiles facientes sanitatem necessario, sicut in domino Nicolao de Bonauerijs per uiam secessus, & quandoque apparente tumore in cute pectoris scinditur, & materia per foramen illud educitur.

Signa sunt feb. minuta quæ quandoq; malignata materia & amplius putrefacta excrescit & augetur ualde & fortè est feb. minuta quæ est hectica. Secundum calefactio extremitatum, aut manuum & pedum propter uapores illuc delatos. Tercium grauitas & extensio quedam in pectore præcipue in ea parte in qua sanies continetur. Quartum est tussis sicca, in principio, in processu uero humida, cum materia ingreditur pulmonem & spūto educitur. Quintum rubedo maxillarum ex uaporibus ad ipsas ascendentibus. Sextum dolores circa eas partes ex mordicatione saniei, et cum incipit malignari. Septimum corpus extenuatur & extrema tumescunt, licet substantiæ exiccetur debilitata amplius digestiua in extremis.

Octauum anhelitus consequentes & frequentes sunt uoces eorum, quod accidit propter stricturam anhelitus & laborem in anhelando, & dicit Auic. q; frequenter sunt nares eorum, id est, motus dilatationis uel dilatatiuus & contractiuius narium ob eandem causam. Nonum deiectio appetitus, imò tandem ablatio: læsis enim spiritualibus, necesse est tandem naturalia lædi. Decimum tumor aliquando exterioris apertus ex directo illius partis in qua sanies collecta est. Vndecimum iacent & dormiunt super latere in quo collecta est sanies, & super latere opposito iacere non possunt, quia grauatur & suffocantur à sanie pulmonem comprimente, & per hæc duo signa distinguitur latus saniei. Duodecimum signum sonitus auditus, in reuolutione delatere ad latus ex puris agitatione. Et dicit Auicenna, quod quidam intingunt filum in luto rubeo in aqua dissoluto, & cum eo circumdant pectus, & ille est locus saniei in quo sit prius fili exitatio. Signa salutis & mortis in empyimate sumuntur ab actione læsa, qualitate mutata, & exeuntibus.

Ab actione quidem læsa, quia cum fortificantur operationes & conualescunt sicut somnus, appetitus digestio, pulsus, anhelitus, bonum. Econtra uero malum. A qualitate mutata, quia si febris minuitur, & coloris habitudo melioratur, bonum, econtra malum. Ab exeuntibus quia facilitas spūti & copiosi secundum exigentiam materiæ & laudabilis, ut quod appareat sanies laudabilis bene conditionata, bonum, econtra uero malum. Et similiter exitus saniei per urinam aut secessum copiose secundum materiæ exigentiam arguit sanitatem necessario, etiam si non sit laudabilis. Significat enim fortitudinem uirtutis, & materiæ obedientiam cum non possit expelli nisi refundendo ad uenam chilis aut ad arteriam magnam, ut supra scriptum est. Et similiter exitus saniei laudabilis cum perforatur locus empyimatis, bonum, contra uero malum. Distinguitur aut sanies ab hum. phlegmatica per odorem, saporem, colorem, modum, hæc tamen distincte scribi non possunt,

sed oporteret horum notitiam longa experientia acquiri, ut agnosceretur habitus dictus gnomon 6. ethi eo. Et sanies quam primum descendit in aqua, contra uero humiditas phlegmatica natat, nisi sit ualde crassa, & in partibus suis tenax & inuiscata, &c.

Cura empyimatis magna ex parte habenda est ex his, quæ dicta sunt, præcipue de cura pleurefis per suppurationem. Est enim in cura empyimatis una intentio principalis, scilicet euacuatio materiæ super diaphragmate contentæ, quæ per tres uias potest educi, aut enim refudat ad uenam concavam transiens per eam ad gibbum epatis, & exinde per alteram duarum uiarum expellitur. Si enim transit ad uenam chilis descendentem exinde per emulgentes ad renes tandem ad uescam mixtu educitur. Si uero ex gibbo epatis transeat ad concavam exinde per meseraicas ad intestina secessu educitur. Et si per utraq; uias transierit simul mixtu & secessu educitur, qui modus terminationis est laudabilis, cum quo est fiducia sanitatis, sed rarissimus. Quem modum si natura tentauerit adiuvanda est, si diminuta fuerit cum his, quæ dicta sunt in capite de curatione pleurefis, per suppurationem intentione tertia. Si uero per se suffecerit non est impedienda. Sed regenda est debito regimine sex rerum non naturalium secundum exigentiam accidentium & uirtutis tolerantiam quod ex supradictis facile elici potest. Secunda uia euacuationis huiusmodi materiæ est, ut paulatim refudet ad pulmonem & tandem per tracheam arteriam transeundo educatur qui modus terminationis licet sit frequens, non tamen ita tutus, sicut suprascriptus, cum plerumq; natura deficiat à sputo, aut ipsius imbecillitate, aut materię inobedientia, est enim difficiliter graue ascendere quam descendere, & plerumq; materia diu transiens per pulmonem sua nitrositate ulcerando perducit ad phthisim, hanc quoq; euacuationem si natura tentauerit adiuvanda est, ut suprascriptum est in cura pleurefis per suppurationem intentione tertia.

Restat tertia uia si neutram istarum non tentaret, aut non uideatur sufficiens, scilicet aperire pectus a pertione penetrante interius ad locum saniei taliter, ut per foramen factum sanies possit educi. Super quam operationem non est præsumendum, nisi duabus conditionibus seruatis. Prima, ut uirtus sit constans potens hanc operationem tolerare. Secunda, ut alicui membro nobili sicut est pulmo aut diaphragma non sit impressum nocumentum quod non uideatur corrigibile, quod plerumq; ex longa mora solet euenire. Et propterea cum aliæ duæ uic euacuationis huius materiæ non uidentur sufficientes, non est tardandum usque ad quadraginta dies, in quo tempore solet esse nocumentum hoc adeo impressum ut deinceps sit male corrigibile. Sed quanto citius tanto melius, dummodo primo uisum sit neutrum aliorum ad hoc sufficere, nisi ubi natura per se tentaret huiusmodi materiæ expulsionem eleuando in curum & tumorem manifestum aliquam partem pectoris, tunc enim omnino adiuvanda esset, nisi iam esset ultima uirtutis defectio. His ergo conditionibus stantibus super tali operatione audendum est. Dummodo primo ab ægro aut ab amicis suis detali operatione rogati fuerimus. Nobis tamen non

promittentibus salutem, imò rei dubium euentum, sed asserentibus, quod si qua est uia solam hanc esse, quæ seruari possit. Et tunc dei nomine inuocato est perforandum aut cum sagittella forti aut rosario, ita ut foramen sit satis angustum, dummodo sanies per ipsum sufficienter possit educi, aut frigida existente materia, saltem radicaliter, & cum pauca feb. cum materio actuali aut potentiali, licet actualis sit salubrior, quam uis magis horribile. Sed in omnem euentum foramen sit tantum ut sanies & trumbi si qui sint libere possint egredi, nec fiat istud secundum incellum reolutio, fiatque foramen uirtutis secundum incellum costarum, inter quartam & quintam costam mendo sam, distanter à spina secundum longitudinem costarum, aliquantulum tamen citra costarum extremitates, ut puta per duos digitos uel circa, penetrans interius ad locum saniei. Si autem fieret hæc operatio cum cauterio potentiali, oportet post cauterizationem perforare quod uisum est cum sagittella, adeo ut sanies libere egrediatur. Et in prima uice aliquid modicum, ut puta medius cyathus permittatur exire. In secunda uice per duodecim horas post, cyathus unus in tertia similiter tantum uel parum plus. Et sic deinceps usq; ad completam euacuationem. Inquit enim Hip. 6. Aphorif. Quicumq; empyici aut hydrofici aut uruntur aut inciduntur, hi fluente aqua aut sanie repente omnino pereunt. Et adiuuetur etiam ad exitum saniei si fuerit necessarium cum tussi hora mutationis, & iacendo super latus agrum. Et quam primum sanies sufficiens exierit, claudatur uulnus, ne diu dimittatur apertum, ne fiat ab aere alteratio & doloris exhalatio. Medicinæ autem uulneri imponenda usq; ad duos dies uel circa, sunt tenæ infusæ in oleo rosaceo, satis molles ad doloris sedationem & postematis prohibitionem & circum circa cum oleo rosaceo est inungendum. Si uero escara fuerit ex cauterio derelicta in oleo rosaceo, uittello oui admixto est tenta infundenda, ut dolor mitigetur & procreetur calus escaræ.

Si autem timeretur ne sanies erumperet propriæ sui multitudinem & subtilitatem et fieret nimis eius fluxus tutius est in albumine oui, aut albumine simali cum uittello tentam infundere, & etiam stupas in his simul infusas & exterius applicare, conuenienterque ligare donec amplius hunc repetitum exitum non timuerimus. Transactis duobus uel tribus diebus ad mundificationem ueniendum est. Si ergo uideatur necessarium ad meliorem mundificationem inciat interius cum cathair aut alio instrumento, quæ aut uinum decoctionis mellis in quacitate nobili, ita ut mel sit sexta pars, & fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, & inciat debite ablutione & reuoluatur de latere ad latus in modum ablutio nis uegetis cum suauitate tamen, & postea permittatur exire quod immisum est simul cum sanie, & si fuerit necessarium reiterare reiteretur tolerare uirtute do nec quod immisum est clarum exeat. Si uero uirtus non toleret, sufficiat una immisio donec uirtus fortificet, & si opus fuerit fortiori mundificatione & a postrefactione, præseruatione, inijciatur aqua aut uinum decoct. myrrhæ & lupinorum, & procedatur modo qui suprascriptus est, exterius aut ponatur unguentum

ex melle rosaceo terebinthina & farina hordei. Et si opus erit fortius mundificare addatur myrrha & sarcocolla, & si propter escaram esset opus aliquam maturacione addatur uicellum oui aut parum farinae sennigræci & tandem incarnetur cum thure, mastice & mumia, aut cum unguento ex ipsis facto cum terebinthina aut alio huiusmodi, & hoc post sufficientem mundificationem cum iam vulnus exiccati uisum fuerit & parum saniei emittere & tunc tunc quotidie diminuantur. Vltimo cicatrizetur cum puluere factum ex nuce cupressi, balauftijs, gall. thutia, croco, ferro aut rare uisio, primo cum uino nigro balneando in quo decocta sint aliqua stiptica huiusmodi. Et postea loco exiccato alpergendo huiusmodi pulueres, quibus etiam si opus fuerit maiori exiccacione potest addi aliquid aluminis, & possent etiam in huiusmodi uino stupæ infusæ & bene expressæ desuper apponi, &c. Digna in principio usque ad duos uel tres dies licet ratione uulneris deberet esse tenuis, tamen ratione debilitatis uirtutis propter resolutionem spirituum, tum ex dolore, tum propter emanationem saniei debet aliquantulum incrassari, & ad frigidum declinare. Vnde in hoc tempore est exhibendum conuulsum pulli alteratum cum lacte seminum communium & suc. hordei in brodio consummato, & similia. Et uinum debet esse dulce, lymphatum nobiliter cum aqua fac. & exhibendum est de cibo bis ter aut pluries in die naturali secundum uirtutis constantiam & ægri consuetudinem. Transactis autem duobus uel tribus diebus, cum tunc sit tempus mundificationis, dentur cibi adiuuantes ad mundificationem sicut suc. hordei in optimo brodio, brodium cicerum, hordeum ipsum coctum in brodio laudabilium carnicum, & similia. Et carnes laudabiles, pullorum, incarnacionis & consolidacionis dentur cibi magis inuiscantes, sicut spelta, frumentum, tritum, & uinum rub. semper tamē aliquam dulcedine participans, aut fiat tale cum aqua sacchi. quæ aqua si oportuerit ad maiorem consolidacionem possit calibeari, & tunc etiam exhibentur carnes laudabiles pluris nutrimenti, & castrati iuuenis, & extremities horum animalium magis inuiscantes & tandem ad digitam sanorum paulatim perducatur. Si autem ulcus uera consolidacione consolidari non potest, imò transiit ad fistulicula præcipue quandoq; accidit propter debilitatem pariter adhibenda est cura fistulæ. Impedimentum enim consolidacionis potest ex duplici causa accidere, aut ex continua reaggregatione materiæ siue fistulæ super diaphragmate, aut per uiam paulatim congestionis iam digestiua debilitata, aut per uiam defluæ aliunde. Secundo ex malitia ulceris facti in peccatore, aut quia labia sunt inuersa, aut genita sit caro intendendum est ad confortationem membrorum spiritalium & præcipue digestiua & expulsiua ipsorum & fortem exiccacionem tam cum cibis quam cum medicinis tam interius, quam exterius applicatis quæ omnia ex his, quæ dicta sunt supra, innotescere possunt præcipue ex cura aquæ in pulmone, & ex cura pleuretis cum suppuratur intentione tertia. Si

uerò impedimentum consolidacionis proueniret ex malitia ulceris pectoris iam dicta, cauterizetur totum ulcus cum ferro ignito aut auro usque ad profundum, cauendo tamen à læsione pulmonis cauterizatione satis notabili, deinde calus escare procuretur, tandem mundificetur, incarnetur, & consolidetur, ut superius dictum fuit. Hoc semper memorando quod medicina in his ulceribus fistularibus debent esse ualde sicca, et sicciore cæteris paribus quam in alijs ulceribus communiter occurrentibus, & hæc de his dispositionibus satis dicta sint.

DE SPVTO SANGVINIS.
Cap. LXI.

Quid nominis & quid rei sputu sang. sunt satis manifesta. Est enim sputum sang. emissio sanguinis per os undecumq; proueniat, propter quod sciedum quod sanguis qui spuitur aliquando descendit à cerebro, aliquando uenit ex naribus, aliquando spuitur ex partibus oris, sicut gingiuis & lingua, aliquando spuitur ex partibus gutturis scilicet à principio meri, epiglottis, & à partibus uicinis, aliquando spuitur ex partibus meri, stomacho, & alijs membris naturalibus mediante stomacho, aliquando spuitur ex canna pulmonis, pectore & panaculis intrinsecis ipsius pectoris, omne autem illud appellatur sputum sang. si per os emittatur à quocumque membro proueniat. Sputum sang. est duplex. Est enim quoddam impetuosum in quo est egressio multi sanguinis. Quoddam est cum paucis impetu, & exitu pauci sang. Et quodlibet istorum est duplex, quoddam est creticum, quoddam non creticum, & iterum quoddam est periodicum, & quoddam sine periodicis, in quibusdam enim sang. determinato tempore congregatus postea expellitur, quod frequentius est à membris naturalibus, quæ à spiritualibus, aut animalibus, & aliquando est illis sanitas, aut præseruatio à multis ægritudinibus. Pro notitia causarum sciendum quod sanguis aliquando egreditur à uenis & arterijs, aliquando à membrorum substantia. Sed primo modo egreditur tripliciter, aut propter apertionem orificiorum uenarum, aut propter resudationem, aut propter solutionem continuitatis in uenis & arterijs siue illæ rumpantur totaliter secundum latum, siue in parte scindantur, aut secundum longum, aut secundum latum. Sang. autem egreditur propter apertionem orificiorum, aut quia orificia illa facta sunt lata in creatioe sua, aut quia ex tempore dilatata sunt propter malam complexionem humid. & cal. laxantem aut dilatantem, aut quia remota est pellicula regens ipsa orificia, aut ab humoribus acutis corroden tibus, aut à medicinis fortiter abstergentibus & orificia uenarum aperientibus, sicut aloes & medicinae exoluentes ualde acutæ, aliquando prouenit ex debilitate contentiua sequente omnem malam complexionem, licet proprie calid. & humid. aliquando fit sanguinis egressio per orificia propter multitudinem ipsius aut acuitatem, aut subtilitatem, siue subtilitas sit per choleram, siue per aquositate sanguinis permixtam, aliquando fit hoc per motum sang. cum magno impetu ad ipsa orificia propter fortes motus corporeos aut animales, aut propter phlebot. trahentem sang. impetuose ad ipsa orificia, & secundum hunc

modum phlebot. saphenarum prouocat sanguinem menstruaem. Causa uero refudationis sang. à uenis est aut subtilitas sang. unde cuncte proueniat aut raritas texturæ uenarum, huiusmodi autem causa est frequenter ebullitio & in sanguine agitatio. Causa uero solutionis continuitatis uenarum coniuncta, est aut multitudo sanguinis extendens, aut acuitas sanguinis, aut humor corrodens uenas, aut uentositates retentæ in eis scindens eas, remotior autem est caliditas humores ebullire faciens, & retentio euacuationum confuetarum, sicut sanguis per nares menstrualis & hæmorrhoidalis, aut uaricum laqueatio, aut ulcerum antiquorum consolidatio, aut alicuius membri abscissio quapropter superfluit nutrimentum illius membri. Causæ autem primitiue sunt calus, percussio, morsus uenenosorum. Aer nimis æstuosus aut nimis frigidus aut nimis ficcus uenam exiccans, et indurans, propter quod paratur eruptioni, quod etiam potest à causis intrinsecis contingere. Cibi multiplicantes sang. aut acuentes ipsum. Medicinæ acutæ, corrosiue, aut à proprietate aperientes orificia sicut euphorbium, gummi, ruta agrestis, & aloes, somnus multus, retinens superfluitates et propriè super redura, aut superflua uigiliæ, sang. subtiliantes & acuentes, nima repletio & retentio euacuationum consuetarum & motus fortes corporis & animales, sicut ira, timor, tussis frequens et fortis, uociferatio, acuitas uocis, sine gradatione & rixa. Et propter hoc multiplicatur in dæmoniis, & in illis qui rixantur ab omni re, & procedit ex uomitu laborioso, sternutatione, expressione fortis, retentione anhelitus, & omnibus huiusmodi motibus fortibus, & propriè factis sine gradatione. Soluuntur etiam uenæ & membrorum substantiæ propter corrosiones & putrefactiones & maxime pulmonis ex humoribus acutis in ipso congestis, aut ad ipsum aliunde deriuatis, & maxime à cerebro, est enim pulmo propter mollitiem suæ substantiæ & ipsius humoris acuti pronus in corrosiones & putrefactiones ad quas fluxus sang. sequitur.

Est autem sciendum quod cum uenæ sunt sang. præter modum repletæ, natura tentat ipsius euacuationem per regiones conuenientes, scilicet, per uenas narium, hæmorrhoidales, aut menstruales, per spiritum, & solutionem sang. quæ cum non potest per illa loca expellere, tentat uenæ scissuram, ne sang. retentus repens ad membra nobilia per uenas magnas, scilicet cerebrum, cor, & huiusmodi subito suffocando interimat. Sang. autem à membrorum substantia egreditur, aut propter apost. aut pustulas membrorum à quibus sang. refudat sicut in pleuresi & peripneumonia quæ apost. aliquando sunt salua quādo sunt sang. & quando refudat materia nō imbibita nec in crassata, aut propter corrosiones & putrefactiones aut propter sanguisugam alicui membro appesam, aut propter eradicationem humoris cum membri superficie inuiscati quomodo posset etia uena excoriari & scindij. Signa sputi sang. à cerebro est nocumentum cerebri præcedens, & quod sang. egreditur cum extratione ad inferiora, aliquando tamen decidit in os absq; alio auxilio per uiam colatorij & aperiendo os egreditur, & si sanguis fuerit arterialis egreditur cum maiori impetu & est subtilior rubeus cum claritate, & spumolus & eius retentio est difficilis, & contraria

signa sunt sang. uenalis. Signa uero quod sang. ille sit ex naribus, est frequens fluxus sang. narium & illius attractio ad partes oris cum rascatione, & si inspirantur nares sunt sanguinolentæ, item in sufflatione narium sang. educitur. Si uero sit à palato egreditur cum rascatione sensata in palato, & si à colatorio egreditur cum rascatione sensata in acumine palati, & si est à lingua uel gingiuis solum expuitur, & aliquando in suctione ipsarum, nō documenta quocq; horum membrorum, quæ sensui subiacent hoc declarant. Si uero egreditur à partibus gutturis, rascatione educitur in gutture sensata, & nocumenta harum partium hæc declarant.

Quod si fuerit in cæna pulmonis & epiglottis egreditur cum pauca tussi, & forti rascatione, & dolor existit in canna, est enim sensibilis per panniculum regentem ipsam, & ille qui est ex uenis cannae est minus potius & magis spissus q̄ qui est ex pulmone, & est melior sang. quamuis nō sit in crassitie eius qui est ex pectore, & cum hoc ex omnibus his locis sanguis est paruæ quantitatæ præterquam ex cerebro & nariibus.

Signa prognostica sputi sanguinis à pectore aut pulmone sunt dispositiones corporum ad ipsum, sicut nuditas pectoris à carne cum striatura humerū eleuari & spatulæ exterius eminentes, sicut curuaturæ alarum, collum subtile & longum, depressum inter uelulas & humeros, & frequentat eos tussicula cum punctura, nunc apud dexteram, nunc apud sinistram spatulam.

Quod si fuerit à pulmone & pectore egreditur cum multa tussi. Nam quanto sang. uenit magis à propina quo, expuitur cum tussi minori, et à longinquo cum maiori, & quando dormit super loco in quo est agnitudo, additur excreatio eius quod expuitur.

Distinguitur autem sanguis proueniens à uenis pectoris à sanguine proueniēte à uenis pulmonis, quia à uenis pectoris proueniens est minoris quantitatæ, magis crassus, imò aliquando coagulatus, sicut sanguis, cuius coagulatio potest fieri in concuitate pectoris, & deinde sic coagulatus ingreditur in pulmonem expuitur & potest fieri cum coagulatione in pulmone. Sanguis autem pulmonis non coagulatur propter multam cholerae admixtionem. Item uenit à pectore cum maiori tussi expuitur propter distantiam ingrediendi pulmonem, & maiorem distantiam & propter crassitiem. Item adest dolor pectoris & est parum spumolus, signa his contraria, ostendit ex pulmone prouenire. Distinguitur autem proueniens à substantia pectoris, à proueniēte à substantia pulmonis, sicut accidit in à postematibus & ulceribus ipsorum per signa apostematum ipsorum, de quibus supra, & per signa ulcerum ipsorum, de quibus infra in cap. de phthisi. Et ueniens à pectore est cum dolore, magis niger, minus spumolus, cum maiori tussi sicut nunc dictum est. Distinguitur autem ueniens ab utriusq; uenis à sanguine ueniente ab eorum substantia, per multitudinem cum est à uenis, per paucitatem cum est ab ipsorum substantia, & est abscissus, id est non continuus, imò manifestè separatus, licet unum sputum ab altero in uase in quo colligitur proueniens autem à uenis est continuus. Distinguitur autem proueniens ab apertione meatus qui continuant arterias pulmonis cum trachea arteria, qui natural

naturali dispositione sunt perui, aerei, & inuij sang. à sanguine proueniente ex factura uenarum pulmonis quia ille est paucus, hic uero multus, & cum leuibus remedijs ille facile curatur, hic uero difficiliter, proueniens autem à meri ex creatur cum uomitu, & cognoscitur per nocumentum sensatū in ipso meri & est paucus. Sed proueniens à stomacho, cognoscitur ex dolore stomachi, & quia egreditur cum uomitu. Sed egrediens ab epate, & membris, quæ sunt ultra epatititibus sanguinem stomacho cognoscitur per nocumenta eorum, et sanguis proueniens à splene est magis niger, & habet odorem ponticum.

Nota tamen ne contingat error, quando q; sanguinem à pectore uel pulmone manantem ad stomachū descendere & uomitu educi, sicut contra aliquid de sanguine à stomacho exiens ad pulmonem descendit & tussi educitur. Et discernitur inter hoc, quia si est à pulmone uel pectore in principio, et secundum pluralitatem uicem expellitur à tussi, & raro uomitu, & ita si à stomacho in principio, & secundum pluralitatem uicem expellitur à uomitu & raro tussi. Creticus cognoscitur, quia est terminus alicuius ægitudinis. Periodicus cognoscitur ex ordine sui periodi, & secundum plurimum prouenit à stomacho & est pereum aliquando salus & præseruatio à multis ægitudinibus. Cognoscitur autem prouenire ex apertione orificiorum uenarum, quia in principio est paucus & augendo procedit, & est sine dolore. Econtra uero proueniens ex ruptura uenarum in principio est multus, deinde paucus et cum aliquo dolore.

Differat autem proueniens per refudationem ab utroque istorum, quia ille est ualde modicus & subtilis in comparatione ad utrumque istorum, sed dilatatur propter facilem fluxum sanguinis à quacunque causa. Signa causarum primitiuarum sunt ipsæ materis corrosiones, & ulceribus, ex ipsarum præteritione, & cum sputum sanguinis succedit sputo faroris signa sumuntur ex antecessione causarum ne alicuius corrosiui, & erit aliquando febris propter malitiam materis corrodentis. Item forte præcessit sputum saniei uel alicuius crustæ, uel partis pulmonis, & aliquando apparet sputum simile aquæ caritæ, & aquositate. Item incipit sputum sanguinis paulatim, maxime corrosione existente in carne pulmonis & non in uena. Et quando q; deinde fluit subito & ex puitur res magnæ quantitatis. Et color eius est malus maxime quando corrosio profundatur, quia corrosio materis corrodentis, unde color apparet liuidus, niger uel uiridis, & plus manifestatur illa malitia coloris in primo sang. existente, quam in postero, & scitur quod non est ab apertione orificiorum nec ab fisione uenæ, quia in illis non est color malus. Et si sanguis est arterialis, est feruens, calidissimus, spumosi impetu, & est subtilior, rubeus cum claritate, cuius recentio est difficilis. Oppositæ conditiones sunt in

sanguine uenali. Sanguisuga autem cognoscitur ex punctione pluries sensata, & quia bibit aquam in qua habitant. Significatur autem sanguinem fluere per eradicationem alicuius pelliculæ superficialis, quia aliquid uiscosum habet pelliculam annexam sanguinolentam emittitur. Signa autem corporum præparatorum ad sputum sang. dicuntur in phthisi. Sed pro complemento doctrinæ sunt aliqua notanda. Primum quod in sputo sang. quatuor timentur. Primum ne nimis superfluat. Secundum, ne sui multitudine subit suffocet. Tertiū, ne in aliqua parte coaguletur. Quartum, ne sequatur ulcus propter ipsius sang. contractionem & putrefactionem, aut quia uulnus non consolidatum fiat ulcus. Secundum notandum est q; fluxus sang. ex pulmone est ualde malus, & deterior q; fluxus sang. ex pectore pluribus ex causis. Prima, quia motus pulmonis impedit consolidationem, & auget fluxum sang. sed hæc causa est etiam communis pectori. Secunda, quia sanies in membro spongioso diutius retinetur, & difficiliter extrahitur, unde magis acuitur, & acuta magis ulcerat. Tertia, quia solutio continui in pulmone impedit anhelitum magis, q; in pectore, unde augetur caliditas & corpus deficiatur. Quarta, quia caro pulmonis est multæ passibilitatis, unde cito fit ulcus pronū ad dilatationem. Quinta, quia pulmo nutritur sanguine subtili, acuto impediens consolidationem. Sexta, quia pulmo est magis subiectus catarrhis prohibentibus consolidatio nem & augmentib. putrefactionem. Tertiū notandū quod sang. exiens ex naribus frequenter in somno, & alio modo descendit ad pulmonē, qui deinde cum tussi expuitur, & facit suspicionem quod ueniat ex pulmone, quare consideranda, an præcessit fluxus sang. nar. & signa ipsius superius dicta in fluxu sang. nar. scilicet rubedo faciei, & oculi, & splendor coram oculis, capitis alleuiatio post grauitatem, & ut nō spuma sit, & inspicere nares an sint sanguinolentæ, & an ex sufflando sang. exeat, de his tamen statim dictū fuit, &c.

Prognostica. Primum. Omne sputum sanguinis in notabili quantitate cum febre est suspectum, cum febris significet putredinem & corruptionem, maiorem tamen inducit suspicionem sputum sanguinis arterialis quam uenalis, imò etiam sine febre suspectum est. Secundum. Omne sputum sanguinis cum tussi ex pectore aut pulmone, cū feb. & sine feb. malum, sed deterius est proueniens ex pulmone, & maxime ex ipsa substantia pulmonis secundum plurimum ducens ad phthisim: quod enim est ex pectore sanatur uelociter, & si non sanatur habet malitiam ulcerum pulmonis, et multotiens fit ulcus fistulosum rediens frequenter cum sputo sanguinis. Tertium. Omne sputum sanguinis sequens corrosione pulmonis est mortale. Quartum. Sputum sanguinis cum uomitu etiam in notabili quantitate sine febre, aut cum modica febre curat multas ægitudines, aut ab eis præseruat, sed cum febre intensa & perseuerante est suspectum. Quintum, reliqua sputa sanguinis & maxime sine febre sunt salubria.

Cum sanguis cum rascatione, aut paruo sonitu qui fit sine tussi egredi-

tur, non est ægro inde timendum. Porterit enim sanari gargarizando ea quæ in cap. de synanche nominauimus, & regimen subtiliando.

Capit. hoc diuiditur in tres partes. In prima agit de sputo sanguinis cum rascatione proueniente ab uulua, palato & partibus gutturis. In secunda ibi. Cum uomitu quoque agit de sputo sang. cum uomitu emanante à stomacho & membris naturalibus. In tertia ibi. Quod si cum tussi agit de sputo sang. emanante à pectore, pulmone, & canna pulmonis. De primo dicit cum sanguis egreditur cum rascatione aut paruo sonitu, qui sit sine tussi non est ægro timendum: sanabitur enim gargarizando, scilicet stiptica, quæ dicta sunt in cap. de synanche. Et etiam dietam subtiliando, quæ etiam sit uiscosa & stiptica.

Cum uomitu quoque si exit sanguis non magnum affert timorem. Curatur nanque hoc phlebotomando ægrum. Et si comederit stiptica sicut sumach & suc. uux acerbæ. In potu præterea sumat ex bolo arm. gummi arab. balaust. sang. drac. thuris omnium ana partes æquales: dentur ex eo drachmas 3. cum rob simplici de citon. Quibusdam autem solet accidere sanguinis exitus cum interpolatione ex quo nullum sentiunt nocumentum, imò remedium, ideoque sic est dimittendus.

In hac secunda parte curans sputum sang. cum uomitu emanare, dicit quinq. Primò quod hoc sputum non magnum timorem affert, quod est intelligendum, si fuerit sine febre. Secundo curetur phlebotomando ægrum, scilicet ex basilica aut ex saphenis, si in causa fuerit retentio menstruum aut hæmor. Tertiò si comederit stiptica, scilicet succum fructuum siccorum, & stipticorum, & succum uux acerbæ similis complexionis, & sumet etiam cibaria quæ ex eis fiunt, aut cum his coniunguntur. Quarto sumendo in potu 3. huius pulueris cum rob simplici de citon. id est, succus citon. per decoctionem inspissato. 8. boli armen. sang. draconis, gummi arab. omnium frigidorum, & stipticorum, & uiscos. thur. cal. & sic. uiscos. ana partes æquales, stomacho ieiuno. Quintò dicit, quod quibusdam solet accidere hoc sputum cum interpolatione ex quo nullum sequitur nocumentum, imò remedium ad curandum, scilicet, uel præseruandum, quapropter sic est dimittendum.

Quod si cum tussi superueniat sanguinis egressio, est timorofum. Et tamen incipendum in curatione ægri cum sanguinis subtractione ex basilica. Deinde ex trochiscis istis in potu est tribuendum, qui. Rec. thur.

sang. drac. amborum, drach. 3. & tertiam, charabe, drach. 5. hæmatitis, terræ sigillatæ amborum, ana drach. 10. aluminis, drach. 2. et s. balaust. drach. 3. opij, drach. 2. raudesceni, drach. 2. ex his omnib. fiant trochisci 10. de quibus quotidie unus in potu sumatur cum succo oximi maioris aut portulacæ. Et si ægritudo uehemens fuerit alius circa noctem dandus est. A diutorium quoque coxarum partes superiores sunt ligandæ. Et extremitates fricandæ. Pectus etiam præcipue si fuerit in eo locus dolens ex prædictis trochiscis, ex aqua & aceto epithimetur. Eius præterea cibaria suc. uux acerbæ, & sumach, & eius similia auxilia admixta habeant. Et patiens supinus iacens de terra sigillata aliquid post aliquid paulatim comedat.

In hac tertia parte curat sputum sang. cum tussi, & dicit 7. Primum, quod hoc sputum est timorofum, ut patet ex dictis. Secundum, quod phlebotomanda est basilica ad minorandum sang. & ad diuertendum. Tertium quod unum ex his trochiscis dandus est in die, scilicet in mane stomacho ieiuno, et si ægritudo fuerit uehemens id est, quod sanguis impetuose egrediatur, alius est dandus circa noctem, id est, per duas aut tres horas ante coenam cibo prædigesto, distemperatus cum suc. oximi maioris, id est, basiliconis communis uel citrarij, non autem gariophylati: habent enim ambo folia lata, & quousque sint calidi, & sic. & potius per qualitates occisas dilatantia, stringunt tamen cum proprietate occulta, aut dentur cum suc. portul. frig. & hum. uiscos. so, & optimo in hac dispositione, præcipue si sit cum caliditate & sanguis acuitur, et similiter est suc. plantag. quantitas aut succi sit 3. 1. usque ad 2. & dentur acuti frig. Trochisci autem sunt isti. 8. thur. sang. drach. ana 3. 3. & tertiam karabæ frig. & sic. stipticæ & uiscosæ, 5. hæmatitis, terræ sigillatæ frig. & sic. stipticæ & sic. uel sacch. cal. & sic. stipt. 3. 2. & s. balaust. frig. 3. 3. opij, 3. 2. raudesceni, loco cuius accipiat rheuma barbarum, 3. 2. & est cal. & sic. stipticæ & eparis, ex omni tatem in confortatione stomachi & eparis, ex omni bus his fiant trochisci 10. cum aliquo ex dictis succis sufficit medietas unius ex his trochiscis: est enim quilibet 4. 3. habens 12. gran. opij, & unus non dabitur, id quod timore in una uice. Quartum, quod ad spatulas superiores partium brachiorum à cubitis usque ad spatulas superiores partes sunt ligandæ, & similiter partes sunt mu res coxarum fortiter stringendo, quæ ligature sunt fricandæ, tandæ descendendo, & extremitates sunt noceræ, non autem alia partes, quia supercalefaciendo noceræ. Quintum, quod locus pectoris dolens ex trochiscis prædictis

dictis cum aceto & aqua ros. mixtis epithimeretur. Sec-
xum, q. cibaria sint suc. uuae acerbae, & sumachi ad-
mixta habeant: sit tamen istorum acedo cum sacchi.
dulcorata ne tulsim exirent. Vltimum, q. patiens su-
pinus iacens aliquid post aliquid de terra sigill. come-
dat, scilicet lambendo, ut aliquid eius ad pulmonem
transfert: est enim propria frig. & sic. stiptica, uiscosa.

Cura sputi sang. à cerebro emanantis, & similiter
deriuati à naribus ad os, patet ex cura fluxus sang. na-
rium, de quo supra. Et similiter cura sputi sang. à par-
tibus oris, & à partibus gutturis, patet ex praedictis in
cap. de uulneribus, & ulceribus, oris & partium eius, &
similiter ex cap. de ulceribus uuluae, et etiam partium
adiacentium. Et conferunt eis retentiones in ore, & gar-
garizationes rerum stipticantium & inuiscantium, sicut
cur aqua albuminis ouis sola, aut in qua infusus sit bo-
armen. sang. drac. trachaganus, & similia, quae in te-
xto dicta sunt, item succus plantag. & portul. cum si-
milibus permixti, & sint actu notabiliter frig. uel si lo-
cus emanationis subiaceat sensui, ponatur super uena
soluta aliquid pulueris supra scripti, & aliquantulum
retineatur bene compressum, quae si non suffecerint
phlebotometur de cephal. uice post uice phleboto-
mia subtili diuertente, & paulatim subtiliorem partem
eius euacuante, quae est pronior fluxui. Et si cetera
non conuulerint & sensui subiaceat cauterizetur cau-
terio actuali, aut potenciali profundè factis, ut e scarà
non facile remoueatur & fiant reliqua remedia in li-
milibus casibus opportuna. Si uero sputum sangu. sit
enim sit criticum, aut propter maliciam eius in quanto
uel in quali expellatur, finendus est, nisi modum exce-
deret. Curat enim & praeseruat à multis aegritudinibus.
Si uero nihil tale sit aut forte superfluit uirtutem
desiciens, sistendus est. Pro cuius cōfiratione exigunt
tres intentiones praeter duas omnibus communes. Pri-
ma est refectio membri à quo est origo emanatio-
nis eius remouendo nocuentum illius membri, &
ipsum confortando, ut sit minora humorum laudabi-
lium. Secunda est, ut fiat diuersio cum subtractione
sang. ex uena deseruiente illi membro & cum applica-
tione uentosarum super ipsum, & si est à toto corpo-
re propter exuberantiam sang. in ipso fiat phleboto-
mia cum iteratione ex basilica aut communi, nunc
tio mensuorum aut haemor. fuerint in causa, & si so-
diocris facienda est: si autem sit acuitas aut inflatio in
sang. cum subtilitate & ebullitione subtili phleboto-
nia utendum est. Et similiter si esset subtilis propter
stipticam aquosam sibi admixtam, minor tamen
solidantium & conglutinantium sicut expedit, nunc ue-
ro quae compingant sang. & incrassent ex his quae di-
centur. Huius tamen cura licet possit esse nota ex his
quae dicta sunt in praesenti cap. manifestior tamen fiet
Cura autem sputi sang. ex pectore aut canna pulmo-
nis apud Meluse, cuius doctrinam sequar, exigat dur-
plex regimen, uniuersale & particulare. Vniuersale
autem quatuor cōplebitur intentionibus. Prima est ad
quatio sang. complenda maxime debito regimine
sex rerum. Secunda est eius diuersio. Tertia ipsius

mundificatio. Quarta accidentium correctio. Prima
autem intentio corrigit nocuenta sang. in quantita-
te, aut qualitate eius, aut utriusque. In quantitate quidē
cum diminutione cibi & potus, & dimissione uini, &
si nō potest dimitti, sit stipticum pauciferum multae
permixtionis cum aqua, & propriè ferrata extinctio-
nis calibis, aut in aqua infusum fuerit tragachantum,
aut aqua ros. & propriè decoct. rosarum sic. Et si po-
test abstinere à uino bibat huiusmodi aquas cum rob-
myrtino, aut bibat aquam decoct. iulubarum, & uiter
dulcia, & omnia quae dilatant & multiplicat sang.
sicut frumentum & trit. Et cōsimiliter omnia, quae
sunt ex farina frumenti, sicut alaganae, & similia, &
propriè quando est peccatum in quantitate sang. nam
huiusmodi, quando esset peccatum in subtilitate eius
conferunt incrassando & inuisando. Et panis eius sit
ex farina milij & filiginis, aut ex his cum pauca farina
frumenti parum fermentatus non salitus. Et sint cor-
renti forbitionibus factis ex rizo, milio, lentibus pri-
ma aqua abiecta, scilicet decoct. earum & horum kist
est conueniens. Similiter kist fabarum aut forbitio ex
farina earum. Item kist hordei & propriè torrefacti.
Ex olerib. conuenit portulaca, lactuc. cucurb. citrulli
& plantago. Ex carnib. perdices & aues minute extre-
mitates uiscosae, uiruli castrati, & similia, & turtures
& similes stipticitate quadam participantes comedat
tamen in parua quantitate cum sang. superabunder,
item caro cuniculi, capreoli. Et ex piscibus pisces pe-
trosos, qui tamen non sint frigi, sed assati aut elixi, i-
tem cancri fluuiales cocti in lacte, aut aqua hordei, &
propriè torrefacti. Fructus conuenientes sunt stiptici
sicut pira, citonia, forbae, mespila, uident tamen om-
nes fructus, & cetera nimis acra, aut acetosa, dulcia,
amara, salsa, unctiosa & acuta, sed insipida, pontica,
stiptica conueniunt. Et si peccatum in sanguine sit
propter acuitatem & subtilitatem eius corrigatur cum
extinguentibus inflammationem, & incrassantibus
ipsum, sicut cibi & potus stiptici extinctui inflama-
tionum, sicut cibi ex lentibus aut cucurbita aut citru-
& portul. & plantago sunt mirabiles: sedant enim in-
flammationem & stringunt sang. Et concedantur eis
cibi paucae acetositates, sicut qui sunt ex prunis, cera-
sis acribus, granatis, carnibus paruorum auium, &
extremities animalium uiscosae, propriè cum remi-
sse acribus conditae. Et confert maximū iuamen-
tum administratio aqua ros. aut plantag. aut portu-
lae permixtae cum coriandro albo, aut sem. portul.
papaueris in matutinis: haec enim incrassant & comp-
pingunt sang. & laudantur iulubae, & aqua decoct.
earum, fructus stiptici & sic. & simile sit reliquum re-
gimen sex rerum non naturalium. Aer aut declinet
parum ad frig. & sic. si fuerit peccatum in multitudine
sang. Si uero in acuitate, declinet ad frig. & hum.
& si fuerit multum aquosus, declinet ad sic. cum tem-
peramento actiuarum. Vitetur aer fumosus & uen-
tosus, & nimis humidus. Vitetur omnes morus fortes
corporeos & animales, & nimium somnum cum est
multitudo sangu. in causa & propriè sub radijs solis,
aut lunae & nimiam quietem, contra autem somnus
& quies confert cum est peccatum in acuitate sang.
Item uitet coitum & balneum aquae dulcis. Et procu-
rer omnes euacuationes à natura institutas & etiam
non naturales, si fuerit ex longo tempore consueta, &

tente, quam recipiente, quæ potest patere ex suprafcri-
ptis, &c. Tertiū contra sputum sanguinis fluentis ex
ruptura uenæ, & indiget admistratione stipticorum
consolidantium, sicut sang. draconis, karabis, boli
armen. lutum figil. balauftiæ, rosæ, cornu cerui adu-
stū, corallus adustus, cortices & flores granatorum
hæmatites, gummi asium, mumia, rheum barbarum
& propriè asium cortices thuris, cortices mastichis,
coagulum leporis, coriandrum, semen lingule arietis
capita & uirgulta rosarum, & fructus, folia myri,
spodium. Ea autem in quibus hæc sunt administran-
da, sunt succus plantaginis, succus portulacæ, suc. basi-
liconis maioris, & aqua ferrata infusionis gummi alsi,
aqua rosæ, succus citoniorum succus granorum myr-
ti. Medicinæ autem compositiæ sunt sacc. ros. est enim
medicamen benedictum, myrrha, syrampus de ros. sic-
cis, syrampus de iuiubis, syrampus myrtinus, trochisci
detera sigillata, trochisci de karabæ, philoniū perfi-
cum. Administrala autem exterius, sunt oleum ros.
masticinum, myrtinum, oleum de cytonijs, & simi-
lia, quæ possunt permisceri cum pulueribus suprafcri-
ptis, & cum farina fauich, lentium, fabarū, & similiū
cum succis suprafcriptis, & album. oui, & ex proprijs
est thus subtilissimè puluerizatum mixtum cum al-
bumine oui, & hæc administrentur super loco dolo-
rosi: in illo enim uerisimiliter est ruptura uenæ.

Quartum, contra sputum sanguinis ex corrosione &
ulcere præcedente, & hoc est illud, quod est maximè
suspectum & timorofum, sed huius curam ponemus
in cap. sequenti de phthisi, si deus uoluerit.

DE PHTHISI.

Cap. LXXII.

Phthisis græcè; sputum latinè. Sed phthisis
græcè, consumptio latinè. Hæc dispositio
quocunque nomine uocetur est descriptiue se-
cundum Mæue detrimentum desiccationis & con-
tundinalium minutarum ex ulceratione pulmonis.
In qua descriptione uidemus ad phthisim esse necessa-
riam corporis consumptionem immediatè sequen-
tem febres habituales, id est, hæcticas, quæ proue-
niant ex ulcere pulmonis. Dicitur autem minuta-
re, quia feb. hæcticæ non sunt ardentes, sicut putri-
bum sumunt, non sentiunt se febrile, nisi cum ci-
calor excreuit. Est enim proprium hæcticorum, ut su-
percalefiant post cibum. Cum quo tamen conceden-
dum est nullam hæcticam esse remissiore ephimera
aut putrida, quam immediatè sequitur, quia primū
esse feb. hæcticæ, est primum non esse sentis.

Ex hac descriptione patet differentia inter phthi-
sim hæcticam, marasum & tabem. Hæctica est enim
febris habitata & facta, cum sit independens à causa
corporea speciali dependentia, cuius calefactum esse,
est in substantia cordis, & non includere in quiditate
eius quod sequatur ulcus pulmonis, quapropter om-
nis phthisis est hæctica, & non e contrario.

Differet autem ab hæctica etiam improprie sumpta
quia dicitur de hæctica senectutis, & de hæctica mem-
bri particularis: sicut de hæctica stomachi & epatis, &
huiusmodi, quia hæc hæctica dicitur fixitatem fixam,
absque caliditate, aut totius, aut membrorum parti-

cularium, quapropter nullus phthisicus est hæcticus
hoc modo.

Marasmus autè & tabes dicunt corporis multam
consumptionem, siue sit feb. siue non sit, & dicuntur
etiam de consumptione membri particularis, sicut a-
liquando dicimus crus tabidum & brachium maras-
maticum, licet secundum alios marasmus differt à ta-
be, ex eo quod importat corporis consumptionem
sequentem febrem acutam. Sed tabes absolute corpo-
ris consumptionem, undecunque proveniat. Sed li-
tem de nominibus omittamus, nam quandoq; hæc ter-
mini apud authores accipiuntur ut synonymi.

Pro notitia specierum phthisis est sciendum quod
ulcera membrorum spiritalium. Aliquando sunt
in pleura & musculis intrinsecis pectoris, & ossibus
eiusdem cum eorum corruptione. Aliquando in dia-
phragmate. Aliquando in mediastino. Aliquando
in canna pulmonis. Quandoq; in pulmone ipso.
Deteriora cæteris partibus sunt quæ sunt in pulmo-
ne, deinde in diaphragmate, deinde in mediastino, de-
inde in pleura & partibus ipsi cõtinuis: ita quod qui-
dam arbitrati sunt nunquam ulcera pulmonis posse
consolidari, eo quod est in continuo motu, quibus
Galenus 6. de ingenio sanitar, contradicit motum
non impedire consolidationem, cum ulcera pectoris
& diaphragmatis, quæ sunt in continuo motu pos-
sint consolidari, sed materiam limitando dicit, quod
ulcera munda siue pura superficialia in pulmone con-
solidantur. Putrida uero corrosiua apostemola ual-
de sordida aut uirulenta, & huiusmodi non possunt
consolidari, cui sententiæ Mæues consentit. Ulce-
ra uero pectoris et immunda siue impura consolida-
tur multis ex causis. Primò, quia pectus est carno-
sum. Secundò, quia est cum paruo motu. Tertiò,
non habet substantiam mollem, pronam in corrosio-
nem et putredinem. Quartò, non habet carnem spon-
giosam in qua sanies retineatur, imò quod ab ulcere
pectoris refudat, aut per aliam uiam expellatur, super
diaphragmate colligitur, si non exspuatur, postea
paulatim expellitur secundum plurimum. Quintò,
non est multum subiectum catarrhis. Sextò, non nu-
trit sanguine calidissimo multæ cholæræ admixto
impediente consolidationem. Septimò, non habet
uenas magnas & amplas, sicut pulmò. Octauo, non
ita cordi deferuit, sicut pulmò. Oppositæ conditio-
nes reperiuntur in pulmone. Item medicinarum
quæ applicantur exterius uirtutes uix possunt attingere
ad pulmonem, quæ autem sumuntur interius si
deglutiantur multum transmutatæ sunt, & earum
uirtus est diminuta quado ad pulmonem uenerit.

Si autem teneatur in ore, uel lambendo sumantur,
parum de ipsis ad pulmonem penetrat. Præterea
aut sunt calid. & febrem augment, aut frigid. et sputum
impediunt, & cum hoc sunt tarde non penetrantes,
aut sic. & similiter sputum impediunt, & nocent hæ-
cticæ, aut humidæ, & nocent ulceri. Præterea si ul-
cus sit corrosiuum, requiritur tempus antequam hu-
mor corrodens sit correctus, & interim ulcus dilata-
tur & ampliatur. Præterea si ulcera pulmonis debent
curari, indigent mundificatione, quæ maximè tussi
perficitur, sed tussim commouedo ampliatur ulcus.
Item addit in dolorem si ulcus ad panniculum perue-
nerit, & dolor impedit consolidationem, humores

attrahendo, quare raro ulcera pulmonis consolidantur nisi fuerint munda, & superficialia, & non multum antiquata: quæ tamen exigunt medicum prudentem & diligentem. Si uero profundetur notabiliter in substantia pulmonis difficillimè curantur, & si peruenierint ad cartilagineas non recipient curationem: homines tamen magis susceptibles curæ phthisis sunt infantes. Crustosa tamen ulcera non impetiginosa, aut pendentia ab humore adusto, quia hæc difficillimè rectificantur, sed crustosa, quia superficialia & pauca sanies quibus facillimè aduenit crusta siue cutis non uera, facillè rectificantur, & si non perfectè liberentur, longissimo tempore durant antequam ægrum ad interitum ducant, ita ut aliquando secundum Auic. prolongetur tempus in phthisi circiter 23. annos. Ulcera uero diaphragmatis in parte carnosâ rectificantur, nisi utrinque penetrent, sed in parte nervosa si sint aliquantulum profunda, raro uel nunquam curam recipiunt. Ulcera uero mediastini facillius rectificantur, quam ulcera diaphragmatis, & adhuc facillius ulcera pleuræ & musculorum inter costas, & costarum etiam si sint extrinseca, ut perueniatur ad costam corruptam. Et ex his manifeste sunt differentia ulcerum pulmonis. Ulcera uero existentia in canna pulmonis si sint in panniculo tegente cannam & cartilagineas ipsius, facillè curantur. Si uero profundentur in substantiam cartilagineam non recipiunt curam. Causæ ulcerum pulmonis quandoque sumuntur ex dispositione patientis, quandoque ex fortitudine causæ imprimantis. Primo modo, aut ex parte complexionis, Et sic complexio frigida est paratior in phthisim secundum Auic. quam calida, quod uerificantur in hoc tantum, quod habent pectus strictius & abundant magis in superfluitatibus. Oppilatio tamen calida ratione acuitatis superfluitatum imprimantium in pulmone est magis parata ad phthisim. Etcerte uidit plures phthisicos, habentes complexionem calidam quam frigidam. Complexio autem frigida & humida sunt ferè æqualiter parata ad phthisim. Sicca quidem magis ratione fracturæ uenarum. Humida uero, quia abundans in pluribus superfluis, & quia pulmo est mollior. Ex parte sexus foeminae & masculi sunt ferè æqualiter parati, licet apud Mesue, in mulieribus magis occultetur, quam in uiris. Ex parte ætatis maximè parati sunt à 18. anno usque ad trigésimum secundum Auic. licet secundum Hippoc. usque ad trigésimum quintum, id est, ad finem consistentis, quod prouenit, quia in hac ætate est pulmo satis mollior, facillè susceptius impressionis, & humores acuti multum imprimantes.

In pueritia uero licet pulmo sit mollior, humores tamen sunt pauca acuitatis propter multam humiditatem obtundentem caliditatem. Item secundò, quia uirtutes naturales puerorum sunt fortissimè optime digerentes, & sua expellentes superflua. In senio uero pulmo est durior & humores pauca acuitatis diminuta caliditate ex decursu ætatis. Credo tamen quod rarius accidat pueris, quam senibus, & si accidat pueris facillius curantur quam senes, licet in senibus non curata magis occultetur, quam in pueris. Sed merito compositionis, prout in phthisim sunt, habentes collum gracile, & longum tendentes

ad interiora cum eminentia. Et habentes humeros alatos, sicut sunt curuaturæ alarum, & spatulas quasi à pectore separatas. Isti enim uidentur quasi alati, id est habentes alas, & de necessitate habent pectus contractum. Si autem cum hoc sunt macilenti, & habentes carnem mollem cum acuitate humorum, & catarrhizans, ut sit debile, facillè recipiens superfluitates & nutrimentum proprium, non bene transmutans cum multiplicatione uento sitis in pectoribus eorum, & pulmonibus, & partibus uicinis, quæ multiplicatur propter debilitatem pectorum, & eorum sequentem malam compositionem. Et frequenter uexat eos tussicula cum punctura aluius spatularum aut manillarum, & præcipue si sint ex irascitibus facillè, cholericis sunt maximè inter omnes parati ad phthisim, & propriè quia cum acuitate humorum habeant carnem mollem. Corpora enim mollia sunt parata ad phthisim, quia facillè ulcerantur, substantia pulmonis, sed dura & spissa propter illud, quod accidit eisdem de eruptione uenarum. Ratione ergo causæ imprimantis multæ sunt causæ primitiue, sicut aer. Autumnus enim maximè facit cadere in phthisim, & uehementius nocet sacris phthisicis. Item constitutio borealis multum dominans & maximè quando præcesit austrius, & similiter contra, licet secundum Mesue regio borealis multum frigida & sicca. Item cibi & potus falsi & acuti & calida replentes. Item retentio omnium euacuationum confuetarum. Item motus fortes corporales & animales, quia uenas rumpunt. Item percussio penetrans ad pulmonem, calis & offensio, & similes. Et ex corporeis antecedentibus sunt humiditates acutæ repentes ad pulmonem, sicut sanies ab ulcere syphilitico, aut ab ulcere pleuritico, aut empyema.

Si enim non mundificatur in quadraginta diebus secundum doctrinam Hippocratis ducunt ad phthisim, licet in duobus uiderim ulcus pleuriticum non mundificatum in quatuor annis, quod tamen non duxit ad phthisim. Sed causæ continuæ per essentiam in pulmone sunt bothor & uariolæ, quæ ulcerantur. Item peripneumonia, quando transit in ulcerum, frequenter autem inter omnes causas sunt acutarihi à capite defluentes ad pulmonem, aut sui acuitate corrodescentes, aut sua humiditate superflua facientes. Ruptura quoque uenarum in pulmone à quibusunque causis fiat, de quibus dictum est in capitulo præcedenti, frequenter ducit ad phthisim.

Aliquando etiam generatur phthisis incipiendo per essentiam in pulmone ex nutrimento suo non bene conuerso, & ex superfluitatibus suis non bene resolutis ob uirtutum suarum debilitates, quæ diuturnantes in pulmone ipsum corroduunt, aut putrefaciunt, sicut quæcunque aliæ humiditates undecunque ad pulmonem defluerint, & ideo ex asthma quædam que transiit in phthisim, licet frequentius contra phthisis associet sibi asthma.

Signa quædam sumuntur ab excrementis, sicut à sputo quando est crassum, saniosum, quod cognoscitur, quia foetet sanies quando ponitur super prunas, & habet colorem album tendentem in uiridem uel cintrinum, & quia descendit in aqua. Per hæc tria à sputo phlegmatico non digesto discernitur, nam si esset digestum descenderet ad fundum, sicut sanies non

nam de ratione phlegmarum digestorum, quod
sint in crassa, & ad terram deducta, ideo descendit
in aqua, ut placuit Auer. in commento canticorum,
comment. 9. hoc tamen signum non solum est effi-
cax, cum etiam sanies spuatur in ægitudine, quæ nõ
est phthisis apud Auicem. capite de empyimate.

Et quandoq; post sputum saniosum sequitur spu-
tum sanguineum, & est proprium signum ulceris cor-
rosiui, sicut contra, quandoq; ad sanguineum sequi-
tur saniosum. Si autem in spuro sint crustæ, aut ali-
quid aliud de pulmonis substantia non remanet du-
bitatio. Est enim certa phthisis, & salsedo sputi arguit
ulcus corrosiuum. Et si expuitur aliquid & sit cras-
sum, est ex pulmone. Si uero subtile, est ex canna pul-
& quandoq; in ulcere magno expuit anulos ex canna
pulmonis. Et nota q; aliquando est sputum sanio-
sum, quod tamẽ non descendit in aqua propter duo.

Primo, quia est ualde crassum, & tenax, & obuias
multæ quantitati aque multum resistenti non potest
ipsam diuidere. Secundo, quia fortè est cum mul-
ta spuma & inclusione multæ uiscositatis subleuantis
quapropter spuro solo non est credendum.

Vrina phthisici est naturalis secundum plurimum
substantia, colore, quantitate, sedimine. Verum
aliquando habet oleagineitatem in superficie, & ali-
quando furfures, & aliquando petala quædam, quæ
omnia significant humidi consumptionem. Ege-
stiones sunt naturales, nisi quod aliquando præceden-
te phthisi sit fluxus lientericus aut diarrhœicus ob de-
bilitatem uirtutis naturalium, & est malum signum.

Sudor quoque factus in fine digestionis quando spar-
gitur nutrimentum per membrum est signum phthi-
sæ, & malum: significat enim humidi debentis nutri-
re dissolutionem à calore præter naturam. Sed à
qualitate mutata. Primum signum est febris minua-
ta, continuata, uniformis, nisi quando cibum sumit,
& hæc febris est hectica, licet secundum plurimum
phthisicus non euacuetur à febre putrida sequente fa-
dificonueniens. Et quandoq; associantur eis aliæ fe-
bres putridæ, scilicet quotidiana, tertiana, quartana,
quinana, & est deterior per uiam signi, significat e-
nim ultimam exicationem per quam humores inci-
nerant, & transeunt in melancholiam, licet per uiam
causæ, aliæ febres sint deteriores, quia magis affligat.
Expropter hoc tertiana est media in malitia tam per
uiam signi, quam per uiam causæ. Color faciei est
plumbinus, licet post assumptionem cibi rubeat ua-
des quandoq; eleuatis. Extrema & propriè pe-
geliua epasis, & ipsorum per communitatem ad pul-
monem, & superfluat uenæ eorum omni hora, quo-
ntiam uirtutes eorum debilitantur à retentione nutri-
menti & regimine eius: & caliditas resoluit & liquefa-
cit, quapropter non attracto nutrimento à uenis, &
humido ipsorum resolutio superfluit uenæ. Sed ab
actione lesa sumuntur signa, quia male dormiant.

Secundo, quia pulsus eorum est minutus, durus, fre-
quens, uniformis, nisi quia cum cibum sumit excre-
lit, & diuersus in fine debilitatis uirtutis. Et anhe-
litas licet in principio parum recedat à naturali, in fi-
ne tamen frequentatur & diuersificatur, & appeti-

tus est diminutus secundum plurimum, & in fine au-
fertur. Dolor quandoq; est in phthisi, scilicet, cum
ulcus peruenit ad panniculum regentem pulmonem
interius aut exterius, aliter non est dolor in phthisi no-
tabilis. Signa autem causarum primitiuarum sunt
ipsæmet causæ. Sed signa causarum per commu-
nitatem & per essentiam in ipso pulmone sunt nota
ex præcedentibus cap. Quando ergo aliqua signa &
maximè, quæ sunt posteriora ex superscriptis adfuerint
debemus cõcludere phthisim adesse, & propriè quan-
do præcesserint causæ uniuersales ad ipsam ducentes.

Prognostica. Primum, quando in phthisi spu-
untur crustæ, substantia pulmonis, & annuli eius, &
uenæ, & lapilli, significat ulcus magnum & propin-
quitatem mortis. Secundum, quando magis pro-
ceditur in phthisi sputum magis in crassatur ipso lon-
giori tempore retento propter uirtutis debilitatem.

Tertium, quando intrinsecatur sputum aut retine-
tur in fine phthisis, & tunc non additur super quar-
tum diem: quandoq; enim contrahitur anhelitus eo-
rum usque quod fiat insensibilis. Quartum, casus
capillorum, curuitas unguium ultimam exicca-
tionem arguentem significat propinquitatem mor-
tis. Quintum, si super spatulas appareat pustula,
sicut faba teadens, scilicet in duritiem, & fuscedinem
moriatur post uiginti duos dies, id est, post multos die-
es, significatur enim quod humor malignus sit in cau-
sa. Sextum, cum tussis uehemens ducit ad sputum
sanguinis continuum ponitur reserè in desperatio-
ne. Si enim curetur tussis cum prohibitis sputi
moriuntur aut suffocantur, aut quia fluxus uentris
superuenit ob superfluitatum retentionem. Si au-
tem dimittuntur tussire, moriuntur tussiendo & spu-
endo sanguinem. Septimum, quando phthisis pa-
rum impresserit, & non sit ulcus ambulatiuum, & nõ
pendens à causa incorrigibili sanari potest, sed non
apud negligentem & stolidum. Cum autem mul-
tum impresserit cura secundum plurimum est cassà &
uana, nisi iussu Dei, sicut in Mediolanensi ordinis san-
cti Francisci de obseruantia, qui post annum quar-
tum suæ phthisis ex spuro sanguinis pluries iterato
tandem uenit post multam corporis rabem ad im-
potentiam expuendi cum ore gromone. Et cum crede-
retur ipsum esse morti proximum, euasit ex miracu-
lo & impinguarus est. Vltimum, fluxus uentris
in phthisi pernicius est.

QUoniam aliquis carniū diminutionem
pati uidetur post tussim ex chroni-
ca passione, & spuro sang. aut saniet proce-
dente, lac asinum in portu tribuatur.
Quod si inueniri non poterit caprinum
cum pauco saccharo dandum est, cum quo
etiam panem sæpe comedat, ipsumq; quan-
to plus potest loco aquæ sumat: uinū tamen
subtile & tēperatum aliquando est tribuen-
dum. Nutrimentū quoq; ægri sit ex carni-
bus.

animum & hoedina. Ager præterea ante
comestionem & post, balneum ingrediatur
quod non sit calidum, sed tepidum, & in se-
micupio moram faciat. Summopere uerò ca-
uendum est ne uenter soluiatur, cui tamen si
solutus fuerit ex huius pulueris bibitione
succurrendum est, qui. Rec. gummi arabicae
spodij, boli arm. seminis myrtini omniū ana-
drach. fiat ex eis puluis, de quo in die, drac.
3. cum syrupo de papauere albo, aut rob
myrtino dentur, huius quoque pulueris bibi-
tio omnibus uentris constrictione indigenti-
bus qui tussim patiuntur remedium affert.
Cui plerūq; adduntur zilocaractē de syria
& bdellium de mecha. Et si lac agro febre
generauerit auferendum est ei lac & ptisa-
na, quousque febris recedat, danda est. Dein
de lac ei denuo tribuatur, & si febris iterū
redierit remoto lacte ptisana est dāda, post
cuius recessionem ut prius ad lac est rede-
undum: hoc autem semper est faciendum, ut
necessitas urget & uenter summopere cu-
stodiendus est, ne soluiatur.

Hoc cap. habet duas partes. In prima ponit signa
phthisis. In secunda curam ibi. Lac asininum, &c.
Prima per se ex dictis manifesta est. Secunda pars di-
uiditur in quatuor. In prima ponit regimen uitæ. In
secunda ibi. Ager præterea. Docet usum balnei in
phthisico. In tertia ibi. Summopere. docet subuenire
fluxui uentris superuenienti hecticæ. In quarta ibi d.
Quod si lac. docet curare febrem superuenientem.

Pro notitia primæ partis sciendum, q̄ genera-
litas quæ conceduntur sunt humanū, asininum, capri-
num, uaccinum, ouinū, equinum. Humanū quidem
summè confert cum proprietate corrente inter indi-
uidua speciei humanæ, & melius est, ut suggat ab ube-
re. Asininū est magis subtile cæteris, prohibens oppi-
lationē, & est absterfium ulceris propter multā par-
tem serosam. Vaccinum autem et ouinum cum habeant
multum de parte caseali & butyrofa multum nutri-
unt. Caprinum uerò est temperatum apud Auic. se-
cundo canon. cap. proprio, id est mediū inter subtili-
tatem lactis asinini, & crassitiē lactis ouini & uaccini,
& similiter est minus frigidum lacte asinino, et magis
frigidum lacte ouino & uaccino. Equinum uerò ab-
stergit magis & faciliat sputum propter multā par-
tem serosam. Vtere ergo his secundum intentionem,
quam habes potiorē magis deferuentem tuo pro-
posito. Sed in ipsius usu seruentur quinque condi-
tiones iuxta Aphor. quod caput non doleat, quod
ager non sit febrilis, scilicet febre putrida, nec sit siti-

culosus, nec uenter rugiat, nec fluat. Sed si uelles ip-
sum exhibere medicinaliter, in primā die accipiat
paucam quantitatem, sicut a 3. 10. usque ad 3. 3. cum
paucō saccharo immēdiatē cum est multum ab ube-
re, deinde paulatim omni die dosis augeatur usque ad
5. aut 6. 3. & in plures, & sic continuet ipsum quous-
que senserit se iuuari: est tamen melius ut suggatur lu-
manum ab ubere. Si uerò febris aut aliud nou-
mentum acciderit, docet Rasis in fine capit. locū eius
ut ptisana hordeacea facta secundum artem, de qua
sermo præcessit in pleureti, & sumat lac in mane aut
ante coenam iam cibo præcedente digesto, & post
ipsum non dormiat nec exercitetur, & tardet cibum
per tres horas, uel quousque lac digestum sit.

Pro secunda parte nota, balneum pro phthisico
conueniens esse ex aqua dulci tepida non calida cum
fiat ad humidandum & in frigidandum, & rāto tem-
pore moretur in semicupio, id est, in uase balnei quo-
usque uerisimiliter potuit impresisse, quod est con-
munitur a quarta horæ usque ad mediam. Caten-
dum tamen ne addit febris putrida, neque uenter rubi-
cus nec multa debilitas, & ponatur in eo, cibo iam di-
gesto quo ad primam digestionem. Cæteræ con-
ditiones in usu balnei sumendæ sunt ex capit. de hec-
tica. Et non est ita administrandum a principio, sed
maximè conuenit phthisi declinante, semicupium ta-
men quasi medium capiens, propriè sumptum non
est uas conueniens ad balneandum hecticum, sed est
uas in quo sedetur cruribus stantibus extra pro cholica.
gendis ægritudinibus matricis & iliorū pro cholica.

Pro tertia parte nota: uentris solutiua non conue-
niunt in phthisi, ut phthisis est, cum non sit morbus
materialis & nocent, corpus exiccando, imò si fluat
uenter summopere constringendus est cum puluere
a Rasi descripto, qui est frigidus, siccus, stipticus, inui-
scans, & est proprius per uirtutem quartam maximè
propter gummi arabicum, sem. myrti, xylocaractē
desen. id est, carubiæ de regione illa sunt conuenien-
tes: quia stipticæ siccae, & cum hoc pulmoni conferen-
tes: *ξύλον* enim græcè, est lignum latine, ut per cornua
quali cornua ligni, bdeli deū mecha, id est, de regione
illa est conueniens, quia frigidum, stipticum & uiscor-
sum, & ponitur de mecha ad differentiam bdellij
daici, quod est calidum, & non est ita cōueniens huius
proposito, reliqua parent.

Duplex est regimen habendum in phthisi præser-
uatiuum & curatiuum. De præseruatiuo sit prius
sermo quod duas exigit intentiones. Prima est pro-
hibere & remouere quascunque causas potentes du-
cere ad phthisim si possibile sit, quæ intentio perfici-
tur curando catarrhum, synanchen, pleuretim, perip-
neumoniam, sputum sanguinis, empyima, & similia
si fuerint in causa. Quod si nulla talis fuerit, sed for-
lum dispositio ad phthisim, merito complexionis,
compositionis, ætatis, & similibus, de quibus supra,
intendatur ipsarum correctioni aut prohibitioni ul-
terioris lapsus, quā bene est possibile. Quapropter
cauendum est ab omnibus cibis, & medicinis acutis
& mordicatis, & ab omnibus quæ excēdunt mem-
bra pectoris, & damor & rixa, & saltus, & luctus, &
procurrentur omnes euacuationes naturales, & etiam
non naturales longo tempore consuētæ, & reliquum
regimen seruetur secundum quod oportet. Secunda

o ransu
Ostendit quod
3 m e d q u
par 18.

Secunda intentio est confortare pul. cum proprijs moderata stipticitate participantib. & contrarijs di-
 scrasie pulm. & ceteris nocementis eius, & ex pro-
 prijs sunt pulmo uulpis præparatus secundum artem,
 liquiritia & succus eius, capil. uen. gran. myrti, rob.
 aut syr. eius, hæc omnia singulariter aut coniunctim,
 & propriè cum aliquo dulci, sicut sacchi, optimè con-
 diata, ualent in cōfortatione pul. Sed regimen cura-
 tiuum phthisis est duplex secundum Mesue uniuersa-
 le & particulare. Vniuersale tribus completur inten-
 tionibus. Prima remouet causam phthisis. Secunda
 euacuat materiam nocentem in phthisi. Tertia ordi-
 nat debitū regimen sex rerum non naturalium. Ve-
 rum duas primas intentiones in unam possem reducere,
 uel remouere causam phthisis, tam producentem,
 quam conseruantem. Prima intentio perficitur cu-
 rando catarrhum si pendeat à catarrho, similiter ul-
 cus, synanchen, pleuresim, empyima, sputum sangui-
 nis, & huiusmodi si ab aliquo istorum pendeat, quorum
 omnium cura perquirenda est ex capitulis proprijs,
 quæ præcellerunt. Attamen curado ista debes etiam
 intendere, quantum est possibile, ad curam phthisis
 cum his quæ dicuntur. Secunda intentio, scilicet eua-
 cuatio, debet perfici si sang. fuerit in causa cum phle-
 bot. ex basilica. primò ad euacuandum multitudinē
 si fuerit, deinde ex saluatiellā ad diuertendum si oportu-
 erit, & si retentio hæmorrhoid. aut mensurorum
 fuerit in causa, ante omnia phlebot. saphena & procu-
 rentur omnes euacuationes consuete. Si uero cholera
 uol. iuiubarum, sebesten, capil. uen. 3.3. trahatur, &
 cum calsiæ. 3.1. aut mannæ 3.1. s. iulep, aut syr. uiol.
 3.1. si tamen solutiuum facile. Si tamen uenter esset
 præter modum stipticus Mesue addit parum trochisci
 de uiol. quorum descriptio posita est superius; sed o-
 mittantur quantum est possibile cum sint scamonæa
 ti. Et si phleg. fuerit in causa, exhibeantur pilulæ co-
 chie in parua dosi 3. s. uel 3.2. 3. s. bdellij, aut gum-
 mi arabici. Et si melanch. fuerit in causa detur sena,
 aut epithymum cum sero caprino aut similia. Sed in
 his uidetur contradictio inter Auic. & Mesue ex una
 parte, & Rasis proprio cap. ex altera parte, primi enī
 precipiunt solutiuā iam dictā. Rasis omnino prohibet
 solutiuā. Ratio Rasis fuit, quòd ratione hæticæ ui-
 tæ sunt solutiuā; ratione ulceris est ut ulcus non
 conueniunt, quapropter in phthisi ut phthisis est non
 conueniunt solutiuā. Ratio Auic. & Mesue fuit, quòd
 solutiuā conueniant, ut auferatur causa tam factiua,
 quam conseruatua phthisis, sicut catarrhus. In catarr-
 rho enim solutiuā conueniunt. Item humores mali-
 gni superfluentes in quanto aut in quali impediunt
 ulceris pulmonis consolidationem, sicut & consoli-
 dationem aliorum ulcerum, ergo cum oporteat cau-
 sam auferri, solutiuā pro ipsorum euacuatione erunt
 oportuna, sicut et quotidie facimus in curatione alio-
 rum ulcerum. Et confirmatur, cum propter præsen-
 tiam humoris maligni ulcera ista fiant corrosiua.
 Responsio est quod intentio Rasis fuit solutiuā non con-
 uenire in curatione phthisis, ut phthisis est, scilicet cum
 est facta & independens, quod etiam primi non ne-
 gassent, sed ratione causæ non ratione phthisis conce-
 ditur solutiuā. Tertia uero intentio exigit aerem a-
 liqualem frigid. temperatum in pasciuis, quanquam

Gal. 5. de ingenio, capite quarto recitet, quod ipse exi-
 stens Romæ eligebar ipsis phthysicis montes calidi. &
 siccos percussos à sole & elongatos à paludibus & lo-
 cis humilibus, & mittebar eos ad montem altum in
 Sicilia, scilicet Ætnam, ubi est continuus ignis & da-
 bat eis theriacam et mithridatum quarto inter forum
 cap. ultimo, & cum talibus prolongabar uitam, tan-
 dem tamen moriebantur, nullus enim eorum euasit
 cum suis remedijs, ut recitat ibidem. Et ut tollatur
 contradictio & instantia, quæ fieri possent, Gal. con-
 cedens huiusmodi aerem exiccantem & calefacientem
 intendit curam paliatiuam non ueram, quæ est ulceris
 exicatio & curæ non uerè inductio. Sed Auicem
 concedens aerem siccum in cura uerè phthisis respicit
 ad ulcus quod est causa hæticæ, & non ad hæticam,
 quæ non potest remoueri sine remotione ulceris pul-
 monis. Similiter Mesue concedens aerem tempera-
 tum in actiuis ad siccitatem debilitantem curat phthi-
 sim, cui remissa hætica est associata. Ego autem simul
 intendens curæ ulceris & hæticæ aerem frigidum,
 ratione hæticæ eligo, qui ratione ulceris solius debe-
 ret esse temperatus in actiuis, & eligo ipsum tempera-
 tum in pasciuis, quia ratione ulceris deberet esse siccus
 & ratione hæticæ debet esse humidus. Tu uero elige
 aerem qui proposito fuerit conformior omnibus a-
 quæ librat, scilicet hætica, ulcere, causis, & accidenti-
 bus, quæ secundum plurimum debent esse proxima
 temperamento, non enim omnia sexto possunt men-
 surari. Et confer mutatio de regione propria ad re-
 gionem & aerem sibi magis conformem: contra si æ-
 grotauerit in regione & aere sibi non connaturali re-
 dire ad regionem propriam & aerem sibi connatura-
 lem. Diata uero aliquando habet respectum ad ul-
 cus, & indiget primò abstergentibus & mundifican-
 tibus, & secundò consolidantibus. Aliquando habet
 respectum ad hæticam & indiget infrigidantibus, &
 humectantibus & bene restaurantibus. Aliquando ha-
 bet respectum ad causam aut ad accidens fortè sibi cō-
 iunctum, ut exempli gratia, sputum sang. & indiget
 stipticis uiscosis constringentibus, propterea medi-
 cus sit diligens & secundum exigentiam ægritudinis
 causarum, & accidentiū, non secundum exigentiam
 intentionum ordinet dietam. Ea tamen quibus uti-
 tur sint facili digestiois, boni chimi, paucarū super-
 fluitatum quorum parum, multū nutriat, sicut oua
 forbilia, testiculi gallorum, carnes laudabiles, uinum
 subtile. Et si aliquando fercula non habentia has con-
 ditiones conceduntur propter alia iuuamenta, sint
 cocta iuribus laudabilium carniū. Ratione ergo
 absterfionis ulceris conueniunt cicerum rub. co-
 ctorum in aqua hor. excorticati. Item cicera ipsa fa-
 cta aut kist ipsorum sunt præstantia ad nutriendum
 pulmonem secundo canon. capite proprio. Item pti-
 sana hor. cum saccharo est præstantissima, & aliquan-
 do ponitur mel in cibis eorum ad abstergendum quan-
 do non timeretur calid. eius, panatella quoque cum se-
 min. communibus frig. spinachia, atriplices, blites,
 borag. buglos, quibus potest addi parum sceniculi,
 aut petros. ius galli decrepiti cum saccharo & semin.
 communibus frig. item brodetum ex uitellis ouo-
 rum cum albumine addendo modicum sacchari aut
 uitellis ouu cum lacte debite coctis cum albumine aut
 sine. Sed & ad consolidandum cum adest spu-

tum sang. datur portulaca, lentes abiecta prima aqua
far. ptilana ex farina amyli, rizum, panicum, spelta,
trit. siue alaganae & proprie coctae cum aqua calibe-
ta. Item carnes uiscosae, sicut pedes & rostra animalium
bene conditionati, elixi, aut alii non fricti. Sed ratione
hecticae conueniunt cucurbitae, portulaca, brodeti,
lac, testiculi gallorum nondum coeuntium, cerebella
hoccorum, epata gallinarum, cancri debite prepara-
ti, sicut preparantur in hectica. Item limaciae, ranae,
testudines, quae debite abluantur & preparantur.
Quod si salatas affectarent concedatur eis aliquando
lactuca, endiuia, borago, cichor. lupul. quae debite co-
quantur & cum uino granat. & cum saccharo condi-
antur. Lac autem ad omnia huiusmodi est conueniens
abstergit enim per partem serosam, consolidat per par-
tem casealem, humectat per partem butyrosam. Si
ergo uolumus exhibere ipsum ratione hecticae sint a-
nimalia, quorum lac sumitur nutrita rebus humectan-
tibus & infrigidantibus. Si uero uolumus ulcus ab-
stergere, nutriantur rebus stipticis & inuiscentibus,
& ponatur in ipso panis bis coctus, & sit lac calibe-
tum aut coctum cum lapidibus. Modus autem est, ut
quinta pars aquae pluuialis cum lacte misceatur, po-
stea calibs feruentis ter aut pluries in ipsum mittatur,
uel lapides fluij igniti sine fumo, & si aqua secum
permixta esset calibea, esset praestantius, & melius,
ut ante calibeam butyrum sit extractum. Ex la-
ctibus magis conueniens est lac adolefcentis puellam
lactantis, scilicet quam peperit, si uis ipsum frigidius,
sit nutrita lactucis, cucurbitis, & similibus, & si uis ab-
stergere sit nutrita hordeo, & ciceribus, & si uis conso-
lidare aut sanguinem sistere, sit nutrita rizo, panitio,
kisti lentium, alaganis, piscibus, & carnibus uiscosis,
conferent enim cum proprietate cadente inter indiui-
dua eiusdem speciei & fugatur ab ubere, post ipsum
est lac caprae sanae, rubrae, iuuenis comedentis fol. salicis,
lactuca, uitis si uolumus hecticae conferre. Si uero
mundificare nutriatur hyssopo, hasea, foeniculo, hor-
deo, & cicere, & misceatur cum melle, & si consolida-
re & sanguinem constringere, nutriatur folijs quercus,
pirorum rubi, & similibus, uel misceatur cum sac-
charo rosacco. Lac uero asininum est frigidius & hu-
mid. sed minoris nutrimenti, postea est equinum faci-
litans sputum & mundificans propter multam par-
tem serosam, sed minus conglutinosum, habet enim
parum de parte caseali, nec multum humectat cum
habeat parum de parte butyrosa, propterea est mul-
tum nutiens et consolidans, humanum itaque confert
cum proprietate, asininum cum infrigidatione & hu-
mectatione, & notabili abstersione, sed caprinum
cum mediocritate sua habens stipticitatem plus ma-
gis alijs ualeat ad consolidandum.

Equinum uero propter multam serositatem ma-
gis ualeat ad mundificandum. Sed ouinum & uac-
cinum cum sint crassiora & habentia multum de par-
te caseali & butyrosa ualent magis ad nutriendum &
consolidandum, & penes Auicem. asinae debent esse
elongatae a partu quatuor uel quinque mensibus. Mu-
lieres uero per mensem, & credo quod caprae debent
esse elongatae a partu, sicut mulieres, oues autem &
uaccae sunt mediae inter utrumque. Lac uero bestia-
rum propter abominationem non suggatur ab ubere,
sed in uase mundo sumatur & tepidum sicut

mulgetur bibatur, iam praecedente cibi digestionem
lebrata & tardet comestitionem per tres horas, aut tan-
to tempore, donec sit digestum. Et Mesue dicit quod
cum lacte dentur torrellae tritae, id est panis bis co-
ctus, quod maxime uerum est ubi opus sit consolida-
re aut sanguinem sistere, secundum Rasim dat lac
cum pane, Auicem. uero cum saccharo & inchoan-
tum est a modica quantitate per duos aut tres dies,
urputa ab 3. 3. postea dentur quatuor per totidem
dies & sic paulatim augendum est, donec peruenia-
tur ad 3. 6. uel plures, & detur primo semel in die, po-
stea bis & secum alijs cibis non commisceatur nec su-
matur, donec digestus sit. Ita autem gradatio fit,
ut natura assuecat & non inducat lubricitatem uel fe-
brem. Et post lactis consumptionem non dormiat
nec exercitetur. Rasis autem tantum confidit in lacte
ut dicat quod quanto plus potest loco aquae in potu
sumat, dat enim ipsum in potu quotidiano, & ipsum
cum cibis alijs commiscet, hoc autem uerum est in il-
lis, qui potui lactis multum assueti sunt & si febrem
induceret, curetur febris, postea redeat ad lac, & si uis
duceret lubricitatem uentris permisceatur secum ali-
qua stiptica ut coralli, ros. hipocystis, & similia, & si
tulis inestaret apud Auicem. secum ponatur trochi-
chan. quod est pectorale prohibens catarrhum, & si
propter debilitatem stomachi multiplicaretur uento
fitas, secum misceatur cyminum uel carui uel si time-
retur febris, trochisci, diarhodon, & lac coctum uel ca-
libeat minus multiplicat uentrositates & uentrem
sistit. Si uero uolumus ipsum esse uentris lenitum
sumatur cum saccharo, & pauco salis. Lac uero acro-
sum est conueniens ad extinctionem caliditatis ad so-
dandum situm, & modus acetosandi est, ut accipiat
lac caprinum bonum & extrahatur butyrum, po-
stea dimittatur die aut nocte una in aere ut temperetur,
postea agitur uehementer & projiciatur spuma
& est exiccadium, confectiuum, et consolidatiuum.
Casei quoque nouiter facti non saliti sunt praestan-
tes, & similiter lac coagulatum & capita lactis conue-
niant ubi opus esset resumere, & humectare, & febre
hectica existente remissa, habent enim multum de par-
te butyrosa apta inflammationi, memorando semper
quod lac conceditur & est praestans cibis medicis
natis praeterquam in quinque casibus de intentione
Hippocratis in textu explicitis. Butyrum uero
prohibetur propter aptitudinem ad inflammatio-
nem. Ius quoque caulium conceditur impingua-
tum cum gallis. Carnes pullorum cuiuscunque ge-
neris & auium bene conditionatarum. Item hocci
capreoli & agni aliquantulum crassiores, & castrati
annuales, & pulmones supra scriptorum animalium
conferunt cum proprietate. Pisces etiam bene con-
ditionati conueniunt qui sunt boni chimi, facili digestio-
nis, paucarum superfluitatum, parui in specie
sua, degentes in aquis laudabilibus, & comedantur
elixi aut alii, similiter carnes. Oua conueniunt secun-
dum omnem modum administrationis modo sint
molliora, non per decoctionem indurata. Fructus con-
ueniunt nisi oleum amygdalinum dulce. sunt per-
uenientes qui aliquando concedi possunt, sunt per-
uenientes in aqua seruati infusae & quater exicatae aut
mixtae cum passulis.

Similiter

apertum probat
torturam

Lac asininum
cautionem in usu
Carli de Bernardis quod
fuit videri. Maffei
de grad. 1172.

Similiter amygdalæ præparatæ cum passulis mixtæ, ex saporibus conueniunt, agrestia aut uinum granatatum cum amygdalis & saccharo mixta cui possunt adhibere additi passulæ. Potus ipsorum non febricitantium febre putrida, penes Rasim esset lac. Sed febricitantium est aqua hordei, aut aqua sacchari, aut aqua hordei, decoctio cancrorum fluuiialium, quæ sit hoc modo, cancri fluuiiales abiectis extremis & coriobus, lauentur ter aut quater cum aqua cineris salita, deinde bulliant duo aut tres uncie ipsorum taliter præparatorum in 2. lb. aquæ hordei, donec optimè cocti sint, aut aqua hordei cum iulep ros. aut uiol. Et si adesset uel timeatur sputum sanguinis bibat aquam calidam aut solam cum syrupo myrrino. Vinum uero conceditur apud uirtutis debilitatem, & etiam fortibus ubi non sit magna inflammatio, sed sit pauciferum aliquale attinens dulcedini album subtile cum sufficere quantitate aquæ temperatum, maxime in mensa, sed extra horas cibationis non conceditur, maxime autem uinum concedendum est his, qui uino multum assueti sunt. Cito enim et multum restaurat & nutrit. Sed Aulic. phlacet aqua pluuialis, panis autem sit simlagineus, id est, ex optima frumenti farina, mediopius est mundificare, sed minus cum opus est consolidare, & farinæ frumenti posset addi farina milij, aut hordei secundum exigentiam. Somnus nocturnus prolixus, scilicet septem horarum aut plurium conceditur, sed sit interruptus, ut expuat secundum exigentiam, meridianus uitandus est nisi aliqua occasione horam nocturnam omiserit, & sit distans a cibo per lueris meridianus conceditur & dormiant capite eleuato ad alterum latus declinante. Procuratur omnes euacuationes a natura infuturæ, & præcipue euacuationes capitis per conuenientes regiones imò etiam men magis nimia uentris fluxitas quæ sit pteitas. Coitus uitandus est. Exercitium nullum uel leuissimum, deambulatio tamen ante cibum eis conceditur, post cibum quiescant per duas aut tres horas, fricationes tamen leues stomacho ieiuno conueniunt, motum, & similia corpus exterminantia. Restauratio quoque ex uarijs composita secundum exigentias sunt in his casibus præstantia. Sunt enim cibi medicinales sicut huiusmodi. 1. pulparum caponis, uel gallinæ unius anni tantum uel duorum benepinquis aut phasianis uel perdiciis uel francullini, aut huiusmodi carnes sint elixæ sufficenter coctæ, non tamquam multum, imò melius est, ut sint parum coctæ, est uel sint assatæ, amygd. excortic. 3. unam, pinearum præparatarum 3. s. auellanarum mundatarum 3. s. passularum communium frigidorum ana 3. 2. amyli garitarum perforatarum, gemmarum, electuarij de geminis sine speciebus ana 3. 1. scoriz ferri præparatarum 3. 3. mentæ sic. tragachan. gummi arabici ana 3. s. specierum triafandalorum sine camphora. 3. s. specierum diarhodon abbatis. 3. 1. coral. rub. boli armenis ana 3. 1. seminis papaueris albi, sem. plantag. seminis

portulacæ ana 3. s. pulparum, sebesten 3. 2. sacchari optimi, penidiorum ana quantum sufficit, fiat confectio in forma solida in morsellis cum sufficienti quantitate aquæ rosacæ, aut uiol. aut plantag. aut acetosellæ aut buglossæ secundum exigentiam. Quod si appetitus esset defectus dimittantur ea quæ non sunt boni saporis sicut species diarhodon abbatis. Aliquando uero addantur aromata cordialia sicut gariophil. & stomaticha, sicut lignum aloes, & galanga, & epatica, sicut cinamomum secundum exigentiam si non obstat febris. Croci tamen aliquid semper est ponendum cum sit cordialis, amicus pectoris, sputum facilitans, & ponuntur iulubæ dum intendimus increscere. Et in hac confectio habemus multam nutritibilitatem ex carnibus & amygdalis, epatis confortationem ex auelanis & speciebus diarhodon. Mundificationem ex passulis, pinels, liquir. penidij, exiccationem ulceris, consolidationem, & fistionem fluxus sanguinis ex bolo armen. coral. tragachan. gummi arabico, fistionem catharri ex sem. papaueris, bolo armen. sebesten, iulubis, confortatione cordis, remissionem hæticæ ex margaritis & gemis, speciebus triafandalorum, & similibus. Confortationem epatis ex scoria ferri & stomachi per mentam & aromata, hæc ergo confectio uti potest tam in horis cibationis, quam extra horas cibationis fumendo unum morsellum, aut plures secundum exigentiam cum potu aut sine potu ad libitum, & potest ex his fieri electuarium addendo plus de aqua rosacea, aut alia simili. Item addendo brodium carnum suprascriptarum, cuius pars nimis pinguis est eligenda alius cibus medicinalis apud Mesue est huiusmodi.

1. lactis acetosi, de quo supra, 3. 3. tortellarum de sceni bene tritarum 3. 1. bulliant leui ebullitione, donec adinuicem optimè misceantur & fumantur stomacho ieiuno, & non comedatur aliud nisi illud sit digestum, & sequenti die addatur suprascriptæ quantitati aureus unus lactis & aliquid de tortellis diminuatur & sic procedatur quolibet die addendo aureum unum lactis, & minuendo parum tortel. donec deueniatur ad exhibitionem lactis puri. Cum autem peruentum fuerit ad declinationem egrotudinis tunc incipiamus diminuire aliquid de lacte acetoso & addere aliquid de tortellis, descendi, donec paulatim deueniatur ad exhibitionem tortel. tantum. Tortellæ autem sunt panis bis coctus.

Particulare uero regimen habet quinque intentiones. Prima est ulceris mundificatio & absterfio. Sed hic notandum quod ubi à sputo sanguinis fuisset facta phthisis, aut ubi timeretur sputum sanguinis absterfientia sint leuiora, ne fluxus sang. reueretur, unde in hoc casu sufficeret aqua hordei extorticati, cum saccharo & propriè ubi adesset febris, & in corpore iuuene nili & tempore calid. Sed in tempore frig. & corpore senili cum pauca febre, & sputo sanioso existente crassiori utemur aqua mellis, cuius descriptio est, accipatur mel 3. 1. aquæ 3. s. bulliant ad consumptionem tertie partis, & aliquando augetur dosis aquæ ubi oporteat magis infrigidare. Et fortius ipsa est ius cicerum cum saccharo aut melle. Et adhuc fortior est decoctio hyssopi & cum saccharo, & adhuc fortius cum melle. Et adhuc fortius est loch de caulibus, id est, succus caulium cum melle inspissatus.

proprie ubi adesset febris, & in corpore iuuene

in corpore iuuene

in corpore iuuene

Et fortissimus est loch de scylla, dia iris, & similia. De his tamen fortibus detur pauca dosis, sicut à 3. u. usq; ad duas, & possunt exhiberi mane, & sero sto macho ieiuno cum aqua mellis aut hordei. Sed forte tutius est, ut hæc fortia sumantur lambendo, ne febre augeant, sed ubi esset maxima necessitas absterfionis, sicut in sene & in sanie crassa cum pauca febre dentur utroq; modo, & hoc tempore dantur cibaria similis intentionis, sicut ius cicerum, ius caulium, kist hordei cum melle, & kist orobi est fortius, & porrum elixatum cum aqua mellis est mundificatiuum, & maximum iuuamenti est huius. Recipe iros asf, hyssopi, ana partes æquales confice cum melle, da mane & sero, ista tamen fortiora absterfentia apud Mesue uitanda sunt in phthisi quantum est possibile, ducit enim ad sputum sanguinis, & augent febrem & liberius in asthmate concedi possunt.

Secunda intentio est prohibitio transitus materiei ad pulmonem, quæ intentio duobus modis perficitur, scilicet regendo membrum mitrens ne materiam transmittat, sicut cerebrum, cum his, quæ dicta sunt in capite de catarrho, & in summa cuiuscumq; membri mittentis dispositio corrigatur, ut materię per aliam regionem deriuentur. Secundo, attendatur confortationi pulmonis ne recipiat, & ex eis est rob myrti, aut syr. eius cum 3. duabus pulmonis uulpis præparari secundum artem. Et ex medicinis mirabilis iuuamenti, aggregatibus uirtutis confortationem & mundificationem est medicamen Gal. Recipe pulmo, uulpis sicci, succi liquiritiæ, capillorū ueneris feminis foeniculi ana cōfice cum rob aut syrupo myrtino. Modus autem præparandi pulmonem uulpis est ut diuidatur in frustra, lauetur cū uino albo. Deinde bulliat in aqua rosacea, in qua aliquid granatorum myrti crasso modo contusorum ponatur una ebullitione, postea abstergatur & lauetur cum uino & aqua ros. deinde excutatur donec possit puluerizari.

Tertia intentio, scilicet exccatio & resolutio materierum, quæ sunt in pulmone, perficitur cum his quæ lambuntur & suffumigantur & sumuntur, quorum copiam superius habuisti in cap. de tussi. Est etiā canon in usu harum medicinarum seruandus. Et Gal. multum utebatur theriaca & mithridato, tamen hæc medicinæ propter hecticam mihi magis suspectæ sunt quàm in tussi aut asthmate. Vere ergo leuioribus & pauciori tempore, & ex domesticis kytram, id est, gummi cedri cum melle & posset addi parū galbani.

Quarta intentio est incarnatio siue consolidatio. Summa autē medicinarum incarnatiuum ulcera pulmonis et pectoris penes Mesue, sunt sanguis draconis propriè lutum sigillatum, lutum armen. karabe sedenegi, id est lapis hæmatitis, olibanum, mastix, balauitia, rosa, & semē eius, corallus sem. portulacæ assu, amyllum assu, sem. maluæ, & althææ assa, sem. arnoglossæ assu, gummi assu, gran. myrti, & similia. Materialia autem cum quibus hæc sunt danda, sunt sicut uitelli ouorum, lac dulce & acetosum, aqua pluuialis & propriè calibeata, aqua hordei, decoctio cancrorum fluuiialium, aqua sauiæ, id est, hordei torrefacti, succus citon. id est miua, succus myrti, rob & syrpus eius, mucilago psilij & sem. citon. syrpus depaupere, uiol. ros. & similia. Ex medicinis autem compositis sunt croci de luto sigillato, de luto armenico,

philonium persicum & est ultimum, mūndificat enim & desiccatur putredines & consolidat ulcera & sicut catarrhum & sputum sanguinis, & tussim sedat, & multa alia habet iuuamenta, & est apud Mesue in cap. de sputo sanguinis in fine. R. sem. papaueris albi, hyoscyami ana 3. 20. terræ sigillatæ, opij, ana 3. 1. sedenegi, croci ana. drach. quinque, castorei, spicæ pyrethri, euphorbij, margaritarum non perforatarum, karabe, zedoariæ, doronigi, ramich, id est galij mus. ana. 3. 1. camphoræ 3. 1. tertiam, confice cum melle ros. colato quantum sufficit dosis est 3. s. usq; ad 1. cum suc. arnoglossæ, aut aqua rosac. & modico uini puri, sed credo non esse dandum, nisi post fermentationem, scilicet, post tres menses. Ex rebus autem mirabilibus ad consolidationem ulcerum pulmonis est saccharum ros. recens, id est eiusdem anni: aggregat enim in eo uirtutes absterfionis ex parte succi ros. & uirtus cōsolidationis ex parte substantiæ earum. Virtus enim absterfionis propter antiquitatem absconditur, quæ adhuc possit detur in recentibus, & Gal. præcipit dari saccharum ros. singulis diebus in quantitate plurima cum rebus medicinalibus & cibalibus, ita quod etiam compendiosum ne. Et post eum plurimi usi sunt & non comprehensibilis est numerus eorum, qui sanati sunt ex eius usu, tamen prius præcedentibus mundificationibus. Falsunt enim uirtutes à principio dum mundificatio non præcessit: coartat enim in pulmone materias. Mesue aut dat ipsum non febricitantibus, cum laet ex lido, febricitantibus autem cum aqua hordeacea, decoctio cancrorum fluuiialium, et alijs multis modis, & inueniunt ipsum esse utilissimū. Verū quoties eius administratio contingit constringi anhelitum, dentur ea quæ elargant ipsum ex his, quæ educunt saniem, sicut propriè syrpus de hyssopo, & similia, et si accidat super calefacto propter exccationem eius, quod potest esse, quia siccitas accendit calorem, dentur syrpus, de uitis, uiol. mucilago psilij, aut citonij, cum aqua gran. dulc. aut aqua expresionis, scilicet portulacæ cum trochiscis de camphora, & si sequatur post ipsum comstipatio uentris dentur muraba de uiolis, id est comstipatio de uiolis, & est saccharū uiolatum aut detur syrpus de uiolis, & est saccharū uiolatum aut detur syrpus de uiolis. Et postquam cessauerit redetur ad saccharum ros. Credo tamē q; saccharum ros. nouum non ita stringit uentrem, sicut antiquū, nam succus ros. ponit inter solutiuā, et hoc sacch. ros. summis laudibus extollit Auicē. in capitulo proprio, & adducit in exemplo foemina illam quasi moriuam ex phthisi, quæ sanata est comestione sacchari ros. Et dicit Auicē. quod non est possibile, ut diu cat summam sacchari ros. quod comedit, & quidam modernus medicus dixit quandam comedisse quādringentas lb. sacchari rosac. cum quo sanata est.

Quinta intentio, scilicet correctio accidentiū completur secundum ipsorum exigentiam. Accidentia enim cōcomitantia sunt consumptio & debilitas uisus, quæ interdum modum excedit. Superuentientia sunt sputum sanguinis, fluxus uentris, costipatio, febricitudine, febris putrida, uigiliae.

Consumptioni quidem subuenimus cum eis quæ humectant, & cibis et potibus tam qualitate quā substantia, scilicet, cum administratione lactis, confectionum restauratiuum, & ciborū quorum parum multum nutrit. Item cum balneatione in aqua dulci postquam

postquam uentum est ad declinationem. Nam ante illud est res prauior, & est ponere ægrum in desperatione, & post balneationem ungere corpus cum oleo uiolarum, 3. duabus rosacei, 5. 1. amygdalarum dulcium, 3. lemis, pinguedinis porci recentis decies lotæ cū aqua frigida, et in fine cum aqua uiolacea 3. 5. quibus potest addi mucilago psilij & similia. Modū autem balnandi prolixum requirere ab Auic. in capitulo de hecetica, & à Mesue in capitulo de phthisi. Tussis autem, si modum excedat subueniendum est, sicut dictum est in capitulo proprio, & similiter de spūto sanguinis, præcessit capitulo proprio, ad quod recurrit. Sed fluxui uentris succurrendum est cum medicinis Rasis in textu, sunt enim præstantia. Conspirationis autem quæ tamen nō est multum timenda succurrimus facile cum enemate lenituo infundente & humectante, sicut ex lacte, saccharo, uittello oui, & oleo uiolaceum, & apud maiorem necessitate addatur cassia, aut mel uiolaceum similiter lac sumptū cum multo saccharo & sale, & iure gallinarum cum saccharo, et pastile, & similia sunt præstantia. Fastidio autem & deiectioni appetitus cum exhibitione citoniorum, pirorum, & similibus in mīua, & succo citoniorum, & salitis, de quib. supra, & cum emplastro de pomis coctis in uino & aceto cui addantur rosæ, & gallia musci, & stomacho applicetur. Febri aut subuenitur cum exhibitione aque hordei, & prisanæ hordeaceæ, & si tur humor facies febre, & euacuetur secundum exigentiam, sed cum leuibus. Vigilijs subueniatur cum emulsionib. papaueris & syrupo eius, quæ si nō sufficiunt detur aliquid opiatū sicut 3. 1. philonij, persici, aut pilula una opiatā ex pilulis alchabier, dictis in cap. de catarrho & tussis, & hæc est cura uera si fuerit possibilis. Quod si cura uera non uideatur possibilis aduic. est regimen in durans & exiccans, faciens dilatatio & escaram in superficie ulceris, ut prohibeat ne non speretur incarnatio & consolidatio. Et in hoc est pes in prolongatione uitæ patientis, licet hæc uita parum sit dilecta, & læditur à quolibet errore: dimittatur ergo lac, & cætera humectantia & primò facta aliquali mundificatione procedat ad consolidantia, in quibus ponitur bolus armenus, & terra sigillata, chilici de terra sigillata, de Karabe, et mixti cum sacch. ros. quæ lambantur & deglutiantur, & sedetur tussis cum papauere, & ex his quæ fiunt ex papauere, & cū trochiscis supra scriptis si aliter sedari nō potest, summa casu, & comedat assata, & pulmo uulpis mixtus cum trochiscis de terra sigillata, & syrupo de myrto est præstans medicina tam sumpta lambendo quàm deglutendo.

Vlcus uero cænæ pulmonis quod cognoscit, quia dolor est in medio colli anterius aut posterius: nō tamen plurimum & accidit cū hoc prurit in corpore, sum, quod excreat cū tussis aliqua pauca & rascatione plurima. Et fortassis præcessit apost. in eadem parte significatum per febre debilem & dolorem pullati-

uum in eadem parte curatur cum eodem regimine uniuersali & particulari quo curatur ulcus pulmonis, sed elaborandum est ut medicinæ maxime abstergentes et consolidantes sumantur lambendo. Dicit enim Auic. quod æger iaceat super collum suum & teneat medicinā in ore, & deglutiat saliuam suā paulatim, ita ut non immittat plurimum subito & exciter tussim, & oportet ut mollescat lacertum gutturis sui, ita ut descendat ad guttur ipsius absq; excitatione sordæ, id est, doloris. Medicinæ autem mundificatiuæ sunt sicut diadragant. cū pauco melle mixtum aut diadragachant. cum loch de pino, sed consolidatiuæ sunt sicut sacch. aut diadragachant. cū bolo armeno, & terra sigillata, reformata adinuicē cum syrupo de myrto, & his posset addi parum pulmonis uulpis præparati et bolum armenum solum, aut terra sigillata solum in ore retenta præstans in cōsolidatione, de ulcere aut pectoris sufficienter dictū fuit superius in pleureti & empyimate, & qualiter pleureti non uera secanda sit aut urēda, si tumor aut dolor, aut qualitas mutata cōmunicentur cuti. Et qualiter post sectionem sanguis restringendus est, & labia uulneris dirigenda, postea mundificandum & consolidandum sit, & si uratur qualiter escara remouenda, postea mundificandum & consolidandum, & dictum fuit qualiter in empyimate secandum sit, aut urendū inter quartam et quintam costam si alio modo mundificari non potest per sceratum, uomitū aut secessum. Et si tumor aut qualitas mutata non apparuerit in parte alia, & qualiter postea mundificandum sit & consolidandum.

Quod si ulcus sit in aliqua parte pectoris & intrinsecum sit, eadem procedendum est cura qua proceditur in phthisi. Si uero hac uia sanari non potest, & antiquatur & fiat fistula, quæ multoties remouetur cū emissionē sanguinis & saniei percreatum, sicut uidi in pluribus durasse per multos annos, nulla est uia in curatione nisi aperiatur exterius. Quod tamen nullo pacto facere debemus nisi tumor, dolor, et qualitas mutata communicetur exterius, id est, ex directo doloris intrinseci consueti, & in eo casu tutius est primò cauterizari locum tumētē cauterio potēiali, quod satis notabilem partem capiat, ut ad locum ulceratū peruenire possimus. Non tamē profundetur nisi usque ad costas, postea remota escara tentemus cum sagittella paulatim perforare usq; ad locum ulceris donec uideamus saniem egredientem, postea mundificetur & consolidetur. Si uero aliquid costæ esset corruptum, tētemus cum medicinis aut cauterio actuali euellere partem corruptam, postea mundificare & cōsolidare, &c. & sic deo duce fit finis huius capituli.

DE PASSIONIBVS CORDIS.

Cap. LXXIII.

Quia hic agitur de passionibus cordis ante omnia iuxta consuetudinem præmittenda est cordis anatomia. Cor descriptiue est membrum principalissimum mediocris quantitatē, figuræ pyramidalis in medio corporis situm, osse cartilaginoso sustentatum ex pinguedine, uenis & arterijs, & carne, cum uillis longitudinalibus & latitudinalibus & transversalibus constitutum, tribus uentriculis & duabus auriculis diuisum, capsa pā-

arteriarum, quoniam à uentriculo dextro oritur uena chilis, cum ibi sit crassior quàm in alia parte, & postea ramificatur in chilim ascendentem & descendentem, & stipes ille qui egreditur à corde non ulterius procedit. Et in origine istius uenæ sunt tria hostiola, quæ aperiuntur ab extra ad intus cum cor dilatatur & attrahit sang. & clauduntur ab intra ad extra cum cor impellit sanguinem per uenam chilim ad nutriendum membra, sed non clauduntur perfecta clausione: huius autem causa fuit, quia cor plus attrahit sanguinem, per uenam chilim, quàm postea quando mundificatus est, expellat per eandem: remanet enim in eo sanguis nutriturus cor & pulmonem, & cōuertendus in spiritum. Item est aliud orificium in eodem uentriculo à quo oritur uena arterialis nutritura pulmonem quæ dicitur uena, quia non pulsatur arterialis, quia habet duas tunicas, ut melius conseruaret sanguinem subtilissimum, & propriè in pulmone qui est in continuo motu, & in orificio eius sunt tria hostiola, quæ aperiuntur ab intus ad extra cum cor constringitur & impellit sanguinem ad pulmonem, & cōstringuntur de extra ab intus perfecta clausione cum cor dilatatur, cuius est ratio, quia per hanc cor expellit & minima, unum arteriæ aorti quæ dicitur aorti, quia ipsa originatur à corde, uel quia omnes arteriæ ab ipso aperiuntur ab intus ad extra cum cor constringitur & impellit spiritus ad membra per hanc arteriam, & clauduntur ab extra ad intus cum cor dilatatur & recipit aërem ab arteria. Quapropter credo quod non perfecta clausione claudantur, sicut quidam dicunt lo aliud orificium cor recipiat. Est etiam in eodem uentriculo aliud orificium in quo originatur arteria uenalis, quæ dicitur arteria, quia pulsatur, & dicitur uenalis, non habet nisi unam tunicam, cum non debeat nisi continere aërem & uapores capnosos, & habet duo hostiola in eius orificio quæ non perfectè clauduntur: est enim ordinata ad expellendū fumos & aërem inuulm ad pulmonem, & tandem egreditur per tracheam arteriam & os, & ad attrahendū aërem frigidum à pulmone cum cor dilatatur. Omnes autem alię arteriæ præter istam habent duas tunicas, quarum durior est intus, & cum ipsa sit obuians percussioni & feruati, custodia & fortitudo. Habet autem cor diamonem & arterijs, & habet systolen ut cum constringitur expellat sanguinem per uenam chilis ad membra & sanguinem ad pulmonem per uenam arterialem, & aërem inuulm ad fumos per arteriam uenalem: est autem sedes & principium spiritus & uirtutis uitalis quia deputatus est ut est proprius pro operatiōib. uitalibus: cū hoc tamen concurrat tanquā agens uniuersale ad quamcunque operationem alterius membrum, & motus cordis non est uoluntarius, propterea non est lacertus, licet sit similis lacerto, & sic patet anatomia cordis. Ex quo sequitur quod cor est ualde calidum, & aliquantulum sic, & potest pati omne genus ægritudinis, scilicet, complexionis cuiuscunque generis lineamateria, & cum materia sanguinea, cho. phleg. et melancholica, & uentosa contenta in uenis eius secundum plurimum, quæ mala complexio cum confir-

matur ad hunc intellectum, quia sit maximè fixa aut in ultima sui malitia, non recipit curam. Si uerò est cōfirmata quia esset in statu, aut quia esset facta independens bene posset recipere curam. Complexio tamen frigida esset deterior quàm calida & sicca, quàm humida, & hæc malę complexionis sunt minus corrigibiles in corde quàm in alijs membris, quia cor licet alijs membris ferat subsidium, à nullo tamen suscipit subsidium, aut saltem nō tantum suscipit subsidium, quantum alijs tribuit. Potest etiam pati malam compositionem & propriè oppilationes propter quas spiritus suffocantur in corde non inuenientes spiraculum. Et aliquando malum fitum multa acquisitione capsulæ comprimentis ipsum. Patitur etiam solutionem continui quæ ex toto genere est mortalis. Si tamen fuerit superficialis, tardatur mors interdum usque ad secundum diem. Si uerò fuerit profunda & maximè penetrans ad uentriculos interficit subito. Potest etiam pati apostema cuiuscunque generis sed sanguineum frequentius, deinde cholicum, rarissimè melancholicum, phlegmaticum, aut aquosum. Et hæc frigida sunt frequenter in capsula cordis, quæ facta in ea, licet possint chronicari sicut in simia, Galen, tandem tamen interimunt. Sed facta in corde ualde citò interimunt. Nam si fuerit calidum & superficiale tardatur mors usque ad secundum diem. Cum autem profundum, interficit in hora. Si autem fuerit frigidum & superficiale potest tardari mors usque ad quartum. Si uerò profundum usque ad sequentem diem. Ex quo infertur quod apostema calidum est deterius quàm frigidum, licet mala complexio frigida sit deterior quàm calida, cuius diuersitatis causa est, quia apostema est ex toto genere mortale, & illud est deterius quod citius interficit. Sed mala complexio frigida non est ex toto genere mortalis, & salubrior cæteris paribus est calida quàm frigida, licet fortè calida excellua mortalis citius interficeret quàm frigida mortalis. Est enim caliditas acutior quàm frigiditas. Patitur etiam borthor siue pustulam paruam, quæ eandem interficit cum egressu sanguinis nigri per nares, quia niger effectus est, mortificatis spiritibus, per quorum præsentiam reddebatur lucidus, dolores etiam non potest longo tempore tolerare sicut nec alia nocumēta fortia: propter hoc apud Auic. decolat, id est, syncopizat, uel in cuius corde inuenitur ex nocumētis quod inuenitur in reliquis membris. Aegritudines autem cordis famosæ ab autoribus nominatę sequentes aegritudines suprascriptas sunt quatuor, debilitas cordis, pulsus, tremor, syncopis, quarum causæ differunt secundum magis & minus. Causæ enim ægræ cum sint leues faciunt cordis debilitatem, ita ut fiat impotens ad operationes. Aliqualiter autē faciunt pulsum cordis efficaciter imprimendo in cor. Cor enim se concutit ut nocumentum expellat faciendo uariationem in motibus, scilicet, ex magno ueloci uel frequenti ad paruum, tardum uel rarum aut e contra, quę mutationes si non fuerint magne ualde aut frequentes, aut cum magna debilitate cordis, hæc passio dicitur pulsus cordis. Si autem fuerint ualde magnæ, ualde frequentes & continuæ, & cum magna cordis debilitate, tunc dicitur tremor cordis, differunt etiam aliter, quia pulsus cordis magis sit uirtute existente fortè tentante expulsionem rei nocentis. Tremor

Quartus est meditationes quoniam iucundæ, plenæ spe, & circa res magnas significant temperamentum aut declinationem moderatam ad calidum & humidum, sicut e contra meditationes tristes cum desperatione, & circa res paruas significant frigidum, & sic, & meditationes contentionis, separationis & rixæ caliditatem & siccitatem, spiritus enim cum sunt clari multum, temperati, cor bene se habet & quæ percipiuntur sub ratione delectabilis & spem bonam generant & confidentiam, & e contra pauci fumosi, frigidi, & sic, timorem & desperationem, sed calidi & sic fumosi multum, contentionem, iniquitatem rixam. His potest addi nonum. Nam caliditas in corde ab ipso patiente percepta significat caliditatem sicut e contra frigida percepta in corde frigiditatem, quod signum potissimum accommodatur ad caliditatem & frigiditatem præternaturales. Potest ad id decimum sumpsum à proportionate lapsus, nam ceteris paribus facilius & frequentius est lapsus in morbum similem quam in contrarium. Talis ergo complexionis est cor qualis est morbus in quem facilius & frequenter labitur, & sic ex 10. modis significationum superscriptarum possumus arguere supra quacunque complexione cordis naturalis. Signa autem quibus arguimus super ægritudinibus cordis sunt infra scripta. Signum malæ complexionis calidæ est augmentum pulsus in uelocitatem & frequentiam non naturalem & declinatio antea non naturalem, & uelocitatem & frequentiam non naturalem, & frequentiam quæ sedatur cum aere frigido, & bene se habere in frigore & extenuari absque alia causa & e contra.

Signa malæ complexionis frigide sunt declinatio pulsus ad paruitatem, tarditatem, & raritatem non naturalem, nisi cadat uirtus, & sit necessaria frequentia, & anhelitus paruus, tardus, & rarus, & tranquillitas cum approximatione eius quod calefacit. Item timiditas & superfluitas in pietate & misericordia. Signa malæ complexionis humidæ sunt inclinatio pulsus ad lenitatem naturalem & uelocitatem patiendi ex improbitate in anima cum uelocitate retentionis eorum malæ complexionis febrium putidarum. Signa malæ complexionis siccae sunt, declinatio pulsus ad duritatem non naturalem, & difficultas susceptionis bilis, & liquefactio corporis, & de significationibus apostematum sunt signa apostematum colorum: ipsa enim in principio sui faciunt diuersitatem mirabilem in pulsu non consuetam, & sit maxima inflammatio in corpore propriè in temporibus membrorum, anhelitus quamuis atrahat aërem frigidissimum, tamen est quasi priuatus anhelitu. Deinde sequitur syncopis frequens, & non oportet ut expectet pulsus durities, sicut in alijs apostematibus calidis, quoniam interfuit ante illud, interficit enim secundum plurimum in prima die uel in secunda. Sed si tunc modis accidentia sed remissa cum paucitate inflationis, & interficit inter secundum & quartum. Sed signum malæ compositionis sicut compressionis eius à multitudine aque in capsula sunt, quia sentit cor suum uariarum est præfocatio manifestè sentita absque causis alijs. Signa autem solutionis continui sunt ipsæ

causæ soluentes. Causæ autem imprimentes in cor quædam sunt communes sibi & alijs membris sicut causæ facientes malam complexionem, solutionem continui, apostemata & similia, quædam sunt propriæ cordi sicut malus anhelitus & accidentia animalia, quæ quandoque nocent spargendo spiritum exterius quandoque suffocando ipsum interius, ita ut quandoque sequatur syncopis, imò mors, ira autem est minor omnibus illis in hoc, raro enim interficit.

Canones uniuersales in curatione dispositionum cordis sunt quatuor. Primus quia cor est membrum principale prius & sublimius omni principali et ideo sumus festini ad curandum cordis dispositiones & si ne errore quantum est possibile. Paruus enim error in principali multum timendus est. Secundus canon est quod in phlebotomia quæ frequenter est necessaria in curatione ægritudinis cordis, cum plurimæ ægritudines cordis materiales à sanguine pendeant, sumus solliciti ne superfluat & cadat uirtus, & si ceciderit succurramus cum medicinis & cibis uiuificantibus, uirtutem secundum exigentiam de his quæ dicuntur, & hæc non appropriatur egressioni sanguinis tantum, imò etiam cuiusque euacuationi, quamuis sanguis euacuatio sit uehementioris necessitatis, ut sibi in casu uirtutis subsidium afferatur. Et quia ut dictum est plurimæ ægritudines cordis sunt à sanguine aut à uapore, phlebotomia est congrua euacuatio à no cumeto amorum liberans. Repletio enim sanguinea remouetur, phlebotomia basilicæ dextræ, & uaporosa phlebotomia basilicæ sinistræ. Tertius canon est in euacuatione per medicinas solutiuas, & est quia plures medicinæ solutivæ inmiscantur cordi, uel secum permisceamus medicinas cordiales bezaaricas quæ conferunt tripliciter. Primo corrigendo no cumenta medicinarum soluentium. Secundo confortando cor addendo in robore cum proprietate sua & stiplicitate temperata. Tertiò quia faciunt uirtutes medicinarum penetrare ad cor remouendo eas ab alijs locis.

Quartus canon est in permutatione complexionis calidæ, frigide, humidæ, & sic, aut compositæ. Nam si uolumus permutare complexionem frigidam, audaces sumus cum medicinis cordialibus calidis, solis, aut saltem permixtis medicinis cordialibus, uitando tamen ne propter intensionem suæ caliditatis, aut multitudinem eius fiat agitatio in humoribus cordis, & materia dilatur & ampliatur, & fortè perducatur ad apostemata, ad oppilationem & reliqua no cumenta, nec tamen multum diminuta sit à gradu & multitudine caliditatis, sufficiens secundum gradum & resistentiam ægritudinis, sed in permutando complexionem calidam tunc non sumus contenti solis infrigidantibus. Nam substantia per quam cor creatur, est spiritus effusus in ipso qui est substantia calida calida, naturali & non calida, nocua corpori quæ aliquando ex malitia complexionis calidæ resoluatur, minoratur, conuertitur in fumum & conturbatur. Cum ergo superuenit corpori cordis quod extinguat ipsum non est permixtum cum medicinis calidis, confortantibus calorem innatum non solum propter caliditatem, imò cum proprietate ipsarum associata caliditatem earum, possibile est ut noceat radici, id est spiritui, quamuis ramo conferat & est corpus cordis contemperando caliditatem eius. Quapropter sapientes antiqui permiscuerunt medicinas

frig. cum cordialibus calid. confidendo quod si natura fuerit fortis discernet inter calefactiuum & infrigidatiuum & affert infrigidatiuum cordi & calid. cordiale spiritui & temperabit ipsum. Et si inueniunt medicamen æquale aut proximum æqualitati confortatiuum spiritus sicut buglossam uigoris & adiuuant se cum eo. Si uero natura fuerit debilis non confert regimen nec sufficiunt medicinae cordiales frig. propter aliam causam quia sunt tardae penetrationis. Quapropter necessarium est ut secum misceant medicinas cordiales calidas quibus iuuatur penetratio uirtutum medicinarum frig. quae tamen notabiliter debent esse dominantes super medicinis calid. secundum exigentiam sui contrarii sicut permisceat crocum medicinis frig. in trochiscis de camphora, propterea qui abstulerunt crocum ex trochiscis de camphora blasphemantes priores fecerunt ipsos pauci iuuamenti quamuis propter ignorantiam non concedant. Complexio autem calid. curatur cum sumptis in potu sicut sunt rob frig. cordialia, scilicet de ribes, de pomis & similibus, & cum aqua & suc. fructuum sicut pomorum apiorum, cyton. acerositate citri, & similib. & cum exterius applicitis frig. permixtis cum paucis cordialibus calid. & si fuerit materia euacuatur. Cura autem malae complexionis frig. est cum confortatiuis magis quae dicuntur, sicut diamusco, theriac, mithridato & similibus cum uino odorifero, exercitio temperato, cibis calid. quietate quae digeratur. Et cum applicitis exterius cordialibus calid. stipticitate temperata participantibus; & si materia frig. fuerit in causa euacuatur. Sed in cura malae complexionis sic. est necessarius cibus & potus plurimus, humectatiuus dum modo possit digeri. Et administratio rine aut balnei cum custodia tamen, ne sit multum calid. nec sit longa mora in ipso, ne resoluatur & uirtute deiciatur, paucitas motus & tranquillitas & potus aquae non multum frig. & moderatae stipticitatis nisi adsit caliditas coniuncta sic. cum multitudine spirituum, tunc enim magis frig. & pluris quantitatis posset exhiberi, & conuenit somnus plurimus, & si fuerit materia euacuatur. Cura autem malae complexionis humid. & subtrahitio dietae quae uirtualiter declinet ad sic. & administratio medicinarum exiccantium & exercitia potius longa & frequentia quam intensa & fortia, nisi esset coniuncta frig. & materia humida si fuerit in causa euacuatur. Cura autem frigida & humid. est intentio & multitudo exercitii, in quo tamen fiat gradatio de paruo & breui ad longum & magnum, et administratio balnei ante cibum praecipue tinarum & longa mora in aqua calida, administratio solutiuum et diureticorum, usus uini antiqui, odoriferi, potetis, moderatae tamen quantitatis, & administratio ciborum calid. & sic. quantitatis moderatae, & si humid. fuerit coniuncta calid. uigent balneum & utatur coitu, et si materia aliqua fuerit in causa euacuatur. Solutio autem continui non recipit curam, sed oppilatio remouetur, phlebot. & alius euacuationibus secundum exigentiam & administrationem incidentium & subtrahantium primo, postea aperientium & prouocantium quae omnia sunt cordialia aut cordialib. admixta, & sint calid. aut frig. aut temperata secundum exigentiam. Si uero sit malus situs propter superfluam humid. capsulae compri mentis cor intendatur omni regimini exiccatio tam

cibali quam medicinali, nec non euacuationibus iteratis, quae tamen uirtutem non deiciant. Cura autem apost. Cum inceperunt non est possibilis, sed obtinendum est ne incipiant cum phlebot. copiosis, & proprie basilicæ, & apud Auic. quandoque speratur in euacuatione eius cum phlebotomiae arteriae & cum euacuatione humorum cum solutiuis, moderatis tamen ne agitent materiam quibus cordialia sunt admixta, & sint calid. frig. aut moderata secundum exigentiam, & deinde cum diuersionibus fortibus & uentosis ligaturis & huiusmodi. Et tertia materia si fuerit subtilis in crassetur & compingatur, ut non fluat etiam exhibendo opiata fortia in notabili quantitate, & super regionem cordis & partis circumstantis applicentur percussiva secundum exigentiam confortantia cor cum proprietate sua, & repellentia materiam, & procurenta sit tenuissima. Somnus sit interruptus & procedatur euacuationes naturales & non naturales longitudo confuetæ, quiescant animo & corpore quantum est possibile. Medicinae autem cordiales quibus uirtutum est secundum exigentiam temporum descriptae ab Auicenna & ceteris sunt infra scriptae. Temperatae sunt lapides praeciosi, urthiacynthus, albedengessit, id est, lapis ualens contra uenena, creditur quod straphyrus, uel forte lapis ille qui uocatur bezahar, id est, uerberans a ueneno alfenisagi, id est, smaragdus, & aurum, copiosum in bursa uel serinio seruatum, argentum, granatæ, rubini, buglossa, borago, topazius lapis. Calidae zedoaria, zorumbet quae sunt eiusdem speciei quamuis Auicenna de eis diuersa faciat capitula, sed zorumbet sunt radices similes ciperi in figura, odorato maiores & duriores intus subcitrini coloris, odoris & saporis zedoariae, remissioris tamen. Doronici græci, arabice, doronigi est radícula parua, saporis dulcis, similis calamo aromat. in colore & figura, been album & rub. & sunt uelocis iuuamenti, gario phil. mirabiles, galanga, nux musc. cinamomum, oleum ballium, id est, basilicon, ambra, balsamita, uinum, aromi lignum & semen eius, stecas, polium, uinum, corec matum, pulegium, origanum, mentastrum, & cetera citri, sem. citri, cubebe, muscus, ambra, feta combusta & non combusta, xilaoles crudum, melissa & feni, eius, enula est mirabilis, macis, calamus aromaticus, cassia, lignea, rosmar. lauendula, satyria, gongi hypericon, calamene hum. menta, polyrricon, lappaber, spica nardi schinanchum, cardamomum, lappacium, quod Auicenna acerosam appellat, non est illud de quo est hic sermo, sed de lappatio uulgariter dicto rumese, quod est caliditas, & sic. & optime ualeat, contra serpiginem conditum aceto & sale. Frig. margaritæ, camphora, sandali. Spondilium, poma, uioles, acerositas citri, cichorea, uinum granatæ, corianrallus, rosa, luto figillatum & armenium, acerositas, & hum. limones, arantii, scariola, lactuca, & cetera. Et uniuersaliter omnes ualentes contra uenena, & cetera ne aromaticum ponitur cordiale. Unde multipliciter dicitur medicina cordialis, primo quia temperata ut supra scripta licet Auer. quinto Colliger cap. de medicinis confortatiuis membrorum uelit quod medicina tendens ad aliquam calid. sit magis confortatiua quam temperata. Secundo quaedam medicinae confortant uirtutibus secundis, ut est stipticitas odor, sicut sunt rosæ & muscus. Quaedam confortant

est à proprietate occulta, & istę sunt duplices, nā quędam habent proprietatē adiutā à qualitate manifesta ut spica & crocus quarum proprietates adiuuatur aromaticitate et caliditate temperatis, & stipticitate quędam. Quędam confortant per proprietatem occultam non adiutam aliqua qualitate manifesta, ut hiatythus & similes, inter quas interest, quia primę indigent actuatione à calore nostro ad quam exiguntur duo. Primum ut fiant actuales cum prius solum essent in potentia. Secundum ut uirtus ipsarum ad cor penetraret, quę maximē ducitur per uaporem ad cor penetrantem, secundę autem non indigent transmutatione à calore nostro per quem ducantur de potentia ad actum, imō non indigent nisi ut uirtus uaporis ad cor deferatur, & prima proprietates indigens adiutorio qualitatis manifesta à quibusdam appellatur uirtus tertia, sed secunda nō indigens adiutorio qualitatis manifesta uocatur uirtus quarta, & isti sunt quatuor modi quibus aliqua medicinę per se primō dicuntur cordiales & confortantes sed medicinales alijs modis confortantes non diu dicuntur cordiales nec confortantes per se primō, sed solum de per accidens sicut quę remouent nocuēta materiem in cor. Et harum quędam faciunt hoc euacuando, quędam alterando ad contrarium secundum qualitates primas, ut frig. contra uenenum calidum & sic de ceteris contra sua contraria. Tertiō aliqua faciunt hoc, stipticando, ut terra sigillata, prohibere uaporem eleuari sua stipticitate, & cum hoc etiam confortat cor, & similiter lutum armen. in pestilentia. Quartō aliqua faciunt hoc incidendo, sicut aqua radophant contra fungos. Quintō quędam reprimunt do acuitatem ut butyrum, & alia unguenta, & multi sunt alij modi quib. opponimus uenenis, sed hi sunt principales, sed illa quę euacuādo confortant sunt duplicia, quędam enim confortant expellendo uenenum, ut terra & lutum sigillatum, quod non cessat facere uomitum donec uenenum expellatur, quędam autem confortant educendo materias malas exilant, agaricus, & lapis lazuli. Et in his est proprietates quędam uirtus tertia, scilicet respectus ad cor plus quam ad aliud membrum. Sunt autem præter hos alij tres modi minus principales quibus medicinę dicuntur confortatiue, sicut quę ducunt uirtutes aliādiendo ne resoluantur uirtus earum in uia, sicut opitum, quędam consolidando alias, sicut species aromaticę ingredientis trochiscos de tyro quę ponuntur ad reprimendum earum malitiam, inter has omnes uerē cordiales sunt medicinę quatuor priorum modorum quę per se confortant. Alię uerō theriacales siue bezahartice appellantur, et non uerē cordiales sunt theriacales, licet non contra, quia medicinæ nec absolute confortat cor, sed cum est in dispositione præternaturali, sed uerē cordiales sunt remouentes singularem proprietatem ad ipsum maximē confortantes in dispositione sana, sicut buglossa hiatythus, sed multę theriacales nocerēt in dispositione sana, quę in dispositione agra opime iuuarent.

Et hæc elici possunt ex dictis Gal. quinto de simplici medicina, & Ser. in suo de simplicibus, capite de medicina custoditiua & liberatiua. Et dicit ibidem quod medicina theriacalis est mediā inter uenenum & corpus humanum, cui Auer. contradicit quinto Colliger, capite de medicinis operantibus contra uenenum & dicit quod medium est eiusdem generis cum extremis, sed medicina theriacalis non est eiusdem generis cum corpore nostro & ueneno, quare non est medium. Ad quod dicendum, quod Gal. & Ser. noluerunt quod medicina theriacalis sit mediā per comestionem nec per formalem participationem utriusque, sed est mediā, quia cum utroque conuenit, cum homine quidem quia ipsum tuetur, sed cum ueneno conuenit, quia participat naturę proportionē quadam & forma uenenoſa, participans autē uno formaliter & cum alio uirtualiter, non est sub eodem genere reponibile cum ambobus extremis, sed est in genere extremi, cuius natura participat. Est enim medicina uenenoſa, non tamen ex toto genere contraria naturę hominis, sicut argentum uiuum, fel uiperę, quia istę non ponentur in confectiōibus liberatiuis, sed aliquo modo uenenoſe & interficientes si sumantur in notabili quantitate, sicut mirra, opium, styrax, crocus, faciunt enim stuporem & occidunt in multa quantitate sumpta.

Quapropter concludit Serapion allegato capite, quod ualde æquilibrata debet esse dos medicinarum theriacalium, scilicet ne noceant corpori, imō ipsas bene toleret & sint sufficientes contra uenenum, & hoc est difficile apud inexpertos. Sed forte ex his quis infert contra determinationem supra scriptam, quod nulla medicina uerē cordialis sit theriacalis cum nulla uerē cordialis participet naturam ueneni. Ad quod dicit quod autores predicti non loquuti sunt de omnibus theriacalibus sed de his tantum quę natura uenenoſa participant, & propositiones illę sunt infinitiue, & non uisuales. Et ego sequor intentionem Simtan. in dictione bezahardi dicentis. Bezahartica est omnis medicina liberatiua à ueneno, nos autem proprio uocabulo carentes hoc significantes, theriacam uocamus, theriacam itaque & medicina liberans à ueneno sunt synonyma. Et subdit bezahard aliquando uocant galbanum propter excellentem eius uirtutem contra uenenum, quod patet per Auic. in descriptione tertię theriacę, & per Ser. in descriptione theriacę, uocatur nihilominus apud eos Kemne, uocatur & interdum bezahard uel bezahar quidam lapis multū durus regibus, ut in Serapione inuenies. Putant autem aliqui hunc lapidem esse qui generatur in oculis ceruorum in oriente, qui cum serpentes comedunt ut deponentes senium fortiores fiant intrant flumen, ibique morantur immersi usque ad caput, tamdiu quousque sentiunt uirtutem ueneni superatam, interim lachrymam emittunt quę coagulata in oculis interdum usque ad magnitudinem nucis defecatur donec cadit cum flumen exeunt, & sic inueniuntur & dicitur omnium uenenorum theriacę, & uerisimiliter deberet liberare à pestilentia.

Sunt etiam præter suprascripta alię medicinę bezahartice ualde excellentes, sicut tormentilla, dicta

num, pimpinella quæ sunt supremæ contra pestilentiam, de quibus feci mentionem in tractatu meo de pestilentia.

DE TREMORE CORDIS.
CAP. LXXIII.

Quid nominis tremoris cordis est satis manifestum. Est autem descriptiue pernes A. motus tremulus accidens cordi & manifestum est ut dictum fuit superius quod sub tremore cordis comprehenditur pulsus eius qui qualiter differant si propriè sumantur dictum fuit superius. Species non habet nisi modos quosdam secundum magis & minus differentes, ut quia aliquis chronicus, aliquis magnus, ita ut à circumstantibus audiat sonitus quidam & uideantur panni regentes pectus eleuari, quidam paruus, item aliquis continuus, aliquis interpolatus. Item aliquis cum magna debilitate & maximè pulsus diuersitate, aliquis nō, licet nō euacuetur à quadam pulsum diuersitate.

Causæ tremoris cordis, sunt omnia quæ lædunt cor notabiliter, ita tamen ut non perducant ad syncopim. Causæ autem lædentes per essentiam sunt mala complexio cuiuscunque generis sine materia quæ facit tremorem, cor debilitando, & omnis debilitas apud A. efficit in corde (donec perseverat in ipso uirtus sufficiens) agitationem quandam, ut expellat ab ipso nocumentum, aut quia nō potest continuare uniformiter motum suum, quare fit motus tremulus, aut quia uirtus facta debilis est apta pati à quacunque facili causa quare frequenter accidit tremor. Sed contra sequitur quod mala complexio facta, nō sensu percepta sicut in hēcticis potest esse causa tremoris, qui erit continuus propter primā causam, sed propter secundā erit ualde frequens, consequens contra experientia.

Respondetur quod mala complexio facta in corde non est sola causa tremoris, nisi ducat ad ultimam debilitatem, cum qua cor non possit complere motum suum uniformiter, sed mala complexio diuersa quæ sentitur bene potest esse causa tremoris, etiam cum cōstātia uirtutis, huius autem diuersitatis causa est, quia tremor cordis qui sequitur solam debilitatem uirtutis, absque tristi sensatione, fit à uirtute uitali debili, nō potente complere dilationem cordis uniformiter. Sed tremor qui sequitur tristē sensationem & malam complexionem diuersam fit à uirtute expulsiua naturali ipsius cordis, commouente cor ut expellat nocumentum: sed bene uerum est quod mala complexio facta debilitando cor, est causa ut ipsum facile incurrat tremorem cordis, propter aliquod nocumentum impressum ab ipsa sensatione, quod non incurret nisi esset debilitatū, quia fortis uirtus omnia contemnit, & consequenter conceditur quod debilitas sola non est causa tremoris, sed debilitas cum nocumento impresso sensato, licet debilitas principalis concurrat, sicut etiam in tremore stomachi debilis, sumpto bono cibo cum mouetur ad amplexandum ipsum motu tremulo, uirtus debilis est cū magis quia cibis bonus. Et notandum secundum Auer. Tertio Colliget, de accidentibus spiritus tactus quod mala complexio diuersa in habente hēcticam non sentitur nisi per malam complexionem frig. retinentem adhuc aliquid naturalitatis, unde hēcticus sentit calidit,

additam post cibum per hēcticam suam. Fit enim tremor à mala complexione cum materia sanguinea, & melanch. quæ frequenter facit tremorem, quia multum horrida cordi, et cuius minera est propè cor, scilicet splen directè cordi suppositus à quo profluit melanchol. ad os stomachi, item mirach et mesenterium, in quorum uenis reperitur multum de melanch. sunt satis propinqua cordi.

Item materia humid. aliquando est in causa, & uetosa aliquando, & est leuior cæteris si sit subtilis, & nō habens materiam à qua eleuetur. Materia autem cholericæ sui acuitate magis facit syncopim quàm tremorem. Similiter mala compositio, oppilatio existens in curribus sang. et spiritus in corde et origine uenarum & artiarum eius aut malus situs cordis sequens compressionem apostematis capsulæ aut multitudinem aquæ in ipsa contentæ, et similiter solutio continui in corde, & apostema faciunt in principio apparere tremorem, deinde syncopim, postea mortem, sed de his superius. Factus autem subtilitate sensus cordis cognoscitur, quia habenti ipsam accidit tremor cordis ex qualibet uetustate generata in spatio quod est inter ipsum & panniculum eius, aut in corpore pancreatici aut in uena eius. Et ex qualibet qualitate calid. aut frig. adueniente ei, ita ut succedat potius aq. præter quod perducatur ad debilitatē in operatiōibus suis. Factus autem per communitatem aut est à toro, sicut in febribus & propriè pestilentialibus, aut in crisi, cū materia mouetur, aut à doloribus fortibus in quacunque parte corporis aut cum communitate pancreatici sui, scilicet capsulæ, si accidat in ipsa apostema molle aut durum, sicut accidit simio & Gallo per Ga. anar tomizatis.

Et quandoque accidit cum communitate stomachi, & propriè oris, quando in ipso est humor uiscosus, uitreus, & mordacitius, cholericus, aut cibus corruptus, aut bothor in ore eius, aut propter attractionem materierum ad stomachum, siue apostemem succedentiū labori, id est dolori eius. Dolor enim stomachi potest facere tremorem cordis tã per se quàm attrahendo materias ad stomachū. quæ erit causa tremoris. Et per communitatem stomachi est aliquando tremor tantus, et ita continuus ut non discernatur inter ipsum & illum, qui est per essentiam in corde, & quandoque accidit tremor in ore stomachi similis tremori cordiali, & fortasse perducit ad ipsum. Fit autem tremor in ore stomachi duob. ex causis, aut quia uirtus expulsiua oris stomachi concutit ipsum ut expellat nociuū, aut quia uirtus naturalis stomachi debilis mouetur motu tremulo ad amplexandum & cōstringendum se supra cibum ut melius digeratur.

Et fit aliquando cum cōmunitate pulmonis quando multiplicatur in eo oppilatio in parte illa que obuiat cordi, et non penetrat anhelitus secundum quod debet, & indicat constrictionem anhelitus non secunda, cum quandoque accidat subita suffocatio & mors, & cut aliquando accidit in paroxysmis asthmatis. Et quandoque accidit per communitatem ab alijs membris, sicut diaphragmate & reliquis partibus pectoris, & à splene, cerebro, gutture, transmittentibus materiam & uapores malignos. Et quandoque per communitatem ab intestinis propter uermes corruptos in ipsis effumantes ad cor, & quia uermes aliqui mouentur

ad superiora & nocent ori stomachi, & aliquando perforant intestina. Et fit aliquando per communica-
tem ab epate transmittente humorem aut uaporem
malignum, aut non transmittente sang. sufficientem.
Similiter accidit per communica-tem à matrice, uapo-
ribus spermaticis aut menstrualibus, aut aliter mali-
gnis effumantibus ad cor, & quandoque matrice
ipsa ad superiora mouetur, est causa præfocationis &
quandoque fit à causis extraneis, sicut à potu & mor-
tu uenoforum & quandoque fit ab accidentibus a-
nimæ fortibus, foetore, corruptione aëris, & sic de sin-
gulis causis primitiuis potentibus in cor imprimere.
Signa communia cuiuscunque tremori cordis sunt,
pulsus diuersus ualde in magnitudine, paruitate, uelo-
citate, tarditate, frequentia, & raritate, & multotiens
similatur pulsui habentium asthma & peripneumo-
niam, & tangendo pectus ex directo cordis sentitur
diuersitas motuum cordis proportionata diuersitati
motuum pulsus. Similiter aspiciendo arterias quæ
sunt in collo uidetur aliquando in motibus earum ma-
nifesta diuersitas, & aliquando sonitus quidam audi-
tur sequens diuersitatem motui ipsius cordis, & pen-
dens ab humid. significatur per lenitatem pulsus, &
lenit habens eam quasi cor eius sit positum in humi-
ditate, & si sit humiditas multiplicata in capsula
comprimens ipsum præter hoc quod sentit cor eius
positum in humiditate sentit ipsum in eadem suffoca-
ti. Sed siccitas superflua significatur per duritiem
pulsus.

Et si fuerit consumptio humid. existentis in capsu-
la, corpus arebit & exsiccat in dies absque febre, & fa-
cius à calidit. superflua singulari significatur per in-
flammationem in corde sentitam, si non est fixa, & si
fixa fuerit per inflammationem sanatam ante fixio-
nem, & pulsus & anhelitus sunt magni, ueloces, & fre-
quentes etiam extra horas tremoris, & præcesserunt
causæ calefacientes sicut febres sientes & factæ, motus
fortes, & similes. Factus à frigore significatur per
causas suas ex extinguentibus calorem innatum tam
per se sicut aëris frig. ægritudines infrigidantes & si-
milis, quàm per accidens, sicut euacuationes extin-
guentes calorem innatum, et adest sentatio frig. in cor-
de nisi sit fixa, & pulsus & anhelitus parui, tardi, & ra-
ri, etiam extra horas tremoris. Et malæ complexio-
nes compositæ habent signa composita, sicut habens
caliditatem in unam humi. cum hoc quod habet pul-
sum & anhelitum magnum, uelocem, et frequentem,
habet ipsum lenem, et sentit quasi cor eius sit positum
in humiditate, & per reliqua tu discurre, & omnes hu-
iusmodi malæ complexiones cognoscuntur, quia le-
duntur à simili & contrarijs iuuantur. Sed tremor
sanguineus significatur per magnitudinem & ueloci-
tatem pulsus & anhelitus cum leuitate pulsus & ple-
nitudine eius, etiam extra horas tremoris, & sentitur
calid. & inflammatio, & iuuatur coitu, quia sangui-
nei aggregant multum semen quod corruptum mul-
tiplicat malos uapores cordi, & etiam per coitum
temperat malos uapores cordi, & etiam per coitum
tur superfluitas quant. & remittitur calid. superflua.
Item est plenitudo & tensio uenarum & multitudo
urinae cum crassitie, & color & habitudo attestantur
sanguin. Item complexio, regimen præcedens &
similia, & iuuatur minutione, Sed melancholiæ sunt

signa contraria & cum tristitia & sollicitudine ut eo-
rum qui sunt in terra aliena cum recordatur suorum.

Sed cholicum, qui tamen raro accidit, signifi-
cant causæ calefacientes & exiccantes præcedentes æ-
gritudines cholicæ sequentes, & est pulsus & anhel-
itus magnus uelox & frequens cum duritie pulsus, et
est uehementia inflammationis, & iuuatur frig. & hu-
midi, & nocetur contrarijs, & sunt huiusmodi co-
lor, regimen, habitudo, tempus anni & cætera huius-
modi attestantia cholerae, sed phlegmatici sunt signa
contraria, & iuuantur fame & siti & exercitio.

Et uentosum purum significat uelocitas termina-
tionis eius, paucitas nocimenti eius, & diuersitas in
pulsu, & nocetur à multiplicantibus uentositatem,
& iuuatur à contrarijs. Factus autem ab oppilatione
significatur per diuersitatem pulsus in magnitudine
& paruitate, tarditate & uelocitate per huiusmodi e-
nim distinguitur à diuersitate pulsus sequentis uirtu-
tis debilitatem, cum uirtus multum debilis non pos-
sit facere pulsus magnum, & similiter est diuersitas
in fortitudine & debilitate quæ non potest continge-
re à uirtute debili, cum non possit facere pulsus forte-
m, & est cum priuatione signorum repletionis, &
hoc maxime uerificat cum oppilatio est in locis pro-
pinquis cordi & uenis eius. Sed tremor sequens ma-
lum situm, scilicet compressionem cognoscitur, quia
sentitur cor suffocari & constringi.

Solutio autem continui cognoscitur per causas su-
as, scilicet tremor sequens ap. in substantia sui cor-
dis, aut sui panniculi cognoscitur per signa superius
dicta, immediate post anaromiam, & præter signa i-
bidem dicta cum ap. calido in substantia cordis ad-
est maxima inflammatio, & diuersitas mirabilis in
pulsu cum feb. maxima, et si fuerit profundum inter-
ficat in hora, si uero superficiale tardatur mors usque
ad secundum diem, & si fuerit frig. non adest tæta in-
flammatiō, & si fuerit superficiale tardatur mors usq;
ad quartam diem. Si uero profundum usq; ad secun-
dum ut plurimum, tamen in corde sunt calidi, sicut in
capsula, ut plurimum frig. mollia aut dura, & cogno-
scuntur, quia non cito interimunt, immo aliquando
chronicantur, tandem tamen interimunt, & cogno-
scuntur præter signa superscripta calida & frig. per
complexionem, calorem, habitudinem, & regimen
præcedens, etatem, tempus anni, & similia. Factus au-
tem ab acuitate tantum sensus cognoscitur, quia sit à
qualibet uentositate & quacunque causa facili, & est
cum fortitudine pulsus & sanitate anhelitus, & inco-
lumitate reliquorum membrorum, & fortitudo pul-
sus & magnitudo ipsius sunt significationes primæ
significantes ipsum & certificant ipsum. Si fuerit cor-
pus cum frequentia huius tremoris incolume, & uir-
tus conseruata, est consuetudo operationibus sana &
illi quibus plurimum accidit illi sunt propter quorū
facies apparent uestigia passionum animalium, sicut
iræ, tristitiæ, & aliarum quibus uestigia sint remissa. Ista
autem uestigia passionum animalium apperentia su-
per facie sunt sicut mutatio coloris ex rubeo in palli-
dum, & e contrario, secundum diuersos motus spi-
rituum & sanguinis nunc intra nunc extra secun-
dum exigentiam passionum, hæ enim mutationes
quàmuis remissæ arguunt passionem animales facien-
tes tremorem cordis. Factus autem per commu-
nitatem

nitat^e in toto sicut in feb. declaratur per febres ipsas, cum quarum augmento augetur & decremento decrescit, & similiter criticus per crism ipsam qua finita sedatur, sed factus à doloribus significatur per dolores ipsos, cum quorum augmento augetur, & decremento minuitur, & ablatione auferitur. Signa autem facti per communitatem à capsula ex dictis sunt manifesta, factum causa stomachi significant malæ dispositiones stomachi et nocumentum appetitus & aliarum uirtutum eius, item quod expellitur ab ipso stomacho maxime per uomitum, item imaginationes per eleuationem uaporum non solum ad cor immo etiam ad cerebrum, & nausea & subuersio, item alleuiatur cum abstinet à cibo nisi sit à materia cholerica effusa ad os stomachi tempore uacuitatis, tunc enim magis fluit & acuitur, & fit uehemens quando cibi incipit digeri uaporibus pluribus cordi communicatis propter laborem uirtutis digerentis. Discernitur autem tremor stomachi à cordiali, quia hic sentitur in regione stomachi, ille in corde, et præcesserunt & adsunt nocumenta stomachi & non cordis sicut in cordiali præcesserunt & adsunt nocumenta cordis & non stomachi. Et factus per communitatem à pulmone cognoscitur, quia præcesserunt & adsunt nocumenta pulmonis sicut asthma, peripneumonia etc. Et sunt signa oppilationis pulmonis sumpta ex constrictione anhelitus, & cæteris, de quib. supra in proprijs cap. Similiter factus à communitate epatis, splenis, matricis, intestinorum, & reliquorum membrorum significatur per nocumēta ipsorum quæ adsunt & præcesserunt, cum quorum augmento augetur & decremento decrescit & ablatione auferitur. Factum autem à uenenis sumptis à morsu uenenosorum & reliquis causis primitiuis significant causæ ipsæ cum priuatione reliquorum signorum. Prognostica.

Tremor cordis quando superfluit permutatur ad syncopim, et quādo magis superfluit permutatur ad mortem. Secundum. Si quis conqueritur de tremore cordis post ægritudines, & habet nauseam & uomit choleram plurimam, & non remouetur nausea, est malum & indicat spasmus in stomacho.

DE SYNCOP. CAP.
LXXV.

Syncopis græcè quasi confusio & amputatio latine. Lipothymia dicitur à λιπο quod est deficitio & θυμος animus. Inde lipothymia, deficitus animositatis. Sed quid nominis casus uirtutis subito, est satis manifestum. Subito enim importat duo, scilicet tepus inperceptibile & causam nō manifestā. Syncopis tamen apud A. destructio est maioris partis, plurium uirtutum, motiue & sensibilis propter debilitatem cordis, & aggregationē spiritus totius ad ipsum propter causam mouentē eum ad interiora, aut propter causam præfocantem ipsum interius, quare non inuenit spiraculum, aut propter paruitatem & subtilitatem suam quare non superfluit super illum qui est in minera. Dicit primò quod syncopis est destructio maioris partis plurium uirtutum motiue & sensibilis, non quidem secundum suam essentiam, sed destruntur quia impediuntur ab exitu in suas operationes. Virtutes enim secundo Colligat sunt nobis parum notæ, operationes autem notæ multum, quare

necessarium est ut uirtutes per operationes notificentur. Dicitur maioris partis plurium uirtutum, non enim operationes omnes motiue destruntur, sed solum motiue uoluntariæ quæ perficiuntur per nervos & lacertos non autem naturales sicut motus cordis, nec mixtæ ex naturali et uoluntario sicut motus diaphragmatis & pectoris nisi quando esset mors propria. Sensibilis autem extrinseca, tota destruitur, sed intrinseca siue operatio cogitatiue apud aliquos non totaliter destruitur. Per reliquas partes in diffinitione positas ponit tres causas immediatas syncopis. Prima est debilitas cordis sequens aliquod forte nocumentum sicut dolorem, solutionem continui, malam complexionem, malam compositionem, apostema & similes, quibus debilitatur cor per essentiam uel per communitatem, quæ debilitas est causa ut spiritus uitalis totus, uel ferè totus in corde aggregetur propter causas mouentes ipsum ad cor, quæ est uirtus attractiua ipsius cordis & naturalis subordinatio spirituum ipsi cordi. Quapropter membra extrinseca depauperata spiritibus, sunt in potentia ad operationes sensus & motus.

Secunda causa immediata est præfocatio spiritus in corde tanta ut non inueniat spiraculum, ita triplex neque cor possit sufficienter euentari, neque spiritus cordis transire ad alia membra, quapropter necesse est uirtutem sensibilem & motiuam multum minui in ipso corde & in membris alijs destrui, cū oporteat uirtutem uitalem ad quamcunque operationem concurrere.

Hæc autem præfocatio immediatè sequitur prohibitam transpirationem, & prohibita transpiratio oppilationem, quæ potest esse coarctatoria ab autore multo aut crasso, & uiscoso, ita ut aer sufficiens non possit ingredi ad cor per ipsius dilationem, & arteriarum constrictionem, neque uapores fumosi possunt egredi, neque spiritus ad membra transire per ipsius constrictionem & arteriarum dilationem. Hæc autem oppilatio erit in origine arteriæ aorti, aut arteriæ uenalis, & potest oppilatio esse attenuatoria propter causam cōprimentem cor, sicut capsula cor dis apostemata, aut superflua aquositate repleta, & propter apost. in ipso corde attenuans foramina, ipsa coarctando, aut fortè humor, aut uapor malignus lædens uirtutem motiuam cordis, quapropter non possit ipsum sufficienter dilatare & constringere. Oppilationem autem carnosam credo rarissimè contingere. Tertia causa immediata est paucitas & subtilitas spiritus, quare non superfluit super illum qui est in minera, id est in corde.

Alia autem membra erunt sine spiritu naturali saltem sufficienti ad sensum & motum. Hæc autem paucitas sequitur omnes causas resoluentes, & quomodocunque spiritus paucificantes sicut famem, morercitia, balnea, euacuationes aërem, malignum, motus uenenosorum, febres prolixas, & similia &c. Lipothymia autem descriptiue est destructio minoris partis plurium uirtutum motiue & sensibilis propter tres causas in syncopi explicatas, aut aliquam earum, sed diminutas in comparatione ad causas syncopis, ita ut lipothymia sit uia in syncopim, sicut syncopis est uia in mortem. Est enim ut sonat quid nominis deficitus quidam animositatis sensum

sum & ad motum. Casus uirtutis subito apud A. est destructio maioris uel notabilis partis uirtutis motu uoluntariae absque nocumento notabili in uirtute sensibili, aut in motu naturali aut mixta, contingit propter defectum in uirtute uitali in tempore ualde paruo & absque causa multum manifesta, propterea dicit A. hoc plurimum contingit ubi non est dolor neque solutio uentris, neque apostema, magnum, neque euacuatio magna, & sic de alijs causis manifestis. Et haec dispositio licet contingat propter defectum spiritus & uirtutis uitalis, tamen est passio uirtutis animalis, quae debetur instrumentis motu uoluntariae, causa immediata huius casus uirtutis est defectus spiritus uitalis in instrumentis uirtutis motu uoluntariae, per quem licet notabiliter minuatur motus, non tamen sensus, cum pauciores spiritus & magis subtiles sufficiant ad sensum quam ad motum. Causa autem paucitatis & subtilitatis spirituum in instrumentis motu uoluntariae est, aut quia a corde non transmittuntur, quod potest esse propter oppilationem in uis transduque oppilatur uiae anhelitus, quae oppilatio plurimum fit ab humore phleg. liquefacto subito fluens ipsius, scilicet in uenis & arterijs, ita ut etiam quantum ad uias transitus, non autem ita ab humore melanch. cum non sit aptus propter suam terestritatem ita facilliter liquefieri & fluere ad uenas angustas, nec ab humoris cholero qui propter suam subtilitatem et paucitatem non sit aptus ita facilliter oppilare. Neque ita frequenter ab humore sang. quia sang. fluens multo citius suffocat & interficit sui multitudinem, item fluens extra locum naturalem facit synocham, et facilius putrescit quam ceteri humores fluentes extra locum naturalem. Quapropter est raro causa solius casus uirtutis & synopis. Et aliquando cor etiam non existente oppilationem non transmittit spiritus propter nocumtum proprium, aut per communiter, cuius causa non est ualde manifesta, imo potius retrahit ipsos ad se. Communitas autem frequenter est a stomacho. Et aliquando causa casus uirtutis est spirituum & humorum subtilitatio in substantia sua, & quia recipiunt resolutionem, & proprie in feb. Est ergo hic casus uirtutis apud A. dispositio quaedam infra synopim, propterea quandoque antecedit synopim, quandoque subsequitur, ubi uirtus non destruitur nisi a neruis & lacertis ipsis existens ab ea uacuis, quare homo fit non motus nec remouetur a suo situ, & dormitione sua, id est, dispositione simili dormienti nisi cum laboramus. Nam cum uehemens sit, facit cadere uirtutem neruorum integrum, & sic fit synopis aut mors. Et si non uehemens facit cadere uirtutem neruorum et lacertorum, & sic sequitur casus uirtutis. Differentia autem inter casum uirtutis, & lipothymiam est, quia lipothymia non connotat quod fiat subito, id est, in tempore incepto & sine manifesta causa sicut connotat casus uirtutis subito.

Et secundo quia non connotat quod fiat sine manifesta lesione uirtutis sensibilis, sicut connotatur per casum uirtutis. Differentia uero inter casum uirtutis & synopim patet ex dictis, est enim minor synopis antecedens eam, & transit in eam cum intenditur. Item sequitur ad synopim cum synopis remittitur. Hi tres termini quandoque accipiuntur ut synonymi.

Causae immediatae synopis sunt illae tres quae sunt in diffinitione expressae, scilicet attractio totius aut maioris partis spiritus ad cor, secunda praefocatio spiritus in corde, ut non inueniat spiraculum, tertia paucificatio spiritus in toto ut non superfluat praeter illud qui est in minera: omnes autem aliae causae numerandae praeter has inducunt synopim mediante aliqua aut pluribus ex istis. Causae ergo synopis sunt mala complexio in corde cuiuscunque generis siens aut facta sine materia aut cum materia cuiuscunque generis si notabiliter imprimat in cor. Item dolor cordis, pustula parua leuissima, solutio continui cum paucissimo sanguinis fluxu, & paucissima spirituum resolutione sunt causa, ut cor nocitum et debilitatum attrahat spiritus totius ad se. Sed apostema notabile in corde facit synopim, spiritum praefocando. Solutio autem continui notabilis in corde mediantibus his tribus causis est causa synopis, sed oppilatio in corde, & malus situs eius facit synopim spiritus & cor praefocando, & similiter multitudo sanguinis & aliorum humorum existens in corde per communiter uero aut a toto sicut cum corpus est repletum sanguine & alijs humoribus superfluentibus in quanto, & est repletio quo ad uasa, tunc materia subito fluens ad cor est causa synopis praefocando. Et aliquando humor existens in toto aut in uenis magnis peccas qualitate maligna, manifesta uel occulta absque multitudine fluens ad cor aut effumans est causa synopis, aut praefocando, aut spiritus attrahendo. Et quandoque oppilationes existentes in toto sunt causa synopis, quae non sunt solum a multitudine, sed crassitie & uiscositate. Et mali humores multiplicantur ex malo & superfluo nutrimento, & malitia digestionis, quapropter sparguntur in corpore, replent uenas & oppilant meatus, & priuatur corpus nutrimento, & non sunt apti conuerti in nutrimentum, quoniam propter suam malignitatem & multitudinem habent proportionem supra naturam, & cum hoc complexio corporis corrumpitur. Et quandoque communitas est a toto, ut in febris, maxime pestilentialibus mittendo ad cor uapores putridos maligna putredine. Item in synopali minuta mittendo ad cor uapores cholericos & acutos, etiam malignos qualitate occulta, aut etiam manifesta, repentes ad os stomachi, quod maxime contingit in principio paroxysmi. Item in synopali humerosa propter uapores frigid. uitreos cor infrigidantes in principiis paroxysmorum, & etiam quia corpus non nutritur, cum ipsum phlegma uitreum non sit aptum conuerti in substantiam nutriti, & etiam ita oppilet ut bonus sanguis non possit ad membra penetrare. Item in crisi fit aliquando synopis propter uapores a materia agitata ad cor eleuatos, et quia materia fluit aliquando ad aliqua membra nobilia, quibus cor comparat, aut quia fit superflua euacuatio. Item per communiter a doloribus. fortibus in quacunque parte corporis fuerint, item euacuationes fortes resoluentes spiritus sicut sudores, quaecunque aliae euacuationes fortes, siue a toto, siue a membris particularibus sicut fluxus sanguinis narium hemorrhoidalis, menstrualis per phlebot. aut per aliam solutionem continui. Item solutio uentris, nimis uomitus, sicut in cholera passione. Item fluxus nimis aquosus uentre secto in ascite, aut plurimae saniei secto pectore

pectore in empymate aut quocunque alio apostemate magno nimia sanie fluere. Item resolutio superflua insensibilis sequens raritatem pororum & humorum subtilitatem & similes causas. Fames quoque superflua in infantibus & decrepitis, deinde in iuuenibus & conualecentibus magis quam decedentibus, quia aegri & sani incurrunt syncopim ex fame. Et omnia corpora sic subtilium humorum, larorum pororum et acuti sensus facile ex fame incurrunt syncopim, & in aestate difficilius tolerant quam in hyeme. Item nimia macies et extenuatio. Per communitatem uero à membris particularibus sicut à cerebro: nam cum in eo accidit oppilatio integra, & est apoplexia fit syncopis proculdubio. Sed per communitatem à stomacho fit frequenter propter tria. Primum, quia est propinquus cordi. Secundo, quia uehementis sensus. Tertiò, quia est minera collectionis humorum diuersorum, quare facit euenire syncopim, quia in frigidat ualde sicut in bolismo, aut quia calefacit ualde, aut quia dolorem efficit ualde. Et hæc sunt propter præsentiam materię calidæ, aut frigidæ, ulcerum bothor, aut apostematum in eo, et propriè in ore eius. Et quandoque causa syncopis est permutatio materię, synanchiæ, pleureis, peripneumonix ad partes cordis subito. Et quandoque est propter uiscositatē materierum in poris, quare oppilat meatus, & propriè in membris anhelitus, & quandoque per communitatem à splene cum superfluit mittendo melancholiam ad os stomachi, & similiter per communitatem à mirach, aut mesenterio mittentibus uapores melancholicos ad cor. Item per communitatem ab intestinis, maxime cum in eis superfluunt uermes mortui, aut uiuentes, quia quandoque ascendunt ad os stomachi. Item per communitatem à materia maxime cum sit præfocatio mēstrualis aut spermatica. Item per communitatem ab epate mittente sanguinem, & humores superfluos suffocantes ipsum, aut mittendo humores, aut uapores malignos sua qualitate manifesta aut occultata. Item per communitatem à capsula cordis cum apostematur, aut superflua aqua repletur, & idem est iudiciū in cæteris membris quib. cor potest compati, aut propter fortem dolorem, aut quia non transmittit quod deberet transmittere, aut quia transmittit humores, aut uapores superfluos, aut malignos consequens ulcera membrorum aut apostemata, aut corruptiones ipsorum membrorum, aut materierum existentium in eis. Causæ autem primitiue sunt sicut uenena sumpta & morsus uenenosorum. Item aer malus inspiratus sicut pestilentialis & cadaverum foetentium & foearum quæ diu steterunt clausæ & aperiuntur. Item superflua uigilia & exercitia fortia & continua. Item nimia inanitio & repletio. Item accidentia animi exterminantia sicut timor, tristitia, gaudium, & huiusmodi cum superfluunt. Sed hic notanda sunt aliqua. Primum cum aliquis in consuetum syncopizare in phlebotomijs syncopizat, phlebotomia non existente superflua patitur aliquam ægritudinem in stomacho, uel habet stomachum debilem uel nimium sensibilem facile susceptuum materierum, quorum nullum ante habuit. Secundo notandum, quod quando materia decrepiti febris eliquatur & fluit ad stomachum, facit syncopim, aut sui frigilitate, aut sui caliditate putredinali, & hoc magis accidit in ipsis decre-

pitis, quia materię eorum sunt magis apte dissolui & moueri ad interiora quam resoluti, aut moueri ad exteriora, quia febres senum sunt sepultæ. quarta primus, capitulo de rigore. Tertiò notandum, quod causa quare aliquis syncopizat in prima phlebotomia, est quia occurrit sibi aliquod in consuetum faciens agitationem in sanguine, unde cor patiens propter illorum agitatione attrahit spiritus ad se, aut forte cholera agitata repit ad stomachum, cui cor compatiuntur hoc autem magis accidit in prima phlebot. propter timorem rei nondum expertæ. Sed contra hoc debet magis accidere his qui uulnerantur propter causas præscriptas, consequens contra experientiam. Dicitur quod non accidit illis qui primò uulnerantur, quia sunt intenti ad fugam uel ad persecutionem, unde spiritus & humores non concitantur ad stomachum nec ad cor, sed ad instrumenta motus, &c. Ultimo notandum, quod multo rariore est phlebotomia causa syncopis propter in frigidationem quæ est priuatiue propter sanguinis & spiritus euacuationem, & positiue propter ingressum aeris frigidi circumstantis, & tertiò fit melior euentatio sang. et spirituum sang. euacuato, unde 4. primi cap. de cura syncopis. Syncopis in frigidat complexionem fortem. Signa attendenda sunt. Primò illa quibus ponitur differentia inter syncopim, subeth, apoplexiam, epilepsiam, congelationem, præfocacionē matricis, quæ dispositiones multum conueniunt: hæc autem ardentius posita fuerunt in cap. de apoplex. Secundo attendenda sunt signa propinqua syncopis. Sinon accidit subito. Primum est minoratio pulsus spiritibus transitis interioribus. Secundum est pallor existeris in facie, sanguine petente interiora. Tertium palpebre non eleuantur paucicatis in musculis earum spiritibus motu uictibus eas. Quartum apparet in oculis debilitas motus & liuedo propter eandem causam. Quintum uisui apparent imaginationes non consuetæ, tum ex inordinato motu spirituum, tum ex uaporibus ad ipsos eleuatis in agitatione sanguinis, cum conuertuntur ad interiora. Sextum in frigidantur extrema primò postea totum corpus calore amplius conuerso in calidius. Septimum apparet ros quidam frigidus in corpore quibusdam humiditatibus subtilibus per poros calorem depauperatis fluentibus exterius per poros cutis debilitata contentiua, uel forte ex congregatione & suffocatione & ignitione caloris ueniens quædam effusio, unde uapores quidam ueniunt ad cutis superficiem condensantur à frigiditate cutis & continentis in humid. quadam apparet in forma ros in cutis superficie. Octauum, impotentia ad loquendum & coeteros motus ex defectu spirituum in inferioribus motus. Nonum, fit quædam nausea ore stomachi cordi compatiante, uel ipso a quo citò sentiente nocuentū sicut & cor propter acuitatem sui humorum, uel forte in agitatione humorum aliqui humores profluunt ad ipsum. Præterea medici sunt attentissimi phlebotomant, soluunt, incidunt, urunt, extrahunt in niem, aut aquositate cum uident ista signa, debilius ab illis operationibus & remoueant causam futuræ syncopis: & si acciderint hæc signa futuræ syncopis in principijs paroxysmorum, aut in quibuscumque alijs casibus, prouideant secundum oportunitatem, ne syncopis confirmetur.

Signa

Signa causarum debilitantium resoluendo spiritum & paucificando ipsum, notificant ex præcessione euacuationis. Item ex diuersitate pulsus uehementi cum uicissitudinibus ex prauitate maxima. Signa autem causarum suffocantium sunt, quia sentit eger cor suum suffocari, & præcesserunt causæ suffocantes non inanes, & permutationes materierum de membris alijs ad cor, & pulsus est significator horum: nam cum est profundus uirtute constante significat materiam comprimentem, & cum uirtus non constat significat mortem. Signa causarum syncopis per retractionem spirituum ad cor sunt, quoniam absunt signa causarum inanitionum & suffocationis, de quibus statim dictum fuit, & pulsus non est cum tanta paruitate et diuersitate sicut, cum syncopis sequitur inanitionem, nec cum tanta profundatione sicut cum syncopis sequitur suffocationem, & hoc signum attendendum est in principio, non autem cum syncopizatus appropinquaret morti. Signa causarum syncopis per essentiam habentur per abnegationem aliarum causarum, tam primitiuarum quam per communitatem. Et secundo per signa debilitatis & alicuius nocumenti cordis per proprietatem, quæ ex dictis in tremore possunt esse manifesta. Tercio, quia frequentas syncopis si causa sit fortis & fixa. Vnde Hippo. 2. Aphor. Aphor. 4. Quicunque exoluntur fortiter et frequenter sine manifesta occasione, repetite moriuntur, id est, qui syncopizant frequenter & fortiter, id est, completa syncopi sine manifesta causa, scilicet, primitiua, aut per communitatem, subito moriuntur: significat enim fortem & fixam causam esse in corde, unde licet pluries euadant tandem moriuntur. Tremor quoque frequens & continuus significat nocumentum per proprietatem nisi pendeat à nocumento oris stomachi, aut capitationis, mali litus, solutionis continui, pustularum, cap. de tremore cordis. Eadem tamen causæ cum debilitate imprimunt in cor, faciunt tremorem, & fortiter imprimuntur facit syncopim, ultimare uero mori in corde sunt, quia apparet habet eam cor suffocari, signa superius dicta in tremore cordis. Signa autem syncopis per communitatem ab alijs membris, sunt quia præcesserunt nocumenta aliorum membrorum, cum quorum cimento crescit, & diminutione diminiuit, & ablatione aufertur. Signa autem causarum primitiuarum sunt ipsæ causæ. Signa autem oppilationis & repletionis, tam quo ad uasa quam quo ad uirtutem, tam in toto quam in membris particularibus. Et signa domini cuiuscunque humoris: si non sufficiat quæ dicta sunt in capitulo de tremore cordis, perquiratur ab Auic. secunda primi, in capitulo proprijs.

Prognostica. Primum syncopis confirmata, id est, existeris in ultima sui malitia, non recipit curam, quia tunc quando perducit ad uiriditatem faciei significat omnino debilitata uirtute motiua. Hic enim taliter syncopizatus fortasse non eleuabit caput ut inspiret aërem, natura agente secundum ultimum conatum dum caput eleuabit morietur, unde constructio pecto-

ris quæ sequetur, fiet à membri grauitate, non à uirtute. Secundum, est Aphorismus statim allegatus, quicunque frequenter, &c. Tercium, syncopis etiam frequens sequens nocumenta matricis, & aliorum membrorum cordi communicantium secundum plurimum est salua, nisi causa sit ultimare fixa.

SI cū cordis tremore fuerit pulsus uel Scitas, & febris. Aeger ex basilica est minuendus. Et trochisci confortati cū suc. malorum acetosorum in potu sunt tribuendi. Qui recipiunt spodij, sem. cucur. citrulli, endiuia, lactuca, portulaca, ros. sandali al. omniū partes æquales. Et pro unoquoque pondere aurei unius ex eis sumatur, cāphoræ trium grā. hordei pondus. Ex quibus cum succo macianorum confectis fiant trochisci. De quibus in potu quotidie unius aur. pondus tribuatur. Quod per duas hebdomadas fieri conuenit. Si autem hæc non suffecerint, lac de quo butyrū sit extractum ad bibendum detur. Ipse uero nutritur ex pullis cum aceto & suc. uua acerbæ, & ex aceto sa. Syrupum præterea acet. de sacch. factum bibat. Si autem cum tremore cordis non fuerit feb. trochisci musc. in potu sumantur. Qui recipiunt mastichis, spica, xiloadoes, cinam. garioph. galliæ musc. nuc. musc. cubebæ, cardā. maioris, helbanæ, corticū citri omnium ana. pondus i. aur. musci sextam drach. unius, ex his omnibus cum uino bene redolente conspersis fiant troch. et conferunt syncopi & tremori cordis. Eleluariū diamusc. præciosum quod est ad syncopim & tristitiam, cordisq. tremorem et tædium faciens. Rec. cinamomi sem. ozimi, garioph. sem. melis. sem. sisimbrij sem. sampuci, macropiperis, omniū partes æquales. Ex quibus omnibus puluerizatis drach. 10. sumatur. margaritarum minutarū, coralli rub. cubebæ setæ crudæ, karabæ, been albi & rub. folij, omniū, an. drach. 10. musci tabati, adhibi puri, drach. s. confici-

antiquum, ut muscatellinum, maluaticum, tribianū,
& similia boni odoris, & subtilia. Et si declinet ad dul-
cedinem erunt magis amica uirtuti & similis modus
seruetur in reliquis rebus non naturalibus, ita ut totū
regimen declinet ad contrariū diaphanæ. Et sit in om-
ni dispositione cordis confortatiuum, & spiritui, &
membrorum quorum cōmunitate cor compatitur.
Secunda intentio est digestio, quam tamen necessita-
te cogere præcedit euacuatio, sicut cū materia est mul-
ta, aut maligna, aut in ipso corde, aut ipsi proxima,
forè si ad ipsum deriuatur, ubicunq; fuerit. Quod se-
pe contingit in cordis passionibus. Euacuatio etiam
sanguinis secundum plurimum præcedit digestionem.
Syrupi autem & cætera digerentia sint contraria di-
aphanæ quātum ad qualitates primas, & sint incisua,
& subtilia in materia crassa, & uiscosa, & in cras-
santia in materia subtili, & sint cōfortatiua cordis, &
membrorum quorum cōmunitate cor patitur tam
proprietate quā stipticitate tēperata. In sanguineo
igitur & cholero ualent syrup. de acetositate citri, li-
monis, deribes, de pomis, de piris, & de citonijs. Item
syrup. de agresta ros. & uiol. Aquæ uero sunt sicut ro-
sarum, uiolarum, acetosæ, nenupharis, boraginis, bu-
glossæ, lupulorum, endiuia, cichoræ, capillorum ue-
neris. Item triafandali, diaboraginarum, diabuglossa-
rum, sacch. ros. uiolaceti. Et his possunt addi coralli,
gemmæ, margaritæ. Sed in cholero declinet ad hu-
midum. In sanguineo ad sicum. In frigido uero phle-
gmarico oxymel simplex compositum syr. acer. cō-
positus, de bifantijis, de corticibus citri. Sed in melan-
chlico, de epithymo syrup. labor, de fumoterre. A-
quæ autem sunt sicut buglossæ, melissæ, feniculi, enu-
le, rosamarinis, boraginis, & possunt fieri diuersæ de-
scriptiones syruporum decoquēdo herbas suprascri-
ptas, & addendo aromata cordialia calida aut frigida.
Tertia intentio est euacuatio aut mel secundum exigentiā.
boromia in sanguineo, & impendente ab alijs humo-
ribus peccantibus cum sanguine, quæ phlebotomia
debet fieri ex basilica dextra primò, deinde basilica si-
nistra si oportuerit. Si tamen retentio fluxus, hæmor-
rhoidarum, aut menstrualis esset in causa, inchoandū
est à phlebotomia basilicæ dextræ aut sinistræ, aut u-
triusq; Quātitas autem sanguinis hauriendi est secū-
dum exigentiā repletionis & uirtutis tolerantiam.
Imò aliquādo oportet ut sit copiosa usq; ad sycopim
excludiue, scilicet, usq; ad 28. 3. aut circa, sicut quando
timet de apostemate, aut subita suffocatiōe & mor-
te, materia multa subito ad cor fluente, aut in inflam-
matione maxima cum esset opus cor refrigerare subi-
to & notabiliter. Aegritudine tamen dante inducias
melius est ut partiat, & huiusmodi euacuationes in
remore & syncopi faciendæ sunt ante paroxysmum
ad prohibendum eius reditum. In paroxysmo autem
hæc omittenda regulariter, & magis ad diuersiones est
intendendum. In cholerico uero euacuamus cum de-
coctione fructuum, manna, cassia, diaprunis, compo-
sito & solutio, electuario de succo rosarum, electua-
rio de psilio, & similibus. Si autem timeretur de apo-
stemate præstantius est procedere cum leuibus lenien-
tibus notabiliter infrigidantibus, ne materia agitata
amplius fluat ad cor, & ante aut præparetur ad phle-

bot. nam secundum plurimum ad uitandum aposte-
ma à quacunq; causa fiat, cōueniens est phlebot. & ali-
quando in sanguineo euacuamus cum lenientib. ad
sanguinis mundificationem. In phlegmatico uero &
proprie si fuerit phlegma uiscosum confert uomitus,
cum optimè stomachum mundificet, qui est lacuna
phleg. & proprie stomacho nauseante. Et fiat post co-
mestionem incidentium, subtiliantium uiscosorum,
nauseam commouentium. Euacuatio tamē per feces
sum est conuenientior, quæ fieri debet cum agarico,
pilulis alephanginis, diaphoenicon, & similibus. In
melancholico uero si fuerit melanch. mixta sanguini
fiat phlebotomia. Sæpius autem contingit melanch.
mixta esse sanguini cum ipsa sit sex sanguinis q̄ cho-
leram aut phlegma. Euacuatio autem melancholice fit
cum sena, epithymo, mirobolanis indis, lapide lazuli,
& similibus mixtis cum suis correctiuis. Et ex com-
positis est diaphanæ, confectio hamech, pilulæ indæ, de
lapide lazuli, et similes. Optimū aut uehiculū medici-
narū soluentium meläch. est aqua lactis cum qua me-
dicinæ suprascriptæ possunt distemperari. Semper ta-
men his solutiuis est admiscendū aliquid cordiale, ut
uinum & aqua, de quibus supra, aut cū aquis cordia-
libus distemperentur. Cauendum tamen est ne ex im-
moderato usu sequat fluxus aut excoarctio. Exper-
tum Auic. ad melancholiā est ut sumantur mirobol-
nig. & chebulorum, an. pondus 3. i. epithymi 3. s. la-
pidis arm. 3. i. quartam, diamul. amari, 3. 3. sumatur
in potu cum tanto uini odoriferi cum quo dissoluan-
tur. Et quandoq; sufficit alidare administrationem
hieræ picæ pondere aurei unius, cū pondere danich,
de epithymo dādo ipsum in potu cum oxymelle cō-
posito. Quarta intentio, scilicet, diuersio perficitur cū
fortibus diuerrentibus mediocribus aut leuibus secū-
dū gradus fortitudinis eius. Est enim tremor aliquan-
do ita fortis ut sequatur stridor dēcium, contorsio o-
culorum, ablatio uocis, & similia. Aliquis est ita for-
tis sine tamen his accidentibus, ut audiatur eius pulsa-
tio ab ægro & circumstantib. Alius est qui solum tan-
gendo pectus percipitur. Et in primo casu oportet di-
uertere potenter. Et quando festinaret casus in synco-
pim, ægro fiant fricationes fortes, uentofationes, liga-
turæ, incipiendo prope cor & descendendo fiant etiā
suppositoria & clysteria secundum exigentiā. Et
si timeretur aduentus apostematis fiat phlebotomia
diuersa, sed omittatur quantum est possibile. Simi-
liter uentris solutio cum exoluentibus, ne forè mate-
ria agitata amplius fluente ad cor sequatur suffocatio
& mors, aut forè syncopis ex uirtutis dissolutione.
Tempore aut quietis phlebotomiæ, & solutiones se-
curius conceduntur, & omnia genera diuersionum,
cum quibus intendendum ad diuersionem materi-
erum & uaporum à corde, & ipsorum euacuatio-
nem, & resolutionem prohibendo accidentia ani-
mi molesta, & quæcunque possunt attrahere materi-
am & uapores ad cor. Quinta intentio est confor-
tatio cordis quæ accommodanda est omnibus inten-
tionibus suprascriptis. Imò cōplentia illa sunt confor-
tantia. Licet enim confortatio cordis sit attendēda in
omnibus aegritudinibus cuiuscunq; membri: maxi-
mè tamen in passionibus eius. Et hæc intentio cū hoc
quod cōfert, sit remotiua malæ cōplexionis, & quo-
rumcūq; nocuentorū remanentium post euacua-

cuaciones suprascriptas, quæ possunt addere in cordis debilitatem. Confortantia autem interius aut exterius applicita. Habeant singularem proprietatem ad cor. Secundò stipticitate moderata participet. Tertiò sint sufficienter contraria diserasiæ cordis & obseruatur canones suprascripti in correctione siue permutatione malæ complexionis calidæ & frig. &c. Exterius applicita in tremore calido sunt huiusmodi. *z. ros. uiol. sandalorum rub. citrinorum, et corallorum, an. 3. 1. florū boraginis & buglossæ, an. 3. 5. croci, caph. ana. gran. 6. aquæ ros. aquæ acet. aquæ florū nenupharis, ana. 3. 2. acet. 3. 1. uini muscatellini, aut alterius uini odoriferi, 3. 5. Misce.* Applicentur regioni cordis cum panno aut cendalo de grana in forma rotunda, aut quadrata satis magna, ut notabilem partem pectoris regat & replicet actu frigidum quod aut minus, aut tepidum secundum exigentiam temporum anni, & caliditatis ipsius cordis & fortitudinis aut debilitatis eius. Et possunt ex his fieri sacculi & unctiões, & emplastra ad libitū. Sed in tremore frig. *z. florū boraginis & buglossæ, an. M. 1. rosarū. meli. rorisinar. ozimi, gariophilati, an. M. s. serici, xilaloës xylobalfami beea al. & rub. zedoariae, doronigi, gariophilorū, cinamomi nucis musc. corticū citri callig. lignes, ana. 3. s. musci, ambre, an. grā. 3. aquæ buglossæ, aquæ melissæ, an. lb. mediā, uini muscatellini uel maluatini, 3. 3. acet. 3. s. Misce.* Et si opus esset contemperare caliditatem suprascriptorum his potest addere aquam roseam, sandalos, & corallus, & huiusmodi secundum exigentiam. Et potest facere unctiões cum oleo liliorū alborum, & cera, & pauco acet. i. emplastra secundum libitū. Ergo discurrere per medicinas cordiales de quib. supra, & elige calidas, frig. hum. & sic. aut temperatas secundum quod est expediens tuo proposito, & debent applicari tam tempore quietis quæ tempore paroxysmi. Et completur etiam hæc intentio cum sumptis, scilicet, syrups, aut rob. de acetositate citri, limonis, ribes, & cæteris tã à causa cal. quæ frig. dictis superius in intent. 2. ad quæ recurre. Item medicinæ Rasis expositæ superius sunt præstantes in curatione tremoris & syncopis tam à calida quæ à frig. pendentium. Et Auic. aliquas describit medicinas, quarum una in tremore non uehemēti & calido est hæc. *z. doronigi partem unam, caph. 4. partē, sandali 3. partē, margaritarum, carabæ, coralli, xilaloës, spodi rosarum an. medietatem partis buglossæ, partes 2. conficiantur cum aqua malorum, & fiant inde trochisci, dosi est, 3. usque ad aureum.* Descriptio alia Auic. fortior in extinguendo. *z. sem. lactucarū sem. endiuia, spodi rosarum, sandali, sem. portulacæ, buglossæ, coriandri sicci, coralli, Karabe, margaritarū, an. partes 2. camphoræ 4. partem, dosi sit. 3. 2.* Credo quod una sufficeret nisi in causa ualde forti, & potest exhiberi in forma pulueris cum 3. 2. aquæ ros. Sed quia in hac descriptione nihil ponitur calidū possunt addi, 3. 2. uini muscatellini. Auic. tamen in fine cap. de cura tremoris calidi ponit descriptionem mirabilem metas transcendente: dicit, quod si superfluat res, augmentet inflammationem, & timeatur quod sit uestigiū apostematis, scilicet calidi, tunc fortasse est ibi necessarium, ut in potu desemen mandragoræ & opium. Et melius quidem est ut in potu tribuas de semine mandragoræ potius quartæ 3. unam, & de opio usque ad medietatem

3. unā, permixtis cum medicamine aromatizato ex musco, xilaloë crudo, caphora, et croco, secundum uirtutē & horā necessitatis. Auic. itaq; tribuit in una dosi mediam, 3. opij, & quartam de semine mandragoræ, cum tamen ipse secundo canone capitulo de opio ponat dosim eius esse 2. danich, & sunt 16. grana hordei. Amplius in eadem recepta ponit opium duplum ad semen mandragoræ contra canones dosandi medicinas: debet enim minus eleuari in gradu potius in maiori dosi, præcipue in his de quorum exhibitione est magnus timor.

Respondet quidam intentionem Auic. esse contrarietatem medicinarum, quæ non tota exhibetur simul, sed quantum uidebitur oportunum. Hæc responsio est contraria uerbis Auic. & suæ intentioni. Respondit Gētilis, quod triplex est opium. Vnum quod colligit per refudationē ex papauere Aegyptio nigro, & est ualde forte. Secundū sit ex capitibus papaueris contritis, & est leuius. Tertium sit ex semine lactucæ aggregatis, et est leuissimum, et minus stupefactiuum quæ semine mandragoræ. Possumus ergo dicere quod Auic. intelligit de 2. & 3. opio non aut de primo. Alia responsio Gētilis, quod opium datur ad multas infestationes. Aliquando ad stupefactiones. Aliquando ad alidum catarrhum & fluxum uentris. Aliquando ad alterandum malam complexionem calidam fortem, in primis casibus communiter parum de eo sufficit, ut puta 3. aut 4. gran. Sed ad alterandum caliditatem fortis opus est, ut exhibeatur secundum resistentiam suam contrarij, caliditatem quæ existente fortissima faciente susceptionem. Imò initium apostematis calidi concedit Auic. dosim prædictam opij, & mandragoræ, præcipue corpore existente multorum spirituum & magne resistentiæ, tam ex parte caliditatis naturalis quæ accidentalis: nec est inconueniens ut exhibeat huiusmodi medicina ita potens ad euitandum maximam ægritudinem omnino mortale, & non est inconueniens quod corpus ægrum magis resistat contrarijs quæ ipsi sunt: tolerabit ergo dosim opij, quam tempore sanitatis non toleraret. Super hanc tamen medicinam non est audendum nisi prius fuerimus experti corpus immixtis medicinis tolerare facilliter. Ego enim aliquando in sedatione doloris dedi quatuor 3. philonij romani, ante expertus fuissē duas non facere impressionem. Est ergo hic casus Auic. casus particularis rarissime contingens, sed pro somno inducendo aut catarrho sistendo, & similibus, non est opus ita fortiter stupefacientibus, cum eis communiter non sit contrarij ratione resistendi. Medicinæ autem permixtæ complexionem frig. apud Auic. sunt theriaca, mithridati, diamusci dulce, & amarum quod est calidius dulci, quia calida & mulbra, id est, parua quantitas ambre, quia calida & multum aromatica sicut etiam debet dari parua quantitas musci. Ideo authores in cōfectione medicinarum recipiendum muscum, crocum, & similes ualde aromaticas ponunt paruum dosim ipsarum in cōparatione ad alias, quasi superflua aromaticitas sit nocēs. Sexta autem intentio, scilicet, correctio accidentiū perficitur secundum ipsorum exigentiam. Inter cætera prohibeat syncope succurrendo remedijs opportunis, de quibus in capitulo proprio. Et stridori dentium succurrat pondus aliquid molle inter dentes. Tremor omnes intentiones à mala cōplexione sine materia exigit omnes intentiones

iones suprascriptas præterq̃ digestionem, euacuati-
onem, & diuersionem. Verū diuersio aliquando cō-
uenit ad prohibendum fluxum humorum ad locum
laxum præcipue cum humores in corpore superflue-
rint: patet itaq; curatio eius ex suprascriptis. Tremor
autem pendens à solutione continui non habet curā.
Similiter pēdens ab apostematibus iam factis in ipso
uel eius capsula. Verū in principio antequam fiat suc-
cūrdum est cum phlebotomijs copiosis, euacuatio-
nibus secundum exigentiā, & omni genere diuersio-
num. Item cum stipticis confortantibus & tuentibus
cor ne recipiat humorem. Itē remouendo causam flu-
xus humorum. Item incrassando, & etiam ipsos cō-
pingēdo si fuerit oportunum ne faciliē sua subtilitate
fluant. Propterea Auic. concedit stupefactiua. Et in
his casibus opus est diæta tenuissima, sicut in alijs apo-
stematibus membrorum interiorum. De eorum ta-
men cura actum est superius. Similiter dictum est de
cura malæ cōpositionis siue sit oppilatio, siue sit ma-
litas. Et si pēdeat à dolore cordis remouetur per
remotionem causarum dolorum cordis, quarum cu-
ra statim est posita. Sed factus à nimia sensibilitate cu-
ratur prohibendo omnes causas potentes lædere cor.
Item confortando ipsum sicut dictum fuit in intēti-
one quinta. Tertiō remittendo sensum cum usu præbe-
tium nutrimentum crassum sicut carnes bouinæ, por-
cinæ, leguminum, & similia, & usu frigidorum, &
humidorum sicut lactuca, endiuia, spinachia, & si-
milib. Itē casei & lactis. Factus à debilitate cordis cu-
ratur remouendo causas debilitatis. Item confortan-
do ipsum conueniente regimine sex rerum, & etiā re-
gimine medicinali si fuerit expediens sicut dictū fuit
in quinta intētiōne. Sed factus à uentositate & uapo-
ribus curatur sicut ille qui pēdet à materia, & cū hoc
resoluitur uentositatis & uaporum attēdendum est,
& in ipso confert phlebotomia basilicæ sinistræ. Fab-
bus curatur per communitatem à toto sicut in feбри-
dis, & resistēdo malitiæ complexionis impressæ, aut
imprimendū à febre, uel à causis eius quæ secundū plu-
rimum est calida, & indiget frigidis cordialibus inte-
rius & exterius applicitis, licet aliquādo sit frigida si-
cut in syncopali humorosa. Sed in tremore sequente
crisim attēdatur complemento crisis tuendo tamen
cor secundum quod est expediens. Sequens autē do-
loris cuiuscūq; membri curatur per remotionem il-
lius autem tremoris cordis facti per communitatem à
membris particularibus exigat duplex regimen. V-
tione, diuersione, ab ipso membro remotione malæ
& cōfortatione ut sit minera laudabilium humorū.
Aliud debetur cordi complendum confortatione e-
do in ipsum secundum quod est expediens. Factus autē
à uenis sumptis curatur cum educitiōe eorum, uo-
mitus est præmittendus cum sumptione olei, aut
aque tepidæ, aut utriusq; simul mixti, et fiat exquisi-
tioni cordis, & dētur bezahartica propria. Factus au-
tem à morlu serpentum curatur attrahendo uenenū

impressum in loco, fricando locum ut sanguis exeat,
postea lauando cum aqua calida locum morsum, &
applicando pullum nouiter mortuum adhuc calidū.
Et ut obuiet cum uisceribus aut applicādo anū galli-
næ uiuētis, & tuendo partes superiores membri mor-
si cum aceto, & aqua rosat. Et confortando cor cum
interius & exterius applicitis. Et theriaca est optima
in morlu uenenosorum sumpta & applicita. Sed tre-
mor sequens alias causas primitiuas curatur cum re-
motione earū, & remotio nocuenti ab eis impressi,
& cordis confortatione.

CVra syncopis curabilis exigit duplex regi-
men. Vnum administrandum tempore pa-
roxysmi. Alterum tempore quietis ad pro-
hibendum reiterationem paroxysmi. Regi-
men administrandum tempore syncopis diuersifi-
catur secundum causas eius propriè secundum tri-
plicem causam in diffinitione expressam. Si ergo
causa syncopis fuerit paucificatio spirituum, & non
superfluit præter illos qui sunt in minera, intenden-
dum est ipsorū regenerationi, uiuificationi, & prohi-
bitioni resolutionis & paucificationis ipsorum, tam
regimine sex rerū nō natural. q̃ medicinali. At ergo
declinet ad contrarium discrasia, & nocumētū quod
facit paucificationem spirituum. Et sit boni odoris a-
romatizatus cū calidis aut frigidis secundum exigen-
tiam contrarij corrigendi. Secundum plurimū tamē
debet ad frigidum declinare, aut ad temperamentum
nisi sit in causa frigiditas mortificans. Et similiter de-
bent uestes et lecti aromatizari. Frigida autē sunt sicut
rosa, uiola, camphora, & sandali, & poma, & pira, &
tonia, & cætera superius memorata. Calida autē sunt
sicut muscus, ambra, crocus, gariophili, cortex citri,
gallia musc. & similia, quibus utendum est pro aëre,
uestibus, lectis aromatizandis. Odores autē magis cō-
ueniētes cæteris paribus sunt illi quibus ægri delectā-
tur: aliquando enim delectant odorē citronij, piri, &
pomi. Aliquādo odore uini aquæ ros. & similitū. Cō-
mune tamen magni iuuamētū est quod sit ex uino o-
dorifero aqua ros. muscata in quib. sit panis allus in-
fusus. His autem possunt addi frigida sicut sandali, cā-
phora, & similia: Et possunt addi cali. sicut gariophi-
muscus, & similia, & si acetum placeat potest addi pa-
rum aceti. Fiunt etiam poma odorifera calida, frigi-
da, & temperata secundum exigentiā contrarij cor-
rigēdi, quarum descriptiones solēnes posui in tractu
de pestilētia, & de his est sermo apud Mesue in fine ca-
pituli de catarrho. Hi autē odores suauis sunt cōueniē-
tes ad nutriendū spiritus, siue potius ad fouendū ip-
sos sua similitudine: non tamen credo quod uerē nu-
triant. Non tamen concedunt in præfocatione matris
cis, siue in syncopi per communitatē à matrice, cum
matrix moueat ad odores bonos. Imò potius appli-
cētur naribus syncopizate ex matrice odores foetidi
qui tamen sint conuenientes ori stomachi sicut odor
calami ulsi, qui est expertus in cura calidæ cholericæ,
& similiter gypsi. In collo matricis supponant odor-
ifera sicut gallia muscata, & propriè cū paucō uino
odorifero, aut oleo liliorum alborum infuso in eis li-
chinio & supposito. Cibi autem & potus sint refumē-
tes calidi, frigidi, aut temperati secundum exigentiā.
Eligatur ergo uinum coloris aurei, et odoris aroma-

tici subtile cum stipticitate quadā attingens dulcedinē, notabiliter uiuofum aut mediocris uiuositatis, ita ut fumens in ore ferē subito sentiat fumositatem cum aromaticitate. In syncopi tamē ab euacuatione potest esse coloris nigri ut sit crassius, et nutritibilis prohibēs resolutionē. Et debet exhiberi calefactū actu, & propriē ualde paucitatis in calore naturali, & causa frigida, & si sit mixtum cum aqua carnis, imō non detur sine ipsa si adsit multa fames & inanitiō, uel panis sit in ipso dissolutus ne subito penetret omnino indigestum. Et potest aromatizari in calida cum aqua ros. secum mixta. Item cum sandalis, citrinis, et similibus. Et in causa frigida cum pauco musci, cinarioni, gariophilorū, uel in causa calida secum misceatur syrupus acetositis citri. Et in frigida parū diamusci dulcis, uel misceatur cum alijs quibus eger magis delectetur, & ex maximē conuenientibus. Et propriē ubi stomachus cōmunicet est miua appropriata syncopi posita ab Auic. in Antidotario mixta cum uiuo. Et hęc cibatio sit frequēs & pauca pro uice sufficiat. Vt de de uiuo mixto cum aqua carnis pro uice ab 3. i. usq; ad 2. Et ad hanc intentionem est contulū pulli, oua forbilia, testiculi gallorum, & similia quā cito transmutentur, & quorum parum multū nutrit. Et cauē dū est a uiuo potenti puro in notabili quantitate, ne cerebrum & neruos percuriat, & ne præter modū inflāmet propriē in causa calida: fortasse enim accideret ex eo permixtio ratiōis, aut spasmus, nisi aqua aut alio liquore temperetur, propterea dicit Auic. quādo necessariū est in aegritudinibus acutis dare uinū propter syncopim melius siue magis conueniēs est, ut sit insipidum, quia tale est pauciferū. Sed fortē quis instabit quomodo potest syncopizatus aliquid sumere cū sit in eo destructus sensus & motus. Respondetur quod per tempus syncopis intelligo totum illud tempus in quo est actu syncopis uel syncopi proximū, cum nondum in totum conualuit a syncopi, licet loqui possit, et deglutire. Vidi enim plures syncopizates decies in hora. Non tamen inter syncopim & syncopim omnino absoluebantur a noimento syncopis. Et aliquando cadit tempus notabile inter paroximos syncopis. Et hoc est quod dicit Auic. Et patiens quidem syncopim quandoq; est in syncopi, quādoq; est in eo quod est inter syncopim & sanitatē, quādoq; est in leui paroxysmo syncopis. Hęc autē cibatio frequēs quę conceditur in syncopi sequente inanitionem & paucitatem spirituum, non ita concedit in sequente retractionem spirituum ad cor, & multo minus in sequente præfocationem spirituum in corde & repletionem. Imō multum debent abstinere. Et fortē nihil dari durante paroxysmo syncopis, licet in omnibus aer & odores boni cōcedantur. Somnus apud Auic. prohibet. Inquit enim patientes syncopim præcipiuntur uigilare et dimittere locutionem, quod uerum est in patientibus syncopim ex retractione spirituum, & ex præfocatione eius in corde, cum somnus trahat spiritus interius, & augeat præfocationem, sed in syncopizatis propter paucitatem spirituum sequentem euacuationem quācūq; præter sudorem, credo somnum in paroxysmis syncopis cōuenire, cum sistat omnes euacuationes præter sudorem, & maximē post cibum ad fortificandum digestionem. Quia tamē somnus est consanguineus syncopis, est attendē-

dum dum dormiunt qualis sit facies, pulsus & anhelus. Sed de hoc erit speciale dubiū in fine capituli. Ex his sequit exercitium non conuenire syncopizatis, apud Auic. præcipiatur ipsos dimittere locutionem. Nam multo magis debet dimittere alia exercitia quibus magis fatigantur & debilitentur. Frictiones tamen conueniunt in syncopizatis propter retractionem spirituum, & præfocationem spiritus in corde, non autem conueniunt in syncopi sequente paucitatem spirituum, imō stent supini & nō moueantur. Sed alij & præcipuē syncopati ex præfocatione spiritus & retractione stent magis capite eleuato, & fricetur. Omnes tamen sunt altis uocibus uocandi & excitandi dū sunt actu in syncopi, licet extra syncopim debeat permitte- ti dormire qui patitur syncopim ex inanitione. Cū ca repletionem & inanitionē est sciendum, quod qui patiuntur syncopim propter paucitatem spirituum debent inaniri aliquo genere euacuationis dū sunt in paroxysmis syncopis, nec multum a cibis abstinere, imō, ut dictū est frequenter, & parum est exhibere. Sed ceteri maximē patientes syncopim ex præfocatione propter multitudinem humorum existentium in corde aut repentiū ad cor, debent abstinere euacuari uomitu, suppositorijs, clysterijs, phlebotomia, mijs secundum exigentiā in paroxysmis syncopis, quæ tamen fiant cum cautela & timore, & quādo cetera non contulerint. Non tamē denot uisita fortia aut medicina exoluentes & materia agitantes, ne humores amplius ad cor præcipitentur. Sed difficile est subuenire syncopizatis qui simul indigent retractione spirituum, & nociui euacuatione, sicut aliquando contingit. Et in hoc stat medici prudentia ut utroque attendat. Sed ei magis de quo maior est suspitio. Sint tranquilliperates et gaudentes, uitanda sunt accidentia corpus exterminantia. Luuatur rerum amaribilium rememoratiōe & habitatione cum dilectis. Regimen autē medicinale tempore syncopis est, ut aspergatur facies aqua frig. aut aqua ros. mixta cū pauco uini odoriferi: excitat enim a profunditate syncopis, & est cōmune remedium omnibus. Et in omnibus speciebus syncopis intendendum est ad remotionem causæ quantum fieri possunt secundum uirtutem euacuantiam. Si ergo syncopis sequatur aliquam euacuationem sistenda est, non quidem cum opatiis si aliter fieri potest, sed alijs ingenijs quæ uirtus potest tolerare, & cum hoc uirtus est cibis uiuificanda secundū canones superscriptos. Et cōmune remedium in cibis quæ sequitur paucitatem spirituum est, ut fiat pororū etis oppilatio prohibens spirituum resolutionē cū aque ros. ratione, euetatione & cū flabellis, & similibus, cum indumentis in quibus sit uirtus sandalorum, rosarum, & similium, & cum odore, & sorbitione frigidorum cordialium sicut acetositas citri cum aqua rosata, aut acerosc. Nisi in causa sit frigus uehemens, aut solutio fortis: Cum frigidis tamen semper sit croci, aliquid calidi quo delectetur sicut musci aut croci, notabiliter tamen frigidis dominantibus, & iuxta hanc intentionem est melius ut uinum, & quicūq; potus sit actu frigidus, nō tamen ita ut fiat calidi extinctione. Illud autē quod supra dicebatur de potu calido actu obseruandum est ubi calidum naturale est ualde paucitatum, & maximē in causa frigida & in quibus multum durat syncopis, & quorum totum corpus infligidatur.

gidatur. Et isti indigent inunctione extremitatum, & stomachi cum oleis calidis aromatizatis. Et in hac syncope sequente paucitate spirituum affluidetur embrocatio extremitatum, & parium membrorum regali cum aqua rosata, & ceteris frigidis cordialibus in quibus tamen aliquid modicum musci, croci aut uini odoriferi ponatur. Et si fuerit singultus aut nausea, tunc oportet ut uiuificetur caliditas infirmi, & adiuuetur natura eius commouendo guttur cum penna excitando uomitum & commouendo spiritum ad exteriora. Et assidue clamores maximi circa ipsum, & stringantur digiti dolore inferendo, & fiant titillationes, & prouocantia sternutationem, & omnia intelliguntur quando est in actu syncopis ad excitandum ipsum à profunditate syncopis. Cumque illa non ualent, & non sterneatur, moritur. Et si syncopis est causa meri, & sit possibile ut expellatur cum uomitu facili, clysteri, aut phlebotomia, fiat istud. Et si est propter euacuationem ex partibus intrinsecis, non autem per poros cutis calefiant extremitates si sint frigidae, & fricentur cum oleis calidis aromatizatis. Et quandoque necessarium est fringere ea ad reuocandum calorem exterius, & ad excitandum aegrum à profunditate syncopis. Sed multo magis haec necessaria sunt ubi syncopis sequitur attractionem spiritus ad cor aut praefocationem ipsius in corde. Et si situr omnis euacuatio secundum quod oportet. Et attendatur uirtutis uiuificationi. Vnde in syncopis sequente cholerica passionem sumantur huiusmodi potus. *℞.* Aquae carnis proprie factae per expressionem carnis *℥. i.* succi citoniorum, uini an. *℥. s.* galie musc. gran. *s. uel* *℥. s.* misce, & si syncopis sequitur sudorem uel aliam euacuationem ex parte cutis, unguentum cutis cum oleis stipticis & aspergat desuper puluis costrictius sicut myrtus, lutum, chimolaea, cortices granatorum & similia frigida stiptica, & uiscosa, & nullo modo materia extrahatur exterius, sed in syncopis sequente euacuationem intrinsecam nullo modo huiusmodi approximetur. Augmentarent enim euacuationem illam comprimendo materiam interioris. Et si fuerit causa doloris, & non sit possibilis eius sedatio, alio ingenio stupefac membrum dolorosum, sicut curatur cholica cum philonio & similibus. Et si uenena sint in causa, dentur bezahartica contra illa uenena. Et obseruentur canones superscripti tam in uenenis sumptis quam in moribus uenenosorum. Et si causa syncopis fuerit repletio in ore stomachi, studentum est ut euomatur, quoniam sanat. Et oportet ut rofricationes totius corporis. Ita ut etiam in stomacho & uiscera. Et non cogantur sumere aliquid nisi uinum predictum, quod necessarium est in dispositione syncopis. Et medici stulti student in cibando eum existimando quod sit conueniens, et uiuificent uirtutem efficiunt ipsum. Sed conueniens est ut detur syrupus aceti mixtus cum aliquo subtiliante, sicut est decoctio hyssopi, si humor fuerit crassus et uiscosus. Si autem subtilis, post ipsum uomitum. Si fuerit facilis, detur aliquid repressiuum, sicut syrupus de granatis, de agresta & similes. Et in summa in quacunque specie syncopis attrahit remotioni causae eius secundum quod est possibile. Ex praedictis ergo breuiter collige duplex regimen. Vnum ad administrandum tempore paroxysmi syncopis

siue aeger sit in actuali syncopi, siue in dispositione media inter actuale syncopim, & sedationem totalem accidentium syncopis. Alterum est ad administrandum sedatis omnino accidentibus syncopis. Primum autem si est in actuali syncopi, ut remoueatur à profunditate syncopis cum aspergione uiscolae aquae frigidae, ut rosaceae, aut sibi proportionalis in facie eius, & cum clamoribus maximis circa ipsum, et cum titillationibus circa partes sensibiles, & inferendo dolores quosdam sicut digitos contorquendo, & similia operando circa ipsum, & approximando bonos odores naribus et cordialia in regione cordis, nisi in ea quae prouenit à matrice in qua foetidi odores naribus apponantur, qui tamen confortet os stomachi & boni odores in collo matricis supponendi sunt. Item prouocando sternutationes, & si non sternutat non est spes salutis, & haec omnia conueniunt in quacunque specie syncopis. Sed in alijs diuersificantur. Nam syncopizantes ex paucitate spirituum debent restaurari cibo & potu sicut dictum fuit. Alij uero debent abstinerere, & proprie cum syncopis sequitur materiam laedentem multitudine, aut malignitate, non autem paucitate spirituum, & proprie cum spiritus in corde praefocantur. Sed in his conueniunt uomitus, clysteria, phlebotomia, uentosa, ligaturae, fricationes, & omnia genera diuersionum, quae non conueniunt in sequente spirituum paucitate. Sed in nullis conueniunt solutiva sumpta saltem notabilis fortitudinis. Omnes tamen conueniunt in remotione suae causae secundum quod est possibile in tempore illo. Et syncopizantes ex paucitate spirituum debent iacere supini. Sed syncopizantes propter retractionem spirituum, aut praefocationem eorum in corde debent stare magis eleuati, praecipue quando syncopis sequeretur asthma & anhelitus praefocationem.

Regimen autem adhibendum cum totaliter accidentia sint sedata, licet remaneant causae potentes reiterare syncopim, est omnino prosequendum secundum quod dictum fuit in cura tremoris. Nam causae eadem quae faciunt tremorem cordis, si augent, faciunt syncopim. Est tamen remissius procedendum in syncopi in omnibus, quae possunt uirtutem debilitare. Cura lipothymiae et calus uirtutis subito patere potest ex cura syncopis.

Sed ut dictorum ueritas eluceat, sunt quaedam dubia remouenda. Primo de intentione Gal. & Auic. tenendum est uomitum in syncopi competere quibusdam conditionibus seruatis. Primo quod uomens sit facilis ad uomitum. Secundo quod materia quae facit syncopim sit in motu faciens nauseam & subuersionem taliter ut leui remedio, scilicet impositio- ne penne possit expelli, aut cum sumptione leuis uomitiui, sicut aquae tepidae cui parum olei & aceti sit admixtum, neque sit alia causa manifesta uomitum impediens. Et huic sententiae Gal. & Auic. taliter limitant, parum obstant rationes Auer. secundo Colliger, quas gratia breuitatis omitto, & quia pauci sunt momenti. Secundum dubium remouendum est propter dictum Auic. in fine capit. de syncopi. Patientes quidem syncopim praecipiantur uigilare & dimittere locutionem. Pro quo sciendum quod debent dimittere locutionem, quia labor duplex est in locutione spiritus resoluens, & uirtutem debilitans, unus in cogitatione, alter in motu membrorum spiritualium & reliquorum deferuentium locutioni. Attamen pro

paruo tempore debent dimitti, imò cogi loqui ut releuent magis à profunditate syncopis, sed cū notabiliter releuati sunt, prohibeat locutio. Sed de uigilijs sciendū dictū Auic. posse intelligi, aut tēpore actiualis syncopis, aut tēpore quietis. Sed de tēpore quietis dicamus, primò quòd uigiliae aliqui conueniunt, aliquādo discōueniunt, secundū diuersas causas syncopis. Si em̄ syncopis sequit̄ morsum, aut sumptionē uenenosorum, aut apostemata maligna uenenosa, sicut althoin & similia, aut febres pendentes à materia uenenosa sicut pestilentialia, syncopalem minutā, uigiliae cōueniunt, & somnus prohibendus, ne materia & uapores ueneni uadāt ad cor, cum in somno fiat reditus sanguinis & spiritus ad cor, ut supra in cap. de subeth. Et Arist. 3. de animalibus in cap. de sanguine & lacte, dicit quòd signū reditus sanguinis ad intra est quòd si scindatur cutis nō exibat sanguis in dormiente sicut in uigilante, hoc tamen intelligendū est quod ad principiu somni, quia postea in processu pandunt sanguis & spiritus. Item Auic. 4. primi cap. de phlebot. dicit, quòd superfluitates in somno ad profunditatē corporis trahunt. Et propter hoc 2. primi cap. de somno et uigilia, homo pręterea cogit uigilare multoties & somnū à se dimittere timore syncopis & casus uirtutis. Item iuuamentū somni quod esset in his casib. ad fortificandū digestionē est nullū, quia materię uenenosae non sunt digestibiles. Si aut̄ syncopis fieret à mēbris frigidis repletis alib. sicut in syncopali humerosa, somnus concedit̄ ad fortificandū digestionem. Propterea dicit Auic. in cura syncopalis humerosae ponat medietas tēporis dormitioni, & medietas tēporis fricationi si possibile est. Sonus enim iuuat ad digestionē humorū crudorū, & fricatio resolutioni. Itē in omni syncopi sequente euacuationē somnus cōpetit, pręter quā in sequēte sudorē, cum somnus omnes manifestas retineat euacuationes pręter sudorē. Nisi forte sudor sequeret̄ nimia pororū dilatationē. In quo casu somnus magis cōpetit quā uigilię, cum magis iuuat ad pororū cutis constrictionē quā uigiliae. Huius aut̄ signum est, quia corpus magis infrigidat̄ secundū partes extrinsecas in somno quā in uigilia, & contra in uigilijs. Propterea plurib. indigemus operimētis in somno quā in uigilia, secunda primi. Si uerò syncopis sit à dolore corporeo somnus cōfert, sopit em̄ dolorē. Si uerò pēdeat ab accidentib. animi, somnus cōfert pro quanto sedat accidentia animi, & facit ad obliuionē, sed magis confert in his accidentib. que trahūt spiritus ad exteriora, sicut gaudiū, ira, & similia quā in trahentib. spiritum ad interiora, sicut timor, tristitia, & similia. Si uerò in causa sit labor et fames adhibito cibo somnus cōfert, sed absq; cibo nocet, apud Rasim in diuisionib. cap. de egritudinib. stomachi. Sed nota quòd quāuis aliquib. syncopizantib. somnus concedat̄, aliquib. uigiliae, no tamē credendū est quosdam eorum semper debere uigilare quosdam dormire, sed omnib. dum diu perseverant in quiete syncopis, sunt somnus quā & uigiliae necessariae, sed aliquibus magis somnus uigiliae, aliquibus contra. Et semper dū syncopizantes uigilāt aut dormiunt, sint medici, aut astantes qui semper notent faciem, pulsum, et anhelitū, notētq; accidentia ex somno sequētia & uigilia & an syncopis magis infestet in somno uel in uigilia Et secundum exigentiā possit prouideri,

si em̄ somnus cōtulerit permittat̄ dormire, si nō euigilet̄. Sed in actu syncopis si ipsa sequat̄ attractionem spiritus ad cor, aut eorū in corde pręfocationē, excitandi sunt, & propriē si pendeat à materia laedente sui multitudine aut malitia. Quòd si sequatur paucitatem spiritui, & fuerit sine cibo quo restaurari possunt, euigilent & cibentur, postea permittant̄ dormire. Si uerò cibati, & dormiant in actu syncopis, si tibi constet de somno, quod tamen est difficile, permittatur, & pręcipuē si pręcesserint longae uigiliae, sed semper attēdatur facies, pulsus, & anhelitus, an redant̄ melius & sinantur dormire. Si uerò in dererius euigilent, et prouideat̄ secundū oportunitatē. Si uerò tibi non cōstet de somno, excutitur à profunditate syncopis, nā possent adeo profundari quòd mors sequeretur.

DE ANATOMIA MERI ET STOMACHI. Cap. LXXVII.

Iuxta morem nostrum. In primis pramittenda est anatomia meri, siue oesophagi & stomachi. Meri est canalis siue uia cibi ab ore ad stomachum & superfluitatum à stomacho ad os longa, stricta, rotunda, cum ore superius et epiglottide, & cum stomacho inferius continuata, iuxta spondiles fixa, & duabus tunicis, cum uillis longitudinalibus, & latitudinalibus composita, ad deglutendum finaliter ordinatum. Pro eius diffinitionis declaratione sciendum quòd cum meri habebat duas operationes pro toto communes, scilicet deglutire, & expellere quae in uermitu expelluntur. Principalis operatio sua est deglutire. Et haec leuiter perficit, primò quia est sibi naturalis, secundo, quia ad ipsum cōcurrit utraq; tunica interior neruosa in qua sunt uilli longitudinales deferentes ad attractionē, & exterior carnosa, in qua sunt uilli latitudinales deferentes ad expulsionem, atra hit enim primò per longitudinales, deinde quod attrahit est paulatim expellit uersus stomachum per latitudinales. Et tertio quia graue facit tendit deorsum. Contra uerò uomitus est difficilis, primò quia pręter naturam, nam si fiat à natura fit ab ipsa pręter naturam stimulat, et non complectur nisi per tunicam extrinsecam cum uillis longitudinalibus, in meri autē graue cum difficultate ascendit superius. In meri autē non fuerunt uilli trāsuerfales, quia non ordinati in retentionem. Quamuis aliqui dixerunt in ipso esse aliquos paucos trāsuerfales, quia illud quod deglutitur & si sit liquidum paulatim descendit, quod arguit ibidem esse aliquā uirtutem retentionis, non enim descendit sicut in foramine. Primi tamē respondent hunc gradatū descensum esse per uillos longitudinales, & latitudinales, nullo modo existens. transuerfales. Est autē meri longius quā sit cāna pulmonis salibus. Est autē meri longius quā sit cāna pulmonis, ubi cum transeat diaphragma usq; ad 13. spondilem, post continuatur cum stomacho, & est lituatum post canā, nam iuxta spondiles, quia canna debuit esse anterius, cum inspiratio aeris per eam ad pulmonem sit fere continua, quare hunc locum anteriorem sibi dignius uel dicauit, ut sit ori magis cōtinua per quā aer ingreditur. Et etiam cum sit cartilaginosa est magis tuta ab extrinsecis occurrentibus. Et cum meri descendunt ad os sibi nerui à tertio pari neruorū cerebri uenientes ad os stomachi ad dandum ipsi sensum, ut cum uacuis est percipiat inanitionem, & insurgat cibi & potus desiderium.

derium. Et non pertranseunt ad fundum eius cum illi non pertineat hæc sensatio. Stomachus est membrum instrumentale magnum rotundum ad figuram tendens arcualem, in medio corporis situm, ex duabus tunicis cum uillis longitudinalibus, transversalibus, & latitudinalibus compositum, duo habens orificia. Vnum superius cum meri. Alterum inferius cum intestino duodeno continuatum ad appetendum, & digerendum cibum pro toto prima digestionem finaliter ordinat. Quod sit instrumentale manifestum est. Et magnitudinem eius arguit quantitas cibi in ipso contenti, licet dum continet cibum corrugetur & parviscitur, & est rotundum, quia hæc figura est capacissima & à nocetibus magis tuta. Tendit tamē ad figuram arcualem in modum cucurbitæ rectorse, cum os ipsius sit magis in sinistro & superius, fundus magis in dextro & inferius, quod factum fuit, quia ad os ipsius debet transiri melancholia à splene ad famem excitandam, & fundus debuit esse in dextro, ut epar superpositum ei cum quinque pennulis suis ipsum amplecteretur ad uigilandum eius digestionem, & quia cholera quæ in Kyti sub media pennula epatis continetur, debet transire ad fundum eius ad uigilandum digestionem. Et quia in latere sinistro iuxta renem est intestinum colicum uolutum occupans magnam partem, & in dextro sunt intestina gracilia parui loci occupantia, quare congruentius fuit, ut fundus in dextro, & os in sinistro locaretur. Est autem situm in medio corporis, habet enim desuper cor mediante diaphragmate. Inferius mesenterium & intestina, à dextris epar, à sinistris spleni cui superponitur anterior scirrus, & siphax, & arteriam aortæ descendentes, ex quibus patet ipsius colligata. Est autem compositus ex duabus tunicis. Interior nervosa densa & crassa cum immediate obuiet cibum, ne si esset mollis facile patiatur ab ipso. Exterior autem fuit carnosa minus densa & crassa adiuvans ad digestionem. Hæc autem debuit esse exterius, quia non est necessarium id quod digeritur contingi à digerente. Sed bene necessarium est id quod sentit sensu tactus contingi à sentiente. Sunt autem in stomacho uilli longitudinales sicut in superficie interioris tunicæ interioris ipsius stomachi, ordinati ad attrahendum cibum à meri, imò ipsum meri attrahit cibum ab ore, sicut & in uodolero stomachus est primus inchoans, meri autem sibi deseruit tanquam ei subordinatum. In superficie autem exterioris tunicæ interioris, sunt uilli transversales ordinati ad retinendum quod per uillos longitudinales est attractum, donec digestiua suam compleat operationem. In superficie autem tunicæ exterioris sunt uilli latitudinales ordinati ad expellendum, quod in stomacho indiget expulsiōe, aut ad intestina per pyloron, aut ad extra cum uomitu per uiam oris & meri. Habet etiam stomachus duo orificia. Primum superius cum menatuam cum duodeno dictum pyloron, quia res crassæ debent per superius transire ad stomachum. Sed res subtiliores in stomacho. Istorum autem orificiorum primum non est in parte suprema stomachi. Nec secundum in parte infima, ne fieret facilis descensus cibi ad inferiorem ante digestionem. Imò natura ordinauit, ut magna pars fundi stomachi esset infra orificium inferius, ne ci-

bus indigestus egrediatur. Et etiam ordinauit, ut magna pars oris stomachi esset supra orificium superius, ne si homo pedibus suspenderet, cibus immediate per os egrediatur. Est tamē stomachus secundum os eius alligatus decimæ tertie spondili dorsi, quæ est uigesima numerando à suprema spondili. Et propterea medicinæ oris stomachi debent exterius circa 13. spondilem applicari, quia declinat os stomachi posterius sicut fundus declinat anterior. Et secundum fundum eius est alligatus decimæ octauæ spondili dorsi, quæ est ultima quinque spondili alcharim. Et numerando à suprema spondili est uigesima quarta ita quod stomachus secundum os eius alligatur primæ spondili alcharim, & secundum fundum ultimæ. Est autem ordinatus ad appetendum cibum pro toto & digerendum ipsum prima digestionem, cum secunda digestio sit in epare. Appetitus autem debetur ori stomachi sequens sensationem ei tributam per nervum descendente per meri à tertio pari neruorum cerebri. Digestio autem principaliter eius fundo debet. Et sunt in eo uenæ quæ ad minima diuiduntur deferentes ei sanguinem quo nutritur. Et similiter sunt in eo arteriæ diuise, sed non ualde manifestæ, & ex his patet complexio stomachi & meri, sunt enim frigida & sicca complexionis partibus nervosis in ipsis dominantibus. Potest autem pati omne genus ægritudinis, scilicet malam complexionem generis cuiuscunque, sine materia, & cum materia, aut imbibita, aut inuisca, aut natæ, aut apostemate. Et potest pati malam compositionem in creatura, quia superficies sua potest esse parum aspera, & per consequens lubrica, aut in uia sicut est oppilatio alicuius suorum orificiorum, aut in quantitate, quia sit nimis magnus, aut paruus. Item solutionem continui quæ si sit superficialis, curabilis, si uero utrinque penetrans, incurabilis. Apostema etiam potest pati cuiuscunque generis quod secundum plurimum est mortale, & maxime cum exituratur.

DE VOMITU. CAP. LXXVIII.

Primo expediemus materiam uomitus, deinde agemus de cholericæ passionem. Est ergo sciendum primo quod reperiuntur isti termini uomitus, subuersio, nausea, fastidium, siue abominatio significantes dispositiones, quarum una est uia in reliquam. Paruum enim nocumētum stomachi facit abominationem aut fastidium. Quod si augeatur facit nausæam, quæ est inclinatio ad subuersionem & uomitum. Si adhuc magis augeatur facit subuersionem, quæ est motus præter naturam stomachi ad expellendum per uiam oris, quamuis nihil corpulentum expellatur. Et dicitur subuersio, quia fundus stomachi uertitur superius uersus os eius, ac si deberet inuerti, uel forte quia mouetur motu compressionis incipiendo à parte inferiori uersus superius. Subuersio autem animi secundum antiquos est, aut nausea inseparabilis, aut destructio appetitus. Si autem magis augeatur & sit aliquid uomibile faciet uomitum qui est motus præter naturam stomachi, cum quo expellitur aliquid corpulentum per uiam oris. Et istæ dispositiones ex omni parte sunt contrariæ appetitui.

Vomitum est duplex. Quidam quietus qualis est ille qui accidit stomachicis facile uomentibus. Alius est acutus & æstuosus, qualis est in cholericæ passione & in

& in his qui fumpserunt uomitua fortia, in pragnatibus, & in his qui propter stricture pectoris, aut debilitatem uillorum latitudinalium, & tunice extrinsecæ stomachi difficulter uomunt. Item quidam uomitus est creticus existens terminus multarum ægritudinum, sicut febrium acutarum, apostematum epatis, quæ sunt in latere concauo & similium. Quidam symptomaticus sicut qui accidit in accensione febrium, & etiã causis similibus. Item quidam periodicus, sicut qui sequitur periodos expulsionis sanguinis ad stomachum omni mense propter retentionem sanguinis menstrualis soliti eo tempore per matricem euacuari, & in diuersis diuersas seruant periodos, quibus frequenter in sua sanitate conferuantur. Quidam sine periodis. Item sumunt species eius secundum causas obiectas, quæ uomitu expelluntur, sicut quidam est uomitus cholericus cholea naturali, aut non naturali, sicut uirellina, prassina, æruginosa, & similibus. Quidam phlegmaticus diuersificatus secundum diuersas species phlegmatis. Quidam melanch. Quidam sanguineus secundum plurimum malus, & propriè cum febre, licet aliquando bonus, cum superfluat in quato, aut malignitas ipsius expectatur, alius permixtus ex pluribus humoribus. Item alius cibalis, alius chilosus. Item alius in quo uermes & aliique fœces expelluntur sicut in cholica, ileos. Alius foetidus sicut in pragnantibus. Item aliquis in quo caro uerrucosa, aut fistulosa expellitur abscessa à stomacho propter uehementiam conatus, aut à rebus incidentibus, aut abstergetibus. Item alius saniosus propter apostema ruptum in stomacho, aut ulcus eius, aut quia ad ipsum deriuatur ab exituris, aut ulceribus membrorum uicinorum, & ex his inferitur quinta diuissio, quod aliquis est laudabilis aliquis illaudabilis, licet omnis sit præter naturam.

Causæ uomitus sunt corporeæ, aut primitiue. Sed corporeæ duplices, aut per essentiam, aut per communitatem. Causæ per essentiam sunt mala complexio cuiuscunque generis cum superfluit, sine materia, & cum materia sanguinea phlegmatica cholericæ, melancholica aquosa & uentrosa, & cæteris de quibus supra. Huiusmodi autem materiæ sunt, aut natantes, aut inuiscatæ, aut imbibitæ. Et faciunt uomitum pungendo grauando, aut extendendo. Et acuitas sensus oris stomachi, aliquando est in causa sequens complexionem calidam & siccam tantum. Item mala compositio sicut oppilatio pylorum, & uermes qui sunt morbus in numero grauando, aut pungendo, & solutio continui, aut recens, aut antiqua, pœdens à causa intrinseca, aut extrinseca. Item pustulæ & apostemata cuiuscunque generis & propriè in ore stomachi. Item dolor stomachi sequens malam complexionem, aut solutionem continui, aut ambas sicut in apostemate. Item debilitas stomachi sequens læsionem alicuius naturæ unius, aut plurium, aut raritatem texturæ, aut paucitatem spirituum, per has enim causas stomachus facilius ad uomitum paratur, si in eo reperiatur aliquid uomibile sicut cibus aut potus, aut aliquid ex superscriptis, imò etiam paratur ad susceptionem superfluitatum aliorum membrorum, & ad cõgregandum eas per uiam paulatim factæ congestionis. Iste autem causæ superscriptæ faciunt uomitum frequenter si sint in stomacho res uomibiles. Si uero nõ, faciunt naueam & subuersionem.

Vomitum autem per communitatem quandoque est à toto, sicut in febribus. Qui quadoque est criticus & terminus ipsarum, quandoque symptomaticus sicut in pestilentialibus, & est secundum plurimum malum motum protendens. Sed in cæteris est secundum plurimum bonum, si per eum materia febris educitur. Si uero solum cibus, est ex toto genere malus. Et quadoque est per communitatem à toto absque febre propter superfluum repletionem, aut cachochymiam cum debilitate stomachi recipientis, recipit enim superfluitatem à toto mediante epate. Quandoque fit uomitus per communitatem à cerebro transmittenti ad stomachum materiam catarrhalem, aliquando per solam communitatem absolutam sicut accidit in percussione capitis, apostematibus cerebri, & similibus in quibus stomachus comparitur capiti propter neruos descendentes à 3. & 4. pari neruorum cerebri ad ipsum. Quadoque fit per communitatem à splene transmittente melach. cum periodis aut sine periodis, & quadoque solum superfluit in frigidando. Quandoque fit per communitatem ab epate, & propriè à concauo eius & Kyti transmittentibus ei secundum plurimum sanguinem, aut cholem. Et quadoque est communitas absoluta per communitatem stomachi ad epat, sicut in magno apostemate eius, si interueniat simplex alteratio, siue nouum mentum mediante neruo utriusque communi. Quandoque per communitatem ab intestinis, aut per simplicem dolorem ipsius, aut quia uermes ascendunt ab eis ad stomachum, aut fœces regurgitant ad eum sicut in cholica & ileo. Quandoque per communitatem à renibus & poris uritidibus in fortibus doloribus ipsorum, sicut est dolor calculi, quandoque per communitatem ad matricem sicut in retentione menstruum, aut naturaliter sicut in pragnante, aut præternaturaliter sicut in oppilatione, & propter reliqua nouum cibus cui stomachus facilius comparitur. Et in summa per communitatem ferè ab omnibus membris communitate soluta et nõ absoluta. Causæ aut primitiue sunt, sicut peccatus aer superflue calid, aut frig, aut corruptus, licet primitiue lentialis, & à cadaueribus mali odoris, licet primitiue pressio fit in corde, læditur tamen os stomachi, cordi compatiens sua propinquitate & nimia sensibilitate. Item cibus & potus suo odore, sapore, proprietate, quantitate nimia, mala præparatione, unctuositate, & perflua, & similibus stomacho disproportionatis, & propriè cum sumuntur absque defyderio. Item motus agitatiuus post cibum. Item ira, tristitia, & similia animi accidentia, & propriè imaginatio alicuius rei ob scenæ. Item res extraneæ sicut percussio, casus, morsus uenenosorum, & sumptio uenenorum. Item commissio obseruationis stomachi longo tempore consuetæ, sicut pelles circa ipsum consuetæ porari & stimulari. Hæ autem causæ leuiter imprimunt fastidium & abominationem. Sed fortius imprimunt fastidium & abominationem. Et ad diuturnas faciunt naueam, & subuersionem. Et ad diuturnius uomitum si res uomibilis in eo reperiatur. Causæ uero nauææ, & subuersionis absque uomitu sunt. Aut absentia rei uomibilis, ut quia non adest, aut si adest, est imbibita, aut inuiscata, aut debilitas causæ imprimentis, aut impotentia ad uomendum propter debilitatem ægri, aut stomachi ineptitudinem & difficultatem ex causis supradictis, scilicet quia sit etiam pectoris, aut habet uillos latitudinales debiles, &

hic de alijs causis facientibus stomachum importetem & ineptum ad se constringendum, & mouendum ad superiora, & nimia stomachi lenitio, & relaxatio facit ipsum pronum ad fluxum per inferius et ineptum ad uomitum. Pro notitia causarum uomitus sanguinis est sciendum, quod sanguis qui uomitur immediate uenit a stomacho uel meri. Causa tamen eius aliquando est in ipso stomacho uel meri, ita ut sanguis qui uomitur profuat ex substantia stomachi uel meri. Aliquando causa est in membris stomacho comunicantibus, & sanguis ab ipsis ad stomachum deriuatur, deinde uomitur. Causa autem primi est ruptura uenae in stomacho sequens laboriosum uomitum, aut sumptionem medicinarum, aut ciborum acutorum aut calum, ossificationem, seu percussionem eius, aut apostema non maturum ruptum, aut ulcus corrosiuum, aut fistulosum, aut sanguisuga adherens meri uel stomacho. Si uero ab alijs membris deriuatur ad ipsum tunc uenit, aut a capite, & per colatoriu descendens ad meri profuit ad stomachum, aut deriuatur a splene per uiam expulsiōis melancholicae ad os stomachi, & tendit in nigrum, habes saporem pontici, aut acetosum. Aut deriuatur ab epate per meseriacas ad ipsum terminatur, & quoadque regurgitat a matrice in retentione mēstruorum, & quoadque a toto cum est retenta euacuatio sanguinis naturalis, aut artificialis consueta, & quoadque cum superfluit propter membri mutilationem, aut conuersionem ad regimen sanguinis multiplicationem cum paucitate exercitij, & quoadque fit uomitus sanguinis a uirtute sana expellente superfluum quatuor aut qualis. Et propter hoc est in uomitu duarum librarum sanguinis, aliquando tranquillitas & iuuamentum. Et quoadque fit a uirtute aegra critica, aut symptomatice sanguinem expellente, sicut in synochis, & quibusdam alijs febribus, et apostematibus, sanguine ad stomachum deriuato, qui aliquando est salubris & terminus aegritudinis, sed ut plurimum perniciosus praecipue si sit cum febre, & ipsum non sequatur praemittus aegritudinis alleviatio, & quoadque causa uomitus sanguinis est apostema ruptum in epate, splene, et alijs membris stomacho comunicantibus, & est riuus ad stomachum per uias manifestas, aut occultas. Signa prognostica uomitus, sunt fastidium & abominatio praecedens, tremor labij propter continuatam pelliculam oris, cum pellicula oris stomachi, nau ad superiora. Signa demonstratiua nauseae, subuersionis uomitus habetur ex relatu aegri, & sunt sensui manifeste. Signa causarum primitiuarum sunt ipsae causae primitivae, post quas sequitur uomitus, & propter pedere. Signa causarum uomitus per communicationem sunt, quia praecesserunt nocumenta totius, aut membri alicuius cum quorum augmento fit & augebatur uomitus, & decremento decreuit & ablatione aut detractum, aut per essentia a quibus uerisimiliter possit pendere. Signa causarum uomitus per essentia sunt haec, si enim sit a mala complexionem sine materia adest tristis sensatio, & propter in ore stomachi qualitate illius, & est sine grauitate, neque habet eructationem saporis ex tranci, & frequenter habet nauseam, & subuersionem

absque uomitu nisi cum cibo sumit & laeditur ex quacumque resumpta, & in frigida magis laeditur digestio, in calida magis appetitus, & adest sitis. Sed humida et sicca cognoscuntur ex siti & priuatione eius. Item cognoscuntur ex causis praecedentibus. Item quia laeditur a similibus & iuuatur a contrariis. Si uero sit materia, adest grauitas & cognoscitur materia per saporem eructationis redolentis amarum, dulce, acetosum, ponticum, foetidum, & similes proportionatos materiae quae est in stomacho. Item frequenter adest sitis, si in eo sint humores calidi per essentia, aut putrefactionem. Sed multo magis manifestatur cum motu per saporem, odorem, & colore eius quod uomitur. Item manifestantur per colorem linguae, et accidentia quae sunt sicut stupefactio dentium, & nocummento operationum stomachi, & si humores sint inuiscati aut inhibiti adest nausea frequens, et subuersio absque uomitu. Signa acuti sensus oris stomachi sunt, quia laeditur a quacumque resumpta etiam debilis impressio & est pronus in synopim propter leuia nocumenta stomachi, neque potest diu sitim aut famem tolerare. Signum oppilationis pylori sunt, tardus descensus chyli post cibi digestionem etiam si sit paucus & facilis, & proprie cum digestiua non est debilis neque ad sunt aliae causae tarditatis descensus. Signa uermium in stomacho sunt, quia adest titillatio quaedam & commotio quasi uoluntaria, sed de his inferius in proprio cap. Solutio uero corinae in stomacho si recens est, cognoscitur per dolorem, sanguinis exitum per uomitum, aut per feculum. Si antiqua, per exitum saniei per easdem regiones, & quoadque sumitur aliquod acutum, sicut acetum, augetur dolor & moridicatio. Signa pustularum & apostematum ponuntur inferius in cap. proprio. Signa autem debilitatis stomachi comprehenduntur ex laesione operationum suarum. Sed raritas texturae & paucitas spirituum, quae sunt causae debilitatis sumuntur ex extenuatione corporis, & quia facile laeditur a quacumque causa. Subtilitas autem humoris cognoscitur quia iuuatur a ponticis. Sed crassities, quia iuuatur a subrilantibus. Sed multitudo humiditatis superfluae cognoscitur ex nauseatibus satietatibus praecedentibus, multitudine saluae, multitudine egestionis, sed ex multitudine uomitus certificatur. Distinguitur inter sanguinem uenientem ex substantia meri, & uenientem ex substantia stomachi per locum doloris, si prouenerit causa ulceris & corrosione aut rupturae. Si uero non ad sit dolor, cognoscitur quod ex meri per paucitatem eius & impedimentum deglutitionis, sed ex stomacho maior fuit quantitas, & non est impedimentum in deglutitione. Item cognoscitur ex causis praecedentibus, & molestantibus stomachum, aut meri & sumptio aceti moridicando locum a quo sanguis emanat, distinguit locum. Si uero sit ex aperture orificiorum uenarum, aut refudatione in quibus non est dolor cognoscitur, quia per refudationem est paucus, ualde & ex aperture in primis paucus, deinde maior, sed in ruptura uenae est aliquis dolor, & multus prima uice egreditur. Et illum qui est a corrosione significant signa ulceris quod praecessit, & sanguis ab eo egreditur in primis paulatim, deinde emanat res plurima ulcere ampliato. Signa autem ulceris sunt manifesta ex suprascripris, & fistulosum ex antiquitate cognoscitur.

Sed

Sed apostema non maturum ruptum cognoscitur in cap. proprio. Et quando ex sanguifuga cognoscitur ex præcedenti punctione iterata quando erat adherens.

Item ex sang. subtili aquoso, & quia bibit aquam in qua habitabant sanguifugæ. Signa autem sanguinis deriuati à toro, uel ab alijs membris ad stomachum sunt nocumenta torius, & aliorum membrorum præsentia absque nocumento stomachi cum absentia signorum exitus sanguinis à substantia stomachi, de quibus supra. Et si descendat à capite per colatorium, multoties ex eo aliquid spuendo cum rascatione, aut sine rascatione emittitur, & si à splene tendit in nigrum & est rubidum, & habet saporem acetosum aut ponticum. Sed ab epate & reliquis partibus ueniens habet saporem proprium sanguinis. Cognoscitur autem à quibus membris proueniat ex præcessione nocumentorum illorum membrorum, & ex causis eius scilicet ex retentione sanguinis hæmorrhoidalis, aut menstrualis fluere consueti, mutilatione membri, regimine sanguinis multiplicatio & similibus. Cognoscitur autem quod proueniat à sana uirtute cum nihil de esse suo molester patiens, & quod sanguis est satis laudabilis. Et criticus cognoscitur per sedationem ægritudinis præcedentis, symptomaticus autem non est cum huius alleuiatione, imò secundum plurimum perniciosus.

Prognostica. Quando multiplicatur nausea in cõ ualescentibus indicat conuersionem siue recidiuam. Secundum. Vomitus in apostematibus epatis, & propriè concaui & splenis proportionatus materiæ facienti apostema frequenter bonus. Similiter in eorum oppilationibus, in reliquis apostematibus secundum plurimum malus. Tertium. Vomitus in febribus proportionatus materiæ febris secundum plurimum bonus, & propriè in die critica nisi in pestilentialibus. Quartum, multoties accidit febricitanti spasmus, aut epilepsia, aut simile epilepsie subitè et euomit humorem, ut est flos aeris, aut indicum & euadit. Quintum, frequenter uomitus remouet singultum clamosum. Sextum, ex administratione uomitus cum æqualitate seruantur renes, & curantur eorum & pedum nocumenta, & sit præseruatio à multis ægritudinibus. Confert enim uomitus in omnibus ægritudinibus quæ fouentur à materia in stomacho contenta, & confert in ægritudinibus proprijs materialibus absque apostemate & ulcere. Item confert in ægritudinibus renum, uesicæ, & membrorum inferiorum, diuertit enim ab inferioribus & eradicat à superioribus. 4. primi cap. proprio. Et solutio uetris se habet e contrario. Et in omni ægritudine materiali maximè bonum est habere sollicitudinem de stomacho ut restitueretur eius operationes, curat enim & præseruat à pluribus ægritudinibus, & apud Hipp. & Auic. ad præseruandum administratur in mense bis duobus diebus, proximis, ut unus suppleat in quo alter deficit, quod intelligitur in corporibus culpate sanis & facile uomentibus, et quibusdam sufficit bis in anno, scilicet uere et autumno, multiplicatio namque uomitus debilitat uirtutem stomachi, & facit ipsum lacunâ superfluitatum & iuuatior uomitus est post balneum, comestionem & porum copiosum. Septimum, uomitus cholericus purus est malus, significans superfluam caliditatem, & similiter phlegmaticus purus malus, significans su-

perfluam frigiditatem. Sed laudabilior uomitus est in quo phlegma cholerae est admixtum, qui duo humores non sunt multum distantes à phlegmate, & à cholera naturalibus. Hi enim sunt consueti in stomacho multiplicari, phlegma quidem per uiam paulatim à congestione, sed cholera per uiam defluxus. Vomitus autem fortidus, niger, prassinus æruginosus, & diuersorum colorum, id est, in quo aggregantur ferè omnes colores significans aggregationem multarum suarum dispositionum epatis, & perfluitatum & difformem dispositionem epatis, & torius est pessimus. Et prassinus & æruginosus significant caliditatem adurentem secundum plurimum. Sed uomitus ad nigredinem declinans sicut azurum & indicum secundum plurimum congelatione. Nigerrimus uero indifferenter caliditatem & frigiditatem. Verum quicquid horum est à caliditate est ablatum splendorem & claritatem, & qui à frigiditate est ablatum splendorem, nam in congelatione excluditur partem diaphanæ, quæ non excluditur in adustione. Et habenti apostema calidum in epate accidit in primis uomitus cholericus, deinde prassinus, deinde æruginosus cui coniungitur singultus. Niger uero secundum plurimum fit à nocumento splenis, licet possit esse ab epate, & propriè in apostemate eius propter superfluam adustionem ad quam quandoque sit transpositio mala & timorosa est, ut sit os stomachi subuersum, patiens syncopim & natura restricta. Nisi sit illud quod facit uomitum, humor subtilis cholericus. Curari enim poterit utraq; dispositio cum aqua prunorum & tamarindorum, cum cassia, manna, aqua hordei, & similibus. Et nota quod debilis stomachi, præcipue si fuerit multæ sensibilitatis cum uomitu syncopizat, sed minus hic accidit si uomitus sumperit. Nonum, uomitus sanguinis sequens uomitus stomachi, aut apostema non maturum, solutum in eo, mortem significat. Sequens autem resolutionem uenæ, apertionem orificij eius, aut refudationem, sanabilis, præcipue sine febre. Decimum, uomitus sanguinis cum febre notabili perferente est malus, & secundum plurimum perniciosus. Sed si ne febre quandoque bonus & terminus ægritudinis præcedentis, & quandoque ab ægritudinibus futuris præseruatiuus, ita ut in uomitu 2. 15. sit tranquillitas & iuuamentum. Antequam accedam ad curam uomitus memorabo quasdam medicinas proprias, simplices & compositas, alterariuas & solutivas quibus in regimine uomitus & reliquarum dispositionum stomachi est utendum. Composita calida aromatica rosaceum, gariophilatum, nardum, ceratum Alexandrinum Mesue, cymina Alexandrina, confectio de xilaloës, de galanga, de coriis, de scoris. Auic. Electuarium de citro, de myrto, prælatorum laticans. Aliud emplastrum, pultis, de menta, de fumo terre maior, de corticibus citri, susus, ligni aloës, diarhodon aromaticus, theriac magna, triphera minor communis. Gal. trochiscus de abinthio, de ros. hierapic. Gal.

Frigida

Frīgida diacitoniten, diarhodon, electuarium de sorbis, oleum citoniorum, rob de ribes, de berberis, de sumach, de citonijis, de piris, de pomis, de granatis, de citro, syrupus de piris, de citonijis, de myrto, saccharum rosaceum. Calida simplicia absinthium, agraricum, aloes, ameos, calamentum, calamus aromaticus, cappares, cardamomum, cyminum, cinnamomum, cyperi, cupressi nuces, citrum conditum & nō conditum, cortex et acetositas, crocus in coriādo stomachum, fistici, galanga, gallia, gariophili, grana pini sumpta cum melle & saccharo, laudanum, macis, mastix, mentha, oliuæ, olibanum, oua, passulæ, pix, rheubarbarum, scorīa ferri uinum, uua passā, xiloes, saccharum. Frīgida, acetosa, acetū, agresta, aqua serrata, bellirici, berberis, citonia, corallus, coriandrum, emblici, endiuiā syluestris & domestica, ferratum, scilicet uinum & aqua extrinctionis eius, granata omnia, karabæ, chebuli conditi, lac propriè caprinum, iaduca, mirobolani omnes, myrtus, mespilia, persica, pira, poma acra pontica, pruna damascena sicca, ribes, rosa, sorba, sumach, sinaragdas suspensus stomacho & portatus, pellicula interior stomachorum gallinarum. Temperata capillus uen, perdix. Quia uomitus est duplex, quidam artificialis ad preseruandum ab ægritudinibus futuris, & ad curādum ægritudines præsentēs, quidam spontaneus.

Deregimine artificiali, sit primus sermo. In quo quedam sunt obseruanda ante uomitum, quedam in uomitu, quedam post uomitum. Hoc in primis præmissio quod non prouocetur uomitus in his qui sunt inepti ad uomitum, quorum conditio nes uide quarta primi, capitulo proprio. Obseruanda ante uomitum sunt ista. Primum, ut insueti ad uomendū prius assuefiant leuibus uomitiuis, ne subito fiat transitus ad inconfecta multum corpus mutantis. Secundum, ut ante uomitum præcedat uen- tris lenitio, siueeductio materierum communium sponte siue artificialiter, sicut clysteri lenitio, & similibus. Tertium, ut ante uomitum cibetur cibus diuersarum uirtutum mixtis ex incisiuis, absterfuiuis, uiscosis, dulcibus, acetosis, sed maxime unctuosus. Item diuersis ex parte artificij, sicut frixis, falsis elixis, & huiusmodi. Et si timeres uomitum futurum diminutum ex difficultate uenientis, uel ex humorum ineptitudine misceantur cum his cibus aliqua uomitum uigorantia, sicut eruca, raphanus, ficus sicce pingues, coepe, porri, cum aqua hordei cum fecce sua & melle, melones, cucumeres, mica panis azimi cum oleo.

At triplices cum seminibus suis, nuces cum melle, aut aliquod istorum, uinum dulce de quo copiose bibat, & finchi cibi male masticati. Si tamē timeres uomitum non sequiturū melius est ut cibus bonus permittatur. Quartum, ut stomachus & partes pectoris, & tempus anni conuenientius, est tepus calidum. Et hora diei conuenientior, est meridiarum uel circa. Deinde sumat aliquod ex uomitiuis uel parum ante moueatur moribus inordinatis, ut cibus in stomacho agitetur. Et faciet oculos, pili ex toto superpositis, similiter uentrem leuiter ulq; ad umbilicum, sed transacta hora una cum uomiti-

uum incoeperit mouere, ponat digitum in ore, aut penam anseris oleo intinctam & iteratis uicibus uomitum procuret, donec stomachus à cibo & superfluis mundificetur. Si autem uomituum fuerit ualde forte, sicut elleborus albus, est melius ut non præcedat cibus, aut ualde paucus præcedat. Consulo tamen, ut uomitiua non transcendant mediocritatem. Situs autem conuenientior est, ut sedeat & inclinet caput & pectus secundum exigentiam. Quod si acciderit difficultas superuenerint, detur aqua calida, quoniam uoment aut uenter soluetur, & sedabuntur accidentia, & fiat clystere lenitiuum. Sed finito uomitu quiescat & laugetur ei facies cum aqua rosata, cui parum acetis sit admixtum. Lauetq; sibi os cum uino aut aqua, secundum exigentiam & taret cibum & potum saltem per duas horas si potest. Et cum cibatur dentur res boni odoris, suauis saporis, pauca quantitates boni nutrimenti, paucarum superfluitatum, facili digestionis & satis facili penetrationis & dormiat, & non bibat aquam frigidam, neq; alium potum ualde frigidum. Si autem uomitus superfluat succurratur, secundum quod dicitur in sequentibus, & si esset diminutus iteretur & corrigantur accidentia sequentia secundum oportunitatem. Ægritudines autem in quibus confert uomitus præseruando aut curando, sunt ægritudines stomachi materiales, non apostemosa educendo materiam contentam in eo, siue congestam siue deriuatam ad ipsum, rectificat enim appetitum, attractionem, digestionem & retentionem. Curat singultum clamorū, dolorem stomachi, imò uomitum ipsum. Nocet autem in ægritudinibus eius immaterialibus, & apostematibus eius. Item uomitus curat febres præcipue críticas & symptomaticas frequenter iuuat, præcipue curat quartanam. Item curat lepram & malitiam cholerae & ulcera mala quæ sunt in corpore. Item confert in epilepsia, apoplexia, sorda, uertigine, spasmo materiali & paralyti, tussi, asthma, Item multas curat ægritudines oculorum. Et breuiter omnes ægritudines, quæ fouentur à materia existente in stomacho, præcipue phlegmaticas, in quibus maxime esse debemus solidi- ti de stomacho. Et confert in ægritudinibus renum, intestinorum, uesciæ, matricis, podagræ & similiarum & prohibet generationem lapidis, stomachum enim integrè mundificat, diuertit ab inferioribus, eradicat à superioribus. Et solutio uentris se habet e contra, licet stomachum & intestina mundificet. Nocet tamen uomitus cum superfluit, & nocet secundum plurimum in ægritudinibus membrorum superiorum in quibus stomachus non communicatur. Vomitiua autem leuia in causa calida sint 3. 5. aut 6. aquæ hordei cum fecce sua. Et fortius est ut huic addatur 3. 1. acetis, aut 3. 2. syrup. acetosi, & tantundem de aqua minuatur, & in causa mixta ponatur loco syrupi oxymel compositum, aut scylliticum in eadem dosi. Et fortius his est succi raphani 3. 3. cum oxymellis simplicis 3. 2. Et adhuc fortius si in eo steterit infusus elleborus per diem naturalem. Elleborus quoq; niger potest infundi in iure iulep, in aqua, & si milibus, & fiet uomitiuum potens secundum tempus moræ in re in qua infunditur, sed non transeat 3. 1. neq; stet in infusione supra diem naturalem & crasso modo contusus. Et adhuc fortius ipso est ellebo-

rus niger in substantia, sed non detur ultra 3. i. cum aliquo liquore. Elleborum enim album natura nostri temporis non potest tolerare. Semen quoque atriplicis duarum 3. cum 3. i. oxymellis simplicis & tribus aquae est satis forte ualens in causa calida. Et similiter flos genestae, & granum regum, cuius duae sunt species. scilicet magnum & paruum, magnum dicitur kerua, est potens uomituum educens phlegma. Similiter capitrum arborum, uide dosim apud Mesue. Pro cura uomitus sciendum est ipsum esse duplicem, scilicet cibalem sub cibali comprehendendo uomitum cuiuscunque rei in corpore. Aliquando humoralem, sub humoraliter comprehendendo uomitum cuiuscunque rei corporeae, de quibus superius theoricè actum est.

Cura uomitus cibalis exigit quinque intentiones. Prima, remouet causam uomitus. Secunda confortat stomachum cum proprijs moderatè stipticis participantibus. Tertia, prohibet humores ne fluant ad stomachum. Quarta, corrigit accidentia. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum. Si ergo pendat ab aere, cibo & potu, & reliquis non naturalibus, de quibus supra, remoueat ipse & nocumētum per eas impressum cum contrarijs & corrigentibus malam complexionem, & quodcunque nocumētum per eas inductum, cum interius & exterius applicitis quorum copia inferius ponetur, & cum eisdem complebitur. Secunda interio, scilicet stomachi confortatio, si illa quae administrantur sunt propria stomacho & moderatè stipticitaris participatia. Tertia autem, scilicet prohibitio humorum à fluxu cum eisdem stipticis perficitur, de quibus in secunda intentione. Item cum diuersionibus cum euacuatione, & sine secundum exigentiam humorum, qui uideantur uerisimiliter ad stomachum fluxuri, & ligaturæ manuum supra cubitos, & pedum supra genua, & uentosa posita super fundo stomachi conferunt ad retentionem. Et positio pedum in aqua calida retinet diuertendo, sicut positio ipsorum in frigida nocet congelando, & immobilizando.

Quarta autem, scilicet correctio accidentium perficitur secundum ipsorum exigentiam, praecipue si yn copis corrigatur, sicut dictum fuit in capitulo praecedente, & reliqua secundum quod dicitur in hoc capitulo. Quinta, autem perficitur praecipiendo regimen contrarium regimini quod fuit causa uomitus, & contrarium discrasiae in stomachum impressae, praecipue somnus prolixus conuenit. Et paucitas cibi & potus, boni chimi, facilis digestionis, saporis delectabilis, satis citò penetrantis, confortantis stomachum tam proprietate, quam stipticitate temperata, contrarij discrasiae impressae. Praecipue uinum sit laudabile, placens patienti, & cibi aromatizati cum his, quae declinant ad calidum, aut frigidum secundum exigentiam, & amygdalae excorticatae contritae positae in ferculis conferunt & delectant. Et in uomitu calido confert kist fabarum & lentium condita cum aceto & brodium consumptum, factum secundum artem cui admisceantur amygd. & aromatizatum secundum exigentiam discrasiae, in quo etiam aliquando ponitur panis bis coctus. Item laudantur fistici, cortices citri, aut arantiorum conditi, cappares in causa frigida, sed in calida praeparantur cum uino granatorum agresta, suc, limonum citri, aranciorum, & similia,

& marinata confecta, & coriandrum habet singularem proprietatem. Post cibum utatur piris, aut cyton, absis, aut condit. Item diacitoniten & parum caisei in fine mense. Et eligantur carnes, pisces, & reliqua cibaria aegro placentia & bene conditionata, ieiunet saepe. Somnus multus etiam post cibum immediatè ad cuius prouocationem confert sumere aqua carnis cum uino odorifero stiptico, & pauco panebis cocto, & pauco pulueris coriandri, dormient enim & sudabunt. Quies animi & corporis propriè post cibum donec à stomacho amplexetur, & res terrefacientes, prohibent uomitum dum est in fieri, sicut aspersio uiolenta faciei cum aqua frigida, & clamare, & eum terrefacere ne uomat, & uerecundia, & similia animam diuertentia à perceptione obiecti facientis uomere.

Si uero pendat à percussione super stomacho, aut in membro stomacho communicante, curetur percussio secundum quod oportet & remoueat uocamentum stomacho impressum & confortetur stomachus, & prohibeantur humores, ne fluant ad stomachum, neque ad membrum stomacho communicans cum phlebotomia, & ceteris diuersionibus. Corrigantur accidentia secundum quod oportet & ordinetur regimen conueniens habendo respectum ad percussione, uomitum & causam eius.

Quod si pendat à uenenosis sumptis educantur illa uomitu & secessu, & dentur bezahartica propria contra illa & stomachus, & membra nobilia confortentur. Si uero à morfu uenenosorum curetur locus morfus secundum quod oportet, & supra locum morsum ponantur stiptica cum debita ligatura prohibentia transitum ueneni ad loca nobilia & confortetur stomachus, & membra nobilia.

Si uero uomitus cibalis fuerit per communicantem à toto, aut à membris particularibus, sicut cerebro, epate, splene, &c. Quinque similes iam dictis exigitur intentiones. Prima corrigit dispositionem naturalem, aut membri communicantis. Secunda, corrigit dispositionem stomachi ipsum confortando.

Tertia, prohibet ne humores fluant. Quarta corrigit accidentia. Quinta, ordinat regimen. Prima autem intentio completur curando febrem, & cetera nocumenta totius cum quibus oportet, cauendo tamen in eorum curatione quantum est possibile ab his quae laedunt stomachum, sicut solutua fortia, & reliqua, quae stomachum debilitant. Similiter debent curari dispositiones cerebri, sicut dolor, apostema, percussio, & similia. Item dispositio reliquorum membrorum sibi communicantium, cauendo ut supra, in eorum curatione ab his, quae laedunt stomachum, quantum est possibile. Secundo, iuxta secundam intentionem confortetur stomachus cum sumptis interius & exterius applicitis, ut puta nocumētum ipsius corrigentibus, quae tamen non noceant, aut parum noceant toti, aut membris sibi communicantibus. Tertio, prohibeatur fluxus humorum ad stomachum, & tum confortando ipsum ut supra, tum diuertendo & euacuando secundum quod fuerit expediens, habendo semper respectum ad dispositiones membrorum communicantis humorem, uerisimiliter fluxurum, & stomachi dispositionem. Quarta, corrigantur accidentia secundum quod oportet, ut dicitur in capitulo hoc.

Quinto, ordinetur regimen sex rerum habendo

Respectum

respectum ad stomachum, ratione cuius debet exhiberi paucus cibus, & conditionatus, ut supra. Et somnus debet esse multus, & multo magis habeatur respectus ad dispositionem totius, & membri communicantis. Similiter si uomitus cibalis fuerit per essentiam in stomacho, quinque similes exigunt intentiones. Prima, est remotio causæ stomachi facientis uomere. Secunda, stomachi confortatio. Tertia, prohibitio ne humores fluant. Quarta, accidentium correctio. Quinta, debitum regimen. Si ergo causa uomitus cibalis fuerit mala complexio sine materia alteretur cum contrariis interius & exterius applicis, quæ sunt propria stomacho. Si uero fuerit cum materia, primo materia euacuetur, secundo dissecrasia cum contrariis corrigatur. Si uero in causa fuerint uermes, attendatur curæ ipsorum secundum quod dicitur in proprio capitulo. Si uero oppilatio in pyloron, remoueat causa oppilationis. Et si causa fuerit apostema, aut pustula curetur, sicut dicitur capitulo sequenti. Et si fuerit ulcus & corrosio mundificetur & consolidetur. Si uero dolor fuerit in causa mitigetur. Et si raritas texturæ intendatur uniioni & confortationi stomachi, & eius corruxa secundam intentionem confortetur. Et si amul simul perfici poterunt, erit præstantius. Mala autem complexio calida stomachi sine materia, cum inchois confortari potest, & uomitus prohiberi. Olei cytoniorum, ros. omphacini, ana. ʒ. i. ros. antheræ, corallorū rub. myrti, ana. ʒ. i. galliæ muscatæ, masticæ ana. ʒ. i. aceti modicum, ceræ quantum sufficit, fiat unctio. Et si uis magis infrigidare his adde succi acetosæ ʒ. i. & fac bullire cum oleis & acapulueres, & fac unguentum. Et fortius imprimens facis secundum formam stomachi, & imbastius qui infundatur in aqua rosacea dupla ad acetum, & optime expressa, & actu notabiliter frigidus applicetur multoties, præcipue ubi esset superfluitas caliditatis ne post sacculi amotionem sequatur unctio, de qua stichis ʒ. i. cum oleis superscriptis & aceto, & addendopulueres superscriptos, præter masticam, & extomachum. Sumenda in fine mensæ, sunt diacitoninum de saccharo sine speciebus, aut pyrum, aut cytonium assum conditum. Si uero in causa esset mala complexio frigida, ʒ. i. thuris, masticis, galliæ muscatæ ana. ʒ. i. garioph. menthæ, rosarum, corallorum, abstinib, calami aromatici, galan. ana. ʒ. s. olei masticis ʒ. i. aceti acuti modicum, scilicet ʒ. s. ceræ quantum sufficit, bulliant olea, tynum, & acetum ad consumptionem uini & aceti, & fiat unguentum cum quo notabiliter regio stomachi ungatur. Ex eisdem possunt fieri sacculi, qui infundantur in uino nigro, si triplo potenti, quadruplo ad acetum acutum, et sacculi in ipsis notabiliter calidis infundatur, & opti-

mè expressus regioni stomachi applicetur ter aut pluries, post eius amotionem sequatur unctio, de qua supra. Cerorum ad hanc intentionem. ʒ. pulueris superscripti ʒ. i. picis græcæ, masticis, resinæ, laudani, ana. ʒ. s. ceræ quantum sufficit, dissoluantur, ad lentum ignem, & cum oleo supra scripto quantum sufficit, & ʒ. s. aceti, & addendo pulueres, fiat cerorum tenax & applicetur, ut supra prius suffumigando ipsum cum ligno aloes. Hæc enim simul complent primam intentionem & secundam. Et in fine mensæ sumat diacitonitem cum speciebus, & similia. Si uero esset lapsus ad humiditatem utatur notabiliter siccis, sicut cypero, nucis cupressi, & similib. Si uero ad siccum permisceantur humores cum siccis & stipticis, ut natura dirigat humida contra siccum, & stiptica ad retentionem. Si uero humores fuerint in stomacho fouentes malam complexionem educantur uomitu & secessu primodeinde mala complexio corrigatur, et stomachus confortetur. Vomitus autem si materia fuerit natans, fiat cum impositione digiti, aut pennæ in ore, aut cum leuibis uomitiuis, quorum descriptio superius præcessit. Similiter soluantur uenter, si uomitus educi non possunt cum solutiuis leuibis stomacho non nocentibus, sicut materia cholerica, cum rheumbarbaro. Plegmatica cum pilulis alephanginis, aut stomatichis. Mixta ex his cum hiera simplici in forma pilularum, si fuerit natans, si uero imbibita, aut inuiscata cum hiera simplici in forma electuarij, de qua dicitur ʒ. i. Est tamen melius si fuerit imbibita, aut inuiscata, ut præmittantur digestiua, abstergentia & incidentia, sicut syrupus acetosus in cholerica, & oxymel simplex in phlegmatica cum aqua saccharata, in aequali dosi cum syrupo, uel accipiantur sine aquis, ut diuturniorem moram contrahant in stomacho & melius inuiscentur in stomachi superficie. Et si opus fuerit fortiori abstergente, accipiantur oxymel compositum, aut scylliticum, et possunt misceri cum aqua decoctionis cinamomi. Materia uero melancholica euacuetur cum diafeng, aut sena, aut epitymo consolatis cum zingibere & pauco salis gemmæ, & misceantur cum pauco iure galli, aut aqua casei, mirobolani nigri permixti, cum alijs solutiuis, euacuando confortant & uomitum sistunt, postea discrasia stomachi corrigatur, & stomachus confortetur. Corrigantur autem accidentia iuxta quartam intentionem, secundum quod oportet. Quinta autem intentio perficitur faciendo regimen declinare in contrarium discrasie, & cibus sit paucus, facilis digestio nis, boni chimi, cito penetrans, boni odoris, placens patienti, & confortatiuis stomachi, & parum bibat, dormiat multum, & immediate post cibum, & quiescat, & aspergatur facies, si uellet uomere, & terrefiat ne uomat, & fiant ligaturæ in extremis, et uentosa stomacho superponatur, & extrema in aqua calida, aut frigida imponentur secundum exigentiam reliquarum circumstantiarum. Curationes autem uermium, apostematum, pustularum, & ulcerum, & dolorum stomachi ponentur in sequentibus.

Oppilatio autem pyloron, si naturalis, curam non habet. Si uero pendeat ab humore crasso & uiscoso, secundum quod est ut plurimum, curatur cum abstergentibus & incisuiis, quæ parum antescrpta sunt.

Item cum exhibitioe hieræ picæ in foma electuarij.

Raritas autem texturæ stomachi curatur intendendo unioni partium eius & confortationi ipsius, & eius incoriationi, & cauendo à solutiis, & facientibus uomere & propriè fortibus, & à ualde resoluentibus & exiccantibus. Sint ergo exterius applicita propria, & stiptica, & contraria discrasie ipsius, sed non multum excedentia in qualitatibus primis actu, aut potentia, de quibus statim sermo præcessit. Similiter interius sumpta sint propriè moderatè stiptica uiscolitare participantia, hæc enim stomachum iuuant & incoriant, sicut cytonium, thus, mastix, crocus, & pelliculæ intrinsecæ in stomacho gallinarum conueniunt cum proprietate sua, & uinum suauè stipticum in pauca quantitate sumptum, & seruet reliquum regimen sex rerum, de quo supra. Si uero uomitus fuerit humoralis, tunc est duplex, criticus aut symptomaticus. In uomitu critico sinatur natura operari, si uerisimiliter ex digestionē præcedenti & uirtutis tolerantia uideatur fore sufficiens, nec est cibo, aut alio modo impedienda. Si uero fuerit diminutus adiuuetur cum leuibus tantum, quæ ex dictis in uomitu artificiali elici possunt, si uero superfluis constringatur cum auxilijs inferius scribendis. Si uero fuerit symptomaticus, aut erit solum ex humoribus in stomacho congestis, aut aliunde deriuatis. Si primum, quinque requiruntur intentiones. Prima, est humoris in stomacho congesti, uomitu, aut secessu, aut utroque modo euacuatio, & ad euacuandum humores imbibitos, aut inuiscatos, magis confert uomitus, quam solutio. Secunda, est correctio discrasie stomachi quæ est causa cōgestionis, & similiter stomachi confortatio. Tertia, est prohibitio, ne humores à membris circumstantibus fluant ad stomachum. Quarta, accidentium correctio. Quinta, debitum regimen sex rerum non naturalium. Quæ omnes intentiones complendæ sunt, sicut dictum fuit in uomitu cibali à mala complexionē cum materia. Si uero fuerit symptomaticus ex humoribus ad stomachum, aliunde deriuatis, septem exigunt intentiones. Prima euacuat, Secunda diuertit. Tertia regit membrum mittens. Quarta fluxum intercipit. Quinta regit stomachum recipientem. Sexta corrigit accidentia. Septima ordinat regimen sex rerum non naturalium. Pro prima intentione est sciendum, quod si uomitus fuerit qualis oportet, quem uirtus bene toleret, sinatur natura operari, uomitus namque curatur uomitum, sicut fluxus fluxum. Propterea uomitus in principio paroxysmorum est sinendus, prohibet enim paroxysmum, aut minuit, quarta primi. Si uero fuerit uomitus non qualis oportet, aut uirtus non bene eum toleret, est sistendus modis infra scriptis penes superscriptas intentiones, si ergo repletio fuerit in toto, & fuerit æqualis omnium humorum, id est, proportionalis, aut sanguis dominetur, fiat phlebotomia de uena comuni, aut de saphenis, præcipue si retentio sanguinis menstrualis, aut hæmorrhoidalis fuerit in causa. Si uero fuerit dominium aliorum humorum absque peccato sanguinis euacuentur, secundum ipsorum exigentiam euacuantibus integris ex suis minoratiuis, digestiuis, & eradicatiuis, etiam iteratis secundum exigentiam. Sint tamen

tales quod stomachum non lædant, aut parum lædant, propterea uitanda sunt solutiuia fortia, & propriè non correctæ, digestiua propria in cholerico sunt oxisacchrata syrup. de agresta, de granatis, de citro, delimonibus, de papauere, qui prohibet effusionem materierum ad stomachum, syrup. endiuie, decyconij. A quæ uero sunt, sicut endiuia, lupuli, acetosæ, epaticæ, plantaginis. Sed in phlegmatico, & mixto, syru. de menta, de absinthio, mel ros. aqua mentæ, absinthij: in melancholico, syrup. de bizantijs, de epithymo, de fumo terræ, aqua scolopendriæ, buglossæ, &c. Sed aqua hordei excorticati ualeat in cholerico, & mixto pluribus modis, scilicet intrigando, humectando, aperiendo, prouocando uentrem, leniendo uentrem, et si fecerit uomitum confert educendo causam, & est optima in curatione febris, & educatione cholerae prasinæ, eruginosæ, & humorum adustorum, ita ut frequenter sit medicina solentis in curatione fluxus, & uomitus cholerici & mixti & cum ipsa possumus multas medicinas permiscere secundum exigentiam, & maxime ualeat in materia corruptis quarum querimus eradicationem. Solutiua uero sunt, sicut rheumbarbari, & myrobolani citrini, in cholerico pilulæ alephanginæ. In phlegmatico pilulæ de rheumbarbaro, & stomatichæ in mixto, & sena myrobolani indi. Epithimum in melancholico, & posset fortificari, addendo magis exoluentia secundum exigentiam. Secunda autem intentio, scilicet diuersio perficitur cum ligatura pedum supra genua, & manuum supra cubitos. Item cum uentolis in natibus & coxis. Item super umbilico & regione epatis, & splenis, & propriè quando ab eis partibus materia stomacho communicaretur.

Clystera quoque leuia, aut acuta secundum exigentiam iuuant ad diuersionem. Lotiones quoque peritum, & brachiorum cum aqua calida sunt ad hanc intentionem. Et ad hanc intentionem sunt prouocatio urinae, & sudoris, sanguinis menstrualis, hæmorrhoidalis, & similia. Sed pro tertia intentione scilicet regimine, membri mittentis debemus trahere. Primum ab ipso superflua euacuare. Secundum, si ergo splen fuerit in causa ab ipso euacuabile, discrasiam eius corrigere. Tertiò, ipsum confortare. Si ergo splen fuerit in causa ab ipso euacuabile, mus melancholiam, si epas & kyttis maxime sanguinem, & cholera, si matrix mensura nisi fuerit pregnans, & si retentio sanguinis hæmorrhoidalis fuerit in causa, ipsum prouocabimus, et sic de ceteris, & si siam autem horum membrorum corrigemus, & si multa, confortabimus cum contrarijs proprijs modis rata stipticitate participantibus. Fluxus autem intercipitur iuxta quartam intentionem oppilando utramque transitus humorum ad stomachum, & quia stomachum ipsos incrassando, & compingendo, & superreclusus recipit humores à toto mediante epate, superregione epatis, stomachi, & partium adiacentium sunt ponenda stiptica propria illis membris, & cum hoc contraria ipsorum discrasie. Et conuenientia ad hoc sunt unguenta, & sacculi superius descripti, quibus possumus addi apud necessitatem maioris intrigationis sandali, spodium, camphora & similia. Et ubi calefacere opus sit, thus, mastix, spica, nucis cupressi, & similia. Humores etiam incrassantur & compingantur.

compingantur, & viæ claudantur cum interius sum-
ptis stipticis, et uiscosis, & apud maiorem necessitatem
stipefacientibus. Et ex leuibus propriis in causa cali-
da sunt rob, aut syrupus de granatis, & similiter de cy-
toniis descriptione Rasis in hoc cap. de uomitu et cho-
lerica passione. Item trochisci de olibano ab eo descri-
pti in eodem cap. et ualent in causa mixta. Confectio
quoque de cytoniis descriptione Mes. in suo Antido-
tario distinctione prima, & incipit, confectio de cito-
niis bona confortans stomachum & faciens digestio-
nem, &c. est preciosa, & docet ibidem ordinare eam in
causa mixta, & causa calida. Et multiplicando calida
ualebit in causa frigida. Et si opus fuerit stipefacere
deur syrupus, de papauere uel s. 3. trochiscorum de
olibano & addatur opij, croci, an. gran. i. aut plus se-
cundum exigentiam. Hæc autem debent sumi per
3. horas ante cibum, & per maius tempus, sed opia-
ta saltem per duas horas añ. Et positio extremi-
tatum in aqua frigida est ad hanc intentionem, & pro-
pientis iuxta quintam intentionem perficitur. Pri-
mo educendo materiam in stomacho existentem uo-
mitu, & secessu, aut utroque modo secundum quod ui-
debitur magis expediens. Secundo stomachum con-
fortando cum propriis stipticis discrasie sue contra-
rijs. Confortantia autem stomachum, & uomitum
prohibentia in causa frigida sunt syrupus dementa,
de absinthio cum aqua cinam. garioph. galangæ, &
similium. Item diacitoniten cum speciebus in fine
mensæ. Et in causa calida miua cytoniorum, syru-
pus de ribes, de piris cum aqua calibata. Et in fine
mensæ diacitoniten, de saccharo. Et ad hanc inten-
tionem sunt multa electuaria, trochisci, pulueres spar-
sim ab authoribus colligendi. Applicanda autem
exterius sufficienter dicta fuerunt cum ageremus de uo-
mitu cibali. Et ex expertis apud Auic. in causa fri-
gida, & galliæ, xilooloes crudi, gariophili, partes æ-
quales sumat de eo in potu, exempli gratia, à 3. i. usque
ad 4. cum uino cytoniorum. Et si huic addatur pu-
legij pars una est præstantius si æger non abhorreat.
Et cauendum est à stipticis uentre existente stiptico
nisi prius leniatur. Et apud Auic. camphoræ inest
proprietates sistendi uomitum in causa calida, sumpta
in potu cum rob stipticis, & odorata, & linita, & re-
mouet nauseam. Et quando sunt humores mali in
stomacho, dentur in principio mensæ lubricantia.
In fine stiptica confortantia. Et trochisci stellæ sunt
porentes in sistendo uomitum, & reliqua opiata.
Sed non sunt administranda, nisi cum reliqua non
sufficiunt & bene correctæ incipiendo à dosi parua
distanter à cibo. Si uero materia à capite ad stoma-
chum deriuatur. Prima intentio est cura catarrhi, de
qua superius proprii capit.
Secunda est stomachi regimen, quod manifestum
est ex dictis. Si uero materia à splene ad stomachum
deriuatur, similes obseruandæ sunt intentiones de e-
uacuatione, diuersione humoris melancholici, & sic
de cæteris. Verum ea quæ complent has intentio-
nes diuersificantur secundum humores & discrasie
exigentiam, quæ omnia possunt patere ex iam dictis.
Et idem regimen seruandum est in cura uomitus, à
quocunque membro sit communicatio.

Accidentia autem iuxta sextam intentionem cor-
rigantur secundum quod oportet. Et regimen sex-
rerum, iuxta septimam ordinetur, secundum quod
dictum est in uomitu cibali, hic tamē canon in ciban-
do obseruetur. Quod si euomat reitretur cibum,
sed bene conditionatus, ut supra, & in modica quan-
titate. Et quotiens euomis totiens reitretur, nam
tandem una uice retinebit.

Et idem canon sit in medicinis, & narratur ab Aui-
cen. in proprio capit. sumptus à Gal. 6. interiorum,
secundo capit. quod quidam homines incessanter ap-
petunt cibum, & quotiens sumunt expellunt ipsum
per inferius, aut superius, & sunt in continuo exerci-
tio comedendi, & expellendi cibum, & uiuunt uita sa-
riorum, non tamen uiuerent, nisi aliquid retineret.
Similiter est auis comedens locustas continuè, & con-
tinuè eas euomēs in toto tempore in quo recipit eas.

Idem faciebat quidam gulolus in patria mea, scili-
cet Verona multum famosus, qui multotiens in die
comedeat, & totiens euomebat, ut nouo cibo dele-
ctaretur. Vomitus prægnantis contingens per
communitatem à matrice propter retentionem men-
struorum communiter est magis infestans à secundo
menfe usque ad quartum. Ante enim mensem se-
cundum parum de sanguine menstruali retentum est.
Sed post quartum foetu aucto multum sanguinis ce-
dit in foetus nutrimentum. Hic ergo si fieri po-
test esset curandus eisdem septem intentionibus, de
quibus supra.

Sed prima intentio, scilicet euacuatio prohibetur,
nisi à quarto usque ad septimum, quarta aphorismo
rum. Veruntamen phlebotomia magis suspecta
est, quanto maior est foetus, quinta aphorismorum.
Sed solutio uentris in primis mensibus, scilicet usque
ad tres inclusiue suspecta est, cum eo tempore liga-
menta foetus sint debilia, & à sexto mense supra simili-
ter suspecta, propter foetus nimiam grauitatem. Con-
cedi tamen possunt solutiuia facilia, sicut reubar-
barum, & mirobolani, calsia manna, & similia. Li-
cet omnia aliquid suspicionis ingerant. Et Aui-
cena 21. tertij, concedit polypodium exsiccatum.

Diuerfiones etiam fieri possent iuxta secundam in-
tentionem cum clysteribus leuibus, sicut ex brodio
carniū, oleo, sale, saccharo rub. uel melle, & posset po-
ni calsia, similiter ligaturæ manuum supra cubitos.
Item uentosa magna super umbilico, hæc tamen non
sunt plurimum continuanda.

Correctio autem dispositionum membri mitten-
tis, scilicet matricis, iuxta tertiam intentionem non
debet fieri, oportet enim prouocare menstrua, quo-
rum prouocatio faceret abortum. Quarta autem
intentio, scilicet fluxus interceptio, suspecta est ne ma-
teria ad stomachum fluxura retineatur, & retenta pu-
treat, & ad membrum aliquod apostemandum con-
uertatur, est enim minus malum ut uomitu educatur.
Confortatio autem stomachi iuxta quintam inten-
tionem male fieri potest, cum materia ad ipsum con-
tinuè deriuatur. Confortatio namque applicata interi-
us aut exterius cum sint stiptica stomacho existente
pleno superfluitatibus sunt causa retentionis illorum
superfluum in stomacho, & consequenter causa ma-
ioris conturbationis & angustie. Quare oportet

alterum duorum fieri, aut materiam ad intestina deriuari cum clysteribus, de quibus supra, et aliquando solutius superscriptis leuibus, & cum diæta uentrem leniente, sicut passulis, ficibus, uitellis ouorum, saccharo, brodio carniū laudabiliū, & similibus sumptis in principio mensis. Aut oportet uomitum finire & ipsum facilitare, uomitus namque materiæ in stomacho contentæ ante cibi sumptionem erit causa quietis stomachi & appetitus. Et quod cibus in stomacho retineatur & bonæ digestionis eius, neque natura ex hoc uomitu etiam quatuor aut pluribus mensibus continuatis tantum terretur, quantum terretur ex uomitu à causa præternaturali pendente.

Et nota quod aqua hordei sumpta in mane calida aut uentrem lenit, aut uomitum faciliat. Et sit 4. 3. usque ad 6. Si tamen sumpto cibo inclinaretur ad uomitum, retineatur aspergendo faciem cum aqua frigida, & apponendo stomacho aliquid restrictiui ex superscriptis. Et in fine mensis sumendo cytonium, aut pirum, aut aliud simile stomachi confortatiui, aut restrictiui, & apponatur uentrosa super umbilico, & similia. Si tamen euomerent, euomant complete cibum & humores, deinde cibus iteretur confortando stomachum, ut supra, & totiens citetur, donec aliquid retineat. Et miua cytoniorum cum bolo armeno sedat uomitum. Et syrupus de agresta, & acerositas citri sunt propria in uomitu prægnantis à causa calida. Corriganter accidentia iuxta sextam intensionem secundum ipsorum exigentiam. Et regimen sex rerum ordinetur, sicut dictum fuit superius. In hoc tamen habet differentiam prægnans à cæteris uomitibus, quia oportet magis complacere appetitui illius, quam cæterorum. Et uinum odoriferum paucum subtile & rectificans appetitum earum nauseam & uomitum. Et sinapis excitat appetitum deiectum per præsentiam humorum, frigidorum, crassorum, et uiscorum. Et caseus assatus excitat appetitum & cedat uomitum. Et cytonia assata in quibus sint scissa frusta xilaoles indi in fine mensis sistunt uomitum, & ualent ad appetitum.

Vomitum sanguinis si fuerit à uirtute sana expellente superflua, aut fuerit criticus, sinatur natura operari quousque aeger toleret bene. Alius uero sistendus est, pro cuius cura recurre ad capit. de spūto sanguinis. Omnes enim intentiones & medicinæ ibidem posite sunt ad hunc locum offerendæ. Non est nisi hæc differentia, quia sicut ibi eligimus medicinas pectorales, ita hic eligantur medicinæ stomachales. Auicenna tamen describit remedium expertum. ꝑ. acatiæ, seminum rosarum, terræ sigillatæ, & balauftiarum, ana. 3. i. opij gran. s. sem. hyoscyami alb. gra. 8. gummi arabicæ 3. i. succi arnoglossæ, uel uirgæ pastoris 3. 2. Si uolumus dulcorare possumus addere iulep, ros. 3. i. Si uero uolumus ipsum in forma solida ponatur cum superscriptis pulueribus, succi quantum sufficit, pro formandis trochiscis his utere secundum exigentiam. Potest enim ex his exhiberi à 3. s. usque ad 1. & s. distemperatis cum uino striptico multæ commixtionis cum aqua calibea, aut cum aqua plantaginis, uel accipiantur in forma pilularum, & post eas bibatur aliquid ex superscriptis. Vomitus autem sanguinis sequens ulcera,

aut apostemata rupta curatur cura ulcerum, aut apostematum, de qua infra, admiscendo medicinis ulcerum sanguinem constringentia. Et si à capite deiecerit, cura potest patere ex cura fluxus sanguinis narium. Cura uomitus, aut spūti sanguinis pendens à sanguifuga manifestabitur in sequentibus in quodam cap. proprio.

DE CHOLERICA PASSIONE. Cap. LXXIX.

Hic terminus cholerica passio apud Alexandrum & Simonem descendit à *χολήδω* Græcè, quod est intestinum latine. Sed penitus hos melius scriberetur choladica quam cholerica. Sed apud alios Græcos nostri temporis hic terminus est corruptus cum potius deberet dici coeliaca, unde enim Græcè, idem est quod uenter Latine. Unde enim Græci scribunt per *ω* diphthongum, cui Latine *œ*, diphthongo correspondet, melius scriberetur coeliaca, quam ciliaca. Est autem descriptiue motus uehementissimè terrierum ex indigestione corruptarum ad expellendum eas à corpore cum labore, & acuitate uirtutis expulsiue, in tantum ut frequenter fiat uomitus & feculentus simul, una uia non sufficiente ad egressum huius materiæ propter sui multitudinem, & acuitatem expulsiuam præter modum stimulantem.

Species sumuntur secundum diuersas species excrementum. Sunt enim quædam aquosa de genere pituitatis. Quædam cholerica & diuersarum specierum, & propriè corruptarum, sicut choleræ præsternæ, eruginosæ, & similia. Quædam melancholicæ corrupta frequenter adustione participantia diuersarum naturarum & colorum. Causæ eius sunt omnia quæ corrumpunt digestionem, imò digestionem, siue sint cibi mali, facile corruptibiles, sicut piperis, chrysomilla, melones, et similia, siue sit ciborum quantitas superflua, aut mala præparatio, aut malus ordo, aut tempus incongruum cum ponitur indigestum super indigesto, aut tēpus anni, & propriè æstas & autumnus. Et aer in sua substantia corruptus, & ea quæ accidentaliter occurrunt, sicut coitus, balneum exercitium indebitum, accidentia animi immoderata & propriè tempore non congrua. Et multiplicata ex potu aquæ frigidæ in ieiunio sequente cibum crassum. Corruptuntur quoque digestionem, sunt causa cholericæ passionis propter nocuentiam ipsorum digerentium, scilicet stomachi, et epatis suarum sunt læsa per essentiam secundum aliquam suarum naturarum, aut omnes, aut per communicatam, uel à toto, uel à singulis membris communitate absolute uel non absolute, sed de causis corruptæ digestionis in sequenti cap. uberius agetur.

Signa. Incipit in primis cum lenitate, deinde statim augetur cum dolore & punctione in stomacho & intestinis. Et quæ sunt minus maligna in primis, tandem plurimum expelluntur, sicut cibi corrupti, deinde humores aquosi, & cholerici citrini, tandem uirides præsterni, & eruginosi, & nigri, & tandem perducit ad fluxum uentris, qui est sicut lora carniū recentium, & interdum habet dolorem pungituum, & quandoque perducit ad karatim alcurat, & sunt frusta

frusta subtilia ex substantia intestinorum, quæ educuntur in dysenteria. Accidentia eius sunt sitis, cuius tolerantia iuuat, & bibere aquam frigidam nocet, dolor, & punctio, & uigiliarum infatigatio à principio usque ad finem, sed in processu perducit ad spatium & singultum, & tandem ad casum pulsus, sudorem frigidum, & mortem, & hoc usque ad septimum. Est enim passio peracuta, cuius terminus est ad mortem, uel ad salutem à 4. usque ad 7. dies.

Prognostica. Primum qui hanc passionem frequenter incurrunt, facilius eam tolerant materia non existente tanta nec ita maligna. Qui uero raro diffi- culter saluantur ex causis contrariis, propterea infantes facilius saluantur quam reliqui, quia eam frequenter cæteris incurrunt. Et quia uirtutes suæ naturales sunt fortissimæ. Secundum, cum uentum est ad casum uirtutis, frigiditatem extremorum, spasmus & singultum in fine, non est spes salutis. In principio uero sic, cum tunc sequatur punctiorem & dolorem & fortiter pugnam, in fine uero uirtutis debilitatem, & corporis consumptionem. Tertium, multoties cum restringitur cholericæ passio, declinat materia subito ad uias urinæ, & accidit ardor urinæ. Quartum, hæc passio secundum plurimum est salubris si debite tractetur, sed non apud tardos, negligentes, aut imperitos, celeritate enim indiget.

Cum punctio & tristitia alicui superuenierit, affuerit cum ea, uel post eam uomitus, uel uentris solutio. Aqua calida multoties in potu tribuatur. Et si adhuc perseverauerit uomitus & uentris fluxus, aqua calida iterum detur, sedabitur enim passio. Cum autem ægritudo quiesuerit balneum ingrediatur æger, in quo per unius horæ spatium moretur. Egressus autem de balneo leui alatur nutrimento. Deinde dormiat.

Hoc capitulum habet duas partes. In prima curat cholericam passionem quando est debilis. In secunda ibi. Sed licet uomitus & uentris fluxus, curat ipsam quando est fortis. Item prima in duas statui. In secunda parte ibi. Cum autem ægritudo, curat ipsam in declinatione. De prima parte possumus signa cholericæ passionis dicere. Cum punctio, quædam conturbatio & anxietas stomacica, & cum ea uel post ipsam fuerit uomitus, & uentris solutio aliquando simul una uia non sufficiente ob multitudinem materię, aut ipsius acuitatem præter modum medietatem stimulantem, aliquando successiue una in partem in augmento & statu, ipsa perseverante est multoties, & in magna quantitate tribuenda, lauat enim stomachum & intestina ab his humoribus eo-

rum acuitatem remittens. Et nota pro solenni remedio huius aquæ exhibitæ, ualere non solum in cholericæ passione, sed in omni uomitu & fluxu & anxietate stomacica ab humoribus calidis contingente si oportune afferatur, ita ut frequenter sola ad curam sufficiat. In secunda parte curat dum uentum est ad declinationem per balneum aquæ dulcis ad sistendum uomitum et fluxum, diuertendo materias à centro ad circumferentiam, & ad corpus humidandum superflue per huiusmodi euacuationes exsiccatum. Et nutrimentum debet esse facilis digestionis, boni chymici, cito penetrans, pauca rum superfluitatum, stomachi & intestinorum confortatorium, sicut succus & confusum carnis pulli, aut perdicis, & similia, & proprie post assationem, & modicum uini subtilis aliquantulum stiptici.

Quod si uomitus uel uentris solutio uehemens fiant, & symptomata terrefacientia superuenierint, non tamen est timendum, imò cum medicaminibus quæ ego nominabo succurrendum. In principio itaque trochisci de olibano cum aqua, & niue, & rob granatorum dentur semel. Qui iterum sunt etiam dandi si uomitus non cessauerit. Duo quoque adiutoria & coxæ in supremis partibus ligentur. Et aqua niue in frigidata super crura, & pedes fundatur, & in ipsam etiam immittantur.

Venter quoque ex sandalis, rosæ camphora, gallia, aqua rosacea conspersis epithimetur. Et pannus aqua rosacea in niue in frigidata infusus de super ponatur, qui postquam tepesfactus fuerit est remouendus, & alius ut prius de super mittendus.

Ad potandum autem paulatim tribuatur uinum uetus temperatum cum rob granatorum. Et quando uomuerit iterum tribuatur. Panem quoque in succo granatorum infusum cogendus est sumere cum uino & comedere. Quod si uomuerit iterum dandus est, donec quiescat.

In hac parte curat cholericam dum est fortis. Et habet quatuor partes. In prima facit, quod dictum est, in secunda ibi. Quod si syncopis. Curat syncopæ superuenientem. In tertia ibi. Quicquid autem. Ordinatur diætā proprie conuenientem in declinatione. In quarta parte ibi. Trochisci dicti de olibano. Describit quoddam medicinas, de quibus fecerat mentionem. In prima parte dicit, non esse timendum, esto

quod uomitus & fluxus ventris fiant uehementer & superueniant symptomata, id est accidentia horrenda, sed ad remedia properandum, ut infra.

Sed nota quod statim à principio & antequam huiusmodi remedia fiant, debet exhiberi aqua calida in magna quantitate & multoties, ut dictum est superius.

In primis exhibet unum de trochiscis, de olibano, quorum descriptio ponetur statim, ponderantē aur. i. distemperatum cum ʒ. i. aquæ frigidissimæ, & ʒ. s. rob. de granatis, & si uomitus non cessauerit iteretur eiusdem medicinæ exhibitio, magis enim debemus esse solliciti de retentione uomitus, quam fluxu ventris. Quod si abhorrent hunc modum sumendi hos trochiscos possunt exhiberi in forma pilularum, & post eorum sumptionem bibatur liquor superscriptus, habent enim in restringendo uomitum singularem proprietatem. Secundum remedium, ut duo adiutoria & coxæ in supremis partibus eorum stringantur fortiter, ut ratione doloris materia diuertatur & ut maior dolor tristem sensationem denigret.

Tertio, aqua frigidissima super crura embrocetur & in ipsa etiam mittantur pedes ad compingendum & incrassandum materiam, ut fiat inepta fluxui.

Et Gerardus de Solo laudat manutergium in aqua frigida infusum, & post expressionem collo applicatum, quia nervi uenientes à cerebro ad stomachum congelantur, unde cessat tristis sensatio in ore stomachi, quæ est causa uomitus, & clauditur meri. Quarta epithymetur stomachus cum hoc. R. rosarum, & propriæ syluestrii stipticarum, sandalorum rub. ana. ʒ. 2. camphoræ ʒ. s. galliæ muscatæ ʒ. i. aquæ rosatæ ad conficiendum quantum sufficit: hoc in modum unguenti cum quo stomachus ungatur, postea pannus infusus in aqua rosata frigidissima actu loco inuncto supponatur & sepe replicetur. Expediens tamen esset ut petia infusa in medicamine prædicto cui multa aqua rosata esset admixta & expressa stomacho sæpe applicetur ne tepescat. Sed hoc medicamen non omnibus conuenit, sed solum stomachi discrasiam calidam habentibus cum fortitudine caloris innati. Quinto, iubet in potu dari uinum granatorum cum uino ueteri mixtum ad uigorandum uirtutem & confortandum stomachi retentiuam & prohibendum cibi corruptionem ratione acetositatis, dosis sit ab ʒ. i. uel quantum uidebitur discretioni medici, & per uinum uetus intelligo uinum depuratum, contra mustum distinctum, & sit stipticum aliquo qualiter & non ualde crassum. Et si uomuerit iterum exhibeatur, donec retineat. Et panis in uino granatorum infusus similiter exhibeatur loco cibi. Et bibatur uinum in quo est infusus. Quem si uomuerit, iteretur donec retineatur, hanc discrasiam calidam stomachi remouent, & confortando humores uenientes ad os stomachi prohibent.

Quod si syncopis superuenerit, muscum cum rob. granatorum, uel cum uino dare conueniens est, inde inferendo, & succus carnis boedinae, & pullinae cum paucis cytoniorum succo, & uino mixtus in potu

est tribuendus. Pulli præterea sunt affligendi, & ante nares ipsius discernendi. Tunc etiam dandum est, ut mastichet ipsum, & paulatim trahat. Postremò bolum corascenū cōditum cum camphora tribuatur.

In hac parte curat syncopim superuenientem, tum ratione uaporum malignorum cordi communicantium, tum ratione compactionis cordis ori stomachi, tum propter paucitatem spirituum sequentem euacuationem superfluum. Primo, exhibet uinum cum musco, ut puta i. ʒ. uini odoriferi subtilis cum 4. granis mulci, sed melius est, ut huic addatur s. ʒ. aut ʒ. i. uini cytoniorum, uel alicuius similis frigidi ualentis in stomachi confortatione. Secundo, exhibet cibum resumptiuum, restauratiuum spirituum in breui tempore, propter facilem eius digestionem & penetrationem, & stomachi confortationem.

Cuius sit hæc descriptio. R. succi carnis boedinae, uel pullinae, aut alicuius auis bene conditionatæ ʒ. 2. uini cytoniorum, uini subtilis aromatici aliquanti dulcedine participantis ana ʒ. i. misce & totum debet calidum, uel quantum fumere possit, ita ut non uomat exhibeatur in potu. Tertio, confortat ægrum bonis odoribus, sicut pullis assatis, & contractis appetitis prope nares, sed bonum est ut unicuique præsententur sibi placentes. Quarto, iubet pro confortatione stomachi, & retentione uomitus, thus mastichari & deglutiri, aut si eius masticationem abhorret, & deglutitur absq; masticatione. Quinto, bolum corascenū, qui non est apud nos, cuius loco accipimus mastichis, boli armeni ana ʒ. i. camphoræ ana gran. 2. usque ad 4. & formare pilulas cum uino cytoniorum, cytonia enim, & quæ ex cytoniis fiunt, conferunt secundum omnem modum administrationis, & serè omnes excedunt medicinas in hoc casu.

Quicquid autem de huius passionis cura nunc usque diximus, donec uomitus sedetur, & stomachus cibum recipiat, fieri conuenit. Postquam uerò stomachus ipsius retinere poterit, nutriendus est æger. Et parum uini ueteris in potu sumat bene reolentis. Et dormire incipiat.

In hac parte ordinat dietam conuenientem, & propriè uomitu sedato: quæ debet esse crassior quam antea. Sed tamen omnia quæ exhibentur, sint pauca in quantitate, facili digestionis, boni chimi, multum uinum superfluitatum, quorum paucum, multum nutrit, stomachi & membrorum nobilium confortat, uia, odoris & saporis boni, ægro placentia: etiam præcipit somnum, qui tamen est conueniens in toto curationis processu, minoratis superfluitatibus, & prope post cibi & potus, aut alicuius medicinalis sumptionem.

Trochisci de olibano dicti ad uomitum.

Recipe

Recipe boli, coraseni, thuris, amborum
an. drach. 10. cubeæ, cardamomi amboru
ana drach. 2. & s. camphoræ, galliæ, gar.
omnium ana 6. drach. 1. fiant trochisci pon
dere aur. 1. hi enim uomitui multum confe
runt. Rob de malis granatis, succus mar
lorum granatorum acetosorum sumantur,
& per noctem unam aut amplius dimittan
tur, donec quod crassum est in fundo reside
at, & deinde coquatur, & dispumetur do
nec iulep similitudinē habeat, in quo ab igne
disposito adhuc tamen calido mēta viridis
stipites mittantur, & in ipso permanere
permittantur, quousq; infrigidentur. Cum
que infrigidatum fuerit extrahantur, ad cu
ius similitudinem syrupus de cyton. & sy
rupus de malis macianis fieri conuenit.

Si autē uomitus hora alia inualuerit ni
mis, & superfluerit magna uentosa stoma
cho superponatur.

In hac parte describit quasdam medicinas, de qui
bus fecerat mentionem, quarum descriptiones sunt
1. boli coraseni, loco eius pone mastichis, bo
li armeni, thuris, ana 3. s. charabæ, cardamomi, an. 3.
ana, gran. 15. camphoræ, galliæ muschatæ, gariophi
ana, gran. quinque, formentur trochisci aur. 1. cum a
qua acetosæ, aut rob de granatis infra scriptis, de qui
bus detur unus in forma pilularum, post cuius sum
ptionem sumatur parum eiusdem rob cum paucis
quæ calibeat. Descriptio rob de granatis, succus
granatorum dimittatur residere per noctem, deinde
subtile accipiat & bulliat, & dispumetur donec iu
le p similitudinem habuerit, in quo ab igne deposito
ipso dimittantur manere donec infrigidetur, postea
extrahatur & referuetur, ad cuius similitudinem sy
rup. de cytonijs, aut malis macianis fieri conuenit &
uentosam magnam ad fluxum. Vltimo,
cho superponit.

Cura huius per sepe difficilis est & indiget medico
constante, & experto quem non terreat accidentia.
Etenim summa quinque exigite intentiones. Prima cau
sum remouet euacuando humiditates corruptas, quæ
sunt in stomacho, & in intestinis, nec non cachochi
miam in toto existentem, præcipue in uenis membro
rum naturalium secundæ & tertie digestionis dolo
rem & punctiōem stomachi & intestinorum se
dando. Secunda, diuertit. Tertia, humores incrassat,
uias & ductus constringit, tandem stupefaciendo si
fuerit necessarium, & cum hoc stomachum & intesti

na confortat ne recipiant. Quarta, accidentia corri
git. Quinta, ordinat debitum regimen sex rerum.

Imprimis si fuerit dolor & punctio in stomacho &
in intestinis cum nausea & inclinatione ad uomitum
aut secessum uentris cum incoeperit, præmittatur cly
stere ex 15. 3. aquæ hordei, & 3. 4. olei communis, 3.
1. sacch. rub. & uno uittello oui. Aut si uideantur hu
mores frigidi magis dominari fiat clystere ex 3. 15.
aquæ pauci mellis, quo educto bibat aquæ calidæ,
aut aquæ hordei 3. 6.

Et si appareat dominium humorum frigidorum
aquæ pauci mellis tantundem, cui posset addi 3. s. cy
mini præparati, est enim proprium, hæc enim aqua
materias & cibos corruptos, uel per secessum, uel uo
mitum purgabit. Post hoc si uomitus & fluxus si
mul incipiunt, aut alter eorum sinatur natura opera
ri, quouque beneferat, & propriè his euacuationi
bus existentibus proportionatis uirtuti & cacochi
miæ. Quod si fuerit improporionatæ cacochi
miæ, ut quia nimis pauca, aut nimis tarda, adiuuen
tur aut cum clysterijs, de quibus supra, aut uomiti
bus leuibus, sicut si 3. 4. aquæ hordei admisceantur, 3.
2. oximellis, & tepidum sumatur, adiuuatur etiā
uomitibus digitis in ore impositis, aut penna oleo in
tincta & similiter imposita. Et omnino uitentur for
tia solutiuæ & uomitiuæ, & omnia stomachum rela
xantia sicut olea. Et omnino cauendum est ne uter
que simul artificialiter prouocetur, fierent enim mo
tus contrarij sese impediētes. Sed nunc adiuuetur
unus, nunc alter secundum naturalē inclinationem
ad illū. Si uero fuerint improporionatæ uirtuti, quia
nimis superfluant, minorentur & constringantur.

Et similiter si fuerint coniunctæ accidentibus mole
stis sicut dolor, punctio & similia, mitigentur & cor
rigantur, sicut infra dicitur. Sumptio enim aquæ
calidæ, aut aquæ hordei, in causa calidæ, aut aquæ pau
ci mellis in causa frigida, in magna quantitate fluxum
facilitat & dolorem & punctiōem lenit. Et similiter
cum his clysterizatio, & propriè addēdo oleum rosi
aut uiolaceum, aut adipem renum capræ, & similia.
Nam hæc intestina confortant, dolorem sedant, ex
coriationem prohibent, & expertus sum quod huiusmo
di aquæ calefactæ sumptæ in potu, & clysterizate mo
do iam dicto, non solummodo in cholericis passio
nibus, sed in multis alijs fluxibus etiā optime conse
runt in principio. Secunda intentio perficitur cum li
gatione brachiorum supra cubitos satis dolorosa,
quæ multoties permuetur nunc parum infra hunc
parum supra, necnon cum positione uentosarum in
pulpis spatularum sine scarificatione & in dorso, uen
tosæ quoque posite super epatē & splene fluxum & uo
mitum retinent, materiā uenientem ad stomachum
& intestina prohibendo, & debent esse uentosæ ma
gnæ. Et ad sedandum uomitum confert ligatura co
xarum supra genua, licet in fluxu non conferat cum
moueat materias ad inferiora. Sudoris quoque prouo
catio egregie confert si fieri potest ad quem prouoca
tum elaboretur sumendo aquam calidam, de qua su
pra, sed sit notabiliter calida, & cū quanta parte uini
subtilis uinosis mixta. Et æger bene pannis cooperiatur,
dormiat iuxta posse, anhelitus quoque reuentio ad
sudorem iuuat, quæ si non suffecerint ponatur in bal

neo aquæ calidæ constante uirtute in quo tamen par uam moram trahat, ne debilitetur, & egrediens de balneo siccetur, & dormiat. Cæteræ quoque euacuationes sibi consuetæ iuxta posse prouocentur, nam diuertendo euacuant.

Tertia autem intentio, scilicet constrictio, perficitur cum inferius dicendis. Sed apud me sanum consilium est, ut elaboraret imprimis in retentione uomitus, & sinat uenter fluere, quæ uomitus retentio fiat si possibile est secunda die, & postea euacuata materia quantum uidebitur opportunum perfectum, elaboretur in uentris constrictione. Constrictio autem uomitus fiat aspergendo faciem ægri aqua frigida dum uult uomere, & apponendo super stomacho res stipticas confortantes notabiliter frigidæ actu & potentia in causa calida, ut .R. sandalorum rub. rosarum rub. semen rosarum ana 3. 2. camphoræ, gran. quinque galliæ muscatæ 3. 1. aquæ rosæ 4. aceti 3. 1. s. misce, & petiæ duplæ aut philtrum in modum scuti figuratum secundum quantitatem stomachi infundatur in hoc liquore actu frigido, imò etiam apud necessitatem in niue in frigidato stomacho applicetur, & sæpe reiteretur ne super calefiat. Et his potest addi succus acerosæ, & succus plantaginis apud maiorem necessitatem in frigidationis, & si frigidorum uelis frigiditatem temperare potes suprascriptis addere succum mentæ. Et nota quod mastix dissolutus cum oleo cytoniorum, & aceto, & extensus super corio ad modum ceroti est efficax in retinendo uomitum. Et si opus esset maiori in frigidatione posset addi semen rosarum & sandali, & similia.

Gerardus de Solo facit cerotum optimum efficax ualde. R. laudani, mastich. ana, quartam s. oliban, 3. s. sandali al. & rub. sumach, berberis, ana. 3. 1. antheræ, corallorum, acatiæ, hypochistidos, psidiæ, balauistiæ, ana 3. s. terebinthinæ quantum sufficit ad tenacitatem, puluerizanda puluerizetur, & cum pistello misceantur omnia malaxando cum oleo rosaceo, & fiat cerotum ad modum scuti secundum quantitatem stomachi. Et si uomitus esset fortis fiant duo, unum ponatur ante, reliquum post, scilicet circa 13. spondilem. Nam orificium stomachi magis declinat ap partem posteriorem, sed quia spondiles prohibent penetrationem uirtutis medicinarum à parte posteriori, ideo magis ponimus ante. Et dicit se uidisse emplastrum positum à parte posteriori sistens uomitum, & non à parte anteriori. Item describit istud. R. succi plantaginis, aquæ rosatæ de stiptibus, quia ista est magis stiptica, ana quartam 1. aceti 3. s. sumach, berber. ana 3. 2. mastichis, oliban, ana. 3. 1. fari næ lenium quantum sufficit, puluerizanda puluerizentur, & misceantur omnia, & fiat emplastrum medio criter liquidum & super stomachum ponatur, & dicit se uidisse quandam uetulam, quæ accepit de pane cocto & pistauit bene & accepit 3. 2. pulueris mastichis, & miscuit totum, & posuit in sacculo, & istum sacculum calefecit manibus, & posuit super stomachum patientis & statim fuit retentus. Sed melius est hanc medicinam sic conficere, & est experta, medulla panis torrefiat & infundatur in uino nigro, stiptico, aceto, succo mentæ, an. & postea contundant in mortario addendo mastichen & galliam muscatæ,

& semen rosæ, aut sandalos, aut corallios, aut alias medicinas stipticas, quæ tibi magis placuerint, aut plures ex his simul secundum intentionem quam queris & est efficax & expertum. Et ex his possunt fieri uingenta calida aut frigida, aut mixta secundum exigentiam. Cum enim humores peccantes sunt frigidi, & complexio naturalis frigida elige calida stiptica, quæ etiam actu calida applicantur, & cum res habet e contrario, applica frigida stiptica actu & potentia. Cum uero res medio modo se habet, medium teneatur ut applicando stiptica, temperata & stiptica permixta ex calidis & frigidis, ita ut ad medium proportionatum reducat. Nunquam tamen applicantur nisi actu calida aut frigida, non autem tepida: tepidum namque dissoluit robur stomachi, & quidam dissolunt mastichen cum albumine oui, & extensum super corio, applicant stomacho, & dicunt esse efficax & ultimum ad retinendum uomitum, sed de curatione uomitus dictum est superius quantum est opportunum. Sed reuertens uomitus elaborandum est, ut uenter moderatè fluat quousque cacochimia sit reducta, aut quousque uirtus tolerare potest, elaborandum est in constrictione pro quo complendo humores incrassentur, uix & ductus oppilentur cum interius sumptis, sicut rob & syrupus de cytonijs & granatis de ribes, de myrto cum aqua plantaginis, aut calibeata, electuarium de sorbis, & similia. Et exterius applicata sunt cerota, emplastra, & unctio nes, de quibus sermo præcessit, & ex conuenientibus proprijs est ut ungatur uenter cum oleo rosaceo notabiliter calido, scilicet quantum suffere potest, postea desuper aspergatur hic puluis. R. sem. rosæ 3. 2. galliæ muscatæ, mastichis, ana 3. 1. misce, & super loco uncto aspergatur. Sed de his uberius agetur in capitulo de fluxu uentris. Et ex appropriatis est aqua andachæ, id est trifolij. Quarta intentio, scilicet accidentium, correctio perficitur cum his quæ dicta sunt in textu, sed pro sitis sedatione non est bibenda nisi aqua calida, aut fugatur aliquid succi granati: potus enim nimis & præcipue actu frigidus multum nocet. Symptomi autem intendatur cum aspergione aquæ frigide non in faciem & potu pauci uini subtilis odoriferi multum uinosi & lymphati, & sumptione aquæ calidis, & similibus, in quibus parum musci ponatur, & si extrema in frigidentur, calefiant cum pannione dis. Singultui autem & propriè ex inanitione subueniatur cum frigidis stomachum confortantibus, euacuationem prohibentibus, sicut uinum, & miua cytoniorum, & exterius applicetur emplastrum ex cytonijs decoctis in aqua calibeata cum pauco aceti ad penetrandum & stringendum, & his possent addi rosæ & sandali, de quibus supra, & cibetur sæpe parum cum aqua carnis, & huiusmodi boni chymilicis digestionis, alterati cum frigidis confortantibus & stringentibus. Spasmo autem subueniatur unguento nucham & partem spasmatam ex oleo rosæ, uic pinguedine porci recentis, & medulla uituli decieslo tis cum aqua frig. & tempore frigido ex oleo amygdalis. Et specialis intentio circa mandibulas spasmatas ut eleuentur cum mento ad superiora & rectificentur in contrarium spasmi inunguendo eas cum humerantibus, de quibus supra. Regimen autem sex rerum est

est, ut non comedant nec bibant uirtute constante nisi mundificatione pro magna parte facta. Interim tamen semper confortentur bonis odoribus sibi placitis: plurimi enim fructuum odoribus delectantur, aliqui odore uini, unicuique concedatur odor, qui sibi magis placet, & ante mundificationem, si situerint colluant sibi os, aut lambendo sumant succum granatorum & citoniorum, & similia: tolerantia enim sitis confert, & si non possunt abstinere à cibo, sumant parum aquae carnis aut confusi, aut pitisanæ, & similia, & parum uini pauciferi, lymphati ut uirtus susten-
 tur. Declinante autem ægitudine detur contusum pulli, & panis in uino infusus, & carnes auium laudabili, & similia, & pira, citonia, & huiusmodi, & bibat uinum nigrum, stipticum, lymphatum, cum aqua calibata. Ralis autem exhibet uinum uetus, id est clarum, & depuratum cum succo granatorum aut citoniorum. Et si uomeret, iterum detur donec retineat & parum pro uice, præcipue parum bibat, & in summa uatur cibus boni chimi calidis aut frigidis secundum exigentiam, sed omnia sint stomachi & membrorum principalium confortatiua, multum dormiat præcipue sumpro cibo, quiescat animo & corpore.

DE NOCVMENTO DIGESTIONIS.
 Cap. LXXX.

Circa rubricam more consueto est sciendum, quod debilitas digestionis primò quæ debetur fundo stomachi est mutatio ipsius à digestionem naturalis per corruptionem, diminutionem, & ablationem. Corruptio autem ipsius fit quæ aduritur, aut putrescit, aut acquirit aliquam qualitatem non proportionalem ad aliquam qualitatem consuetarum. Diminuitur autem apud quosdam dupliciter per remissionem aut intentionem cibo dimittitur aut superflue decocto: ita tamen ut non corrumpatur aliquo modorum suprascripitorum. Quorū error apud alios facile reprehenditur, cum digestio fit æquatio eius quod digeritur in ordine ad nutritionem, quanto autem aliquid magis æquatur in ordine ad nutritionem, tanto magis & melius digeritur. Non itaque digestio potest lædi per intentionem. Et confirmatur, quia digestio fit à calore æquali multiplicato in quanto apud Galenum 1. Aphor. Aphor. 4. metheo. digestio est cōpletio in unoquoque humido à proprio naturali calido ex oppositis passis, ergo quanto magis complebitur & ultimabitur naturæ in generationem uel perfectionem mixti et non in corruptionem, omnis superflua decoctio ordinatur in corruptionem, ergo nulla superflua decoctio est digestio: oppositum autem contingit in operationibus uinum ministrantium nutritiue: possunt enim lædi per intentionem & remissionem. Digestio tamen est diminuta dupliciter, aut quia tarda, aut quia non completa: nec tamen ex his fit corruptio ad acetosum. Sed contra, sicut potest esse diminuta à completo abque corruptione ad acetosum, ita potest ad fumosum, ergo cum non possit reponi, in alia specie est digestio læsa per intentionem. Et confirma-

tur, quia sicut est in artificialibus, ita est in naturalibus sed contingit artificio aliquid maius aut minus decoqui absque hoc quod corrumpatur, ergo, &c.

Item 4. metheo. contingit pepanlim lædi in maius & minus. Credo opinionem utranque posse defendi, & fortè non est contradictio, nisi in uerbis: utraque enim concederet decoctionem posse lædi per intentionem & remissionem absque corruptione, & quælibet concederet æquationem & debitam permixtionem humidi cum sicco in ordine ad nutritionem, aut mixti generationem & perfectionem non posse lædi per intentionem. Et facientes differentiam inter magis digeri & perfectius digeri fortè sentiunt hoc idem: si enim quanto eliquatio esset fortior, tanto digestio esset intensior, tunc faciet transitum subitum ab intensiua digestionem ad non gradum digestionis, ubi ponatur fortificari digestionem, donec digestibile aduratur. Aufertur autem digestio, cibo non immutato aliquo modorum suprascripitorum, aut leuissimè immutato, ita ut aliquando etiam post longam retentionem amoueatur aut egeratur non permutato ab eadem dispositione in qua assumptus est.

Causæ nocuenti digestionis sunt duplices primitiue & corporeæ. Et primitiue sunt aut extraneæ, sicut percussio stomachi, aut membri stomacho communicantis. Item morsus, sumptio aut applicatio uenenosorum. Balneum calidum post cibum conuertens calidum exterius, aut frigidum caliditatem extinguit. Aut non sunt extraneæ, sicut sumptæ à fæce rebus non naturalibus. Aer nanque superflue lapsus in qualitatibus primis aut corruptus, aut habens uapores malos admixtos, sicut cadauerum, & similia, foetentium est causa nocuenti, scilicet, corruptionis aut diminutionis, digestionis. Similiter cibus. Aut quia superfluous ut bene digeri non possit & corrumpitur ad acetosum: maxime si stomachus sit frigidus, aut diminutè digeritur, uel est tam paucæ quantitatis, ut aduratur & corrumpatur ad fumosum in stomacho calido, aut nimis decoquitur. Secundo, propter qualitatem superfluam, sicut mel in dulcedine cum notabili caliditate, & corrumpuntur magis ad fumosum, aut superfluitatem in frigidationis, & diminutè digeritur, aut corrumpitur ad acetosum, sicut lactuca, papauer, & similia, aut superfluitatem in humidum, sicut persica, pepones, & similia, & putrescunt in stomacho calido & acetosantur in frigido, & e contrario siccitas superflua corrumpit magis ad fumosum, si coniuncta sit caliditati superflua. Tertio, ratione modi substantiæ reuicis, sicut lac, oua, cerasa, & similia, quæ facile putrent. Sicut contra quæ sunt crassæ substantiæ, tardè digeruntur & diminutè corrumpuntur ad acetosum, sicut caro bubali, pira spissæ substantiæ, & similia. Quarto, quia sunt contraria appetitui, sicut oleaginea, foetida, pinguedines, rancida, crocus, & similia, quæ magis corrumpuntur ad fumosum & putridum. Quinto, quando currunt proprietates contrariæ, aut à tora specie, sicut inter carnes crudas & hominem, aut insequentem materiam, sicut aliqui abhorrent uinum, aliqui caseum. Et amicus meus soluebatur comestione cancrorum.

Istæ ergo proprietates siue actiue siue passiuæ, sunt causa nocuenti digestionis, scilicet, corruptionis, aut diminutionis, & malè possunt removeri, licet

aliquando contigerit non bibentem uinum postea bibisse. Et imprudenter operantur, qui student has proprietates específicas, aut insequentes materiam permutare, & magis falluntur & ineptius operantur, qui exhibent uinum, aut aliud secundum proprietatem alicui contrariam quātumcūq; cognouerint illud secundum qualitates manifestas fore conueniens, proprietates enim in omnibus siue específicas, siue insequens materiam, est super omnes dispositiones manifestas obseruanda, & uniuersaliter hic modus ampliatur ad quemcūq; cibum & potum alicui horribilem ratione odoris, saporis, cruditatis, et similia, Sexto quando cibum sumitur nō in hora sua, sicut cum stomachus est repletus humoribus superfluis, aut cum sumitur cibo præcedente nondum perfecte digesto, uel si sumitur ante consuetum exercitium, uel expulsionem superfluitatis; etiam si non fiat in stomacho dummodo sint alterantes stomachum. Septimo propter errorem in ordine assumendi: sicut enim cibus difficilis digestionis crassus & stipticus præmittitur faciliori ad digerendum, subtili, & lubrico, quapropter errant qui præmittunt carnes ouis, nisi sint duræ, & lac coagulatum, & cerasa & uuas, & ferculum comedunt in fine mensæ, & elixum cæteris paribus post assatum. Octauo, quando cibi diuersi comeduntur, ut liquida, assata, frigida, elixa, arto cleæ, Item multum diuersa ex parte saporum, nec non ex parte modi substantiæ, mala super omnia est commixtio salforum cum dulcibus, & assatorum uel frixorum cum rebus facilis corruptionis, si aut miscere pisces salitos, caseum salitum, pisces frixos cum ouis aut lacte. Et hi pro parte corrumpuntur, pro parte diminutè digeruntur. Nono, propter malitiam artificis, sicut cibus male coctus, aut pisces qui post coctionem steterint suffocati. Decimo, quando faciens eructionem, quia uentosabilis, alijs præponitur cibus. Tunc enim uctositas alios commouet cibos, & permiscet nec sinit stomachum bene alios amplexari, propterea raphanus, & similia sunt commedenda in fine non in principio. Undecimo, quando esset malæ substantiæ non corrigibilis à uirtute, sicut fungi & cibi qui putruerunt. Contra illos qui comedunt perdices & quales fetentes, & isti corrumpuntur ad foetidum, & qualitatem malam non consuetam. Duodecimo, quando est multus potus in comparatione ad cibum, aut e contra. Sed ex parte somni post cibum, si aut digestio iuuatur calore intus reuocato, ita minuitur aut corrumpitur cum homo uigilat tempore somni, calore exteriori moto ad instrumenta motus & sensus uoluntarij. Repletio quoq; superflua & non existens in stomacho, sed in membris ipsi communicantibus impedit stomachi digestionem, calorem innatum suffocando, sicut nimia inanitio ipsum paucificando. Motus quoq; laboriosus post cibum minuit aut corrumpit digestionem, tum cibum agitando, ut non bene amplexatur à stomacho, tum calorem trahendo ad instrumenta motus. Leuis tamen deambulatio iuuat faciendo cibum ad fundum descendere stomachi. Ete contra quies post cibum iuuat ad digestionem, prolongata etiam completa digestionem, minuit digestionem calorem hebetando. Coitus autem post cibum impedit digestionem, & multiplicatus, maximè nocet. Accidentia quoq; animi immoderata, immoderate mouentia spiritus interius aut exterius, aut simul

exterius & interius, sicut passio dicta essent digestionem impediunt. Spes uero & gaudium moderatum digestionem iuuant. Causæ uero corporeæ sunt duplices per essentiam aut per communitatem. Per essentiam quidem. Aut in compositione, sicut si stomachus parus, caret quantitate, existens nimis magnus aut parus, aut figura existens figuræ rotundæ, cum debeat esse figuræ oblongæ, sicut cucurbita retorta, aut si essentia tenuis, aut raræ substantiæ, aut esset nimis aspera, aut lenis in superficie, licet huius speciei compositionis æqualitas immediate deferuiat retentioni, mediate digestionem. Similiter lapsus in complexione impedit digestionem. Sed inter omnes lapsus ad frigidum & humidum, iuxta Aphorismos. Quicūq; uentres habent humidos iuuat. Lapsus autem in passiuus cum temperie actiuarum parum impedit digestionem, nisi proportionetur materiæ, & terias. Humiditas quidem cum præsentia materiæ, siccitas cum consumptione & arefactione, sunt enim hæc qualitates passiuæ paucae impressionis, neque multum possunt intendi sine lapsu actiuarum. Marenæ ergo in stomacho superfluentes cuiuscūq; generis, siue pediant digestionem, siue in stomacho contentæ, aut aliunde deriuatæ. Et similiter uentositas aut cibum corrumpendum cum admiscetur aut minuendo, quia non sinit stomachi parietes sufficienter cibo adhære, bona enim comprehensio stomachi super cibum, est causa bonæ digestionis nisi sit grauatiua, sed grauatiua facit retentionem comprimendo & non sinit cum na digestio, licet cibus citius descendat, & nō sinit cum ea eructatio & rugitus, sed calidæ ex his magis corrumpuntur, imò cum stomachus est calidus absq; materia aut cū materia cholericæ effusa ex epate ad ipsum propter multitudinem generationis eius in ipso per uisceris, corrumpuntur in ipso cibi leues, & digeruntur felles, & crassi, sicut est caro uaccina: frigida uero diutius nutrit, corrumpunt, et interdum auferunt. Sed materia saniosa plurimum corrumpit ad foetidum. Solutio continui, recens aut antiqua, apostemata, bores thor, digestionem impediunt diminuendo aut corrumpendo. Et nota digestionem duplicem in sua operatione impeditur, tam propter defectum instrumenti, quod est complexio calida & humida moderatè, quàm in organo quod est fundus stomachi. Sed defectus in his lædit digestiua per se & immediate. Sed aliquando læditur mediatè & per accidens propter defectum continuæ læso pyloron ab humiditate superflua, aut irritato caliditate excessiua pungente et irritante, siue sint cum materia siue sine, quare non tantum opere retentiua retinet, donec digestiua suam completam operationem, & aliquando propter superfluitatem appetitiuæ, quæ debetur ori stomachi secundum plurimum à frigiditate superflua contingentem, quæ re etiam superfluit attractiua, & consequenter sic comestio superflua in comparatione ad digestionem à toto se per communitatem impeditur digestio aut à toto se cut in febribus, hydrope, crisi, & similibus, & per communitatem à membris particularibus, sicut à cerebro, à spiritalibus membris, splene, epate, intestinis, renibus, uesica, mesenterio, zirbo, neruis, iuncturis à rach, matrice, & similibus communitate absoluta aut non absoluta. Et inter communitatem absolutam computatur

computatur priuatio transmissio eius quod deberet transmitti, sicut in fluxu sanguineo laeditur stomachus, spiritu sufficienti ad ipsum non transmissio.

Signa nocimenti digestionis in se & absolute sumuntur ex gravitate & mala tolerantia cibi, etiam si paucus sit aut mediocris. Item ex multiplicata uento litate per superius aut inferius, aut ex rugitu, tardo descensu cibi ex stomacho, nisi fuerit lubricus aut adfusa causa lubricans. Item ex pauca corporis restau ratione, palliditate faciei, multo spuro cum debilitas digestionis longo tempore prolongatur. Item ex uisu, relatu acri, & astantium: uidemus enim post longam retentionem cibi in stomacho ipsum egredi per superius aut inferius, nihil aut parum a sua dispositione permutatum, quod est euidentis signum primæ digestionis ablatae. Et si digestio est diminuta notabiliter, eructatio post octauam aut decimam horam re dolet odorem cibi, & forte adest nausea, extensio, & aestuatio anhelitus, & si corrupta ad acetosum, foetidium, aut fumosum, aut ad qualitatem non consuetam, eructatio redolet illud ad quod corrupta est.

Signa causarum primitiuarum sunt praecursio earum, & subsecutio huius nocimenti digestionis, ueri similiter causae praecedenti proportionalis. Et quod quod defunctus talis impedit causam, tale sequitur nocu mentum, & quando non praecedit, non sequitur huiusmodi nocumentum. Signa autem malarum digestionum stomachi, scilicet malae complexionis, compositionis, solutionis continuitatis, apostematum, patere possunt ex his, quae dicta sunt in capitulo de uomitibus, & similiter signa uentositatis. Sed malam complexionem frigidam aut humidam, significant paucitas sitis & constans appetitus ad cibum, albedo linguae, sapor oris insipidus aut acris, eructatio acris aut incipida, tardus descensus cibi, calor faciei cal. & sic significant sitis, paucitas appetitus ad cibum, sapor oris, & similiter eructatio amara, foetens aut fumosa. Color linguae tendens in citrinum aut fuscum, pallor faciei cum citrinitate, & similia, & uento litatem significant rugitus & extensio, & ipsius per se peris aut inferius expulsio. Signa reliquarum digestionum in capitulo de uomitibus perquirantur. Signa autem fortis compressionis stomachi supra cibum absque bonitate digestionis sunt, quod compressio est tremula absque uento rugitus & eructatione. Item adest extensio & singultus cum impotentia perficiendo cibum. Item adest conturbatio, grauitas, desiderium cibum uelociter descendit absque complemento digestionis. Materiam uero corruptam ultra signa sui generis, de quibus supra, cognoscuntur ex foetore, sapore horribili, inconstituta, nausea, uomitibus singultu, & similibus accidentibus malignis, & si huiusmodi materiae congerantur in stomacho signifi ca interpolatione: quod si interpolatio fuerit pluri quod autem sit membrum mittens, cognoscitur per notum ipsum, quae praecellerunt, & per materias in stomacho repertas naturae illius membri proportionales. Si uero communitas sit absoluta sola praecellio nocumentorum illius membri est signum, &

proprie cum non uideatur nocumentum illud esse per essentiam, aut ab alia causa pendere. Signa autem renuitatis stomachi, & raritatis texturae sunt dolores & aliae aegritudines in stomacho prolongatae, & debilitas digestionis cum debilitate appetitus, & corporis extenuatio.

Prognostica. Primum. Nocumentum digestionis stomachi est mater ferè omnium aegritudinum materialium, propterea dicitur quod plures interficit crapula quam gladius. Secundum. nocumentum digestionis primae notabile est causa nocimenti digestionis secundae, dico notabile, quia si fuit paruum corrigitur per bonam monoculi & epatis dispositionem. Tertium. Digestio prima corrupta est causa aegritudinum quae sequuntur corruptionem tertiae aut quartae digestionis: cum ipsa corrumpendo secundam digestionem sit causa corruptionis digestionis tertiae & quartae. Aegritudines autem quae immediate sequuntur nocumentum digestionis primae sunt sicut lienteria & hydropilis tympanites, & quae sequuntur nocumenta secundae, sicut sunt ascites, fluxus humoralis, apostemata, & similes, & quae sequuntur, nocumentum tertiae, & quartae sunt sicut scabies lepra, hypofarica, albaras, & morphaea. Quartum. Quod est origo aegritudinum chronicarum multiplicando materias crassas & multas cum debilitate uirtutis. Est enim causa epilepsiae, melancholiae mirachiae, & corruptio digestionis multotiens est causa pruritus. Quintum. Digestio corrupta in conualescentibus prognosticat recidiuam, arguit enim multiplicatas superfluitates quae sunt causae reciduae.

Sextum. Debilitas digestionis primae multiplicat phlegma uerum aut non uerum: quia chylus indigestus est similis phlegmati in substantia, colore, uiscositate, frigidityte, quapropter facile conuertitur in aliquam substantiam similem phlegmati, quod tamen non credo esse uerum phlegma. Est etiam causa phlegmatis ueri quia ex chilo diminute digesto plus conuertitur in phlegma, in secunda digestionem, quam si esset bene digestus, propterea in omnibus aegritudinibus phlegmaticis, maxime debet esse intentio in conforatione digestionis primae. Secundo, debilitas digestionis perducit ad rigorem & frigus extremitatum, & uelut commotionem principij paroxysmi febris, quia calor reuocatur ad intra ut fortius digeratur, & hoc licet sit bonum per uiam causae, quia reuocatio interius fortificat digestionem: est tamen malum per uiam signi, significat enim aut paucitatem caloris, & consequenter debilitatem uirtutis digestiuae, aut absolute, aut saltem in comparatione ad cibum digerendum. Septimum. Nocumentum digestionis sequens debilitatem uirtutis aut malitiam complexionis confirmatam, difficillime recipit curationem.

Et apud Auic. in libro mortis uelocis dicitur, quod si super oculos eius, qui habet nauasariam satietatem & tarditatem digestionis appareat bothor nigra similis eiceri & rubet pars eius, & sit uiridis pars altera, tunc ipse incipit cum diminutione rationis, & mori in septima decima: significantur enim per diuersitates colorum diuersae materiae malignae, quarum partem parua natura symptomatice expellit, reliquam remanens interimit.

scoriae, aurei, 10. omnibus scrupulum uini
addatur & coquantur, donec ad medietate
rem redeant & coletur, deinde ager de hoc
syrupo postquam colabitur pondus drach.
30. quotidie sumat & nutritionem alleuiet.
Quod per tres hebdomadas faciens, caueat
sibi ab acetosis & a fructibus recentibus
& aqua frigida, uinum uero mensuratè
bibat. Emplastrum quod stomachum confortat
& calefacit. Recipe styracem, spicam,
schinanthum, calamum aromaticum
mastichen, ex his cum uino ueteri, & succo
cytoniorum conspersis emplastrum super
stomachum ponatur. Ad hoc praeterea
conferret, ut stomachus fricando inungatur
ex oleo quod fit ex spica nardi & cypero,
aut lana carminata in praedicto oleo calefacta
inmoluta super stomachum ponatur, &
cum panno ligetur. Ager quoque uinum
uetus bibat, aut miuam, aut hydromel.

Miuam autem hoc modo fit succus cytoniorum,
moxorū sumatur & per diem & noctem,
ut residere possit, dimittatur & coletur,
deinde eius quod clarum est partes
duae sumantur, sacch. pars una, uini ueteris
1. & incipiat coqui suauiter & dispumari,
donec in iulep similitudinem transcat. Postea
pro unaquaque lib. ex toto sumantur
zingib. spic. cinamomi, gariophyll. omni-
um ana, drachmam unam, masthicens dra-
chmas duas, omnia puluerizata in panno li-
gentur, & intus dum calefactum est mittan-
tur, & cum infrigidari coeperit pannus ex-
trahatur & exprimatur deinde syrupus re-
recondatur.

Nunc curat nocumentum digestiuae intensum &
in ueterum pendens à frigiditate. Et ordinat quin-
que remedia. Primum est hoc. Recipe diacimini, dia-
pluribus diebus cum 3. i. uini ueteris, siue distempe-
renur ad inuicem siue bibatur post ipsum uinum.
Subdit postea quod si uenter est stipticus uratur diaci-
mino. Est enim aliquando solutiuum non quidem à
propriate, sed merito quorundam pungentium &

stimulantium sicut piper & baurach. Quo etiam mo-
do uinum granatorū ponitur ab Auic. prima quar-
ti, cap. de curatione generali febrium inter solutiuum, li-
cet fortè etiam soluat comprimendo, si uenter sit so-
lutus uratur diaolibano, cuius descriptio est in cap.
de fluxu uentris, notabiliter enim stringit propter ba-
laustias: si autem uenter medio modo se habet, possunt
ad inuicem cōponi, sicut hic docet Rasius. Descriptio
autem ista diacimini est satis nota, est enim notabiliter
calid. & sic, stomachi confortatiuum & uentostatis
resolutiuum. Baurach arabicè aphronitron Græcè,
est spuma nitri Latine, hic tamen per baurach panis
credo Rasim intelligere salem panis, pro quo uide
Mesue cap. de speciebus salis ipsum salem panis inter
quatuor species famosas salis numerat. Secundum re-
medium est decoctio scoriae ferri, quæ multum con-
fortat stomachum & epar, & exicat inter omnia hu-
miditates superfluas, est enim sicca in tertio, & super
alias scorias, remouet mollificationem cocta cum ui-
no, & secum permiscet plurima calida & sicca pro-
pria in stomachi confortatione. Aniuudem, id est,
radix herbæ, de qua fit assa keyfin, id est, leuisticum,
melano piper, id est, nigrum piper, macropiper, id est,
longum piper, cætera nota sunt. Continuat usum
huius per tres hebdomadas, quia hæc malitia comple-
xionis cum est inueterata & fixa non facile remoue-
tur. Tertium est, ut caueat ab acetosis & acris, à fru-
ctibus recentibus ab aqua frigida, & similibus frig. &
humidis, & bibat uinum uetus mensuratè. Quartum
est emplastrum confortans stomachum & califaciens
cuius descriptio est satis nota. Sed ut hoc emplastrum
sit tenax, oportet multiplicare masthichen super alios
pulueres. Laudatur etiam approximatio olei facti ex
spica nardi & cypero, in quo dicitur calefacto lana aut
philtrū infusum et optimè expressū stomacho appli-
cetur et liget. Quintum est, ut in potu suamat uinum
uetus, aut miuam, aut hydromel, si non biberit uinum.
Describit autem miuam cyton. quæ est nunc in com-
muni usu, quam aromatizat ad hoc ut magis calefa-
ciat & confortet stomachum. Et omnia nota sunt.

Quod si digestiuae debilitas fuerit cum
multa siti, & paucorum ciborum appetitu,
& foetito ructu, syr. acetosus de citonijs bi-
batur. Recipe succ. citoniorum acetoso-
rum partem unam sacch. albi partem unam
aceti clari quartam partem unius, coquan-
tur omnia simul donec inspissentur. Est au-
tem syrupus iste stomachi confortatiuus,
& ad has suas peragendas operationes in-
uatiuus, & uehementiam incensionis &
inflammationem quæ est in stomacho sedat.
Aegri uero nutritionis sit res, in qua si-
mul congregantur acetositas & stiptici-
tas. Et ut caro cum succo uiuæ acerbæ co-
cta, & malis macianis similiter cocta, &

cum ribes, & facta ex aluem & almoſi, & illis ſimilia ex cibis. De iſto præterea detur puluere ut tranſglutiat, qui recipit roſ. rub. drachmas decem, ſpodij drachmas tres, ſemen. coriandri drachmas 5.

Dofis eius ſit drachmæ duæ cum luc. granati, muzzi, & cum ſyrupo de cytonijs acetofis.

In hac parte curat nocumentum digeſtiuæ ſiue fit diminuta per inenſionem, ſiue ſit corrupta à calid. ſuperflua, cuius ſigna ſunt multa ſitis, paucus ciborum appetitus, ruſtus fortidus, & reliqua ſigna ſuperius dicta. Pro qua corrigenda concedit ſyrupum acetofum de citonijs, cuius deſcriptio nota eſt.

Eriſum ſicut eſt ueritas ſummis laudibus extollit. Et præter laudes quas ipſi attribuit prohibet tranſitum cholerae ad ſtomachum, quæ multoties corrumpit digeſtionem. Diæta autem ſit frig. & uratur acetofis & ſtipiticis quæ nominat in textu, & ſatis nota ſunt. Aluem & almoſi ſunt condimenta rerum ſicut gelatina, limonea, myrtea, & ſimilia acetofa & ſtipitica. Ordinatur præterea puluerem frigidum, ſicum, & ſtipiticum, cuius deſcriptio & iuuamenta ſatis nota ſunt.

Si autē cum hoc quod diximus fuerit in corpore extenuatio & inflammatio, ægrolac & aqua hordei danda ſunt.

Ipſe quoque ex herbis humectantibus nutriendus eſt, ut ſunt lactuca, malua, cucurbita, citrulli, carnes hœdorum & agnorum lactantium, & piſces recentes. Balneum præterea antequam comedat & poſtquam comederit & tinam quotidie ingreditur. Et uinum clarum ualde temperatum bibat, & aſſidue utatur quiete. Et motum & exercitium uitet. Sitq; totum eius regimen, qui corporis craſſitiem adipiſci deſiderat. Et ſicum hac diſpoſitione inflammatio fuerit & incenſio uehementiſſima, ſtomachus ex rebus frigidis eſt linendus. Et aqua hordei danda. Sitq; eius regimen hecſicam habentis.

Curat debilitatem digeſtiuæ à calid. cum corporis extenuatione per frigid. & humid. exterius & interius applicita. Et intendit inſrigidare et humectare tam qualitatiuè, q̃ ſubſtantificè. Et quæ dicit nota ſunt. Lac eſt optimum ſi non adſit febris putrida, ſed ægro putridè febriente uitandum eſt lac. Balneum aquæ dulcis conceditur, ſicut conceditur in hecſica, & ad e-

aſdem intentiones. Et licet Raſis concedat ipſum ante cibum & poſt cibum, credo tamen ipſum magis conuenire cibo prædigeſto quo ad primam & ſecundam digeſtionem, ſcilicet quando nutrimentum debet ad membra delegari. Imò credo balneum non digeſto ſaltem quo ad primam digeſtionem magis obelle, q̃ prodeſſe. Cætera nota ſunt. Differentia autem inter balneum & tinam eſt, quia tina eſt uas in quo balneatur. Balneum autem eſt locus conſtructus ex tribus calis in quo balneantur. Tina ergo poſſet eſſe in balneo, & extra balneum. Cura nocimenti digeſtionis primæ, ſi pendeat à cauſa primitiua, ſex exigit intentiones. Prima, remouet cauſam primitiua & nocumentum ab ea impreſſum. Secunda, educit cibum corruptum ſi aſſuerit, & cætera quæ ſunt in ſtomacho adiuuantiæ ad corruptionem. Tertia, corrigit malam diſpoſitionem ſtomachi, ipſum confortando & etiā epar quod eſt ſedes & principium uirtutis naturalis. Quarta, prohibet fluxum humorum ad ſtomachum. Quinta, corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen ſex rerum non naturalium. Si ergo pendeat à uulnere uel contuſione in ſtomacho aut in membro ipſi communicante, curentur ſecundum quod oportet, iuxta primam intentionem. Et ſi ſumpſerit uenenofa, uomitu educantur, aut ſecellu ſi ſumpſerit lenientib. & dentur bezahartica contra illa uenenofa, & ſtomachus, & membra nobilita confortentur, & ſimiliter ſi applicita fuerint, remoueantur, & nocumentum per ipſa impreſſum, & ſimiliter curetur morſus uenenolorum & nocumenta per ipſum impreſſa, ſicut ſape dictum fuit. Si uero pendeat ab aere, cibo, & potu, & reliquis rebus non naturalibus inconuenienter applicitis, remoueantur cauſæ illæ, & nocumentum per ipſas impreſſum, & inducatur regimen contrarium. Et quia regimen malum eſt frequentius in cauſa, ipſius correptioni attendatur. Et ſi cibis in ſtomacho fuerit corruptus, iuxta ſecundam intentionem educatur q̃ citius fieri poſteſt. Et ſi ſibi commixti cum uomitu aut ſecellu. Vomitus tamen eſt promptior ad educendum in ſtomacho contenta. Non eſt tamen uomitus frequentandus, ne ſtomachus fiat lacuna ſuperfluitatum. Et ſi non poteſt fieri aut non ſufficiant, ſtomachus ſoluitur lenia, ſicut caſſia pilulae alephangine, ſtomachicæ. Et diatrion piperis eſt proprium in corruptione ad acroſum. Et quædam propria inferius deſcribentur. Poſtea iuxta tertiam intentionem corrigitur ſtomachi diſcracia. Et digeſtiua eius confortatur cum contrarijs proprijs confortantibus ſtomachum tam proprietate, q̃ ſtipiticitate temperatis, & multa ualde propria & ſolennia deſcribuntur à Raſi in libro ſuperius expoſita tam interius, quam exterius applicanda. Et multa excellentia addam inferius, prohibetur autem fluxus humorum ad ſtomachum, iuxta quartam intentionem ipſum confortando, ut ſa-

sibi admixtos. Secunda, corrigit discrasiam stomachi, & ceteras causas digestiuam debilitantes, ipsum confortando. Tertia, prohibet humores nefluant ad stomachum. Quarta, corrigit accidentia. Quinta, ordinat debitum regimen.

Prima intentio perficitur, ut supra dictum fuit. Secunda uero perficitur secundum exigentiam causae corrigendae, si enim quantitas stomachi aucta, aut diminuta, aut malitia figurae fuerint in causa, permolari non possunt, sed cibus est moderandus ut sit facilis digestio, mediocri quantitate, in stomacho tamen paruo debet esse paucae quantitationem. Raritas autem & tenuitas substantiae aequaliter emendari potest cum proprijs moderatissimis & aliquantulum stomachum incoctis, de quibus sermo praecessit in cura uomitionis. Asperitas autem superflua corrigitur cum lenientibus sumptis in principio mensae, sicut sunt iura pingua & fercula aliquantulum brodiosa, pruna matura, uia, ficus, & similia sumpta in principio, & contra lenitas corrigitur utendo stipticis, tam interius, quam exterius applicitis. Discrasia uero corrigitur cum contrarijs proprijs modicis stipticis interius aut exterius applicitis, de quibus egit Rasis in litera, & multa praestantia inferius describentur. Sed tertia intentio perficienda est, ut statim dictum est.

Quarta autem & quinta intentio perficitur, ut dicitur inferius. Si uero nocumentum primae digestionis fuerit per communitatem a membro aliquo uel a toto sex exigat intentiones. Prima, refficit corpus aut membrum mittens euacuando, cundo discrasiam membri mittentis corrigendo, & cum hoc ipsum confortando, ut fiat mineralaua & superflua quae sunt in stomacho. Tertia, corrigit discrasiam ipsum confortando. Quarta, prohibet humores a fluxu. Quinta, corrigit accidentia. Sexta ordinat regimen conueniens, prima intentio completur euacuando a toto, aut a membro particulari mittente cum phlebotomia, aut solutiua secundum quod uidebitur experientia. Sicut tamen solutiua talia quod non debilitent multum stomachum, sicut est proprium solutiuum exoluentium, & similiter diuertantur materiae tam a membro mittente, quam a stomacho secundum quod uidebitur expedire. Et discrasiam membri mittentis corrigitur, & simul etiam confortatur cum contrarijs sibi proprijs moderate stipticis non oppilantibus. Secunda intentio, scilicet aliquo ex uomitijs calid. aut frigid. forti aut debili, quae descripta fuerunt superius in capit. de uomitu, & si sufficiat sola impositio digiti aut pennae in ore iterata multoties non procedatur ad fortiora. Et si haec intentio uomitus compleri non possit, dentur solutiua aut lenientia, sicut calsia aut manna, aut electiue soluentia, sicut pilulae alephan-

ginae aut stomachicae, reubarbarum, aloes lotus, cui myrobolanorum aut mastichis potest addi.

Sint enim talia ut euacuando confortent, ne uirtus sua transeat stomachum & meseraicas. Hipoc. dixit quod aloes epaticus cum aqua absinthij, uel artemisiae propinata stomacho ieiuno, sanat stomachum ab omni languore educendo ab eo materias fraudulentas. Confortat cerebrum, & uiscera mundificat, uermes occidit & educit, sanat apostem. stomachi & uiscerum & mundificat epas. Pilulae confortantes stomachum in omni eius languore & laesione intrinseca, nec permittunt humorem putrescere in eo, sed abstergunt. Et qui utitur eis, diebus singulis sanus permanebit a dolore stomachi & capitis. Et sunt salubres oculis, & eis qui tristantur. Et est medicina matricis uisiofae, & aliorum uiscerum. Recipe mastichis 3. 4. aloes electi 3. decem, agarici boni 3. tres. Et est melius ut praeparetur cum oxymelle, sed confice cum succo altimiliae. Dosis a 3. uno usque ad drachmam unam per horam ante coenam, uel cum uadit dormitum.

Corrigitur autem discrasia stomachi, & simul confortatur cum contrarijs proprijs moderate stipticis, quae dicta sunt in textu. Et ex simplicibus proprijs in hac intentione calidis sunt gariophili, menta, cinamomum, mastix, passulae, algariae, xylaloes, zingib. macis, galanga, pelliculae intrinsecae stomachorum gallinarum, & inter caetera uinum aromaticum, & piper maxime iuuat digestionem. Ex compositis calidis sunt aromaticum rosatum, diagalanga, diacinamomum, diatriopion pereon, & confectiones magnae, sicut theriaca & mithridatum.

Electuarium nobile apud Franciscum de Pedomontium confortans stomachum & digestionem a causa frigida. Recipe galangae, nucis muscatae, cardomomi ana 3. duas, anthos, id est floris roris marini drachmas quatuor, menta, halafae, ana 3. tres, syrupus de menta, uel de corticibus citri quantum sufficit, & in corruptione ad acetosum confert mastix, & cum est fortis conferunt magnifice, & ultimae summitates schinanthi cum carui.

Ex frigidis autem sunt rosae, coriandrum praeparatum, coralli, sandali, labrusca, citron. & est singulare. Ex compositis diarhodon abbatis, miua acetosa, & similia, & multae sunt species trochiscorum in hac dispositione proprie. Et exterius applicita, ad hoc conferunt, sicut emplastra & unctio nes, cerata, sacculi, fomenta quorum descriptio superius posita est in capite de uomitu. Verum in hoc est differentia, quia restringentia uomitus debent esse magis stiptica, imò notabiliter stiptica, haec uero moderate.

Duo autem sunt quae confortant omnia membra, unum a complexione, & est oleum rosaceum, quod penes Galenum calefacta in frigidat, & frigida calefacit, alterum a proprietate, & est terra sigillata. Et ex confortantibus corpus & omnia membra est exercitium moderatum. Sed quarta intentio, scilicet prohibitio fluxus humorum cum eisdem completur, sed aliquantulum magis stipticis

aliquid particulare obster, sed dormire non incipiat, nisi distanter à cibo per horam, & dormiat primò super latere dextro, ut melius cibum ad fundum descendendo super sinistro, ut epar comprimat ipsum, cum quinque pennulis suis, sic enim xtro somnum compleat, ut factus chilus melius transeat ad epar. Procuret omnes euacuationes à natura infinitas. Coitum non exerceat, nisi naturaliter multum stimulatus, sed nullo modo immediate post cibum & tempore digestionis. Caveat à sudore. Exercitium ante cibum conuenit, post cibum quiescat. Leuis tamen deambulatio concedi potest, nulli stomachus sit ualde debilis, in quo casu omnis motus nocet, imò uociferatio. Spes & gaudium moderatum sibi conuenit, cætera animi accidentia uitanda sunt, aliqui tamen dicunt digestionem quartæ mediæ compleri in uigilijs, quàm in somno propter conuersionem caloris ad exteriora tempore uigiliarum. Et penes Auicennam amplexari infan-tem propinquum ad hoc ut polluat secundum longitudinem noctis est de rebus magis iuuantibus ad digestionem. Et similiter catulum canis, aut cattum de somno, & à Galeno in de Accidenti. Nam & si minor calor sit in exterioribus tempore somni, quàm tempore uigiliarum, est tamen tantus, ut una cum eorum complexione sufficiat ad digestionem quartam, quæ est facilior quàm prima aut secunda. Præterea membra intrinseca indigêt, ut digestio quarta in eis celebretur quorû cura debet esse maior absolute. Itaque ad quatuor digestionem magis adiuuat somnus quàm uigilia, &c.

DE DOLORE STOMACHI.

Cap. LXXXI.

Dolor stomachi qui est sensus nociuus eiusdem multipliciter distinguitur. Aut ratione suæ essentiae, quia aliquis est grauatiuus, aliquis extensiuus, aliquis perforatiuus, aliquis mordicatiuus. Aut ratione loci, quia aliquis est in toto, aliquis est in parte ut in officio eius uel in fundo. Et quilibet est intensus & remissus, continuus & interpolatus, periodicus aut sine pe-riodo. Causa cuiuscunque doloris immediata est mala complexio diuersa, aut solutio continui recens, & aut composita sine materia aut cum materia calida, mordicatiua, adustiua, aut frigida phlegmatica, aut melancholica. Et hæc materia faciunt dolorem aut alterando aut soluendo continuum aut extensiuum, cum continetur in loco amplo, aut perforatiuum, cum continetur in loco angusto, sicut inter tuni-cas stomachi. Apostema autem est utroque modo doloris, cum aggreget in se malam complexionem & solutionem continui, & dolor sequens ipsum est pungitiuus & mordicatiuus, si pendat à materia acuta. Extensiuus & grauatiuus si pendat à materia

multa, & aliquando pulsatiuus dum maturatur & pungitiuus & perforatiuus dum est proximus eruptioni. Causæ autem mediæ doloris sunt duplices, primitiue, aut corporeæ, primitiue quidem sicut percussio, casus aut offensio stomachi, aut membri stomacho communicantis, sicut cerebrum, nerui aut intestina, & similia. Aer uero frigidus, uentus, inordinatio in cibo & potu secundum aliquem modum 12, in capitulo præcedenti positorum, & sic de alijs sex rebus non naturalibus inconuenienter applicitis, præcipue potus aquæ in hora non conuenienti, est aliquando causa uehementis doloris. Corporeæ autem sunt duplices, per communiter, aut per essentiam. Per communiter quidem à toto, sicut in febris, aut crisi, aut à membro particulari, sicut cerebro communicante ipsi aut absolute, aut mittendo materiam catarrhalem, similiter à neruis secundum plurimum communiter absolute. Item à splene aut superfluo in frigidando aut transmittendo materiam melancholicam, & ab epate & kysti mittentibus, materiam cholericam. Item ab intestinis eleuatis uermibus, uentositare, aut fecibus ad stomachum.

Et per communiter à renibus, sicut in dolore calculi, & est secundum plurimum communiter absolute. Item per communiter à matrice, à retentione mensesuorum. Item per retentionem sanguinis hæmorrhoidalis fluere consueti, & breuiter stomachus potest recipere superfluitates à quocunque membro mediante epate. Per essentiam uero causæ doloris stomachi, sunt causæ immediatæ doloris, de quibus supra, scilicet mala complexio, solutio continui, & apostema. Sed causa remotior frequenter accidens est, nocuum digestioni, per quod corrumpitur cibum ad fumosum, fetidum, aut acetosum, & multiplicatur uentositas & phlegm. per indigestionem, quæ omnia disfraciendo stomachum aut extendendo, sunt causa doloris. Mala quoque digestio cum debilitate expulsiõis est causa quod apostema in stomacho per uiam paulatim factæ congestiõis generetur. Hic autem ponam causas quorundam particularium dolorum frequenter contingentium. Sunt enim aliqui famelici qui incurrunt dolorem stomachi, & cum comedunt sedatur. Huius causa est effusio materierum mordicantium ad stomachum, quando uacuum est à cibo, quæ aliquando sunt melancholice, acetosæ, effusæ ad os stomachi à splene per uiam naturalem consuetam, sed nocent, aut quia plures, aut acetosiores quàm in dispositione naturali consueuerunt. Sed frequentius sunt cholerice effusæ à kysti ad fundum stomachi per porum felleum ad ipsum terminatû in maiori quantitate, quàm debeat in dispositione naturali. Inquit enim Auic. tolerare famem, stomachum putridis replet humoribus. Sedatur autem post comestitionem cibo comprimentes humores ad fundum stomachi, & fortè extra per pyloron, & hoc cõtingit si non ualde multæ sunt & in stomacho illo sit facilis effusio contentorum in ipso ad intestina aut merito compositionis aut alterius dispositionis. Secundo sunt aliqui quib. post tres aut quatuor horas postq̃ comederunt, & aliquando post 10. horam incipit dolor, & non sedatur nisi cum uomitu rei acetosæ, quæ est quoddam aggrega-

tum ex humore phleg. aut melancholico acris, & ex ipso cibo corrupto ad acetosum, aut cum descentione totali eius quod in stomacho continetur. Et aliquando hic dolor remanet per longum tempus, ut puta per diem naturalem & supra. Causa autem primi est melanch. acris, aut phleg. acetosum, quæ existentia in fundo stomachi manent quæta. Et secundi causa est cholera manens similiter quæta in fundo stomachi. Cuius autem cibis sumitur ascendunt & cum ipso permiscunt & corrumpunt ipsum. Sedatur ergo primus cum uomitu rei acetosæ. Secundus pendens à cholera cum descensu ipsius simul cum cibo, est enim prior sua stimulatione ad hoc ut effundatur extra stomachum quam melanch. remanent autem sic longo tempore, aut quia non uomitur, aut quia non completè uomitur, neq; completè descendit, nisi post longum tempus. Et aliquando humor imbibitur aut apostemat, & sic dolor diu permanet. Tertio sunt aliqui quibus accidit dolor stomachi cum comedunt & sedatur post digestionem, & apud Auic. plurimi eorum sunt melanch. & patientes melanch. mirachiam. Cuius doloris causa est uentositatis eleuata à materia melancholica. Sedatur autem post digestionem chilo simul cum humore melanch. descendente ad intestina. Quarto, sunt aliqui qui post cibationem incurrunt ardorem stomachi cum eructationibus arsis tendentibus in acetosum secundum plurimum, & sedatur post digestionem. Huius causa est corruptio cibi ad acetosum secundum plurimum, & aliquando ad putridum uel fumosum, & tunc eructatio redoler odorem fumi aut rei foetentis. Et primus ardor tendens ad acetosum pendet à mala complexionem frig. sine materia aut cum materia phleg. acetosa uel melanch. non multa. Secundus uero ardor à cal. sine materia aut cum materia cal. secundum plurimum cholera corrumpente cibum ad putridum aut fumosum, & hoc est rarius & aliquando hoc contingit propter multitudinem comestionis aut iterationem eius absque fame uera, & aliquando propter comestionem rerum acetosarum, aut acrium in stomacho frigido, aut calidarum acutarum in stomacho calido, sicut aliorum, & similia. Huius ardoris & dolorum, de quibus supra, causa immediata potest esse humor aut cibus corruptus, necnon uapores & uentositates ab ipso eleuati. Quinto, aliqui post somnum incurrunt dolorem stomachi, cuius causa est materia catarrhalis descendens ad stomachum in somno, & uomitu sedatur materia catarrhali ab eo expulsa, dolor stomachi aliquando permutatur ad cerebrum, aliquando ad nervos, aliquando ad cor, aliquando ad iuncturas & intestina. Signa. dolor stomachi cognoscitur ex relatu ægri. Similiter signa specierum distinguuntur penes doloris essentiam, quibus nomina sunt imposita, ex ipsa natura rei, habentur ex relatu eiusdem, si compos mentis sit. Si uero non, oportet ad notitiam earum peruenire ex notitia propriarum causarum cuiuscunque doloris. Cognoscitur autem in qua parte stomachi sit dolor, similiter ex relatu ægri. Si enim est in ore stomachi, dolor est in parte superiori infra malum granatum per duos digitos, magis læditur appetitus, & fortis adest singultus & aliquando communicatur dorso circa 13. spondilem eius, quæ est secun-

da incipiendo à prima. Si uero sit in fundo, dolor est supra umbilicum per duos digitos, & magis læditur digestio, & si dolor est in ore & fundo, dolor in ambobus locis sentitur & simul læditur appetitus & digestio. Sed nota quod si dolor esset in parte posteriori stomachi, tunc inuenit dolorem. Si uero in posteriori minimè, nisi cum fortissima compressione. Distinguitur autem dolor fundi stomachi à dolore colon superæquitante ipsum, quia in colica est fortis retentio fecum & uentositatum, & cum edocuntur subito dolorem. Hæc autem non sunt in dolore stomachi, sed e contrario uomitus sedatur dolorem stomachi parum conferens in colica. Aliæ species doloris similiter cognoscuntur ex relatu ægri & manentium. Solutio continui si recens sit uera, & manifesta cognoscitur ex sanguine fluente. Si uero antiqua ex sanie, uomitu, aut per secessum expulsa, aut reliquis signis læsionis stomachi. Sed mala complexio cum materia & sine materia cuiuscunque generis, cognoscitur per signa superioris dicta in cap. de uomitu, & in cap. de debilitate digestionis, superiorum enim esset eadem toties reiterare. Ventositatis autem cognoscitur ex rugitu et eructatione, & quia ad eius expulsionem per superius aut inferius permutatur doloris alleuiatio, & frequenter dolor permutatur. De apostemat, uero specialiter agitur in hoc cap. Causæ primitiue sunt cibi signa, & quia quandoque similes causæ præcesserunt, similis sequitur effectus, scilicet dolor stomachi. Dolor autem aut per communitatem à toto aut à membro particulari cognoscitur ex præcessionem uocumorum totius aut membri communicantis, cum quorum augmento augetur, & decremento decreuit, & ablatione auferitur. Item ex affectibus sequentibus uocumenta membri communicantis, qui sunt causa doloris stomachi, sicut exempli gratia in communitate cerebri ad sunt signa descensus catarrhi ad stomachum, & in communitate splenis fluxus melancholicus, & sic de cæteris. Nocumena autem digestionis quod frequenter est causa doloris stomachi, cognoscitur ex dictis in præcedenti cap. Cognoscitur autem dolorem, aut materiam eius permutari ad cerebrum, nervos, cor, iuncturas, aut intestina, ex sedatione doloris stomachi & aduentum læsionis in membro, ad quod sit permutatio, scilicet scotomiæ, paralytis, syncopis, doloris in uterum colicæ. Prognostica. Primum, dolor stomachi nisi sit pendens ab ulcere aut apostem. secundum plurimum curatur, exigit tamen medicum diligentem & expetitur. Secundum, multa sensibilitas stomachi cum deluxione materierum acutarum ad ipsum, est quodammodo periculosa, si materies intolerabilis perducens ad syncopim. Tertium, cum prolongatur dolor stomachi, si mendum est ne ducat ad apostema eius. Quintum, si cet dolor stomachi multiplicetur in prægnantibus & in quibus mensrua retinentur portendit tamē aliquando præfocacionē matricis, materijs, uaporibus, aut uentositatibus eleuatis ad stomachum & ad diaphragma. Sextum, apud Auic. in libro moris scilicet superius quod quādo apparet cum dolore stomachi superius

pede dextrum quoddam simile uescæ moritur pa-
tiens in 27. & ex signo illius est quod appetit res dul-
ces. Vescæ enim illa, quam debemus credere esse phle-
gmaticam, similiter cum appetitu rerum dulcium, sci-
liet uehementis dulcedinis arguit dolorem stomachi
pendere à phlegmate acetoso, stomachus enim præ-
ternaturaliter dispositus appetit contraria. Sed cri-
sis illa per mutationis diminuta arguit uirtutem debi-
lem & materiam inobedientem, ex quibus cum alijs
malis signis, quæ hic debemus supponere, arguendum
est ipsum esse moriturum. Statuit autem ipsi 27. quæ
est una ex creticis morborum tropicorum, licet pos-
sit mori & ante & post secundum diuersas circumstan-
tias. Septimum signum est si habet dolorem uentris,
id est stomachi, & apparet super supercilium eius ue-
cusculæ & bothor nigrum simile fabæ, deinde fit ul-
cus & multitudine somni propter frigus suæ ægritudinis.
Significatur enim ex his materiam hanc faciem do-
lorem stomachi esse frigidam & permutari ad cere-
brum, quia sequitur subeth, fit autem bothor in cilio
loca insignibilia, sed cum non possit ipsam nisi diminu-
re expellere maior pars eius ad cerebrum permutata
interfuit, ulceratur uero quia licet radicaliter frigida
sit ad multitudine rami participat, & forte magis facit su-
bæ multitudine oppilando, quam propter frigus
sue complexionis.

Si cum dolore stomachi adsunt tribula-
tio & angustia & nausea, ægro aqua
repida in potu est tribuenda, & ut uomat
precipiendum. Et si hoc non suffecerit,
uenter ex hierapicra soluat, quæ Rec.
pulueris ros. rub. spicæ, mastichis, xilobal-
sami, carpobalsami, cinam. xilocassie assa-
fœti omnium ana, drachmas quinq; aloes sco-
rensis duplum omnium quod bene tritum,
miscetas cum medicinis tritis, & cum pan-
tirituratio cum aloë secundo iteretur, cuius
dosi sit à pondere duorum aur. usq; ad dra-
mas duas. Aegro quoq; quotidie detur pa-
nis in uino & succo mali granati infusus.
Et in syrupo acetoso de citonijs.

Diuiditur hoc capitulum in quatuor partes. In pri-
ma de dolore stomachi ab humore calido. In
secunda quando est à uetustate, ibi. Quod si cum do-
lore. In tertia, quando est ab apostematibus, ibi.
Si autem cum dolore. In quarta parte dicit esse opus
medico erudito ad curandum dolorem stomachi &
epatis in fine capituli, ibi. Ad dolorem tamen sto-
machi. Prima, in quatuor. primo ponit signa, se-
cundo curam per uomitum, ibi. Aegro aqua repi-

da. Tertiò per solutionem uetris, ibi. Et si hoc non su-
fficiat. quartò per dietam, ibi. Aegro quotidie.

De duabus primis partibus dicit, si cum dolore sto-
machi fuerit tribulatio, id est, conturbatio & anxie-
tas stomaticha, & nausea, id est, inclinatio ad uomit-
us, pendentes, scilicet ab humoribus calidis, scilicet
cholera uitellina, citrina, præsina, & similibus, ægro
aqua repida est in potu tribuenda, scilicet sex 3. aut
circa, huic tamen posset addi aliquid aceti ad inciden-
dum, & magis stimulandum, expulsiuam, aut 3. 2.
oxymellis simplicis, si humor esset crassior, & uisco-
sior, & præcipiendum est ut uomat, digitum aut pen-
nam in oleo repido intinctam multoties imponen-
do in gutture, donec exquisitè materia euacuetur.

In tertia parte dicit, quod si hoc non suffecerit ad cu-
rā doloris, aut quia uomitus nō possit fieri, aut quia
factus non sufficit ad eradicationem materiæ, uenter
est soluendus cum hierapicra dando ex ea à 2. 3. usq;
ad 2. aur. una tamen. 3. aut unus aur. hominibus re-
gionis nostræ cōmuniter sufficit. Et melius est ut ex
hoc puluere conficiantur pilule ut facilius sumi pos-
sint, descriptio hæc nota est, & omnia ingredientia
sunt calida & sic, præter rosas & sunt stomachum con-
fortantia, & nihil hic ponitur solutiuum, nisi aloë.

Et habet hæc cholera hoc præcipuum apud Auicē. 14.
tertiæ ca. de cacexia, ut educat superfluitates stomachi
reueratis humiditatibus innatis. Et eius conse-
rentia non est solum in euacuatione humoris choleri-
ci, sed etiam phlegmatici: & aliquando hi pulueres
cum melle permiscetur in modum electuarij, & po-
test exhiberi ex eo. 3. 1. & humoribus existētibus, im-
bibitis aut inuisicatis erit maior eius conferētia quā
in forma pilularum. Credo tamen quod in dolo-
re pendente à cholera pura subtili magis obesset in-
flammando, quā iuuaret euacuando.

Detur itaq; in cholera crassa, aut in cholera mixta
cum phlegmate, imò etiam in phlegmate solo in sto-
macho natante inuisicato & imbibito optimè con-
fert. In dolore autem pungituo pendente à chole-
ra subtili magis conferret rheumbarbarum & myro-
bolani citrini, aut manna aut cassia cum decoctione
myrobal. citrinorum, xylobalsami, id est ligni bal-
sami, carpobalsami, id est, fructus balsami, xylocas-
siae, id est, cassiae lignæ, cætera nota sunt. Ulti-
mò ordinans dietam, dicit quod detur panis infu-
sus in uino, scilicet uuarum, & succo mali granati ad
contemperandum caliditatem uini, & detur etiam
panis infusus in uino & syrupo acetoso de citonijs,
id est, factio ex succo cytoniorum acetosorum, cum
debita quantitate sacchari & possunt hæc omnia ad
libitum inuicem permisceri.

Quod si cū dolore ructuū multitudo &
extensio atq; singultus, ægro electuarium
diacyminum & diacalamentum & aliæ
confectiones, quæ uentositatem dissoluere
consueuerunt, quæ in capitulo de colica nomi-
nabimus danda erunt. Cibaria quoque
eius sint calagiae & mutagenath cum se-
minibus. Vini ueteris puri parum bibat.

Et utatur motu. Et ingrediatur balneum. Stomachus quoque ex oleo de neridem, ut diximus, in panno inuoluto uaporetur:

In hac secunda parte curans dolorem stomachi à uentositate. Primò, ponit tria signa, scilicet ructum multitudinem, extensionem, id est, dolorem extensiuum, singultum .f. sequentem uentositatem. Secundò, dat medicinas dissoluentes uentositatem, scilicet diacyminum diacalamentum, & cætera huiusmodi, quæ dissolunt uentositatem, de quibus in cap. de colica dicitur, sicut est electuarium de baccis lauri, ante tamen horum carminantium exhibitionem conueniens est ut præcedat euacuatio humorum ex quibus uentositas generatur uomitu aut secessu, & cibi sui sint, sicut calagiæ, id est, cibus, qui fit ex pulmone, corde & epate incisis minutim, & cum oleo frixis, in quo post remotionem prædictorum ponitur parum aceti, ouæ, & parum croci, mutageanth, id est, cibus qui fit in caziola, aut sartagine conditus cum seminibus carminantibus uentositatem, sicut anisum, ammi, cyminum, & similia, parum uini ueteris potentis dandum est, & non in multa quantitate. Exerceatur stomacho ieiuno, post cibum quiescat, ingrediatur balneum, scilicet aerium, aut balneum naturale, aut artificiale carminatiuum uentositatum, non autem balneum aquæ simplicis. Stomachus quoque uaporetur cum panno aut philtro infuso, in oleo de neridem, id est de spica, qui expressus optimè & notabiliter calidus stomacho pluries applicetur, & hoc fiat stomacho ieiuno.

Placet mihi gratia clarioris doctrinæ, primò expeditur materiam de dolore stomachi ab omnibus causis contingentibus præterquam ab apostematibus stomachi, deinde de apostematibus eius specialem faciam sermonem. Sed antequam ordinem curam doloris stomachi, cum ipse multoties à uentositate contingat & sequatur stomachi inflationem, placet de inflatione & rugitu aliqua summam dicere.

Est autem inflatio extensio alicuius partis à uentositate in ipsa comprehensa manente quæta. Rugitus uero est sonitus uentositatis in aliqua parte commotæ absque ipsius expulsionem, quæ si à stomacho per os expelleretur, sequitur eructatio, si uero ab intestinis per anum sequitur trula. Inflatio autem distingui potest secundum magnitudinem & paucitatem extensionis. Sed rugitus distinguitur secundum quantitatem eius, & differentiam sonorum, multiplicatur tamen propter multitudinem uentositatis & loci angustiam. Et ex oppositis causis paucificatur. Propterea multiplicatur magis in intestinis subtilibus, quàm in crassis, aut stomacho. Sed ex parte soni, quia grauis est sonitus, cum est in loco amplo, sicut in stomacho, aut in intestinis crassis, & est acutus, cum est in intestinis gracilibus. Item aliquando est clarus cum uentositati non permiscetur humiditas. Et ex opposita causa redditur non clarus, quapropter claritas sonitus in intestinis significat mundificationem intestinorum aut exiccationem fecis. Quia causa immediata inflationis & rugitus est uentositas, opus est ut causas uentositatis absoluamus.

Causa autem uentositatis in stomacho & in inte-

stinis est duplex, efficiens & materialis. Formalem & finalem philosophis relinquo. Et uterque est duplex corporea & primitiua, Corporea duplex per extensionem, & per communitatem. Causa autem efficiens uentositatem est caliditas diminuta, nam sexto de accidenti & morbo, & 3. Colligit, cap. primo, & 13. tertij cap. de inflatione, uentositas non à forti calore multiplicatur, quia resoluatur insensibiliter, nec à forti frigore, quia frigus prohibet elevationem uaporum. Et similiter uentositates 20. tertij cap. de causis diminutionis coitus, caliditas & frigiditas sunt contrarie uentositati, & ideo in fortissimis caloribus & frigoribus in mundo non apparet uentus. Similiter contingit in corpore nostro, quod necin forti calore propter resolutionem insensibilem, nec in forti frigore prohibente subtiliationem, uapor aut uentositas generabitur, & si cibus uel materia uentositatis repereratur. Quapropter fit à caliditate media inter resolutionem & non agentem, ita ut agat, sed non resoluatur unde ex cibo uel humore de se non uentoso dicta caliditas generabit uentositatem. Et propter hoc in corporibus ægris uel sanis debilibus multiplicatur uentositas, & in fortibus sanis minime uel parum licet uentus. Contra. Primò, in fortissimis tantum rebus uentosis. Contra. Primò, in fortissimis, mo calore, sicut febricitium multiplicatur uentositatem, ergo positio falsa. Secundò. Si calor fortis conuenit materiam in uaporem, resolutioni insensibili apertum, cum non sit transitus de extremo ad extremum sine medio, erit deuenire ad mediocritatem substantiæ uentositati proportionatam.

Tertiò. Calori debili difficilius est ex humore uentositatem generare, quàm uentositatem generare resoluere, sed facit primum, ergo facit secundum, quæ soluitur, sed facit primum, ergo facit secundum, quæ propter non erit causa inflationis aut rugitus, sicut nec calor fortis. Quartò. Calor quantumcunque diminutus in corpore humano conuertitur humidum in uaporem, ergo, & cæter. Assumptum probatur, quia cum nullo calore corporis uiuentis est admixta tanta frigiditas quanta reperitur in ære hyemali congelante, sed tamen ille conuertit humidum in uaporem, ergo, & c. Et confirmatur, quia in morientibus tam in ægritudine acutis, quàm in chronicis uitis, multiplicatur aliquando uentositas usque ad finem uitæ, in quibus calor diminuitur usque ad gradum cum quo non stat uita. Assumptum manifestum est ex sententia Auicennæ in capite de synocha, & experientia comprobatur in tympanite. Ad primum dicitur, quod per calorem fortem non intelligitur calor intensus, sed fortis iusticialiter, qui exigit tres conditiones, prima, quod sit satis intensus, secunda, quod sit cum notabili multitudine caliditatis, cuius est in forma humanæ bene proportionatus cuius est instrumentum, talis autem non est calor febricitium.

Ad secundum dicitur, quod fiet transitus à substantia humoris ad substantiam uaporis per medium proportionatum generationi uentositatis. Et consequenter quod uentositas generabitur si materia illa erit proportionata generationi uentositatis, sicut phlegma aut melancholia, aut multi cibi, de quibus infra, sed tamen illa uentositas quæ erit medium, transitus, ut non possit in uaporem conuertetur & resoluatur, ut non possit in cere inflationem aut rugitum, cuius consideratio pertinet ad medicum. Ad tertium negat maior & dicitur quod licet

fit maior distantia inter substantiam humoris siue cibi & substantiam uentositatis, q̄ inter substantiam uentositatis & uaporis, tamen membrum calidum propter meliorem applicationē ad cibum uel humorē, q̄ ad uentositatem in ambitu alicuius receptaculi consistat, potest facere primum & non secundum, sunt etiam alie responsiones, quas gratia breuitatis omitto. Ad quartum dicitur, quod calor quantum uaporem emittit in iuuentur conuertit humidum in uaporem generando ipsum ex parte aquea. Ex quo tamen non sequitur quod debeat generare uentositatem, quæ generatur ex parte crassa terre alicuius cibi uel humoris, sicut nec in mundo tempore magni frigoris generatur uentus, licet generetur multitudo uaporis, aut si in corpore nostro generetur uentositatis, illa esset modica non apta facere inflationem, aut rugitum à medico considerandum. Ventositas namque generatur ex parte crassa terre, uapor autem ex parte aquea, sed exhalatio ex parte ignea & aerea, quæ propter exteris paribus difficilius est uentum, q̄ uaporem aut exhalationem generare. Et ad confirmationem dicitur quod in multis ægritudinibus generationem uentositatis usque ad finem uitæ, imò etiam post finem uitæ, nam corpora putrescentia multo tempore inuolunt, & per calorem putredinalē uariis uentositatibus eleuatis, & sub cute ab eis horrendis retentis, & consequenter sequitur quod calor & consequenter negatur quod in hoc casu diminuat, imò intenditur, sicut quando homo etiam comestum moriente autem ad gradū cum quo non stat uis calor. Secunda causa uentositatis sunt cibi & potus naturaliter uentosi, quia in ipsis est humid. extraneæ sunt uinum dulce, turbidum. Item omnes hæc humides sunt auellanae, & castanæ, & ex piscib. canicæ, lentes, item mel. Contingit autem quod aliquid cibis sit uentosus, sed uelox motus eius de stomacho ad intestina uel de intestinis ad epar, aut uel ex eo uentositatis, nisi forte modica. Tertia causa est res superueniens debilitas digestionem dato quod aqua frigida, motus inordinatus, coitus, accidentia corpori exteriori sunt frigus superueniens, & multo tunc sit frigus superueniens, & rugitus uentositatis ex qua repletur corpus, propterea quia debilitatem eius mediam, id est diminutam à completam, & medietas operationis est uaporatio. Quarta causa est aliquando cibis calidus, & propter caliditatem stomachi calido, qui patiens à caliditate improporcionata præter modum euaporat, aut forte impletur caliditate aliquas humiditates à quibus obuiat in uapores crassos, & uentositates conuertitur causa multiplicatæ uentositatis. Quinta causa est uacuitas stomachi à cibo unde calor non inueniens cibū circa quem se conuertat, conuertit su-

per humiditates quæ sunt in stomacho uel intestinis, ipsas conuertentes in fumum, uapores, & uentositates, propterea in fame multi incurrunt torsiones, rugitus, & eructationes, & quandoque inflationes, & quandoque propter caliditatem expeditam à cibo mouentur uirtutes naturales, & mouetur aer effusus in spacijs, & mouetur cum eo residuum uaporum humiditatum & est sicut uentositas.

Sexta causa sunt ægritudines splenis & multiplicatio melancholiæ, quæ uentofatur & facit rugitum & inflationem tam stomacho pleno, quàm uacuo, & est deterior uentositate phlegmatica, licet uentositas phlegmatica sit pluris euentus. Quod autē melancholia uentofetur habetur tertio porble. problemate primo, & quarto problemati, proplemate tertio, & ad hanc reducitur melancholia mirachia quæ est causa multiplicationis uentositatis, tum debilitando digestiuam unde cibus uentofatur, tum quia melancholia precipitatur ad stomachum & intestina ex qua uentositas generatur. Septima causa est multiplicatio phlegmatis in stomacho & intestinis, quod uentofatum est causa rugitus & inflationis & uehementis doloris stomachi & intestinorum. Cholera etiam crassa uentofari potest, sed minus quàm melanch. & melancholia rarius, quàm phlegma. licet uentositas melanch. cæteris sit deterior. Causæ autem corporæ remotiores, sunt debilitates digesti, malæ complexionēs, ulcera, apost. oppilationes, raritas texturæ, & similia. Et causæ primitiue sunt inordinatum regimen in sex rebus non naturalibus & annexis cuius rememoratio in curis iam dictis præcessit. Signa. Inflatio & rugitus cognoscuntur ex relatu ægri. Sed causæ suæ si sunt primitiue, sicut cibi inflatiui, potus aquei, & similia cognoscuntur, quia scitur quod cibi illi sunt inflatiui & quod quodcunque sumantur sequitur inflatio & rugitus, & sic de singulis causis primitiuis, & quod bono regimine obseruato non sequitur huiusmodi. Item quod hæc accidentia sunt leuia & facile sedantur utputa homine eructante bis aut ter, diminutio autem caloris cognoscitur per læsionem digestionis etiam bono obseruato regimine, humores autem peccantes, qui sunt materia uentositatum cognoscuntur per ipsorum expulsionem, uomitu aut secellu, per saporem eructationis, & alia signa sæpe superius dicta & apud Auicenn. differentia inter inflationem melanch. & illam quæ est ex humoribus, malis, crudis, est quod inflatio melancholiæ est cum siccitate: illa uero cum humiditate.

Pronostica apud Auicennam. Primum, quando multiplicatur inflatio in uentribus conualescentium indicat conuersionem & reciduiam, significat enim debilitatem digestionis, uel materias uentofabiles, quorum quodlibet sufficit ad reciduiam, modo non fuerit ex parte ciborum.

Secundum, plurimum ægritudines Almeriachia, id est, mirach & mesenterij sequitur uehementem caliditatem stomachi & oppilationes uiarum cibi ad corpus, quare reddit & retinetur in partibus stomachi & corruptus facit eructationem acetosam, & accidit uomitus stupetaciens dentes, cibo acetosato simul cum melancholia euomito, præcipue si communicat splen, & est egestio humida, id est, liquida chilo non potente transire ad epar, & incrassatur

Cura autem reliquorum dolorum particularium
per essentiam, aut per communitatē perficitur eiusdem

brum illud ad quod fit permittitur.
cipiat, ut æque intermedia claudantur.
Hic uero subiungā quādam medicinas proprias
in cura dolorum stomachi incipiendo ab eis quæ li-
muntur ab intra. Terebinthina sumpta cum uino
potenti calido, aut si opus sit sumptionem uinum
bibatur in doloribus propriè pendentes à causa fri-
gida, dosis eius est ab ʒ. i. usque ad ʒ. i. s. Similiter
qua uitis. ʒ. i. uel 2. confert in causa frigida potens-
sime. Auic. Quod qui accidit post cibum & non fecit
tur nisi uomitu est dolor malus, & rectius quidem
ut sumat causā diæli quid mellis ante cibum, et ut eo
syderes causā illius ex causis uomitus, id est, ex
quod uomitur & euacua illud quod oportet euacua-
ri ex infusione aloës, et similibus secundum exigentia
humoris peccantis. Deinde administra trochiscos
stellæ qui ualent ad dolorem stomachi, quando re-
pit superfluitates expulsas ex reliquis membris ad ip-
sum. Et ex eis quæ conferunt ad hoc est ut sumatur co-
libani, mastichis, nigellæ, ameos, corticum sicificos,
uiri didium, xilaloës crudi, ana. partes æquales, con-
ciātur cum melle emblicorum, & sumatur ex eis om-
ni die ante cibum quantitas 2. ʒ. usque ad duos ʒ. s.
confert ei administratio coriandri, & syrupus gran-
torum cum menta, & ex eis quæ conferunt dolori
stomachi cum proprietate secundum quod testatur
Galen. sunt crues intrinsecæ stomachorum gallie-
rum, & melius est ut sint prius lotæ cum uino odor-
fero, & postea exiccatae & puluerizatae, & semen esse
cum uino, & radix pæoniæ sumpta, & corallus sulphu-
miller conferunt cum proprietate, ut corallus sulphu-
sus ad stomachum, ita ut tangat os stomachi. Confe-
dantur ad dolores stomachi profundos & difficles
R. spicæ, mastichis, cinamomi, thuris, schinabli, ca-
storei, myrrhæ, piperis, mandragoræ ʒ. i. s. foemen-
mi, abanthii, aloës, opij omnium, an. ʒ. i. s. fomen-
trochisci & dens in potu ʒ. 2. cum uino & sime de uili-
mis. Rasis tamen in Almanfore ponit aliquid de uili-
pionem trochiscorum stellæ ad quā ingreditur de
ra sigil. quam existimant esse stellam, & trochisci de
rosi

moris & ex nocuentis perceptis in membris mittē-
tibz. Cognoscitur autem humores esse in stomacho
cogestos ex gravitate & ceteris nocuentis stomachi
fere continuis. Quod aut ulcera pendeat a medicinis et
cibis acutis, et reliquis causis primitiuis ex eorū prae-
cautione cognoscitur. Sed distinguitur inter ulcus sto-
machi & intestinorū gracilium, licet plerumq; conue-
niant in egestione saniei & corticum subtilium. Pri-
mo, quia dolor stomachi sentitur distanter ab umbi-
liconum superius saltē per duos digitos, dolor inte-
stinorum circa umbilicū uel infra. Secundo, quia fre-
quenter in ulceribus stomachi & meri adest uomitus
norm. Tercio, qui non adest in ulceribus intesti-
norum. Tercio ex nocumento percepto in descensu
cibi & propriē acuti sicut sinapis aut aceti, et etiam cū
descendit ad fundū qui non sentitur in intestinis nisi
post longum spacium, scilicet, cum exiuit pyloron.
Quarto, ex fœtore eructationis redolētis saniem, sen-
tatur in ulcere stomachi et nō in intestinorū. Quinto, ex
elemento uaporis facētis incurrere siccitatē lingue ma-
nifestius q̄ in ulcere intestinorū licet etiam in ulceribz
intestinorū q̄q; exerceat. Sexto, quia rarius egerunt
corries in ulcere stomachi q̄ in intestinorū et graciliū, li-
cet meri sentitur dolor, posterius in collo et inter spa-
tia, quoniam dispositio eius transitus deglu-
titiā eius, & quandoq; pertransit hunc locum parū
per. Sed ulcus factum in ore stomachi significat quod
dolor et in inferioribus pectoris et supremis uentris,
et est uehementior propter oris stomachi sensibilita-
tem & deglutitiū significat ipsum cum pertransitione
peccoris, & plurimum eius declinat ad mirach, & mi-
prie extrema, & perducit ad syncopim plurimū, ue-
niet ulcers eius in egestione absque excoaratione in-
testinorum, & inuictio doloris post quietē eius, quod
tamen est in inferioribus stomachi. Dolor tamen
parius in comparatione ad dolorem oris stoma-
chi, nec sequuntur accidentia ita seua, ex his facile di-
stingui potest inter apostemata stomachi & ulcera eius.
Prognostica. Vlcera stomachi et meri superficialia
facile curantur, sed profunda et antiqua diffici-
lior, et frequenter cura est impossibilis secundum A-
uicē, & quando stomachus dirumpitur non euadunt
nisi pauci a ruptura parua.

Si autē cum dolore stomachi fuerit feb.
apostema manifestū, et cū tangitur
sentitur caliditas, ager prius ex basilica
phlebotometur, & loco dolenti duo super-
ponantur sandali et ros. & camphoræ cum
aqua ros. & succo citoniorum. Nutrimen-
tū uerō eius non sit nisi sola hordei aqua, et
custodiatur a carne et uino & cōfectionibz.
quæ de melle sunt, & bibat succum grana-

torū mizorū, & rob. de fructibus frigidis.

*Cūq; caloris uehementia sedata fuerit agro
cassia fist. cū succo endiuie dissoluta ac bul-
lita & despumata ad bibendum detur.*

In hacertia parte principali superius diuisa ponit
curam doloris stomachi ab apostemate & habet duas
partes. In prima ponit curam doloris ab apostemate
calido. Secundo ab apostemate frig. secunda ibi. Cū
autē apostema. Prima iterū in duas. Nam primò cu-
rat apostema cal. nondum conuersum in duritiē. Se-
cundò curat ipsum, postquam induratum est, ibi. Cū
autē agritudinis. In prima parte, positis quibuldā si-
gnis apostematis calidi, quæ sunt febris notabilis, a-
postema manifestē cognitū per duritiē, gravitatē, do-
lorem notabilem, continuum, et similia, de quibus su-
pra, & per sensationē caliditatis in regione stomachi
tam a medico tangente q̄ ab agro curat quatuor in-
strumētis. Primò per phlebot. basilicę, de qua agerur
cum ordinabo curā. Secundo per epithima stomachi
superponēdum frigidum, stipticum, repercussiuum,
cuius descriptio sic ordinetur. ꝛ. aquæ ros. lb. s. succi
citoniorum, ꝛ. 2. sandali al. & rub. rosarum rub an. ꝛ.
2. camphorę, ꝛ. s. aut. 1. si maior fuerit caliditas misce,
& petia siue philtrum aut lana in eo infusa non multū
frigida applicetur, & saltem quater in die naturali re-
plicetur. Tercio, per dixeram quæ sit sola aqua hordei
exhibita ter in die naturali aut per aquam hordei in-
telligamus ptisanam colatam bis in die exhibitā, quę
fortē temporibus nostris esset conuenientior in qui-
bus homines copiosius comedunt. Et abstineat a car-
ne & uino & cōfectionibus quę sunt de melle & om-
nibus calidis, bibat uinum granatorum mizorum,
et rob de fructibus frigidis sicut de agresta, citoniorū,
de ribes, & similia, & temperentur cum aqua cocta.
Quarto, cum uehementia caliditatis sedata fuerit per
medicinas suprascriptas deflos cassiæ cū succo endi-
uie dissoluta, bullita, & despumata, cuius hæc est descri-
ptio. ꝛ. florum cassiæ, lb. 1. succi endiuie per residen-
tiam depurati lb. s. cum quo trahatur cassia suprascri-
pta bulliat ad lentum ignem despumando donec ac-
quirant mediocritatem substantiæ, & possunt ad li-
bitum cum saccharo tabarzet dulcorari, huius dosis
sit ꝛ. 1. uel circa. Confert educendo materias commu-
nes, infrigidans, confortans & dolorem sedans & po-
test exhiberi bis in hebdomada aut quādo uidebitur
secundum oportunitatem, & exhibeatur calidum si-
cut est, aut cum aliqua aqua distemperatum quæ ma-
gis uideatur oportuna.

Cum autē agritudinis dies elongati fue-
rint, & calor omnino quieuerit, si remanse-
rit apostema cum duritie ex hoc emplastro
epithimetur locus. Quod Rec. uiolarū sic-
carum, drach. 10. rosarum rub. drach. 5. spi-
cæ odoriferæ, mast. amborū, an. drach. 3. ci-
peri, schinantibi, calami aromat. omniū, an.
drach. 2. farina fœnugr. drach. 20. florum

hoc est primò basilica lateris contrarij & hauriatur
 & 3. lang. Et per 12. horas post aut circa phlebotomē
 basilica eiusdem lateris, hauriēdo 4. 3. lang. Aut am-
 ca. Si camē rectio sang. menstrualis aut hæmorrhoi-
 dalis esset in causa, primò phlebotometur saphenæ,
 postea basilica eiusdē lateris. Euacuationes aut aliorū
 humorum fiant diebus sequētibz secundum humo-
 ris exigentiā. Cholera cū flore cassiæ mixto cū succo
 aquæ endiuivæ ut dixit Rasis, aut cassiæ uel manna
 distemperetur cum aqua fructuum, scilicet, prunorū,
 uinorū, uiol. & sem. endiuiv. Non autem mi-
 que cum nimis stipticant & exasperant. Ne-
 cessaria aut furiosa. Imò istæ lenientes sint leues & no-
 biliter infrigidantes. Et alij humores soluantur cum
 perniciosa secundum ipsorum exigentiā in quibus seme-
 te quam stipticitate moderata quæ omnia ex mulco-
 ris elicitur soluitur cum medicinis lenitibus sicut
 in apostemate, phlegmatico cum 3. i. floris cassiæ detra-
 & in melancholico trahatur cassiā suprascripta cum
 decoctione senæ, & epithymi cum pauco zingib. Si
 autem humores liquida abhorreret, sumat pilulas ale-
 phinginas, & similia lenia respicientia humorem eua-
 cuandum. Diuersio autem completur cum clysteribz
 utantur secundum exigentiā materiæ, cum uento-
 ricis, & similibus. Fluxus autē inceptio
 ten si fuerit subtilis, & in crassando materiam fluen-
 tem si fuerit subtilis. Item claudendo uias medias in-
 per uisum mittēs, & stomachum cum stipticis su-
 gula secundum applicitis, quæ sunt magis aut minus fri-
 gida secundum materiam & discretiæ exigentiā, quæ
 reperculsiua de quibus statim dicitur complent hanc
 intentionem.
 Secundum regimē statim à principio exequendū
 cūlione phlebotomia exigit tres intentiones reper-
 cussionem in principio. In augmento usq; ad medi-
 um status reperculsiuam cum resolutione & matura-
 tionem. Tertia est resolutio pura, aut pura matura-
 tionem. Contrario in materia frigida ma-
 gis de mollificatione quam de resolutione. E-
 contra in phlegmatica. Prima complet in causa calida
 resolutio de resolutione maxima debemus esse sollici-
 tati. Rasis ex sandalis, aqua ros. capho-
 rana, illi possent addi coralli, spodiū, labruscā, ba-
 tianum, & similia, & ex pluribus iam di-
 citur fieri, unguenta cum oleo ros. myrtino ci-
 tronum, & similibus cum cera & aceto. Quibus a-
 potius operantur propter maiorem multitudinē
 forme, cum suprascriptis pulueribus miscendo fari-
 nam, & similia, & ex corticibus, car-
 borum, & similia, & parū schinanthi aut absinthij, &

impinguando cum aliquo aut pluribz ex oleis supra-
 scriptis & addendo parū aceti. Et pro hac intentione
 cōplenda sunt etiā reperculsiua interius sumēda sicut
 miua citoniorū, syrūb. de ribes, de portulaca, uiol. ne-
 nupharinus, de pīris, de granatis, de agresta. Et apud
 maiore necessitatē infrigidandi & sedadi dolorē, sy-
 rup. de papauere. Multū tamen frigida uitanda sunt
 quantum est possibile. Cōpingunt enim & prohibēt
 materiæ resudationem. Sed hæc in principio in quo
 materia adhuc pauca fluit minus uerēda sunt, & pro-
 priē si fuerit subtilis. Aquæ aut sunt sicut endiuiv. so-
 latri lactuce, portulacæ, plāraginis. Sed in causa frig-
 reperculsiua sint stiptica aliquāter ad calid. declinā-
 tia, uel miscantur calida cum frigidis sicut oleū ros.
 aut citoniorū cum oleo mastichino, de absinthio, uel
 de menta. Cum quibus addito aceto pro sexta parte
 poterimus epithimare stomachum. Aut ex his cum
 pauco aceti & cera possumus conficere unguentum,
 addendo etiam ad libitum puluerem rosarum, myr-
 ti, mastichis, & absinthij, ciperi, calami aromatici, &
 similia. Sed interius conueniunt syr. de mēta cum
 iulep. ros. Item syr. aceto. cum absinthio longo tem-
 pore in eo infuso. Item syr. aceto. cum melleros. Aquæ
 aut sunt sicut cichoreæ, mentæ, lupulorum, & similia
 singulariter aut coniunctim secundum quod uidebi-
 tur expediens. Secunda intentio huius secundi regimi-
 nis perficitur miscēdo cum suprascriptis reperculsiuis
 in causa cal. aliqua leuia resolutiua subdominātia, ut
 flores chamæmilæ, meliloti, absinthium, schinanthū,
 passulas, ficus, capillos uen. farinam fœnugræci, sem-
 lini, parū croci, et similia. Sed in causa frig. reperculsi-
 uis conuenientibus in ea addemus resolutiua calida
 stipticitate tamen aliqua participātia, sicut oleum de
 spica, mastichino, spica, sem. apij, mast. bdellij, ammo-
 niaci, & similia. Et emplastrum Rasis, quod dicit con-
 uenire in apostemate cum induratur est cōueniens in
 hoc tempore, quod sit ex uiolis, rosas, spica, mastiche,
 & c. Et in hoc tempore conueniunt oleum ros. oleum
 mastichinum, & de spica simul mixta. Et si apostema
 tenderet in uia maturationis, his possunt addi aliqua
 iuuantia ad maturationem sicut mucilagines malua-
 uisci, fœnugræci, sem. lini, pinguedinis gallinæ in ma-
 teria calida. Sed anatis, anseris, & hisopum humidā,
 in materia frigida, & celsij ceterōrum descriptione Phi-
 lagrij apud Mesue. Et similiter emplastrū de meliloto
 resoluūt, mollificāt, et maturāt, ualētia magis in mate-
 ria frig. Et in materia phlegmatica Auic. laudat hoc
 emplastrum. 3. polij, meliloti, amomi, chamæmil. a-
 nethi, an. 3. 10. absinthij, picæ, an. 3. 7. aloës, 3. 8. mas-
 tichis, 3. 10. thuris, 3. 6. radices althææ, 3. 15. ammoni-
 ci, oppopanacis, styra. an. 3. 10. adipis anseris & gal-
 linæ, ana. 3. 1. ceræ rubæ 15. s. misce & fac unguentū
 gummis in uino dissolutis. Polium aut de quo supra
 est plāta, cuius longitudo est circa palmum quam Plī-
 nius & Isidorus mirabilem prædicant, folia enim eius
 mane cādida, meridie purpurea, sole occidente cæru-
 lea aspicuntur, calida in secundo, secca in tertio. Sed
 in materia melancholica apud Auic. ponatur in em-
 plastris medulla ossium cerui, medulla cruris uac-
 ni, & pinguedo gibbi camelorum, & ex conferentibz
 ad hoc & in dubelati est istud. 3. meliloti, fœnugr. cha-
 mæmilæ, baccarum lauri, althææ, absinthij, an. pariem.
 ammoniaci, thuris, an. duas, retias partis dissoluan

radare descensum medicinarum per meri, & sint mi-
nuta cum inuisantibus facientibus ipsa adherere su-
perficie meri, ut per moram & meliorem applicatio-
nem melius imprimant, præterea exhibeantur in for-
ma electuarii, & confectionis solidæ, sicut diadraga-
gantii, & similia, & paulatim deglutiant, & in descen-
sum longam moram contrahant. Quod si ulcus corro-
sum fuerit, nihil est præstantius quàm succus plan-
taginis cum bolo arm. Et si adlit fluxus sanguinis cū
hemorrhæa lapidis hæmatis lotus, trochisci de chara-
be de terra sigil, & similia. Et si fuerit necessarium sol-
uta, ut ventrem, solutur cum leuibis, sicut manna, ca-
lenta secundum ipsorum exigentiam. Solutio qui-
dam ventris cum trochiscis despodio, cum sem. ace-
ledæ. Vomitus autem curetur sicut dictum fuit in
alibi regiminis particularis, ut dentur mundifican-
tia, incarnantia, aut carnem generantia, & sigillantia
secundum exigentiam intentionis perficiendæ.

DE SINGVLTV. Cap. LXXXIII.

Singultus, Græcè, Iygmos, Arabice Isoach. Et
apud Aui. describitur est motus diuersus com-
positus, sicut spasmus contractiuius cum tensio-
ne, aut meri, ex quo aggregatur ad seipsum cum
tenu ad motum fortis expulsiōis sequētis ipsum si-
mus tussis, quæ est in pulmone & uelamine ad ex-
pellendum humorem, aut si non sit nocēs, imò sit se-
mita semitam superfluitatis siccitatis mouētis ad
uicem ad dilatationem & non obediāt illud, & succur-
rat ei, uirtus namq; dilatat, sed siccitas contrahit et cō-
stringit. Et sic in singultu de inanitione sunt duo mo-
tus oppositi, scilicet dilatio facta à uirtute, & con-
strictio à siccitate facta, et etiam à uirtute sentiente no-
cium quæ primo se dilatat, ut deinde impetuosius
constringendo melius nociuum excutiat. Pro cuius
definitionis declaratione, notandum primò quod
in expulsiōe duo reperiuntur motus. Vnus est pu-
ra contractio, sicut in expulsiōe cibi digesti à stoma-
cho per pyloron, cōtrahendo enim se expellit ipsum
ad intestina. Alius est impulsio quædam quādo post
contractionem, uel simul cum ea est etiam impulsio
membri, ut manu expellente lapidem manus moue-
tur ad sequendum motum lapidis per certum spaciū.
In singultu ergo est uterq; istorum motuum oris sto-
machi meri, uel totius corporis stomachi contracti-
uus & impulsuus, ideo dixit compositus. Secundo
notandum quod assimilatur singultui tussis, & cum ster-
nutatio assimiletur tussis, ut superius ostensum fuit, se-
quitur quod singultus etiam assimilatur sternutatio-
ni. Assimilatio autem est in hoc quia in tussis primus
motus est dilatio pulmonis, diaphragmatis, et pe-
ctoris ut pulmo impleatur aëre, ut adiuuet pulmonē
ad expellendum, postea est contractio pulmonis, pe-
ctoris, et diaphragmatis cum impulsione ad superio-
ra, ut simul cum adiutorio aëris subleuantis humor
expellatur. Et hi duo motus sunt in cerebro sternutatio-
ne. Primò dilatio cerebri ut aëre impleatur. Secun-
dò contractio cum impulsione aëris & humiditatis
expellenda sicut in singultu uomitu, & subuersione
sunt isti duo motus. Primò dilatio oris stomachi,
meri, uel totius stomachi, non quidem ad recipien-
dum aliquid in adiutorium, sicut in tussis & sternuta-
tione, sed ad impetuosius attrahendum cum impul-
sione, sicut uolentes proijcere lapidem, retrahunt ma-
num posterius ut impetuosius moueatur ad proij-
ciendum. Secundo est motus contractionis stoma-
chi cum impulsione ad expellendum. Sed contra, se-
quitur diffinitionem istam uomitui & subuersioni
competere. Dicitur quod licet in motibus iam dictis
multū similes singultui. Est tamē differentia in hoc,
quia motus iam dicti præcipue posterior, scilicet con-
tractio cum impulsione sunt in singultu cum uibra-
tione, sed in uomitu & subuersione, siue uibratione
Norandum tertio, quod motus contractionis mem-
bri est propter duas causas. Vna ut fugiat, licet post
fugam aut fugiendo expellat, sicut manus ab igne cō-
busta fugit se retrahens, licet postea se cōcutiat ad ex-
pellendū. Secunda ut non fugiat, sed ut fortius expel-
lat, sicut uolēs fortiter lapidem proijcere, manum re-
trahit simul cū lapide, ut impetuosius manū extēdat
ad proijciendū lapidē. Et hę duę causę contractionis
membri sunt imaginabiles in cerebro laborāte epilep-
sia, aut sternutatioe, & in pulmone tussitē, et stoma-
cho singultū, cum non à re nocēte, præter modū læ-
dunt, & stimulent, intentio cōtractionis est ad fugam
nociui, unde potest esse quod huiusmodi membra
primò se contrahant antequam dilarentur, & fortē
in illa contractione absque potenti dilatatione expel-
lent nociuū. Si uerò à re lædente parum stimulentur
possibile est ut contrahantur non ad fugam, sed ad ex-
pellendum rem lædentem, sed in hoc casu prius se di-
latant

latant antequam contrahant, ut deinde impetuosius se attrahendo nociuum expellant, maxime hoc fieri cum id nociuum cum difficultate expellet, licet enim huiusmodi membra in his operationibus non utantur discursu, dirigunt tamen ut placuit Auer. Ab intelligentia non errante.

Notandum quartò pro declaratione predictarum definitionis et dictorum Auic. in presenti capitulo differentiam esse inter rem lædentem & rem nocentem. Res enim lædens est parum lædens, & non multum deiciens uirtutem, ita ut uirtus stimulata remaneat tantæ potestatis ut possit facere singultum, & duos motus ad ipsius integrationem concurrentes. Sed res nocens est inter se lædens, & ita uirtutem deiciens, ut non possit facere hos duos motus singultus integrantes, & facit tremorem, id est motum tremulum oris stomachi. Sicut etiam res parum lædens cor facit pulsuum cordis in quo cor mouetur motu constrictiuo & dilatatiuo fortibus ad expulsionem nociui. Et res nocens facit tremorem cordis, in quo cor debilitatum non potest moueri motibus fortibus, sed tremis faciendo motus paruos & inordinatos. Quæ res nocens si ulterius augeatur, inducit syncopim & tandem mortem. Et licet causæ singultus possint esse multæ sortes, semper tamen sunt minores, & minus lædentes in eadem specie causæ, & cum maiori fortitudine uirtutis quàm causæ tremoris stomachi. Ideo uidemus singultum de inanitione mortalem, & similiter alios singultus cum quibus æger ducitur ad mortem deficere, & remanere motum tremulum. Itē etiā in corde prius deficere pulsuum quàm tremorem. Nota tamē tremorem oris stomachi frequenter fieri in ipso dum est siccum sensibilissimū & debile. Et simile de tremore cordis existimandum est. Auic. tamē in hoc cap. aliquando his terminis lædens & nocens, utitur ut synonymis. Aliquando uidetur appropriare nocens causis facientibus singultum replendo, aut stimulo, sed lædens magis siccitati & causis facientibus singultum inanendo, sed de his non est habenda cura. Notandum quintò quod singultus est leuior motus quàm uomitus propter duo. Primum quia leuis causa non potest facere uomitum facit singultum, quæ postea aucta faciet uomitum. Item quia in singultu secundum plurimum solum mouetur os stomachi, sed in uomitu os & fundus. Singultus est duplex proportionatus ad materiam, & non proportionatus. Et proportionatus ad materiam duplex, quidā de repletionē, quidā de inanitione sicut de spasmo dictum fuit, & est aphor. 39. sextæ particulæ. Quanquam non sit omnino similiter iudicandum de spasmo & singultu. Potest enim aliquis spasmus esse solum de repletionē, aliquis solū de inanitione, aliquis solum non proportionatus ad materiam. Quorum primi causa immediata effectiua est sola materia replens, secundi sola siccitas, tertij sola uirtus stimulata contrahens. Sed ad omnem singultum necessario concurrat uirtus, cum sit compositus ex duobus motibus dilatatione & constrictione, qui non possunt causari neque à siccitate sola, neque à materia replente sola, sed necessarium est unicuique istorum coagere uirtutem. Verum à uirtute sola possunt ambo motus perfici, non concurrente aliqua alia causa, tanquā causa immediata. Et sic potest esse aliquis singultus solum non proportionatus ad materiam, sed

nullus potest esse solum de inanitione, neque aliquis solum de repletionē.

Causæ singultus quædam sunt per essentiam, quædam per communitatem quædam primitiue. Per essentiam sicut mala complexio siens siue materia calida siue frigida, uel sicca, calida mordicando & corper contrarietatem. Item per constrictiōem & corrugationem quam facit in ore stomachi. Sicca autem si non fuerit confirmata quolibet humectante curat. Confirmata difficilē sed secūdum plurimum est cum materia aut calida pungēte, aut frigida grauante, aut mordicāte si fuerit phlegma acetosum, aut corrugate & constringente si fuerit phlegma ponticum, aut melancholia quæ etiam exiccando iuuat ad singultum. Bothor quoque & ulcera in ore stomachi quandoque sunt in causa. Et quandoque singultus causæ sunt reliquæ uomitus quæ remanserunt in ore stomachi inbibitæ uel adherentes, ideo sæpe singultus sequitur uomitum, & aliquando antecedit cum materia sit pauca, aut parum stimulans, & non sufficit ad uomitum, quæ postea aucta facit uomitum. Item uentrositas ex siens in ore stomachi est aliquando in causa, aut excedo, aut sua acuitate stimulo, siue sit in stomacho genita ex humoribus, aut cibis uentrosabilibus, siue aliter unde ad stomachum deriuata.

Per communitatem uero à toto sicut in febribus, ex lefaciendo, aut exiccando, aut uapores uel humores acutos ori stomachi communicando quod maxime accidit in principijs paroxysmorum materia peruenit interiora. Item in crisi, in quibus materia, uel uapores ori stomachi comunicant. Aut per communitatem à cerebro sicut in percussione capitis & in phrenesi in quibus per neruos reuersus comparitur, os stomachi, & est mortale secundum plurimum. Aut per communitatem ab epate sicut in apost. eius, & proprie concaui comunicando, aut qualitate sola sicut caliditatem, aut siccitatem & est deterius, aut cholera per uentrem, aut uocamentum solum per neruū colligantem stomachum cum epate. Et quomodocumque proprie communitas, oportet apostema esse magnum epatis. Et de hoc distantiā oris stomachi à concauo epatis. Et de hoc loquitur aphor. 16. septimæ particulæ. In phlegmone epatis singultus malum. Aut per communitatem ab intestinis dum laborant uermibus, aut apostematibus, aut materiis, cuiuscumque generis uelut in cholera, & ileos, ut aphor. 10. secundæ particulæ. In ileos uomitus & singultus malum. Item per communitatem à matrice in retentione menstrui, partu, abortu & similibus. Item à uescica, renibus, & alijs membris oris stomachi communicare potentibus. Causæ uero primitiue sunt, sicut aer frigidus. Item res comestæ lædentes acuitate, sicut res acetosæ, sinapis, diapipece, helioleborus, & cibus corruptus ad qualitatem acutam. Item cibi uentrosabiles, aut multitudine sua aggregantes, aut fames longa os stomachi exiccando, & quæcumque possunt os stomachi præter modum exicare, siue euacuationes superflue & similia. Signa. Differunt singultus à tremore oris stomachi, quia in singultu ad sunt duo motus integrantes, scilicet dilatatio & constrictio fortes & integri, sed in tremore diminuti, enim motus tremulus ori stomacho, & est cum maiori uirtutis debilitate. Quod autem sit de repletionē cognoscitur per grauitatem stomachi, exactionē, uomitus,

tillimè, significatur enim apostema magnum epatis communicans nocumentum, non solum ori stomachi, sed cordi. Quartum. Qui cum singultu habet punctionem, uomitum, & cupez, id est, spasmus & destructionem rationis mori, scilicet ualde cito. Significatur enim nocumentum esse tantum in stomacho, quod etiam maximè cerebro communicatur. Quintum. Singultus de inanitione qui humectantibus non facile sedatur mortalis præcipuè si spasmus ipsi coniunctus fuerit. Significat enim siccitatem fixam. Sexu. Reliqui singultus, qui neque inanitione neque apostema sequuntur secundum plurimum salubres &c.

Cum singultus post crassi cibi comestione, aut uini ualde temperatè adhibitionem superuenerit. Aqua calida in qua cuminum, & menta, & mentastrum, & parum thuris bullierint multoties in potu est sumenda, & agro ut dormiat est præcipiendum, & uenter uaporandus, & ieiunandum est ei. Cum autem per multos dies à comestione abstinerit, iubendum est balneum sæpe ingredi. Deinde paucis cibis desiccantibus tamen est alendus, sicut sunt calagiae et mutagenath cum seminibus, & uini parum puri in potu tribuendum. Et si hoc non suffecerit trochisci isti dandi sunt qui dicuntur de thure. Rec. thuris drach. 5. enule drach. 3. mentastri fol. rutæ siccae amborum an. drach. 2. sem. sisimbrij drach. 3. s. informetur trochisci ex eis pōdere aut. 1. ex quibus unus in die cum apozimate cymini tribuatur.

Diuiditur præfens cap. in tres partes. Primò curat singultum à uentositate. Secundò de inanitione. Tertio dicit in cura singultus conuenire sternutatione & anhelitus retentione. secunda ibi. Quòd si singultus, tertia in fine cap. ibi Singultui propterea. De prima parte dicit. Cū singultus superuenerit post comestionem, cibi crassi, id est, propter suam substantiam crassam difficilis digestionis, sicut sunt fabæ, castanæ, caro bufali, & similia & post potum uini ualde temperati cum aqua, quia debilitando digestiua est causa uentositatis, & uos supplete quæcunq; possunt multiplicare uentositatem, sicut cibi habentes humidū superfluum uentosabile sicut herbæ & similia. Et sicut humores phlegmatici, aut melancholici in stomacho congesti, aut ad ipsum deriuati qui sunt apti uentofari. In his enim casibus post educationem cibi, aut humoris uentosabilis cum abstinentia, cum euacuationibus oportunis detur aqua huiusmodi calida. g. cymini, mentæ, scilicet hortulanæ domesticæ, calidæ & sicce, mentastri,

mentastri, scilicet sylvestris, adhuc calidioris & siccioris, licet menta Romana habens folia longiora, & latiora sit adhuc magis calida, añ. 3. s. thuris 3. i. quæ omnia sicca bulliant in tribus lb. aquæ ad consumptionem medietatis et coletur, de qua accipiat stomacho ieiuno 3. 3. et bonum est ut secum misceant 3. 2. diacymini, aut diagalangæ, aut parum fac. & sumat debite calida tribus, aut quatuor dieb. & tardetur cibus per quatuor horas, aut quinque, & post eius sumptionem dormiat ad libitum, confert enim somnus & maxime stomacho ieiuno, hæc enim tria, scilicet fames, somnus, et exercitium optime conferunt ad resolutionem uentositatis. Et uenter uaporandus est cum carminantibus uentositatem, sicut sacculis, fomentis, & huiusmodi, & hic debet per multos dies à cibo abstinere, id est, parum comedere, postea balneum ingredi, scilicet stufam, aut balneum actu & potentia calidum, sicut thermæ quæ præter uirtutem sulphuream qua omnes participant, sunt etiam participant uirtute ferrea, aut simili stomachi confortatiua. Cibi autem sui sint calefacientes, desiccantes, pauci in quantitate, sicut calagiæ & mutagenath, id est, cibi facti ex carnibus frictis in sartagine conditi cum seminibus, scilicet anisi, fœniculi, & similibus, & aliquibus aromaticis inter quæ præstabilissimum est galanga, & bibat parum uini uinosi puri, aut mediocris potentie, nam multum fortificat digestionem. His autem non sufficientibus ad curam dentur huiusmodi trochisci, æ. thuris 3. s. enulæ 3. 3. mentastri, foliorum rutæ siccatæ añ. 3. foliorum nemen, id est, serpilli. 3. 3. s. formetur trochisci pondere aur. i. Ex quibus unus in die exhibeatur cum apozimare, id est, decoctione cymini, hæc omnia calida sunt, & sicca uentositatem carminantia. Et per ista inteligit electuaria calida famosa, sicut diacymini, diagalanga, diatriopipereon, diabolibanum, electuarium de bacis lauri, & similia, & gariophili apud Auic. appropriantur singultui.

Quod si singultus post feb. acciderit fueritque cum eo tribulatio, aut nausea, aut sitis, aut in ore siccitas, aqua calida ægro multotiens tribuenda erit, non tamen repente, sed paulatim. Et si sedatus non fuerit, aqua hordei cum oleo de amygdalis dulcibus detur. Spondiles quoque colli, & dorso ex oleo tepido inungantur, & fricentur. Et mucilago psylli cum iulep, & succo granati in potu tribuantur.

In parte ista curat singultum de inanitione. Et quæ dicit nota sunt, tribulatio, id est, conturbatio & anxietas stomachi.

Singultui præterea & sternutationi confert retinere anhelitum.

In hac parte dicit, quod sternutatio confert in singultu, quia confert conuulsando totum corpus, & stomachum, remouet materiam ab ore stomachi iuxta aporil. 13. sextæ particulæ. A singultu habito ster-

nutatio superueniens soluit ægri tudinem. Et ex eodem fundamento tussis, & omnes fortes morus conferunt. Sed retentio anhelitus confert, quia corde inflammato inflammatur partes circumstantes, unde fit uentositatis & humorum resolutio. Propterea hæc indiligunt de singultu pendere à materia, uel uentositate.

Cura singultus à mala complexionem sine materia patet ex sæpe dictis superius, sola enim alteratione contrariis interius et exterius applicitis indiget, quæ tamen stomachum confortent, tam proprietate quam stipticitate moderata. Si tamen siccitas sequens humidi consumptionem propter febres acutas, aut euacuationes, faceret singultum de inanitione duxerunt intentiones. Prima est remotio, aut elatio causæ exiccantis quod oportet. Secunda est humectatio totius corporis, sed maxime stomachi qualitatiua, aut substantifica cum interius & exterius applicitis. Quæ duæ intentiones iuxta excoriatum, plene sunt simul, sicut cum aqua hordei excoriatum cui syrupus uiol. posset addi, et parum uini granatorum dulcium, aut mazorum, aut uini cironiorum. Si fluxus uentris esset in causa, non existeret febreputrida, lac est sublime, & si tunc fluxu posset calibet. Et detur aqua carnis, et iura carniū resumptiua alterata, secundum quod oportet & bibat uinum non tantum aliquantulum dulce multæ permutationis cum aqua hordei, & balneetur in aqua dulci repida, & si machus epithimetur cum oleo rosato, & mul. & similibus, & ciberetur sæpe parum pro uice, & si opus est uentris lenitione, fiat clysterum dormiat. Et si opus est uentris lenitione, fiat clystere cum lacte, aut aqua hordei, & oleo uiolario. Et si maiori infrigidatione opus sit, addatur succus cucurbitæ. Et apud Rasim ungantur spodiles, colli, & dorso cum oleo, sed proprie uiolaceo, & detur mucilago psylli cum iulep, & succo granati, & oleum amygdalarum dulcium est optimum secundum omnem modum administrationis cauate non existente magna. Si uero singultus pendeat ab humoribus imbibitis tantibus, & inuiscatis, siue in stomacho congestis, siue aliunde transmissis octo exiguntur intentiones. Prima est digestio secundum humoris exigentiam, debent enim digestiua esse quantū ad qualitates primas contraria discretæ membri mittentis stomachi & humoris: quantum ad secundas incisua, si fuerint uiscosi, subtiliatiua, si crassi, inuiscatiua, si fuerint subtiles imbibiti, ut inuiscata cum eis euellant ipsos à membri superficie, & respiciant per uirtutes tertias et quartas, tam stomachum quam humores peccantes, imò membra mittentia quorum descriptio est eorum sunt patere ex superscriptis. Secunda intentio est euacuatio materiæ peccantis tam uomitu quam fecula etiam reterata secundum opportunitatem. Tertia intentio est diuersio cum clysteribus, ligaturis extremitatum & ipsorum lotionibus. Item balneis diuerentibus siue sint balnea aquea, siue aërea, item uentositatibus siue sint balnea aquea, siue aërea, ponantur uentibus. Et apud Auic. in singultu antiquato ponantur uentotæ super stomachum sine scarificatione, & super dorso circa 13. spondilem ubi incipit os stomachi ponantur uentotæ rubificantiæ ad attrahendum materiam ad cutim. In quo casu inueni uescicatoria conuenire super eisdem locis applicita, nec minus etiam conferunt si ponantur super membris mittentibus, hæc tamen

oris stomachi est duplex. Alter cibi, & dicitur fames, quæ descripiuē est appetitus calidi & sicci. Alter potus, & dicitur sitis, & est appetitus frigidi & humidus. Vterque læditur tripliciter. Ablatē quando omnino nihil appetitur, diminutē dupliciter, per intensionem & remissionem. Per remissionem quidem cum minus appetitur q̄ sit necessarium pro nutritione corporis, & humectatione. Aut quādo aliqua appetuntur, aliqua non, ex his quæ secundum naturam debent appeti siue cibalia, siue potabilia. Per intensionem uerō quando magis appetitur quā possit digeri, aut q̄ sit expedies pro nutritiōe & corporis humectatione. Et huiusmodi appetitus aliq̄s est ad cibum dicitur appetitus caninus. Sed quando ad potum dicitur sitis superflua. Et ex hoc genere est appetitus intolerabilis: sunt enim quidam qui dum famem notabiliter patiuntur incurrunt syncopim, cholera repente ad os stomachi, aut spiritibus præter modum resolutis, aut incurrunt dolorem stomachi, et capitis: et ista sunt corpora cholericā aut sicca tantum, acuti sensus, habentia poros latices et humidum facile resolubile. Et quedam horum sunt corpora exuberantis carnis, habentia multum de calido & humido, sed habent ipsum subtile cum latitudine pororum, & omnis eius calor innatus est fortis ualde, aut plurimus, & ualde debilis non potest famem tolerare. Bulimu autem fames membrorum cum satietate stomachi. Sed appetitus corruptus, est appetitus quorundam quæ non debet appeti ab aliquo indiuiduo de specie humana naturaliter disposito. Nunc uerō sequendo ordinem. A uic. Primō agetur de diminutione & ablatione famis. Secundō de corruptione eius. Tertiō de appetitu canino, & de intolerabili. Quartō de bulimo. Quintō de siti. Causa diminutionis & ablationis famis potest esse omne genus malæ complexionis in ore stomachi siue materia cum superfluit, caliditas quidē a quacūq; causa pendat, siue corporea, siue primitiua rarefaciendo raritate opposita corrugationi. Secundō attrahēdo humores ad os stomachi, qui replēdo famem deiciunt. Tertiō quia non finit os stomachi pati frigiditatem sequentem naturalem resolutionem, & aduentum melancholiæ, ad famem excitandam: frigiditas uerō licet non excedens multum, excitat appetitum, quapropter inueniuntur Septentrio- nales ex uentis, et Hyems ex temporibus uehementiores ad excitandum appetitum, & qui iter peragit in niue uehementioris est appetitus ualde. Attamen cum superfluit est magis inter cæteras qualitates destrues appetitum, mortificando duas uirtutes, scilicet sensibilem & attractiuam, sed hoc est raro: humiditas uerō & siccitas sunt in hac re paucae impressionis, magis ad sitim minuendam & excitandam facientes quā ad famem, humores quoq; cuiuscūq; generis cum superfluunt in ore stomachi famem auferunt, aut minuant, sed calidi magis, e contrario sitim excitantes, frigidi uerō licet sitim minuant, et interdum famem excitent dum sunt pauci & non multi præter naturales, & propriè phlegmaparum acre, & melancholia potica, attamen cum superfluunt in præternaturalitate aut multitudine auferunt, & minuant nauseam, subuersionem, aut uomitum excitantes. Similiter ulcera, bothior, & apostemata in stomacho famem impediunt, sitim si calida fuerint excitantia. Diminutio quo-

que & ablatio sensus oris stomachi, siue sequatur aliam quam ex causis superscriptis per essentiam in ore stomachi, siue per communitatem a cerebro, aut terio pari, aut sexto neruorum cerebri sitim & famem simul auferit, aut minuit, per communitatem uero aut à toto, sicut in febribus in quibus caliditas ori stomachi communicata, præter modum calefacit, & excitat, sitim augens, famem minuens, aut auferens præter causas superius dictas, & aliquando repleto humorum qualitate aut quantitate peccatum in uenis facit ipsas fugere ab attractione & potius laborare ad expulsionem, quo modo in syn copali humoribus non igitur appetitus, & in multis alijs laborantibus non solum febribus, sed alijs generibus ægritudinum. Vi di enim mulierem laborantem fluxu uentris nihil comedisse, neq; bibisse per octo dies nisi aquam frigidam, quæ tamen superuixit. Similiter Teutonicum quendam febriem nihil comedisse in 28 diebus uini quod nia penitus abhorreret, sed solum bibisse uini quod euenit, quia eorum uenæ humoribus superfluis præter modum erant repletæ. Et hoc modo quādoq; deficit appetitus prægnantium, & in quibus mensura retinentur, quomodo etiam uis per totam hyemem abstinent à cibo. Aliquādo deficit appetitus propter debilitatem attractiuæ membrorum, sicut in hæticis & alijs ægris multum debilibus, in quibus membrorum uirtus attractiua deficit, non quidem ob defectum resolutionis, sed propter attractiuæ impotentiam. Et aliquando deficit propter paucitatem resolutionis, sicut in frigidis ualde complexionaliter, aut ætatis, quo modo serpentes, ranæ, & cætera animalia debilis caloris in hyeme stant sine cibo, quia calor eorum sopitur & minuitur, ita ut quasi sola respiratione contenti, & nutritionem quasi nullam faciat, per communitatem uerō à membris particularibus, sicut ætatis, tarrhus à capite descendens, si figatur in ore stomachi, aut in uisceribus & adhæreat deorsum appetitum, & quādoq; facit appetere contraria, scilicet incidētia, et subitanea si fuerit crassus & uiscosus. Item per communitatem à neruis uenientibus ad dandum sensum & motū ori stomachi, scilicet sexto pari, tollitur deorsum cum non percipiat succionem, neq; melancholiæ impressionem. Item per communitatem à splene cum melancholia non transmittitur ad os stomachi, aut eū superflue transmittitur, aut nimis acris, licet per communitatem ab epate cum debilitatur eius attractiua post fluxum sanguinis, aut alias euacuationes, aut cum ipsum, aut melaice apostemantur, aut oppilantur, sicut in hydrope, aut etiam cum oppilantur uentris, quæ sunt post epat. Item per communitatem ad cititinis sicut in colica & ileo, in quibus appetitus ad cibum deletur & sitis intenditur causis inferius existentibus in cap. proprijs. Item propter uermes qui suis uaporibus in intestinis uiuentes, aut mortuos ad stomachum nocent ori stomachi, & sic ascendunt ad stomachum multo magis uomitum excitando, licet aliquando chilum sugendo faciant appetitum caninum, ut infra in cap. proprio. Item per communitatem à corde, sicut eū oppressum est ueneno, aut sicut in pestilentiali prius eum os stomachi propter propinquitate & maxima sensibilitatem facile cōpactetur. Propterea magna prostratio appetitus in principio uirulentæ febbris absque manifesta læsione ipsius oris stomachi est signum

signum satis efficax super febrem pestilentialem.

Item per comunitatem à matrice et quibuscumque membris absoluta & non absoluta. Causae autem primitivae sunt sicut caliditas aut frig. aeris superflua, aut ipsius caliditas malitia, fortior superflua & similia. Item cibi dulces & humidi, uigiliae superfluae resoluendo, & ratione in frigidando, licet forte in principio calefiat, tamen somnus uero hebetando & multiplicando superfluitatem, licet somnus & uigiliae aliquando faciant appetitum caninum, ut infra. Item quandoque in initio superfluitas debilitando, sicut contra repletio superflua stomachi replendo. Similiter motus & quies cum item res extraneae potentes occurrere. Et ex his dictis ponitur aliquando suscitatur appetitus. Facit enim illud remouendo nocuum stomachi quo appetitus obediatur, siue illud sit qualitas prima, ipsum cor mpendendo sua contrarietate actuali aut potenciali, siue sit humor inuiscatus ipsum abstergendo ab oris stomachi superficie, siue sit nimia raritas partes unificando, siue sit defectus sensus oris stomachi ipsum excitando, siue sit defectus melancholice debentis fluere ad quid ponticum pro fame excitanda, ut quia sumatur aliis quibus aut potus excitatur appetitus, sed tantum quod remouetur causam appetitum obtundentem. Et cauendum uero & magnificat ipsum destruit.

Signa male complexionis sine materia sunt, quia non adest grauitas, neque uomitus humoralis, nec eructatio, sed solus alique sapor extraneus & speciem malae complexionis cognoscitur ex causis praecedentibus, calefacientibus, in frigidantibus, humectantibus, aut excitantibus. Item sensatio illius male complexionis in ore stomachi, et iuuatur contrariis, noceatque & calorem in ore perceptum, & eructatione praecedente ipsos stomacho ieiuno, & per sitim si mor est crassus & uiscosus, adest appetitus incidentiarius & subtrahantium, & nausea frequens, & limolitas linguae, & debilitas digestionis.

Signa ulcerum stomachi superius posita, scilicet dolor, & egressus saniei uomitu, aut secessu, mollificatio uomitus, paruitas morae cibi in stomacho, mordicatio superius posita sunt.

Signa obrutionis sensus oris stomachi sunt, quia non percipit aliud stomachi nutrimentum, & res acutae non faciunt mordicationem singultum sicut diatrion piperon, syrumpus aliquod & similia sumpta stomacho ieiuno, & forte quod sit per coitatem à toto, aut neruorum praecellit. Quod si sit per coitatem à toto, sicut in febribus, plurimum, & si humores in febribus stomacho commixti, & etiam cuiusmodi humores sint. Quod si sit per repletionem humorum in toto, cognoscitur ex signis repletionis colligendis secunda primi

cap. proprio, scilicet ex regimine praecedente tumore uenarum crassitiae urinae, plenitudine pulsus, somnolentia, pigritia corporis, multitudine egestionis, & quia euacuatio, abstinentia, & exercitio iuuatur. Quod autem sit propter impotentiam attractivae membrorum cognoscitur ex corporis debilitate, & consumptione. Si uero membra non attrahant propter paucitatem resolutionis cognoscitur, quia forte corpora illa ualde frigida sunt complexionaliter, aut etatiue aut aliter notabiliter in frigidata sunt. Et quia propter abstinentiam corpus non consumitur. Quod autem sit per communiter à cerebro & neruis, cognoscitur ex nocumento ipsorum. Et si in causa sit catharrus, cognoscitur ex ignis catharri, de quibus in capite proprio. Quod autem sit propter defectum melancholice transmittentiae à splene ad os stomachi cognoscitur: quia si sumat potica, aut acetosa appetitus excitatur, supplem enim uicem melancholice, & facit credere hanc significationem magnitudinem splenis propter retentionem eius quod oportet ut effundatur.

Quod si superfluat melancholia, aut si minus acris cognoscitur ex uomitu melancholice & sapore acetoso pontico, inquietudine, et alteratione caloris corporis, & linguae ad nigredinem.

Quod autem sit per communiter ab epate propter nocuum attractivae cognoscitur, quia ad sunt causae eius, scilicet mala complexio frigida, superflua euacuatio & propria sanguinis, & aliquando apostema aut oppilatio eius, aut melaerica, & quia non apparent aliae causae. Signa autem oppilationis uiarum quae sunt, post epas sunt color malus & corporis consumptio: quia prohibetur sanguis penetrare ad membra, & cutis superficiem, & non apparent alia signa. Oppilatio autem epatis cognoscitur ex grauitate, tensione, et quia frequenter adest fluxus. Quod autem sit per communiter ab intestinis sicut in cholica & uermibus cognoscitur ex signis inferius in proprijs capitulis ponendis. Quod autem sit per communiter à corde cognoscitur ex nocumentis ipsius, de quibus supra. Sed quod sit per communiter à matrice cognoscitur, quia forte est praegnans, aut alia ex causa retenta sunt membra, aut forte ad sunt alia nocumenta matricis, de quibus infra. Similiter quod sit per communiter à quocunque alio membro cognoscitur per nocumenta ipsius cum quorum augmento augetur nocuum appetitus, & decremento decreuit, & ablatione aufertur. Causae autem primitivae seipsas ostendunt: & quod quodocunque tales causae ad sunt talis sequitur effectus.

Prognostica. Primum, cum appetitus conualescentium non est bonus, aut cadit significat reciduationem, nisi sit propter sanguinis paucitatem et debilitatem corporis. Secundum casus appetitus in aegritudinibus chronicis est significatio ualde mala, imò nunquam uidi aliquem cuius appetitus destructio perseverauerit in aegritudine chronica & remissa qui euaderet, similiter contra, constantia appetitus in aegritudine chronica & intensa magnam affert spem salutis.

Cura diminutionis & ablationis appetitus exigit quatuor intentiones. Prima est remotio cau-

antibus mēbraicis ab intestinis & stomacho, oris stomachi inanitio melancholiæ à splene ad os stomachi derivatio, tristis sensatio in ore stomachi, ad quæ sequitur, fames siue cibi desiderium. Si ergo membrum non inanitur fortē propter pororum oppilationem aut debilitatem caloris resolutentis & consequenter membra non attrahant à uenis nec uenæ ab epar, necepar à stomacho, fiat fricationes membrorum etiam iteratē si oportuerit & propriē post somnum, & iam perfectā primā & secundā digestionē quando scilicet est tempus distribuendi sanguinem ad membra, ad hoc etiam conferunt balnea aërea & fiones. Secundus modus est procurare ut chylus cito penetret ad epar, & ad hoc ualent quęcunque re mouent oppilationes & sunt subtilis substantiæ facili penetratē sicut uinum uetus subtile, diacalamen fidum, mīdātum, theriaca in causa frigida, sed in causa parum uini limphati. Tertius modus est procurare ut cerebrum sit bene dispositum & mundum multitudine, & in summa uigore uirtutem animalem ad quem modum causa existente frigida ualet diambra, mīdātum, uinum uetus, diamuscum, diambra, diapliris arcoticon, zingiber conditum, secus conditum. Confectio anacardina in causa multum frigida. Item acorus conditus, diambra, & omnia quę confortant neruos & neruosa. Et his aliquid potest teneri in ore quod lambendo deglutitur. Sed in causa calida iulep & sacch. ros. quibz aliquid diamulsi aut simile posset permisceri. Vtationes quoque applicite parti posteriori capitis in collo usque ad 13. spondilem uigoro dō neruum descendentem ad os stomachi, & ipsum os ad hoc confortant. Quartus modus est attrahere melancholiam ad os stomachi si defecerit, quæ attractio qualiter non possit procurari dictum est superius, & si hoc fieri non possit dentur aliqua uicē eius suppletia, quæ de allium, piper album, nigrum enim minus est uicem nisi materia esset nimis frigida. zing. cappareus, oluæ conditæ, pisces saliti, almuri, quod sit hoc modo. Accipiantur farinæ hordei partes duę, panis depressus & ponantur in furno, usquequo coquantur paulatim intus & extra, postea frangantur in tres aut quatuor partes & positæ prius in uas uitreo iterum ponantur in furno usque mātutur permiscendo cum aceto aut alijs modis, qui supplet uicem melancholiæ nisi quodam modo gemone, uinum granatorum, berberis & similia, et ex mātutur, & aliquando facimus sapores addēdo saccharum & mel, aut passulas & aromata ad libitum. Et quandoque cum his ponimus exiccantia sicut nucem & similia. Ita enim pontica supplet uicem melancholiæ in frigidando & uillosos longum quibus melior sit attractio. Quintus

tus modus est per absterfionem humoris inuiscati in ore stomachi, in superficie oris stomachi, ad quod cōferunt cepæ coctæ aut crudæ cum aceto, & aromatis conditæ, & cui placet datur oleum. Item oximel simplex, aut sillicum, & syrupus, & quęcunque abstergunt & incidunt. Sed in causa calida, aqua decoctionis hordei, & passularum cum lacte, seminū comunium frigidorum. Item ualent exiccantia humilitatis stomachi, et propriē quando sunt subtiles, sicut panis biscotus, et furfuraceus stomacho ieiuno. Et ad hanc intentionem, laudat Auic. sauich hordei ablutam, cum aqua & aceto. Fit autem sauich hordei, accipiēdo hordeum nouum, antequam plena maturitate induretur, & ponitur in uale gneo, uel terreo uitreato, & est melius, & super ignem leuiter torrefit, deinde fricetur et uentiletur, donec totus cortex recedat, quo cocto utuntur ad placitum, & in hoc casu laudatur uomitus cū oximelle & balnea bibita, quę deponunt phlegma ex stomacho. Item exercitium stomacho ieiuno & longa abstinentia. Sextus modus est cum odoriferis, ægro placentibus, sicut citonia, pira, poma, limones, aranci, citri, persica, pipiones assati, & cum uino citoniorum, & gariophilis conditi. Et odor panis nouiter extracti de furno, & in summa ingenientur in faciēdo cibos odoriferos, saporosos, ægro placentes, & uideat alios comedere res diuerforum modorum. Septimus modus perficitur per ea, quę à proprietate confortant. Inter quę absinthium obtrinet principatum suscitans appetitum mortuum. Secundo menta, rob, & syrupus eius. Rob mentæ apud Auicennam. Te rantur granata, acetosa cum corticibus suis, & de suc co eorum accipiantur partes duę, succi mentæ pars una, mellis aut sacch. pars una, siue quantum sufficit, ad faciēdum gustui placidum, & est singulare, sed præparandum ad ignem facilitate, ut fiat bona comestio, cuius dosi in ieiuno sit colearium unum, deinde thus, mastix, gallia muscata, xiloolos, calamus aromaticus, bauciæ, id est pastinacæ, schinanthum. Sed in causa calida, citonia cruda cocta condita. Item succus eorum, diacitonitem, & apud Mes. confectio de citonijs facta cum succo citoniorum & ualet sine speciebus in causa calida. Sed cum speciebus quas ibi ponit ualet in causa frigida. Et quandoque potus aquę frigidæ, in æritate quæ nō mortificet calorem innatum, rectificat appetitum, & propriē in conseruatis. Medicamen proprium in conualescentibus ex febribus. Recipe rosarum drachmas decem, sumach drachmas duas, cardamomi drachmā unam fiant ex eis trochisci 2. 3. facit enim appetitū, & sedat sitim. Octauus modus est permiscere plura ex istis secundum diuerfas intentiones, ita tamen ut opponantur causę siue lapsui qui fuerit in ore stomachi & non solum cōpleatur huiusmodi per sumpta, imò quandoque per exterius applicita sicut fomenta, unctiones, cerata & emplastra, quę opponuntur lapsui, & sint excitantia appetitum, et non solum ponantur in ore stomachi, imò super toto stomacho, & ex proprijs est ut coquatur citonium in uino nigro stiptico cum pauco aceti, postea addatur panis biscotus siue assatus & succus mentæ, piper longum, mastix, schinanthus, thus & similia, et potest fieri calidum aut frigidum, secundum exigentiam la-

aëris corrugando & inspissando villos longitudinales potest esse causa huius appetitus, sicut accidit iter agentibus per aquas & per niues, licet fortificando calorem intrinsecum per antiperistaltism hoc possit accidere sicut ab initio dictum fuit. Et in summa si hæc causæ fuerint naturales & quasi naturales, faciunt appetitum caninum naturalem aut quasi naturalem.

Si uero multum præternaturales faciunt ipsum ægritudinalem, licet hic appetitus & omnes causæ eius non absoluantur ab aliqua præternaturalitate. Et ex his manifeste sunt species & causæ appetitus canini. Signa. Appetitus caninus cognoscitur, quia est intensus. Et si homo ei sequatur est necessarium iuxta Rasi cibum egredi indigestum per superius aut inferius, plus enim iuxta descriptionem superius datam appetitur quam possit digeri. Causæ autem primitiue, scilicet, uigilie, exercitium, balneatio, frigiditas aëris, aut superflua eius caliditas resoluens, longa fames & similes cognoscuntur, quia cum adsunt aut præcesserunt, secundum plurimum sequitur hic appetitus caninus. Et quia non adsunt aliæ causæ à quibus possunt pendere. Causæ autem per communiter à toto sicut in conualescentibus ex longis ægritudinibus resolutis & arefactis. Et sicut in habentibus calorem fortem naturalem aut præternaturalem præter modum resoluentem, & sicut in euacuatione superflua à natura uel arte cognoscuntur. Primo, ex præcessione illarum ægritudinum & corporis arefactione. Secundo ex caliditate forti tactu percepta cum colore rub. aut tendente in citrinum, & robore corporis, si caliditas illa fuerit naturalis, si uero fuerit præternatur. erit mordacior debito cum debilitate corporis & imperfectione operationum. Signa tamen complexionis posita sunt secunda primi, ad quæ recurre. Tercio uero ex præcessione euacuationum spontaneorum aut artificialium. Et cum his & omnibus causis præter modum resoluentibus secundum plurimum uenter est stipticus, quia natura retinet feces ut exurget, quicquid potest licet aliquando actualis fluxus possit esse causa appetitus canini. Catarrhi autem cognoscuntur ex dictis superius in capitulo proprio, quod fluunt secundum plurimum non solum ad stomachum, imò etiam ad pulmonem, uerum existimo ipsos raro esse in causa cum magis sint apti appetitui destruere quam intendere. Signa uerum ponentur infra. Signa autem causarum quæ sunt proprie ori stomachi sumuntur hoc modo, caliditas superflua oris stomachi comprehenditur ex siti, cum non solum exiccat humidum substantificum, sed etiam roridum, & est uenter stipticus, & est sine acetositate & rugitu, & similibus frigiditatem significatibus. Et contraria signa sunt dominantia, & si hæc dispositiones fuerint naturales appetunt similia, si uero præternaturales contraria, sed humor acetosus in stomacho cognoscitur ex eruuatione, sapore, odore, uomitu, redolentibus sapore acetosum, & quod homo non appetit aquam, neque res frigidas, & si est phlegma, color linguæ est albus, & sputum album acetosum, & color faciei albus, & similia quæ sunt signa phlegmatis, & si est melancholia, color linguæ est fulcus, & sapor in ore representans cum acredine declinet ad ponticitatem, & forte adsunt nocumentum splenis, & signa eius qui est ex debilitate conten-

tiue in stomacho & in corpore sunt egressio festina cibi indigesti. Et si adsit debilitas contentiue aliorum membrorum adsunt fluxus aliorum generum, & fortasse peruenitur ad sanguinolentam egestionem, & ad eandem quæ est sicut lotura carnis, secundum plurimum tamen his fluxibus dum actu sunt coniumgitur deiectio appetitus.

Prognostica. Primum, appetitus caninus perducit ad bulimum, facit enim ut multus cibus sumatur qui sumptus non potest digeri, & sic est necessarium iuxta Rasi ipsum indigestum egredi uomitu aut secessu & multas humiditates præternaturales in stomacho congeri & corpus non nutrir, quapropter sequitur bulimus qui est fames membrorum cum fatiatur stomachi, & ducit ad subeth propter multitudinem uaporum phlegmaticorum caput replentium, qui eleuantur ab humiditatibus phlegmaticis in stomacho congeffis. Et ex eadem causa potest ducere ad mortem uaporibus illis eleuatis ad caput, in humiditatem phlegmaticam condensatis & facientibus apostema lithargicum, & etiam quia corpus non debet nutriri unde exiccat & arefit. Secundum, si caput petitus caninus secundum plurimum curatur.

Cum aliquis famem assidue patitur, & cibus post comestione adeo grauatur, ut aut uomere, aut per inferiorem regionem ipsum eicere cogatur, rizi dandum est ei, quod cum coquitur ex liquore qui fluit ab agno, qui in furno assatur impingatur, & cauda, & ei similia, nec non ex omni cibo qui unctuosus est. Et uinum uetus purum dandum de quo quantum poterit bibat. Deinde præcipiendum est ei ut euomat, & hoc regimen conseruandum est donec sanetur. Quod si nec cibus eum grauat, nec ipsum euomit, nec per secessum expellit, cornes uaccinæ sunt dandæ, & frumentum coctum, ut puls & rizi cum lacte, & aquam frigidam in potu sumat, & in aëre frigido moretur. Hac autem ægritudine laborans nihil acetosum & stipticum, nec acetum comedat, sed dulcibus & unctiosis solum utatur.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. In prima parte determinat de appetitu canino pendente à causa frigida. In secunda de appetitu canino à causa calida. secunda ibi. Quod si nec cibus, nec secessus. Primo ponit signa eius. Secundo dicit in prima parte nota sunt ex superscriptis. In secunda ibi. Rizi est ei dandum. Quæ dicit in prima parte curat appetitum caninum exhibendo ritum

ritum impinguat cum pinguedine cadente ex agno dum allatur & exhibet carnes ualde pingues, sicut carnes existentes in caudis agnorum quæ sunt ualde pingues: hæc enim ualde pinguis, & similiter oleaginea destruit appetitum, postea dat uinum uetus in magna quantitate, corrigit enim malam complexionem frigidam, postea iubet uomitum prouocari, ut humor acetosus in stomacho existens educatur, & hoc multoties debet fieri donec sanetur, non tamen debet uomere omnem cibum, quia sic non nutritur.

Sed exempli gratia, comedat & bibat copiose in prandio, ex his quæ dicta sunt aut similibus, postea uomat. Sed in coenis ex his unctuosius parum comedat, & uinum uetus bibat in moderata quantitate & illud retineat. Et hoc pluribus diebus faciendum est donec sanetur. In secunda parte curans appetitum caninum à causa calida dicit, quod si cibus cum non grauat, nec per uomitum aut secessum emittat, Ex quibus significatur calorem naturalem esse forrem, & benedigerentem, sed superflue resoluentem, danda sunt ea quæ sunt difficilis digestionis, & solidi & uiscosi nutrimenti, ne facile resoluantur, & cum hoc ad frigidum declinantia, & temperetur complexio superflue calida sicut est frumentum coctum, ut pulsatissime coctum, est enim parum distans à temperamento uersus calidum, temperatum in passivis & ipsius elixatum sicut hic præcipit est apud Auic. rarior digestionis, inflatuuum, plurimum nutrimenti super omnia alia genera. Et rizum calidum, & siccum coctum cum lacte, ad temperatum eius caliditatem, & bibat aquam frigidam, & moretur in aëre frigido, de quo tamen est dubium ne per antiperistaltim fortiter & hyeme calidissimi sunt natura. Sed credo Rasis non uelle debilitare digestionem, imò potius fortificare, sed bene prohiberet nimiam resolutionem humiditatis, quæ multo magis fit in aëre calido quæ frigida, quæ bene consideremus hic appetitus caninus est naturalis aut quasi. Ultimo dicit, quod laborantes huiusmodi appetitu non debent uti acetosis, stipticis aut acutis, hæc enim excitant appetitum. Et in his qui habent fortitudinem caloris, cauendum est ab his quæ sunt facili digestionis & pauca quantitatis, ne digestio corruptatur ad fumosum.

Superest ut ordinetur cura appetitus canini, quicunque causa pendeat exigit quinque intentiones. Prima, est remotio causæ. Secunda, appetitus obfusio. Tertia, stomachi confortatio. Quarta, correctio accidentium. Quinta, regimen uitæ. Si ergo pendeat à causis primitiuis remotio, & nocumētum si quod est per ipsas impletur, puta si fuerit à superfluis uigilijs, inducatur somnus aliquoties superfluis, non tamen multum in longitudine & profunditate uisus somni, imò in pluribus uicibus satis fiat, ita ut ubi consueuit dormire in die naturali, dormiat bis & ter secundum opportunitatem. Similiter si sequatur longā famem postea digerit, sed potius pluribus uicibus inter quas tantum tempus mediet quod præcedens cibus possit digerit, & si sequatur superfluum exercitium inducatur quies opportuna eodem modo in reliquis, secundum

do appetitus obtundatur, & aliæ intentiones perficiantur, ut infra. Si uero appetitus caninus sit per communitatem à toto aut ab alijs membris, exiguntur quinque intentiones similes superscriptis, quarum prima est remotio causæ, uerbi gratia, in arctatis ex longis ægritudinibus intendatur restorationi exhibendo cibum copiosum non in una uice, sed in pluribus uicibus, qui sit facilis digestionis, boni chimi & paucorum superfluitatum. Sed in habentibus calorem fortem præter modum resoluentem intendatur ipsius remissioni tam regimine cibali, quam medicinali, sicut cum syrupis, confectiionibus, electuarijs, aquis, epithimatis, emplastris infrigidantibus quæ satis nota sunt. Et cum cibus frigidus sicut lactuca, acetosa, endiuiæ, portul. & dentur cibi præbentes nutrimentum crassum & multum, sicut frumentum, rizum, carnes grossæ, & similes, iuxta textum Rasis, & in omnibus in quibus appetitus caninus sequitur nimiam resolutionem, sunt pori cutis inspissandi cum stipticis, sicut oleum myrrinum cum cera dissolutum, & sicut alumen dissolutum cum aceto, & ut abluatur aqua frigida, nisi timeatur caloris extinctio. Quod si sequatur euacuationes superfluas sistendæ sunt, & similiter si sequatur debilitatem contentiuæ membrorum confortanda est sicut dicitur in fluxibus. Et similiter si catarrhus fuerit in causa curetur sicut dictum est in c. proprio, & uermes similiter sicut dicitur inferius. Si uero causæ fuerint proprie sicut caliditas aut frigiditas curetur cum contrarijs interius & exterius regioni stomachi applicitis quæ ex superscriptis satis nota sunt, & phlegma acetosum, & melancholia acris pontica in ore stomachi educatur aut cum uomitu, est enim promptior uia, & si iubet Rasis in litera, aut cum solutiujs, sicut sunt pilulæ alphantinæ, stomachicæ, hiera simplex & similes, phlegmate existente in causa, quibus præmittantur digestiua sicut oximel simplex, compositum, scilicet liticum, mel, & aquæ proportionales, & melancholia cum sena, epithimo, mirob. indis, dialys. quibus præmittantur digestiua sicut syr. de epithimo fabor, & si miles cum aquis proportionalibus, & hæc digestiua & euacuat. respiciant tam membrum mittens quæ recipiens. Et quandoque sanguine melanchol. existente multo, aut splene apostemato confert phlebotomia basilicæ, & aliquando uentosatio super splenem confert prohibendo transitum melancholæ ad stomachum, & in summa à quibuscunque causis pendeat exquenda sunt quinque intentiones superscriptæ. Quarum prima est remotio causæ complenda, ut dictum est. Secunda intentio, scilicet, obfusio appetitus perficitur multis modis. Primo suadendo eis ut rationi obsequantur & non appetitui. Secundo, quod medicus faciat illis in mensa presentari quantum est ipsis sufficiens & nihil aliud & cum comederint illud, abstineant ne presentia obiecti eorum accendatur appetitus & intendatur. Tercio, quod sumptu cibo quantum uidetur sufficiens surgant à mensa & ad alias cogitationes se transferant. Quarto, si hæc non sufficerint sicut accidit in pueris, & quibusdam alijs qui non obsequuntur rationi, nec sunt aliquo pacto tolerantes famem cum surrexerunt à mensa dentur aliqua quæ paulatim comedant, quæ parum grauent stomachum sicut aliquas passulas & auellanas aut phisticos & similia, quæ ipsi rumpant, aut interim paulatim aliqua

aliqua pauca comedendo appetitus sopiatur. Quin-
to, his non sufficientibus dentur in princ. aut in me-
dio mense cibi portabiles sicut brodium: hi enim ap-
petitum magis obrundunt et non grauant digestio-
nem. Sexto, his non sufficientibus dentur cibi
fastidiosi ut insipidi, primo non cum sale & cæ-
teris, non secundum consuetudinem debite condi-
ti, deinde pingues aut dulces, & proprie pinguetudi-
ne aut dulcedine fastidiosa. Cauendo ab acetosis, pon-
ticis, stipticis, acutis, salis. Septimo, sopiendo aut de-
bilitando os stomachi cum intensæ frigidis aut mul-
tum uiscosis adherentibus ori stomachi ægro dando
foetida aut res habentes odores ægro displicentes. Itē
rancida aut aliquid putrefacta, quæ sint pingua
os stomachi disgregantia & relaxantia. Et inter cæte-
ra ponatur multus crocus pro condimento suorum
ciborum & potuum. Item pineæ antiquæ aut nuces
rancidæ, & similia multum appetitum deiciunt, bu-
tyrum quoque deijcit appetitum, & proprie quando
fuerit antiquum horridi odoris & saporis. Et in sum-
ma omnia multum pingua & oleaginea deiciunt ap-
petitum. Vinum autem sit mediocris potentia non
stipticum, acre aut ponticum, de quo multum bibat
siue intentio fuerit uomere, siue intentio sit depositio
humoris uiscosi ex ore stomachi. Sed ratione uomit-
us prouocandi detur post alia cibalia abominabilia
& ad uomitum disponentia aut simul cum ipsis. Sed
ratione resolutionis aut dispositionis humoris uisco-
si ex ore stomachi detur stomachio ieiuno ne alijs ci-
bis impeditum debilius operetur. Et si bibatur calidum
ratione utriusque intentionis magis conuenit. Auic. ta-
men quando adeit fluxus prohibet omne uinum: sti-
pticum namque & acetosum auget appetitum, sed ama-
rum addit in solutione uentris forte quod insipida si-
cut quædam ferientia conuenirent. Octauo, deijci-
tur appetitus cum exterius applicitis sicut fomenta-
tiones ex mollificantibus ex decoctione malua uisci,
maluæ, foenugr. sem. lni, & similitum, uel uesica plena
huiusmodi decoctione tepida ori stomachi applice-
tur. Item unctiones ex pinguedine mucilaginis, medullis
& oleis mollificantibus cum butyro, & si hu-
iusmodi exhibeantur per os amplius deijciunt ap-
petitum. Cauendum tamen est summopere ne ex horum
applicatione aut sumptione destruat appetitus.
Est enim deterior destructio appetitus quam appetitus ca-
ninus. Tertia autem intentio, scilicet, confortatio sto-
machi perficitur cum moderate stipticis habentibus
propriam ab ipso, & contrarijs eius discrasia in te-
rius sumptis & exterius applicitis, non tamen exicca-
tibus appetitum quæ possunt patere ex superius di-
ctis, & propriæ in cap. de debilitate digestionis. Et
muscus & laudanum confortant stomachum, & non
augent appetitum, similiter crocus confortat stoma-
chum & deijcit appetitum. Quarta autem intentio,
scilicet, correctio accidentium perficitur secundum ipso-
rum exigentiam. Vomitus quidem cura præcessit
superius in 1. cap. de dispositionibus stomachi, & si-
militer cura debilitatis digestionis in secundo. Et cu-
ra bulimi statim sequitur. Sed de fluxu uentris cuius-
cunque generis agatur in sequentibus; hæc enim sunt ac-
cidentia quæ aliquando sequuntur appetitum canini.
Pro quinta intentione aer & reliquum regimen
sex rerum declinet in contrarium discrasia, & melius

est partiri cibum quam multum una uice exhibere. Et
cauendum est ab acetosis, acutis, ponticis, stipticis &
amaris. Et utendum est dulcibus, unctuosos & insi-
pidis. Et apud Auic. uitellus oui induratus per al-
sationem & confert in fine mense. Somnus longus &
multa quies conueniunt. Et ioci & ludi, & medita-
tiones diuertentes animum à comestione & ciborum
consideratione, & reliquum regimen magis specia-
le potest patere ex suprascriptis in hoc capitulo.

DE BULIMO. Cap. LXXXIX.

Bulimus aliter dictus fames uaccina est desiri-
ptiue apud Auic. fames membrorum cum
satietate stomachi. Sunt namque membra fa-
melica indigentia nutrimento, sed stomachus
respuat ipsum, & non habet species nisi modos diste-
rentes secundum intensum & remissum. Causæ bu-
limi sunt duplices, sicut duo sunt inclusa in quiditate
eius, Vnum est membrorum desiderium sequens ip-
sorum inanitionem. Quæcunque ergo possunt esse cau-
sa inanitionis membrorum, possunt esse causa saltem
partialis bulimi. Reliquum est satietas stomachi, id
est, deiectione siue destructio appetitus ac si stom. esse
satur. Quæcunque ergo causæ possunt minuire aut
destruere appetitum, possunt esse causa saltem par-
tialis bulimi. Bulimus itaque exigit causas quæ utrius-
que faciunt, scilicet, membrorum inanitionem & de-
iectionem appetitus. Itæ ergo causæ aliquando sunt
una, id est, quæ una & eadem causa faciat utrumque, si-
cut appetitus canini, modo superius declarato: facit
enim ut multus cibus sumatur qui sumptus non po-
test digeri, & sic membra inaniantur, & cum hoc non
digesto est causa nauseatiue satietatis & deiectionis
appetitus. Item frigus intensum exempli gratia in
agentibus iter per nives est aliquando causa congelati-
onis oris stomachi & mortificationis uirtutis sensiti-
uæ & attractiue eius: & tamen per antiperistaltin po-
tuit aliorum membrorum calorem fortificare. Item
febres aliquando membra inaniant, & tamen humo-
res à quibus pendent ad stomachum repentes ap-
petitum deijciunt. Item debilitas digestiue facit ut super-
fluitates in stomacho congerantur, & sic de fine
deficiente nutrimento corpus inaniantur, & sic de fine
gulis. Aliquando pender à diuersis causis, nam po-
test obtundi appetitus propter nocumentum neuro-
rum cerebri uenientium, ad dandum ipsi sensum, aut
propter catarrhum in ore stomachi inuisum, &
tamen ex alijs causis corpus inaniri, & tu per reliqua
causas discurre, quæ possunt elici ex capite. de in-
anitionis aut diminutionis appetitus, & ex hoc capite
appetitus canini.

Signa cuiuscunque causæ patent ex suprascriptis in
dictis capitulis. Signa namque inanitionis membrorum
sumuntur à macie, complexione calida resolu-
uente, & similibus. Sed signa causarum destructio-
nis aut diminutionis appetitus positi sunt in capitulo
lo proprio.

Prognostica. Primum bulimus quandoque ducit
ad syncopim, tum propter corporis inanitionem,
tum propter nocumentum oris stomachi, cui con-
compatitur. Secundum. Licet bulimus longum tem-
pus plurimum curetur; tamen si longo tempore
peruenerit

Sitis iuxta suprascripta. Est descriptiue appetitus frigidi & hum. Et est duplex. Quædam naturalis sequens causas efficiētes naturales, scilicet, uir, uis & caloris naturalis actione, et propter fines à natura intētos, qui sunt humidi, & roridi, restauratio ciborū in stomacho melior commixtio, & consequēter melior digestio chili ad epar & sanguinis ad mēbra melior penetratio, & quartò madefactio in locis necessarijs sicut in lingua, gutture, pulmōe, iuncturis, et similib. Quæda sitis est præternaturalis. De cuius curatiōe hic agēdū est, quæ potest ladi diminutē, ablatē, & corruptē. Et diminutio dupliciter per intensiōē, & remissiōē. Sed de ipsa lēsa per intensiōē prius agēdū est. Quæ est duplex, quæda enim est sitis intensissima in qua appetitur potus frigidissimus. Alia multa in qua appetitur potus multus, licet non ualde frigidus quarū causæ sunt distinctæ, quæ poterūt elici ex dicēdis.

Causa immediata cuiuscūq; sitis est tristis sententia sequens consumptionem humidi roridi in ore stomachi. Causæ uerò mediatæ quædam sunt extrinsecæ sicut aer æstuosus & ualde siccus, uinum potens, antiquum, calidum & sic. quod apud Gal. 2. interiorum perduxit serum notari ad instatiam uigiliarum, alienationem & febrim, & tandem ad mortem. Item aquæ falsæ de quibus Gal. ibidem. Et tempore meo quidam Quirinus nobilis Venerus cum tempestate impulsus pertransiisset Gades Herculeos cum 60. socijs, solū cum quinq; socijs superuixit. Reliqui enim feruore sitis compulsi biberūt aquam salam, & mortui sunt solutione uentris superueniente, & dysenteria cum siti continua usq; ad ultimum anhelitum. Ipse autē cum quinq; socijs qui superuixerunt biberunt urinam propriam ab aqua falsa abstinentes. Item cibi calidi acuti, sicut allium, piper, & similes. Item cibi falsi, sicut carnes, caseus, et pisces saliti. Item res crassæ, & uiscosæ faciunt sitim, quia natura querit ipsas expellere loriōne, incisione, & subtiliatione, ad quæ peragenda querit potum in auxilium, & pisces saliti sunt causa sitis his tribus modis, quia crassi, quia uiscosi, & quia falsi. Item amara faciunt sitim, quia calida exiccantia, & dulcia quia inflammantur. Item, quia aliqua eorum acuitate participant sicut mel & ficus. Item stiptica & pontica, quia exprimunt humidum ab ore stomachi comprimendo, & multitudo cibi eū paucitate potus est causa sitis. Item omnia putrefacta in stomacho sunt causa sitis. Item somnus longus superflue calefaciendo, & uigiliæ multæ nimium exiccando. Et somnus super crapulam & cibos calidos, quorum augeat caliditatem, intendit sitim, licet somnus fortificando digestionem aliquando sedet sitim iuxta Aphorif. 28. quintæ particulæ. Qui bibere appetunt. Quandoque enim superuenit sitis labore digestionis, quam somnus sedat fortificando digestionem, & aliquando humectando sicut qui contingit ex siccitate meri, licet sitis præcipue fortis ex alijs causis contingens parū somno sedet, sed potius potu. Item multitudo locutionis, exercitiū longū aut intensum. Et accidētia animi corpus inflamantia aut exiccantia faciunt sitim sicut ira, tristitia, timor. Et sit sitis à mortu quorūda uenenosorū tā à proprietate q; à qualitate manifesta ipsam exiccant. Et uinū aut cibi in quo mortuæ sunt uiperæ faciūt sitim quæ nullo ingentio sedatur.

perleueret secundum plurimum ducit ad interitum, etiam sine causa ualde manifesta. Cura exigit quatuor intentiones. Prima est remotio causæ uel causarum ram destructionis appetitus stomachi quam inter debeant remoueri, patet ex dictis suprascriptis duobus. cap. scilicet in capitulo destructionis appetitus, & in cap. appetitus canini. Secunda est appetitus excitatio & oris stomachi confortatio, quæ qualiter debeat compleri manifestum est ex dictis in cura appetitus canini. Et inter cætera in lapsu calido administratur odorifera sicut citronia, poma odorifera, arādonis sicut coriandri præparati, rosæ, flores lampophili, cinamomum, uinum odoriferum cum micatidis, aut cum tortellis de seni, id est, pane biscocto in macho applicata ad hoc conferunt quæ sunt stiptica aromatica cum proprietate appetitum excitatā, de dnanā ad contrarium lapsus, quæ appositæ sunt intentione in capitulo destructionis appetitus. Pro tertia cum aqua frigida, & ponendo sub naribus odoriferā, & non sinendo ipsos dormire & excitando ipsos aliquorum pilorum, aut aliquo alio modo leuem doctorem inferendo, & cum titillationibus, & similibus ingenijs & cum euadunt à syncopi cibentur pane in bile est prohibeatur ne redeat syncopis. Et si possit stipticis odoriferis suo lapsui contrarijs. Quarta autem intentio, scilicet, regimen sex rerum patere potest ex dictis cap. destructionis appetitus, & appetitus canini debet enim dedinare ad contrarium discalæ. Fames autem syncopalis iuxta Auicē. est ut patet, cum q; tardatur eis cibus superuenit eis syncopis & calūs uirtutis.

Causæ enim sunt debilitas aut nimia sensibilitas oris stomachi, cui cor facile compatitur. Item nimia resolutio sequens aut fortem caliditatem, aut humidi substatitici & humorum subtilitatem aut raritatem rexturæ & pororum latitudine. Signa nota sunt ex suprascriptis. Prognosticum. Fami syncopali facile subuenit, famis syncopalis curatur cura syncopis & cura appetitus canini. Et in summa cura uertitur circa duo, unum est ad curandum ipsos in dispositione syncopis, & de hoc sufficiens sermo præcessit in capitulo syncopis, & in capitulo debulimo. Aliud est ad curandum ipsos cum euadunt à syncopi, imò potius antequam ipsam incurant si cognoscitur eius aduentus apud Auicē. cibandi sunt pane infrigidato in uino, uino odorifero miscetur uinum citoniorum in quo panis infusus actu frigidus sumatur, aut si maior fuerit caliditas, miscetur cum uino uinū granatorum, aut uinum crispinum, aut de berberis, aut succus acetositaris citri, limonum & similib. & prohibeantur à somno plurimo, & non tardetur eis cibus, & cibatur frigidis actu.

modus est, per retenta in ore sicut frustum anguriae, cucumeris, melonis, cucurbitae, prunorum, arancij, citri, pomi, & similia, qui prius sint infusi in aqua frigida & liquiritia, & hic modus maximè ualet in siti sequente calefactionem aut exiccationem meri, caninae pulmonis aut membrorum spiritualium. Tertius modus est per collusiones & gargarismata cum aqua frigida sola, aut cui admixtum sit aliquid uini granatorum, aut acetii, aut succi citri, aut arancij, & si milium, de his quae bibuntur pro sedatione sitis, & hoc maximè ualet in siti sequente dispositione capitis maxime quando colluendo aut gargarizando fautorum. Similiter in siti sequente dispositione meri, caninae pulmonis & spiritualium. Quartus modus est, epithimata aut unctiões frigidas circa gulam, colla, & pedes usque ad 9. & malum granatum cum lacte, aqua endiuiae, acetosae, nenupharis, lactuca, qui bus aliquid acetii potest admisceri ad penetrandum, aut oliuiol. nenupharinum cum paucis ceræ & acetii, & hic modus ualet in siti merito cuiuscunque membri contingenti, cuius regio ungitur aut epithimatur, ita quod si cōtingit merito epatis, renum & aliorum eorum inunctio aut epithimatio conferret. Similiter in siti per proprietatem in ore stomachi. Quintus modus est, cum somno fortificando digestionem, tando meri iuxta Aphorism. superius alleg. Similiter ubi aliquando sedant sitim resoluendo uapores, qui in somno accelerantur. Sextus modus est, cum bibitis quae in mala complexionem calidam & siccam, sine materia debent esse frigida actum & potentia. Sed ubi ad sitim cholericam aut saliam, aut alterius generis potius conueniunt actum calidum, & proprie ubi materia sit imbibita aut inuiscata, quae lauando abijciant da simplex, aut decoctionis hordei, aut liquiritiae, aut pallularum, nec obstat quod dicitur tertio regiminis acutorum, quod aqua calida inflammatur, & in cholericam conuertitur. Similiter prima quarti, de cura febrium pestilentialium, aqua in pauca quantitate ex citat caliditatem, intelligitur quando non est tanta, ut possit humores à stomachi superficie abluere, aut ad intellectum Auicennae, quando consequenter & paulatim exhibita tota conuertitur in uapores corpus inflammantes propter uehementiam caloris febrilis, non est enim extinctum tanto calori proportionata, sed ubi sufficit humores à stomachi superficie abluere est conueniens. Aqua uero frigida fortè non perit humores compingendo, & amplius eos circa su periciem stomachi inuiscando, potius autem conueniunt actum calidum, aliquando frigidi, sunt infra scripti. Aqua hordei cum iulep uolarum, aut iulep rosarum. Item aqua cocta mixta cum saccharo, & uino granatorum dulcium in materia frigida, uel mutorum aut acerosorum in materia calida. Similiter mucilagines, semina citroniorum, uel psyllij cum aqua hordei & saccharo, ubi non timeretur uentris lubricitas, similiter succi fructuum acerosorum, sicut acetosae li monum, citri, arancij, pomorum, pirorum, prunorum, mariscarum, extremitates uitis soli aut bibiti

cum saccharo & tamarindi sunt proprii ad hoc, & resistentes feruori materiae cholericae & sanguinis & debite dulcorati cum saccharo non stupefaciunt dentes. Et iulep facti cum huiusmodi acetosis optime conueniunt. Et à fide digno habui & expertus sum aquam frigidam cum debita quantitate acetii gustui sumentis proportionata esse optimum sitis extinctiuum. Verum diuersi potus eligantur secundum diuersitatem materiae. In materia phlegmatica mel rosae, oxymel simplex, syrupus acetosus simplex: in cholerica oxysacchara, syrupus acetosus, syrupus de acetositate citri, limonis, arancij, dia prunis simplex, syrupus uiolaceus. Et rob ex supra scriptis magis extinguunt sitim, sicut de berberis, de agrestia, de citro, de limonibus, de sumah, de pomis de piris, & similibus, quae cum aqua saccharata possunt exhiberi & aliquando exhibemus aquas sublimatas, sicut endiuiae, acetosae, rosarum, & similia. Quae debent esse sublimatae ad uaporem aquae, siue ad balneum mariae. Et non ad ignem sicut communiter fit. Primum enim sunt praesentes habentes odorem, & uim rerum, quae sublimantur. Secundum uero habentes odorem adustionis, siue declinantes ad fumum sunt pauci iuuamenti. Eius signum, quia non seruant odorem proprium. Quae distillantur & quae extrahuntur ex rebus frigidis minus infrigidant quam debent. Et quae ex calidis magis calefaciunt quam debent. Et cum hoc nullae seruant odorem uim & proprietates rerum à quibus per distillationem extrahuntur. Et suo malo odore & sapore displicent facientes aegros renuentes usum earum, & sic parum proficiunt. Ceteris enim paribus magis iuuat cibis & medicina placens, quam displicens iuxta Aphorism. Parum deterior cibus. Quapropter medici multum debent esse uigilantes ut fierent huiusmodi aquae. Imò ceterae medicinae secundum quod oportet, cum aliquando oporteat istis aquis uti non tantum ut medicinalibus, sed loco potus sicut in hydrope colica, & similibus, in quibus aqua omnino prohibetur, & aliquando propter discrasiam calidam non poterimus uti uino. His ergo potibus sitis sedatiuis aliquando utimur in parua quantitate aut mediocri, aliquando in magna, aut una uice, aut pluribus uicibus, non tantum propter sitim quantum propter causam sitis, sicut in causae, tertiana continua, synocha, febre pestilentiali, in quibus de aqua aut alio potu in frigidante exhibetur quantum bibere possunt, & hic modus maximè ualet in extinctione sitis per proprietatem in ore stomachi & per communitatem à toto & à membris, quorum discrasia os stomachi praeter modum calefit & exiccatur, & etiam si pendeat à causis primitiuis, de quibus supra. Septimus modus est stupefaciendo aliquid sensum oris stomachi cum intensae frigidis actum & potentia, sicut cum syrup. electuarijs, in quibus sit uirtus feminis lactucae, & propriae nigrae, papaueris albi & nigri, mandragorae, hyoscyami usque ad opium, sed de opio in modicissima quantitate, & hic modus ualet in siti à quacunque causa contingente. Octauus modus est conuertendo mentem ad alia multum tangentia, ita ut sitis obliuiscatur, & hic modus ualet in siti ab omni causa contingente si parua sit. Tertia intentio, scilicet confortatio stomachi perficitur cum interius & exterius ap-

Rami etiam ipsius capillares uadunt uersus gibbū epatis & secundum suas extremitates obuiant extremitatibus ramorum uenæ chilīs uenientium uersus concauum, ut sanguis in hoc transitu per angusta loca bene digeratur & perficiatur. Ex hoc apparet epar fuerunt ut minimum in opilationes. Hæc autem facta bona fuerit sanguificatio. Nō autem sic fuit in stomacho, imò cibus tanquam in quodam uase collectus est. Tum quia cibus erat crassius & non potuisset per loca angusta transire. Tum quia chilificatio non est ita perfecta digestio sicut sanguificatio. Ab hac autem uena portæ oriuntur multi rami egredientes epar, quorum sex sunt manifesti. Vnus transit ad nutriendum partem dextram stomachi inferiorem. Secundus transit ad splenem deferens sanguinem melancholicum & est ualde manifestus. Tertius transit ad nutriendum superiorem partem stomachi dextram.

Quartus transit ad nutriendum zirbum pro parte, & pro parte ad intestinū rectum. Quintus uadit ad colon. Sextus ad ilia & intestina gracilia. Et qui uadunt ad intestina componunt meseraicas per quas epar uenit chilum ab intestinis. A gibbo autem oritur uena, licet fortè dignius sit propter causas supradictas in corde ut à corde oriatur, habet autem unicum neruum à cerebro uenientem ad constituendum panniculum ut det ipsi sensum, sicut & unica arteria uenit ad ipsum à corde ad dandum uirtutem uitalem. Est autem integratum ex latere gibboso quod est superius & concauo inferius, & est pennulatum, scilicet, quique pennulis, licet non in omnibus sint manifestæ, quibus amplectitur stomachum ad uigorandum eius digestionem. Et habet uirtutes quatuor naturales, attractiuam, retentiuam, digestiuam, & expulsiuam. Retinet enim chilum mediantibus meseraicis. Retinet ipsum donec sit in sanguine conuersum per uillos transuersales, digerit per calorem eius principiter fundatum in carne rubea, eius propterea sanguis est rubeus quamuis generetur ex chilo albo, expellit autem sanguinem per uenam chilis ad cor & reliqua membra. Sed superfluitatem cholicam ad Kila eius, superfluitatem melancholicam expellit ad splenem medianter ramo uenæ portæ, de quo supra. A quo fitatem uero ad renes per uenas emulgentes, meseraice tamen licet principaliter per eas attrahat epar chilum habent tamen præter uirtutem attractiuam aliqualem uirtutem sanguificatiuam in uirtute epatis sicut & uas spermatica immutant sanguinem uersus naturam sententiam antequam ueniat ad testiculos, & ad hanc primo in fine, multas adiicit rationes, quas inutile est persequi. Reliqua posita in diffinitione sunt manifestæ. Ex his iam patet quod epar est calidæ & humidæ complexionis. Et potest pati omne genus ægritudinum simplicis & compositæ, scilicet, malæ complexionem cuiuscunque generis sine materia & propriæ opilationes, nec non solutionem continuam etiam salubrem plusquam multa alia membra nobis, tum quia quietū, tum quia carnosum, & quia est sedes & principium uirtutis naturalis qua sit consoli-

datio. Item potest pati apostema & uescicæ quæ rum-puntur, & consequenter debilitatem suarum uirtutum quæ sequuntur aliquam aut plures ex ægritudinibus suprascriptis, propter quam aliquando corporis extenuatio, dolores, histeria, & similes. Ego uero præter tria capitula Rasis pro completionem doctrinæ intendo agere de debilitate epatis & opilationibus eius. Item de apostematibus & ulceribus eius. Nam hæc frequenter eueniunt, de fluxu autem epatico loquar, cum agam de passionibus intestinorum. Reliquarum autem ægritudinum epatis cura erit ex his manifesta.

Sed ante omnia pro habendo ingenium curatiuæ ægritudinum epatis ponendi sunt aliqui canones seruandi in cura dispositionum eius. Primus est, quod medicinæ exhibendo per os dentur quando completa est digestio prima & secunda, & superfluitates harum digestionum sunt expulse, & proprie hic canon obseruandus est quando exhibentur medicinæ aperitiuæ. Nam tunc temporis epar est preparatum ad suscipiendum operationem medicinæ, & ad regulandum ipsam, quia tunc non est circa aliud occupatum & de aperitiuis maior est ratio, quia possunt secum trahere de chilo indigesto. Tempus autem primæ digestionis est circa horas octo. Tempus autem secundæ digestionis est secundum plurimum subduplū & quia secundum plurimum nondum finita prima incipit secunda, communis terminus ambarum sunt decem horæ, licet isti termini non possunt bene limitari propter diuersitatem corporum ciborum & consuetudinum. Si tamen plus differtur, non est inconueniens nisi in solutiuis, quæ non debent dari in fame, sed statim post complementum primæ & secundæ digestionis. Secundus canon, ut cum omnibus medicinis aperitiuis, quibus indigemus in morbis epatis materialibus apostemosis, sicut in oppilationibus misceantur medicinæ moderata stipticitate confortantes, nisi fortè timeamus siccitatem superfluum in proprijs. Oportet enim semper intendere ad confortationem membri principalis, quæ maxime completur cum proprijs moderata stipticitate participantibus. Tertius canon, quia subriliantium medicinarum, licet sint aperitiuæ, proprietas est ut acuant sanguinem, sicut aqua radicum aperitiuarū, & quādoque generent humores diuersos discouenientes per aduersionem, & quandoque conuertant humores in lapideitatem, sequi debent medicinæ lenitiuæ sicut cassia, & similes, ut mundificent, aduersionem prohibeant, & petrificationem. Quartus can. uitanda est omnis superflua calefactio & omnis superflua infrigidatio. Primo, quia epar est membrum principale indigens magna custodia, unde 48. primi, cap. 1. Super membra principalia cum fortibus medicinis non faciemus aliquid in quo sit ambigendum, quanto magis poterimus, ne nocumentum toti commune faciamus. Primo, quia nocumentum principalium est toti commune. Secundo, quia alia non principalia à principalibus iuuantur. Ipsa uero principalia non sic iuuantur nisi à corde. Tertio, quia superflue calida colligant substantiam epatis quæ est lasa & debilis compaginis, indurant, & in lapidem conuertunt. Epar etiam est inclinatum ad lapsum calidum, sed intense frigida oppilat meatus & maxime uenas epatis.

& chimus earum est bonus. Sed debent esse aliquali-
ter correctæ, aliter faciunt sodam præcipuè recen-
tes, quia in ipsis est humiditas uetofabilis. Item epar
adip, id est, lupi secundum aliquos, uel si adip differt à
lupo, eius tamen epar est in uirtute epatis lupi. Item
carnes limaciarum conferunt cū proprietate quæ fri-
gidæ sunt & humidæ. Caro autem testitudinis est pro-
pria & magis propinqua æqualitati, & ambæ conse-
runt hectis, sed quia uiscosæ sunt, & habent quandā
humiditatem superfluam, & propriè limaciæ bonum
est, ut ante coctionem lauatur cum lixiuio aut uino,
aceto, sale, & similibus. Et cōseruitur epari exiccato & in
flamato dando nutrimentum frigidum & humidū
& constans non facile euaporabile, & propriè si non
sit oppilatuū, sano tamen epari perdes sunt saniores.

DE DEBILITATE EPATIS.

Cap. XCII.

Quamuis Rasis de debilitate epatis ex-
plicitè non loquatur, tñ pro complemē-
to doctrinæ decreui de ea facere capitū-
lum cum pluribus contingat, & sit frequē-
ter causa reliquarum ægritudinū eius. Debilitas epa-
tis descriptiue est eius impotentia ad suas perficiendū
operationes, & propriè digestiua absque manifesta
causa ex apostemate, solutione continui in eo, & simi-
libus causis ualde manifestis dicitur autē propriè di-
gestiue, quia licet epar debilitatum secundum attra-
ctionem, retentionem, aut expulsiuā debeat dici debile,
tamen nomen debilitatis importat debilitatem prin-
cipalis operationis eius quæ est digestio, cui ceteræ
subseruiunt, dicitur absq; manifesta causa, quia si ad ef-
fer aliquam manifesta causa, sicut apostema, solutio cō-
tinui, & similes. Ab illis dispositio sua sumpsit de-
nominationem, & non à nomine accidentis quod est
debilitas, sequens tamen aliquam eius ægritudinem
aut neutralitatem, sicut etiā cōualecentem ex febre,
dicitur debile & non febrilem. Quādo ergo epar
est neutrum cōualecentiæ, aut decidentiæ sicut esset
neutralitas cōplexionis, compositionis, unitatis aut
apostem. aut ægrotaret ægritudine difficulter cognō-
scibili, diceremus ipsum esse debile, non denominan-
do ipsum ab aliqua tali ægritudine aut neutralitate.
Cum quælibet talis sit immanifesta, propterea Gale-
nus, in interiorum, 7. cap. inquit. Epaticus, id est, debi-
lus secundum epar. Est ille in cuius epatis operationi-
bus est debilitas absq; manifesta ex apostemate aut
dubelari, id est, ulcere uel apostemate maturato, licet
tanquam debilitas epatis sequatur eius ægritudines
rei. Licet aliter posset describi quod est diminutio aut
corruptio unius aut plurium operationū eius, & pro-
priè digestiue absq; manifesta causa.

Species debilitatis epatis quædam est noua, quæ-
dā est antiqua, quædam remissa, quædam intensa.
Item quandoq; est debilitas unius uirtutis tantum,
quandocq; plurium aut omnium. Et plurimum qui-
dem debilitatur attractiua ex frigore, retentiua ex hu-
miditate, expulsiua ex siccitate.

Causæ quædam sunt primitiue, quædam per cōmu-
nitatem, quædam per essentiam. Primitiue extraneæ
sunt sicut percussio, casus & offensio super epare, item

læsio à rebus uenenosis, & similes. Nō extraneæ sunt
quæ sumuntur à rebus non naturalibus indebitè ap-
plicitis. Per communitatem uerò, aut à toto sicut in
febris, aut à membris particularibus ipsi cōtiguus,
sicut Kyrtis fellis, quando non trahit cholera ab epa-
te, aut propter oppilationem aut debilitatē, aut quan-
do esset ea præter modum repleta epar superflue cale-
faciens. Aut à splene quando non trahit melancholia
ex causis eisdem, aut quando esset præter modū
ipse repletus, epar superflue in frigidās. Aut à renibus
& uescis, quando non trahunt aquositatem ex simili-
bus causis. Similiter à matrice quando propter super-
fluum fluxum menstruorum in frigidatur epar, aut
propter uehementem retentionem eorum, & corrū-
pitur per ipsam sanguis epatis, sicut etiā propter flu-
xum superfluum sanguinis hæmorrhoidalis, aut
eius retentione accidit epatis debilitas. Et simile acci-
dit in quocunque superfluo fluxu sanguinis. Ali-
quando per communitatem à stomacho communi-
cante epari chilum diminute digestum aut corruptū.

Item per communitatem ab intestinis cum lædunt
aliquo nocumento notabili. Et quando accidit inter
ea & inter se propter multitudinem phlegmatis uis-
cosi existentis in eis aut in uis inter ea & fel oppilatio
& nō mūdificatur cholera ab epare & intestina rema-
nent plena fecibus, quare non recipiunt illud quod
uadit ad ea ex sanguine & alijs humoribus. Et hoc
multoties accidit in colica, & aliquando propter
communitatem membrorum pectoris, quibus pro-
pter uicinritatem & maximam colligantiam epar fa-
cile compatitur. Et breuiter per communitatem à
quocunque membro potente epar notabiliter læde-
re. Aliquando uerò causæ sunt per essentiam in epa-
te propter malam complexionem cuiuscunque ge-
neris cum materia aut sine materia, aut propter apo-
stema sanguineum, erysipelas, sephiros & cancerum
aut undimiam, id est, apostema phlegmaticum mol-
le, aut propter solutionem continui cum sanie aut si-
ne sanie, aut propter putrefactionem accidentem ei,
aut propter oppilationem, de qua erit sequens capi-
tulum aut exitum sanguinis superfluum ex eo propter ru-
pturam uenæ aut causam aliam.

Signa sumuntur ex multis. Primo ex colore, quia
color citrinus significat caliditatem epatis, & color
albus, pallidus ipsius frigiditatem. Et uiridis ob-
scurus adhuc maiorem frigiditatem quod potest esse
dupliciter, aut quia epar discrasiatum ad cal, multi-
plicat cholera citrinantem cutim, & discrasiatum
ad frig, phlegma pallefaciens cum albedine. Et di-
scrasiatum ad frigidum & siccum melancholiam per
cuius præsentiam color cutis fit uiridis obscurus, aut
forte fit color uiridis obscurus, quoniam cum domi-
nio humorum frigidorum paucificantur spiritus de-
bentes sanguinem illustrare, unde color sanguinis fit
obscurus, licet hæc mutatio coloris sanguinis etiam
possit esse per simplicem alterationem epatis absque
noua humorum generatione: est autē obscurus pro-
pter defectum spiritus naturalis debetis humores aut
cutim illustrare, & cuius color est optimus habet epar
sanum. Et quamuis Auicenna dicat quod medicus
expertus cognoscit epaticum & stomachicum per co-
lorem non egens significatione alia, credo tamen dif-
ficile esse per colorum solum distinguere inter epaticū

& stomachicum, tamen quia nocumentum stomachi frequenter facit colorem malum nocendo epati, licet possibile sit contrarium sicut in syncope per communitatem à stomacho, tamen quia colores ex defectu utriusque provenientes sunt similes, propterea ad distinguendum inter utrumque oportet considerare actiones læsas aut exeuntia utrique pertinentia, hæc tamen quæ dicta sunt de significando per colorem intelliguntur seruatis conditionibus Galen. 2. techn. quod color non sit alteratus ab aëre aut ab alijs causis extrinsecis, & quod humores non sint in interioribus occulti, ut habetur 2. commento primæ partitulae Aphorif. Verum nocumentum epatis per essentiam potius facit colorem malum, quàm nocumentum stomachi per essentiam cum nocumentum stomachi plurimum faciat colorem malum nocendo epati.

Secundum signum est sumptum ex egestionem aut urina quæ sunt sicut lotura carnis. Quæ licet significant principalius aut secundum plurimum debilitatem digestiua, quia digestiua debilis non bene transmutat chylum in sanguinem quare fit sicut lotura carnis recentis cum ipse existens albus non complete rubificetur. Possunt tamen & præcipue egestio similis loturæ carnis esse propter defectum in attractiua nõ attrahente ipsum ad centrum epatis, sed dimittit ipsum in meseraicis, quæ licet habeant aliquam uirtutem significatiuam, tamen illa est diminuta. Tercio, potest esse ex defectu retentiua non tanto tempore retinentis donec digestiua suam compleat operationem. Quarto, ex acuitate uirtutis expulsiua expellens ipsum ad intestina antequam digestiua epatis compleat eum transmutauerit. Nam ex quacunque causa acciderit hæc diminuta transmutatio chily in sanguinem natura expellit ipsum tanquam superfluum, & maxime ad intestina, quia hæc uia est sibi aptior & minoris nocuentis, potest etiam fieri urina sicut lotura carnis ex defectu digestiua epatis non bene transmutantis nec separantis aquositatem à sanguine, & propter hanc causam quandoque apparet in stomachicis. Similiter ex nocumento expulsiue expellens ad renes ante completam sanguificationem, & tertio retentiua non tantum retinentis donec digestiua perfecte sanguificauerit, & propter has causas accidit aliquando mictus sicut lotura carnis, frequentius tamen sequitur debilitatem digestiua. Et apud Auic. iste fluxus uetris lauius in fine suo permutatur ad alteram speciem, & fit in habente complexionem calidam uirulentus, id est, sicut uirulentia quæ cum albedine quadam tendit in rubedinem uel citrinitatem, deinde fit sicut sex uini partibus subtilibus resolutis, & fit sicut sanguis adultus qui tendit ad nigredinem, licet ante hunc frequenter multiplicetur solutio uentris cum cholera pura. Sed in habente lapsum ad frigidum fit post fluxum qui est sicut lotura carnis fluxus qui est sicut sanguis congelatus. Et perueniunt ambo simul ad educendum res diuersarum qualitatium & substantiarum. Sed magis in habente complexionem frigidam, calor nanque propter intensionem acuitatis suæ tribuit unam formam aduersionis agendo in passum magis uniformiter. Sed frigiditas minoris acuitatis aliquam partem magis passibilem congelando immutat dando

colorem & modum substantiæ secundum sui exigentiam. Aliam uero partem magis resistentem alterat corrumpendo eius complexionem & calorem proprium, cui postea succedit calor extraneus putrefaciens, & dat ei colorem & modum substantiæ differentis à primis. Tercium signum est dolor leuis extensus usque ad fureulas dum penetret chylus in epatem sicut in stomacho ab his quæ diligenter considerant accidentia sua, & ex his significamus debilitatem epatis absolutam & propriam digestiua. Sed signa causarum primitiuarum sumantur, ut infra. Quod enim debilitas epatis pendeat à causis primitiuis, cognoscitur ex earum præcessione, ut quia aqua frigida potata fuerit & similes, & consequentem debilitatem epatis. Et quod quandoque præcessione similes causæ, sequuta est similis debilitas. Ex regimine sex rerum in melius mutato, multotiens cile corrigitur epatis debilitas. Quod uero debilitas epatis sit per communitatem sicut in febribus cognoscitur, quia præcesserunt, & propriæ febres chronice, quæ debilitant etiam paucificando caliditatem, & non remittendo: sit enim bona digestio à caliditate naturali & aequali multiplicata in quanto. Sed illam quæ sit communitate fellis significat color ictericus, & quandoque est cum eo egestio alba, quandoque est oppilatio inter fel & intestina. Facta uero communitate splenis significatur per egritudines splenis, & per colorem in quo uincit nigredo. Stomaticha uero significatur per malitiam digestiua & nocuentem stomachi non solum presentia, sed etiam que præcesserunt. Et illa quæ est per communitatem uentris significatur per puncturam eorum, & quæ sunt illis fitatates, rugitus & per cholicam, & quæ sunt illis miliaria. Et quæ est communitate renum, aut uelice significatur per alterationem dispositionis urinae ab eo quod oportet secundum naturam, & per declinationem formæ ad malitiam, & hydropolim.

Et illam quæ fit propter membra pectoris significat malitia anhelitus, & tussis sicca, & quandoque sentit habens eam in suspensorijs epatis, aut pulmonis, aut utriusque grauitatem, aut tensionem.

Et quæ est per communitatem à matrice significatur per retentionem menstruum, aut fluxum superfluum, aut alias eius aegritudines.

Et similiter quæ est per communitatem ab hæmorrhoidibus significatur per fluxum superfluum, aut retentionem sanguinis hæmorrhoidalis.

Signa uero debilitatis epatis per essentiam sunt ut infra. Mala nanque complexio calida, frigida, humida, aut sicca, significatur per complexionem epatis naturales, facilius nanque labitur quodcumque membrum ad lapsum præter naturalem sibi similem quod ad contrarium.

Item ex præcessione regimimis cui mala complexio sequens attestatur sicut causa effectui, & quod nocetur à similibus iuuatur à contrarijs, & calida coloratur per colorem citrinum et frigida per colorem albidum, & sicca per molliorem & lenitatem, & sicca per asperitatem. Item calida multiplicat humores aduictos, frigida crassos, tardi motus, & crassos

& crassos, humidus aquosos. Signa autem oppilatio-
num apostematum solutæ continuatis sient mani-
festa in capitulis sequentibus. Sed signa debilitatis cu-
iuscunque uirtutis sunt infrascripta. Primo si digesti-
ua minuitur, sanguis existens in toto erit diminutæ
digestus, ut quia phlegmaticus sicut in hypofarco
uel aquosus sicut in ascite. Aut superflue decoctus, &
sic erit cholericus, aut adustus. Ut plurimum tamen
in ascite digestiua corrumpitur, cum multum eius qd
debet in sanguinem conuerti, conuertatur in aquo-
sitate, sed ablatio digestiue cognoscitur per exitum
chili, scilicet in quantitate in qua intrauit epar. Sed cū
eius ablatione non credo hominem longo tempore
posse uiuere, sicut nec ab q; cibo. Sed hoc signum ex
exitu chili uideo fallax cum possit sequi ad nocumē-
tum digestiue stomachi, & generaliter quādo est chi-
lus inuoluentis pro nutrimento corporis, & sic non
attrahetur ab epate & descendet. Item potest sequi
oppilationem melaicarum. Item debilitatem attra-
ctiue epatis & melaicarum. Item debilitatem con-
tentiue epatis, quare regreditur sicut intrauit, inter
quas causas huius effectus, scilicet fluxus chili produ-
ctiua, licet sit difficile distinguere, credo tamen hoc
modo distinguendum esse. Nam si prouenit ex no-
cumento stomachi, ad sunt & præcesserunt nocumen-
tum stomachi. Item chilis ille apparet male immutatus
in modo substantiæ, uel colore existens fortè diffor-
mis in partibus suis, & cum eo associatur henteria.
Si uero sequatur oppilationes melaicarum ad sunt
signa oppilationum earum causarum, de quibus in-
tra. Si sequitur debilitatem attractiue epatis ualde ci-
tur ad epar, & in hoc maxime differt à fluxu chilo-
lo sequente ablationem digestiue cum post celebratam
digestionem stomachi notabile tēpus interuenit an-
tequam egrediatur, cum oporteat ipsum ingredi e-
par, et regredi antequam fluat exterius. Si uero sequi-
tur debilitatem retentiue epatis stante bonitate dige-
stiue & attractiue cognoscitur, quia est aliquāter
immutatus uersus colorem sanguinis cum aliquāto
tempore in epate, aut melaicis moretur, in quo tē-
pore per actionem digestiue immutatur. Est & alia
differētia, quia cum aufertur digestiua apparent si-
gna frigiditatis secundum plurimum. Cum uero
ex similibus signis distinguitur inter diminutam di-
gestionem sanguinis cum aliquāto tempore in epa-
tis, & contentiue eius. Sed de his statim dicitur ube-
rius. Sed corruptio digestiue epatis & fluxus rerum
corruptarum cognoscitur, item ex generatiōe aquo-
sitate sicut in tympanite, et ex multiplicatiōe phle-
gmatis superflui, & multum distans à natura san-
guinis sicut in aliqua hypofarca, et fluxus lotius po-
test esse tamā diminuta quam à corrupta digestiōe.
Si enim sit ex chilo diminute uersio in sanguine est à di-
gestiōe, si uero sit ab aquositate sanguini
permixta cum impotentia discretiue erit à corrupta
digestiōe. Cognoscitur tamen corrupta digestiō e-
paris magis ex urina quā ex egestiōe, quia in gib-
bo sit humorum generatio, aut saltem perfectio & a-
quositas sequestratio. Cum ergo apparet urina ma-

la substantiæ confusa in qua non apparet sequestra-
tio uel hypostasis, aut quando apparet urina sangui-
nolenta non ex defectu membrorum urine significa-
tur corrupta digestiō, aut ualde diminuta. Significa-
tur etiam corrupta digestiō per sanguinē corruptū,
quia sit in putredinē uersus, aut in melancholiā per su-
perflua infrigidationē aut adustionem, sicut cū appa-
rent egestiones, sicut uini fex, & cognoscitur sanguis
corruptus in phlebotomia cum est diuersorum colo-
rum cum uiriditate quadam, sed cognoscitur eius di-
minuta digestiō in phlebotomia, quia tendit in albe-
dinem cum admixtione multi phlegmatis & aquosi-
tatis, & superflue decoctus tendit in citrinū cū nigre-
dine quadam & mixtum multæ cholæræ. Debilitas
uero siue diminutio attractiue significatur per ege-
stionē humidam lenē. Item qdō apparet urina boni
coloris & stomachus est sanus, tunc per hæc tria certē
ficatur debilitas attractiue. Item debilitas in toto &
macrefactio à paucitate sanguinis significat debilita-
tem attractiue. Retentiue uero debilitatem signifi-
cant nocumenta digestiue cui ipsa retentiua subordi-
natur, sicut penetratio sanguinis diminutæ decocti
in membra significat debilitatem retentiue, licet plus
digestiue. Item apparitio sanguinis in toto mixti cū
superfluitatibus suis, scilicet phlegmate, cholera, me-
lancholia, & aquositate, significat debilitatem reten-
tiue, ita ut sit color citrinus per choleram, albus per
phlegma, fuscus per melancholiam, & mollities per
aquositate. Et minuitur urina, quia aquositas mīt-
tatur ad totum & minuitur necessitas assellandi, quia
cholera debens iuuare expulsiuam intestinorum mīt-
tatur ad totū. Et minuitur appetitus, quia deficit ad-
uentus melancholiæ quæ excitat appetitum. Ista em̄
omnia non fiunt nisi quia non tanto tempore retine-
tur massa sanguinea in epate quod possit fieri seque-
stratio, unde aliqdō fit hydrops digestiua debilita-
ta, aut retentiua, & aliqdō fit colica fecalis, aut phle-
gmatica, quia deficit mundificatiuum intestinorum
quod est cholera. Expulsiue uero debilitatem si-
gnificamus, similiter quia sanguinis superfluitates re-
manent permixtæ sanguini, & nulla sufficienter ex-
pellitur ad locum suum. Sed corruptionem expul-
siue significamus, quando superfluitates expellun-
tur quo non debent, sicut aquositas ad stomachum,
& sic de alijs, & cum ex debilitate retentiue & expul-
siue aliquando prouenerunt similes effectus & acci-
dētia, similiter debet distinguī inter utranque per
causas suæ debilitatis, cum enim uidemus dominium
humiditatis, debemus potius credere debilitatem ex-
pulsiue iuxta dicta superius.

Sed dubitatur quare debili existente retentiua,
humores aliq; à sanguine magis expelluntur cum san-
guine ad totum quam expellantur ad loca propria,
scilicet cholera ad kistim, melancholia ad splenem, a-
quositas ad renes, cum potius deberet esse opposi-
tum kisti, & reliquis receptaculis hos humores na-
turaliter attrahentibus. Respondetur duplex
esse tempus retentionis. Vnum & primum
in quo humores generantur, aut acquirunt suas for-
mas substantiales. Secundum in quo post-
quam geniti sunt localiter separantur, & certum
est quod est difficilius retentiue his duobus tem-
poribus retinere quam primo tempore tantum.

& est facilius expulsiua totam massam humoralem expellere ad uenam chilis, & consequenter ad totum corpus quam singulos horum ad sua receptacula expellere. Quapropter in paruo tempore posset facere primum & non secundum. Est etiam possibile & forte frequenter contingens quod retentia sit ita debilis, ut non possit tanto tempore retinere, in quo ex chilo sint quatuor humores geniti secundum suas formas substantiales, sed solum acquisuerunt dispositiones quasdam diminutas facientes pro introductione sue forme, & tunc expulsiua mittit eos imperfectos ad uenam chilis, aut totum corpus. Et in utroque casu minorabitur separatio cum superfluitatibus ad loca propria. Et in utroque casu aggregabitur in corpore molities cum citrinitate ac cum albedine & nigredine permixta sicut dicit Auicenna. quia in corpore tunc est massa humoralis in qua non sunt humores actu per suas formas substantiales, sed solum sunt adepti aliquas dispositiones pro formis suis in confuso sicut in abortibus 30. dierum apparent lineationes & similitudines membrorum exteriorum licet membra non sint integre formata. Et haec quae dicta sunt intelligi debent de notabili parte ipsius massae humoralis, non de tota, quia si tota massa esset taliter imperfecta non credo uitam posse nisi paruo tempore permanere, cum nihil nutriet nisi sit aut fuerit formaliter humor. Est enim certum talem massam, si non sint humores esse chilum.

Secundum dubium, quod est deterius an operationem auferri an corrumpi uel diminui. Pro quo sciendum quod nocumenta harum operationum possumus dupliciter considerare, aut quantum ad causam producentem ea, aut quantum ad nocumenta quae relinquuntur. Si primo modo consideretur nocumentum ablationis est deterius, deinde diminutionis, ultimo corruptionis, quia ablatio, & diminutio, & proprie nutritiue & digestiue sunt a frigiditate, quae auferit omnem uirtutem si est fortis, licet frequentius attractiuam & digestiuam. Et ipsa facit maius nocumentum quam caliditas, quae est corrumpens secundum plurimum.

Si uero consideretur secundo modo nocumentum corruptionis est deterius, deinde ablationis, deinde diminutionis. Et ratio quia difficilius est rem corrupte digestam, corrigi quam nullo modo digestam, aut diminute, quia non attenditur malitia maior aut minor, nisi in quantum sunt magis aut minus remota ab hoc ut perficiantur. Et certum est quod sanguis corruptus magis distat, ut fiat bonus quam sanguis diminute, aut nullo modo digestus, et hoc modo potest esse concordia inter Auicenna, qui dixit, quod nocumentum digestionis quod est ablatio est deterius, deinde diminutio, minus uero corruptio, scilicet quantum ad causam, & inter Serapionem quarto breuiarii, primo capitulo dicentem: quod nocumentum quod est corruptio est deterius, deinde ablationis, deinde diminutionis, scilicet quantum ad posse corrigi.

Prognostica. Primum, nocumentum digestiue epatis est factiuum, aut constructiuum fere omnium agnitudinum tam materialium quam immaterialium.

Secundum. Debilitas epatis notabilis cum fuerit antiquata difficillime, aut nunquam emendatur.

Cura debilitatis epatis habet quatuor intentiones. Prima est remotio causae debilitantis ipsum. Secunda est ipsius confortatio. Tertia accidentium correctio. Quarta debitum regimen sex rerum. Prima intentio. Si causa fuerit primitiua remoue ipsam & non cum eum per ipsam epati impressum, sicut exempli gratia. Si potus aquae frigidae fuerit in causa prohibe ipsum & potet uinum.

Et similiter remoue frigiditatem epati et membris naturalibus, impressum cum calidis interioribus & exterioribus applicitis, & idem sit iudicium de reliquis causis primitiuis. Si uero debilitas epatis sit per communis nitatem a toto sicut in febribus. Cura febres secundum quod oportet, et remoue discrasiam epati impressam cum contrariis ipsum confortantibus tam proprie quae stipticitate moderatis, & aromaticitate quae gaudent spiritibus. Si uero fuerit per communis nitatem ab aliquo membro corrige illius membri dispositionem, primo euacuando & diuertendo tam ab eo quam ab epate, si quid humoris fuerit in causa. Secundo malam illius membri dispositionem corrigendo. Et tertio ipsum confortando ut fiat minera laudabilis chimii, remoue etiam nocumentum epati impressum per membrum communicans. Quod si debilitas epatis fuerit per essentiam propter malam complexionem, malam compositionem, solutam continuitatem, aut apostema remoue iuxta posse agnitudinem illam qua debilitatur. Et in summa omnia haec sunt ad perficiendum primam intentionem quae est remotio causae debilitantis epatis. Cum quibus autem haec intentio perficiatur, potest esse manifestum ex curis agnitudinis epatis positis & ponendis, nec non ex curis agnitudinum totius, et membrorum particularium quibus epas compatitur. Debilitas namque ipsarum accidens remouendum per remotionem agnitudinis facientis ipsam. Secunda intentio, scilicet epatis confortatio, quae proprie pertinet huic capitulo perficienda est cum infra scriptis. Primum est calefactio subtilis, id est, leuis ut seruetur complexio naturalis subtilis, aut spirituum, uel subtilis, id est, cum subtilibus in schistaria habetibus uirtutem penetratiuam, sicut in schistantho, cipro, croco. Secundum est aperio etiam leuis quia fere semper est timor de oppilationibus, et haec reperitur in fistis, absinthio, marrubio. Tertium est maturatio sicut in croco. Quartum lenificatio, sicut in passulis, & uino granatorum dulcium, aut meli absterfio, sicut in aqua hordei excorticati, aut meli. Sextum incisio, sicut in uino granatorum multorum & acetosorum. Septimum cum stipticis moderate, sicut in schinantho, absinthio, ros. & similibus. Octauum prohibitio putrefactionis, sicut in cinnamomo, cassia lignea. Nonum excitatio, sicut in spodio. Decimum mundificatio uirus, sicut cum mele & uino subtili. Undecimum cum proprietate, sicut in spica, epate, adip, & carne limaciarum, rheubarbaro. Duodecimum cum amicitia currente intere par & medicinas propter multas causas, sicut in passulis. Non dico tamen quod in omnibus casibus pro confirmatione epatis his omnibus indigeamus, sed haec memorata sunt, ut his utamur quae proposito nostro magis deferuiunt. Et ut sciamus uerificare receptas authorum coponentium antidota ex diuersissimis simplicibus habentibus plures, aut omnes has intentiones

Quamuis

Quamuis sit possibile quod in uno simplici plures ex his conditionibus reperiantur, ut patet habenti notitiam simplicium.

Præter hoc esto memor pro confortatione epatis multum attendere confortationi spirituum ipsos multiplicando. Et omnibus nouem modis ipsos confortando, de quibus fuit sermo in capitulo de melancholia. Ipsi enim sunt cuiuscunque uirtutis instrumentum ad suas perficiendas operationes.

Item præter hæc esto memor diligenter considerare, quæ uirtus sit læsa principaliter, & ipsius confortationi magis attendere, & propriè digestiue, cui reliquæ subseruiunt. Attractiua enim confortatur calido & sicco, retentiua frigido & sicco. Digestiua calido & humido, aut cum temperamento passiuarum. Expulsiua calido & humido, licet magis humido quæ calido. Et digestiua magis calido quam humido, & quæ temperamento passiuarum. Retentiua uero magis sicco quam frigido, & attractiua magis calido quæ sicco. His ergo utere quæ tuo proposito deferuiant secundum exigentiã uirtutis læsæ.

Ultimo non solum attende confortationi epatis. Sed eorum membrorum quæ debent trahere superfluitates ab epate, quæ sunt renes, splen, & ystis, fellis, & intestina, licet ipsa non ita immediate epati deferuiant, sicut reliqua tria.

Sed superest ut ponamus quædam antidota iuuantia in confortatione epatis. Excellēs in causa frigida est diagalanga, descriptione Mesue. Et diarrhodon abbas in causa calida. Ex syrupis in causa frigida, syrupus de absinthio, syrupus acetosus. Sed in causa calida, syrupus bizantinus. Ex trochiscis in causa frigida, trochisci deligno aloës, trochisci de rheubarbaro, sed in causa calida, trochisci de sandalis, de berberis.

Et Rasis in capitulo de dolore epatis, describit medicinas elegantissimas in confortatione epatis tam in causa calida quam in frigida.

Auicenna uero describit medicamen acceptum à Gal. multum in debilitate epatis laudatum. R. passulorum enucleatarum, aur. 25. croci aur. 1. calami aromatici aur. 2. bdellij iudaici aur. 2. s. cinamomi aur. 1. cassiæ lignæ medietatem aurci, spicæ aur. 3. schinanthi aur. 2. s. myrrhæ aur. 4. gummi alborin aur. 4. co cuius ponitur zylocaracta, mellis aur. 16. uini sublimis quantum sufficit, & quandoque ponimus in ipso opium, & semen hyoscyami albi, scilicet cum adfuerit signa superfluitatis, & hanc receptam uelificat Auic. in textu Gal.

Electuarium ualens in causa frigida mirabiliter confortans epat. & mundificans canales eius, & urinam promouens. R. ligni aloës, rosarum, spicæ nardi, cinamomi an. 3. 2. lacce, rheubarbari, gariopholi, an. 3. s. alari, anisi, maioranæ, mastichis, gummi, balsami, ethyos, culcuræ, an. 3. 2. confice cum syrupo de ligno aloës.

Euaporatio in causa frigida. R. cinamomi, cassiæ lignæ, ana 3. s. spicæ 3. s. absinthij, euaporatio in uenis eius per quas transit nutrimentum totum commune, quædam in poris, siue meatibus per quos superfluitates expelluntur.

Causæ primæ apud Auicennam est crassities sanguinis, qui nutrit epat, aut debilitas expulsiuæ cum uehementia attractiue eius, quapropter neque superfluitates

endiuia M. 1. sandal. alb. & rub. spodij, an. 3. 2. cuscute, absinthij, ana 3. s. bulliant in aqua ros. in qua sit quarta pars uini granatorum, aut parum aceti, et fiat euaporatio ut supra, sed ubi est fortis caliditas, melius est ut sit actu frigida.

Vnguentum in causa frigida. R. suc. eupatorij 3. duas, spicæ 3. duas, olei de spica, 3. duos, bulliant ad consumptionem succi, & addendo spicam in fine cum paucis aceti, & cera sufficienti fiat unguentum. Sed in causa calida. R. sandalorum alborum & rubeorum, spodij, an. 3. 1. spicæ, 3. 1. succi endiuia, olei ros. ana 3. 1. bulliant succus et oleum ad consumptionem succi, & cum paucis aceti, & cera sufficienti fiat unguentum.

Multæ alię medicine sunt ad hanc intentionem, quas causa breuitatis omitto. Medicine tamē Rasis in capitulo de dolore epatis sunt præstantissimæ.

Attende tamen præcepta Auic. in proprio capitulo de debilitate epatis.

Nam cum uides debilitari digestiuam, conforta cum eis in quibus est stipticitas & caliditas cum mensura, id est, non excessiua & aromaticitate, & sit in eis maturatio, sicut sunt medicinae compositæ ex eis quæ sunt sicut spica, folium, nux muscata, coriandrum, cardamomum mastix, calamus aromaticus, cyperi, & similia. Et si fuerit proueniens à retentiua adde de stipticitate, & minue de caliditate, aut conforta huiusmodi medicinas cum medicinis oppositis eis cum in frigidatiuis, sicut sunt balauftiæ, rosæ, & hypocisthis, & si fuerit debilitas in attractiua, conforta cum eis in quibus est stipticitas parua, tanta scilicet quod uirtutem epatis conferuet, & sit in eis caliditas & aromaticitas, & stude in aperitione oppilationum. Et si fuerit debilitas in expulsiua conforta cum calefacientibus, & humectantibus aromaticis, & calefac splenem, renes, & uiscera cum sibi proprijs, & aperis poros siue meatus per quos superfluitas ad hæc membra expelluntur. Et quia cuiuscunque uirtutis debilitas potest ab omni mala complexione contingere est necessarium ut magis consideres malitiam complexionis lædētis uirtutem quam uirtutis lesionem, cum oporteat uirtutem confortare per remotionem causæ lædētis. Vnde oportet aliquando digestiuam & attractiuam confortare cum in frigidantibus, licet secū dum plurimum debilitentur à frigore. Et passulæ confortant in debilitate epatis ita ut prohibeant solutionem uentris similem aquæ carnis.

DE OPPILATIONE EPATIS.

Cap. XCIII.

OPPILATIO epatis est morbus in uis eius prohibens transitū humiditatis naturalis, aut superflue, quæ per ipsum naturaliter transire consuevit.

Est triplex, quædam in poris substantiæ eius per quos transit nutrimentum ipsi proprium, quædam in uenis eius per quas transit nutrimentum totum commune, quædam in poris, siue meatibus per quos superfluitates expelluntur.

Causæ primæ apud Auicennam est crassities sanguinis, qui nutrit epat, aut debilitas expulsiuæ cum uehementia attractiue eius, quapropter neque superfluitates

perfluitates epatis quæ resecantur in digestionem quæta, sufficienter expelluntur, & nutrimentum proprium attrahitur indigestum.

Causæ autem remotiores sunt cibi præbentes nutrimentum crassum, & quæcunque possunt debilitare expulsiuam, & fortificare attractiuam.

Causæ autem oppilationis quæ est in uenis sunt quia creatæ sunt strictæ, aut inuolutæ à generatione. Vnde ex omni parua re oppilantur. Aut quia sunt ex tempore constrictæ, & secundum plurimum rami portæ oppilantur, quoniam materia oppillans peruenit ad ipsos, primo per illud quod tollitur à ramis ipsius in ramos uenæ chilæ sibi obuiantes, quapropter sex in ipsis relinquunt ipsos oppillans, propterea plurimum oppilationum est in latere concauo, licet etiam quandoque fiant in gibbo, & oppilationes istæ quæ sunt in uenis epatis, aut sunt coartatorig ab humore multo crasso, aut uiscoso genito, ex cibis sibi proportionalibus concurrere debilitate digestiua, & expulsiuæ alicuius complexionis malitiæ insequente, cibi autem isti sunt, sicut carnes crassæ, & res quæ comeduntur in appetitu corrupto, sicut carbones, gysum, & similia non proportionata humanæ speciei, item sicut fungi & quedam genera pororum nutrimenti crassi, & sicut zarror, id est, forbæ, & similia. Aliquando istæ oppilationes sunt attenuatorig sequentes apostema, uentositatem, aut qualratem constrictiuam.

Carnosæ uero nunquam aut rarissimæ sunt, quia orificia uenarum sunt neruosa, super quorum substantia nihil tale generatur, & si super aliquo oritur non communicatur omnibus, aut pluribus, & iam dictum est in dispositionibus pulmonis quod res quæ sunt crassæ & oppillantes epas, non oppillant membra quæ sunt post epas cum digerunt in epate, sicut frumentum conglutinofum, & uini dulce, & similia.

Oppilationes autem quæ sunt in meatibus expulsiuæ superfluitatum dicuntur cum agemus de dispositionibus fellis, & splenis, ipsæ tamen à consimilibus causis proueniunt, & sunt triplices, coartatorig, attenuatorig, & carnosæ, sicut præcedentes.

Signa oppilationis in epate sunt. Primum color citrinus, uel pallidus in toto corpore, quoniam sanguis bonus in quantitate sufficiens ad corporis superficiem non accedit, sed subtile potius aquositate, uel cholæræ mixtum attrahentibus membris inanitis. Secundum est grauitas in hypochondrio dextro, tunc propter materiam oppillantem, tum propter materiam ex oppilationem retentam, imò apud Auicennam secunda primi est maior grauitas in oppilationem quàm in apostemate, quod uerificatur si oppilatio sit magna, aut in uis transitus humorum & superfluitatum, apostema uero nec humorum, nec superfluitatum transitum est impediens. Sed ubi cætera sunt paria ex parte quantitatis & loci ac reliquorum credo maiorem esse grauitatem in apostemate quàm in oppilationem, cum cæteris paribus materia sit magis in apostemate in uno loco collecta, & sit magis grauitas. Tertium est impedimentum anhelitus, & propriè cum dilatatur propter compressionem diaphragmatis ab epate oppilato et ipsius tractionem inferius. Quod maxime uerificatur cum oppilatio est in gibbo, hæc tamen signa sunt communia apostemati epas

tis & oppilationi inter quæ febris distinguit, quæ necessario associatur apostemati epatis, & non oppilationi.

Quartum signum est fluxus uentris ex materia crassæ regurgitatione, oppilationem sibi transitum impediens, & urina multitudine et subtiliatur propter subtile aqueum multiplicatum ex indigestione, penes trans, epate pellente, et membris attrahentibus si epatis & totius corporis ariditas non obstat.

Sed signa distinctiua inter oppilationem pororum transitus nutrimenti proprii & oppilationem uenarum sunt, quia in oppilationem uenarum prædicta signa sequuntur à principio & corporis consumptio, sed in oppilationem pororum transitus nutrimenti illa non sunt à principio, sed apparent in principio multiplicationis sanguinis in uenis, & color rubeus in cute, quia sanguis non accedit ad nutriendum epas. Sed si oppilatio esset in poris, siue uis purgatiuæ superfluitatum ab epate, scilicet in uis purgationis cholæræ ab epate ad kystim fellis, & melancholiæ ad splenem appareret in sanguine multiplicatio cholæræ & melancholiæ cum colore citrino nigro, aut mixto in cute. Sed de his uberius agatur in sequentibus.

Signa uero distinctiua inter oppilationem uenæ chilæ, aut ramorum eius, & oppilationem uenæ portæ, & ramorum eius sunt, quia oppilationem uenæ chilæ & ramorum eius sequitur fluxus uentris sanguinis, et humorum iam generatorum in porta, siue concauo epatis, non potentium penetrare ad ambitum oppilationem chilæ transitum impediens ad ambitum totius, & propriè quantum ad partem eorum crassioris. Quare regurgitat ad portam, deinde per meleraias ad intestina, & sic urina subtilis multiplicationis cum tinctura propter debilitatem digestionis epatis multiplicantis aquositatem, & propter transitu subtilis partis sanguinis & aquositate non bene à sanguine differet membris trahentibus.

Crassities quoque ac durities hypochondri dextri est sensui manifesta. Sed oppilationem existentem in porta et ramis eius sit fluxus chilosus, aut humorum diminuitur digestorum, nam si sit oppilatio in meleraiis, quæ sunt rami uenæ portæ terminatæ ad intestina sit fluxus materiae chilosæ, si uero sit in porta, & ramis eius contentis in epate sit fluxus humorum diminutè digestorum, et aliquando sicut lotura carnis parit ualde diminute decocto, & aliquando fluxus partim chilosus, partim humoralis, & non apparet crassities, aut tensio sensui manifesta in hypochondrio dextro. Signa autem distinctiua inter oppilationem portæ, & ramorum eius, & debilitatem ipsius epatis, quamuis conueniunt fluxu chilofo manifestum sunt ex capitulo præcedente. Quod autem oppilatio sit coartatoria à multitudine humorum cognoscitur ex signis plethoricis, de quibus 2. primi, additis signis generalibus oppilationis superscriptis.

Quod uero pædeat ab humore crasso, aut uiscoso, cognoscitur ex signis cacochimicis, de quibus 2. primi, additis signis oppilationis superscriptis. Item cognoscitur ex regimine præcedenti, & malitia digestionis, ex quibus si multiplicet uentositas apparebit crassities, & tunc augeri aut minui subito uel in breui. Si uero non tunc augeri & crassities permanebit æquales, ad quod semper tunc & crassities apparebit, & mixtio humorum in ægestionibus, uel urinis apparens, si uero oppila-

do est attenuatoria, ut quia uis epatis creatæ fuerunt stricte, cognoscit ex diuturnitate passiois, et à principio generationis contractæ cū fortitudine retentius, & debilitate expulsiuæ. Si uero oppilatio attenuatoria sequat apostema, aut aliā cām uis attenuantē siue corporea siue incorporea illos: signa apparebūt, de quibus infra. Si uero oppilatio fuerit carnosa, ex pustula, bothor, uel uerruca oppilatio nō erit uniuersalis, imō in paucis uenis, et sic signa oppilationis erit debilia. Et cum hoc cura parum proderit, aut nihil, si fuerit à ueruca aut carne addita.

Prognostica. Primum. Oppilationes epatis sunt matres omnium egritudinū. Secundum. Cum prolongatur difficilis, aut impossibilis est curatio et multoties perducunt ad putrefactiones facientes accide- res, aut apostemata perducta ad hydropisim. Et ad generationem uentositatis facietis accidere do- lores prauros. Tertium Multoties confortatur natu- ra ad expellendas materias oppilationum seipsa uel arte. Et egrediuntur aut in egestionem, si fuerit oppila- tio in lacere concauo, aut in urina si fuerit oppilatio in lacere gibboso, humores permixti crassi, & solui- tione contracta non recipit curam, preferuari tamen possit qui hāc patitur cum bono regimine ab incur- su egritudinū quæ oppilationes sequi consueuerunt. Accidentalē uero noua scd̄m plurimū facile curat.

Cura oppilationum epatis exigit quatuor intenti- ones. Prima causam oppilantem epar remouet. Se- cunda ipsum confortat. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat debitum regimen sex rerum.

Prima intentio perficitur secundum diuersitatem causæ oppilantis. Si ergo oppilatio fuerit à multitu- dine, euacua aut cum phlebotomia, si sanguis fuerit uicinus, aut alij humores peccauerint cum sanguine. Quæ phlebotomia fiat à uena cōmuni, repletioe exi- stente in toto, aut à saphenis. Si in causa fuerit reten- tio sanguis menstrualis, aut hemorrhoidalis, postea phlebotometur basilica, aut saluatella dextra. Si ue- ro repletio non fuerit cōmunis, sed propria epati suf- ficit phlebotomia solius basilicæ, aut saluatellæ, po- stea alij humores euacuentur secundum quod oportet. Si uero causa oppilationis fuerit humor crassus, et uiscosus, prius digere, deinde euacua. Digestiua au- tem in primis sint incisuiua, absterfuiua, subtiliatiua ab- sequē magna aperiōne, aut prouocatione, postea sint magis aperiuiua. Euacuatio autem fiat cum solutiuis si oppilatio fuerit in concauo. Si uero in gibbo cum diureticis, & fortiter aperiētibus. Digestiua autem conuenientia à principio sunt, sicut syrup. acerosus simplex, saccharinus, aut melinus cum aquis endi- uis, aut absinthij, aut similibus pauce aperiōnis. De- inde in processu cū syrupo aceroso composito, mel- lino, aut saccharino, oximelle, scyllitico, & aquis cu- ratis, capilli uen. asari, rubæ, & similibus calidis & frigidis, aut propinquis æqualitati secundum exigē- tiam. Pro quo sciendum est quod medicinæ aperi- tiuæ, quædam sunt simplices, quædam compositæ, & utrunq; quædā frigida, quædā calida, quædam aqua- litati uicinæ. Frigida quædā sunt sicut endiuiā hortu- lana, & campestris, quæ est taraxacon, & aqua plan- taginis cum solijs & radicibus suis, & omnia prouo- cantia cum infrigidatione, sicut semina communia

frigida, quibus utendum est in oppilationē cum cali- ditate. Et ex compositis, syrup. bizantinus, syrupus acerosus compositus, licet forte conuenientius inter æqualitati propinqua possent numerari. Calida ue- rò sunt diuretica fortia, ut asarum, tapfia, petroseli- num, aristolochia, rubea tinctorum, iris, fistici, agari- cus, epithymus, scylla, polium, spica, centaurea mi- nor, et succus eius, gentiana. Et ex compositis syrup. acerosus cum rubea et melle, oximel scylliticum, oxi- mel compositum, & hæc sunt supra caliditatem pri- mi gradus temperatæ autem uicinæ temperamento sunt, lupuli, lacca, cuscute, capil. uen. & sunt ambo a- peritiua ualde cum æqualitate ualentia, tam in oppi- latione cum caliditate quam cum frigiditate. Sed cali- dæ circa primum gradum quæ sunt proximè im- mediata supra scriptis, sunt rhubarbarum, absinthi- um, eupatorium, cimæ schinanthi, amygdalæ ama- re, succus fenic. chamæpithie, & proprie quando op- pilatio esset in uis stricte, acetum scylliticum, aspara- gi, & similes. Et ualent in oppilationē frigida cum ui- no, aut aqua seminum calidorum. Et in calida cum aqua endiuiæ, cuscute, quæ proprie aperit oppilati- ones splenis. Item cum decoctione seminum frigido- rum communium, uel etiam sine his. Non enim cu- rādum est de inflammatione cum iuuamentum aperi- tionis præualeat nocimento quod efficit earum ca- lor inflammando, eo quod ad extinguendum est fa- cilis post aperiōnem. Et nota quod medicinæ supra scriptæ non solum ualent sumptæ interius, sed etiam exterius applicitæ secundum opportunitatem.

Et multas medicinas compositas inuenies in antido- tarijs huic proposito deseruiētes calidas, frigidas, et temperatas ex genere decoctionum, syruporum, ele- ctuariorum, trochiscorum, unguentorum, et similitū quibus utere secundū necessitatem, & multas tuapte cōponere potes. Si uero oppilatio esset attenuatoria à generatione contracta, urputa naturalis stricte uenarum curam non habet. Cauēdum tamen est ab- his quæ possunt esse causa alterius accidentalē oppi- lationis. Sed cura oppilationis attenuatoriæ sequens alicuius cōplexionis malitiā patere potest ex cap. præce- denti. Cura uero oppilationis sequētis apostema epatis manifesta erit ex cap. sequenti. De cura aut oppilati- onum existentium in meatibus expulsiōis superfluitatū agatur in cap. de histeria, & de dolore splenis.

Secunda uero intentio, s. epatis confortatio perficitur cum medicinis dictis in cap. præcedenti, cauendo in- à multum stipticis, aut uiscosis, & omnibus quæ pos- sent oppilationē renouare, aut augere.

Tertia intentio, scilicet correctio accidentium per- ficitur curando, & præseruando ab omnibus agritu- dinibus, quarum oppilatio epatis potest esse causa, hæc autem sunt plurimæ, quarum curam perquire in capitulo præcedenti, & sequenti. Sed pro qua- ta intentione cauēdum est à superflue stipticis, pon- ticis, uiscosis, & multum dulcibus & præbentibus nu- trimentum crassum, & frequenter utendum est incisi- uis, subtiliantibus, abstergentibus, et summo pere la- borandum est, ut fiat bona digestio tam in prima q̄p̄ secūda. Quapropter utatur his quæ bene potest di- gerere, et non superfluat in quantitate. Nec comedat nisi præcedentis cibi digestionē celebrata. Non multiplicet cibaria in mēsa una, Surgat à mēsa cū re- liquis

liquis famis. Primo nota biliter comedat antequam bibat, deinde frequenter bibat, & parum pro uice. Caueat ab aqua frigida, & cibis, & potibus, actu aut potentia ualde frigidis. Somnus sit septem horarum aut circa, ut fiat bona digestio, & sit nocturnus, meridianus uitandus est, nisi forte à medio Maij usq; ad medium Augusti dormiat per horam in meridie.

Procurete euacuationes à natura institutas. Post cibum quiescat & exercetur perfecta prima digestione, & sit sperans & gaudens, & fugiat sollicitudinem, tristitiam, timorem, iram, & similia corpus exterminantia. Et sit indutus uestibus mediocriter calidis secundum temporum exigentiam.

DE APOSTEMATE EPATIS.

Cap. XCV.

Apostema epatis, quantum ad quid nominis, & quid rei est satis manifestum. Sed pro notitia specierum est sciendum quod apostematum quæ accidunt in regione epatis, quædam accidunt in ipso epate, quædam in lacertis positæ super epar, quædam accidunt in meseraicis & mesenterio. Sed eorum quæ accidunt in epate, quædam accidunt in partibus superioribus eius, scilicet in gibbo, quædam in partibus inferioribus, scilicet in concauo. Item quædam accidunt in suspensorijs & panniculis eius, quædam in uenis eius, quædam in ipsius substantia. Plures tamen accidunt in ipsius substantia, & quandoq; comunicant pluribus partib; simul.

Distinguntur præterea ex partæ materiæ effectiue concurrentis ad ipsorum generationem. Nam aliquod est sanguineum, siue phlegmonides dubelati aut non dubelati, id est, colligens & non colligens, quoddam est cholericum, quoddam est phlegmaticum, quoddam melancholicum factum incipiendo, aut permutando. Et melancholicum est duplex, quoddam ex melancholiâ non adusta de genere sephiros, quoddam ex melancholiâ adusta de genere cancerorum, quoddam est inflatiuum, uentosum, & frequenter apostemata epatis sunt mixta.

Causæ apostematum epatis per essentiam sunt mala complexio calida malignans humores & ipsos attrahens qui non debite regulati faciunt apostemata. Item mala complexio frigida debilitans digestiuam & expulsiuam est causa cur apostema congeratur in epate, superflua quoq; attractio epatis est causa, cur attractum non bene regulatur & faciat apostema. Oppilatio quoq; retinens humores & superfluitates est causa, cur indebite figantur in epate, præcipue opilatio in parte epatis terminata ad porum selleum qui est sub media pennula epatis. Dolores quoq; epatis frequenter causant apostema attrahendo materiam ad locum dolentem, & sit apost. per uiam defluxus, aliquando debilitando sunt causa, ut apostema paulatim congeratur. Per communitatem uero aut à kisti fellis cum oppilatur, aut aliter efficitur impotens ad expellendum cholera per meatus convenientes underegurgitans ad epar est causa apostematis. Similiter per communitatem ad splenem cum oppilatur, aut apostematur, & similiter cum oppilatur uia deferens melancholiâ ad splenem. Item per communitatem ad stomachum cum læditur, & maxime secundum digestiuam, unde non præparatur chylus epati

conueniens, ut inde sanguis & humores laudabiles fiant. Item per communitatem à membris spiritalibus, intestinis, renibus, matrice, maxime in retentione mestrui. Et per communitatem ab ano cum retinetur sanguis hæmorrhoidalis. Causæ autem primitiuæ sunt casus, percussio, offensio epatis. Item cibi superflue calidi, aut frigidi, crassi, uiscoli, & quæcunq; possunt epar lædere. Apostemata epatis terminantur quadrupliciter. Aut enim resoluuntur. Aut suppurantur. Aut indurantur. Aut permutantur & si permutentur ad membra ignobilia, sicut ad splenem est bonum, & contra, si permutentur ad magis nobilia, malum. Et quandoque critice expelluntur, aut cum sudore, prouocatione urinae, aut fluxu sanguinis, cum est in gibbo, et si est in concauo facit crislum cum sudore, uomitu, aut solutione uentris.

Signa. Primo ponam signa distinctiua inter apostema epatis & pleuresim, licet in multis mendolosa sint, & proprie cum pleuresi est in costis mendolosa teris dextri. Primum est ex parte doloris, quia in pleuresi dolor est sub costis uersus pulmonem, in apostema epatis infra costas uersus ancham. Secundum in apostema epatis non est sputum cum tussi in principio, neq; in processu. Sed in pleuresi est sputum cum tussi saltem in processu. Tertium, in pleuresi est pulsus ferrinus, in apostema epatis undosus. Quartum, in pleuresi est dolor pungitius satis intensus, in apostema epatis est dolor grauius, id est, remissus nisi causa doloris sit in panniculo. Quintum, in pleuresi est magna anhelitus malitia, sed in apostema epatis est nulla aut pauca. Sextum in apostema epatis est color multum à naturali mutatus, in pleuresi parum aut nihil. Signa uero distinctiua inter apostema epatis & apostema epatis sunt. Quia tumor in apostema epatis nisi cum magna compressione, est enim apostema mirach, leui compressione sentitur, sed apostema epatis nisi cum magna compressione, est enim apostema mirach, in profundo. Item tumor in apostema epatis minimè, nisi forte esset in gibbo, & maxime quantitas, plerumque subiacet uisui. Sed in apostema epatis titatis & in macilento. Tertium ex parte figure, nam lacertus apostematus est longitudinalis, latitudinalis, aut transversalis, & apostema est illius figure, incedens secundum situm musculi, & alsimilatur caudæ muris, cuius una pars est subtilis, altera crassa, sic enim est figura lacerti, est enim crassior in origine sua quam uersus medium uentris. Sed apostema epatis est lunare habens figuram semicirculi aut maiorem, sic enim est figura epatis. Quartum apostema multo li nō facit accidentia ex siti, febre, alteratione coloris aut formæ quæ sequuntur ad apostema epatis. Quintum, cum uides mirach extenuari & tendere in fuscum iudica quod apostema est in epate, hæc enim sequuntur defectum nutrimenti, qui non firmi ex nocumento epatis. Est tamen sciendum huiusmodi apostemata mirach, quandoq; facere hydroperum di apostemata mirach, quandoq; facere hydroperum, nocendo epati, maxime quado sunt in parte mirach, superposita epati propter compressionem uicinatæ tem & colligantiam. Distinguitur autem apostema epatis, ab apostema meseraicarum, licet in signis multum communicent, scilicet febre, grauitate, dolore & similibus, quia apostema meseraicarum est cum minori febre, minori grauitate, & sequitur ad ipsum fluxus chilosus secundum plurimum, quod nō sequitur

ad apostema epatis, & ad ipsum est magis apta sequi extenuatio quam cacexia, aut hydrops quæ frequenter sequuntur apostema epatis. Nec tactui subiacet, sicut apostema epatis. Signa uero apostematis epatis sunt infra scripta. Primum grauitas notabilis in apostemate epatis, & maior quam in oppilatione cæteris paribus, licet in oppilatione magna possit esse maior grauitas quàm in apostemate paruo, sicut uoluit Aui. secunda primi. Secundum dolor multo maior in apostemate epatis quam in oppilatione ratione solutio nis cõtinui, quæ est in apostemate et nõ in oppilatione

Tertium signum est mutatio forme & coloris ualde notabilis, non enim stat bonus color sine præsentia boni sanguinis, cuius defectus sequitur ad apostema epatis. Minus tamen mala mutatio est in phlegmone epatis, imò aliquando uidetur habitudo & color factus bonus propter sanguinis inflammationem facientem faciem rubere. Attamen si bene notabitur uidebitur notabiliter mutata in uiuiditate oculorum & in forma, & si forte tanta mutatio nõ appareat à principio parum post apparebit. Quartum signum est attractio fuscule & humeri dextri ad inferiora, quia epar grauitans trahit suspensorium alligatum dorso. Quintum, quia habentes apostema magnum, & proprie per latere dextro, quia epar cõprimuntur à stomacho et ab intestinis, nec possunt iacere super sinistro, quia epar grauitat, imò etiam grauat eos situs resupinus, licet minus cæteris. Signa uero distinctiua inter apostema gibbi, aut concaui sunt. Quia tactus inuenit ipsum cõprimendo in extremitate costarum hypochondri dextri cum est in gibbo, non aut cum est in concauo nisi forte in macilento habente apostema magnum & cum forti cõpressione.

Secundo inuenitur maior grauitas in apostemate gibbi quam concaui, tñ quia epar per gibbū apprehenditur, tum quia concauum stomacho suscitatur. Tertio in apostemate gibbi est constrictio anhelitus, quia gibbus apostematus cõprimendo diaphragma & pulmonem facit tussim siccam, quæ non accidit in apostemate concaui. Quarto minoratur urina in apostemate gibbi, imò cum est magnum aliquando retinetur propter oppilationem attenuatoriam sequeutem ipsum, & aliquando propter debilitatem expulsiuæ. Sed hoc non accidit in apostemate concaui, sed contra in apostemate concaui adsunt aliqua accidentia quæ deficiunt in apostemate gibbi. Præter colligantiam oris stomachi in cõcauo epatis mediante neruo subtili. Secundum, dolor magnus etiam sumitur cibus notabilis, uel aliter stomachus extenditur, quia stomachus extensus cõprimuntur apostema epatis, et non gibbum. Et in summa per epar apostema concaui stomachus multum leditur, & econtra apostema gibbi multum leduntur spiritalia est in gibbo & concauo apparent omnia accidentia super scripta, et si apostema est in pãiculo, est dolor uementior et trahit humeri deorsum plus & maxime si est in suspensorio. Signa uero specierum apostematis epatis distinctarum penes materiam, efficiuntur ipsa sunt infra scripta. Si apostema sit choleicum dictum almelet parua est grauitas, & par-

uus tumor, sed inflammatio & mordicatio magna. Item citrinitas linguæ, deinde denigratio cū alperitate, et est febris fortis, continua exacerbans, de tertio in tertium. Et pulsus est durus, magis ferrinus quam undosus multum uelox & frequens, sed non ualde magnus. Sitis intensa & iuuatur à frigidis & humidis. Si uero fuerit apostema sanguineum dictum phlegmon significatur per rubedinem faciei, & exuberationem uenarum, & pulsus est plenus, magnus uelox et frequens, magis undosus quam ferrinus. Et maior est tumor & minor grauitas. Dolor est grauius, extensius magis quæ pungitiuus. Febris cõtinua conclusa, et nõ iuuatur à ualde frigidis et humidis, sicut choleicum, sed apostema phlegmaticum significatur per inflationem quandam, & lenitatem cutis, plumbetatem coloris. Et non est in loco sensata durities, licet sit grauitas, & est pulsus leuis. Et non est fitis, neque nigredo linguæ, neque febris notabilis, sed apostema melancholicum est duplex, quoddam à melancholia adusta, et est cancer, quoddam à melancholia non adusta, & est de genere sephiros, & utrunque quod sit incipiendo, quandoque permutando ex apostemate sanguineo, aut ex alijs. Signa comunia sunt. Primum durities manifesta in loco sensata proprie si fuerit in gibbo. Secundum grauitas notabiliter. Tertium extenuatio mirach, unde manifeste representatur ipsius figura lunaris properatio ad hydropem, hypofarciam, aut ascitem. Extenuatio corporis, calus appetitus, tenebrositas coloris, aut minoratio urinae. Signa uero distinguunt inter sephiros et cancerum sunt, quia in cancro est febris notabilis in sephiros remissa. In cancro dolor notabilis, proprie fulmineus, in sephiros nullus si sit purum, si uero nõ purum etiam nõ est dolor, nisi leuis apud magnum motum corporis aut fortem compressionem super locum apostematum, aut cum stomachus est plenus cibo cõprimens ipsum, & in summa omnia accidentia sunt fortiora, in cancro, sicut inquietudo, calus appetitus, singultus, nausea, maior extenuatio, et similia. Signa uero quod fiant incipiendo sunt, quia non præcessit apostema alterius speciei, sed solum aliqua causa primitiua, aut corporea non de genere apostematatis. Quod uero fiat permutando econtra cognoscitur quia præcessit apostema alterius speciei & maxime sanguineum, illud enim inter cætera facile permutatur in duritiem, & lapideitatem, et proprie cum in fine applicantur super eo notabiliter frigida & stiptica, epar namque uelociter oppilatur & induratur. Apostema uero uentosum, cognoscitur ex dolore extensiuo absque grauedine cum pauca aut nulla febre. Dispositiones quoque naturales, & non naturales sicut ætas, complexio, regimen præcedens, & similia ducunt in notitiam materie apostematatis. Nam in habentibus symbolum facilius est transitus.

DE DYBELATI EPATIS. Cap. XXVI.

DYbelati de quo est hic sermo, fit cū in apostematibus materia in uno loco colligitur, & sanatur, propterea maxime sequitur apostema sanguineum, cum illud inter cætera maxime maturationi paratum sit. Signa future maturationis sunt quia auxilia debite facta non proficiunt, imò accedunt, sicut febris, dolor grauis, fitis,

G

leuiolaceo, quibus possunt addi electuaria solutua de quibus infra secundū exigentiam. Sumenda aut sunt sicut aqua endiuig in infusionis duarū 3. rheubarbari cum 1. 3. mannę aut 6. 3. cassię, & succus ros. ab sinthij, & eupatorij, uiolę, aloęs, sed sit lotus, pruna, tamarindi, mirob. Auic. uituperat. Propter stipticitatē. Electuaria aut conuenientia, cū opus est magis solvere sunt electuariū de pillio, aut de succo ros. cuius 3. s. cum suprascripta in infusione possent misceri. Ca uendū tamen est in apostematibus a uehementer sol uentibus, debilitat. n. epar & materias agitant, & am plius ad locum apostematū interdum fluere faciunt. Est igitur melior multiplicatio numeri quā quantitas. In phlegmatico aut fiat decoctio pro clysteri ex chamemila, meliloto, foeniculo, petroselino, aspara go, lupulis, cuscute, & similib. quibus possent agaricus turbith, cartamus, & similia solutua, in decoctione addi, his ē potest addi electuariū indum, hiera, sim plex, cōposita, logodiō & similia antidota solutua, secundum exigentiā. Fiant tamē in principio clyste ria leuia postea gradatim fortificentur secundum qd oportet. Sumenda aut sunt sicut pilulę de rheubarba ro, cui agaricus addi potest. Item cassia distemperata cum aqua absinthij, aut eupatorij in infusionis turbith, aut pauci sacch. Item cassia cum paucis electuarij indi & aquis suprascriptis. Itē pilulę de hiera, stomatichę, alefange. In melancholico aut fiant ex cuscute, cha medry, chamepity, steacade, agarico, sena, & folliculis eius, corticib. capparis, et ponatur in clysteribus sal indum, dialena, electuarium, hamech, et similia secū dum exigentiam. Sumenda aut sunt predicta electua ria cum cassia distemperata, cum decoctione aliquo rum ex suprascriptis, sicut cuscute, senę, epithymi, item sena solum sumpta cum aqua lactis infusionis sem. endiuig, & cuscute. Sunt etiam pilulę inde de la pida lazuli, de lapide armeno, deferuientes huic pro acerosus, syrup. f. de granatis, de endiuia, de agresta, uig, & epaticę, uiol. lupulorum, solatri, alchechengi, acerosę, portulacę, plantag. papap. & similes. Itē hu tis, in infusione infusionis specierum diarhodon abba in apostemate eparis cum sacch. sufficienti. Digestiua oximel simplex, compositum cum aqua absinthij, eupatorij & similib. digestiua uerō in apostemate melancholico à melancholia adusta, sunt syrupus bi zancinus, de pomis dulcibus, de fumo terrę, cū aqua endiuig, epaticę, & similib. frigidis & humidis. Sed in apostemate melancholico à melancholia non adu sta syrup. de eupatorio cum aqua buglossę, boragie nis, aut cum decoctione passularum, tamarisci & si milium, & elaborandum est ut euacuationes sint in tegeratę ex minoratio, digestiua, & eradicatoria, etiā secundum exigentiam. Diuersio autē iuxta supradictam intentionem fiat cum clysteribus de quib. puls. spatularum cum scarificatione aut sine. Item cum prouocatio de sanguinis menstrualis hemorrhoi dalis, aut sanguinis narium, si retentus fuerit præter consuetudinem. Item cum lotionē crurum & simi lib. Regiminis autem particularium prima ingen

tio, scilicet repercussio potest compleri per sumpta et applicita pro qua intentione debite complenda, sciendum primo quod repercussiuu & si sint magne ne cessitatis sunt tamē magni timoris, primo quia epar habet uias ualde angustas, & timor est de oppilatio ne maiori, secundo cum repercussiuu sint stiptica & materiam incuneantia, timor est de apostematis in duratione. Tercio quia prohibet resudationem mul totiens in apostematibus intrinsecis necessaria, quar to quia sunt causa retentionis cholere, quę est magna causa faciens, aut fouens apostemata calida in epare. Ex quibus inferitur. Primo quod ipsa debent esse in stipticitate remissa, licet possint esse notabiliter frigi da secundum exigentiam sui contrarij. Secundo qd nisi humor apostemans sit ualde calidus & subtilis, si cut cholera naturalis, debent esse mixta cum aperiti uis, lenitiuis uel incisiuis. Tercio quod oportet reso lutiuu citius applicare in apostematibus eparis cali dis quam in alijs apostematibus calidis aliorum mē brorū, in quibus resolutiuu sunt dominantia ualde, in medio augmenti uel in fine repercussiuu cōmisen tur, sed in his in principio augmenti debent commi sceri. In resolutiuis est timor et nocumentum. Primo quia dissoluunt uirtutem & substantiam eparis, quę est sanguis coagulatus. Item apostema lapideat & in durant resoluendo partes subtiles, quod est facile in epare, ut supra dictum est in cap. de oppilationibus. Quare oportet ut inter hoc teneatur medium quod est difficile. Et hæc sunt uerba Ga. 13. therapeu. 12. cap. hic ab Alman. posita. Sed consilium meum in tene do hoc medium, ut operemur sine errore, uel cum pauco, est ut alterum duorum faciamus, aut quod u tamur medicinis nō multum eleuatis in grad. secun dum qualitates primas, neque secundum qualitates secundas sicut est stipticas, resolutio et similes. Aut si uolumus his uti propter excellentiam sui contrarij sint aliquantulum refractę cum medicinis sibi contra rijs quas melius est non esse fermētas ut natura pos sit ipsas dirigere cōtra sua contraria. exempla autem statim ponentur. Est autem sciendum, quod stipti ca interius sumpta, magis sunt apta nocere in aposte mate concaui quam gibbi, quia citius sibi occurrūt, & cum maiori stipticitate, cum magis occurrant cum suis partibus terreis. Secundo sciendum stiptica applicando non debere esse notabiliter frigida actū, tunc. n. difficilis esset suę uirtutis penetratio, frigiditate actuali porositates obturātę, propter petiā, uel filtrū in medicinis applicandis insulū aliquādiu in manu teneat, ut illa frigiditas tepescat, sed in aposte mate frigido debent esse calidę actū non superfluę. Interius etiam sumpta debent esse actū calidā, nisi in casu excessiuę caliditatis cum subtilitate humorum, frigida aut & calida interius sumenda sunt pro parte posita cum posuimus digestiua. Tua autem inter est, uti eis tam interius quam extērius secundum can. da ros, utendo scilicet his quę non sunt ualde excessiuę, secundum qualitates primas aut secundas, aut si fue rint excessiuę refragendo ea cū cōtrarijs. Vnde si sy rup. fuerit stipticus, sicut rosaceus, de acresta, de acero sitate citri et similes refragat cū syrup. uiol. de nenu phare, aut cum aqua endiuig, nenupharis, uiol. & si milib. Similiter si aqua fuerit minus frigida sicut aqua solatri refragat cū aqua cichoreę, capil. uener. &

tionem sanie post apertionem & rupturam. Sed rarissime cum maturatioe saluatur uita, imò post apertionem quandoque citò moritur, quandoque uita aliquando tempore prolongata tandem moritur propter mèbri nobilitatē, cum cuius tanto nocumēto non potest saluari uita. Maturantur autē huiusmodi apostemata cū interius sumptis sicut lac asininū cū sacch. sumptum. Et sicut aqua decoct. radicum aperiarum, sicum, passularum, et daetylorum. Postea facta maturatione adiuuetur eruptio natura non susciente miscendo cum emplastris supra scriptis, cepe narcisi, fermentum, simum columbinum et similia, & iacendo super latere agro se uelociter mouendo. Quod si erupat fit penes Auic. eruptio aut ad intestina sanie expulsa per melaicas ad ipsa, quę eruptio accidit, quę apostema in cōcauo. Aut fit eruptio ad renes & uesicā, quę fit dū apostema est in gibbo. Aut fit eruptio ad concauitatem uentris inferioris, quę scilicet rupturatur substantia epatis & panniculus inuol dum plurimum. Ego autem nō uideo cur etiam per melaicas terminatas ad stomachum non possit esse effusio sanie ad ipsum, cum etiam uideamus sanguinem effundi ab epate ad stomachū, imò stomachus recipit superfluitates totius mediante epate. Si ergo sanies effundat ad stomachū, uel ad intestina sumat in potu aquā mellis, debitē calidam, ut fiat mundificatio stomachi & intestinorum, nec non ulceris à sanie. Et attendatur uomiui aut uentris solutioni cum renibus mūdicantibus regiones illas maximē naturā retinente euacuatiōe per easdē. Si uerò erupitur ad cōtum frigidiorū. Vbi adfit notabilis caliditas, uel et ponatur grana alchechengi ad bulliendū, dū sit aqua mellis. Si uerò esset remissa caliditas ponatur radices asparagi, apij, & similia diureticorū ad bulliendum, dū sit aqua mellis. Si uerò sanies cōtineatur in inguine, & sit notabilis cōtinitas, ut nō fit uerisimiliter resolutio, perforetur ueter ubi est sanies cauēdo sectionē musculi ita ut perforetur siphac nominatū ab Auic. burabaton. Et sit foramen parū in quo ponatur cānula pro extractiōe saniei si fuerit expediens. Et paulatim extrahatur sedm quod extrahit in extractiōe acum thure, mastiche, san. drac. bolo. arm. charabe, & endiuia, plantaginis, & similia. Et in toto curę protinē corrigitur accidentia, iuxta primā intentionē tertia aut intentio terti regiminis, sedcū quod fuerit expediens. VI. Regimen enim sex rerum non naturalium in apostematis calidis, debet esse frigidum, sed magis in cho- lericis quā in sanguineis, & in frigidis debet esse calidū, humidum in melancholicis, sicū in phlegmaticis, unde primo in cal. eligatur aer frig. uel preparat artificia- liter modis supradictis. Et huic oppositus eligatur frigidus, uel preparat cū igne & similib. Diera sit fri- gida & ualde renui, sicut aqua hordei, cum pauco iu- lepi uisari, uel sit aqua sacch. ita ut usque ad tertium nihil aliud detur nisi fortē pīlana, quę etiam conti- nuetur usque ad septimum, uel detur ius pulli parui cum acresita uel uino granatorum, donec peruenia- tur ad extremitates pullarum, et olera ut lactuca, atrī-

plices, spinachia, endiuia, et epatica. Et si opus erit pa- nis fiat ex hordeo, uel farre, aut ex farina frumenti non omnino à fursibus depurata, uinum non con- ceditur, nisi fortē pauciferum, cui aqua permixta sit sexcupla. Procedente tamen tempore & propriē cū uerum est ad declinationem dieta, magis in crassetur. Et liberius uinum concedi potest subtile non dulce. Sit quietus animo & corpore, somnus iuuat ad dige- stionem & doloris sedationem, et ratione huius debe- ret esse longus, nocet tamen attrahendo materias, eli- gatur ergo mediocris scilicet septem horarū aut cir- ca. Credo tamen minus malum esse declinare ad som- nū prolixiorē quam oportet, quā ad breuiorē quā opor- tet precipue in apostematibus calidis, in quibus mul- tum impeditur somnus. In frigidis uerò similiter die- ta debet esse subtilis, licet non tantum quantum in ca- lidis ad prohibendum augmentum, & digerendum humorem. Nam facta diminutione in humoribus non fiet tantus fluxus, sed debet esse circa temperiem aut declinans ad calidū sicut pīlana, panis lotus, quę si pręparentur cum schinantho erunt pręstantiora, postea pręparentur cum croco, passulis, & alijs dige- rentib. Venter sit potius lenis, quā strictus. Et pcurant alia euacuatiōes naturales & etiam nō naturales sibi cōsuerę sicut fluxus hemorrhoidalis & ulcus diu cō- fuerit & similia. Sōnus sit septem horarum, aut circa. Quiescat animo & corpore.

Cura apostematū mirach et lacertorū uētris inferi- oris est pīxima curationi apostematū epatis. Vnde e- gēdē medicinę & eiusdē intentiōis cōueniūt in utrisq;. Et nō est differētia, nisi quia in his debemus audacius repercutere in principio, & propriē in augmento, & audacius resoluerē in statu, et declinatione quā in apo- stematib. epatis. Medicinę ergo postq; in apost. epa- tis his accomodent in exequēdo intentiōes similes tā u- niuersales quā particulares. Cura apost. melaicę siue mesēterij est similis curatiōi apost. cōcauitatis epatis.

DE DOLORE EPATIS. Cap. XCVII.

Cum quis male fuerit coloratus, & cū hoc malum habuerit formam, ha- bueritq; dolorem in dextro latere apud co- stas posteriores, et fuerit eius malus color citrinus, & fuerit cum hoc in ore siccitas & sitis uehemens.

Hoc cap. intitulatū de dolor epatis est primū inter cap. dispositionū epatis, de quib. agit Rasis in parte presentī, quia dolor quātum ad quid nōinis aut quid rei est satis manifestus. Diuidit hoc cap. in partes 3. In 1. determinat de dolore à cā cal. In 2. de dolore à cā frig. In 3. pro cura apostematū epatis remittit nos ad curā apostematū stomachi. 2. ibi. Quod si malus co- lor 3. ibi. Si autē aposte. in epate fiat. Prima in duas. In 1. ponunt aliqua signa apostem. cal. in epate, sedcū curā. 2. ibi. Aqua hordei. In 1. dicit, cū aliquis fuerit male coloratus, et cū hoc fuerit male figure. i. habitu- dinis siue forme, et habuerit dolorem in latere dextro a- pud costas posteriores, quę dicit mēdosę, et color su- us malus fuerit citr. & fuerit in ore sic, et sitis uehēmen-

Que duo signa postrema arguunt dominium caliditatis cum materia colerica, suppletu hic dolor prouenit à causa calida.

Aqua hordei, et succi berbarum ut endiuia, & solatri, & cuscute cum syrupo acetoso, de saccharo alb. facto in potu tribuatur. Emplastrum quoque ex 2. sandalis & rosis & campb. & aqua ros. cum panno lineo loco superponatur. Quod hoc modo fiat. Pannus in prædictis inuolutus superponatur, quando tepere inceperit remoueat, & alius loco eius apponatur. In potu præterea sumat granatorum succum, & rob, qui in frigidare consueuerunt. Hic quoque à uino, & à confectionibus, quæ de melle sunt sibi caueat, & à cibis calefacientibus. Et sumat trochiscos de berberis. Qui recipit succi berberis drachmas decem, seminis endiuia, seminis citrulli, portulacæ, seminis omnium, ana drach. tres, rosarum, drachmas duas ravedseni, drachmam unam, spice drachmam semis, in formentur trochisci pondere aurei unius, ex quibus detur unus cum syrupo acetoso de saccharo, aut cum succo granati. Venter quoque si necesse fuerit cum succo fructuum soluiatur, ut sunt pruna & tamarindi. & saccharo albo.

Hic ponit curam. Primo cum aqua hordei, & succis endiuia, solatri, cuscute, mixtis cum syrupo acetoso, simpliciter facto ex saccharo albo, quæ in potu tribuatur. Aqua quidem hordei per se ne forte mixta cum syrupo, acetoso in stomacho acetosetur. Succus uero singulariter aut coniunctim mixti cum syrupo, acetoso. Sunt enim aperitiui epatis, confortatiui, & primi duo frigidi. Sed succus cuscute, circa reperiens notabiliter aperitiuus oppilationum, & propriè pori fellei. Secundo emplastrum, id est, epithyma ex duobus sandalis, ana, 3. 2. ros. 3. 1. camphoræ, 3. s. aquæ ros. 3. 3. in quo infundatur pannus & aliquantulum compressus regioni epatis applicetur notabiliter frigidus. Et cum tepere coeperit remoueat, & alius actu frigidus superponatur, ait enim Apicem, per frigiditatem actuale et potualem caliditas epatis superflua temperetur. Tercio in potu sumat uinum granatorum, scilicet mazorum aut acrium & similiter rob, id est, succos per decoctionem aut ad solem inspissatos qui frigidi sint sicut rob de agresta de acetositate citri, limonis & similium cum aqua endiuia, epaticæ & similium,

aut cum aqua cocta cum saccharo. Quarto à uino confectionibus, de melle & cibis calefacientibus abstinere. Quinto sumat trochiscos de berberis. Quorum descriptio, 8. suc. berberis frig. et sic. in fine tertij sem. endiuia, citrulli, portul. an. 3. 3. ros. 3. 2. ravedseni, 3. 1. spice, 3. s. informetur trochisci pondere aur. 1. ex quibus detur unus cum syrupo acetoso, de sacch. aut cum succo granati. Sexto uenter, si necesse est cum succo fructuum soluiatur, si haberi potest, si uero non. 8. prunorum, rindorum, ana. 3. 3. incidantur & infundantur in una lib. aquæ & media per decem horas, deinde bulliant, donec remaneat tertia pars aquæ & coletur sufficienter exprimendo & calida in potu exhibeatur cum saccharo dulcoretur.

Quod si malus color qui est cum dolore epatis fuerit albus, medius uidelicet inter eum, qui est cum fluxibilitate, et eum qui est cum tumore fueritque cum eo uentris solutio & palpebrarum atque extremitatum tumor, trochisci de ravedseni cum syrupo acetoso de melle in potu dandi sunt. Rec. spice mastichis, suc. eupatorii, succi absinthij, seminis foeniculi, anisi omnium ana drachm. 2. ravedseni drach. 10. informantur trochisci pondere aur. unius ex quibus, unus in potu omni die tribuatur. Sumantur præterea mastix, spice, ciperi, schinantibus, calamus, aromat. croc. mirrha, deinde mirrha & mastix in uino dissoluta cum alijs miscerantur, & ex eis emplastrum epati superponatur.

Aeger uero à cibis frigidis & crassis abstinere. Si autem hæc non suffecerint trochisci de lacca cum apozemate de radicibus sunt dandi. Trochisci autem de lacca sunt isti. Rec. lacca, ravedseni amborum, ana drach. 3. spice seminis apij, ameros, mastichis, schinantibus sem. iuniperi, amygdalarum amararum, costi amari, rubic. succi eupatorii, asari, aristol. rotum gentiana, omnium ana drach. 1. s. informantur ex his trochisci pondere aur. unius. Apozema de radicibus. Rec. cordicum radicis apij, foeniculi amborum, ana drach. 10. sem. apij, sem. foeniculi, florum, schinantibus, ameros

os, omnium ana. drac. 5. ros. rub. spice odo
riferæ, amborum, ana. drac. 3. coquantur in
lib. 1. donec ad tertiam redeat, & det in po
tu cum prædictis trochiscis.

Hic ponit curam, quâdo est à causa frigida, primo
per trochiscos de reubarbaro, & emplastrum, secun
do per regimen uitæ, tertio per trochiscos de laccâ
quos describit, & describit etiam decoctionem unâ,
quam uult dari cum dictis trochiscis, secunda ibi.
Æger uero, tertia ibi. Si autem hæc. In prima par
tedicit, quod si malus color, qui est cum dolore epa
tis fuerit albus attestans phlegmati, medius uidelicet
inter eum, qui est cum fluxibilitate, id est, magna mol
litie, qualis est mollities reperta in hypofarca supra,
& parum mollitiem qualis est mollities phlegmati
ei naturaliter dispositi, & medius etiam inter illum,
qui est cum tumore hypofarico, & illum qui est in
phlegmatico naturaliter disposito. Iste enim color,
de quo est hic sermo, est propriè color cæceti qui est
medius inter cholorem hypofaricæ, & naturæ phle
gmaticæ, sicut etiam mollities & tumor sunt medij.
Quod si fuerint cum eo uentris solutio, & palpebra
rum, &que extremitatum tumor, sicut aliquando ac
cidit, trochisci de rauedensi cum oximelle dandi sunt
in potu. Rec. spice, mastichis, succi eupatori, succi ab
sinthij, sem. fœniculi, anisi. añ. 3. 2. raued. id est, rheu
barbarum, 3. 10. informantur trochisci pōdere unius
aur. ex quibus in potu omni die sumatur cū aliquo
liquore proprio, sicut aqua absinthij, aut eupatori,
aut apozema statim describendum. Sumatur præ
terea, hic describitur emplastrum, Rec. spice, mastix,
ciperi, schinanthi, calami, aroniat. ana. 3. 2. croci. 3. 1.
mirhe. 3. 2. conficiatur hoc modo, mirra, & mastix
in uino dissoluatur & cum alijs miscatur, & epati su
perponatur. Et si non esset bene tenax addatur plus
gids absintæ, & mirra. Æger uero à cibis crassis & fri
scis de laccâ cum apozemate, id est, decoctione de radi
cis dandi sunt, qui, Recip. laccæ, rauedensi ambo
rũ. ana. 3. 3. spice, semi. apij, ameos mastichis, schinan
thi, semi. iuniperi, amigdalârũ amararũ, costi amari,
quia calidior, rubæ, succi eupatori, asari, aristolo
chæ rotundæ, gentianæ, ana. 3. unam semis, infor
mentur trochisci ponderis, aurei. 1. Ex quibus detur
unus cū apozemate de radicibus, quod Recipit, cor
ticum radicum apij, fœniculi, añ. 3. 10. sem. apij, sem.
fœniculi florum schinanthi, ameos añ. 3. 5. rosarum
rub. spice odoriferæ, añ. 3. 3. coquantur in lib. 1. aquæ
donec redeat ad tertiam, & detur in potu cum prædi
ctis trochiscis. Certe ego non credo tantam quanti
ficet tres lib. ex quo collige magnam quantitatem
rerum debere poni in decoctione, cuius oppositum
faciunt moderni. Sed mihi uidetur antiqui & moder
ni sunt sepe declarate superius.

Si autem apostemata in epate fiant, eo
rum cura erit ut apostematum quæ in sto
macho generantur.

Rasis in parte præfenti pro cura apostematum epa
tis remittit nos ad capitulum de cura apostematis sto
machi. Dolor epatis, aut est perforatiuus & fit à uēto
sitate, aut uapore crasso sub panniculo contento par
uum spaciū occupante. Aut est extensiuū & fit à
uentositate, aut uapore satis magnum spaciū occu
pante, aut ab humore multo extēdente. Aut est pun
giuius, & fit ab humore acuto panniculum punge
te. Aut est grauius, & fit ab humore multo aut
crasso siue apostemet siue non. Sunt & aliæ species
dolorum, sed hæc communiter accidunt epati.

Sed pro notitia causarum est sciendum, quod cau
sa immediata doloris eius est solutio cōtinui, aut ma
la complexio panniculo cōmunicata, cum epar quā
rum ad eius carnem nō sentiat. Prima autem causa
solutionis continui est uentositas, aut uapor crassus
extendens panniculum & faciens inflationem. Qui
uapor & uentositas non inueniunt exitum, aut pro
pter multitudinem, aut propter oppilationem. Cau
sæ autem uaporum & uentositatum & consequenter
inflationis epatis sunt sicut in inflatione stomachi di
ctum est. Aut ex parte ciborum & proprie illorum
quæ in secunda digestionē uentofantur, quorum uen
tositas in epate retinetur faciens eius inflationem, si
cut illa quæ generatur in tertia digestionē est causa
erectionis uirgæ. Aut sunt ex parte caliditatis medij
inter resoluentem insensibiliter, & non potentem hu
midum uentofare, plurimum tamen causa materialis
est multitudo phlegmatis aut melancholiæ, ubicunq;
fit in epate, uenis, stomacho uel splene. Secunda cau
sa solutionis continui aut malæ complexionis & con
sequenter doloris est multitudo humorum aut eorū
acuitas absque quod apostement. Tertia causa est
apostema calidum aut durum. Nam phlegmaticum
raro facit dolorem notabilem. Quarta causa est mo
tus criticus aut symptomaticus humorum qui dolo
rem faciunt aut suis uaporibus, aut quia ipsimet mo
ti ad epar, implendo extendunt, & simul faciunt ma
lam complexionem & solutionem continui. Quin
ta causa est oppilatio. Sexta debilitas. Sciendū ta
men, quod quando dolor epatis est fortis, aut est ab
apostemate, aut à uentositate, & si est ab apostemate
est febris & grauitas. Si uero à uentositate, non est fe
bris neque grauitas & talem dolorem resoluit febris
iuxta aphor. 49. septimæ particule. Quibus cunq;
cir
cundoler epar his febris superueniens soluit dolorem.

Signa uentositatis & inflationis sunt sensio quædā
in epate, & additio festina & mutatio, propriū enim
uentositati est cito augeri & minui, mutari & interpo
lare & ibi non est grauitas, neq; alteratur cum ea for
ma nisi uentofitas habeat materiam fouentē, & quan
doque compressio sedat eam, similiter carminantia si
ipsa uentofitas non habet materiam. Signa uero
malarum complexionum, epatis debilitatis, oppila
tionis apostematum patent ex cap. præcedentibus.

Crisis uero cognoscitur ex præcedenti ægritudine
quæ cum ea terminatur.

Prognostica. Primum. Dolor epatis sanatur si
ægritudines à quibus pendet sanari possunt. Secun
dum est ex lib. Hippocratis, inuēto in sepulchro, quā
do est dolor epatis cum pruritu uehementi in cama
dati, id est, in collo uel posteriori parte capitis & pol
lice pedis, & apparet bothor simile fabæ in collo mo

sicut talis in quinto, ante ortum solis, & accidit ipsi difficultas urinae cum distillatione propter oppilationem in collo vesicae, propter nocumentum lacerti eius. Et ratio huius est, quia hic dolor fit ab humoribus malignis, qui sunt opilatiui, ideo fit difficultas urinae, & in ipsis est caliditas & bauracitas, unde eleuantur uapores, qui faciunt pruritum in locis dictis, & natura tentat materiam expellere, & non potest nisi paruum partem permutare, cuius signum est bothor in collo, ergo significatur, cum haec agritudo sit acuta, quod natura cito succumbet, scilicet in fine quarti, ideo moritur ante ortum solis quinti diei.

Cura doloris epatis si sequatur uapores & uentositates instantes & extendentes exigit sex intentiones. Prima euacuat euacuatione integrata ex minoratiuo, digestiuo & eradicatiuo, etiam iteratis si fuerit expediens: Secunda diuertit cum dysteribus, & alijs generibus diuersionum. Tertia aperit uias ut uentositates ubere possint exire. Quarta uentositates resoluit epar confortando. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum. Sumat pro minoratiuo iuxta primam intentionem, septem pilulas de rheubarbaro, aut de eupatorio, aut de alchehen-gl. Et pro digestiuo syrupum acerosum compositum aut oximel compositum cum aqua ablinthij cichoreae & similia, & pro eradicatione pilulas de raued aut aggregatiuas aut electuarium indum. Pro secunda intentione utatur dysteribus carminantibus uentositatem, & euacuantibus humores, ex quibus uentositates generatur. Et aliquando ponatur uentose sub epate. Sed pro tertia utatur dialacca, aut diacurcuma & si uiderentur nimis calidae cum diarhodon temperentur. Sed pro quarta utatur fomentis resolutiuis uentositatem, sicut est fomentatio, cum oleo despica, aut cum decoctione in uino, aut aqua carminantium uentositatem sicut spica, anethum, ruta & similia, aut cum sacculis ex milio aut fursure torrefacti, aut uino aspersis, & apud Auicennam confyderetur, ad quod latus declinet uentositates, nam si extenditur dolor ad partes intestinorum, tunc solue uentrem prius cum praedictis, deinde solue uentositatem, & si extenditur ad diaphragma, ossa pectoris, & dorsum administra diuretica sicut dialacca & c. Deinde resolutiua uentositatem praedictam. Sed pro quinta intentione corrigantur accidentia secundum exigentiam. Pro sexta uero apud Auicennam conuenit uinum purum in ieiunio, sed in modica quantitate, uiter potum aque frigidae, sit parcus in cibo & potu, qui tamen declinent ad calidum & siccum secundum plurimum, & utatur aperientibus & carminantibus uentositatem, & uiter multiplicanti uentositatem & oppilanti, sed de his dictum est in passionibus stomachi, & dicitur in colica uentosa & tympanite, inter caetera notabiliter exercetur stomacho ieiunio. Doloris autem pendens a reliquis causis, scilicet a mala complexionem sine materia & cum materia, ab apostematibus, ab oppilationibus & debilitate, cura patere potest ex capitulis praecedentibus & pro magna parte patet ex textu Rasii. Auicenna tamen appropriat quaedam in cura doloris epatis, sicut trochiscos de rheubarbaro, confessionem, de rheubarbaro, diacurcuma & similia, quae lege in eo in proprio capitulo.

Sic cum icteritia. Quia icteritia secundum plurimum causatur uitio Kystis fellis, ideo de ipsius anatomia iuxta morem consuetum agendum est. Kystis fellis quae descriptiue est membrum instrumentale paruū, figurę oblongae ad rotunditatem tendentis sub media pennula epatis collocatum ex una pellicula, neruo, arteria & uena compositum ex fundo, & collo trifurcato integratum, ad mundificationem choleram a sanguine, ipsamque ad fundum stomachi pro uigoranda digestionem expellendum, ad intestinum duodenum, pro uigoranda expulsiue choleram liter ordinatum. Est quidem instrumentale, quia compositum & ad operationes, pro conseruatione indiuidui, necessarias tōtque communes ordinatum. Paruum quidem in comparatione ad splenem, citius minor sit quantitas cholerę quam melancholiae. Est autem figurę oblongae, sic enim aptius diuidi potest in collum & fundum eius. Tendit autem ad rotunditatem, quia haec figura est omnium capacissima & a nocumentis magis tuta, & est collocatum sub media pennula epatis quantum ad fundum, licet collum a medio epatis originem trahat. Hoc enim conueniens fuit, ut cholera superflua posset apertius ad ipsū purgari, in medio enim epatis perficitur digestio, & in ea parte cholerę resectio. Et ex hoc patet concordia Gal. s. de iuuamentis membrorum dicentis Kystim fellis in medio colloari inter uenas, quae deferunt chylum ad epar, id est, meseraicas & uenas quae deferunt sanguinem ad membra, id est, uenam chylum. Hoc enim intelligitur de collo eius, quantum ad ipsius originem, non autem de fundo, & est composita ex unica pellicula habente tres species uillorum, sola enim sibi sufficit ex unico neruo, & unica arteria uenientibus ad ipsam ad dandum ipsi sensum & uitam, & hi sunt rami nervi & arteriae, qui delegati sunt a cerebro & corde ad epar, uena autem ipsam nutriendi descendit ab epate. Est autem integrata ex fundo ad continendum. Prius autem pars colli cōtinua fundo fert choleram ad fundum, & ipsam refert cum expellenda est ad stomachum, & ad intestina, propterea dixit Gal. 3. uirum chylum, & ad intestina, propterea dixit Gal. 3. uirum naturalem, quod Kystis per idem collū attrahit chylum & expellit. Hoc autem collū bifurcatur. Una pars tendit ad medium epatis siue melius ab ipso oriatur, quae solum est cholera ad Kistum delatua. Altera autem ramus tendit uerius fundum stomachi, & intestinum duodenum, & bifurcatur in quibusdam, una eius pars quae est minor, uadit ad fundum stomachi, & ad uigorandum digestionem. Altera autem pars, & maior uadit ad duodenum ad uigorandum expulsiuam intestinorum propterea feces sunt citrine. Si autem contingat quod maior est ramus, in quibusdam tendens ad stomachum, illi sunt infelices & sunt fructus cum fere quotidie choleram euomant, & sunt fructus secundum uentrem. Postea in diffinitione expelluntur tres fines Kystis fellis. Vnus ad mundificationem choleram a sanguine nutritionem impediendam. Secundus est ad uigorandum digestionem stomachi. Tercius ad uigorandum expulsiuam intestinorum. Et ex his patet, quia Kystis fellis est complexionis calidae & siccae, quantum ad complexionem innamam.

neat uen. apud fellis

neat uen. apud fellis

actuam per influentem, & potest pati omne genus ægritudinis simplicis, & compositæ, præcipue frequenter patitur oppilationem, ad quam sequitur icteritia de qua Ral. agit in præsentis capitulo. Icteritia dicta est ab auctori croceo colore. Et est auis quæ comedit ficus. Vnde Plinius. Icteris uocatur auis à colore, quæ si spectetur ab icterico sanari illud malum tradit ab iri arcu propter colorum uarietatem. Icteritia de scriptiue apud Auic. 15. tertij. est alteratio coloris faciei, ad citrinitatem tendens, aut nigredinem propter cursum humoris citrini aut nigri ad cutem & quæ sequuntur eam.

Icteritia est triplex citrina, nigra, & uiridis. Citrina pendet à cholera citrina. Nigra à cholera nigra, siue melancholia. Viridis à cholera uiridi, uel ab utrisque simul mixtis. Ex colore enim citrino admixto color nigro resultat color uiridis. His ergo duobus humoribus ueniens ad cutem causatur icteritia uiridis. Quamquam sit imaginabile à cholera uiridi prædem. De hac tamen cum rarissime contingat per pauciores facit mentionem. Hi autem humores si putrescerent facerent febres, cholera quidem tertianâ, melancholia quartanam, ambe simul utranque.

Causæ autem citrinæ. Secundum plurimum est ex parte epatis, & Kystis fellis. Et causa nigræ est ex splenicitate. Et quandoque accidit ex epate, cum superfluat eius aut nigræ simul complexio communis corpori cum tum in cholera, partim in melancholia per adustionem. Sed loquimur prius de causis citrinæ. Causæ ergo icteritiæ citrinæ sunt, aut multitudo cholæræ & generatio eius, aut prohibitio euacuationis eius. Causæ autem multitudinis cholæræ sunt primitiue, aut corporæ. Et primitiue aliquæ sunt extraneæ, siue morbus serpentis qui dicitur generati, morbus typhus uel uespæ grossæ, & punctura pediculi uulturis, & rehibita sicut fel leopardi & uiperæ quando non in terficiunt statim, & ita sunt omnes medicinæ fortissimæ caliditatis adurendo sanguinem in cholera. Sunt autem quedam non extraneæ sumptæ ex sex generibus rerum sicut estis & ær uel de calidus & siccus & uenti similes, & influxus cœlestes, sol, ignis, & humis. Item potus calidi sicut uinum, potus aquæ uitis, & aqua multi mellis, & omnia notabiliter dulcia & amara & acuta, & maximè res cal. subtilis substantiæ quæ sunt aptæ superfluæ decoqui. Item ex parte artificij sicut res fixæ aut superfluæ assare, ex his superfluæ & exercitij intus & maximè sub æstu solis aut circa materiam adustiuam. Similiter acciden- tiamini multum inflammationis sicut ira, timor, &c. Causæ autem corporæ sunt, aut propter totum aut propter epar, licet stomachus coadiuuat & cor, cum do totum corpus multum super calefit à febre, aut ex alijs causis. Subtile enim sanguis conuertitur in cholera. Et quandoque cholera cum multa est & acuta, natura stimulat cruce aut symptomaticæ expellitur sicut plerumque accidit in febribus cholericis iuxta Aphorism. 62. quartæ partiæ. Quibuscum-

que in febribus in septima aut nona, aut undecima, aut decima quarta die icteritia superuenit bonum, si non dextrum hypochondrium durum fiat. Si uero sit non est bonum, & tunc fit subito icteritia. Quandoque fit paulatim quando illud quod de cholera paulatim generatur, ad cutem transmittitur & non reuoluitur propter spissitudinem cutis, uel crassitiam materiæ, uel prohibitionem resolutionis ab ære frigido, & propriè quando sunt uenti septentrionales. Similiter contingit in retentione sudoris à quacunque causa fiat. Propter epar uero quando est calidissima complexionis, & tunc ferè semper homo est aliquantulum ictericus, aut quâdo superfluè calefit, sicut in febribus & apostematibus calidis. Aliquando etiam supercale fit epar supernaturaliter propter longam moram cholæræ in ipso, aut propter oppilationem, aut debilitatem expulsiuæ suæ, aut debilitatem attractiuæ Kystis. Et ita de alijs causis præter modum inflammationibus epar, ut panni calidi, clysteria calida quibus aliquando utimur in colica, aquæ uitis, & potius reliqui superfluè calidi. Prohibitio autem euacuationis est, aut ab epate, aut à Kysti, aut ab intestinis, aut ab alijs membris. Ab epate quidem, quia uirtus eius expulsiua aut separatiua siue discretiua est debilis propter aliquam eius ægritudinem, aut fortè, quia oppilatum est propter causas oppilationis suprascriptas, aut facta est oppilatio in principio uel circa principium canalis, per quem Kystis recipit cholera ab epate siue illa oppilatio sit coniuncta apostemati siue non. Ex parte uero Kystis sumuntur causæ multipliciter aut propter debilitatem attractiuæ eius aut intensionem eius, unde attrahit multum uice una, & impletur nimis & extenditur præter modum, & sic debilitatur maximè secundum uillos longitudinales & latitudinales, ut neque possit expellere neque attrahere. Itè aliquando accidit propter nimis festinam attractionem, quod aliquod phlegma simul cum cholera attrahitur nondum facta perfecta separatione in epate, quapropter fit oppilatio, aut in meatu per quæ cholera attrahitur ad ipsum, aut per quem expellitur ad stomachum aut ad intestina. Quapropter huiusmodi oppilatio potest esse in triplici meatu, scilicet, aut in illo per quem attrahit ab epate, aut per quæ expellit ad fundum stomachi, aut per quem expellit ad intestina. Sed per communiter ab intestinis fit icteritia, quâdo oppilatur extremitas meatus Kystis fellis ad ieiunum propter phlegmata, quæ sunt in ipsis intestinis obturati orificium dicti meatus, uel dū ipsa intestina sunt oppilata ut in colica & ileos dicitur. Cholera etiam crassa replens intestina potest esse causa, cur cholera existens in Kysti non ueniat ad intestina quamuis meatus sit apertus. Et in hoc casu aliquando cholera in intestinis retenta ascendit ad stomachum per reuolutiones intestinorum, & fit ardor in stomacho, & corruptio digestionis, uertigo & similia. Et in his casibus non habens descensum per intestina reuertitur ad epar, & postea spargitur cum sanguine per totum, & est causa icteritiæ. Hoc autem est ualde raro, & non nisi sopita expulsiua uel destructa sopito, aut destructo intestinorum sensu, uel etiam destructa operatione uillorum latitudinalium ipsorum intestinorum, quod aliquando accidit propter nimiam ipsorum extensionem, unde colica est causa icteritiæ & antecedit

multum citrina, & in paruo tempore & icteritia satis intensa, neq; apparent reliqua nocumenta epatis.

Oppilatio uero signa sumuntur hoc modo: Nā si oppilatio fuerit in poro felleo existēte sub media penula per quem cholera delegatur ad Kystim cognoscitur, quia adeit grauitas in epate & inflatio propter retentionē cholerae in eo. Et prius fit icteritia & urina citrina, postea feces dealbantur. Si uero oppilatio fuerit in poro felleo terminato ad duodenum prius apparent feces albae, postea fit urina citrina, & icteritia & forte commouetur nausea, subuersio & uomitus cholera retenta & deriuata ad stomachum, & uenter stringitur, & forte fit colica, cuius causa est oppilatio iam dicta. Cognoscitur autem quod colica sit causa icteritiae quando ipsa praecedat icteritiā. Cognoscitur autem quod sit oppilatio in poro felleo terminato ad stomachum ex diminutione digestionis stomachi, & quod non repraesentatur amaritudo in ore secundum quod cōseuit, & cum hoc icteritia est remissa, & fit in longo tempore & feces sunt citrinae. Signa uero causae oppilationis sumuntur hoc modo. Nam si causa est humor crassus significatur per regimen praecedens. Et si causa eius est nascencia rei aliā aliud uationem icteritiae, & per aliud uationem significationem dyssenteriorum & reliquorum apparentiū, & si oppilatio fuerit attenuatoria sequens apostema membri uicini aut aliud simile cognoscitur per signa apostematis illius membri, aut alterius similis aggritudinis potentis oppilare attenuatoria.

Prognostica. Primum. Omni oppilatione meatus epatis ad fel, aut meatus fellis ad intestina quae ex in carnatione aut poro siue carne orta in meatu non speratur sanitas. Secundum. Secundum plurimum uelocius generatur icteritia citrina q̄ nigra, quia facilius & uelocius a causis extraneis generatur cholera quam melancholia. Tertium. Sicut icteritia citrina aegritudinum cholericarum, ita icteritia nigra splenis & melancholicarum. Quartum. In illo qui habet icteritiam factam & non curatur neq; materia expellitur est timor. Nam pluribus eorum accidit mors subita materia repente cōmunicata cordi aut alteri membra nobili. Quintum. Est Aphor. 62. quartae par aut. 12. aut 14. die icteritia superuenit bonū si dextrū non bonum. Sextum. Hippocr. dixit in his quae referuntur ad ipsum quod icteritiae species est mala, quā est corpusculorum generatorum per adustionem, & uirtutis animalis interficit enim in 14. uel circa secundum tenorem uirtutis. Septimum. Quando diu remanet urina alba aut parum tineta icteritia non curata, est timendum quod habens eam cadat in hydroposim, significatur enim quod oppilatio est ex frigore.

Quod icteritia sit nigra sensui manifestū est, cuius causa coniuncta semper est melancholia. Haec autem secundum plurimum pro-

uenit uitio splenis, potest tamen uitio totius & epatis prouenire. Sed icteritia citrina nūquam prouenit uitio splenis. Et cum hac icteritia nigra undecumq; proueniat frequenter mirach est extensum cum dolore & grauedine propter multiplicationem uentositatis & crassitiem humoris. Et secundum plurimum natura est constricta, licet quandoq; nō, cum melancholia est adusta stimulans expulsiuam. Et tertio est digestio mala & deterior q̄ appetitus. Et quarto est cum ea malitia animae, id est, male cogitationes & tristitia, & malitia animae, id est, oris stomachi. Et uarietas, id est, error in uirtutibus, comprehensiuus propter uapores melancholicos petentes cor & cerebrum. Quinto, egreditur quandoque sudor niger sicut in citrina egreditur color citrinus. Sed quod haec icteritia sit uitio splenis cognoscitur. Primo, quia est uehementioris nigredinis quam proueniens uitio totius, aut epatis. Secundo, durities, magnitudo splenis & dolores eius, qui sunt in sinistro latere separant eam ab ea quae uitio totius & epatis cōtingit. Tertio, quia licet in splenetica sit quandoque egestio & urina nigra cum superfluo nocumentum eius, tamē secundum plurimum non est in ea urina nigra. Sed in ea quae uitio totius aut epatis accidit ferē semper est urina nigra. Item praecesserunt nocumenta totius aut epatis cum incolumitate splenis & econtrario cum est splenetica. Sed distinguitur inter eam quae prouenit uitio totius ab ea quae uitio epatis, quia in illa praecesserunt nocumenta totius sicut febres adurentes, aut superflua totius frigidas, & in proueniente uitio epatis praecesserunt aggritudines eius sicut malae complexionēs, oppilationes, apostemata, & debilitas discutiue & expulsiue epatis sequens aliquam aggritudinem eius. Factam uero propter oppilationem in meatibus significat grauitas uehemens & difficultas dormiendo super latus sinistrum. Sed facta propter apostema durum splenis significant grauitas, tumor & durities ipsius. Sed in facta propter debilitatē attractiue splenis nihil tale accidit, & nota quod secundum plurimum quando est debilitas attractiue splenis, aut ē oppilatio in meatu per quem transit melancholia ad splenem, splen nō est tumidus, & contra, quando est oppilatio in meatu per quem natura expellit melancholiam ad os stomachi est splen tumidus. Facta autem uitio epatis significatur, quia prima nocumenta fuerunt in epate, quorum signa superius praecesserunt cum incolumitate splenis. Et non est nigredo pura sicut in splenetica licet quandoque nigredo in epatica sit magis luminosa cum melancholia est adusta reueruatis in ea quibusdam partibus igneis. Econtrario melancholia splenetica est terrea opaca, & significat ipsum nocumentum in urina. Et si fuerit corruptio, id est, digestio corrupta epatis per quam generatur melancholia propter dominium caliditatis & siccitatis erit nigredo icteritiae decliuus ad citrinitatem. Et si fuerit illie dominium caliditatis & humiditatis erit nigredo cū rubedine, & si fuerit dominium frigiditatis & siccitatis uincente frigore, nigredo declinabit ad uiriditatem, sed siccitate uincente declinabit ad nigredinē, & si fuerit dominium frigid. & humi. humiditate uincente declinabit ad citrinitatem quandam, sed frigiditate uincente ad uiriditatem. Splenetice uero color unus, scilicet, nigredo pura absq; declinatione & alios colores.

reuer. ha. ab. e. p. m.
p. m. p. m. p. m. p. m.
p. m. p. m. p. m. p. m.
p. m. p. m. p. m. p. m.

lores, diuersificantur etiam colores icteritiæ melancholicæ secundum diuersitatem specierum melancholicæ, scilicet, sanguineæ, cholericæ, phlegmaticæ & melancholicæ, quæ tanta diuersitas non reperitur in splenetica.

Prognostica. Primum, icteritia nigra est rarioris euentus quam icteritia citrina. Secundum, icteritia nigra magis prolongatur, & cæteris paribus difficilius curatur quæ citrina. Tertium, icteritia nigra est frequenter crisis agitudinum splenis melancholicarum. Et nota quod quandoque aggregatur utraque icteritia simul, quia cholera & ei quod ipsum admiscetur ex sanguine accidit adustio, & fit nigra aliquantulum, & aliquantulum remanet de citrinitate prioris. Et quandoque componitur ambo humores simul, quia in epate & splene simul est nocumentum. Et tertio, quia sanguis per adustionem secundum partem subtilem uertitur in cholera, & secundum partem crassam in melancholiam, & ex his duabus icteritijs simul mixtis secundum plurimum confurgit color uiridis, licet sit imaginabile icteritiam uiridem à cholera uiridi pendere, scilicet, prassina aut cinaria. Huius autem icteritiæ uiridis signa possunt ex dictis elici & similiter prognostica.

SI cum icteritia fuerit febris, succ. endiuia & solatri, & aqua hord. agro in potu tribuatur. Ipse quoque ex cucurbita, & chrysolachana & citrullis, & his si milibus. hærbis frigiditati attinentibus nutriendus est. Et syrupum acetosum ex fortissimo aceto in potu sumat. Epate præterea emplastrum ex duobus sandalis est superponendum. Ei uenter ex succo prunorum & sacch. soluendus. Quæ si non suffecerint, trochisci de camphora cum succo granatorum dandi sunt. Trochisci de camphora. Rec. sacchari spodij, rosarum rub. omnium, ana drach. 3. sem. endiuia, sem. citrullorum, cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, sem. ex omnibus sandalis rub. omnium, ana. drach. 1. formentur ex his trochisci pondere drach. 2. ex quibus quotidie unus cum sexta, drach. 1. de camphora detur, si autem ager uenas habuerit plenas, fueritque diu ex quo minutus non fuerit phlebothometur.

Hoc cap. diuiditur in tres partes. In prima curat icteritiam cum febre. In secunda icteritiam sine febre. In tertia docet remouere colorem maxime in oculis remanentem, secunda ibi, Quod si icteritia fuerit si-

ne febre, tertia ibi. Si autem icteritia in oculis remanserit. In prima parte curat hanc icteritiam cum febre septem auxilijs. Primo, g. succi endiuia, 3. 1. succi solatri, 3. s. aquæ hordei, 3. 3. misce, his ad libitum posset addi parum sacchari, hæc mixtio sumatur quatuor aut quinque diebus, & ualet in icteritia cum febre siue sit coniuncta oppilationi siue non. Secundo, quod nutriatur ex cucurbita aut chrysolachana quæ est aureum olus à colore aureo. Nam χρυσόειον αἶμα olus. Et est attriplex, frigida est & humida in primo, & apud aliquos temperata citrullis, & similibus, sicut cucumeribus, anguria quæ sunt frigida. Tertio, sumat syrupum acetosum simplicem ex fortissimo aceto, est enim magis aperitiuus, & in oppilatione melius sumere cum aqua endiuia, & in oppilatione melior est cum aqua cuscutæ. Quarto, epate superponatur emplastrum ex duobus sandalis, scilicet, albis, rubis, item sicut cerotum sandalinum descripi. Melius. Quinto, uenter ex succo prunorum quatuor aut quinque 3. & saccharo soluendus est, & si non habeatur succ. fiat decoctio, licet sit maioris quantitas usque ad 6. 3. Sexto, trochisci de camphora dandi sunt, quorum descriptionem uide in textu. Et pro duabus 3. trochiscil. misce 6. 3. unius de camphora. Sed communiter sufficeret medietas huius dosi nisi corpus sit roboratum naturaliter & præternaturaliter notabiliter bustum calidum. Septimo, si uenas habuerit plenas, fueritque diu ex quo non minutus fuerit, phlebotometur, scilicet ex dextra basilica.

Quod si icteritia fuerit sine febre, non ter ex his pilulis soluitur, quæ Rec. aloës drach. 1. scammonæ quartam, drach. 1. ex his cum succo endiuia confectis fiant pilulæ, & sufficient ad dosim 1. Deinde dantur trochisci de lacca cum apozemate de radicibus.

Hic curat icteritiam sine febre, & propriè oppilationi coniunctam duobus auxilijs. Primo, soluit uenter cum his pilulis. Rec. aloës 3. 1. scammonæ quartam, drach. 1. 3. unius, agarici partes duas unius 3. id est, 3. 1. licet ei eupatorii tertiam 3. unius, ex his cum succo endiuia mixtis fiant pilulæ & sufficient ad dosim unam, sed erit magna, ita ut in multis sufficeret medietas, simul enim euacuat cholera & phlegma quod oppilat. Secundo, dantur trochisci de lacca cum apozemate, id est, decoctione de radicibus, de qua in epistula præcedenti. Hi enim dantur ad deoppilationem.

Si autem icteritia in oculis remanserit, ager fortissimum acetum paulatim ossificat. Et balneum ingrediatur. Eius quoque oculis qui icteritiam cum febre patitur aqua rosæ mittenda est. Icteritiæ præterea ualde confert, ut ager per tres hebdomadas seorsum bibat.

Hic remouet icteritiam in oculis existentem 4. auxilijs.

illis. Primo odorando acetum fortissimum, cuius vapores iuuant ad resolutionem. Secundo balneum ingrediatur, scilicet aquae dulcis debite calidum, similiter ad resoluendum humorem facientem icteritiam sub forma sudoris educendum. Tercio immitit oculis parietis icteritiam cum febre aquam rosaceam ad confortandum & infrigidandum. Quarto bibat serum per tres hebdomadas debite calidum sumendo tres aut quatuor 3. pro uice, confert enim choleram euacuando.

ORDO CYRAE ET PRIMUS
mo icteritiae.

Quia icteritia citrina a duabus causis in genere contingit, altera est cholerae multiplicatio. Altera prohibitio euacuationis eius. Primo curabimus sequentem multiplicationem cholerae. Secundo sequentem prohibitionem euacuationis eius.

Cura icteritiae sequentis multiplicationem cholerae, exigit sex intentiones. Prima remouet causas multiplicationis eius. Secunda euacuat ipsam multiplicationem eius. Tertia corrigit disrasiam membrorum & caetera eorum nocumenta, quae remanserunt ipsa confortando, ne iterum multiplicetur. Quarta remouet citrinitatem ab oculis & a toto. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sexerum. Vbi tamen cholera esset preter modum multiplicata, intentio secunda, quae est cholerae euacuatio, debet esse prima, tum quia tanta multitudo cholerae non datur inducias, tum quia iuuat ad sui ipsius multiplicationem. Si ergo causae fuerint primitivae, iuxta primum intentionem remouendae sunt, & nocumenta per ipsas impressa, unde intendatur morsui uenenosum trahendo uenenum exterius cum applicitis super loco morsu, sicut culus gallinae uiuentis. Et si emplastra nouiter mortua per medium secta, & item partes supra locum morsu quodlibet uenenosum frigidis & stipticis, sicut aqua rosacea, aceto & succis in frigidantibus proprijs cum debita strictura. Et contra fortetur cor & membra nobilia. Et dentur bezaharica propria contra illa. Et remouetur caliditas & siccatas superflua per uenenola impressa. Similiter si uenena fuerint sumpta procuretur eorum uomitus & secessus. Et frangatur ipsorum acuitas cum promembrorum et humorum superflua caliditas. Idem est iudicium in reliquis causis primitiuis. Similiter autem corporeae per communiter a toto remouentur, sicut febres cum quibus oportet. Et secundum plurimum opus est extingui illas febres illae sua caliditate superflua, subtili sanguinis in cholera couertat. Aut solutis est euacuatione, aut cum phlebotomia in capitulis proprijs. Crisis autem cholerae ad cutim iuxta aphor. 6. quartae particulae. Imò potius adiutendo uestes citrinas & reliquis auxilijs, & cum hoc frigidum est in ipsis educit per poros cutis, cum manifeste sub forma sudoris cholera educitur. Si uero causa multiplicationis cholerae fuerit caliditas

superflua epatis aut totius, naturalis aut praeter naturam, aut etiam cuiuscunque alterius membri studendum est in remotione eius, & inductione dispositionis contrariae. Complentia autem hanc intentionem sunt infrigidantia magis aut minus potentia, secundum exigentiam sui contrarij, dispositiones tamen naturales magis paulatim permutandae sunt, quam praeternaturales. Cum hoc tamen semper cauendum ab oppilatione. Eligatur ergo regimen sex rerum, declinans ad frigidum & humidum, de quo infra in sexta intentione. Item regimen medicinale complendum cum his quae interius sumuntur sicut syrupus acetosus simplex, oxisacchara, syrupus de granatis, de acetositate citri, limonis & similibus, cum aquis endiuiae, lactuca, epatice, acetosae & similibus, quae aliquando possunt aromatizari cum infusione sandalorum et similibus, electuaria conuenientia sunt sicut triasandali, diarrhodon abbatis. Trochisci conuenientes sunt sicut trochisci de camphora de quibus in textu. Et ex succis conuenientibus est succus solatri, endiuiae, acetosae, qui possunt sumi cum aqua hordei. Item succus granatorum, succus berberis, acetositas citri & limonis. Applicanda autem exterius sunt, sicut cerotum sandalinum, applicandum epati. Item epithimata cum sandalis, spodio, aqua endiuiae, epatice, rosacea, aceto similiter applicanda epati. Item infrigidans Gal. applicandum renibus. Item cordialia applicanda cordi, de quibus omnibus superius dictum est. Et cum his & horum membrorum uirtutes confortabuntur.

Secunda intentio, scilicet cholerae euacuatio perficitur cum manna aut cassia distemperatis cum infusione prunorum & tamarindorum. Item cum infusione reubarbari, & etiam cum ipso sumpto in substantia. Et fortiora sunt electuaria succi rosarum, electuaria de psillio, pilulae aureae, aloes lotus & nutritus cum aqua endiuiae & solatri euacuat cholerae crassam. Succus rosae euacuat cholerae & aperit oppilationes, est tamen calidus. Tertiam autem intentionem complent ea quae dicta sunt in prima intentione, quae replenda sunt si fuerit expediens. Quarta autem intentio, scilicet remotio citrinitatis ab oculis & a toto complatur iuxta textum cum odore aceti. Item cum balneo in aqua dulci & aceto quae omnia iuuant ad cholerae resolutionem. Si tamen fuerit notabilis caliditas, & proprie febrilis, aqua rosacea oculis imponatur. Quinta autem intentio, scilicet correctio accidentium perficitur, secundum ipsorum exigentiam, ita ut non solum praesentia curentur, sed etiam futura uerisimiliter suspecta prohibeantur. Sed pro sexta intentione, aer declinet ad frigidum, non tamen superflue, ne poros oppilando cholerae resolutionem impediat. Videntur omnia cholerae multiplicancia sicut dulcia, amara, salia, acuta, unctuosae, uinum potens, imò omne uinum nisi particularis conditio obsteret, aut forte sit ex nudis declinantibus ad frigidum, sit album subtile, & cum aqua bene conditionata sufficenter limphetur, uidentur omnia stiptica oppilantia. Ex herbis conuenientibus sunt sicut lactuca, endiuia, portulaca, scariola, epatica, sed possunt misceri cum modico foeniculi & petroselinis. Item asparagi & lupuli conueniunt, cucurbita, cucumeres & similia frigida, & humida, et si sunt salata, possunt condiri cum aceto, uino granatorum, agresta & similibus.

H

Et ex his ferculis conueniunt hordeum, far, ptisana hordeacea, ex carnibus eligantur quæ sunt facili digestiois, boni chimi, paucarum superfluitatum & pisces parui petrosi, et similes bene conditionati, concedi possent elixi aut assi & conditi cum declinantibus ad frigidum sicut sunt suprascripta, & succus arancij, limonis & citri, & caro ericij est propria & caroli maciarum. Ex fructibus conceduntur poma perfica, pruna, melones, anguria, cerasa & similia ad frigidum declinata, somnus sit satis prolixus, exercitium paruum, procuret euacuationes naturales, sit sperans & gaudens, uitet iram & accidentia animi inflammantia.

Cura icteritiæ propter prohibitionem euacuationis cholerae.

Quod si icteritia sequatur prohibitionem euacuationis cholerae, tunc est dupliciter, aut propter debilitatem uirtutum epatis aut kistis fellis, aut propter oppilationem. Quod si sequatur debilitatem cura patere potest ex his quæ dicta sunt in cap. de cura debilitatis epatis.

Si uero oppilationem, exiguntur sex intentiones. Prima remouet causam oppilantem. Secunda cholera ex oppilatione retentam euacuat. Tertia corrigit discrasiam membrorum, ipsam confortando. Quarta remouet citrinitatem ab oculis & à toro. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum. Pro prima intentione. Si causa oppilans fuerit phlegma aut cholera crassa sicut est secundum plurimum sumatur, ʒ. i. aloës in forma pilularum per horam ante coenam, & est efficax si continuetur alternis diebus. Si uero fuerit nimis debile in comparatione ad eum qui solui debet, fortificetur cum tribus aut quatuor gran. diagridij, aut sumatur solutiuum expertum ab Auis. ʒ. aloës ʒ. i. scammoniæ gran. 4. salis naptici gran. 15. rubear tinctorum, agar. ana. ʒ. s. misce, & fiant pilulae, & sunt dos. una. Et sumenda est cum custodia. Aliud in forma liquida. sumantur electuarij succi ros. ʒ. i. s. electuarij indi uel diapheniconis tantundem, uel quantum uidebitur expediens cum sero caprino distemperetur, & sumatur cum custodia. Quod si huiusmodi solutiuu sumerentur cum infusione aloës aut rheubarbari prestantius operarentur. Aliquo ergo aut pluribus ex his utere secundum quod tibi uideretur expediens. Et hæc simul causam oppilantem euacuat, & cholera ex oppilatione retentam iuxta secundam intentionem. Item uomitus confert in omni icteritia euacuando & diuertendo.

Phlebotomia quoque basilicæ & saluarellæ manus dextræ iuuat in aperitione oppilationis maxime sanguine abundante. Et ad aperiendum oppilationes, & ad mundificandum cannales ualet syrupus bizantinus, cum aqua cuscute. Item succus rosarum duarum. ʒ. cum aqua endiuie & cuscute, an. ʒ. 7. & ex expertis est huiusmodi. ʒ. uini albi subtilis, pauciferi aut medij uinositatis, aqua endiuie, an. ʒ. 1. cuscute, prassij, recentium, ana Man. 1. bulliant simul ad consumptionem tertie partis, sed cuscuta potatur in sine, & coletur, de qua colatura dentur, ʒ. 3.

aut 4. cum una. ʒ. syrupi acetosi simplicis, præcedente tamen aliqua euacuatione, cum his de quibus supra. Et de syrupis proprijs ad mundificandum cannales, & aperiendum oppilationes est syrupus de endiuia, de bifantij. Syrupus acetosus simplex saccharinus aut mellinus, syrupus acetosus compositus, oxirinus aut mellinus, & scilliticum si materia est multa, mel compositum, & scilliticum si materia est multa, & crassa, ut in senibus & pinguibus. Aquæ autem sunt endiuie, cichoreæ, lupulorum, cuscute, scolopendriæ, capillorum ueneris, raphani, apij, foeniculi, petroselinij, asparagi, brusci, de quibus in cura oppilationis epatis, & aliquando cum his admiscemus pulueres subtilissimos aperitiuorum, aut cuscute rubear tinctorum, asari, gentianæ & similia. Item conueniunt decoctiones huiusmodi aperientium, & sunt fortiores aquis distillatis sicut decoctio capilli ueni, & rubear tinctorum, seminum aperientium, est tamen dubium in aperitiuis, ne materia rãta feratur ad uisurine quod excoriet, istorum tamen aperientium est uariis usus apud medicos modernos, aliqui dant succos, aliqui ius cicerum, in quo decocta sunt aperientia, aliqui electuaria, ut diarrhodon, dialacca, diacurcuma cū aquis decoctionis distillationis aut expressionis. Tu uero utere fortibus aut debilibus, magis aut minus calidis aut frigidis, secundum exigentiam. Si uero causa oppilationis fuerit apostema in epate, aut in aliquo ramo kistis cura patet ex dictis in cura apostematis epatis, & inter cætera præmittatur phlebotomia. Si uero oppilatio esset carnosæ parua est spes curæ, licet quandoque naturæ beneficio caro ipsa cum mollis est remoueatur, & dicunt quidam ad hanc ualere succum portulacæ, & succum foliorum raphani, & aquam acetosæ, de quibus pro quoque accipiat, ʒ. s. & bulliat simul ad consumptionem tertie partis, & coletur, quibus addatur orobi conuulsi, & coletur, quibus addatur ana ʒ. 1. colicis, tritici, seminis melonis, seminis raphani, ana ʒ. 1. Quod si mirrhæ, an. ʒ. 2. & est pro tribus uicibus. Quod si oppilatio sit a siccitate cum lenientibus & humectantibus aperienda est sicut cum syrupo uiuio. ʒ. i. mixto cum mucillagine seminis citoniorum, sem. psyllij, seminis maluarum, an. ʒ. 1. distemperatis cum tribus ʒ. decoctionis prunorum, sebesten et similia, & cū his posset misceri manna aut cassia si opus esset solutione uomitus quoque quandoque iuuat in aperitione oppilationis. Secunda uero intentio perficitur cum solutiuis, de quibus supra, & ex fortibus & prestantibus sunt electuaria de psillio, & electuaria succ. ros. sed aperta oppilationem leuioribus utendum est, ne forte perducerent ad disenteriam, sufficit ergo aloës lotus, infusio rheubarbari in sero caprino, & similia, aut de his fortibus detur modica quantitas. Tertia uero intentio perficitur secundum plurimum cum frigidis confortantibus membra naturalia, sicut diarrhodon abbatis, triafandali & similia. Quarta autem intentio. Et quinta perficitur cum his quæ dicta sunt in cura icteritiæ sequentis multitudinem cholerae.

Sexta autem intentio, scilicet regimen sex rerum perficitur similiter sicut dictum fuit in cura icteritiæ sequentis multiplicatione cholerae, his additis quæ in cura huius oppilationis non oportet ita infrigidare, & magis cauendum est a crassis uiscosis stipticis oppilationibus, & magis utendum est incisiuis, subtiliatis, abstergentibus.

Similiter si rupto poro uritide, aut homine altera ex causa non potente mingere, sicut uidit in una prægnate impletur uenter inferior aqua non concurrere nocumeto epatis, non esset ascites. Similiter si propter frigiditatem extrinsecam membrorum, aut usum ciborum frigidorum, aut frigiditatem stomachi, non bene dissilicantis nutrimentum non conueniens ad poros membrorum attrahentium, sed non unitum esset causa tumoris qualis in hypofarca non diceretur tumor ille hypofarca, quia non concurreret nocumentum epatis, propterea in descriptione addendum est, quod est egritudo materialis pendens à nocumento digestiue epatis, appropriat enim hæc egritudo epatis, sicut febres cordi. Ex quibus sequitur quod si uenter esset tumidus, aut membra manifesta omnia in ca sibus superscriptis, ille tumor non esset hydrops, qui hydrops, quamuis non pendeat ab errore digestiue epatis nisi in conseruari. Causa remota est debilitas, uel corruptio digestiue epatis, cuius causa est aliqua egritudo eius, aut per essentiam, sicut mala complexio cuiuscunque generis sine materia et cum materia Item mala compositio sicut paruitas epatis, oppilatio, solutio continui, licet raro, apostema uero frequenter calidum, frigidum, molle & durum, quandoque oppilans officium uenarum ascendentes per communitatem uero, aut à toto, sicut in febribus chronicis, aut acutis, quæ paucificando calorem innatum epar debilitant, & faciunt digestiua ipsius errare, ut pro sanguine generet phlegma, aquositate, aut uentositatem. Calor namque epatis & etiam totius quandoque paucitatem resoluitur, quandoque uelociter extinguitur, quæ extinctio potest esse tamen à calido superfluo, sicut à febribus acutis quam à frigido, sicut à potu aquæ frigidæ & hyemæ, & post balneum, exercitium, et coitum. Item ab omni exsiccante et humectante superfluo. Item omnes euacuationes superflue paucificant calorem innatum, sicut euacuationes per sudorem, urinam, solutionem uentris cum rasura intestinorum, aut sine. Item per menstrua, hæmorrhoidas, fluxum sanguinis narium, & euacuatio sanguinis superflua quoque modo, aut per quancunque regionem, hæc. n. paucificant calorem innatum debilitant epar, & faciunt eius digestiua errare. Nocibilium omnium euacuationum est, euacuatio sanguinis. Per communitatem uero à membris particularibus, sicut à pulmone et diaphragmate apostemantur, aut cum pulmo est ple nus aqua, aut cum aliquid eorum superflue calefit, aut infrigidatur, nam decima tertij, cap. de apostematibus accidentibus pulmone multo quidam perducunt egritudines pulmonis ad egritudines apatis, si tamen perducit uehementia frigiditatis eius, & uehementia caliditas eius ad hydropisum, & similiter uelamini, id est, diaphragmatis. Similiter cum empyima in mæchi & malitiam complexionis eius. Et proprie cum succedit fluxus uentris sanguinolentus, aut est propter mælaricæ, id est, nocumentum in mesenterio. Aut propter coitatem splenis, aut propter magnitudinem suam, aut propter apostema durum in ipso, aut leuia calida. Aut quia non bene modificat epar à melancholia, aut quia nimis coplet ea. Et sic impletur nocet stomacho superflue infrigidando ipsū, est, n. ipsi contrarius, aut

nocet ei acredine malacholice quæ est in ipso inficiendo sanguinem, aut faciendo ipsum acrefcere, aut forte quia cum melancholia attrahit etiam multum de sanguine. Vnde uirtus digestiua epatis debilitatur. Et quandoque communitate renum, scilicet propter caliditatem superflua, aut frigiditatem, aut propter eorum oppilationem, aut duriciem, quare non attrahunt aquositate, aut propter egritudines intestinorum, et proprie monoculi quia est propinquum epati. Item propter uescam & matricem multis ex causis satis notis. Non enim hæc membra causant hydropem solum communicando malam complexionem epatis, imò propter eorum oppilationes, dolores & apostemata, & aliquando communicando materiam ipsi sicut sæpe facit matrix cum oppilatur. Et quandoque per communitatem sphincteris cum sanguine, hæmorrhoidalis fluere consuetus retinetur. Et plurimum communicant membra fecis concauitati, & membra pro retentione, scilicet urinæ, & anhelitus gibbositati, et quandoque læditur epar læsione educente ad hydropem, propter apostema siphac regentis epar, uerum plurimæ communitates perducunt ad hydropem, sunt communicationes cum renibus, orbo, splene, mesenterio, & stomacho, & causa in orbo de quo minus uidetur est, quia ordinatus est in complementum primæ digestionis. Causæ autem primitiue sunt in ordinatum regimen sex rerum non naturalium, quod manifestabitur ordinando regimen conueniens pro cura hydropis. Item causæ extraneæ, sicut percussio, calus, & offensio super epar, et similia. Sed dubitat Auic. quæ species hydropis est deterior, in quo dubio tenendum est cum Auic. ascitem esse deteriorem secundum plurimum, tum quia prouenit à deterioribus causis, sicut sunt apostemata epatis febres malignæ fortissimæ, sicut impressiones à causis primitiuis, et quia debilitas digestiue faciens aquositate est maior, quia si aquositas generetur à frigiditate epatis, non generatur nisi à magna, à qua non generatur phlegma aquosum, neque uentus sed à minori. Si uero à caliditate generetur superflua, hoc est, quia caliditas naturalis paucificatur in quanto per resolutionem proprii humiditatis & spirituum multo magis quam in tympanite, aut hypofarca. Secundo quia aquositas in uentre congregata difficilius educitur quam uentositas, ut manifestum est propter maiorem crassitatem, & difficultatem phlegma, quia licet phlegma sit crassius, est tamen ad minimam dispersum per uniuersam corporis superficiem, unde minus causæ resoluendi resistit, & cuilibet parti eius calidum resoluens melius applicatur, & e contra in ascite. Tertio quia accideria sequentia ascitem & causas eius sunt deteriora, sicut uehementis grauedo corporis, suffocatio, syncopis, materia aquea quæ implet concauitatem exstante et resudante ad spiritalia. Et propter ascensum uaporum corruptorum ad omnia membra nobilia. Tenendo secundo cum Auic. quod hypofarca secundum plurimum est minus mala ceteris, propter tres causas contrarias superscriptas. Ex quibus inferit tympanitem esse mediam secundum malitiam, & quod licet in qualibet ex tribus speciebus reperiat aliqua mortalis, et aliqua salubris, secundum plurimum tamen minus mortalis & magis salubris est hypofarca, e contra ascites, sed tympanites media. Contra determinationem instat. Primo quia hypofarca nocumentum est in omnibus membris.

cum sit causa in ea ut plurimum corruptio digestio-
nis tertiæ, quæ est in omnium membrorum uenis,
nam ubi deberet generari humiditas prima de secun-
dis generatur humiditas phlegmatica inconueniens
pro nutrimento membrorum. Item leditur digestio
quarta omnium membrorum, quia nutrimentum
inconueniens attrahitur in porositatibus membro-
rum & non unitur neque assimilatur, & cum hoc est
nocumētum digestionis secundæ, sicut in ceteris quæ
aliquando sequitur defectum digestionis primæ. Et
confirmatur quia omnia membra nobilia & ignobi-
lia tument propter causas dictas, & sic omnia multū
leduntur. Secundo instatur quod tympanites sit de-
terior cæteris, quia sicut se habet uentus ad aquam, &
phlegma in comparatione ad sanguinē laudabilem
ita digestio per quam generatur uentus ad digestio-
nes, per quas generatur aqua & phlegma in compa-
ratione ad digestionem, per quam generatur bonus
sanguis, sed uentus magis distat à sanguine laudabili
quam aqua et phlegma, ergo similiter digestio per quā
uentus generatur magis distabit ab optimā digestio-
ne generante bonum sanguinem, quam digestionem
per quas generatur aquositas & phlegma, maior ma-
nifesta, quia affectus & causa sunt proportionales, si-
ue similes in bonitate et malitia, sed minor probatur,
quia uentus in modo substantiæ magis distat à san-
guine quam aquositas & phlegma, ut manifestū est.
Item magis in complexione cum sit frigidus et sic-
cus, sed aquositas & phlegma frigida & humidæ, un-
de conueniunt cum sanguine in humiditate. Ex quo
sequitur quod tympanites, cuius causa coniuncta est
uentus sit deterior cæteris, quia quanto aliquid ma-
gis distat ab optimo in aliquo genere illud est deterius.
Tertio instatur quod tympanites sit minus mala
ceteris tum quia uentositas facillimè resoluitur, secū-
do quia à leui causa generatur tam ex parte ciborum
quam ex parte caliditatis. Vnde non significat tan-
tum lapsum quantum alię duæ. Tertio non commu-
nicatur nocumentum uniuersale toti, sicut in hypo-
sarca. Ad primum conceditur quod nocumentum
est in omnibus membris in hypofarca, sed ex hoc nō
sequitur, quod sit cæteris deterior cum similiter in alijs
duabus nocumentum sit in omnibus membris, scilicet
omnium membrorum fortis exiccatio substantifica,
quæ non est in hypofarca. Præterea nocumentum
commune non semper est deterius nocumento parti-
culari, sicut in lepra quæ est cancer uniuersalis compa-
rata cancro particulari, quæ est deterior & non sana-
bilis, nisi cum euulsione mēbri cancerati, tertia quar-
ti, capitulo de cancro, & capitulo de lepra, lepra autē
multotiens sanatur membris non amputatis, ita etiā
de febre comparata alijs ægritudinibus particulari-
bus. Et ad confirmationem, dicitur quod quamuis
lædatur tres digestionem, secunda, tertia, et quarta di-
minute aut corrupte, tamen secundum plurimū læ-
sio secundæ in tympanite & ascite est deterior, & mi-
nus corrigibilis quam læsio trium in hypofarca, &
pendens à fortiori causa & minus corrigibili. Et ad
secundam confirmationem dicitur nō omnia mem-
bra tumere, sed bene manifesta ignobilia & forte ca-
ro cuti propinqua, sed cor, pulmo, epar, & cætera no-
bilia non tument, et quæ nutritum secundum plurimū
eius sit inconueniens in mēbra nobilia & ex nutrime-

to est cōuenientius attrahit ipsum, unientia & assimi-
lantia, & residuū pro ignobilibus relinquunt, & for-
te illud quod attrahunt aliquantulum perficiunt. Est
multum excreceret malitia nutrimentum, forte tument
membra nobilia & tandem sequeretur mors. Ad se-
cundam rationē negatur maior generaliter sumpta,
sed bene cōceditur quod sicut se habet uentus ad aquam,
& phlegma in malitia in comparatione ad sanguinē
bonum, ita se habet digestio generatiua uēti ad dige-
stiones generatiuas aquæ & phlegmatis. Vnde sicut
uentus faciens tympanitem est medius in malitia &
difficultate extractionis inter aquam et phlegma, ita
digestio per quam generatur uentus est media in ma-
litia inter duas alias digestionem, non tamen est medi-
us in modo substantiæ & in cōplexione, nec oportet
in omnibus affectum assimilari causæ, præcipue illi
quæ non est totalis. Ad tertiam sequendo conclusio-
nes dictas, dicitur quod licet uentus cæteris paribus facili-
us resoluitur quam phlegma, & quam aquositas, attamen
uentositatis multa cōclusa in uentre difficili-
us euacuatur quam phlegma per mēbra ad minima
diuisum propter causas suprascriptas. Ad secundam
negatur quod leui causa generatur, imò secundū plu-
rimum sit à corruptione primæ & secundæ digestio-
nis à fortiori causa proueniēte quā nocumenta secū-
dæ, tertiæ, aut quartæ digestionis facientis hypofar-
cam. Ad tertiam patet ex dictis, qualiter sit responde-
dum. Si quæ autem sint authoritates quæ sonant cōtrari-
um determinationis Aui. dic quod fuerunt opinio-
nes cōtrarię opinioni Aui. uel si forte dixerint hy-
pofarcam esse deteriorem intellexerint ratione cōmu-
nitatis nocumenti toti, aut maiori parti corporis. Si
uero dixerint tympanitem deteriorem, intellexerint
ratione maioris distantię uenti à sanguine laudabili in
cōplexione et modo substantiæ quam phlegmatis, aut
aquositatis, & intellexerint de tympanite sequente
febres acutas, sicut sanguinē pestilentialē, eo quod
Aui. uero intellexit ascitem esse deteriorem, eo quod
sit magis mortalis & minus salubris quam reliqua.
Hypofarcam uero e contra & tympanitem hypo-
& hanc sententiā iam dictam in cōparatione hypo-
sarce, & tympanitis affirmat magis experientia quā
ratio. Ego uero in diebus uitę meę uidi paucas hypo-
sarcas & multas tympanites, & utraq; secundū plu-
rimum sanatas præter quasdam tympanites, siue ue-
ras, siue non ueras euenientes in febris acutis quali-
subito & in propinquitate mortis ascites uero cum
multas uiderim paucas uidi sanari.
Nunc uero agamus in speciali de causis specierum
hydropisis, & primo ascitis quæ cum fiat ab aquo-
sitate expulsa ad concauitatem uentris inferioris. Pri-
mo ponam causas multiplicationis eius 2. derivatiōis
eius ad concauitatem iam dictā, & cur non fluat ascites
as cōsuetas, per quas si copiose fluere nō fieret ascites
Causæ ergo multiplicationis sunt ex parte mate-
rię agentis, ac extrinsecorū. Ex parte materię sunt po-
tus aquæ, aut uinum multum limphati. Item cibi su-
perflue humidi et aquosi, sicut cerasa, persica, & si-
poma, cucum. angur. melones, uuæ immaturæ, & si-
milia. Ex parte uero agentis, debilitas aut corruptio
digestiue epatis, de quibus dictum fuit in cap. de de-
bilitate epatis. Sed ex parte extrinsecorū, sicut
aër humidus & frig. qui circūdat & inspiratur ab his
qui

qui habitant loca terrena, & carceres, & meatus subterraneos longo tempore, & qui habitant in uallibus & balneatur in aquis, aut bibunt eas, & propriè post exercitum, balneum, aut coitum. Causæ uerò sparium uel uesciæ, uel ex parte ipsius aquæ. Ex parte epatis quâdo eius expulsiua est debilitata, ita ut non possit expellere ad uias urinæ, aut corrupta, quare ex parte uentrem quod non debet, uel fortè in uena magna, uel emulgentibus est oppilatio, aut in gibbo epatis, quare aquositas non potest penetrare. Aut in gibbo epatis est apostema, & propriè durum ex parte renum, quia in renibus fit oppilatio, uel apostema, propter quod aqua non potens penetrare regurgitat ad epar, uel fortè eorum attractiua debilitatur, uel fiant in ipsis ulcera dolorosa. Ita ut propter dolorem aut ardorem ex urina fugiant ab attractione. Similiter intelligatur de uesciæ & poris uritibus. Ex parte uerò aquæ quod fit tantæ quantitatis quod superet expulsiuam epatis, & sequestratiua uenas, & propriè per uenas mirach, & resudando penetrat in concauitatem mirach. Et hæc est una de uis quæ aqua penetrat per concauitatem mirach, scilicet aqua penetrat per uenas communes mirach uel perueniens ad uenas quæ ascendit ad fumen, per quas & quod hæc penetratio licet mirabilis, sit possibilis, patet quia medicinæ cholericæ aliquando penetrant per spondyles ad nucham, per quam penetrationem sequitur paralysis, ut suprascriptum est in paralysis. Secunda uia quod penetrat per meseraicas, & ex eis resudat ad concauitatem, sed certe facilius esset eius penetratio ad concauitatem intestinorum, sed hoc accideret epateresudat ad concauitatem. Quarta si aliqua uia uel meatus frangeretur, sicut uena aliqua de prædictis, aut forte unus ex poris uritibus. Et per scissuram illam fluere ad concauitatem. Causæ uerò speciales nutrimenti in poris, sed non unio propter phlegmaticitatem suam. Vnde tument membra exteriora, est corruptio digestionis tertis, scilicet quæ fit in uenis ad phlegmaticitatem. Vnde generatur prima humiditas de secundis phlegmatica cruda, inepta ad nutritionem. Et semper concurrunt nocuum digestionis secundæ, aut aliquando primæ similiter declinantis ad phlegmaticitatem & cruditatem. Causæ uerò corruptionis harum digestionum sunt malæ complexio nes horum membrorum frigida & humida, aliquando oppilationes, aut apostemata frigida maxime in epaterioribus obtundentes calorem innatum, & prohi-bentes superflua euaporare. Causæ autem primæ carceribus, cameris terrenis, & locis paludosis, & similibus, de quibus supra. Item cibi frigidi & humidifragilis, potus aquosi, res uiscosæ, & similia. Et faciens carnes. Quapropter humores liquefacti peruenientes ad renes oppilant eos crassitie sua, unde non potentes descendere sparguntur per corpus & sic hydropica. Tympanitis uerò causæ sunt secundum plu-

rimum corruptio digestionis primæ. Cuius causa est debilitas digestiua stomachi uel quia materia, id est, cibus qui sumitur est uentosabilis, caliditas enim stomachi debilis, operationem debilem faciens in cibo, facit, ut cum peruenit ad epar cōuertatur in uaporem, aut uentositatem eo quod non est præparatus in conuersione sanguinis, quia non habet aliquationem bonam cum permixtione partium subtilium cum crassis. Vnde separatæ uentosantur facilliter. Secunda causa est debilitas caloris epatis quæ agit in cibis, uel materias humores sibi uicinas ita ut non sufficiat transmutare & agere in eas nisi euaporando.

Tertia causa est caliditas intensa in stomacho & epate extranea quæ agit in cibos humidos actione disproportionali antequam calor eorum, ut naturalis incipiat digerere. Vnde conuertit eos in uaporem & uentositatem. Quarta causa est multus usus ciborum uentosabilium, ut sunt legumina recentia, fabæ, fæseoli, allium, cepe, porri, fructus humidi, sac, acrosta, uinum granatorum, & similia. Sed hoc sciendum quod digestio qua generatur uentositas, & similiter caliditas eam generas dicitur corrupta, quia generatur aliquid non habens rationem humoris, hæc autem uentositas generatur ex cibo assumpto. Aliquando ex humiditatibus reperiis in stomacho, intestinis, epate & partibus uicinis à caliditate extranea ipsas subtiliant in uaporem crassum, aut uentositatem. Item sciendum quod in febribus pestilentialibus, imò in multis acutis pestilentialibus, sicut in synocha & similibus fit inflatio uentris & tympanites, cum representatione soni tympani, & hoc fit à caliditate forti, sed debili in quantum naturalis à multitudine materierum, aut crudarum per uiam indigestionis multiplicatarum aut corruptarum per malignam putredinem quæ per actionem huius caliditatis uentosantur, & euaporantur, sed non resoluuntur, quia maior est eorum multiplicatio quam resolutio, & est malum signum, & secundum plurimum mortale.

Signa primo ponuntur communia ferè omnibus hydropicis. Deinde de signis cuiusque speciei specialibus agam. Primum, est mutatio coloris à naturali uiuido ad malum diuersum, tamen secundum complexionem epatis. In frigida enim mutatur ad album plumbeum, in calida citrinum qui aliquando non aduertenti apparebit rubeus rubedine sana. Sed si bene & distincte notabitur, uidebitur in oculis mutatio à uiuiditate sana, & à pulchritudine in sinu oculorum & circumferentia maxillarum, & in his coloribus bene caueant medici ne decipiantur. Secundum signum est inflatio oculorum, pedum, & interdum manuum nisi in tympanite. Sed in hyposarca plus quod prouenit propter humiditates & uapores crassos comunicatos partibus extremis nisi in tympanite, ubi nullus tumor nisi in uentre reperitur. Manus autem non ita inflantur sicut pedes, quia fonti caloris propinquiores, per quem fit resolutio, uirtutum naturalium confortatio, & cum hoc propter fortitudinem expulsiue non recipiunt superflua. Secundo quia frequentius mouetur. Tercio quia humores graues amplius sunt parati descendere, contingit tamen aliquando unum crurium plus altero tumescere, uel ex maiori eius debilitate, uel quia materia in membris superioribus eiusdem lateris magis continetur. Tertium signum est

propinquarum, quod est in tympanite Quintum, & sequuntur eam fluxus ventris sanguinolentus & lenitas nature tendens in albedinem, scilicet phlegmaticam, quod signum uerificatum fuit in signis generalibus. Sextum, & quandoque pulsus eius est undosus, latus, lenis, propter multam humiditatem.

Prognosticum Auic. autoritate aliorum, quando in facie hypofarcici, aut manu sinistra eius sit molities, id est, paralytis & accidit in princ. huius accidētis pruritus in naso, moritur in secundo die, aut in tertio. Significatur enim magna corruptio, unde fit uaporum corruptorum eleuatio ad superiora qui faciunt pruritum in naso, quare stante tanta corruptio necum debilitate uirtutis significata per paralytim moritur festine. Signa tympanitis. Primum, egreditur in ea fumen notabiliter. Secundum, non est in ea grauitas sicut in ascite. Tertiū, est in uentre maior tensio quam in ascite, imò uenter est sicut chorda tensa. Quartum, & non est in ipsa pinguedo, id est, inflatio cum mollitie aliorum membrorum, sicut in hypofarca, imò tendunt ad arefactionem. Quintum, & cum uenter percutitur auditur sonitus uentris pleni aëre non uentris pleni aqua. Sextum, & est appetens eructuationem semper, & iuuatur ex ea propter exitum uentositatis. Septimum, & eius pulsus est longior pulsu aliorum hydropicorum propter tensionem cum fortitudine uirtutis in comparatione ad ascitem. Et propter hoc apparet durus, uelox, frequens, cum propter inobedientiam instrumenti non possit satisfacere cum magnitudine, est satis fortis cum uirtus non debilitetur sicut in ascite. Octauum, & non est inflatio in ea omnium membrorum, sicut in hypofarca, nec pedum, sicut in ascite causa patet ex dictis.

Prognosticum. Primum, homo de quo uehementius timetur cum accidit ei hydropis est ille, cuius complexio naturalis est calida & sic, non enim agrotat in eam. Secundum, hydropis adueniens propter duritiem plenius, est magis salua quam ueniens propter duritiem epatis, imò est in qua operatur curatio. Tertiū, quando dominatur materia hydropis adeo ut faciat nem anhelitus, & solutionem uentris significatur propter iniquitatem mortis in tribus diebus. Si autem noceatur anhelitus propter malam complexionem officialem, id est, membrorum officialium, sicut diaphragmatis pulmonis, non est ita malum sicut propter multitudinem materie. Quartum, ulcera maligna oris & ginguarum, & reliquarum partium, accidentia in profluuiis, iam uirtute defecta propter malitiam uaporū & sanguinis, significant mortem non multum distare. Quintum. Quando descendit ex hydropico quod est sicut caro pronuntiatur mortem eius, forte enim illud descendens ex epate significat eius corruptionem. Sextum. Si aliquid habenti melancholiam accidat hydropis curatur per aduētum hydropis, quoniam superueniens mortalis nisi euacuatur causa hydropis. Octauum. Venter siccus in hydrope est melior quā lenis, & propriè si hydrops proueniat ex nocumēto renum & mebrorum urinae. Nam in hoc fit lenis uenter propter reuersionem humiditatis ad intestina. Et siccatas uentris est maior in hydrope sequente no-

cumenta membrorum anteriorum, & quando surmen, & formosalia sunt carnosia est melius, significat fortitudinem & tolerantia solutionis, & his possunt exhiberi solutiua fortia. Nonū. Omnia ulcera in hydropis sunt difficilis curationis. Decimum. Omnis hydrops sequens peripneumoniam est mortalis. Undecimum. Hydrops ascites est secundum plurimum mortalis, sed hypofarca, & tympanites secundū plurimum salubris, nisi tympanites quasi subita sequens ægitudines acutas, sicut synochas pestilenciales, & similes quæ ferè semper est mortalis. Duodecimum. Omnis hydrops in acuta febre malum, secundo prognostic.

Cum uenter post epatis dolorem & feb. augmentari coeperit, & quod est ab umbilico usque ad femur exterius prominuerit, & cutis quæ est ibi subtiliari & albere uisa fuerit, & cum uenter mouetur, auditur sonus quasi aquæ in uase non pleno moto, & si cum his urina fuerit rubea, parua est habenda fiducia, propriè si uirtutis non affuerit fortitudo.

Hoc capitulum diuiditur in tres partes. In prima Rasis curat ascitem. In secunda hypofarcam. In tertia tympanitem, secunda ibi. Quod si in palpebris, tertia ibi. Si uero uenter. Prima in 2. Primo ponit signa ascitis: 2. curam, secunda ibi. His tñ. In prima parte ponit quatuor signa. Primum quod uenter post epatis dolores qui sequuntur ad apostemata, aut alias eius ægitudines coeperit tumere ita ut ab umbilico usque foemur exterius eminuerit, imò etiam super umbilicum, licet minus. Secundum quod cutis uentris uisa fuerit albere & subtiliari quasi tensa à re alba. Tertium cum uenter mouetur auditur sonus aquæ in uase non pleno moto, hæc tamen significant hydropisim, ascitem. Quartum & si cum his urina fuerit rubra, scilicet notabiliter & cum cōditionibus suprascriptis, scilicet quod non fuerit ualde pauca, nec malæ substantiæ quæ significant & ipsam pendere à causa calida. Et consequenter parum sperandum esse & maxime uirtute existente debili cum deterius sit hydrops calida quæ frig. hæc quatuor significant ascitem mortale.

His tamen si uirtus fortis fuerit, & uenter uehementer siccus, pilula de rauced seni dandæ sunt, quæ Rec. rauced seni, succi eupatorii, sem. endiuia, omnium anad. drach. 3. agar. drach. 5. mezereon drach. 10. fiant ex his pilula, quarū dosis sit drach. 2. s. ex quibus quaque hebdomada dosis una sumatur.

Quod si uirtus fuerit debilis trochisc de mezereon dandi sunt. Qui Rec. sem. endiuia

endiuiæ drach. 10. mezereon drach. 1. & 2. tertias agarici, succi eupatorii similiter tantundem, rosarum, sem. citrullorum amborum ana drach. 2. & 5. ex his omnibus fiant trochisci 10. de quibus unus in die cum syru. aceto. de saccharo dandus est. Si autem uenter fuerit solutus dentur trochisci de berberis cum syru. acet.

Ager quoque nutriatur ex zibregi. Et bibat syrupum acetosum de citonijs. Et si uentris solutio uehemens fuerit citoniorum rob solum dandum est,

Hic curat ascitem primo à causa calida. secundo à causa frigida, secunda ibi. Si autem cum his. In prima parte ponit tria remedia. Primum uirtute existente forti, & uentre sicco pilulæ de raued, id est, de rheubarbaro in quibus ponitur mezereon. 12. raued, feni, sed loco ipsius accipimus rheubarbarum, & est melius, succi eupatorii, semi. endiuiæ añ. 3. 2. agar. 3. 5. mezereon 3. 10. fiant pilulæ, quarum dos. est 3. 2. 8. & quaque hebdomada sumatur dosi infra cum custodia. Si uero uirtus fuerit debilis dentur trochisci de mezereon, ut 12. semi. endiuiæ 3. 10. mezereon, agarici, succi eupatorii añ. 3. 1. & 2. 3. rosarum semi. citrullorum añ. 3. 2. 5. ex his fiant trochisci 10. de quibus unus in die cum syrupo acet. de saccharo dandus, trochisci isti sunt leues, sed pilulæ fortes & non dandæ nisi uirtute existente forti. Est enim mezereon calidum & sic in quarto excoctum, serosum, inflammabile, consumptiuum & dissolutiuum uirtutis, educens aquam citrinam cum fortitudine, cuius dos. substantia est à 3. s. usque ad unam & nocet epati nisi rectificetur, sed semen endiuiæ, & succus eupatorii, & semen citrulli ipsum rectificat, mezereon tamen bonum communiter non reperitur apud nos. Secundum remedium, quod si uenter fuerit lubricus dentur trochisci de berberis cum syrupo acetoso, in frigidant enim & stringunt. Tertium, quod ager nutriatur ex zibei uel zibregi, qui est cibus factus ex carne cocta, & ouis simul mixtis, & bibat syrupum acetosum de citon. Et si uentris solutio uehemens fuerit, citoniorum rob solum dandum est ad uentris constrictionem.

Si autem cum hac passione non fuit urinarub. nec calor, pilulæ istæ dandæ sunt, quæ. Recip. mezereon, sagapeni amborum ana drach. 5. salis indi, fimi columbi amborum ana 6. drach. 1. pilulæ enim istæ aquam uehementer descendere faciunt. Trochisci præterea de lacca cum apozimate de radicibus dandi sunt. Emplastrum asciti conueniens. Rec. fari, hord, cipe-

ri, stercoris bouini ueteris, baurach. boli ar. omnium partes æquales ex his omnibus tritis fiat epithyma super uentrem, huius nanque proprietas est aquæ magnam partem exiccare.

Hic curat ascitem à causa frigida per tres medicinas. Prima medicina est. Quod si cum hac passione non fuerit urina rub. nec calor scilicet febrilis, aut complexionalis superfluis, pilulæ istæ dandæ sunt. mezereon, sagapeni cal. in tertio, sic in secundo educunt humores crassos & uiscosos, & aquam citrinam añ. 3. s. salis indi cal. & sic in tertio, soluentis melancholiam & humores uiscosos, fimi columbini calidi in quarto soluentis pungendo & dissolueno añ. 3. s. fiant pilulæ & sunt dosi una, & potenter soluent aquam, in aliquibus tamen libris non sunt sal indum, neque fimi columbinus, credo illos textus esse meliores. Secunda medicina est, ut dentur trochisci de lacca cum decoctione de radicibus quorum descriptiones cessit in cap. de dolore epatis, aperiant oppilationes & prouocant. Tertia medicina est hæc. boli hord. ciperi, stercoris bouini ueteris, baurach. boli arm. omnium añ. partes æquales fiat epithyma super uentrem, permiscendo cum aliquo liquore, sicut esset aqua cineris & uinum album. luit enim resoluendo aquam.

Quod si in palpebris & extremitatibus fuerit apostema molle, & testiculi apostemantur, faciesque ac totum corpus mollescit quadam teneatur, erit tunc hydropisis species quæ hypofarca uocatur. Aegro itaque hac specie laboranti trochisci de lacca cum apozemate, de radicibus sunt tribuendi. Et uenter quaque hebdomada ex pilulis de rheubar. est soluendus. Et patiens in arena calida est sepeliendus. Et quoque est precipiendum ut exercitio utatur. Et famem, & sitim sæpe patiatur.

Hic curat hypofarcam dicens: quod si in palpebris & extremitatibus fuerit apostema molle, & testiculi apostemantur, id est, oscheum, & forte testiculi cum eo, & facies, & totum corpus fit factum molle cum quoque tumore quæ omnia sunt signa hypofarce. Pro cura hac ægritudine laboranti, sunt tribuendi trochisci de lacca cum decoctione de radicibus ad mundificandum corpus per uiam urinae, & aperiendum oppilationes, & frequenter exhibeantur. Et uenter quaque hebdomada soluendus cum pilulis, de rheubar. quoque possunt fortificari reformando eas cum succo ieros. Pilulæ tamen de raued. Mesue sunt fortiores. Et factis euacuationibus patiens in arena calida sepeliatur ad resoluendum phlegma aquosum. Et exercitetur stomacho ieiuno. Et fac sæpe famescat & sitiat.

Suero

Si uero uenter inflatus fuerit, ac tensus, & cum percutitur sonum reddit ut tympanum, hydropisis species adesse significabitur quæ tympanites dicitur. Quam qui patitur, à comestione olerum abstinere debet, atque eorum omnium quæ uentositatis sunt generatiua. Venter quoque omni die ex panico est uaporandus. Et uentose super uentrem ponenda. Et medicamina tumorem dissoluentia danda sunt, ut diacyminum, & electuarium de bacca lauri, quod in cap. de iliaca nominabimus.

Ager præterea exercitio uti assuescat. Et famem pati. Ex collyrijs quæ uentositatem dissolunt, quorum faciemus mentionem sibi subijciat. Venter quoque mantili donec incipiat rubere fricetur. Et ex oleo rutaceo chysterizetur.

In parte ista curat tympanitæ dicens: Quod si uenter inflatus actus fuerit, & cum percutitur sonat ut tympanum, est species hydropis dicta tympanites & tu supple re reliqua signa tympanitis superius allegeta sunt posita. Sed pro cura, debet abstinere à comestione olerum & omnium quæ uentositatis sunt generatiua. Pro quo nota omnia olera esse uentosa, licet aliqua eorum carminant uentositatem, sicut rutaceo. Secundo est uaporandus cum panico, aut milio & propriè torrefactis. Tertio uentose super uentrem sunt ponenda. Quarto medicamina uentositatem dissoluentia danda sunt, sicut diacyminum, electuarium de bacca lauri, cuius descriptio ponitur in cap. de colica. Quinto ager multum exercitetur stomacho ieiuno. Sexto patiat famem & sitim. Septimo collyria uentositatem dissoluentia, de quibus agitur in cap. de colica subijciantur. Octauo uenter cum panno fricetur donec rubere incipiat. Nonum ex oleo rutaceo chysterizetur.

ORDO CVRÆ.

Quia cura cæcix non differt à cura hydropisis nisi secundum magis & minus, ideo de ambarum curatione simul agendum est. Harum itaq; cura sex exigite intentiones. Prima ordinat debitum regimen sex rerum. Secunda minorat superflua. Tertia digerit, aperit, & membrana naturalia confortat eorum discrasiam corrigendo. Quarta eradicat. Quinta corrigit accidentia. Sexta remouet causas recidiuationis, quia est multum recidiualis. Regimen autem sex rerum non naturalium debet tendere in contrariis causis facientis hydropem, ideo habet diuersificari secundum diuersitatem specierum hydropis & causarum suarum, debet ergo in causa ca-

lida declinare ad frigidum, in frigida ad calidum, sed secundum plurimum ad siccum. Et semper magno opere ad confortationem stomachi, & epatis, & membrorum naturalium. Aer ergo sit clarus declinans ad siccum, quapropter habitet in solari non in loco terreno humido, & sit calidus in frigida, & frigidus in calida, magis tamen cæteris paribus declinet ad calidum in frigida, quam ad frigidum in calida cum in omni hydrope opus sit causam coniunctam resolueri. Vitetur aer uentosus & aquosus.

In cibo & potu obseruentur hæ conditiones. Prima ut sit parcus in utroque, quapropter non comedat nisi præcedentis cibi digestionem celebrata, & nisi notabiliter fameat constante appetitu, similiter non bibat nisi multum situerit. Sunt enim fames & sitis summum remedium in hac ægritudine, & propriè sitis. Quapropter non comedant, neque bibant extra prandium & coenam imò si bene possent tolerare conueniens esset ut non cibarentur nisi semel in die. Secunda ut non multiplicent cibaria in mensa una. Tertia ut surgant à mensa cum reliquijs famis. Quarta ut notabiliter comedant antequam bibant, & nullo pacto bibant aqua. Et si necessitas aliqua cogeret ad aquam misceatur cum uino per 3. aut 4. horas antequam bibat, & ante potum præcedat cibus, ut tardius penetret ad epar. Quod si patiens non biberet uinum à proprietate quadam individuali sibi horrendum non cogatur ad ipsum, sed potius bibat aquam endiuicis, aut absinthij cum syrupo acetoso simplici, saccharino, aut mellino, aut saltem aquam calideatam, est enim aqua summopere uitanda secundum omnem modum administrationis. Vinum tamen in causa notabiliter calida nocet nisi sit ualde pauciferum, unde fortè præstantior est aqua endiuicis, aut ius galli & propriè decrepiti, sed in causa frigida sit potius subtile antiquum clarum, de quo tamen parum bibat, & melius est album quam nigrum. Panis hordeaceus est melior quam triticeus. Si uero abhorreret ipsum comedat triticeum, non omnino à surfuribus depuratum, bene coctum & salitum, cui si administratur semen endiuicis, aut fœniculi, aut anisi erit præstantior. Ex salatis conueniunt in causa calida endiuia, cichorea, lupuli, in frigida, cappares, fœniculi, petroselinum, carota, prassium, apium, asparagi in utraque, & sint debite coctæ, & cum pauco aceto, & oleo conditæ asparagi tamen cum solo sale condiantur. Sed in tympanite olera & propriè recentia uitanda sunt. Ex ferculis conuenit ius cicerum, & phaseolorum, & decoctiones radicum, & semen aperientium, & caulium, & quæ sunt ex pane, aut ouis absque caseo, & quæ sunt ex enula & sit cocta in iure laudabilium carnum infra scriptarum, uitetur tamen superflua usus brodiorum. Ex carnibus conueniunt perdices, phaseani, franguelini, turtures, turdi, alaudæ. Aues paruæ degentes in arboribus & pratis, columbi uolare incipientes, ex quadrupedibus hœdi, cuniculi, capreoli, lepores &c. quæ comedantur in prandio elixæ, in coenis assæ, epata gallinarum optime conueniunt super prunis cocta non multum, pisces uidentur, sed caro limaciarum conuenit, oua conueniunt secundum omnem modum administrationis, & sint mollia non per decoctionem indurata, uitetur lac, caseus, & lactinia omnia, butyro, & oleo raro utatur. Ex saporibus conuenit in frigida mostarda

mostarda, & sapor ex passulis, & sapor ex aromati-
bus in calida acresta, uinum granatorum, de berberis
& quæ cum his fiunt. Aromata conuenientia in fri-
gida sunt cynamomum, zing. piper, grana longa,
crocus, & similia, sed in calida sandali, spodium, co-
riandrum. Fructus conuenientes in frigida, sunt pas-
sula, fistica, auellanae torrefactæ, sed in calida grana-
ta muza. Somnus sit nocturnus sex horarum, aut circa.
Exercitium & propriè stomacho ieiuno est eis uti-
le. Et propriè ambulando per loca arenosa, sicca, &
per montes usque ad sudorem qui continue absterga-
tur. Et tunc caueant à uentis, & post exercitium stent
in sole capite protecto & alijs membris discooperitis.

Accidentia animi conueniunt, sicut lites, ira, solici-
tudo, & similia exiccantia, cauendum est ab acciden-
tibus quibus corrumpitur digestio, sicut tristitia, timor,
& similia, hæc autem exiccantia magis conue-
niunt in ascite, & hypofarca, minus in tympanite. So-
licite procuret omnes euacuationes naturales, imò
etiam non naturales, sicut uomitus si eis fuerit consue-
tus, est enim euacuatio sibi conueniens. Pro secunda
intentione quæ est minoratio huiusmodi causæ. obser-
uentur. Primus, quod diuersi humores euacuentur
crassi, subtiles, choleric, phlegmatici, aliquando mel-
ancholici propriè cum plenus est in causa. Sed in ascite
maximè aquositas, in hypofarca phlegma, in tym-
panite diuersi secundum diuersitatem humorum qui in
uentositatem subtiliantur, sed frequentius phlegma,
deinde melancholia, licet aliquando ex chilo imme-
diate generetur uentositas. Causæ autem tantæ diuer-
sitate humorum est eterogenitas chili cum errore di-
gestiue. Secundus, quod solutiu ista parum sint le-
uiua membrorum nobiliu maximè stomachi & epa-
tis, ut quia sunt leuia sicut benedicta, hiera simplex, pi-
lulæ de rheubarbaro, de eupatorio, aut si opus est for-
tibus sint bene correctæ, & mixta etiam cum his quæ
stomachum & epas confortant sicut ligno aloës cru-
do, schinantho, & similibus.

Tertius, frequens sit eua-
cuatio ne materia multum exuberet, non tamen pro-
uice sit copiosa ne uirtus deiciatur. Quartus, post so-
lutiu dentur aliqua confortantia stomachi & epas
stipticitate moderata, propriè etiam & aromaticitate.
Quintus, non conuenit phlebotomia ratione hydropis,
tū quia materia hydropis, & propriè ascitis, aut tym-
panitis non est multum apta educi cum phlebotomia,
materia uerò hypofarce fortasse magis, tū quia phle-
botomia paucificat calorem innatum per quem epas
& stomachi digestio perficitur, tum quia pauco
existente sanguine in corpore phlebothomia prohi-
betur, quarta primi, ca. de phlebotomia. Verum ali-
quando competit ratione causæ, ut puta apostematis
epatis, in cuius principio debet fieri phlebotomia,
sed post principium minus cōpetit phlebotomia, q̃
si esset apostema solum sine hydrope. Secundo, si
causa hydropis esset retentio sanguinis menstrualis
aut hæmorrhoidalis fluere consueui, tunc ex saphenis
facienda est phlebotomia aut huiusmodi sanguis pro-
uocetur, similiter dico de sanguine retento, per aliam
regionem fluere consueui, in his casibus facienda est
phlebothomia, nisi sit fortis indicatio in cōtrarium,
phlebotomia tamen magis toleratur in hypofarca
quàm in ceteris, quia plurimum materiæ hypofarce
in uenis continetur, licet paucitas sanguinis huic ob-

stet. Et si consiliu tuum sit de phlebotomando, prius
materiæ aliæ multum dominantes sunt minorandæ,
postea phlebotomandum, & sic fiat phlebotomia la-
ta, & propriè in hypofarca ut phlegma cū sanguine
possit educi. Sextus, uomitus aliquando conue-
nit ad mundificandum superflua in stomacho conue-
nit ad mundificationem impediunt, & propriè stom-
acho nauicæ qui fieri potest stomacho ieiuno, & post
sumptionem alicuius cibi iuuantis ad uomitum. Se-
ptimus, dysferia conueniunt in euacuando causam
antecedentem & conuicta hydropis. Item in euacu-
ando materias quibus stomachus & epas debilita-
tur. In dysferibus ergo possunt poni solutiu secun-
dum exigentiam materium euacuandarum. Item
possunt poni aperitiua alterantia secundum exigen-
tiam causæ hydropis. Ego enim in dysferibus aliquo-
tens pono succu ieros in ascite & in tympanite. So-
lutiua eleuarium indum benedictam, & similia. Solutiu
ergo exhibenda sunt hiera simplex ualens in calida &
frigida. Sed in frigida magis, quæ educit superflua &
refertur humiditatibus innatis. Quod si humores
fuerint crassiores, secum misceatur tertia pars agarici
preparati, & fortiora sunt hieralogodion, hiera diu-
colocynthidos & eleuarium indum, & hæc ualent
in cæcexia & omnibus speciebus hydropis, sed in alci
te propriè sunt pilulæ de raueo cum mezereon, quæ
sunt primæ pilulæ descriptæ à Rasi, ualentes in ascite,
calida uirtute existente fortis, sed incipias à 3. i. si uel
uirtus fuerit debilior des trochiscos ab ipso descriptos
ptos etiam ualentes in causa calida, & deur trochiscos
unos, pilulæ tamen de mezereon M. sunt fortiores in his
prestantiores. Ego tamen in his pilulis de mezereon
paucam inueni utilitatem, quod euenit, quia non ha-
bemus bonum mezereon, & in causa frigida Rasi tu-
ber dari pilulas de mezereon cum sagapeno. Ego uerò
in ascite do succum ieros facta residentia à 3. i. usque
ad 6. cū tantum aquæ mellis aut aquæ casei, & si fue-
rit uehementis caliditas cum his misceo, 3. i. sandali
uel tantumdem specierum triasandalorum aut filitum
in fundo, 3. i. postea extraho facta bona expressione.
Vbi autem in fluxibili uentre leuiora sufficiant, do pi-
lulas de rheubarbaro, aut de eupatorio descriptione
Mef. in ascite & hypofarca, & si uolo fortificare eas re-
formo cum succo ieros & sunt optimæ. Item pilulæ
de raueo, Mef. sunt prestantes, ius etiam galli deere
piti cum polypodio & aneto confert & leniter soluit
& alchechengi, almezereon, alsebebram descriptione
Mef. dist. 3. sunt efficacia.

Sed pro tertia intentione, quæ digerit, aperit, & me-
bra naturalia confortat, sunt obseruandi isti can. Pri-
mus canon digestiua sint calida aut frigida secundum
exigentiam sui contrarij. Sed quo ad uirtutes secun-
das sint subtilitativa, absterfua, incisua, aperitiua,
prouocatiua secundum quod oportet, sed quo ad uir-
tutes tertias sint membrorum naturalium confortati-
ua tam proprietate q̃ stipticitate moderata. Hæc au-
tem facilius complemus in complexionem frigida q̃
in cal. tum quia securius possumus calefacere q̃ infri-
gidare tum quia magis efficacia, & a proprietate ma-
gis operantia reperiuntur calida quàm frigida q̃
pter hanc causam facilius curatur hydrops frigida q̃
cal. Item, quia ut dictum fuit in prognosticis hy-
drops

drops cum sit morbus frigidus, quo ad causam con-
iunctam materialem, prouenit a fortiori causa in epa-
te calido quam frigido. Et eo magis si sequatur di-
scrasiam calidam cum ratione discrasiae calidae, quae
est causa antecedens, oportet in frigidare, sed ratio-
ne causae coniunctae calefacere, ideo iuxta cum par-
ua habenda est fiducia in hydrope a causa calida nisi
adliuitutis fortitudo. Secundus canon, quod in
hydrope est morbus ualde chronicus oportet dige-
stui, imò omne genus medicinarum permutare, tum
quia morbus uariatur in decursu per tempora sua, se-
cundo oportet uariare secundum diuersitatem tem-
porum anni, tertio secundum uarietatem uirtutis,
quarto dato quod in supra scriptis nulla fieret uaria-
tio oportet uariare compositiones medicinarum, quae
tamen sunt similes uirtutis habentes diuersa materia-
lia, & diuersos modos ne natura affluat tum ne me-
dicinae huiusmodi tedium afferant agro, propterea
cum uno tempore fuerimus usi syr. alio tempore uta-
mur aquis, postea confectionibus, postea electuarijs,
postea epithimatis, unctionibus, emplastris, cero-
tis, & similibus, & haec aliquando sunt similes uirtutis
aliquando differentis gradualiter aut formaliter se-
cundum exigentiam. Item oportet uariare medi-
cinas secundum diuersitatem intentionum, ut nunc
digerere, euacuare, aut per urinam, aut per sudorem,
aut per uomitum, aut per fluxum ventris & simili-
bus modis. Nunc uero confortare, oportet enim
hoc modo medicinas alterare. Quid enim prodes-
set semper euacuare & non confortare cum membra
naturalia debilia iterum regenerantur quam phlegma
& uentositates, neque iuuaret confortatio absque eua-
cuatione, nec tamen unius modi euacuatio iuuat,
imò oportet diuersas tentare & magis illas sequi quae
magis conferunt. Tertius canon, cum compleuerit
unum ordinem medicinarum, ut puta minora-
tium, digestium, eradicantium, confortantium, si
namus naturam aliquanto tempore quiescere sine
medicinis cum sola dieta conueniente, cuius tempo-
ris longitudo et breuitas debet prudentia medici me-
surari, & hoc ne natura terreatur ex tam continuo
usu medicinarum. In hydrope ergo frigida ualet
syr. de absinthio, qui cum hoc quod non est multum
calidus confortatius membrorum naturalium &
aperitiuus, deinde syrupus acetosus diarrhodon, &
syrup. de eupatorio, qui est his calidior & magis ape-
ritiuus, & si opus esset incisione & absterfione cum
his misceat aliquod oximellis simplicis aut oximel-
lis compositi si fuerit opus magis aperire et prouoca-
re, & syrup. acetosus aut oximel simplex, si opus fue-
rit magis calefacere, in quo steterit infusum absinthii
nem, & confortationem. Aque autem his propor-
tionales sunt aqua absinthij, prasilij, cuscutae, capil. ue-
neris, asparagorum, fenic. apij, & similia. Et ali-
quando dantur sine syr. alicuius confectionis aut
diarrhodon abbatis, aromaticum rosarum, diacurcuma, dia-
don abbatis, in qua est species ad omnem hydropem, dia-
morusa, diacostum, confectionis de ravedeni. Ex tro-
chiscis autem conuenientibus sunt trochisci de ros-
de absinthio, de lacta. Item trochisci de ravedeni de-
scripti a Rasi in capitulo de dolore epatis, & trochi-

sci de reubarbaro Mesue. Item trochisci de eupa-
torio, de capparis maxime ualentes in hydrope se-
quente oppilationem splenis. Ex epithimatis, unctionibus,
& emplastris sunt, quae dicta sunt in cap-
de debilitate epatis. Sed in hydrope calida ualet syr.
rupus endiuiae, syr. de bizantijs, oxifacchara, syr.
de granatis. Aque uero sunt aqua endiuiae, epaticae,
lupulorum, capil. ueneris, quae est temperata, et quan-
do non est magna caliditas cum his frigidis possu-
mus admiscere aliqua calida ex aquis aut syr. supra-
scriptis. Nam natura sagax dirigit frigida contra ma-
lam complexionem calidam, & calida ad confortan-
dum spirituum & calorem innatum, quod est intel-
ligendum tam in his quae interius sumuntur, quam
in his quae exterius applicantur. Ex confectionibus
uero sunt triafandali, diarrhodon abbatis. Ex trochi-
scis sunt trochisci de berberis descripti a Rasi in cap-
de dolore epatis. Trochisci de camphora, caumate
existente magno. Applicando autem exterius in co-
fortatione epatis cal. & frig. descripta sunt in cap. de
debilitate epatis & de dolore ipsius, ad quod recurre
Quod si oppilationes fuerint fortes & multum tra-
xerint ad lecuram utere ex his quae sunt magis aper-
ientia, quorum sermo praecessit sicut dialacca, diacur-
cuma, & similia, & si uideantur nimis calida misce
diarrhodon abbatis, & similibus infrigidantibus, &
pro his recurre ad capitulum de cura oppilationum quod
praecessit, pro quibus aperientis non solum profune
sumpta, sed etiam clysterizata sicut clysteria ex radi-
cibus & seminibus aperitiuis, mensura tamen sit in a-
perientibus & prouocantibus ne forte superflue pro-
uocando inducerent excoriationem. Aut ne forte
in tympanite multiplicarent uentositatem propter
superfluam caliditatem, ideo Auicenna post admi-
nistrationem fortium diureticorum docet admini-
strare ius gallinae pinguis ut incoriet uias urinae & ar-
dorem remoueat. Prouocantia tamen fortia magis
sunt necessaria in ascite & hypoplasia, minus in tym-
panite, sufficiunt enim leuia quae ducunt materiam
in uentositates conuertibilem, sed iura sunt magis ne-
cessaria carminantia uentositatem, & ex medicinis
communis iuuamenti in omnibus speciebus hydro-
pis sunt urinae infantium, quae cum saccharo biban-
tur usque ad s. 3. pro uice, & autores aliqui laudant
urinas proprias. Item ad haec omnia ualet uinum
album decoctionis absinthij, marubij, endiuiae, cicho-
reae, cuscutae, & similia, & urina leporis cum spica
nardi est propria, est enim urina leporis & humana
ualde mirabilis in dispositionibus frigidis epatis &
splenis. Sed pro quarta intentione quae est eradi-
catio materij hydropis tam antecedentis quam con-
iunctae diuersa sunt instrumenta et auxilia secundum
diuersas species hydropis. In ascite quidem sex mo-
dis eius materiam eradicamus. Primo, per solutio-
nem uentris. Secundo, per urinam. Tertio, per su-
dorem. Quarto, euacuando per uenas umbilicales.
Quinto, per resolutionem insensibilem. Sexto, per
uulcationem cauteria & sectionem. Primus mo-
dus, scilicet euacuatio per uentris solutionem, com-
pletur cum aqua distillationis corticis mediani fam-
buci. Item cum solutiuis superius positus in mino-
ratione quae fuit intentio secunda, & si opus est augea-
tur ipsarum dosis aut frequentius iterentur.

in hydrope calida

de phlegma quatuor

in hydrope frigido

vinum quale

per aqua

Et fortius illis est succus cucumeris asinini. Extrahatur ergo succus ex fructu cucumeris asinini absque uio lentia postquam est maturus quod cognoscitur ex citrinitate sibi adueniente in fine aestatis, & permittatur depurari per residentiam, deinde quod depuratum est permittatur exiccare infundendo in eo pro unaquaque uncia. 3. 1. specierum alephanginarum in petia subtili quæ cum extrahentur exprimantur, ut uirtus earum ingrediatur in succum, & secum pro unaquaque uncia dum est exiccatus, aut quasi misceatur 3. 1. dragaganti aut bdellij. Et reseruetur qui exhibeatur post sex menses. Et dosis eius est a 3. s. usque 1. reformata una aut duabus pilulis, & potenter educit aquam. Succus tamen ireos est magis domesticus quo communiter utor aut cum aqua mellis ut supra, aut in his qui facile soluuntur reformando pilulas de rheubarb. aut de raueo cum eo, clysteria quoque in quibus ponuntur huiusmodi aquam educentia, sicut in quibus ponitur succus ireos, & similia conferunt ad hoc, & potest de his in clysteribus poni maior quantitas quam in exhibitis per os. Secundo minoratur materia acida per urinam cum apozemate de radicibus Rasis in cap. de dolore epatis, aut cum diacurcuma aut dialacca, cuius dosis est a 3. 1. usque ad 3. cum aqua apij, aut alparagorum & pauco uini subtilis, & si uiderentur nimis calida secum misceatur tantundem diarrhodon abbatis, aut aliquid tria sandalorum, & continetur pluribus diebus, & fortius est iustinum aut lithon thrypton cuius partem potest cum his permisceri, & secundum Gal. 3. complexionum medicamen de cantaridibus correctis per adustionem, aut per gummi ceraforum admixtionem ualeat educendo multitudinem humiditatis, sed non detur nisi gran. s. & posset cum superscriptis misceri. Tercio modo minoratur per euacuantia per sudorem sicut sunt balnea ignea, sicut furnus, balnea aërea, sicut stufæ ualent educendo multitudinem humiditatis, quibus theutonici plurimum utuntur. Et balnea aquea sicut thermæ & receptio fumorum thermarum. Et ex sumptis est medicamen de assa, cuius sumatur drachmam unam cum uncia una aut pluribus uini subtilis calidi, post cuius sumptionem bene pannis cooperiatur & dormiat, & retentio anhelitus & absterio sudoris iuuat ad prouocandum sudorem. Item iuuat post sumptionem sudatiui si stufetur sub pannis aspergendo laterem calidum existentem prope ipsum in aliquo bacili aut alio uase, sed aspergatur cum aqua decoctionis anethi bacarum lauri, sulphuris, aut similibus prouocantium sudorem. Quarto euacuatur per uenas umbilicales ponendo uentosas super umbilico, & emplastra attrahentia & dilatantia. Quinto, per resolutionem insensibilem sicut cum emplastris uentri superpositis sicut est factum ex stercore uaccino et caprarum pascentium herbas siccas, quibus aliquid salis & sulphuris addi potest. Item stercus caprarum mixtum cum urina infantum. Item stercus columbarum, bacæ lauri, ires, elleborus, mixta cum predictis stercoribus, & proprie cum urina camelorum & equorum, & est forte. Item limaciæ contritæ posita super uentrem & dimissa donec exiccetur, similiter ostræca & lapis pumex est mirabilis, & huiusmodi possunt misceri cum lixiuo & pauco aceti, sed caue cum huius-

modi administras in hydropo calida ne epas inflamet. Quapropter huiusmodi non administrentur super rigione epatis, imò super regione epatis dicitur hoc fuerint applicetur cerotum sandalinum, aut aliquod epithyma infrigidans. Emplastrum tamen Rasis est conueniens, & parum calefacit. Crura & coxæ cum idæ similiter exiccantur cum spogij infusis in lixiuo facto ex cinere uitæ & stipitem caulium, & similibus calefacientium & exiccantiū quæ spongiæ calide actæ & optimæ expressæ applicentur partibus tumidis cum bona ligatura & solutione. Sexto, euacuatur aquo sitas in ascite cum uescicatorijs, quæ fiunt in uentre aut in cruribus ubi est maior tumor cum maiori mollitie, & fieri possunt cum pede coruino contrito super locum stricteligo, & sic retento per decem aut duodecim horas, ego uero communiter utor cantaridibus contritis permixtis cum fermento cum aceto forti, ita ut plurimum cantaridarum contangatur locum, & ligentur cum bona stratura, & sic dimittantur per decem horas aut circa, & illa ulceratio cõseruetur aperta tertio in tertium, imponendo asphodilos mixtos cum tharibibus. Cauteria uero actualia aut potentialia si ant in locis eisdem, quæ penetrat cutim uerâ, & remota escara ulcera cõseruentur aperta per sexaginta dies ad quorū aperitionis cõseruationem cõserit in ulcere tenere granum ciceris aut cerâ, & super ulceretere diaculqon, & possunt fieri in pluribus locis uentris in parte inferiori in quibus sit maior tensio & mollities. Albucasis, uero cauterizat in circulo umbilici cum quatuor cauterijs, similiter ea aperta lonsplenem & stomachum, & dimittit ea aperta longo tempore, penetrent parum ultra cutim, & foramina sint ad quantitatem ciceris, incisiones uero si ant in bursa refticulorum quando est plena aqua in ea parte in qua est aquositas aut in ambabus, si fuerit in ambabus, & fiat cum lanceta foramen paruum ita ut aqua refundendo egrediatur. Et quandoque pungimus eam in pluribus locis cum acubus ut aqua habeat refudationes plures, & si bursa non est plena aqua elaboretur ut aqua fluat ad eam a uentre cum motibus corporis & sternutationibus, si in ea poneretur feton esset præstantius. Si uero superscripta non sufficiant ad curam, & cum magna instantia fueris requisitus de extracitione aquæ per pertionem uentris præmissa prognosticatione de perticulo mortis, patiente existente forti, non sene neque habente tullim, nec fluxum aut aliud accidens quod sectionem impediat auctoritate Albucasis, Hali abb. & Auic. ipsum incide a parte anteriori sub umbilico, per tres digitos si hydropis sit causa intestinorum non quidem directe sub umbilico, ne incidantur musculi longitudinales, sed aliquantum lateraliter, si uero causa ro causa splenis incide a parte sinistra, si uero causa epatis incide in parte dextra non quidem ex directo umbilici, sed infra per tres digitos aut circa, & mox est ut patiens sedeat & sit minister post dorsum eius sustinens ipsum, & cum manibus aquam ad locum incisionis ducens, deinde tu pellem uentris trahes superius per spaciū unius digiti aut amplius, & ibi cum rosario paruo perfora usque ad locum uacuum faciendo foramen paruum, ita tamen ut aqua exire possit, & tunc extractio modico de aqua, tanto scilicet, quod uideas, quod possit exire, pellem

pellem descendere dimittas, ut claudat foramen, & diligenter liga ne aqua exire possit. Et postea egrum ciba & in lecto reponere, postea quotidie semel in die pellem trahere superius, agro sedente aut iacente supino, & imposita cannula aquam extrahe paulatim quantum uirtus bene tolerat. Et melius apud Aui. est infra subsistere quam nimis euacuare, est enim ad omnem euacuationem aptus sequi casus uirtutis, & tandem aqua pro magna parte extracta uulnus suae & consolidat. Quod si quid remanserit cum auxilijs dictis extrahatur, & in hoc tempore, attende confortationi uirtutis & reificationi discrasie membrorum naturalium, non enim hoc tempore opus est alia euacuatione, & hoc tempore sollicitus sis ne aqua inopinabile egrediatur bene foramen obturando. Nam iuxta aphorismum uigessimu septimum, sexte particulae. Quicumque empyici aut hydrofici utuntur aut inciduntur sanie, aut aqua multa fluente repente pereunt. Propterea semper postquam medicati sunt singulis diebus taliter situentur ut uulnus sit superius, & sic bene obstruatur. Sed in hypofarca materiam eradicamus tantum quatuor modis, scilicet per solutionem uentris, per urinam, per sudorem & insensibilitatem. Primus uero modus completur cum pilulis de hiera simpliciter, de rheubarbaro, de eupatorio, & fortiores sunt hiera composita Galeni, hiera logodion, hiera diacolocynthidos, electuarium indum, & ubi phlegma esset aquosum pilulae leues superscriptae reformatae cum succo ieros essent praesiantes, per urinam uero & per sudorem eradicamus materiam cum dictis in ascite. Insensibiliter uero & etiam per sudorem eradicamus faciendo ipsos stare in sole calido, retingendo tamen caput & faciem. Item sepeliendo in arena calida. Sed in tympanite similiter quatuor motionem uentris cum leuioribus ex medicinis dictis in hypofarca. Item cum pilulis alephaginis, & si inesset melancholia quae in uentositatem conuerteretur, euacuatur cum senae & epithymo aut cum superscriptis miscantur. Clysteria tamen de quibus statim agitur forte sunt efficaciora, & si forte coniungeretur tympanites cum ascite solutiva superscripta reformetur cum succo ieros, & similiter per urinam minorat sed per sudorem cum eisdem. Insensibiliter uero multis modis. Primo cum clysteribus carminantibus uentositatem, licet haec aliquando minorent materiam sensibilibiter, sicut factis ex decoctione anethi, anisi, carui, ameos, rutae, & similibus cum qua decoctione ne possint misceri 3. duae electuarij de baccis lauri. Et si uideretur nimis calidum cum decoctione superscripta ponatur ad bulliendum maluarum, blitis, matrum rest addi oleum rutaceum aut de spica. Secundo, uenter uaporetur cum pannicio & milio torrefactis, aut rosae quoque lati orificij super uentrem ponantur. Venter dentur medicamina uentositatem dissoluentia, colligant uentositatem carminantia, de quibus in corallia superponantur, exercitetur stomacho ieiuno faciem & sitim pariantur, & uenter aliquando stomacho ieiuno cum panno aspero fricetur donec rubeat.

Accidentia uero corrigantur iuxta quintam intentionem secundum quod oportet, sitis quidem cum acibus in ore retentis, aut os colluendo, & si non potest abstinere a potu, bibat aquas sublimationum cum syrupo acetoso, oxilacchara, & similibus, sed pro his recurre ad capitulum de siti. Sed deiectioni appetitus subueniatur cum acetosis appetitum excitantibus, & similibus quae egro placent & proprie in principio mensae. Sed ad prohibendum reciduationem iuxta ultimam intentionem obseruetur regimen superscriptum, maxime quantum ad tres intentiones, scilicet, regimen sex rerum, minorationem materiae ne aliquando superflueret sed cum leuibus, sed maxime attendatur ad confirmationem stomachi & epatis, & proprie cum cibis conuenientibus tam propria re quam secundum qualitates manifestas. Et aliquando quibusdam electuarijs aut confectiionibus proprijs, & sic est finis huius difficultis capituli.

DE ANATOMIA

splenis.

Quia Rasis hic agit de passionibus splenis iuxta consuetudinem est eius anatomia praemittenda. Splen est membrum instrumentale, me diocrit quantitatis, figurae quadrangularis, in sinistro latere sub costis mendosis locatum, ex carne spongiosa, uenis & arterijs multis & crassis panniculo inuolunte compositum, dorso & costis mendosis mediantibus panniculis oriens a siphach alligatum, cum corde, cum diaphragmate, epate & melenterio scirbo, & stomacho colligatum, ad contra operandum cordi & epati, melancholiam quae ab epate, & sanguinem mundificandum, ipsumque pro fame excitanda ad os stomachi transmittendum finaliter ordinatum. Est quidem instrumentale propter causas saepe dictas. Est figurae quadrangularis, superius crassior inferius subtilior in modum linguae, locatur in latere sinistro sub costis mendosis, sed non ita alte sicut epas, componitur ex carne spongiosa, ut facile recipiat humorem melancholicum crassum, in cuius receptionem est ordinatus. Habet autem uenam magnam uenientem ad ipsum a uena portae, a qua descendit unus ramus in medio transitus eius ad melenterium ad ipsum nutriendum, deferens ad ipsum sanguinem aquosorem & humidorem, postea quando ista uena approximatur spleni, iterum unus ramus ramificatur ab ea qui uadit ad nutriendum partem inferiorem stomachi sinistram, postea ueniens ad concauitatem splenis ramificatur in duos ramos inferiorem superiorem, inferior descendit ad nutriendum scirbum quantum ad partem sinistram, sed superior transiens per concauitatem splenis emittit duos ramos, quorum primus peruenit ad partem superiorem sinistram stomachi ad nutriendum. Alter uero circa orificium stomachi peruenit ad portandum melancholiam, quae emulcendo profuit ad os stomachi ad excitandum appetitum. Quod uero ex hac uena remanet in splene ipsum nutrit. Ex quibus apparet splenem mediante hac uena colligari epati, melenterio, scirbo & stomacho, cui multum appropinquat secundum eius concauum. Et secundum conuexum costis & diaphragmati.

Colligantiam autem habet cum corde per arterias, quæ ad ipsum ueniunt ab arteria aorti, quæ in dorso est infra diaphragma, a quibus arterijs stomachus multum calefit in latere sinistro siue a splene merito istarum arteriarum, & hæc fuit una causa, quare arteriæ multæ & magnæ ueniunt ad splenem. Et alia causa fuit ut calore istarum arteriarum sanguis crassus, qui nutriturus est splenem, subtilietur & digeratur, panniculus autem inuoluens ipsum, similiter panniculus suspendens ipsum cum dorso & costis mendois ortum habent a siphach. Tres autem fines in descriptione positi sunt satis noti. Ex quibus inferitur quod si splen non recipiat & retineat melancholiam sufficienter, non potest debite caliditati epatis & cordis contra operari. Et est causa arefactionis cordis & epatis. Si uero superflue ipsa præter modum infrigidat, imò propter superfluitatem melancholiæ est aliquando causa hydropisis & tremoris cordis. Item si non mundificet epar & sanguinem a melancholia est causa februm & apostematum melancholicorum, panni, lepræ, iheritæ nigrae, lentiginum nigrarum, elephantia, morpheæ nigrae, uaricum & melancholiæ, & similia. Si uero melancholiam receptam non expellat ad os stomachi deficit appetitus, & forte melancholia retenta splen intumescit & apostematur. Si uero ipsam superflue quantitatis perpellat ad os stomachi, & sic pontica est causa intensionis appetitus. Si uero nimis superflue pellat ad os stomachi aut sit nimis acris quamuis in moderata quantitate est causa nausæ, subuersionis & uomitus. Et quandoque fluens ad intestina facit excoarationem melancholicam mortiferam. Et ex istis apparet figura, quantitas, numerus, situs, substantia, colligantia, & operationes principales in quas ordinatur. Et apparet complexio, est enim quo ad complexionem innatam calida & humida complexio, licet merito nutrimenti & melancholiæ quam recipit sit frigida & sicca complexionis. Et consequenter apparet quas ægrotudines potest pati, quia oppilationem, tumore, & similia, & quæ ægrotudines possint merito ipsius in humano corpore accidere. Item quod in actu pratico pro resoluendis tumoribus eius mediocriter resolutia sunt applicanda, licet enim fortia competere ratione humoris. Nimum tamen substantiam eius mollem exterminarent & exicarent, & forte resolutis partibus subtilibus crassam petrificarent, & secundo, quod mollificantia & incidentia debent cum resoluentibus permisceri pro tumoribus & oppilationibus eius curandis.

SERMO VNIVERSALIS DE
ægrotudinibus splenis.

Splen accidunt omnes species ægrotudinum simplicium & compositarum, scilicet, mala complexio simplex & composita, sine materia & cum materia, mala compositio sicut oppilatio, solutio, continui apostemata, & tumores non apostematos, tensio a uentositate & dolor. Harum causarum signa & pronostica sient manifesta ex cap. sequenti.

Sed notandum primo, quod quando splen magnificatur extenuatur corpus, quia destruitur uirtus epatis digestiua propter superfluum infrigidationem,

quare minoratur sanguinis generatio. Amplius splen propter magnitudinem suam attrahit plurimum de sanguine epatis, quare ipsum amplius debilitatur. E contra autem splenis extenuatio significat bonitatem epatis, significat bonitatem humorum, sicut e contra, magnitudo eius significat humorum malitiam.

Secundo sciendum, quod ægrotudines splenis ducunt ad febres comixtas, sicut ipse quandoque ex eis generant, generatur namque ex tertiana non pura, febribus pestilentialibus, & febribus compositis, sicut est thymitæus, duplex tertiana, & similes, quæ quandoque sunt inordinatæ uagantes mutatis humoribus per adustionem in qualitatibus, quantitatibus & formis, unde non seruant suos periodos, uerum continuata, adustione conuersi in melancholiam, tadem faciunt quartanam, iuxta Hippoc. 3. prognost. febribus inordinate uagantibus, quartanæ sunt futuræ maxime circa autumnum, ægrotudines itaque splenis & febres huiusmodi sese mutuo fouent & augent, plurimæ itaque ægrotudines splenis sunt autumnales, & faciunt colorem habentis eas decliuem ad citrinitatem & nigredinem.

Tertio notandū, quod ægrotudines splenis, quandoque augment appetitum cum sunt remissæ, quandoque delinunt ipsum cum sunt intensæ. Et quandoque cogunt in fine digestionis ad euomendum rem acetosam ex qua ebullit terra propter superfluum eius acredinem, & hæc res euomit non est nisi melancholia acris cum aceto ad acetosum corrupto permixta. Et propter hoc non sequitur dolor neque aliud nocumentum notabile. Si. n. dolor aut aliud nocumentum præfuit fortelatur. Si uero non præfuit post hunc uomitum non sequitur.

Quarto notandum, quod urina sanguinea, id est, rubea, obscura, crassa, est bona in fine, id est, in procedu ægrotudinum splenis quæ sunt a sanguine melancholico crasso. Et forte est crisis, & significat eam crissim, similiter urina crassa in qua est fex & uiscositas, similis uiscositati, id est, feci sanguinis quæ est melancholia, est bona in ægrotudinibus melancholicis magis puris significans earum crissim & ægrotudinem quæ sequuntur eas.

Signa malarum complexionum splenis. Calidam significat sitis & inflammatio sensata in latere sinistro. Item fortitudo uirtutis attrahentis melancholiam, quia attrahit citius quam debet, id est, ante completam humorum generationem, & quia attrahit quod non debet, scilicet alios humores præter melancholiam, & inuenitur splen magis tumidus quam debet esse. Sed frigidam significat debilitas quantationis eius. Unde deficit spleni melancholia quam debet stomacho mittere, & eius defectu sequitur duobus appetitus, & iteratio fastidiosa satietatis propter duos. Primo, quia comedit sine appetitu, & quoties sumit cibum fastiditur. Secundo, quia splen frigidus infrigidat stomachum unde crudificatur cibus in stomacho, & ex hoc sequitur fastidiosa satietas ex præsentia cibi crudi in stomacho. Item sequitur multitudo rugitus et eructationis, quia materia melancholica propter paucitatem caliditatis uentofatur. Est enim melancholia uentofa iuxta dicta superius. Item, quia debilis caliditas stomachi facit cibum euaporare & uentofari. Sed

Sed mala complexio sicca significatur per asperitatem duritiem, & debilitatem corporis, crassitiem sanguinis, & uehementiam nigredinis corporis & sanguinis. Sed humidam significat lenitas lateris finitri molities corporis & nigredo declinans ad albedinem plumbeam.

Prognosticum. Mala complexio in principio facile curatur, sed confirmata difficulter.

Cura huius est proxima curationi malae complexionis epatis. Vnde intentiones quae ibidem posita sunt huic capitulo accommodentur. Verum medicinae splenis debent esse fortiores & magis penetrantes, quia est membrum minus nobile & magis in profundo positum. Et humor est crassior et magis resistens. Acquiritur autem eis fortitudo per intensionem & multitudinem formae, penetratio autem per admixtionem aceti, & utraque secum permiscendo aliqua uiscosa, & cum hoc propria sicut amoniacum ut uirtus non exaltet. Et haec uera sunt tam de his quae applicantur exterius, quae de his quae sumuntur interius. Sumpta enim interius tam alterantia quam euacuatiua magis distant a splene quam ab epate. Nam oportet eas penetrare per epat ad splenem, quare oportet eas esse fortiores & penetrantiores. Et humor est magis resistens digestionis & euacuationis, in splene tamen uti debemus medicinis sibi propriis. Cappares enim & scolopendria multum sibi sunt appropriatae. Vnde 12. therapeu. capitulum, quale est pharmacum, absinthii epatis, tale spleni capparis cortex, & quale epati eupatorium, tale spleni scolopendria. Ex frigidis autem est semen endiuiae & portulacae. Et si phlebotomia fuerit necessaria phlebotometur ad euacuandum multitudinem de basilica sinistra in brachio. Sed materia existente pauca & uirtute debili, & ubi opus sit magniter fiat phlebotomia lata. Et communis superflua aliquando phlebotomantur saphenae, & quando in causa esset retentio menstuum & haemorrhoidarum. Phlebotometur etiam aliquando quidem timore conuersionis materiae ad caput, & existente magna plethoria. Sed de medicinis tam alterantibus quam euacuantibus uberius inferius agetur.

DE DOLORE SPLENIS.

Cap. C.

Quia Rasis indulget breuitati facit solum unum capitulum intitulum de dolore splenis, conabor omnes eius egritudines in hoc capitulo perstringere. Dolor splenis qui est tristis per carnem spongiosam eius est quintuplex, punctius, perforatiuus, extensiuus, grauatiuus & pullatiuus. Inest. n. ei dolor pulsatiuus magis quam in epate propter multitudinem & magnitudinem arteriarum quae sunt in ipso & non in epate. Causa immediata cuiusque doloris est mala complexio aut solutio continui. Aut utraque simul sicut in apost. eius. Tumor autem non apostematosus siue sit humoralis, siue uentosus non est plethione aut solutione continui sequente extensio nem, similiter eius oppilatio. Mala autem comple-

xio existens causa doloris eius potest esse cal. frig. & sic. sine materia. Sed cum materia potest esse cuiuscunque generis, sed secundum plurimum cum materia est melanch. aut sanguinea. Raro cholericum aut phlegmaticum. Huius autem malae complexionis causae quandoque sunt primitivae, sicut aliqua aut plures ex sex rebus non naturalibus aut extraneis. Quandoque corporeae sequitur enim dominium humorum qui sunt in ipso aut eius oppilationem. Et quandoque fit aut fouetur per communitatem, aut a toto sicut in febribus, hydrope, lepra & similibus, aut a membris particularibus, sicut epate matrice & alijs. Apostemata splenis, quia sunt causa doloris eius, de ipsis erit sermo, & etiam de duritie & tumore splenis quae sunt infra apostema.

Apostema splenis quantum ad quid nominis, & quid rei est satis ex dictis manifestum. Et differt a tumore et duritie non apostemosa per solutionem continui, quae est in apostemate & non in duritie & tumore non apostemoso. Nam in his materia continetur in porositate splenis non faciens eorum solutionem, sed in apostemate in pluribus porositatibus solutis propter crassitiem, aut maiorem multitudinem materiae extenditis, & hoc est deterius, sic una concuities in qua materia continetur.

Apostemata splenis dupliciter distinguuntur, scilicet penes materiam. Et sicut plurimum sunt melancholica dura, raro sunt mollia phlegmatica & cholericum. Sanguinea uero sunt aliquando incidendo, sed plurimum ad duritiem permutantur, quoniam sanguis ad splenem ueniens est spissus, secundo distinguuntur penes figuram. Nam figurae eorum sunt quatuor, scilicet rotunda aut ad rotunditatem tendens, secunda, lata, tertia, longa crassa, quarta, longa subtilis. Et in prima sequitur maiorem multitudinem materiae, quam secunda, & tertia maiorem multitudinem et crassitiem quam quarta, et sunt duae potestates secundum figuram & situm splenis. Et spleneticus dicitur qui habet duritiem in splene suo, aut apostematosam, aut infra apostema ex quo inferitur, non ex simili causa aliquae denominari spleneticum & epaticum, nam epaticus dicitur qui habet aegritudinem occultam in epate suo modo superius exposuimus, sed spleneticus dicitur qui habet duritiem in splene suo.

Causae apostematum & duritiei splenis quaedam sunt primitivae sicut indebitum regimen sex rerum ut puta aer crassus & turbidus. Item uinum crassum & reliqua cibaria multiplicantia melancholiam & sanguinem melancholicum. Ex quibus causis fit, ut Ferrariae multi sint splenetici. Quaedam sunt corporeae, aut per essentiam, sicut debilitas expulsiue splenis aut fortitudo attractiue eius. Item oppilatio uenae per quam deferretur melancholia ad os stomachi, debilitas digestiue eius non debite subillantis & digerentis nutrimentum proprium potest esse in causa. Per communitatem uero aut a toto sicut in febribus diuersis et inordinate uagantibus, quae multotiens in quartana mutantur. Item per communitatem a membris particularibus sicut ab epate propter caliditatem aut frigiditatem superfluum cum siccitate multiplicata melancholiam. Item per communitatem a matrice in retentione menstuum.

Tumores splenis terminantur quintupliciter. Nam aut resoluuntur insensibiliter. Aut euacuantur sensibiliter per uomitum, urinam aut secessum. Aut indurantur sic perpetuo remanentia. Aut per mutantur ad epar, aut ad alia membra nobilia aut ignobilia sicut ad cutim, & fiunt apostemata difficultis suppurationis, & forte fit aliquando isteritia nigra. Aut maturantur, & postea erumpuntur.

Signa communia omni apostemati splenis sunt grauedo, magnitudo, aut dolor extensius communis usque ad diaphragma in latere sinistro, & quandoque cum magnificatur apostema ascendit dolor usque ad furculam & humerum sinistram, propter communicatam furculam cum diaphragmate & humero sinistro.

Secundo, quandoque facit anhelitum duplum secundum formam anhelitus fletus infantis, quoniam apostema impedit diaphragma ne uadat in motu anhelitus, quare stat subito propter laesionem deinde redit, & dum non est apostema magnum non comprimit diaphragma, nam communicatio splenis ad diaphragma minor est communicatione stomachi ad diaphragma, ut patet ex anatomia, sed stomachus non comprimit diaphragma nisi dum est multum plenus cibo, aut aliter multum extensus, ergo similiter splen non comprimit diaphragma nisi dum est multum tumidus. Ideo sensus aliquando comprehendit inflationem splenis. Et tamen anhelitus non comprimitur. Tertio, quandoque accidit ex apostemate splenis, quando est in inferiori parte eius ut subtilitur sanguis, quoniam splen mundificat sanguinem a fece sua, scilicet melancholia, quae est fex sanguinis, & rubant pedes & genua patientis, quae rubedo non ita accideret si apostema esset in superiori parte splenis, eo quod comprimeret uiam per quam deferretur melancholia ad os stomachi. Vnde sanguis non posset ita depurari a fece sua, & accidit extremitati nasi & auris splenetici ut resplendeant propter causam superscriptam.

Signa autem distinctiua inter apostema splenis et tensionem a uentrositate sunt quatuor. Primum, quia in inflatione non est grauitas. Secundum quod incessus & exercitium facit splenem apostematū dolere, sed dolorem sedat in inflatione uentrositatem resoluendo. Tertium, quia in inflatione adest rugitus qui non est in apostemate. etiam eructatio per quam alleviatur. Quartum, quia in inflatione non est febris quae est in apostemate. Sed tumor non apostemosus differt ab apostemato per carentiam febris continuæ, & quia omnia eius accidentia sunt leuiora.

Signa autem specierum apostematum splenis distinctarum secundum humorum uarietatem sunt haec, nam apostemata cal. praeter accidentia dicta communia omnia apostemati communicant in quatuor. scilicet in inflatione sensata, in splene, siti & febre & urinae tinctura. Verum in eo quod est cholericum, inflammatio est uehementior, sitis fortior & grauedo minor. Et dolor est magis pungitius quam extensius & color cum rubedine tendit in citrinitatem, sed in sanguine e contra. Sed in apostematibus duris, maligna fit anima, ex cogitatione tædiosa commouetur tristitia & uarietas, scilicet mentis, non tamen fit hic

uarietas et commixtio sensus nisi materia melancholica plurimum dominante, quia materia non mouetur ad caput. Sed fit commixtio sensus per communitatem splenis ad diaphragma et diaphragmatis ad cerebrum. Et quandoque denigratur lingua in duritia splenis, & sentitur durities absque rugitu cum praemittitur nisi aggregetur eius inflatio, & non est cum ea febris continua, imò quandoque est interpolata, & proprie quartana. Verum in apostemate, & proprie magno est febris continua forte habens excrecitas de quarto in quartum. Et quandoque cum his duritiis multiplicatur ulcera crurium & corrunduntur dentes et gingivae propter crassitudinem sanguinis, qui descendit ad crura ipsa ulcerans, & corruptionem uaporis qui ascendit in omnes partes gingivarum & dentium. Et quandoque fit in ulceribus crurium crisis ipsius, pluribus namque corum qui splenem habent, cum accidunt exercitia laboriosa, attrahitur materia ad crura & euadunt, & secundum plurimum bothor quaedam dicta ab Auic. anithan antecedunt illa. Vrina autem splenetici est sicut sanis sed plurimum, sed cum exercet seipsum subtiliatur melancholia & permiscetur cum urina & fit nigra, quae nigredo non est merito renum, nam si esset causa renū, esset multo rotiens non praecedente exercitio, cum oportet urinae transire per renes, et plurima phlebotomia apostemat splenem euacuando subtile, crasso remanente, propterea bonum est ut in regimine splenetici fiat phlebotomia lata, & autumnus est inimicus apostematis. Signa uero duritiei splenis sequentis apostema calidum sumuntur ex accidentibus apostematis quae se diu praecesserunt, & accidentibus duritiei quae secura est. Signa autem apostematum phlegmaticorum sunt lenitas tactus, albedo coloris tendens ad nigredinem cum reliquis signis apostematum eius. Signa uero apostematum splenis distinctorum secundum figuram sumuntur ex ipsa figura.

Prognostica. Primum, si splenetici inueniunt doctorem intrinsecum in ipso splene est maior species laetis, significatur enim melancholiam non esse ualde crassam, ita ut priuaret membrum sensu faciendo sepius rospurum. Secundum, si acciderit fluxus uentris cum sanguine aliquando bonum: forte erit crisis eius. Quod si perseverauerit aduenit ei lubricitas hydro-pica & morietur. Tertium, qui habet catharrum non habet splenem, nam catharrus significat dominium humiditatis cum quo non multiplicatur melancholia. Quartum, sumptum ex libro Hippocratis, habens dolorem in splene suo cum fluere per uentrem sanguis rubeus significans magnam compassionem epatis spleni, & apparent in eo ulcera alba non dolo-rosa eo quod non participat acuitate moritur in die secundo, significatur enim magna debilitas epatis, & retortius propter euacuationem boni sanguinis, & remanentiam malarum materiarum frigidarum, ex quibus corpus non est aptum nutriri, quarum partem aliqua symptomaticae expellitur ad crura ulcerans illa. Si uero non moritur, cadit appetitus propter multam caliditatem, naturalis diminutionem. Quintum, quandoque terminantur apostemata splenis, fluxus sanguinis narium, & proprie ex latere sinistro, & apostematibus apud aures difficultis suppurationis & apertionis propter crassitatem materiae. Sextum

Sextum, laudabilior urina eorum est crassa sanguinea, & urina in qua est fex viscosa significat sanitatem splenis & destructionem eius, & cum in urina febricitantis habentis splenē apparuerit sicut suspensio sanguinis, id est, hypostasis sanguinea à sanguine melancholico destruitur splen eius, id est, agnido eius.

Septimum, apostema epatis permutari ad apostema splenis est ualde bonum, & e contrario ualde malum. Octauum, & multotiens confortatur splen subito per seipsum, aut propter istud quod confortat ipsum, & praeuaret super totum istud quod est in ipso de materia mala, & solutione educit eam feculentam, sicut fex oliuarum, & significatur quod est ex splene & non ex epate, quia splen habet eius agnitionē, non autem epas. Item de mutatio splenis post hanc euacuationem. Nonum, uehementia appetitus sequens splenem est ualde melior, quam eius destructio sequens multitudinem melancholice aut malitiam.

Cura apostematum splenis exigit triplex regimen. Primum, debetur causae antecedenti complendum euacuatione & diuersione. Secundum, causae coniunctae complendum repercussione in principio. In augmento repercussione mixta resolutioni. In statu & declinatione sola resolutione. Et hoc si tēdat in uia resolutionis. Si uero in uia maturatōis diuuetur.

Tertium regimen est accidentium correctio. Prima intentio, scilicet, euacuatio completur secundum plurimum in principio cum phlebotomia, quae materia existēte multa proprie dominante sanguine coniuncta facienda est ex basilica dextra, & hauriatur, 6. 3. lang. aut circa, postea si expedierit fiat ex saluarela sinistra, de qua dicit Auicē. debere dimitti per se constringi, si constringitur ante calum uirtutis. Si tamen in causa esset retentio mēstruorum aut sang. haemorrhoidalis consueti fluere praemittatur phlebotomia saluarela sinistra. Communiter tamen sufficit phlebotomia basilicae aut saluarellae sinistrae. Rasis tamen praedilegit phlebotomiam saluarellae sinistrae, & fiat foramen latum. Et si uenter non est lenis, praemittit ante phlebotomiam lenitio uentris saltem cum clysteri. Postea euacuentur alij humores secundum exigentiam, communiter praemittēdo digestionem, quae materia existente calida perficiatur cum hoc. 8. 3. syrupi acetosi simplicis, 3. 1. iulep. ros. 3. s. aque de ana. 3. s. & tamarisci & scolopendriae, ana. 3. 1. bul. in 1. lb. aquae ad consumptionem medietatis & coletur.

Sed Rasis dat trochiscos de agno casto cum syrupo aceto & sunt praestantes. Syrupus Gerardi de Solo. 8. corticum radicū capparis, mediani corticis tamarisci, genniste, ana. 3. 1. endiuie scariolae, portulacae, scolopendriae, capil. uen. recentium, an. M. quatuor sem. communium frigidorum mūdatorum, sem. portul. sem. appij, sem. brusci, sem. asparagi, ana. 3. 1. mel. ad quartam unam, sacchari quartas tres, temperētia mixta. Solutium sit huiusmodi. 8. tamarisci foliorum, florum boraginis, florum buglossae, 3. s. palmarum mundatarū ab arillis, 3. 6. anisorum, 3. 1. populi, epithymi, an. 3. s. bul. in sufficiens quantitate aquae ad consumptionem medietatis & coletur, quae decoctio colata trium 3. misceatur cum 3. 1. senae & calida exhibeatur in potu debita seruata custodia, uel cum hac distemperentur diasenae, 3. 3. hamec. 3. 1. & calida exhibeatur. Item possunt fieri pilulae ex aloē, 3. s. senae. zing. grañ. 2. quae reformentur cum electuario hamec. & sunt satis faciles. Si uero apostema pen deat à materia frigida absque febre detur hoc digestiuum. 8. syrup. de epithymo, oximellis compositi, ana. 3. 1. aquae scolopendriae, 3. 3. misce. Aliud ex in uenione propria quo cōmuniter utor, est huiusmodi. 8. corticum radicū capparis, scolopendriae, tamarisci, sem. agni casti ana. 3. s. passul. 3. 1. epithymi, 3. 6. bulliant in 3. lb. aquae ad consumptionem medietatis, sed epithymum ponatur ad bulliendum in fine, quae decoctio colata cum bona expressione misceatur cum syrupo de epithymo, & oximellis simplicis, an. 3. 1. & clarificetur. Materia etiam existente digesta & pro parte minorata melius est oximel compositum, & Gerardus de Solo ponit digestiuum longe compositionis huic proposito deferuiens. Ego tamen existimo una cum principe, quinto can. istarum medicinarum esse melius plurimo earum licet oppositum senserit Auenzoar & Auer. Solutiuum sit diasenae de quo detur 3. 1. distemperata cum aliqua ex decoctionibus suprascriptis. Ex pilulis conueniunt in de pilulae de lapide lazuli, pilulae de lapide armeno, ex hieris conuenit hiera rufini, hiera diacolocinthidos, & similes. Et si peccet phlegma conuenit electuariū indum. Et si humores sint mixti, solutiuum sint mixta, aut detur solutiuum illos simul euacuans, & in humoribus adultis uidelicet confectio hamec. Item pilulae de fumo terrae, & melius est iterare solutiuum quam dare solutiuum multum una uice euacuans. Diuersio tamen iuxta secundam intentionem completur cum clysteribus factis ex decoctionibus eorum quae respiciunt splenem. Et prouocatio hemorrhoidarum est conueniens diuersiuum. Item conueniunt aliae diuersiones communes, de quibus saepe dictum est, & haec duae intentiones in toto processu morbi sunt exequendae, ut semper materia minoretur, est enim difficilis educationis.

Sed prima intentio secundi regiminis, scilicet repercussio maxime conuenit in apostematibus calidis in principio. Et tutius haec stiptica administrantur in apostematibus splenis quam epatis. Primo, quia uia per quam recipit splen est latior, scilicet ramus uenae portae. Secundo, quia splen est membrum ignobilius quam epas. Tertio, quia in eo non sunt tot meatus angusti, de quorum oppilatione timeamus, quot sunt in epate. Et hoc maxime conueniunt in principio administranda tam interius quam exterius, sicut in epate dictum fuit. Et sunt diuersificanda secundum materiam, apostemati tamen duro non conueniunt huiusmodi stiptica. Vnde in materia calida conuenit iulep rosaceum, aut syrup. acetosus simplex cum aqua decoctionis, sem. endiuiae, & portulacae, & capillorum ueneris, sed in materia frigida mel rosarum cum oximele simplici, & aqua capilli uen. & haec simul digerunt & repercutiunt. Exterius autem applicanda sunt, oleum ros. cum tertia parte aceti in calida, sed in frigida his potest addi parum olei mastichini, postea in processu his admisceatur oleum de

capparibus. Tandem deueniendum est ad hanc unctionem qua communiter utor. 12. olei de capparibus 3. 6. medullæ uituli, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti ana. 3. 2. aceti modicum, cere quantum sufficit, & est mihi experta. Et nota quod acetum est conueniens ferè in omni materia, & in toto curæ processu saltem cum alijs mixtum, imò Ras. in præsent cap. applicat ipsum solum in materia calida, iuuat enim in principio ad repercussionem in omni materia, in augmento ad repercussionem & resolutionem, & ad faciendum uirtutes aliarum medicinarum penetrare, sed deinceps iuuat ad resolutionem, mollificationem, & ad faciendum uirtutes aliarum medicinarum penetrare, acetum enim mollificat apostemata dura, & propriè uapor eius. Similiter sumptum interius conuenit, ut plurimū incidens humores crassos, & faciens uirtutes aliarum medicinarum penetrare, indigemus enim propter crassitatem, & uiscositatem humoris in toto curæ processu incisione & absterione. Ex mirabilibus autem ad resolutionem huiusmodi apostematum, est emplastrum de fermento Mesue mihi expertum, cuius est hæc descriptio. 12. ammoniaci bdellij, sicuum siccarum ana. 3. s. fermenti in aceto salito dissoluti 3. z. bdellium & ammoniacum in aceto dissoluantur, & misceantur simul cum sicubus, & addatur foliorum rutæ, tamarisci, salis natri ana. 3. i. & misce bene incorporando & applicetur, & propriè post aliqualem mollificationem, & ad eradicationem materiæ, cum cætera non contulerint ualet unum, aut plura cauteria actualia, aut potentia lia penetrantia cutem, quæ per tres aut quatuor menses conferuentur aperta. Si uero apostema tendat in maturationem adiuetur cum diachylone & similibus, sed attende maturantia esse diuersificanda secundum diuersitatem materierum. In materijs enim calidis conuenit maluauiscus, farina sem. lini, foenugræci ficus pingues, oleum selamini, & similia parum calida, sed in frigidis magis calida. Vnde his addantur radices ireos coctæ & præparatæ, & materia existente melancholica ponantur multum mollificantia, nō tamen multū calida sicut medullæ, mucillagines maluauisci, foenugræci, sem. lini, & similia, deinde studendum est eruptioni cum motibus, & addendo suprascriptis emplastris cepe, narcisci coctum, quod optime iuuat ad erumpendum, & post eruptionem intendendum est mūdicatōni ulceris, & tandem consolidationi sicut dictū fuit in apostematibus renum, & si eruptio fieret ad uentrem & sanies colligeretur in inguine sinistro sicut aliquando uidi, studendum est in eius resolutione. Quæ si resolutioni non obediat extrahatur locum perforando.

Accidentia uero iuxta primam intentionem tercij regiminis corrigantur secundum quod oportet. Præcipue dolor à cuius sedatione interdum præ magnitudine sua coacte oportet incipere cum unctionibus, fomentis, sacculis, emplastris, uescis, & similibus semper utendo proprijs. Et si anodina sufficiunt bene est, si uero non, transeundum est ad stupefacientia tam sumpta quam applicata. Regimē autem sexrerum non naturalium tendat in contrarium discrasie & humoris facientis apostema. Sed ut plurimum dieta debet esse tenuis in principio ad prohibendum augmentum apostematis, sed cum apostema, & hu-

iusmodi dispositiones melancholicæ prolongantur, regimen debet esse impinguatius non oppilans, neq. incrassans sanguinem ut minoretur melancholia. Vnde uinum sit subtile album unius anni tamen pauciferum, aut multæ uentositatis secundum exigentiam, & panis bene conditionatus nō azimus, aut auro pyrus. Multus potus aquæ communiter uitandus est, & sit aqua bene conditionata, sicut aqua pluuialis de stillata per arenam. Similiter eligantur carnes pingues boni chimi, & elixæ. Oua conueniunt mollia nō indurata. Et pro salata utatur capparibus, aut endiuia, aut cichorea cocta, lupulis, asparagis, & similibus, & condictantur cū aceto, passulæ conueniunt, uiretur caseus, & omnielac præter lac camelarum, quia apud Aui. id est, aperitiuum, siue propter pascua, siue à proprietate. Vnde secundo can. confert pluribus agritudinibus epatis, & splenis, & reliquum regimen ordinatur in contrarium humoris & discrasie. Et nota quod sunt quedam conferentia à proprietate quibus frequenter utendum est tam in regimine cibali quā medicinali, sicut splen asini, aut pulli equi ambo exiccant & puluerizati dati in quantitate 3. i. uel plus cum uino subtili aromatico à proprietate ualet mirabiliter. Item uespertilio pinguis & decolatus & exiccatus in furno, in uase uitreo & puluerizatus exhibitus quantitate trium 3. cum uino, aut aceto est curatio expectandi in multo, aut ad decoquendū in fereulis suis & ita possent poni reliqua à proprietate respicientia splenem, sicut scolopendria, capparibus, capillus uentris, rubea, acorus, baccara &c.

DE OPPILATIONE SPLENIS.

QVandoque oppilatur uia per quam splen recipit melancholiā. Cuius signum, quia splen non est tumidus tumore ab humore proueniente, imo potius extenuatus. Quandoq. oppilatur uia per quam mittitur melancholia ad os stomachi. Cuius signum, quia splen est tumidus cum recipiat melancholiam, non expellat, neque fames excitatur sicut consuevit. Cuius oppilationis causa quandoque est uentositas, quandoque est apostema, quandoque humores multati crassi, aut uiscosi absque apostemate. Signa apostematis sunt extensio uehemens cum lenitate. Sed motus sunt signa apostematis, de quibus supra. Sed oppilationes aliæ sunt cum grauedine absque signis apostematis. Curationes sunt illæ eadem quæ sunt fortes ex curationibus oppilationum epatis, de quibus in proprio capitulo. Sed sint magis propriæ contra humores melancholicos.

DE INFLATIONE SPLENIS.

Inflatio splenis est tensio & eminentia eius à uentositate. Cuius signa sunt tensio & eminentia quæ cedit comprimenti, sed subito reuertitur, sicut in uesica plena uento, & nō est grauitas & durities solida, sicut in apostematibus, & quandoque comprimitur sentitur rugitus. Curam inflationis splenis perficitur cum eiusdem medicinis quibus curatur durities, siue tumor nō apostematosus splenis. Indiget enim aperitiuis, absterfuijs, & resolutiuis, cum uirtute restipica maiori quam in duritie splenis, & hu-

*emplastrum de Mesue
autem Durahung.*

In malida.

materia uentosa est leuis de cuius restrictione parū timemus. Et cū hoc stipticitas faciat ad confortationē splenis, qui confortatus melius resoluit uentositatem. minūq; eam recipit aut materiam eius. Medicinē autem magis conuenientes sunt, sicut agnus castus, cymīnū, ruta, semen eius, ameos, & his similia, cum quibus decoctis in aqua, aut uino subtili, aut in utrisque potest splen fomentari. Quibus etiam aliquid acuti aceti addi potest, & ex eisdem possunt fieri unguenta cum oleo de capparis, deruta, de spica, uino subtili & pauco aceti faciendo bullire olea cū uino & aceto ad consumptionem uini & aceti, postea addendo ceram & pulueres, nec hic mollificātib; opus est sicut in duritie. Et iuuatur multum ex positione uentofarū igni tarum super splene, hæc tamen faciendā sunt præmissa euacuatione cum his quæ dicta sunt. Et oportet ut famem toleret & parietur cibum, & abstineat ab aqua quātum potest, & bibat uinum subtile antiquū & non dormiat immediate post cibum, sed tardē do nec extensio stomachi sedata est. Quod si extensio nem dolorosam senserit comprimat super ipsam & ingeniatur ad egestionem & postea dormiat, & utamur trochiscis de capparis, trochiscis de agno casto fo mentetur splen stomacho ieiuno cum filis infusis in aceto decoctionis corticum radicis capparis, sulphuris, tamarisci, scolopendriæ, semine agni casti, nucis, cupressi, & rutæ. Et Rasis in textu ponit medicinas excellentes ad hanc intentionem. Tua autem integris calidis in eius absentia.

Et ex his rādē pater cura doloris splenis de quo intitulatum est capitulum Rasis. Nam dolor sequitur malam complexionem, aut solutam continuitatem, aut humorem, aut oppilationem, aut inflationē quorum omnium cura præcessit. Ergo cum cura doloris sit triplex, una per remotionem causæ, secunda per anodina, tertia per stupefacientia. Prima iam manifestā est. Nam pendet ex cura ægritudinum quæ sunt causa doloris, quarum cura iam absoluta est. Quod si forte dolor non daret inducias sui magnitudine, ut si forte dolor non daret inducias sui magnitudine, ut cura regulari procedere non possis, tentetur statim cura cum anodinis, sicut floribus chamæmilæ, melilobus quædam propria addantur, sicut scolopendria, tamariscus, & similia faciendo ex his unctioes emplastra, sacculos, fomenta, & similia. Quibus si nō al leuiatur procedatur ad stupefacientia sumpta, aut applicata, mixta, tamen cū his quæ appropriatur spleni.

SI cum dolore splenis fuerit calor, & urina rubedo, & febris, æger ex his trochiscis sumat. Trochisci de agno cast. Recip. seminis agni casti, seminis tamarisci amborum ana. drach. 10. seminis endi. seminis portulacæ, amborum ana. drach. 5. ex his fiat trochisci, de quibus detur quotidie unus cum syrupo aceto, de saccharo cuius pondus sit drach. 3. Aeger ue-

ro si repletus fuerit ex saluatella quæ est in sinistra manu phlebotometur.

Splen quoque ex frustra filtri aceto calido infusi embrocetur, & obseruetur a rebus dulcibus, & cibis crassis.

Hoc capitulum de dolore splenis diuiditur in tres partes. In prima agit de dolore splenis à causa calida. In secunda à causa frigida materiali. In tertia agit de ipso pendente à uentositate, secunda ibi. Quod si cum prædicta ægritudine, tertia ibi. Si autem splen tensus fuerit, prima in duas. In prima ponit signa doloris splenis à causa calida. In secunda curam, secunda ibi. Ager. Primum signum est calor sensus in splene & ex præsentia materiæ calidæ contentæ in splene causantis malam complexionem diuersam.

Secundum est rubedo urinae ex parte materiæ calidæ mixta cum urina. Tertiū est ieb. putrida ex materia putrente in splene ad cor effumante, aut ephimera pendens à calefacto esse spirituum propter dolorem, aut materiæ caliditatem, hæc autem feb. non ita est apta pendere à materia frigida. Hic ponit quatuor auxilia pro cura huius doloris à causa calida. Primum est trochisci de agno casto, quorum est hæc compositio. R. seminis agni casti, seminis tamarisci calidorū & sic. ana. 3. 10. seminis endiuia, seminis portulacæ frigidorum & humi. ana. 3. 5. Ex his puluerizatis fiat trochisci cum aceto, aut syrupo acet. ex quibus quotidie unus trium 3. detur cum syrupo acetofo, de saccharo, & potest addi aqua endiuia in infusione tamarisci, ut sint portabiles, in frigidant enim, materiam subtiliant, confortant. Secundum auxilium est phlebotomia saluatellæ sinistrae ad minorandum materiam tam antecedentem quam coniunctam, & fiat foramen latū ut humor crassus possit exire, ab hac tamen prius est inchoandum, & similiter ab alijs euacuationibus si opus fuerit. Tertium est embrocatio, siue fomentū regionis splenis ex filtro infuso in aceto calido acuto, intrigidat enim, incidit, & resoluit. Quartum est regimen in cibo & potu, prohibens à comestione rerum dulcium ne humor cholericus multiplicetur, & à rebus crassis, ne multiplicetur sanguis crassus.

Quod si cum prædicta ægritudine non fuerit calor, ægro trochisci, de capparis dandi sunt. Recip. corticum radicis capp. sem. agni cast. amborum ana. drach. 10. scolopend. drach. 7. aristoloch. long. foliorum rutæ, sem. nasturtij, acori, nigellæ omnium ana. drach. 3. ammoniaci drach. 3. ammoniacum in aceto dissoluatur, ex quo cætera conficiantur & informetur, ex his trochisci ponderantes drach. 2. ex quibus unus cum syrupo acetofo, de melle, & apozemate, de radicibus in potu sumatur.

Hic

Hic curans dolorem à causa materiali frigida dicit. Quod si cum prædicta ægritudine non fuerit calor, cuius absentia significat materiam esse frigidā simul cum absentia febris & tincturæ urinæ, dentur trochisci de capparibus. R. corticum radicum capparorum, sem. agni casti añ. 3. 10. scolopendriæ 3. 8. aristoloch. long. foliorum rutæ, sem. nasturtij, acori, nigellæ añ. 3. 3. ammoniaci 3. 3. dissoluatur ammoniacum in aceto ex quo cætera puluerizata conficiantur in forma trochiscorum, quorum quilibet ponderet 3. 2. Et usus eorum est ut unus quotidie potetur cum oximelle simplici aut cum composito. Et cum decoctione radicū, sunt enim omnia componentia calida præter acetum, & ex quibus fit medicina subtiliatiua, incisiua, absterfua propria in splene. Quæ tamen administranda sunt post euacuationem.

Si autem splen tensus fuerit, & cum premittitur auditur sub eo rugitus, ex prædictis trochiscis cum apozemate de radicibus est dandum. Et uinum uetus tribuendum, & potus aquæ minoretur quāto plus possibile fuerit.

Emplastrum ad duritiem & uentositatem quæ est sub splene, faciens. Rec. foliorum rutæ drach. 1. baurach, mentastri sic. amborum ana. drach. 3. ammoniaci drach. 7. ammoniacum in uino ueteri dissoluatur ex quo cætera conficiantur, & fiat ex eis emplastrum quod loco superponatur.

Hic curat dolorē splenis à uentositatis dicēs, quod si tensus fuerit, scilicet, sine grauitate, & cum premittitur auditur rugitus ex motu uentositatis. Ex prædictis trochiscis dandum est, ut supra, & potus uinum uetus & minoretur potus aquæ. Deinde ponit emplastrum contra duritiem & uentositatem splenis. R. foliorum rutæ propriè in resolutione uentositatis, baurach loco cuius accipimus sal nitrum amborum ana drach. 3. ammoniaci drach. 7. ammoniacum in uino ueteri dissoluatur ex quo cætera conficiantur, & fiat emplastrum quod spleni superponatur, resoluit enim uentositatem & humorem. Et sic est finis.

DE ANATOMIA INTESTINORVM.

Cap. CI.

Actum est in præcedentibus de ægritudinibus splenis, hic agendum est de passionibus intestinorum, de quibus ab Auic. agitur in 16. sen. tertij. Et iuxta consuetudinem est præmittenda anatomia intestinorum. Sunt enim intestina descriptiue membra longa, rotunda, concaua, numero sex, plures habentia reuolutiones, superius cum orificio fundi stomachi, inferius ad anum terminata, in uentre inferiore locata, cum dorso mediante mesenterio ligata, ex duabus tunicis cum uillis longitudinalibus & transversalibus, uenis, neruis, & arterijs, & pinguedine composita, ad complendū

digestionem primam, eiusque superfluitates expellendum finaliter ordinata. Sunt autem intestina adeo longa, ut omnia simul extensa sint communiter nouem cubitorum. Rotunda, quia hæc figura est capax uem cubitorum. Concaua, ad continendum chilum & superfluitates eius. Sunt autem numero sex, plures habentia reuolutiones, nam si fuisset unum intestinum solum & rectum, oportuisset hominem esse in continua comestione & ferè continua assellatione, quorum primum impediuisset hominem à negocijs in uita necessarijs. secundum autem fuisset in decorum & molestum. Propterea Deus sapientissimus providens humanæ necessitati, ordinauit ut essent plurima multas habentia reuolutiones, ut quod digestum est in stomacho non cito descendat, sed per meseraicas uenientes à uena portæ ad intestina paulatim ab epate suggatur, unde illud quod effugit primam aciem meseraicarum, cum meseraicæ non attrahant nisi illud quod peruenit ad contactum superficiei intrinsecæ intestinorum, attrahitur per meseraicas uenientes ad alias reuolutiones intestinorum, quia quod una uice est occultum, fit postea manifestum orificijs uenarum, donec totum conueniens pro nutrimento attrahatur, reliquum tanquam superfluum & stomachum patitur, per meseraicas enim uenientes ad stomachum peruenit quid attrahitur, scilicet illud tantum quod contingunt & satis remissæ, & sunt magis deputatæ ad deferendum sanguinem ad stomachum, ipsum nutriturum quam ad deferendum chilum ad epat, ut sentit Gal. 4. de utilitate particularū, cui sententiæ quod est Auic. 16. tertij. Primum autem intestinum quod uocatur duodenum, eo quod habeat longitudinem 12. digitorum coniunctorum, incipit ab orificio fundi stomachi quod dicitur pylorum, id est, portenatū, est multum subtile habens concauitatem angustam, & proportionatam orificio à quo sumpsit initium, & est eius concauitas minor quam sit concauitas meri cum per illud debeant transire res crassæ nondum digestæ, per hoc res in stomacho iam prædigestæ & digestæ, secundo quia ad descensum eius quod prædigestum est ad intestina concurrunt expulsiua stomachi, & attractiua intestinorum simul attrahentia uilillum & fecem, in qua uoluptuantur sicut uesica in urina & Kystis in felle. 3. de uirtutibus naturalibus. Sed ad attrahendum cibum ad stomachum solum concurret attractiua stomachi & meri, & nulla expulsiua naturalis, si quædam expulsiua meri quæ est partim terminatur & partim uoluntaria, & ad finem huius terminatur porus selleus deferens choleram ad intestina. Huic autem continuum est secundum intestinum ieiunum sic dictum, quia semper uacuum & inanitum reperitur propter tria, primum quia id quod est conueniens ex chilo ad ipsum perueniens facile ad epat attrahitur propter multitudinem meseraicarum ad hoc intestinum descendentiū magis quam ad aliquod aliud respectu suæ quantitatis, & post ipsum plures in duodeno reperiuntur. secunda causa suæ inanitionis est multitudo cholæræ puræ ad ipsum uenientis & lauantis. tertia quia parum habet obliquitatis in comparatione ad sequentia. Est etiam satis breue non multo longius duodeno, & hoc est illud intestinum, de cuius excoriatione maxime timetur in fluxu dysenterico, & quod maxime extenuatur & exciccatur in ægritudinibus

inibus acutis. Deinde tertio sequitur ileon intestinum ualde longum plures habens reuolutiones, nunc ad dextram, nunc ad sinistram & posterius, & dicitur ileon quia locatum est in ileis. Et ab hoc sumpsit nomen passio iliaca siue ileos, aliter dictum miserere, dolore existens intensissimus perducens ad uomitum fecum, & ad mortem in septem diebus. Et ad hoc intestinum plures descendunt melaicae quoad aliquod aliud cum sit ceteris longius. Et clystera imposita comunit non transeunt hoc intestinum, & haec tria sunt gracilia, quia subtilia sunt, & satis tenuis substantiae parum habentia de pinguedine & mucilaginositate, in quibus solutio continui a quacunque causa prouenerit est multum timenda. Et in his tribus gracilibus uiget magis uirtus digestiua quam in crassis, non quidem dans formam chilo, sed per confectionem & complementum digestionis, forma enim datur chilo per uirtutem digestionis, in monoculo tamen magis uiget uirtus digestiua quam in ceteris crassis. Post ileon sequitur facculus. Primum ex crassis, sic dictum, quia est pendens in modum sacculi, aliter dictum monoculus, quia non habet apparenter nisi unum orificium, licet in ueritate sit necessarium habere duos, unum per quod attrahat a superioribus, aliud per quod attractum descendat ad inferiora. Sunt tamen haec officia adeo uicina ut unicuique aestimetur. Hoc autem intestinum est satis breue locatum infra renes magis posterius quam anterieus, & magis dextrorsum quam sinistrorsum, huius autem fines sunt multi. Primum ut illud quod descendit in hoc tanquam in sacculo diu retineatur, ut complete digeri possit quod effugit digestionem stomachi. Et ideo locatur satis iuxta epas ut ab eo uirtutem digestiuam acquirat, & hoc se habet in comparatione ad duo intestina sequentia, sicut stomachus ad tria praecedentia, neque hoc factum est principaliter ut melaicae fugant ab eo, cum pauciores melaicae ad hoc ueniunt quam ad quodcunque aliud. Secundus finis est ut fex incipiat in isto acquirere formam fecis manifeste, licet in ueritate forma substantialis fecis inducatur in materiam fecis in stomacho. Nam per uirtutem digestiuam stomachi corrumpitur forma cibi in stomacho, ergo per eandem debet induci in materiam eius alia forma. Et non in totam inducitur alia forma, & non nisi forma fecis, ergo &c. aliter sequeretur quod aut per tempus statum materia sine forma, aut generabitur aliquod medium medium uia transitus inter cibum & fecem, primum impossibile, secundum inconueniens, frustra enim est multiplicare huiusmodi entia sine necessitate. Tertius ut uermes in hoc intestino generentur, quorum praesentia si pauci sint, & non magni est iuuatiua, cum fugant superflua, & ex his generentur, quorum superfluitas praesentia cum putrent possit esse ualde nocua, licet etiam aliquando in alijs generetur, & hoc est illud intestinum quod in alijs generetur, & descendit ad bursam testiculorum, quia est pendens & colon intestinum crassum, sic dictum, quia multos habet colos, & etiam multas habet cellulas in quibus stercorea figuram accipiunt quae figura rotunda maxime apparet in schibalis cum induratur, & ideo figura cellularum debet esse rotunda, sicut & schibales sunt rotunda, & in illis cellulis multa phlegmata continentur quae aliquando emittuntur appensa ipsis schibalis, & in his generantur frequenter uermes cucurbitini, sed inter cellulam, & cellulam cum paru de phlegmate continetur, generatur solummodo panniculus continuans unum uermem cum reliquo in altera cellula generato, hinc est quod aliquando apparent uermes habentes longitudinem sex pedum. Et ab hoc intestino nomen sumpsit colica, existens dolor ualde intensus cum in ipso frequenter propter duritiem fecum generetur, & ad hoc sicut ad superiora multae melaicae terminantur ad suggendum si quid boni remanent, hoc autem intestinum incipit in dextra parte & situatur sub media penula epatis & contangitur a Kyrtis fellis, ut praeter cholera ad ipsum interius uenientem a superioribus intestinis stimuletur ad expellendum a contactu Kyrtis fellis, & propterea hoc intestinum in illa parte apparet circinum croceum, & gustui amarum. Deinde aequit stomachum, ordinatur enim natura cum sit satis ignobile in comparatione ad superiora ut situetur supra stomachum, quasi stomachum & alia intestina defendens, & etiam ut sit proximum scirbo per cuius caliditatem & humiditatem uiuetur in expulsioue fecum, ideo scribis huic intestino est maxime adhaerens, cum tamen cooperiat stomachum, & reliqua intestina, deinde postea hoc intestinum transiens ad sinistram locatur circa renem sinistram. Et ex hoc fitu possumus concipere multa utilia tam ad partem theoricam quam ad practicam. Primum quare nocuum est factum in hoc intestino, sicut cum humores descendunt per ipsum, aut clystera ascendunt per ipsum ducit ad syncope, hoc enim est per communitatem oris stomachi, cuius nocuum est facile cordi communicatur. Secundum quare dolor colicus multum affimilatur dolori renis, cuius causa est, quia hoc intestinum iuxta renes, & propriè sinistrum situatur, inter quos dolores docet Auicenna distinguere per cibum assumptum, nam si dolor augetur ex sumptione cibi, tunc dolor est colicus, stomachus enim cibo plenus comprimit intestinum colon. Si autem sit dolor renalis sedatur propter humiditatem uaporosam cibi doloris sedatiua. Habemus etiam iuuameta in actu practico duo. Primum, quia remedia quae exterius applicantur magis debent declinare ad sinistram quam ad dextram, cum magis in sinistris quam in dextris hoc intestinum loceatur. Secundum iuuamentum est, quia cum imponimus clystere debemus facere, ut aeger iaceat magis in principio super parte dextra ut liquor possit ascendere, & cum superius ascendit & eleuatus est aliquantulum postmodum iaceat super parte sinistra, ut per compressionem liquoris liquor ascendat magis ad superiora, & transeat ad partem dextram, & postea cum uult ipsum emittere reuoluat se super dextrum, & postea surgens clystere emitat. Oppositus autem situs debet seruari in operatione medicinae, nam cum materiae descendunt ad intestina reuoluat se super sinistram, & postea super dextrum, sic enim fit facilius superfluitatum exitus. Habemus quinto differentiam, an rugitus & dolor sensatus ex praesentia humorum sit in stomacho, aut intestino colon. Nam si cito descendit est in colon. Si uero tarde est in stomacho, cum oporteat per omnes intestinum reuolutiones descendere.

Et ex

Et ex his inferitur quod colica lateris sinistri est facilius curabilis, quam lateris dextri, cum materia in illa parte contenta sit propinquior uisus educationis, faciliusque clystera perueniat ad eam partem. Ultimo est intestinum rectum ceteris crassius & latius, cuius situs est secundum rectum super dorsum, & ascendit usque prope renes, huius autem iuuamentum est ad attrahendum id quod in superioribus intestinis continetur, & ideo latum creatum est, & consequenter ad expellendum par uiam ani, quæ est eius extremitas, propterea in hoc intestino fuerunt multi uilli longitudinales manifesti qui deferunt attrahendi eius, ut quod attractum est magna quantitate, postea facilius expellatur. Et in hoc intestino & maxime uersus extremitatem eius accidit tenesmus. Ultimo est sphincteris, siue anus qui est extremitas intestini recti, in cuius circumferentia sunt quinque orificia uenarum hæmorrhoidalium, quatuor musculis iuuantibus ad eius dilatationem & contractionem mota, ad retinendum & expellendum superfluitates primæ digestionis secundum exigentiam necessitatis & uoluntatis imperium finaliter ordinata, unus enim musculus est in extremitate ani, exprimens quod de fece aliquando in ano continetur, & est ad minima diuisus cum carne sphincteris sicut in labijs. Secundus est magis superius existens, siue caput hominis, cuius una pars transit ad radicem uirgæ, altera pars dilatatur in circumferentia sphincteris. Deinde est unum par musculorum super hos duos situatum, quorum officium est longaonem, siue sphincterim, siue anum superius trahere, & ex nocumento horum sit ani descensus qui interdum reduci non potest. Et in summa ex uisus cibi & superfluitatum primæ digestionis nulla est quæ habeat morum uoluntariū, nisi principium, scilicet meri, & finis, id est sphincteris. Sunt autem hæc intestina cum dorso mediante mesenterio, aliter dicta anchora, ligata, quod quidē mesenterium est membrum dorso continuum ex panniculis ortū habentibus à siphac, ligamentis, multa adipe, & carne glandosa, uenis mēseraicis, & arterijs compositum, & dictum est mesenterium à mēseraicis multis in ipso repertis quæ per hanc uiam ad intestina delegantur. Carnes autem glandosæ sunt factæ in ipso ad sustentandum huiusmodi mēseraicas, & etiam ad humectandum intestina ut facile feces possint descendere, & propter hanc causam, est etiam in ipso multitudo adipis. Et in hoc mesenterio frequenter colligitur multitudo humoris melancholici faciens melancholiam mirachiam. Fuit autem cōueniens ut huiusmodi mesenterium mediaret inter dorsum & intestina, ne molle sicut intestina lædatur à contractu duri. Composita autem fuerūt intestina ex duabus tunicis, ne nocumentum unius partis facile alteri communicetur, & etiam propter diuersitatem uillorum fuerunt in eis hæc duæ tunicæ necessariae, fuerunt enim in eis uilli longitudinales ad attrahendum, transuersales ad retinendum, latitudinales ad expellendum, sed latitudinales magis in eis dominantur quam in stomacho cum sint magis ad expellendum ordinati, nisi in intestino recto in quo magis longitudinales dominantur, habet enim attrahere rem crassam difficilis expulsionis, uenæ autem existentes in ipsis quæ plurimæ sunt, omnes sunt mēseraicæ descendentes à uena portæ. Arteriae autem ueniunt ad ipsa ad dandum uir-

tutem uitalem ab arteria aorti descendente. Nervi autem sensitiui plurimi ueniunt ad ipsa cum plurimo sensu indigerint, qui nervi partim à cerebro, partim à nucha ueniunt. Pinguedo autem magis est in superficie extrinseca intestinorum quam intrinseca, licet etiam interius penes Auic. sit pinguedo, pinguedo tamen magis est in crassis quam subtilibus, quia sunt magis frigida & magis crassa, & propter hanc, quia oportuit eorum feces duras à multitudine adipis mollificari, multitudo etiā mucositas & phlegmatis inuiscari est in superficie intrinseca intestinorum, crassiorum ne facile lædantur à duritie fecum, phlegma etiam stagnans, & inuiscatum reperitur in intestinis superioribus gracilibus, sed in minori quantitate. Ultimo in diffinitione subduntur fines duo, quorum unus est complementum digestionis primæ, reliquus est superfluitatū ipsius primæ digestionis expulsiō, & ex his manifesta est tota anatomia intestinorum, scilicet quantitas, figura, numerus, situs, colligatio, & quæ sunt partes componentes, & consequenter ex his manifestum est, quod sint frigida & sic, complexiōis, & quod possunt pati omne genus agredinis simplicis & compositæ, frequenter autem patiuntur colicam, & fluxum, & uermes. Gratiā completioris doctrinæ de anatomia scibi aliquid dicendum est. Est autem scirbus à Gal. dictus omentū, & brum compositum ex duobus panniculis, uenis, & arterijs in modum retis adinuicem contextis adipe seposita uacuitates replente ad uigorandum digestiui stomachi & intestinorum finaliter ordinatus, duo autem panniculi ex quibus componitur, ortum habent à duabus extremitatibus siphac dorso alligatis. Sed uenæ & arteriæ eius ortum habent à uena chilis, & arteria aorti descendentes. Adeps autem sepositus ordinatus ortum habet ab adipe mesenterij, fuit autem ordinatus ad uigorandum digestiui stomachi & intestinorum, tamen reflectendo calorem, quod optime facit medianibus panniculis densis, ex quibus componitur, qui etiam quia leues sunt, & extensibiles non comprimunt stomachum & intestina, neque propter suam facilem extensionem prohibent incumescentiā stomachi & intestinorum aliquando necessariam. Iuuat etiam ad digestionem calefaciendo mediante adipe seposita, quæ licet ab autoribus graduatur inter membra frigida, est tamen potentia calida, quod declaratur ex facili inflammabilitate, nec minus adeps ipsa iuuat reflectendo calorem, uenæ quoque & arteriæ in ipso dispersæ adiuuant digestionem, calefactionem per sanguinem & spiritum in ipsis contentū. Propterea miles in bello percussus cui abscessus fuit omentum post consolidariōnem non portuit eam digerere, quinto de ingen. sani. Hic autem scirbus cooperit anterius stomachum & omnia intestina, quod non sic facit in alijs animalibus, quia homo inter cetera animalia est debilioris uirtutis digestiue, & etiam ut sit tuta stomachi & intestinorum, quod magis necessarium fuit in homine quam in ceteris animalibus, cum uenter ipsorum non sit ita expositus extrinsecis occurrentibus, & reguntur pelle duriori. Et ex his manifestata est colligatio ipsius. Colligatur enim cū stomacho & intestinis maxime cum colon cui multum annectitur. Et colligatur cum omnibus membris à quibus componenda ipsum ortum habent, ut dicitur

etū est, et manifestus est situs eius, est enim immediatē sub siphach contentus. Similiter quantitas & eius complexio. Est enim calidā & humidā complexiois & potest pati omne genus egritudinis simplicis & compositae. Sed inter cetera descendens per didymum in bursam testiculorum facit herniam scirbalem. Si autem propter uulnus ventris, aliquando scirbus egrediatur, & aliquanto tempore moretur disponitur ad putredinē, quapropter oportet ut quicquid egressum est post aliquantum tempus liget fortiter & supra ligaturā incidatur & cauterizetur, deinde cū filo intro mittatur, filo pendente extra uulnus, postea uulnere extrinseco consolidato, uel prope consolidationem filum illud extrahatur.

DE PUNCTIONE
intestinorum.

Pro notitia huius materię sciendum quod reperiuntur iste passiones, punctio, colica, ileos, quę licet in aliquibus conueniant in multis tamen differunt. Est enim punctio de qua apud Auicennam 16. terrij dolor remissus, paruū occupans spacium existens in intestinis.

Colica uero distincta contra ileos est dolor intensus in intestinis crasis maxime in colo, cum quo fit difficilis exitus eius, quod inferius per naturam egreditur, scilicet fecis, uentositatis humorum, uersueuerunt. Ileos autem descriptiue est dolor intestinalis fortissimus in intestinis gracilibus maxime in ileo cum quo fit difficilis exitus eius quod per antrum egreditur. Sed primo sequendo Auicē, absolua mus materiam punctiois. Punctio quidem non habet species nisi quodammodo differentes secundum causas, & loca ipsius.

Causę uero punctiois quędam sunt primitiue, quędam corporeę. Primitiue quidem sicut cibi acuti, falsi, acetosi. Item uenena sicut argenti uiuum sublimatum, calx, arlenicum, & huiusmodi. Corporeę uero sicut uentositates quę aliquando in spatio intestini continentur. Aliquando incholetra puniens & mordicans. Tertio phlegma salsum. Quarto melancholia adusta. Quinto phlegma uiscosum in cuius separatione fit dolor. Sexto excoriatio & ulcus. Septimo apostema. Octa uo uermes, crisis quoque cę eius cum qua humores ad intestina deriuant, imo ipsa punctio est signū crisis.

Signa. Primo causę primitiue sunt sibi signa. Et similiter nocumenta ipsas consequentia. Ventositates uero cognoscitur per rugitū, & aliquando punctiois mutationem. Item per eructationem, aut exitum uentositatis per inferius cum quiscitur per caliditatem in loco sensatam, sitim, oris amaritudinem, linguę citrinitatem, & quod cholera tera signa generalia sumpta ex complexione, ætate tempore anni, regimine precedente & similibus consueuant, si cholera ætenseatur. Cognoscitur autem phlegma salsum per punctiōem cum grauitate, & si

egrediatur inferius apparet album, & cum hoc sentitur in ano mordicatio & tenemus. Et si expellatur per superius percipitur in ore salfedo, phlegma quoque crassum et uiscosum cognoscitur ex grauedine magna, & quia cū educitur apparet in aliqua parte superficiē eius aliquid sanguinis adherēs. Melancholia quoque cognoscitur per saporem pontici, aut acris & per colorem eius fuscū cum educitur. Et hęc omnia significantur ex signis cōibus sumptis ex complexione ætate & similibus. Vermes autem cognoscuntur per signa uermiū inferius ponenda. Similiter excoriatio, & ulcus penes signa dicenda in cap. fluxus disenterici. Apostema uero cognoscitur per signa communia ex duritie, tensione, grauitate, febre, dolore continuo in una parte & similibus. Crisis autem declaratur per ægritudinem præcedentem & euacuatiōnem sequentem cum qua prima ægritudo terminatur uel minuitur.

Prognostica. Primum, ægritudo secundum plurimum curatur si debite tractetur. Secundum, hæc ægritudo si augeatur ducit ad colicam, aut ad ileon, est enim uia in ipsas & proprie cum est sine fluxu. Tertium, quando peruenit punctio ad aluarez, uomitum, singultum, destructionem rationis significat mortem.

Cura punctiois quatuor exigit intentiones. Prima causam remouet, secunda stomachum & intestina confortat ipsorum diserasiam corrigendo. tertia corrigit accidentia. quarta ordinat debitum regimen. Si ergo cibi fuerint causa punctiois illi prohibeantur præcipiendo regimen contrarium, ut puta si fuerint acuti, aut falsi dentur frig. & humid. & in sipida, sicut portulacę, lact. cucurbitar. cucumeres, et similia. Et si fuerint acetosi dentur dulcia et calida, & quicquid fuerit contentum in stomacho ex his cibis uomitu educatur. secundo confortetur stomachus & intestina cum proprijs moderate stipticis contrarijs diserasiæ a cibis facientibus punctiōem inducēt. Si uero in causa fuerint uenena, uomitu quam primum educantur sicut exhibēdo potum copiosum tepidum ex aqua cum oleo sesamino, aut oliuarum subtriplo ad aquam, & cum hoc uomitus præcipiatur. Et si punctio ad intestina descendat cum dysteribus ex eisdem rebus factis educantur, & si uomitu, aut solutione uentris cum iam dictis educi non possent detur aqua decoctionis anethi cum pauco mellis, & salis, hic enim potus tepidus adiuuat uomitum. Et si fuerit in intestinis & proprie superiori bus, et non sufficiunt, quę dicta sunt detur cassia cum decoctione prunorum, & similia, & pro his recuratur ad sextam quartam, aut ad octauum Alman. Si uero in causa fuerit uentositates considerandum est an multiplicetur merito stomachi, & aliorum membrorum absque humoris præsentia, an sit humoris præsentia qui quotidie uentosatur, si primum cum hoc sit a diminuta caliditate, confortandus & multiplicandus est calor innatus cum his quę interiorius et exterius applicantur, quę etiam uentositatem carminant, sicut bonum uinum antiquum non dulce paucum, multa abstinētia a cibo, fames, & exercitium, & cibaria ad calidum & sic cum declinantia non uentosa, & detur in principio mensę diacyminum, aut diagalanga, & super di

K

barijs suis ponantur aromata proprie facta ex cinamomi 3. i. zing. galangæ ana 3. s. piper drachmas 2. his etiam quibus placent posset addi cyminum præparatum medicinaliter, aut stomacho ieiuno posset exhiberi trochisci de aromatibus, electuarium de baccis lauri, & similia. Auic. tamen dicit quod ex his quæ sunt mirabilis iuuamenti apud experimentatores est, ut calcaneus porci aduratur et sumat ipsum in potu habens punctiorem uentositatem, ut puta dando de ipso puluerizato 3. 2. cum potu uini potentis calidi. Aut dentur de granis lauri siccis solis puluerizatis duo coclearia, est autem coclear 3. s. & fiat exterius stomacho, & intestinis euaporationes cum rebus carminantibus uentositatem, & inungatur cum oleo de spica, de ruta, laurino, & similibus, aut ponatur emplastrum de baccis lauri, & similiter fiat clysteria ex carminantibus uentositatem in quibus ponatur oleum rutaceum. Si autem sit humoris præsentia ex quo generetur uentositatis ille educatur cum pilulis alephanginis, diaphoeniconæ, electuario indo. Et si fuerit melancholia cum diaesæ, et similiter fiant clysteria eiusdem intentionis, deinde procedatur ad regimen de quo supra. Si autem in causa fuerit cholera attente considerandum est. Dicit enim Auic. quod punctio a quacunque causa curatur cura cholice nisi sit punctio cholerica. Oportet enim ut in ea caueatur ab errore cadente, & æstimatur quod sit cholica, & curatur cura eius, & moritur infirmus. Credo Auic. intellexisse quod cura colicæ secundum plurimum est cum carminantibus uentositatem calefacientibus et exiccantibus, et interdum cum fortibus solutius, cum leuia non sufficiant. Si autem punctio cholerica curetur cum istis non est dubium quod æger posset duci ad perditionem. Secundo quia medici inaduertiens dāt solutiua fortia, sicut diaphoeniconæ, electuarium indum, sicut aliquando consueuerunt in cholica & perducunt ægrum ad fluxum uehementem qui nō facile sedatur, & interdum ad cholicam passionem, est enim punctio de proprijs signis antecedentibus cholicam passionem. Quapropter pro cura huius debemus in principio cholera solui cum clysteribus frig. lenientibus, et si non suffecerint detur cassia, aut manna cum decoctione prunorum, aut tamarindorum, & si cholera fuerit crassa detur aloë lotus. Secundo choleraeducta discrasia corrigatur cum frigidis interius & exterius applicatis, ita ut in eis ponatur solatrum, & sandali, & rosæ, sed semper misceatur aliquid absinthij, & similia calidiorum stomachum confortantium, & interius sumat diarrhodon abbat, et triafandalos, & aliquando in his casibus datur uinum granatorum, uinum berberis, & similia. Cauendum tamen est a stipticis, imò omnia sint lenientia nisi adsit fluxus uentris. Si uero humor fuerit baurachius, educatur cum clysteribus factis ex decoctione turbit, polypodij, uolarum, sumitræ, & similia, & euacuetur cum solutius sumptis per os quæ sunt, sicut hierapicra, diacitoniten descriptione Mes. & similia. Si autem fuerit phlegma uiscosum, aut melancholia, illa sollicite educatur cum clysteribus mundificantibus, et abstergentibus & cis quæ sumuntur per os, sicut electuarium indum, & diaesæ pilulæ, alephanginæ, & similia, & præmittantur digestiua si opus est, facta ex oxo-

melle simplici, composito aut scyllitico, syrupo de epythimo, & similibus cum aqua decoctionis cinamomi, & anisorum. Secundo corrigatur discrasia, Stomachus & intestina confortentur cum proprijs, ex quibus maxime laudat Auic. puluerem amomi sumptum per se, sequente potu, ut puta alicuius uini uinofi pauci & dentur trochisci de aromatibus, & similia calefacientia & confortantia. Si autem in causa fuerit excoctio, ulcus, aut apostema curentur, ut dicetur inferius in cap. de colica apostemosa & disteria. Si uero crisis fuerit in causa, finatur naturam operari si per se fuerit sufficiens. Si uero non, adiuuetur cum fricatione uentris, clysteribus et solutius leuibus.

Pro cura autem punctiōis pendentis a uermibus, recurre ad capitulum de uermibus infra ponendum. Tertia autem intentio, scilicet correctio accidentium perficitur secundum ipsorum exigentiam, pro quorum cura recurre ad capitula præcedentia de uomitu, singultu, aluere, & similibus. Quarta uero intentio, scilicet debitum regimen sex rerum, non naturalium ordinetur in contrarium discrasie, unde cibi & potus sint faciles digestionis, boni chimi paucarum superfluitatum, & sint uentris lenitui nisi adsit fluxus uentris. Quapropter iura pingua conueniunt, & propius galli decrepiti, & apud Auicennam eritius affatus est proprius conferens in uentris punctiōibus, scilicet tam calida quam frigida, & intelligitur de ericio porcino & non canino, sonus eorum sit prolixus & proprio nocturnus, nec curent omnes euacuationes a natura institutas, nec uentositatem retineant natura inuitante, sint pauci in cibo & potu, non comedant nisi fame præcedente, imò tolerantia famis in uentosa & phlegmatica, & exercitium super fame optime conuenit.

DE RVGITV ET

exitu uentositatis inuoluntariæ.

Facit Auicenna capitulum de rugitu & exitu uentositatis inuoluntariæ. Causa immediata rugitus est multitudo uentositatis. Hæc autem multiplicatur, aut propter cibos uentosabiles, scilicet aut propter malitiam digestionis in membris, scilicet in stomacho, & intestinis. Cuius causa est aut ipsorum frigiditas, aut paucitas caloris innati, licet forte non sit remissio in gradu, sicut in sine phthisis. Multiplicatur enim uentositatis propter diminutionem caloris, siue sit diminutio in quanto, siue in gradu. Hæc autem diminutio aliquando est per eleniam, aliquando per communitatem a splene, aliam, quando ab epate, aliquando a mirach et mesenterio, siue per simplicem alterationem, siue in stomacho, & intestinis communicando materiam uentosabilitatem. Et plurimum est cum lenitate naturæ. Et si in intestinis subtilibus, tunc sonitus est acutus. Et si in crassis, tunc sonus est grauis propter latitudinem foraminis, & si rugitus est cum gurgulatione, tunc uentositatis est admixta humiditas. Est autem secundum plurimum magis merito malitiae digestionis membrorum quam merito ciborum, & rugitus plerumque est signum crisis antecedens ipsam. Exitus

Exitus autem uentositatis inuoluntariæ, aliquando fit propter mollificationem intestini recti, et proprie extremitatis eius.

Quandoque apud Auicennam propter mollificationem ieiuni, de qua re non parum est admirandum, cum ieiunum non habeat musculos qui sint instrumentum motus uoluntarij neque taliter locatum ut per ipsum uentositates possint ad extra exire. Credo autem textum esse corruptum, & forte loco ieiuni debet esse meri, per cuius mollificationem posset egredi uentositates inuoluntariæ per superius, sicut per mollificationem ani egreditur inuoluntariæ per inferius, aut forte ieiunum habet occultam colligationem cum intestino recto ita ut propter eius nocumētū mollificetur rectum. Cura rugitus nota est ex his quæ dicta sunt superius in curatione punitionis a uentositate, quam curam huic cap. accommoda.

Cura autem exitus uentositatis inuoluntariæ perficitur cura paralytici ani, quæ est manifesta ex cura paralytici in generali. Verū remedia localia applicanda sunt regiōni alios et ab alcatim, infra. Et si fuerit per nocumētum ieiuni aut meri inungatur quod est super umbilicum cum oleo cosino ante & retro.

DE COLICA.

Secundo ordinem Auic. iam de colico & ileo est nobis agendum, & licet quid nominis & quid rei harum dispositionum sint satis ex dictis manifesta, attamen ut memoriter teneantur, & secundum scilicet species & differentias absoluantur. Permittit quod dolor intestinorum qui est tristis eorum sensatio est duplex, quidam existens in omnibus intestinis, quidam in aliqua eorum parte circumscriptus. Primus autem duplex, quidam enim est cum motu descendens aut ascendens per reuolutiones intestinorum & uocatur tortio.

Quidam autem quiescens, & uocatur nomine generis dolor intestinorum, & hij aliquando sunt remissi aut mediocres de genere naturalitatum in sensibilibus ledentes. Si uero dolor intestinorum sit circumscriptus aut est remissus existens de genere neuralitatis, & est punctio, de qua supra, aut est fortis, et dicitur colica si sit in colo & reliquis intestinis crassus cum difficili exitu eius, quod per naturam egreditur in ileo, & intestinis gracilibus, & dicitur ileos conuocando similiter difficilem exitum eius, quod per inferius egreditur, nomen autem sumpserunt hi duo dolores ab illis duobus intestinis, eo quod in illis frequentius accidunt, in duodeno enim raro accidit dolor propter ipsius rectitudinem, breuitatem et propinquitatem orificio stomachi, et in ieiuno raro, cum causæ doloris factiæ parum in eo morentur, propter causas supra scriptas. Sed in ileo frequentius propter ipsius longitudinem & plurimam circuitu breuitatem, rectitudinem, amplitudinem, & ani propinquitatem. Et similiter in sacculo rarius accidit quam in colon propter breuitatem & amplitudinē. In colo autem frequentius propter longitudinem, tortuositatem, stricturam, & quia feces duræ, & multæ hanc ultimam causam frequentius accidunt colica & ileos, saltem a cā intrinseca licet a cā extrinseca non

frequentius. Et hæc sunt species dolorum sumptæ secundum diuersitatem causarum recipientium. Sed secundum diuersitatem dolorum in se, & diuersitatem causarum imprimantium sumitur hoc modo. Nam aliquis est pungitiuus, aliquis grauatiuus, aliquis extensiuus, aliquis perforatiuus.

Causa enim interior ipsum dolorem imprimens aut est calida acuta & subtilis ipsorum soluens continuatæ, licet sit raro, & tunc facit pungitiuum sicut humor cholericus aut falsus sua baurachitate mordens. Aut sanguis corruptus, aut uermes suis aculeis pungentes, aut uentositates in aliquo paruo loco cōclusa, aut ulcus paruum. Sed grauatiui causa est materia frigida, grossa, uiscosa in intestinis aggregata sicut humor plegmaticus aut sanguis congelatus, aut melancholia quæ de se dolorem talem faciunt satis quietum. Si uero uentofetur dolorem faciunt intensiuum extensiuum aut perforatiuum si in aliquo loco concludantur.

Si uero moueantur faciunt tortionem, causa autem extensiuu, tortiui & perforatiui est uentositates. Si enim multa sit occupans magnum spatium non mota, sed in illo conclusa facit dolorem extensiuum. Et similiter fit dolor extensiuus a multitudine alicuius materiæ extendentis. Si uero moueatur facit dolorem tortiuum. Si uero sit in aliquo loco paruo conclusa, sicut inter duas tunicas intestini dolorem facit perforatiuum differentem a pungitiuo, quia uentofitas & similiter humor faciens pungitiuum est magis subtilis quam humor aut uentofitas faciens perforatiuum, differt autem perforatiuus ab actuali, est. n. actualis, cum sit panniculi actualis eruptio, & frequenter sequitur perforatiuum. Item quidam dolor est periodicus sequens aggregationem materiæ in determinato tempore sufficientem ad dolorem, quidam non periodicus.

Causæ colicæ quædam sunt corporeæ, quædam primitiæ. Corporeæ duplices, per essentiam & per communitatem. Sed absoluiamus primo illas, quæ sunt per essentiam in intestinis. Deinde quæ sunt per communitatem, Tertio primitiæ.

Causæ autem per essentiam sunt quatuor, scilicet mala complexio non quælibet, sed diuersa, mala cōpositio, solutio continui, apostema. Primo malæ complexiones immateriales. Caliditas enim per se potest facere dolorem, secundo per accidens resolueno & exiccando fecem. Item attrahendo humidum ipsius ad epar, per cuius præsentiam fex reddebatur mollis & fluxibilis, fex autem retenta est causa colicæ. Item frigiditas potest facere dolorem tam per se quam per accidens debilitando expulsiuam tam musculorum uentris quam intestinorum aut oppilando poros, & tunc crescit caliditas per antiperistalsim exiccans feces ut statim dictum est. Item frigiditas impressa in sphincteri sicut accidit sedentibus in terra aut super lapidibus unde confringitur sphincteris & expelluntur feces sursum & retinetur urina, & propter hoc multiplicatur colica in regionibus frigidis & temporibus frigidis & flantibus uentis frigidis. Tertio complexio mala sicca tam per se quam per accidens est in causa, siue sit siccitas positiua, siue sit per consumptionem humidi facientis feces lubricas, licet una ab altera raro absoluitur.

mes, lapis in intestinis generatus. Itē causę extrinsecę et reliqua. Quarto principaliter apost. causat colicā, sunt enim per se causa doloris tam per malam complexionem quam solutionem continui, causant etiam colicam per accidens oppilando quę si sint facta per uiam defluxus sunt secundum plurimum calida, si uero per uiam paulatim factę congestionis secundum plurimum frigida.

Colica autem per communitatem est a multis mēbris. Primo a stomacho aggregante interdum phlegma aut melancholiam aut alium humorem qui aliquando uentofatur. Interdum aggregante uento sitatem ex cibis, ut supra in capitulo de inflatione stomachi, quę tamen non faceret dolorem in stomacho propter amplitudinem eius. Et quia descendit ad inferiora, & quia stomachus est intra membra calida, nec etiam in gracilibus faciet dolorem, quia sunt calidiora neque retinetur in eis, non enim habent feces ficas oppilantes, sed descendens ad intestina crassa intestinum faciet dolorem, quia sunt frigidiora remotiora membris calidis facile oppilabilia propter præsentiam secum & multas reuolutiones. Et sunt spissa non rara sicut gracilia a quibus uentofitas facile resolui potest. Similiter per communitatem ab epate generante uentofitatem & expellente ad intestina, ut supra in tympanite, iuxta aphorismum 11. quartę par ticulę.

Quibuscumque torsiones, &c. et similiter epas expellunt humores, quandoque ad intestina, qui sunt causa colicę, imo intestina recipiunt superfluitates a toto corpore mediante epate. Item per communitatem a splene cum melancholia effusa ad intestina uentofatur. Aut etiam uentofitas a splene communicatur in intestinis, aut splen tumefactus coartat intestina. Item per communitatem a spiritalibus ut cum ab ulceribus pectoris et pulmonis sanies mittitur ad intestina per uenam chilis mediante epate aut cerebro sicut in catarrhis. Item per communitatem a renibus sicut cum apostemantur & coartant intestina & proprie ren finister qui contangitur a colon, similiter cum partibus lapidem communicatur no cumentum intestinis, retinentur superfluitates, & fit colica, propterea difficile est distinguere dolorem colicum a renali differentia tamen inter eas statim agetur. Item fit colica per communitatem a matrice & uesica cum apostemantur. Item fit colica per communitatem a toto fere in febribus, quę contigit Ferrarię de anno 1449. aut fluxum uentris. Quod non erat nisi, quia humores maligni multi crassi, et secundum plurimum aduerant & uenter multum stipticus faciebat colicam, si uero magis subtiles & multi & uenter natura fluxi am, sicut mihi eodem anno contigit. Imo dicit Auicenna, quod quandoque accidunt colica & ileos, sed frequentius ileos secundum semitam accidentię agri tudinum pestilentialium & transeunt de regione in regionem, et de homine ad hominem ex quo concluditur has ægritudines esse quandoque contagiosas & pendere ab influxibus super cœlestibus taliter disponentibus. Et multa extranea Auicē. subdit

ibi quę prosequi esset inutile. Et quandoque accidit colica habentibus tetanum, quare deficiunt ab expellendo humores & feces ab intestinis superioribus, sicut deficiunt a retinendo quod est in inferioribus. Et quandoque deficiunt ab expellendo tam a superioribus quam ab inferioribus, in summa ergo colica cum fiat a tot causis, frequentius tamen contingit a phlegmate, uentofitate & duritię secum.

Causę autem primitiue colicę sunt uinum plurimę commixtionis & proprie multum. Item olera & proprie cucurbita. Melones quoque & angurie & fructus omnes recentes habentes humiditatem superfluum uentosabilem, sicut poma, uua & similia. Item fructus stiptici & pontici, sicut pira, zarur, citonia, sorba, mēspila, castanę. Item legumina & proprie recentia. Item milium & rizum & cetera uentem stringentia & proprie cum post huiusmodi bibitur aqua. Item coitus & retentio uentofitatis uolentis egredi. Item aduentus frigoris stomacho & intestinis sicut si homo præter consuetudinem expositus fuerit uento & aeri frigido aut steterit in aqua frigida, aut sederit super lapide frigido, & apud Auicennam ex eis quę præparant intestina inferiora ad colicam est comestio ouorum assorum durorum. Item pirorum & citoniorum. Item fauich, milij, & rizi & simili. Item retentio egestionis uolentis egredi. Item aer pestilens & uentus septentrionalis & sumptio ueneni, casus super uentrem percussio contundens aut scindens.

Hic notanda sunt aliqua. Primum quod secundum plurimum ex materia colicę siue sit humor siue feces aut alia materia impletur primo monocolum, deinde peruenit ad alia, nec est propter hoc necessarium secundum plurimum prius dolere monocolum quam alia, non enim propter amplitudinem suam qualibet repletio facit dolorem in ipso nisi modum excedat aut sit intensę malitię aut acuitatis. Secundum, quod non accidit sanitas integra nisi complete euacuetur monocolum cum semper suggerat materiam alijs. Tertium & quandoque materia colica uenit desuper, & quando fit clystere, scilicet carminatiuum aut apponitur aliquod euaporatiuum ampliatur materia & dilatur, & sic dolor duplicatur, & propterea in his casibus clystera ex oleo & similibus lenientibus sunt conuenientiora neque carminantia conueniunt nisi materia paucificata. Quartum febris est iuuatiua in omnibus doloribus colicę, cuius causa est uentofitas crassa aut phlegma, aut malitia complexionis frigida, & est ex rebus uelociter sanantibus uentofam. Quintum colica multotiens permutatur ad paralyfim & sanatur per eam, materia enim dilatata petit nucham aut aliquos neruos aliquibus membris particularibus deseruiens, & similiter aliquando permutatur ad iuncturas, quę permutationes aliquando accidunt propter medicos inepte operantes, qui ut sedent dolorem faciunt balnea siue semicupia nondum materia minorata, & adhibent alias medicinas colliquantes, esset enim minus malum ut stupefacerent. Primum uidi in fratre domini episcopi Veronensis, qui post paralyfim uniuersalem mortuus est sequenti die.

Secundum in potestate Lenati qui longo tempore arctica laboravit, hæc enim illico secuta sunt post balnei administrationem. Sextum & multotiens permutatur phlegmatica & sanguinea ad dolorem dorsi, quia materia subtiliata per caliditatem dolorosam. Et per medicinas iliace quæ communi ter subtiliatur facile fluunt ad dorsum cui dolori optime confert phlebotomia, est enim communis euacuatio & eo maxime, quia ibi est uena chilis quæ fugerens materias dorso inanitur per phlebotomiam. Septimum similiter permutatur ad melancholiam & epilepsiam, quæ sunt ualde male. Et quandoque ad hydropisim corrumpeudo complexionem epatis. Octauum, quando cholica inuenit dolores articulorum non apparêt tribus de causis, quoniam dolor fortior scilicet colicæ impedit debilitatem siue denigrat, & quia materia conuertuntur ad latus doloris fortis, scilicet ad intestina, & quoniam dolor, abstinentia & uigilia, resoluunt superfluitates. Nonum, & quando prolongatur retentio fecis & inflatur uenter propter fortem extensionem secum retentorum interficit, & quosdam uidi in quibus intestina rumpuntur, & fex egrediens replet concavitatem uentris & sunt sicut hydropici, & foetent odorem stercoreum, & quosdam uidi qui post retentionem fecum, scilicet ad sextum diem postea incurrun fluxum uentris, & cum lienteria moriuntur in tribus diebus, quia propter fortem extensionem & malam complexionem impressam uirtus digestiua & retentiua intestinorum ablata sunt. Decimum et multotiens colica succedit ad fluxum uentris cum quo euacuata sunt materiae subtiles & remanserunt crassæ factiuae colicæ. Vndecimum & multotiens cura colicæ remouet singultum, quia materia graditur ad intestina.

Iam ponenda sunt signa colicæ. Et primo communia. Signa ergo initii colicæ sunt, quia parum de fece egreditur & mutatur paroxysmus, id est consuetudo egerendi, non enim egerit horis sibi consuetis, minuitur appetitus imò quandoque aufertur propter magnam communitatem stomachi cum intestinis, præcipue abhorret dulcia & unctiosa. Hæc enim sunt similia phlegmati, sed magis appetit salsa, acuta & acetosa, contrariantur enim materiae phlegmaticæ quæ indiget calefactione, incisione, subtiliatione, stomachus enim præter naturaliter dispositus appetit contraria, sicut naturaliter dispositus appetit similia, secundo technici, appetit tamen aquam frigidam, propter sitim magnam ex consumptione humidi roridi in ore stomachi, quæ consumptio fit a uaporibus fecum retentorum calidis & siccis, & fit sitis propter alias causas statim dicendas, debilitatur digestio propter magnam compassionem stomachi, et propter uapores corruptos petentes stomachum, sentit dolorem in dorso propter uiciniam, intestina enim alligantur dorso, & dolorem in cruribus propter nocumentum communicatum nervis ad crura descendentibus, & quia propter dolorem reuocatur calor ad uiscera.

Signa autem augmenti colicæ sunt fortificatio doloris & uenter stringitur, ita ut non possit egredi uentositas, imò interdum non possunt eruere, & aliquando fit fortis punctio & dolor perforatiuus, &

actualis, maxime quando uentositas continetur inter tunicas intestinorum, sed quando materiae continentur in concauo intestinorum est dolor communiter extensiuus et grauatiuus, & fit fortis sitis et non satiatur, licet bibat plurimum, quoniam quod bibitur non penetrat ad epar propter oppilationes in orificijs meleraicarum, quæ sequuntur uentrem, id est, ad intestina terminantur quæ sunt plena, & sic onstia ipsarum oppilantur. Item fit sitis propter dolorem, & uigilias, & propter uapores fecum calefactes & exiccantes humidum roridum oris stomachi. Item multiplicatur in aliquibus ipsorum tremor abique causa, scilicet manifesta. Fit enim a uaporibus malignis petentibus cerebrum, & opprimentibus ipsum & neruos, & dolor etiam fortis communitate absoluta communicat omnibus membris. Item si aliquo ingenio aliquid egreditur per anum, illud est schibale, id est, stercorea sicca, rotunda, dura, sicut stercorea ouium & caprarum magna & parua, quarum causa in anatomia intestinorum dicta fuit. Aliquando egreditur res natans in aqua propter uentositatem inclusam subleuantem. Item fit frequens uomitus phlegmaticus, & cholericus, secundum plurimum phlegmaticus, deinde cholericus, deinde euomunt choleram poralem siue prasinam, deinde choleram eruginosam, & tandem melancholiam adustam, adurunt enim humores dolore, uigilijs, fame, medicinarum calidarum exhibitione, & fit uomitus frequens per communitatem stomachi ad intestina, & prohibitionem exitus per partem inferiorem & multitudinem materierum corruptarum, & quandoque uia cholerae ad intestina secundum plurimum confringitur, quare expellitur ad superiora. Item urina est tincta propter conuersionem maioris partis cholerae ad renes cum non inuenit uiam ad intestina quæ sunt oppilata, & sic oppilata est extremitas pori fellei terminata ad intestina. Secundo tingitur propter dolorem. Tercio, quoniam renes communicant in dolore, et propter istud quandoque retinetur urina, comprimitur enim uia transitus urine. Et quandoque est urina in principio, propter cut aqua ciceris, aut aqua casei dicta lactea, propter materias cum urina mixtas, licet sit etiam istud in fine, nisi uia transitus urine oppilentur, fit enim lactea ex permixtione phlegmatis cum aquositate. Sed in ea quæ est sicut aqua ciceris permiscetur tremor corporis diuersi. Item aliquando associatur retentione cum dis maximus, ita ut pectus indigeat retentione cum manu propter compassionem cordis in fortissimo dolore & uapores malignos ad ipsum eleuatos, & ita deperuenit ad syncopem, est enim tremor uia in syncopim & peruenit ad sudorem frigidum, et mortem. Sunt enim foetor & dolor de maxime profimentibus uirtutem.

Signa colicæ salubris. Primum quia egreditur aliquando fex & uentositas. Secundum, est mutatio doloris de loco ad locum. Tercium, quia aliquando dolor interpolatur aut saltem remittitur, & inuenit per clysteria & alia remedia quietem, & per exitum uentositatis, & egestionis.

Contraria autem significant colicam prauam, & aliquando mortalem.

Sicut dolor fortissimus qui non minuitur neque permutatur

permutatur. Secundo in qua nullo ingenio aliquid egreditur. Terio, in qua uomitus consequitur uomitum, significat enim fortis oppilatio intestinorū, & materiam regurgitare ad stomachum, & quod perueniat ad uomitum fecum & cadit uirtus cum nihil retineat, quo possit nutrire.

Item sudor frigidus & frigus extremitatum propter uehementiam doloris uentris, & declinationem sanguinis & spiritus ad ipsum.

Item quando peruenit ad singultum, quorū unus sequitur alium propter magnum nocementum cōmunicatum ori stomachi.

Item quandoque peruenit ad turbationem rationis, & spasum, significatur enim materiam cōmunicari cerebro & neruis aut saltem est communicatio absoluta propter doloris uehementiam.

Et ex signis extraneis est cum apparet in colico ueftigium & bothor nigrum sicut faba & ulceratur, & remanet usque ad diem secundum, aut parum plus, quoniam moritur, significatur aut materia melancholica adusta, quia est bothor nigrum & ulceratur, cuius materia natura tentat expulsionem, & non possit expellere nisi modicam rem, quapropter cū macipue in colica quæ est aggritudo acuta, & subdit, quod huic homini aduenit subeth in principio, materia aut saltem multis uaporibus cerebrum opprimen-
tibus, ultimum est quod bonitas anhelitus est bona significatione ad euadendum sicut e contra malitia anhelitus est efficax signum ad moriendum.

Differentia inter dolorem colicum & renalem ex lapide. Quia dolor colicus & renalis maxime ex lapide demulsum simulantur propter propinquitatē colon renibus, & propriē reni sinistro & colligantiam eorū adinuicem. Ideo signa distinctiua inter hos dolores sunt ponendo quæ penes Auicennā sumuntur ex sex.

Primum est ex parte doloris quatuor modis, scilicet ex quantitate, loco, tempore & motu.

Quantitate, quia renalis paruum occupat spaciū, colicus autem magnum. Loco, quia colicus incipit à superæquitate plurimum, & transit ad sinistram pitæ sinistra, & uertitur uersus mirach & pecten ille enim est locus intestinorum crassorum, & quādo magnificatur & extenditur, dilatur dextra & sinistra, & in summa est decluior ad anteriora quam ad posteriora. Sed renalis incipit à superioribus posterioribus ubi sunt renes, & descendit paulatim per poros uritides usque ad uescicam, & est decluior ad posteriora ubi sunt renes. A tempore uerò, quia renalis est fortis, et quando stomachus est uacuus à cibo, & colicus alleuiatur. Sed contra renalis alleuiatur cum sumitur ci-
bus & colicus fortificatur. Huicmodi autem causa est, quia stomacho uacuo renes dolore inflāmati non refrigerantur nec remolliuntur, sed sumpto cibo alio refrigerantur nec remolliuntur, sed sumpto cibo alio dolor sedatur. E contra uerò sumpto cibo colon à stomacho pleno & grauante comprimitur, & dolet. Itē per descensum cibi augetur repletio in colon, item colicus fit subito, sicut in eo uelociter fit oppilatio, imò melius sicut facta oppilatione à uentositate retēta fit extensio, & renalis non fit ita subito cum lapis non su-

bito generatur, licet aliquando intendatur subito cū lapis incepit moueri.

Quarto principaliter sumitur differentia ex motu doloris, quia colicus mouetur ad plures partes uētris & magnum occupat spaciū, sed renalis stat fixus, ex si mouetur, mouetur descendendo solum secundum incesum pororum uritidum, & sic sunt quatuor differentie ex dolore sumptæ. Secunda differentia principalis est ex parte uicinantium, quia in lapide dolet dorsum totum, & multiplicatur tremor & impotentia flexionis corporis, & erectionis. Et in colico non.

Tertia differentia principalis est ex parte iuuatium & nocentium, quia in colica exitus fecum & uentositatis per clysteria, & alia non solum alleuiat, imò perfecte curant, sed in dolore lapidis, licet alleuiet, tamē parum & saltem non curatur nisi exeat lapis, & e contra medicinæ frangentes lapidem & prouocatiuæ curant lapidē & non colicam. Quarta differentia principalis sumitur ex eo quod egreditur aut retinetur, quia in colica cum adest dolor retinetur schibale stercus fecum & stercus uaccinum, & fortē adest rugitus ex præsentia uentositatis, & cum huiusmodi educuntur curatur. Sed cum adest dolor renalis est in uisū urinae præsentia lapidis aut arenularum conglobatarū & per istarum exitum curatur. Quinta differentia principaliter est ex parte ultimitatis accidentiū quoniam dolor crurium & dorsi & tremor in renali est plus, sed casus, appetitus & uomitus frequens paruitas digestionis, uehementia doloris & perductio ad syncopin, & sudor frigidus in renali sunt minus. Sed e contra omnia se habent in dolore colico.

Sexta differentia principalis sumitur ex parte significationum & causat præcedentium, quoniam frequentia nauſeatiua facietatis & sumptio ciborum malorū qui sunt aquosi, uentositates aut stipitici siue pontici & uicissitudo punitionis & rugitus & retentio fecis sunt præcedentes in colica, sed urina arenosa & filosa est præcedens in renali, & nō est in ea urina subtilis nisi dum esset ultima oppilatio. Item renalem præcedit grauitas renum, & sumptio ciborum uiscosorum quorū chimī sunt materia lapidis. Differentia autē inter dolorem colicum & matricalem sumitur ex 5. Primū quia dolor matricis communicatur inguinibus, pectini, anchis & coxis & alcatim & ilijs & non ascendit supra illa neque superæquitat stomachum, sed e contra licet colica communicet ilijs & pectini, tamen non communicat inguinibus & coxis, frequenter stomachum superæquitat. Secundum quia in dolore matricis licet sit uenter factus lenis & educat superfluitates intestinorum, tamē dolor non sedatur, sed in colica fica. Tertium, quia in dolore matricis præcessit retentio menstruorum & humiditatum consuetarū per uuluum euacuari, sed in colica præcessit fecis & uentositatis retentio. Quartum, quia dolor matricis iuuatur cum educatione humiditatum & uentositatis ex matrice, colicus cum educatione fecum & superfluitatum intestinorum. Quintum, quia aliquando habens dolorem matricis præocatur uaporibus ascendentibus ad cor, diaphragma, non autē sic in colica. Signa distinctiua in species colicæ. Colica phlegmatica signatur per antecessiōem causarum generatarum phlegmatis ex facietate nauſeatiua, & ex speciebus ciborum generantiū phlegma. Item per ætatē

scilicet senectutis & pueritiæ, & regionem frigidam & humidam. Et tempus anni scilicet hyemem. Et reliqua scilicet secundum artem & similia. Secundum signum est exitus phlegmatis ante cholericam & in ipsa colica cum sit dysstere. Tertium est frigiditas intestinorum & grauitas sensata propter frigiditatem & grauitatem phlegmatis. Quartum est uehementia retentionis, ita ut non egrediatur aliquid de fece aut humore & uisitate, & si quid egreditur illud est res inflata sicut stercus uaccinum natans, quale egreditur in uentosa propter phlegma quod uentosatur. Et si comparatur ad uentosam dolor est remissior quam dolor uentosus, sed est longioris durationis cum difficile sit illud phlegma educere propter sui crassitatem et uentositatem, licet non tantam faciat extensionem sicut uentositas & per consequens non ita intensum dolorem, nec decipiat aliquis propter situm inflammationem & rubedinem aquæ & æstimet quod ægritudo sit calida hancque sunt omnibus colicis communia.

Prognosticum. Colica phlegmatica secundum plurimum curatur. Signa uentosa sunt ista. Primum est antecessio causarum uentositatis sicut est multitudine potus aquæ frigida. Item potus uini commixti & olera inflatiua scilicet in quibus est humiditas superflua & fructus humidi inflatiui. Secundum quod cibis non fuit digestus. Tertium rugitus. Quartum retentio fecum in intestinis prohibentium exitum uentositatis. Item extensio & uolutatio uehemens, id est, inquietudo propter magnitudinem doloris, quasi intestinum terebellum perforetur & quasi in intestino occultetur acus, & hæc accidentia licet aliquando sint in phlegmatica cum retinetur uentositas aut generet ipsam sunt tamen fortiora in uentosa. Et cum hoc in uentosa non est grauedo sensata in phlegmatica. Item in uentosa quandoque præcedunt rugitus plurimi & uentositates. Et quandoque uenter non rugit, & fortasse non rugit nisi cum sit euaporatio & compressio. Et quandoque figitur dolor & non permuratur. Et quandoque cognoscitur inflatio cum manu & secundum plurimum iuuatur compressione & euaporatio quandoque iuuatur, quandoque non. Iuuatur enim cum est pauca & subtilis ita ut subtiliata possit resolui. Cum autem est multa & crassa, & in aliquo loco conclusa tunc euaporatio nocet. Et similiter cum eius materia est sicca melancholica. Item significat ipsam inflatio fecis uaccinæ quæ plena uentositate natat super aqua. Et quandoque est cum ea uenter lenis fluens & egrediuntur humores & non iuuatur propter retentionem uentositatis crassæ inter tunicas.

Et ex signis propriis significantibus ipsam contineri inter duas tunicas intestini est dolor fortis perforatiuus in eodem loco semper permanens. Et illa in qua est permutatio doloris est incolumior. Sed in qua est inflatio sicut in tympanite mala, significat enim corruptionem digestionis stomachi & epatis.

Prognosticum. Colica uentosa secundum plurimum curatur & si prolongatur transit in tympanitē.

Signa colicæ ex fece sunt antecessio retentionis fecis ante colicam cum tensione & grauitate uehementi, & sentitur quasi intestinum rumpatur & quandoque sit tenebrion propter fecem stimulantem intestinum rectum & grauantiem ipsum & propriè extremitatem eius, & tamen non egreditur aliquid propter

fecis crassitatem aut duritiem. Et quandoque egreditur res uiscosa & crassa, scilicet parum phlegmatis aut parum fecis duræ phlegmatæ inuolutæ aut quibusdam mucilagibus, quarum magna est copia in intestinis crassis. Verum illam quæ est ex fece exiccata cholera significat tinctura fecis, mordicatio, aduulso, & inflammatio, siccitas linguæ, & multitudo eius, quod egreditur de cholera, & aduentus quietis cum fluxu cholerae & nocetur à fame & iuuatur à frigidis temperatis. Sed feculentam factam à raritate corporis significat præcessio paruitatis fecis duræ, extenuatio corporis, item uelocitas & facilitas lædendi à calore & frigore extrinseco, item paucitas pilorum. Sed feculentam factam à caliditate & siccitate uentris significat intentio inflammationis & siccitas mirach & tenebrositas eius & siccitas egestionis cum nigredine. Sed feculentam factam à resolutione aeris, balneo, exercitio, sudore, & reliquis similibus significat præmissio paruitatis fecis & antecessio causarum prædictarum. Sed signa facit ex retentione cholerae, ita ut non transeat ad intestina sunt signa icterici scripta in capitulo proprio, & albedo fecis cum diffcultate exitus eius, & forte aderit icteritia. Signa uerò colicæ feculentæ à causis primitiuis, sicut à comotione rerum siccarum, aut exiccantibus, aut quia homines propter occupationem tardauerunt egestionem, aut quia fex sit exiccata propter ieiunium sunt ipsæmet causæ primitiuae, & cōsecutio duritiæ fecis post ipsas, & idem sit iudicium in omnibus causis primitiuis. Signa autem superflua caliditatis epatis propter miram attractionem feces exiccantis, & similiter frigiditatis eius sunt manifesta ex his quæ superius dicta sunt in passionibus epatis.

Prognosticum. Colica ex fece secundum plurimum curatur.

Signa apostemosa sunt. Si sanguineum est, tumor, durities tensiua, dolor continuus, extensius & grauius, fixus in loco uno cum pulsatione & inflatione, febris acuta, sitis uehemens, rubedo in colore, retentio urinae apostemate comprimente uias urinae, & est signum fortè magnitudinis apostematis. Item lædi cum fluxu cum exiens peruenit ad locum apostematis, & quandoque est iste dolor cum lenitate uentris, & quandoque perducit ad frigus extremitatum cum calore uehementi in uentre, & quandoque rubet locus uentris exterioris, & significat magnitudinem apostematis, aut quia fortè apostema permutatur extensius. Si uerò apostema fuerit cholericum erunt renuissio, pulsatio & grauitas minus, & febris & inflammatio & mordicatio uehementius.

Signa apostematis phlegmatici, & est parum, sunt. Ut sit dolor continuus in loco uno, & propriè cum descendit aliquid per partem apostematam. Et inuenitur cum manu inflatio cum lenitate. Et habitudo ægri est habitudo mollium phlegmaticorum. Et fortè iam præmissum est regimen phlegmatis multiplicitati sicut lactis, piscium, olerum, crassarum. Et frigidorum humidorum & carniū crassarum. Et est ipsema eius frigidum subtile, & est signum conueniens ad hoc, & egestio est phlegmatica. A melancholia non prouenit nisi rarissime, & posset fieri permutatio ex apostemate sanguineo & etiam in apostemate machi signa ex prædictis in hoc capitulo de apostemate machi

machipatere possunt.

Prognosticum. Colica sequens apostema in intestinis crassis secundum plurimum curatur. Sed in gracilibus si fuerit notabile, secundum plurimum mortalis.

Signa factæ ex torsione intestini & ex aperitione dimi & ruptura eius aut siphac sunt. Si est ex torsione eventus eius subito post motum laboriosum aut saltum uehementem, aut casum, aut percussione, aut calcationem, aut luctationem, aut tolerantiam ponderis, aut quia præcessit uentositas uehemens hæc omnia contorquent intestinum rumpendo ligamentum usque in finem non addens neque minuens. Si uero sit ex dilatatione aut ruptura didimi apparet tumorem. Si uero siphac in aliqua parte ruptum fuerit apparet ibi tumor ubi ingressum est intestinum, & in omnibus his casibus sit retentio fecum secundum plurimum.

Prognosticum. Colica sequens contorsionem intestini nunquam sanatur nisi Deus uoluerit, & nisi à casu intestinum ad oppositam differentiam reuolutum redeat ad situm naturalem. Colica autem sequens præcensum intestini in bursum testiculorum aut in ruram siphac curatur secundum plurimum. Nam secundum plurimum reduci potest ad intra uentrem & ad situm naturalem, sed non apud in experimur uenientes. Sed signa reliquarum specierum colicæ rarius eueniunt breuiter absoluam. Signa tunc sensibilibus frigiditatis intestini sunt paruitas si ne grauitate, item inflatio egestionis, & quando est frigida. Et signa factæ ex caliditate sine materia sunt signa contraria. Et signa factæ ex siccitate sunt egestio, liatio & asperitas, & signa factæ ex præsentia cholere in intestinis sunt regimen præcedens multiplicatiuum cholere, ætas, tempus, regio & forma, mordicatio uentris, item noceri ab his quæ educunt choleram, quia in ipsa actuali educatione dolor augetur, licet educatio nihil cholere fuerit imbibita, & quandoque associatur ei febris, & non est febris intensa neque cum ea magni mole. Et quandoque associatur dolor in pectine quasi punctura cultelli absque uentositate. Sed signa factæ ex melancholia sunt eruatio acris, nigredo egestio signa communia attestantia melancholia. Sed signa uentris expulsiue sunt ut iam antecesserit lenitas. Sed egerbatur parum pro uice. Item antecessio causa rum debilitantium uirtutem ex calore, frigore, & reliquis, aut præsumptio alicuius rei debilitantis uirtutem uenosa aut non uenosa. Et multoties accidit ut uenter sit lenis aut temperatus, & sit quantitas & qualitas egestionis secundum naturalem, & tamen non potest egredi fex, nisi cum clystere aut supposito nitula in sphincteri aut ragadias aut hemorrhoides aut alia similia nocumenta propter quæ natura terretur

in emittendo feces. Et quandoque accidit propter obstructionem sensus. Et quandoque propter debilitatem musculorum uentris, discurret ergo medicus, & causam inueniat. Sed signa colicæ sequentis debilitatem sensus sunt ut patiens sumat ea quæ faciunt fecem mordicantem, & non percipiatur in assellatione, hæc autem sunt sicut cape, porrum, caseus salitus & cetera acuta. Item quod non sentiatur nocumētū suppositiorum acutorum, & uenter inflatur ex eis quæ retinentur & non doleat dolore notabili. Sed signa factæ ex uermibus sunt signa uermium, de quibus infra & antecessio exitus eorum. Signa autem colicæ à solutione continui in intestinis sunt exitus sanguinis aut saniei, aut foris præcessit apostema quod ruptum est. Si uero causa eius fuerit lapis in intestinis erit ibi grauedo, & punctio & quod alias præcedenti tempore genitus sit & educus. Sed signa colicæ per cōmunitatem à sto macho, cerebro, spūalibus, epate, splene, renibus, uelica, matrice, mirach, & toto, sunt quia præcesserunt nocumenta eorum membrorum aut totius, cum quorum augmento augetur colica, diminutione minuitur, & quibus recedentibus colica recedit. Sed signa colicæ contagiosæ & pestilentialis est ipse transitus de homine ad hominem & de regione ad regionem, & quod maxime accidit his qui conuersantur, & hæc frequenter est mortalis, & secundum plurimum colica, ileos.

Signa autem causarum primitiuarum colicæ est ipsarum causarum præcessio & subsessio colicæ secundum plurimum his causis præcedentibus. Prognosticum. Hæc species colicæ secundum plurimum curatur, præter pestilentiam. Cum uentum est ad uermium fecum in quacunque specie mortale secundum plurimum.

SI cum dolore uentris fuerit ipse constrictio & nausea, sed nec calor, nec febris affuerit, ea ægro danda sunt quæ uentrem sine uomendi desiderio soluant ut est electuariū de galia. Quod Rec. mastichis, garioph. zing. melanopiperis, macropiperis, cinamomi, nucis muscatae, galie, omnium ana. drach. 10. scammonae, drach. 10. postea exprimantur citonia acetosa, & recentia, & succus eorum cum eiusdem quantitatis melle misceantur & coquantur, usque ad spissitudinem paulatim. Et conficiatur ex eo medicamen, quod tamen eiusdem quantitatis sit, cuius species sunt. Cuius dosis sit ab aur. 2. usque ad 2. & s.

Hic Rasis incipit determinare de passionibus intestinorum, & in primo cap. determinat de doloribus intestinorum, in secundo de fluxibus. Causam autem de uermibus postponitur. Sed primum cap. de dolore intestinorum diuiditur in sex partes. In prima determinat de dolore intestinorum à phlegmate & cholera

& cholera, siue sit dolor colicus siue iliacus. In secunda ibi. Quod si cum uentris dolore, determinat de colica uetosa. In tertia ibi. Si autem cum dolore febris affuerit determinat de colica à causa calida inueta cū febre. In quarta ibi. Cum autē locus doloris, determinat de colica apostemosa. In quinta ibi. Qui autem cum hoc dolore, ponit regimen praeferuatiuum à colica uentosa. In sexta ibi. Sed si cui dolor iste, redit ad ponendum curam colicae à causa calida. Primam diuido in quatuor. In prima ponit curam doloris intestinorum siue colici siue iliaci cū electuario solutiuo, quando est cum uehementi nausea, in secunda ibi. Quod si nausae uehementia non fuerit, ponit curam huius doloris cum pilulis solutiuis, quando est sine uehementi nausea. In tertia ibi. Si autē passio iliaca, curat hunc dolorem cum suppositorijs. In quarta ibi. Et si nō contulerit curat hunc dolorem cum clysteribus, quid dicat in prima parte satis est manifestū.

Curat, hunc dolorem existentem cum nausea cum electuario de galia stomachi confortatio ne sequatur uomitus. Est tamen tutius ut praemittantur aliqua clysteria, ut uenter sit obediens, ne medicina solutiu efficiatur uomitiua. Recepta ordinetur hoc modo, ℞. mastichis, gariophilorū, zing. melanopiperis, id est, nigri piperis, macropiperis, id est, magni siue longi piperis, cinamomi, nucis mus. galiae. s. alefangine descriptione Mes. omniū añ. 3. 10. scamonee 3. 10. succi citoniorū acerosorū rectū, mellis añ. ℥. 1. bulliāt primo succus, & mel lento, igne paulatim ad succi cōsumptionē, & in fine puluisiā dictus secū misceatur. Vult enim Rasis quod mel remanens in fine postquā est cum succo bullitum sit tantae quantitatē quantae est pulvis secum miscendus, quod tamen inusitatum. At plus enim in communi usu ponitur pro una ℥. mellis tres. 3. pulueris, sed hoc non erit electuarium, sed una massa solida, dos. eius est à 3. 2. usq; ad 3. 2. cū dimidia. Et si bene cōpuras dosis non est magna, erūt enim pro unaquaq; dosi à 6. usq; ad 7. gran. scamoneae, & non est aliud solutiuum. De qua re admirandum est cum intentio sua fuerit principaliter soluere phlegma, quod patet ex pilulis sequentibus in textu Rasis. Credo in textu Rasis esse defectum. Et quod debuerit esse in hoc electuario saltem 28. 3. turbit. Quid patet ex duobus. Primo quia dos. apud consuetudinem. Mes. est parua. Secūdo, quia Mes. describēs hoc electuarium in suo antidotario distinctione tertia in fine. Quando uult soluere cholera & phlegma permisceat turbit cum scamonea. Et tu si placet uide descriptionem eius. Aut oportet dicere, quod intentio Rasis fuerit solum soluere cholera, quod non est bene consonum receptis sequentibus. Ego autem tibi consulo, ut in hac recepta, Mes. sequaris, qui cum uult soluere solum cholera ponit solum scamoneam. Cum uult soluere cholera & phlegma ponit scamoneam & turbit. Si autem solū uult soluere phlegma, ponit turbit, & loco scamoneae tantum cartami excorticati. Et si uult educere solum melancholiā, loco istorum ponit eleborum, epithimum & polypodium. Vel si uis potes dicere, quod in isto electuario ponitur piper nigrum, & piper longum, qui solunt phlegma liquefaciendo & ipsum dissoluendo & uirtutem stimulo. Nec mireris de hoc, nam ipse Rasis in suo antidotario conficit pilulas ualentes in

nausaeuati satietate & in colica soluentes, in quibus tamen nihil ponitur solutiuum nisi piper & saccharum & ita facit Auic. in cap. de colica, & Ras. in suo antidotario ponens hanc met receptam ex succo citoniorum non ponit nisi scamoneam. Hic ut libet. Et si infertur, quod dosis est parua contra consuetudinem Ras. Responde quod in colica solutiu non debent esse multum fortia, ne forte perueniat ad uomitum secum. Et haec responsio est cōformis intentioni Rasis in diuisionibus in cap. de colica, ubi in colica perueniente à phlegmate crasso dicit quod hora parosus mi succurratur cū clysteri lenitio solutiuo. Et si sufficit bene est. Et si non cum solutione medietati, & delectur electuarium de dactylis. Et electuarium diacitonen solutiuum. Et certum est quod non loquimur de alio diacitonen solutiuo, nisi quod hic describitur & in antidotario suo.

Quod si nausae uehementia non fuerit nec aeger medicinas uomuerit pilula iliaca sunt dande. Quae Rec. colocynthidis longa peni amborum, ana. drach. 10. scamoneae, drach. 3. & tertiam, informantur pilula, de quibus unius aur. pondus est dandum, uelociter enim passionem dissolunt iliacam.

Hic Ras. non existente nausea magna dat pilulas proprias contra passionem iliacam. ut ℞. colocynthidis calidae, siccae, educentes phlegma crassum & conuertentis colicae phlegmaticae & uentosa iuuamentū, ut situm, & similiter hydropisi, sagapeni calidi & sic quod bibitum & clysterizati confert colicae phlegmaticae & uentosa, ana. 3. 10. scamoneae 3. 3. & formentur pilulae de quibus pondus aur. 1. est dandum. Ita est uelociter enim passionem dissolunt iliacam, imo praedicina fortis, à qua non est incipiendum, imo praemitenda sunt clysteria, & non auderem ex pilulis praedare, 3. 1. & iam uidi cum hoc solutiuo quēdam peruenisse ad uomitum secum, cui etiam fractum est intestinum & uenter plenus est fecibus, ac si esset hydropisus & foetens erat & mortuus est tertia die post hoc solutiuum, & in quinta die à principio egreditur. Cū tamen etiam patientes iliacam non moriantur de intentione Auicē. & ut dicat experientia ante septimum diem. Ego itaque consulo ut incipias à clysteribus, & si non sufficiant peruenias ad solutiu leuius, sicut sunt pilulae alephanginae & similia leuia. Quod etiam consilium habes à Rasi in diuisionibus loco sitim allegato.

Si autem passio iliaca difficilis fuerit, nec medicamina uentris solutiu eis contulerint, hoc suppone collyrium. Quod Rec. salis panis, drach. 10. colocynthidis interio ris, scamoneae amborum, ana. drach. 2. & s. fiat ex eis collyria longa & supponantur.

Curat hanc passionem cum suppositorijs, & solutiu in textu ponit pulueres solutiuos, sed debent fieri cordi nari,

nari, panis salis, 7. 10. & est sal quo communiter uti
mur & ponitur in pane, colocynthidis interiorum,
scammonea, amborum, 3. s. mellis, 3. s. buliat mel
& addantur pulueres suprascripti & fiant supposito-
ria longa, etiam usque ad longitudinem, 7. digitorū
coniunctorum, est enim intestinum rectum, longum
latius & latum, ita ut sit capax huiusmodi cili-
norum.

Et si non contulerint ex enemate leui
clysterizetur. Quod Rec. ficus citrinas,
5. furfuris quantum una manu capi potest,
maluauici, manip. 1. hec in panno ligata &
ficula folia 10. in duabus lib. aquae coquan-
tur, donec ad unam redeant, deinde coletur
& ponatur super ea baurach pōdus unius
aur. olei sesamini, unc. 1. & fiat clystere ex
eo. Si autem quis fortius & acutius fa-
cere uoluerit pondus aur. unius de collyrio
quod prius diximus admisceat. Clystere
uehementer soluens, quod tunc utendum est
cum medicamina non conferunt, nec uenter
soluitur. Rec. colocynthidis interioris,
drach. 10. centaurea, drach. 5. buchorma-
rien, arthanita, amborū, ana, drach. 2. men-
tastri ruta, origani, omnium ana, manip. 1.
omnia in tribus lib. aquae donec ad tertias
duas redant coquantur & colentur, deinde
dissoluantur in ea alchitram, mellis, ambo-
rū, ana, drach. 3. castorei, sagapeni, oppopa-
naci, collyrij, quod praediximus, omnium ana
drach. 2. misceantur omnia, & dum est tepi-
dum, fiat ex eo enema. Et si schibale non
exerint iteretur clystere donec exire uiden-
tur, hoc namque clystere administrari de-
bet cum res fortissima est & pessima, & in
colica mala, & est illa in qua fit nausea ual-
de uehemens & inferius nihil egreditur.

Huius praeterea aegritudini quandoque
foetida superuenit eructatio & plerumque
stercus per os egreditur, quod cum accidit
sepe mortem portendit.

Curat hanc passionem clysteribus lenitiuis. Quae
si non suffecerint docet clysteri admisceri aureū unū
pulueris collyrij suprascripti. Et si haec non conferūt,
docet Rasis imponere clystere ultimum & fortissimū
etiam multotiens iterandum si schibale & reliqua op-

ilatiua non exierint. Similia namque clysteria for-
tia fieri conuenit in colica & iliaca mala, in qua time-
tur ne feces euomantur, Nam uomitus stercoris saepe
portendit mortem. Buchormarien & arthanita,
sunt duae species mali terrae siue panis porcini, siue cy-
claminis, idem enim sunt, alchitra est pix apud alios
gummi cedri. Reliqua nota sunt. Sed certe tutius est
primo incipere a clysteribus lenitiuis, quae si non suf-
fecerint procedatur ad clysteria fortia, & his non suf-
ficientibus ad solutiua leuia, & ultimo ad fortia.

Quod si cum dolore uentris non fuerit
ipsius strictura, sed inflatio & rugitus &
tensio in uentre existunt, confectio de bac-
cis lauri danda est, quae reci. foliorum ru-
tae siccorum, drach. 10. ameos, cimini, nigel-
lae, cheisin, origani, carui, alexandrini sem.
amigdalorum amar, melanopiperis, macro-
piperis, mentastri, dauci, acori, baccarum,
laur. castor, omnium, ana, drach. 2. sagape-
ni, drach. 4. oppopanacis, drach. 3. conficiā-
tur cum melle eiusdem ponderis, cuius dosis
sit ut auellana una, aut nabacha multis uici-
bus cum uncia. 1. uini calefacti, aut cum apo-
zemate de radicibus. Huic confectio in
remouenda uentositate & dissoluenda nihil
equiparatur. Hoc praeterea supposito-
rium subijciatur, quod sit uentositatis dis-
solutiuum. reci. cimini, foliorum ruta & ui-
ridis, amborum, ana, manip. 1. buchorma-
rien, arthanita, amborū, ana, drach. 3. bau-
rach, drach. 1. conficiantur ex melle & su-
perponatur cum spongia uel lana, hoc enim
dissoluit uentositatem inferius & expellit.
Venter quoque assidue ex panno calido uar-
porandus est, & aeger in tinia mittendus.

Si autem haec non suffecerint uetosa cum
igne ponenda est, & locus donec rubere coe-
perit fricandus. Post haec inunctio fieri
conuenit ex oleo rutaceo, & ex alijs oleis
calidis, & ex eis clysterizandus est aeger
postquam eis admixta fuerint castoreum,
euphorbium, amborum ana, drach. semis.

Hanc uero solitus pati aegritudinem,
dum sanus est caueat ne uinum aqua mixtum
bibat

bibat, nec etiam sumat uinum nisi purum, et forte nec aquam multā bibat, & abstineat ab herbis & lacte, et omnibus inflatiuis.

Philonium faciens iliosis cum maximo coartantur dolore & timetur ne syncopis superueniat, uentositatem carminat & somnum prouocat, recipe. piperis, ameos, foliorum rutæ, mentastri, castorei, baccarum lauri, cymini, omnium, ana, unc. i. oppij, mādragoræ, hyoschyami, sem. omnium, ana, unc. s. conficiantur cum melle eiusdem quantitatatis detur ex eo pondus aur. unius huic quoque electuario additur plerunque scammonæ, unc. tertia, & fit tunc medicamentum uentris solutiuum.

In hac secunda parte principali curat colicam siue iliacam uentosam. Et diuiditur in partes septem. Primo ponit curam per electuarium, quando non est in uentre constipatio. In secunda ibi. Hoc præterea, curat colicam & maxime cum uentris constipatione, cum suppositoio. In tertia ibi. Venter quoque, curat per approximationem panni calidi & balneum. In quarta ibi. Si autem hæc non suffecerint curat cum uentosa. In quinta ibi. Post hæc unctionem fieri conuenit, curat cum unctione & clysteribus. In sexta ibi. Hanc uero solitus pati, docet a quibus est cauendū tempore sanitatis. In septima ibi. Philonium ponit philonium ultimū in sedando dolores fortissimos. Quæ dicit in prima parte satis nota sunt. Cheisin, id est, semen leuistici, alexandri seminis, id est, petroselinii, & iubet omnia permisceri cum melle tantæ quantitatatis, quantæ sunt reliqua, quod tamen ut statim dixi non est in cōmuni usu, dosi huius electuarij fit, ut auellana aut na batha, id est, iuiuba siluestris & misceatur cum 3. i. uini calefacti potentis, aut detur cum apozemate ex radicibus superius dictis in cap. de dolore epatis. In secunda parte curat colicam cum suppositoio, sed ponit extraneum modum faciendi hoc suppositorium, facit enim primo electuarium cum melle ut patet, deinde facit suppositorium de spongia uel de lana in cōmuni forma, quod postea intingit in electuario dicto & supponit. Sed certe præstatius esset facere suppositorium in cōmuni forma, faciendo mel per decoctionem inspissari sicut dictum fuit in alio suppositoio.

In tertia parte quæ dicit nota sunt, sed balneū illud siue tina debet esse cum decoctione rerum carminantium uentositatem. In quarta parte quæ dicit sunt manifesta. Ventosa enim habet soluere uentositatem, & debet esse uentosa magna. In quinta parte quæ dicit sunt manifesta. Et nota quod ponit in clysteri castorei, euphorbij, añ. 3. s. Et est forte insolitum, & non auderem facere nisi in forti, & non in puero, neque in prægnante, prouocat enim abortum mirabiliter. In sexta parte quæ dicit sunt manifesta. In septima parte describit philonium, ualde efficax in sedando do-

lorem uentosum & quemcunque alium dolorem maxime à frigida causa, sed nō debet dari, nisi in casibus extremis, & cum alia non contulerint, nec debet multum frequentari, sedat enim dolorem stupefaciendo, & subdit quod huic electuario additur tertia pars, 3. scammonæ & efficitur solutiuum. Et nota quod est bonum ingentum cum stupefactiuis miscere solutiuum, simul enim perficitur cura uera & mendola, stupefactiuum potest minus nocere, quando est iuncta solutiuo.

Si autem cum dolore febris affuerit, cassia fist. in succo endiuie bullito & dyspnæto dissoluta ægro est danda. Et syrupus uio la. in potu est tribuendus. Et nutritius est ex taphea cum oleo de amigdalibus dulcibus condita. Et ex leui clysteri clysterizandus.

In hac tertia parte principali curat colicam pendentem à cholera, & docet lenire uentrem cum callia dissoluta, cum succo endiuie bullito, donec dispenseur. Et clysterizetur cum clysteribus lenientibus frigidis. Et nutrit ægrum ex taphea. Taphea est duplex, una alba quæ fit ex sola aqua & carne. altera uiridis quæ fit ex aqua & carne & coriandro uel aliqua herba uiridi. Et per hæc intelligit cibaria frigida & humida. Omittantur tamen ea, quæ à proprietate faciunt colicam sicut cucurbita & similia.

Cum autem locus doloris in uentre apparuerit crassus, & æger habens apostema in principio phlebotometur, deinde cassia fistula, cum succo herbarum sepe danda est. Et sit cibus eius, cui hic dolor ex consuetudine accidere solet, taphea unctuosissima, cum saccharo, & oleo sesamino. Et abstineat à stipticis, & acetosis, & a cibis crassis, & uentrem stringentibus.

In hac quarta parte principali curat colicam apostematosam, quapropter præcipit phlebotomiam in principio, scilicet ex ballica & hauriatur quantitas sanguinis notabilis secundum exigentiam repletoris & uirtutis. deinde detur callia cum succo herbarum frigidarum, sicut endiuie, lactuice, & similia. Intendit enim curare apostema calidum, nam hoc secundum plurimum euenit, cætera manifesta sunt.

Qui autem cum hoc dolore uentositatem pati solitus est cibetur cum calagie & mutagenat conditis cum seminibus. Et abstineat ab oleribus & lacte, & omnibus que inflant. Et bibat uinum forte, & non uicium, aut hydromel cum speciebus quæ pro condimento ponuntur, ut piper quas dicitur

mus. Confectio hydromelis. Recipe mel mundi, libram unam, aquæ libras sex misceantur & coquantur diu & spumentur bene, donec fiat ad spissitudinem iulep.

Cunque hoc factum fuerit in una quaque libra, ex eo mittantur, drachmas duas, pulverizati piperis in panno ligati, donec appropinquet finis decoctionis eius, & cum infrigidatur extrahatur pannus & exprimatur, & cum necesse fuerit propine-

In hac quinta parte principali, primo docet præseruare a dolore uentroso, licet hoc regimen etiam conferat in cura doloris colici præsentis. In secunda ibi. Confert etiam, describit medicinam conferentem in actuali dolore. Quæ dicitur in prima manifestata sunt. Calagiæ & mutagenat sunt cibi apud Arabes, qui sunt in cazola ex carnibus minutim in eis cum aromatis & seminibus resolutis uentositatem. Hydromel, id est, aqua mellis.

Confert etiam cui hæc passio ex uentositate & crassa superfluitate accidere solet oleum de cherua recenti cum apozemate de seminibus sumptum. Apozemate de seminibus, hoc est. Recipe, ameos, cymini, cheisim, carui, origani, nigellæ, omnium, ana, pugillum unum. Istis autem admisceantur, libras tres aquæ & coquantur, donec ad libram unam semis redeant, de hoc itaque apozemate sumantur uncie duæ, quibus drachmas tres olei de cherua addatur & multis diebus bibantur.

In secunda parte docet dare olei de cherua, drachmas tres, cum uncis duabus apozematis, id est, decoctionis de seminibus pluribus stomacho ieiunio. Cherua Arabice est planta quæ communiter uocatur pentadactylus, caraputia maior & a quibusdam ipsa solis, apud Dioscoridem uocatur cici aut selanus agrestis, ex hac recenti fit oleum de cherua granis eius expressis.

Sed si cui dolor iste cum calore superuenit pruna 20. & ficus citrina, 5. & pasularum enucleatarum, drachmas 5. sumantur et coquantur et colectur, cui oleum amigdalæ admisceantur, deinde cassia fistula, in eo dissoluta colectur & misceantur. Et ex apoze-

mate quod in capite de rheumatismo diximus in potu tribuatur.

Venter uero si multum fuerit siccus prædicto apozemati addantur polypodij & turbith amborum, ana, drachmas duas & coquantur cum eo, & detur donec uenter soluat, cum autem solutus fuerit remoueat polypodium & turbith. Confectio electuarij quæ uentrem soluens destruit uentositatem & grauedinem. Recipe turbith albi fricati et pulverizati, drachmas uiginti, sacchari, drachmas triginta, zin. drach. decē, huius pulueris, drachmas tres ad bibendum tribuantur. Pilule de quibus cum quis uentrem soluere uoluerit unam sumere debet, quæ & appetitum excitant & inflationem resoluunt & grauedinem & cibum digerunt. Recipe, mastichis, zing. cinamomi, garioph. necheremisch, melanopiper, macropiperis, scamoneæ, sacch. uiolacei omnium ana. drachmam unam, fiant ex eis pilule ad magnitudinem ciceris & sumatur una, mouebit enim semel aut bis.

In hac sexta parte principali redit ad ponendum curam colicæ a causa calida siue quando cum cholicæ coniungitur feb. Et primo docet soluere uentrem cum hac medicina. Recipe prunorum, ros. ficuum citrinorum quinq; passularum enucleatarum, drachmas quinque incidantur incidenda & coquantur in duabus libris aquæ ad consumptionem duarum partium & cum 3. 3. huius decoct. trahatur cassiæ floris, 3. i. cui toti addatur, olei amig. dulcium recentium, 3. i. & calida exhibeatur stomacho ieiuno, hæc enim leniendo feces exiccatas educit & non inflammat, & est medicina secunda. Item docet exhibere decoctionem, quam superius posuit in cap. de catarrho. Et est prima decoctio ibi posita uentris lenitiua, & si uenter fuerit nimis stipticus docet admisceri illi decoctioni turbith polypodij ana drachmas duas, quæ debent bullire cum cæteris positis in decoctione ista ita ut uenter sufficienter soluat. Sed cui uenter solutus fuerit administretur sola decoctio prima. Ista enim sufficit et ad tenendum uentrem lenem, tandem Rasis ponit duas receptas conuenientes in colica. Prima est satis manifesta, ualens in colica phlegmatica, & sumatur cum custodia. Turbith enim est solutiuum phlegmatis satis forte, et si sit confortatum cum zing. sicut hic soluit phlegma crassum. Si uero nō, soluit phlegma aquosum. Secundo describit receptam pilu. ualentium in ca-

mixta, quas magnis laudibus extollit & possunt sumi per horam ante cibum.

Melius tamen est propter scamnoneam ut seruetur aliqua custodia, & quæ dicit patent, nechermisch dicitur esse rosa asinina, & dicitur quod est species endiuizæ alibi pexoniæ.

PRO curæ colicæ sunt præmittendi quidam canones generales & sunt 13.

Primus quod regimen colicæ non tardetur, est enim secundum plurimum ægrotudo acuta & inter cætera repletio minoretur, ita ut cibus exhibeatur rarius & in minori quantitate, multumque tempore sanitatis, & cum hoc non sit crassus, viscosus aut ventosus sed lenitius. Item si nauseauerunt uomitus adiuuetur. Et proprie si fuerit stomachus plenus cibo, & cum eo etiam humores in stomacho existentes educantur, hic namque minuit materiam colicæ.

Secundus canon, nullo pacto festinet medicus dare in principio solutium forte desuper, sed primo incipiat cum clysteribus lenitibus, & deinde aliquantulum acutius si opus est, quibus non sufficientibus det solutium, sicut ius galli antiqui simplex aut compositum si non fuerit febris. Si uero fuerit febris, aquam hordei medicinalem debite calidam. Et Rasis in textu facit aliquas decoctiones lenientes ex prunis, ficibus, passulis & similibus cum quibus potes mannam aut cassiam permiscere. Quandoque scybalæ & humores crassi descendunt per inferius, & dolor instans coegerit dare solutium, electuarium per superius tunc detur, sed leue & in pauca quantitate & boni odoris sicut pilulas alephanginas, & sunt proprie mihi experie, aut hiera simplex aut diaphenicon, aut diacitoniten descriptione Mesue. Et quanto medicina est minoris quantitatis & melioris odoris & saporis, tanto est melius. Melius enim a stomacho retinetur, detur tamen quantitas, tanta quæ uerisimiliter sufficiat operari. Est tamen melius dare illa, quorum uirtus parum transeat ultra stomachum, & intestina, ne materia a corpore precipitentur ad intestina, propterea omittantur medicinæ exoluentes, quantum est possibile. Et similiter omittantur medicinæ leues electiuæ si clysteria sufficienter educere scybalas & alia quæ oppilant nisi materia fuerit in stomacho, & in intestinis superioribus quæ non potuit uomitu educi, hoc autem comprehenditur per grauitatem & dolorem supra umbilicum sensatum, & tunc ista medicina solutiu lenis sumpta per os, aut euacuabit materiam totaliter ad extra, aut attrahet ipsam ad aliquod intestinum inferius, quæ deinde per clystere poterit educi. Similiter oportet dare solutium per os quando colica sequitur excoriationem siue fluxum dysentericum, est enim materia communiter contenta, supra locum excoriationis, ad quam clysteria non attingunt.

Tertius canon, quod aliquando opus est dare medicinas exoluentes & satis fortes, & trahentes a longinquis in tribus casibus. Primus casus, quando materia antecedens transiens in causam coniunctam colicæ continetur in locis distantibus sicut in uenis, & hoc frequenter contingit, quando febres

permutantur ad colicam, sicut fuit de anno .1449. Ferrarie, tunc in hoc casu competit diaphenicon, pilulæ aggregatiuæ, & similia. Secundus casus, quando humores essent crassi in intestinis inuiscati, quos neque clysteribus neque solutiuis leuibus possunt eradicare. Tertius, quando esset fortis oppilatio, quam neque clysteria, neque leuia solutiu possunt auferre, & in his duobus casibus ultimis auctores concesserunt pilulas de sagapeno, & Rasis in litera pilulas iliacas, tibi ramen iureiurando assero, quod ad soluendum fortem oppilationem uidi magis conferre oleum commune bene conditionatum calefactum exhibitum in quantitate sex aut octo unciarum. Et est medicina satis secura cum sit cibus ciarum. Et est medicina facis secura cum sit cibus ciarum. Et est medicina facis secura cum sit cibus ciarum. Et est medicina facis secura cum sit cibus ciarum.

Quartus canon quod nullo pacto ponatur agaricus in medicinis colicæ, qui agaricus adhæret intestinis. Et facit etiam alias medicinas retineri & profundari in intestinis, & cum hoc trahit a longinquis.

Quintus canon quod secundum plurimum debemus esse contenti clysteribus & suppositoriis, quia clysteria educunt humores etiam crassos existentes in intestinis, & cum hoc non trahunt ex longinquis alias materias ad intestina. Et tertio non faciunt operationem in humoribus & casum in febres sicut medicinæ. Et quarto si non soluunt neque educunt materiam oppilantem non est dubium quod faciant peruenire ad uomitum secum & debilitent uirtutem sicut medicinæ. Et quinto secundum necessitatem possunt reiterari absque paruo nocumeto non si cut medicinæ, non enim etiam si essent acuta taliter actuantur sicut medicinæ in stomacho, præterea medicinæ in stomacho quandoque trahunt humores malos ad intestina excoriantes ipsa, quare aggregatur colica & excoriation simul, & hoc est ex nocumeto mortalibus.

Sextus canon, quando clysteria sunt aliquoties iterata & non soluunt, abstinendum est ab ipsis & propterea acutis donec materia sit digesta quæ interim digeritur, tum a calore naturali, tum auxilio medicinarum digerentium secundum humoris exigentiam, imo proprius usus clysteriorum acutorum est post maturationem, timeatur enim ex ipsis cor & epatis, & faciunt accidere soda cum non soluant propter agitationem. Et quia quandoque sunt ex rebus mittentibus uapores acutos ad caput. Ideo oportet quandoque ut adiuuentur desuper sicut etiam euacuatio desuper iuuatur cum suppositoriis & clysteribus, hæc nota sunt scienti medicinarum acutarum malitiam. Et nota quod quanto maior est febris clysteria debent esse magis lenientia & minus acuta, cum tamen apud Auicennam oporteat aliquando in clysteribus esse duas drachmas & mediam salis. Septimus canon. Non fiant clysteria cum aliquid crudum in stomacho continetur quod maxime de cibo intelligitur. Oñia uero non

non. Oportet ut fiat interpolatio in clysteribus, nec ex omni causa fiat clystere, contra ignoraes qui singula hora & pro singulo dolore faciunt clystere, huius autem ratio est, quia clystera agitant non educendo, et sunt causa februm aut aliorum nocumtorum, secundo debilitant stomachum & epas, & possent aliquando sequi fluxus immoderatus sicut aliquando mihi contigit. Nonus canon. Oportet ut custodiatur caput ut non recipiat vapores materierum retentarii nec medicinarum quas sepe administrare oportet, sicut sunt clystera, fomentationes, balnea siue semicupia, hi enim aliquando grauant caput. Et aliquando sequitur alienatio & uigiliarum instantia, huius autem subueniatur stringendo agrum circa medium cum fomentatur aut ponitur in semicupio. Et similiter ponendo aliquem pannum inter caput & locum fomentatum, ut vapores non possint ad caput peruenire. Et tertio epithimando frontem & reponendo cum rebus frigidis caput confortantibus, sicut aqua rosae, aut oleum rosae, cum quarta parte aceti, & similiter cum succis in frigidantibus. Decimus canon. custodiatur pars epas ab emplastris, fomentationibus, sacculis, & huiusmodi calidis, quae uentri propter doctorem applicantur, ne supercalefiat, imo si uidebitur in frigidetur cum sibi proprijs sicut cum cerato sandalino, & huiusmodi. Et similiter custodiatur regio cordis cum succis frigidis, caphora, & huiusmodi. Et si potest poni aliquid distinguens inter uentre & huiusmodi membra fiat ne medicinae unius membri alteri communicetur. Undecimus toleretur sitis quantum est possibile in colica, facit enim ad resolutionem humorum uentositatis. Quod si a potu abstinere non possit sedetur cum aliquo iulep, ut puta uiolaceo aut cum decocto prunorum tamarindorum & similibus. Est enim in istis lubricatio, & quia dulcia sunt & corpori amica cito penetrant, & bibatur parum pro uice, si enim cum paucis potu melius satisfit sit nec sequitur uomitus, aut teneantur aliqua in ore sitim sedantia. Duodecimus, quando in colica est uomitus frequens & tamen oppilatio est in intestinis oportet, ut fiat retentio uomitus etiam cum stipticis exterius applicatis, deinde soluantur uenter. Ego tamen in his casibus confingo uomitum, aspergendo faciem cum aqua frigida & alijs ingenijs, & omitto quantum possum medicinas stipticas exterius applicatas ne augescat oppilationem intestinorum. Decimus tertius, & si in cura regulari doloris intestinorum sit incipiens a remotione causae, attamen coactae aliquando est incipiendum a sedatione doloris, in fortissime doctore non dante inducias tamen rarissime contingit ut cogamur incipere cum stupefactiuis. Quod si necellitas cogat aliquando ad hoc melius est ut solutiuum cum narcotis miscantur, ut simul utraque curaperficatur sicut miscere unam drachmam aloes, aut pilularum alephaginarum cum duobus granis opij, et uno grano croci, aut 5. 3. diaphoeniconis cum 5. 3. philonij.

**CURA COLICAE
phlegmaticae.**

His canonibus praemissis iam accedamus ad curam colicę particulariter secundum eius species. Incipiendo curare phlegmaticam. Cura cuius exigit octo intentiones. Prima est uentris lenitio & intestinorum deoppilatio. Secunda, est humoris peccantis minoratio. Tertia, digestio. Quarta, eradicatio. Quinta, doloris sedatio. Sexta, stomachi intestinorum & membrorum mittentium si qua sint in causa confortatio. Septima, accidentium correctio. Octaua, debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima intentio completur cum clysteribus lenitiuis, & abstergentibus factis ex uncis decem, brodij carniū pinguium, uncias quinque, olei communis, uel sesam. & uncias duas sacchari rubei, uel tantundem mellis uiolacei & drachmas duas salis. Quod si clystera retinentur secundum quod frequenter accidit ponantur cum brodio carniū suprascripro, quatuor, aut sex uncias mellis crudi aut unus cyathus urinae. uel Recipe olei communis libram unam mellis, uncias sex, misce, & calidum imponatur. Fiat etiam decoctio ex fursuris, fenugraeci, seminis anethi, mal. seminis maluauisct, blitis, anan. Manipulum unum, quę bulliant in aquae libras quinque, usque ad sufficientem decoctionem ex qua decoctione accipiat libram unam olei communis, uel sesamini, uel anethini, uncias quinque, mellis, uncias tres, & debite calidum supponatur, quod si clystera retinere non possent omitantur acuta stimulantia sicut mel, sal, & urina, & similia. Et pro secreto habere quod butyrum impositum in his clysteribus est optimum faciens ad lenitionem, & doloris sedationem.

Secunda intentio est materiae minoratio. Verum ubi non esset fortis oppilatio possent istae duae intentiones simul compleri, sicut suprascriptis clysteribus addendo cassiam, hieram simplicem, hieram compositam, hieralogodion, diaphoenicon, electuarium indum, hieram hermetis, & similia, de his ergo unum uel plura addantur secundum quod est tuo proposito conueniens. Er possent fieri decoctiones educeres phlegma, ut. Recipe polyodij, unciam unam, cartami, uncias duas, centaureae minoris, drachmas duas, colocynthidis, drachmam unam, fenugraeci, unciam unam, ficuum siccarum numero octo bulliant in tribus libris aquae ad consumptionem medietatis & coletur, cuius decoct. uncias octo miscantur cum uncis quatuor olei sesamini aut communis, & unciam unam butyri, & addatur salis aut sal gemmae, uncias duas, uel imponatur sine sale si uis quod diutius retineatur. Clystera autem ultimam & efficacissimam est, quod est descriptum a Rasi in textu & a me expositum, & si uis temperare medicinarum calidarum acuitatem his adde in decoctione maluas, sebesten, matres uiolarum, & similia. Collyria quoque in textu descripta sunt ad hoc multum efficacia, potes etiam si placet facere collyria minus acuta si drachmas duas mellis, addatur salis gemmae, drachmas duas, stercoris muris, drachmam unam. Et in summa multa talia sicut scammonia, colocynthidis, elleborus, turbith, & similia, possunt cum melle incorporari & fieri collyria secundum exigentiam.

Item, steruus lupi ex offibus quod fit album & proprie collectum super spinis, & aromatizatum cum sale & pipere usque ad drachmam semis. Item dicitur quod suspensio in pelle leopardi uel cerui, uel in lana arietis, qui fugit ab eo, scilicet lupus aut in argēto a proprietate conuertitur, ut testatur Galenus 4. de simplicibus medicina, cui Aulicenna cōsentit in capitulo de colica: Et intestinum lupi exiccatur & bibitum est adhuc presantius, imō delatio eius in forma cinguli ualeat. Item, scorpiones assati in colica uera, & in lapide renum sunt ultimi, sed in lapide renum de perle in colica de per accidens, credo prouocatio urinae. Et ex laudatis in uelementia colicæ est cornu ceruini adustum in potu lupprum usque ad drachmam unam cum uino, sedat enim dolorem statim. Quarta modus est cum balneis & embrocis, balnea autem sint mineralia siue aque thermarum, aut in quadequoquantur res carminantes uentositatem et remouentes dolorem, quia sedantes dehis quæ dicta sunt superius in fomentis. Et sint magis aut minus calide secundum exigentiam materie colicæ, temporis anni & complexionis ipsius patientis, & accidentia quæ secum complicantur, multum enim iuuant cum sedando dolorem sua humiditate, anodinatum maturando, materiam resoluendo & uentositatem carminando, tum mollificando musculum ani & faciendo ventrem obedientem. Sed in hominum administratione sunt cā. obseruandi. Primus, quod aqua non attingat nisi usque ad umbilicum, & sit moderate calida quæ deleat & possit totiterari, & fit moderate calida quæ deleat & possit totiterari, & propterea melius instrumentum ad hoc est semicupulum. Et si non sit paratum, habeatur brenna altitudinis unius pedis in qua sedat æger pedibus existentibus extra. Secundus, quod non diu moretur & proprie debilis, est enim conuenientior iteratio quam longa mora in eo et sint prope eius boni odoris, quibus deleatur sicut fructus odoriferi, uinum, uel uispa cum garophyllis, uino, optimo aceto, & aqua rosæ, & apud necessitatem aliquid uini exhibetur, aut aqua carnis si timeretur calus in syncopi. Tertius, quod non administratur materia existente in colica nisi iam minorata sit, timeretur enim de paralyli & de rapto materium ad aliqua membra nobilius. Quapropter existente aliquo apostemate iam inchoato aut de proximo inchoando non fiat balneum istud, & proprie secundum membrum illud de cuius apostemate timetur. Quapropter non conuenit in colica apostemosa nisi forte in declinatione, et similis huic est embroca super ventrem patientis in uentre embroca excicetur & ungatur, & in lecto ponatur & dormiat, fortasse enim illico dormiet, & sub molestanti ne a somno impediatur. Cum autem dolor non possit his quatuor modis sedari, & esset fortis uisum dissoluens, tunc ad narcotica, id est stupesciua uenit, cum est, et ex propriis est illud phlegma, quod est a Rasi in litera descriptum. Et Aulicenna facit capitulum de narcoticis quæ sunt in hac dispositione propria, & ordinat quædam suamenda per os in modum electuarii. Sed præstat ualde & philonium romanum descriptum a Mesue

& hoc a Rali descriptum. Sed in forma pilularum potest exhiberi istud a. Aitenna descriptum. Recipe croci, sty racis liquida, zingib, piperis longi, feminis hyocyami, albi, ana drachmam unam, opii, castorei, ana drachmam unam, quartam, fermentur pilula parua, & sit dosis earum a 3. s. usque 3. 1. Item possunt fieri dysteria ex iam dictis lenientibus quibus ponatur castorei, drachmam semis, & opii grana quinque & sedat dolorem, & quandoque fit terna huc suppositorium ex petia lanae aut cortis, & intingitur in olei de seminibus, aut in olei anchini uncia unam, opii, scrupulum unum, castorei, drachmam semis, optime ad invicem dissolutis, & sit ligaturum cum filo citri. Ita ut ligamentum pendeat extra, ut possit extrahi ad libitum, & possit ad libitum ex eodem medicamine infundit etiam absque quod extrahatur. Et nota quod ubi timeretur conuersio materiad ad aliud membrum sicut ad neruos, est minus malum sedare dolore cum narcoticis, quam facere balneum. Item nota quod aliquando huius modi narcotica miscentur cum solutis, sicut precipit Ralis misce scammonem cum pilbionis quod ordinat in textu. Ego autem uti huius pilulis. Recipe aloes, succi citrini, uel pilularum alephanginarum, sed melius est quod sint ex aloë non leso, drachmam unam uel 3. quatuor, opii, croci, ana grana. 1. uel 2. uel pro croco pone castoreum, sicut pilula septem uel nouē & exhibeantur stomacho ieiuno, dolorem enim post horam sedant & postea tandem soluent & faciunt operationem incolumentum. Et si uiles quod uelocius soluerent adde duo aut tria granula scammones, & cum his no modicum hgnorem sum aliquando confectus. Sexta autem intentio, scilicet stomachi & intestinorum confortatio aliquando necessaria est, quia huiusmodi membra sunt laxata ex dolore & causis suis. Vnde multiplicauerunt iterum phlegma et uentositatem, ergo confortandi sunt confectionibus, sicut aromatico rino. diadraganto, diagalanga, speciebus duciis bono uino & alijs huiusmodi. Et similiter eorum mala complexio est corrigenda cum contrarijs. Si autem aliqua membra sunt comunicata sicut epas, splen, & cetera corrigantur scdm quod dictum est, & dicetur in cap. proprijs. Septima aut intentio. scilicet correctio accidentij periculi tur scdm ipsorum exigentia. Instantia uigiliarum remouetur per remotione doloris, cui aliqui oportet subuenire cum narcoticis simul tolerantibus dolorem & somnū inducentibus. Vomitiui oportet subuenire abstergendo faciem cum aqua frig. et reliquis remedijs in precedentibus cap. dictis. Syncope cu exhibitio ne uisui & auge carnis, & similibus. Reliquorum accedentia cura suis cap. perquiratur. Vltime aut intentio. scilicet regime uitae perficitur faciendo aere declinare ad calid. & sic naturaliter aut artificialiter. Et sit nota biliter indutus scdm exigentiam tēporum, precipue teneat stomachum & uentrē debite calidū, dieta sua tam in quantitate continua, q̄ discreta sit tenuis. Et cibi sui non sint sicci, crassi aut uiscosi, neque uentrosi, biles & sint uentrem lubricantes. Et panis fuis sit bene coctus, salutus & fermentatus, qui cōdiri potest cum aliquibus granis anisi, cymini, feniculi, licet hoc sit magis conueniens in fine quam in principio. Vniu sit odoriferū, purum, antiquū, aromaticum.

Sed in pauca quantitate & aliquando conuenit pa-
rum maluatia ad subtiliandum humorem, confor-
tandum uirtutem uigorandum digestiōem. Fer-
cula autem sua sint brodia pinguia, uidentur affa-
ta & fixa, sit brodium caponum & gallinarum pin-
guium. Sed proprium est ius galli antiqui uia ci-
bi & medicinae, & quanto pinguius tanto melius.
Item, brodium caulium & cicerum. Item, brodi-
um factum ex decoctione caulium, ceparum, porro-
rum, alli, cum oleo uel carne pingui castrati est mira-
bile. Item, brodium blitis coctae cum carnibus lau-
dabilibus pinguius. Sed apud debilitatem uirtu-
tis dentur contusi pulli, oua sorbilia, brodium carni-
um laudabilium cum uisello oui concassatum.
Carnes uero sint perdicum, phasianorum & fran-
quillinorum, autum paruorum, pipionis iuuenum,
uidentur crassae carnes, & sint elixae non affare nec fri-
xae, uidentur potum aque frigidae uini multum aqua-
ti. Aqua sua sit aqua saccharata, aut aqua decocti-
onis pauci mellis, ita ut aqua sit duo decupla ad mel,
et optime bulliat et despumetur. Est enim aliquando
aqua necessaria cum adest febris & ius blitis & spina-
chiarum tunc esset conueniens. Pro salata utatur
capparibus & asparagis. Aromata autem sua sint
proprie ex cinamomi partibus duabus zingib. pi-
per. galange, ana pars una, croci quarta unius partis.
Somnus super repletiōem malus, in uacuitate bonus,
licet secundum plurimum oporteat ipsos dormire
quando possunt. Similiter in retentione fecis ma-
lus. Deambulet stomacho ieiunio, post cibum quie-
scat, & in praeservatione exercitium est opportunum,
quod retentionem fecis & stiptica. Et retinere uen-
rositatem exire uolentem, desperatio, tristitia & hu-
iusmodi accidentia corrumpentia digestionem dis-
conueniunt, ira tamen conuenit nisi modum exce-
dat.

CVRA COLICAE

melancholice

licae

Sed in colica melancholica procedatur cum eis-
dem intentionibus. Sed etiam euacuantiā &
digerentiā debent esse melancholice propriae.
Et carminantiā uentositatē debent esse fortiora, quia
illa uentositas est crassior & deterior, horum autem
copia habita est in aegritudinibus splenis. Decoc-
tio tamen epithymi Mef. est propria. Item pilulae
indae, de lapide lazuli, & electuarium diafanae, & in
melancholia adusta electuarium hamech. Et pro
clysteribus in decoctione ponatur epithymum stoe-
cas & sal indum. Et in supposito rijs lapis lazuli
contritus & lapis armenus & sal indum. Et apud
Auicennam euaporetur uenter cum eis quae sunt gra-
na lauri, armel, id est, ruta agrestis, organum, cham-
milla in aceto decocta ad maiorem incisionem & pe-
netrationem. Et regimen declinet magis ad humi-
dum. Et in brodijs suis decoquatur borago & bur-
glossa. Et fructus conuenientes sunt passulae. Et
salata eorum sint capparēs, & proprie si splen sit in
causa.

CVRA COLICAE

cholice.

ET in cholica cholerica seruentur eadem inten-
tiones. Sed totum regimen tam medicinae
le quam sex rerum non naturalium declinet
ad frigidum & humidum. Vnde clysteria fiant ex
decoctione blitis, matrum uiolarum & maluarum,
sebesten cum oleo uiol. & pauco salis. Et si retine-
rentur addantur uncias tres mellis uiolacei, & simi-
liter fieri possunt ex aqua hordei cum oleo uiolaceo
& sale. Et postea addi cassia in clysteribus, & electu-
arium de succo rosae. Solutiua autem per os sumen-
da sunt penes Rasim, florū cassiae, drachmas decem,
quae trahatur cum succo endiuiae bullito donec cla-
rescat. Sed melius est ut trahatur cassia cum deco-
ctione prunorum tamarindorum & uiolarum, & si
militer possent exhiberi uncias duas mannae drasse-
peratae cum eisdem. Si autem colica fuerit crassi-
or & minus calida, possunt dari cassia distemperata
cum decoctione prunorum et passularum & ficuum
& in hac possit concedi aloës lori, drachmam unam,
sed ubi causa antecedens esset distans, possent dari pi-
pulae aureae, electuarium de succo rosae & similia.
Digestiua uero sint syrupus uiolaceus cum aqua hor-
dei medicinali, aut cum decoctione prunorum & ta-
marindorum, & si cholera sit crassior misceatur cum
syrupo uiolaceo syrupo acetofo simplici. Et pro
ferculis conceditur decoctio blitis, endiuiae, lactucae,
& similia in iure carniū laudabilium, bibat az-
quam saccharatam aut hordei, & si expediens sit, ui-
num sit pauciferum, & Rasis nutrit cum rapha cum
oleo de amigdalibus dulcibus condita. Et si fuerit
pediens stupefactum iuber Auic. permisceri liti-
cus adip, id est, lupi cum stupefactis. Et cauenda
est a castoreo & euphorbio & similibus, sed pro cor-
rectione opij ponatur crocus, & requies descriptio-
ne Nicolai, si misceatur cū pauco iteroris adip, esset
ad intentionem Auicennae.

CVRA COLICAE

uentosae.

Eius cura exigit intentiones suprascriptas, scilicet
lenitionem & deopilationem intestino-
rum, ut uentositas possit exire aut extrahi mo-
dis infra dicendis. Secundo, minorationem mate-
riae ex qua generatur & fouetur uentositas. Ter-
tio, eradicationem & fouetur uentositas, paulatim
digestionem. Quarto, eradicacionem, paulatim
tamen & in pluribus uicibus & omnes hae intentiones
cum medicinis dictis superius complentur. Ve-
rum Auicenna multa describit clysteria, supposito-
ria, & medicinas solutiuas, mirabilis et extraneae com-
positionis, quas si placet uide. Quinta autem com-
plenda, ut supra dictum est, cum fomentis, sacca-
lis, emplastris, unctionibus, fricationibus, & simili-
bus. Tertius, est eius attractio cum uentosis ma-
gnis latorum orificiorum.

Quartus

Quartus, cum attractione eius ad inferiora & educatione per annum cum clysteribus & suppositorijs, in quibus ponuntur carminantia & attrahentia uentositatem ad inferiora, ex quibus sunt ruta, cymini, fessilis, ammorum, ammi, baccæ, lauri, aristolochia, bdellium, sagapenum, castoreū, sal, & similia, ex quibus possunt fieri decoctiones pro clysteribus secundum exigentiam, & ex compositis componendis in clysteri est electuarium de baccis lauri cui non est compar. Quintus, cum educatione eius per superiora & inferiora, & per porositates uentris simul cum confectio- nibus ad hoc proprijs, sicut diacuminum, diaz ingi- ber, diagalanga, diacynamomum, diacalamen, theria- ca uetus, mithridatum, diambra, diatriompipereon, electuarium de baccis lauri in textu descriptum, item decoctio de seminibus similiter in textu descripta, cuius 3. dantur cum olei de alcherua 3.

Et tu iuxta Auic. considera modum illum artifi- cialem dandi in potu oleum de alcherua, de qua re fa- cit speciale cap. Item, decoctiones in uino bono se- minum carminantium, sicut cymini, ameos, ammo- mi, fessiles, dauci, anisi, feniculi, petroselin, carui, ni- gelle, iuniperi, baccarum lauri, urticæ, carthami, rutæ, calamen, pulegij, chamedrys, chamepityos siccorū, & aromatum sicut zingib. gariophylorum cinamo- mi, pipris, galagæ, & similia, & ex fortibus est ari- stolochia & castoreum per omnem modum adhibi- ta, & ad hanc intentionem sunt unctiones ex oleis in quibus illa bullierint & sacculi & emplastra stoma- cho & uentri applicita ex similibus composita, in qui- bus uult Auic. & alij auctores ut ponantur solutua, scilicet colocynthis, turbit, & similia. Ex quibus est unguentum arthanis, descriptione Mes. quod super uentrem posuit soluit solutione catarchici, & super stomacho prouocat uomitum. Et nota quod in un- ctis, 3.1. & colocynthis, 3.2. & eius supposito sol- uunt uentrem & curat colicam. Et ex emplastris uento- sitatem carminantibus est emplastrum de baccis lauri descriptione Mes. Sextus modus est, ut stringatur totus uenter, & stomachus cum fasciâ, deinde patiens projiciat se super aliquo cussino de corio pendetibus capite & pedibus ut per compressionem expellatur uentofitas, expelletur enim per superius aut inferius, uel uenter apodiet alicui rei super quam se fortiter co- primat. Septimus modus, ut toleret famē duobus aut tribus diebus, aut quantum potest exercitetur. Fa- lumorum & dormiat cum uentre deorsum, facit enim amplius ad uigorationem caloris innati. Præterea, quia clysteribus in his dispositiōibus, maxime opus est, & uentofitate resistente difficile est clysteria impo- nere, facit Auic. speciale cap. de clysteribus. Modi au- tem siue figuræ clysteriorum præter illum Auic. quē non intelligo sunt tres. Primus est communis cum ma- nica de corio & cannula pyramidalis in extremitate adus modus est cum canna longa perforata ex pluri- bus frustis composita, quorum unum ingreditur, al- terum stricte ut nihil possit refudare, & in parte infe- riore huius cannæ recte infixâ est una canna longa spania diametraliter fixa secundum latus cannæ lon- gæ prædictæ. Et in hac canna taliter infixâ est cannu-

la pyramidalis anum ingrediens infixâ in extremita- te eius cadēs diametraliter super illam extremitatem secundum latus ipsius, in summitate autē primæ can- næ longæ est scutella in qua imponitur liquor anum ingressurus qui uocatur enema. Et instrumentum quo inijcitur uocatur clystere. Liquor autem ingrediens primo descendit postea ascendit. Canna autem pri- ma longa ex frustis composita debet esse parum lon- gior quam sit unus cubitus. Et cum hoc instrumento homo potest sibi met imponere clystere. Tertius mo- dus est, ut habeatur duo ligna sicut duo incisoria par- ua optime rotunda, & corium de pelle heedi inuol- uatur stricte circa ista duo incisoria secundum ipsorum circumferentiā, stricte ipsum figendo cum clauis par- uis, ut liquor cum erit impositus non possit exire. Vel fiant duo cannales in medio duarum circumferentia- rum horum incisoriorum, in quibus cannalibus pel- lis iam dicta ligetur cum filo forti cerato stricte, sed melius est ut utrumque fiat, scilicet quod figatur cum clauis, & quod ligetur. Et in centro unius istorum in- cisiorum sit foramen in quo ponatur cannula py- ramidalis anū ingressura, & per hoc foramen liquor imponatur, deinde ponatur cannula iam dicta bene stricte in foramine illo ut nihil possit refudare, super quā cannulā in ano fixam patiens sedeat cōprimēdo illa incisoria adinuicē. Nam per hunc modum ne de- tur penetratio corporum necesse est liquorem in inte- stina ascendere. Sit autem prædicta canna anum in- grediens perforata in extremitate sua anum ingredie- te, & habeat duo alia foramina lateralia unum propē corium in latere uno aliud parum altius in latere op-posito. Et sit longitudo sua communis quinque digi- torum coniunctorum, licet in puero minor. Sed in casibus aliquibus oportet quod sit ad longitudinem unius spaniæ uel 10. digitorum coniunctorum ut pu- ra in colica, ileos & ubi oportet liquorem ascendere ad intestina gracilia. Similiter cum oportet inijcere ali- quem liquorem in matricem, sicut pro secundina ex- trahenda, aut pro matrice mundificanda aut pro cu- randis ulceribus eius, & cum istis duabus ultimis for- mis clysteriorum potest patiens se ipsum clysteriza- re, quæ res est frequenter opportuna in his qui uerecun- dantur, præcipue in mulieribus. Situs autem clyste- rizandi uariatur secundum locum læsum. Si enim ue- limus dorso prodesset, stet homo resupinus. Si intesti- nis, stet cum facie deorsum & magis ascendit homine- stante cum facie deorsum quàm secundum situm aliu, & præcipue si posteriora sint tempore impositionis & post impositionem magis eleuata quàm anterio- ra, & si dextro uolumus magis prodesset super dextro uoluatur, & ita de sinistro. Et si uolumus enema mul- tum ascendere ad superiora sicut in colica, ileos & cū- ulcera sunt in intestinis gracilibus eleuentur postero- ra & conuallentur. Cauendum tamen ne liquor stomachum ingreditur ne forte sequatur uomitus ipsius, & stercoreum, præcipue in his qui cum ascendit parum ad superiora syncopizant. Et patiente exilis- te debili imponatur clystere ipso iacente super lateri- bus uel supino nec post impositionem conuallentur. Quantitas autem liquoris in adultis est ab una lb. cū dimidia ad lb. 2. In infantibus sufficit lb. s. Hęc tamē uarianda sunt secundum magnitudinem intestinorū & secundum diuersitatem loci quem uolumus attrin-

gere, quanto enim locus attingendus est magis supra, quantitas debet esse maior, quāto inferior sufficit minor quantitas. Vnde si uolumus mundificare aut cōsolidare ulcus intestini recti sufficit ℥b. s. aut parum plus. Modus autem imponendi cum primo clysteri est ut stringatur manica cum manu propē liquore, ne aër mediet inter manum & liquorem, deinde imposita cannula in ano & aëro aut alio firmiter eam tenente impellatur enema siue liquor successiue donec ingrediatur quantum sufficit. Sit autem impulsio illa cum maiori conatu quando uolumus liquore magis ascendere. Quanto autem minus, impellatur cum minori conatu. Et tempore impositionis nō tussiat, neque sternutet, neque uomat, neque se exprimat, sed anhelitum dilatat. Et immediate post impositionem suppa prius circumuoluta canula impellatur propē anum & bene adhaereat, deinde aeger crura & coxas extendat. Et postea reuoluat secundum exigentiam utilitatis quam queris, & similiter magis aut minus eleuetur. Retineatur autem in colica non superflue imō post decimum horæ, cum primū stimulat & pungit, eneciat, sed in fluxibus multo tempore retineatur. In reliquis autem casibus longiori aut breuiori tempore secundum quod uis uirtutē eius ad loca magis aut minus distantia attingere, & secundum alias circumstantias quas sapiens metatur. Quod si debito tempore non retineretur aliud minus acutū aut minoris quantitatē replicetur. Si uero nimis retinetur sicut in colica accidit in qua interdum retinentur 7. clysteria, tūc suppositorium stimulas imponatur. Et si istud non sufficit inijciatur cum clysteri liquor in quo sit magna quantitas mellis etiam usq; ad ℥b. i. Et infallanter educet secum reliqua clysteria & cetera quæ facile possunt educi. Et nota quod fiunt clysteria non solum ad inijciendum liquorem, sed ad attrahendum uentositatem in intestinis contentam sicut in colica uentosa. Modus autem est ut habeatur foliis paruis cuius cannula sit longa 10. digitis coniunctis uel etiam amplius. Et sit de ligno, ferro & argento, & cum latera foliis sunt clausa imponatur. Deinde aliquo uel aëro ipso firme tenente cannulam latera foliis dilatentur, & ne detur uacui egredietur uentositas. Sunt & alij modi huius proportionales, aliqui etiam pro expellenda uentositate tenent in ano canulam argenteam uel ligneam utrinque perforatam, ut libere uentositas egredietur. Sed sit illa cannula secundum partem ingrediētem intestinum in multis locis perforata ne omnia foramina simul obtineantur. Secundo sedatur dolor cum stupefacientibus, quorum copiam superius descripsi. Sed cōmuniter in hoc casu uitor philonio romano uel philonio à Rasi in textu descripto. Sexta autem intentio, scilicet membrorum confortatio est complenda, ut prius dixi in colica phlegmatica. Similiter septima intentio, scilicet accidentium correctio perficiatur ut prius. Octaua autem intentio, scilicet regimen uitæ declinet ad calidū & sic, & caueatur aër frigidus & uetustus, & humidus, & pannis bene opertus sit præcipue secundum uentrem & stomachum & anum, sit parcus in cibo & potu, & sint calidi & sic. non uiscosi, nō uentosabiles, facili digestioni, uentre non confringentes, dormiat multum maxime in nocte. Exerctetur multum stomacho ieiuno, sit sollicitus in expellendo superfluita-

tes inferius, nullo pacto retineat uentositatem, nec superius nec inferius, sit sperans & gaudens, & aliquando leuiter irascatur. Sed tristitia, timor, & accidentia corrumpentia digestionem fugienda sunt. Omittit reliqua particularia, nota enim satis sunt ex superscriptis, scilicet quod uinum suum debet esse potens, antiquum, medijs saporis in pauca quantitate bibitum, & quod panis sit bene fermentatus & salutus in quo semina carminantia uentositatem aliquando ponatur, hæc nota sunt ex superscriptis.

CYRA COLICA EX FECIBVS.

Eius cura exigit tres intentiones præter tres cōmunes in quacunque specie colicę necessarias. Prima est fecis mollificatio & superficies intestini & intestinorum applanatio, ut facile tribuet. Secunda ipsius ductio. Tertia causę sciatis, fecis remotio, & hæc intentio simul concernit regimen curatiuum & præseruatiuum. Prima intentio completur primo cum clysteribus ex ℥b. s. olei communis cui possunt addi 3. butyri recentis. Item cū clysteribus ex oleo sesamino nec non cum brodijs pinguius carniū, sicut pullorum, agnorum castratorum, & similibus, & propriè capium & intestinorum eorum addendo æqualem quantitatem alicuius ex oleis superscriptis, & potest addi butyrum, & quando nihil aliud esset paratum solum oleum sufficit, & possunt fieri decoctiones ex maluis, maribus uolarum, sem. lini, sem. aut radice maluauisci, ficibus, & similibus & frigidioribus possimus uti existente febre, & cum signis caliditatis & calidioribus in dispositione contraria. Item compleri potest hæc prima intentio cum fumendis per os ex quibus sunt itura pinguis carniū laudabilium, gallinarum, caponum, agnorum castratorum, & ius galli antiqui est propriū, non solum leniens, sed sua nitrositate abstersens, ut telli quoque ouorum sorbillum, passula nigra sine nucleis, ficus albæ tam sicæ quā recetæ, pulpa uiolarum optime maturorum, penidia, sacch. iulep uiolarum brodium cicerum rub. integrorum, brodium caulium collectorum ante ortum solis leuissime lotorum, nec fractorum in frusta ualde parua & leuiter coctorum. Item brodium blitis, attriplicis spinachiarum, maluarum, mercurialis, maluauisci, & similibus, & in summa omne brodium habens uirtutē nitrosam, uel rachiam, uel absterfluam, uel salam stimulat uirtutis, uel in qua sint partes unctuosæ & pingues, & si uolumus maiorem mollificationem faciemus bullire herbas superscriptas in aqua uel brodio carniū, deinde addamus oleum commune in magna decoctate uel butyrum recens, & similia, & brodium ualeat digestionis acriminū sicut ceparum & similibus laudabilium ad lubricandum, & quandoque in brodijs cetera lūm ponatur sacch. uel penidia. Et quando commune non sufficeret ad leniendum oleum communis bene conditionatum, aut sesaminum, aut amigdalorum dulcium recentium sumptum in quantitate 6. aut 8. 3. non fallit. Et si timeretur læsio stomachi & amaritas huic misceantur 3. olei amigdalorum amararum, aut facta uentris lenitione confortetur & corrigatur stomachus cum stipticis confortantibus interius & exterius applicitis. Sed existente febre decur aqua

aqua hordei excocti facta secundum artem mixta cum iulep uiolaceo uel saccharo rubeo. Vel detur syrupus acetosus simplex per duas horas post ipsam aquam. Cassia quoque & manna sumptæ in potu cum aqua hord. aut brodio carniū aut decoctione prunorum faciunt ad uentris lubricitatē, & similiter etiā in clysteribus ponantur. Emplastra quoque, fomenta, unctiones, & semicupia facta ex huiusmodi lenientibus ad hoc conferunt, & cum hoc sedant dolorem. Secunda uero intentio, sciliceteductio fecis mollificatione eadem die complenda, aut sequenti die perficitur scilicet istorum clysteriorum mollificantium, de quibus supra, addantur mellis ab. 3. 3. usque ad. 3. 6. aut secum miscendo multum salis, aut 6. 3. urinæ, mel ramentum est mihi magis dilectum, aut replicetur saepe aliquod suppositorium ex supra scriptis. Quæ si non sufficiant detur cassia, aut hiera pica per os & pilulæ aliphanginæ, & aloë non fallunt præcedente mollificatione, & fortiora sunt diaphoenicon, diacitoniten somlutium, & similia. Tertia autem intentio, scilicet remotio causarum, siccitas secum perficitur secundum ipsarum exigentiam. Si ergo ad sint causæ primitiue sicut cibaria sicca, pauca comestio, balneum, exercitium nimium, nimius coitus, &c. huiusmodi similia remoueantur, & inducatur regimen contrarium. Itē, alteretur caliditas epatis si sit in causa, & deoppiletur Kystis quæ qualiter debeant perfici dictum est superius in passionibus epatis & icteritia. Et si causa est de bilibus expulsiua intestinorum & obtusio sensus eorum succurratur cum theriaca, mithridato, diacori, diapirifarcoticon, diamulco. Item, stimuletur expulsua cum suppositorijs & clysterib. acutis, & si causa sit ipsa multiplicantes, ut superius in icteritia. Et si cum oleo ros. rudi, aut cum oleo de myrro, & similib. præstantius tamen est ut causæ sudor auferantur. Et si causa est urinæ promotio cohibeatur per frigiditatem, sed tutius est causas eius auferre. Et si causa exicationis fecis & longæ retentionis eius sit per communem corriganter secundum quod dictum est in capitulis præcedentibus & dicetur in sequentibus. Reliquæ autem intentiones, scilicet doloris sedatio, accidentium correctio, & regimen sex rerum non naturalium pos sunt patere ex supra scriptis.

DE COLICA APOSTEMOSA.

Eius cura est ut in primis lenias uentrē. Et educas materias communes si fuerint retinæ cum clysteribus in apostemate cal. quod est secundum plurimum frigidis & humidis, sicut est aqua decoctionis hordei, sebesten uiolarum, & oleo uiol. aut cum lacte & oleo uiol. & pauco saccharo. Et addatur cassia si fuerit opus magis lenire. Et si fuerit opus magis infrigidare, ponatur in clysteribus aqua solari aut mucilago psilij. Deinde quā citius fieri potest fiat phlebotomia basilicæ. Et hauriantur 6. aut 8. 3. sanguinis, aut plures secundum repletionem & uirtutem. Et si apostema fuerit uehementer magnitudinis comunicans uis urinæ, & retinens ipsam fiat phlebotomia saphenæ eiusdem lateris post phlebotomiā

basilicæ, & hauriatur notabilis quantitas sanguinis. Et attendatur etiam lenitati uentris cum sumptis per os, quæ cum hoc etiam sicut aqua hord. cum mucilagine, psilij, & similibus, præter cucurbitam. Inest enim ei mala proprietas in passionibus intestinorū. Et ex proprijs est aqua siue succus duorum granatorum 5. 3. Item aqua endiuia, & aqua solari, cum quibus si opus est lenire uentrem misceantur 3. 6. aut 3. 1. florū calliæ, aut 3. 2. manna, & hoc tempore super loco apostemato ponantur repercussiuia frigida non stiptica multum sicut oleum uiol. mixtum cum oleo ros. Deinde in augmento misceantur cum sumptis interius & clysterizatis resolutiua & molliuia cum repercussione sicut aqua decoct. hord. sebesten & passularum, & his possunt addi in decoctione folia altheæ, & hæc decoctio potest bibi & clysterizari, & si clysterizetur huic potest addi oleum sesaminum & amygdalinum. Et circa statum fiat decoctio ex floribus chamomillæ, sem. maluauisci, sem. lini, & similibus, qui clysterizetur addendo oleum sesaminum aut amygdalinum, aut parū uini cocti. Et si opus fuerit abstergere ponatur 3. 1. sacch. rub. Et si tendat ad maturationem addantur adipēs, & si post maturationem patur, regatur cura ulceris intestinorum, de qua infra & similes intentiones habeantur in sumptis interius & applicitis exterius. Sicut interius est aqua decoctionis sebesten, hordei, passularum, ficuum, & sem. maluauisci, & potest cum sacch. dulcorari. Et exterius sicut oleum ros. chamomelinum, sesaminum, quibus potest addi pinguedo gallinæ, anaris, & similitū. Item possunt addi mucilagines maluauisci, foenugr. sem. lini, & ad confortandum misceatur secum oleum mastichinum, & ad hanc intentionem possunt fieri emplastra & fomenta. Si uero apostema fuerit frigidū leniatur uenter primo. Deinde phlebotomietur ex basilica. Et obseruentur eadem intentiones quæ positæ sunt in calido, sed declinent ad calidum. Unde ea quæ competunt in augmento calidi possunt competere, in princ. frigidi, & quæ competunt in statu calidi, possunt competere in augmento frigidi. Sed in statu & declinatione addatur magis calida sicut oleum de spica, oleum laurinum, adeps anseris, & similia.

CVRA COLICÆ EX TORSIONE

& ex descensu intestini in bursam testiculorū aut in aliquā rupturā mirach.

Si fuerit ex torsione situetur aeger supinus in loco temperato, priuseductis fecibus quæ sunt infra intestinum tortum cum clysteribus iuxta doctrinam datam in præcedentibus cap. Et manibus inunctis in oleo de spica, de enula uel castoreo, si fuerit facta torsio ex uentositate, fricetur uenter primo leuiter descendendo & ascendendo, nunc ad latera trahendo & semper ascendendo cum fricatione & descendendo, & ad latera trahendo perueniatur ad locum ubi sentitur intestinum tortū & hoc fiat pluries. Et si cum leui fricatione non obedit neque redit ad situm naturalem, fricatio fiat fortior etiam iterata. Et si non redit ad situm naturalem experiantur alij situs super latera similiter fricando. Et aliquando iaceat cum uentre deorsum. Itē ipse sedens aut iacens se conuoluet, aliquando se inordinato motu proijciat, aut aliquando

quando pedes eleuetur. Fortasse autem quod arte fieri nequit à casu redibit ad situm naturalem. Si autem à casu, percussione, saltu, & similibus causis primitiuis facta fuerit tortio, fiat hæc eadē frictio sed leuior ne locus apostemetur, & sint manus inunctæ cum oleo uiol. aut simili frigido aut temperato. Et nullo pacto dentur in his casibus solutiua superius nisi prius intestinum fuerit reductum, & diæta ualde tenuis.

Cumque intestinum est reductum procuretur exitus fecum iuxta superiorum doctrinam. Deinde uenter stringatur cum fascia strictura decenti ut non amplius dislocetur, & stringantur crura fortiter super genu & similiter adiutoria super cubitum, ne intestinum contortum apostemetur. Et diæta sit tenuis lubrica. Et si fuerit ex descensu intestini in oscheum aut in aliquam fracturam siphæ, prius feces quæ sunt infra intestinum illud dislocatum educantur & imponantur clysteria mollificantia quæ ascendant usque ad intestinum dislocatum & non sint acuta ut possint retineri. Et exterius applicentur mollificantia quæ etiā uentositatem carminent, ægro iacente supino & aliquantulum magis eleuato cum parte ad quam facta est dislocatio. Et si opus est ponatur in balneo mollificante liquore ascendente ad locum ubi retentum est intestinum dislocatum. Aut loco illi applicentur philtrea in fusa in huiusmodi mollificantibus. Postea comprimatur intestinum cum suauitate uersus aperturam. Et inter cætera obseruetur hoc ingenium, ut intestinum prope aperturam digitis stringatur ut subtilietur, & paulatim stringendo impellatur modicum, post modicum de intestino aut defece in eo contenta, donec paulatim quasi inungendo ad superiora totum intestinum impellatur. Nec faciendum est sicut faciunt quidam inexpertii qui totum fortiter comprimendo una uice uolunt impellere. Et cum reductum est procuretur exitus fecum omni ingenio. Sed ante reductionem non dentur solutiua. Et diæta sit ualde tenuis & lenitiua. Et reducto intestino consolidetur ruptura cum ligatura braccali & reliquis necessarijs interius & exterius applicitis.

CYRA RELIQUARVM SPECIERVM
cicrum colicæ.

Si fuerit ex lapide in intestinis humid. lubricis, abstergentibus, quibus aliqua lapidem frangentia sunt admiscenda, curandus est. Quæ si lapis fuerit in superioribus intestinis per os exhibeantur. Si uero in inferioribus per clysteria. Si uero fuerit ex uermibus cum interficientibus & ipsos educentibus curetur iuxta doctrinam in proprio cap. ponendam. Si uero ex sang. in intestinis congelato fuerit educatur. Si fuerit in intestinis inferioribus cum aquæ decoct. hordei & fursuris & similibus abstergentium mollificantium, cuius lib. i. sit admixtum oximel simplicis uel scillitico, ʒ. 3. Si uero fuerit in superioribus detur aqua hord. calida cum oximelle simplici uel scillitico & istis adhibitis tam superius quam inferius potest admisceri aliquid coaguli, sumptis per os usque ad 5. grana. sed clysterizatis uisque ad 3. s. Si uero dolor intestinorum fuerit à solutione continui & fuerit ex causa exteriori, ut puta ex uulnere eius cura alibi perquiratur, & proprie ab Auic. quarti. Si uero fuerit

ab humore acuto pungente & corrodeute siue sit colica, siue phleg. salsum, aut à cibo acuto, & est secundum plurimum de genere punctionis, eius cura est habita superius cap. de punctione. Et si excoriatio & ulcus factum sit in intestinis cura perquirenda est interius in cap. de dysenteria. Est etiam superius posita cura colicæ quæ huic deferuit quantum est expediens. Si dolor intestinorum fuerit per communitatem ab alijs membris, puta à cerebro, neruis, pectore, epate, splene, instrumentis urinæ, mirach & laceris uentris, & similibus, aut per communitatem à toto, duæ habebantur intentiones generales, una ad membrum mittens, altera ad membrum recipiens, à quarum prima licet regulariter incipiendum frequenter tam coactè à secunda incipimus. Si uero dolor fuerit à causa extrinseca, ut puta à potu aquæ frigidæ & balneo in ipsa, uento septentrionali, lesione super lapide, ab ære pestilenti, à ueneno sumpto, à cibis stipticis & ponticis, aut à proprietate facientibus hanc passionem duxerunt intentiones. Vna est causam primitiuam remouere, eam omnino à corpore abijciendo uel quantum est possibile & inducere regimen contrarium. Secunda est dispositionem impressam corrigere. Quæ intentiones qualiter debeant compleri ex supradictis patere potest.

DE ILEOS Cap. CII.

Quid nominis & quid rei ileos quæ apud antiquos dicta est, domine misere mei, propter mortem crudelem & obsecram post tantos cruciatus & uomitum stercoreum, superius posita sunt. Quæ licet cum colica conueniant quibusdam generalibus, scilicet causis accidentibus & cura, sunt tamen quandoque particularia iurabiniuicem differunt, scilicet causæ, dolor, exitus, uamentum remedium, & ultimas accidentium. Primo, in causis quidem differunt. Nam illa plus accedit à causis primitiuis & extrinsecis, & mala complexione singulari & frigida, sicut in potu aquæ frigidæ in tempore non congruo, & hoc quia graçilia sunt stomacho propinqua magis. Item, frequentius accedit ab ære pestilenti propter propinquitatem ad cor. Et similiter à uenenis propter propinquitatem ad cor. Et propter has causas magis permutatur de regione ad regionem, & de corpore ad corpus in modum pestilentis morbi. Item frequentius accedit ab apostem. propter uicinitatem ad epat, & maiorem multitudinem mesentericarum uenientium ad gracilia. Item frequentius accedit propter uicinitatem ad gracilia. Item frequentius accedit propter ordinem uisus retentiuæ, cum gracilia sint magis ordinata in retentione quam crassa, & contra crassa magis expulsiuæ, sunt enim gracilia strictiora. Scilicet uenter tositæ, phleg. stercore sicco, uermibus & similibus cum sint frigidiora & ad horum expulsiuam ordinem nata. Et si accidat in eis frequenter propter defectum ad speciem. Accidit enim in gracilibus frequenter dolor pugnitiuus & tortiuus. Pugnitiuus quidem propter choleram immediate ad ipsa uenientem. Sed tortiuus propter ipsorum longitudinem & plurimam reuolutionem, licet in quocumque intestino, quæcunque species doloris possit accidere. Secundo, quantum ad intentionem

intensionem, est enim dolor in gracilibus intensior quam in crassis, quia sunt magis nervosa & acutioris sensus. Tercio, in loco doloris. Nam dolor iliaceus est supra umbilicum & hypochondrijs magis, sed colicilius est infra umbilicum. Quarto, in permutatione, facilius enim ileos permutatur quam colica propter maiorem colligantiam & uicinatam intestinorum grauium cum membris ad quæ permutari cõsuevit, de qua permutatione superius dictum est. Sed e contra in colica dolor est magis extrinsecus, grauius, & perforatius, & si aliquando est pungitius, est tamen magis perdurans propter longam materiæ retentionem ex ipsorum spissitudine & carnositate. Et dolor magis est infra umbilicum circa pectinem. Et minus nocuum tunc communicat superioribus nobilibus quæ iliacæ. Et minus permutatur, licet sit maioris perlon aut sacculus oppilatur, materia regurgitat ad superiora in quibus propter ipsorum stricturnam facile retinetur & causat iliacam. Sed cum oppilatur superiora in iliacæ materia ad stomachum regurgitat. Et si larga non retinetur, sed descendit secundum plurimū & egreditur. Tercio, principaliter differunt in executione. Nam in ileos per anum ferè nihil egreditur, & non nisi cum maxima difficultate, sed per uomitum plur. & facilius. Et illud est phlegmaticum, quandoque cholericum, quandoque uiride, prasinum uel eruginosum, quandoque nigrum melanch. Item plurimū foetidum stercoreosum cum uermib. mixtum. Et est seculum plur. mortale. Item, in iliacæ urina est magis tincta propter dolorem acutorem magis inflammatem. Item, propter retentionem cholæræ quæ per canalē ad finem duodeni terminatū, ad graciliā transmitti cõsuevit, quare rediens ad uias uris tingit ipsos dolores uehementem in spiritalibus angustia cum doloris attracto, & uirtute magis dissoluta. Sed in colica cum clysteri aut collurio facilius egreditur phlegma mucilaginosum & sterus scybalosus phlegmæ inuolutum. Item, uentositas crassa sonans & uenter non fit nisi per compassionem gracilium, & propter dolorem inflammantem, & etiam propter compassionem renum in dolore, quare urinam retinent diu & tingitur, non autem propter cholæræ regurgitationem. Quarto principaliter in remediis iuuat superius exhibita, quia iliaci iuuantur maximè per clysteria & suppositoria. Sicut colici contra iuuantur per cidentium ultimata consecutione. Nam casus uirtutis, alienatio, spasmus, alucies, instantia uigiliarum, tremor cordis, syncopis, frigiditas extremorum, singulus, & huiusmodi accidentia terroris, & tandem mors sunt in iliacæ magis & in colica minus propter causas suprascriptas. Et apparet in iliacæ inflatio oculi magis quam in colicæ, id est, inflatio monoculi. Et in summa iliacæ est difficilior quàm colicæ ex causa proportionali uel consimili. Et factam ex ueneno significat antecessio ueneni, & alia accidentia ueneni, scilicet

debilitas corporis, tremor cordis, quæ aliquando dolorem iliaceum antecedunt. Et factum ex apostemate significat durities fecis, & uelocitas in egestionem, id est in uomitu fecis & febris. Cum alijs enim non erit febris nec casus uirtutis uehemens nisi forte fuerit à ueneno. Et ex suprascriptis in hoc capitulo de colicæ iā manifesta sunt quid nominis & quid rei ileos causæ & signa.

Sed prognostica sunt ista. Primum, cum plus occidit ileos occidit in septimo, quod est uerum secundum plurimum, quandoque etiam uidetur occidisse in quinto. Secundum. Cum accidunt accidentia horrenda supra scripta pauca est spes salutis, licet aliquos uiderim peruenisse ad uomitum stercorei cum accidentibus fortibus & euasisse. Tercium est Aphorismus sextæ partis. Cum ex distillatione accidit ileos moritur, cuius est in septimo, nisi accidat febris & curat cum ea sudor plurimus. Et quamuis dicat Auicenna. Galenum causam huius Aphorismi ignorauisse, credo causam esse, quia distillatio ex humiditate superflua accidit, propter quam superfluitates cõsuetæ cum urina euacuari, sunt retentæ. Et regurgitantes ad intestina faciunt ileos. Febris autem superueniens est causa ut materia subtiliata cum sudore educatur, per cuius presentia causabatur distillatio & ileos. Quartum, ileos, phlegmatica & uentosa iuuantur febre.

Quintum, Bonitas urinae in ileo non facit fiduciam sanitatis, quid ergo iudicandum est de urina mala.

Sextum, Deterior ileos est in quo egreditur stercus uomitu. Deinde illa in qua egreditur sudor foetidus, scilicet habens odorem stercorei. Tercio, in quo est anhelitus habens odorem stercorei. Quarto, in quo est eructatio habens odorem stercorei. Quinto, leuissima omnium est in qua inferior uentositas est foetida. Cura ileos proxima est curæ colicæ. Verū differt à curâ colicæ in tribus. Prima differentia est, quia cura eius maiorem exigit festinationem quam cura colicæ, quanto est morbus acutior tãto minores datur inducias. Secunda differentia est, quia bibita sunt cū hac magis inuatiua quam supposita, cuius oppositum est in colica. Causa autem differentia est, quia clysteria & lichina non ascendunt nisi difficulter ad intestina gracilia. Attamen bibita & supposita sunt in eius cura necessaria, & quamuis A. dicat quod non refert à quo incipiatur an à bibitis an à suppositis, dummodo alterum subsequatur. Ego tamen existimo melius esse incipere à clysteribus ut intestina crassa mundificentur ab his quæ in eis continentur, ut uia exitus superfluitatum quæ dolorem faciunt intestinis gracilibus sit expedita, & facile possint descendere, & eo magis, quia oppilatio inferiorum & præcipue sacculi frequenter est causa retentionis superfluitatum in superioribus. Et consequenter doloris eorum quamuis inferioribus, & propriè in sacculo non fit dolor propter suam amplitudinem. Et clystere primum debet esse lenitium secundum, acutum ut eradicet materias ab inferioribus, & trahantur à superioribus. Et clysteria ista debent esse magnæ quantitatis, & postea quàm citius fieri potest, subsequatur aliquod lenitium de super. Et Auicenna dicit, quod sorbitio aquæ calidæ sedat dolorem. Ego tamen credo tutius esse ut exhibeatur oleum commune bene conditionatum 6. aut 8. ʒ. de bite calefactum, & elaboretur cum ingenio ut resina

cur.

tur. Aut si abhorreatur detur lſ. i. brodij caponis uel gallinæ multum pinguis, sed melius galli decrepiti. Aut detur alia medicina lenitiua ex callia, manna, & similibus dictis in colica. Et apud necessitatē misceantur cum diaphoenicone, diacitonitē, electuario indo, & similibus. Aut ipsa sola electuaria exhibeantur cū lenitibus sicut brodio galli decrepiti, aut aliquod modo secundum exigentiam, ita ut fiat deoppilatio & re-
tenta educatur. Tertia differētia est, quia in iliaca magis est necessaria phlebotomia quā in colica, ita ut non solum in apostemosa sit necessaria, sed etiam frequenter in alijs speciebus. Nam propter fortem dolo-
rem & multitudinem uenarum melaicarum uenitium ad gracilia sunt magis apta apostemari gracilia quā intestina crassa. Item, quia facta oppilatione in gracilibus magis per corpus spargitur humores con-
fucti euacuare quā propter oppillationem in cras-
sis quæ sparsi phlebotomia sunt euacuandi. Obser-
uatis ergo his tribus differētijs, procedatur ad curam
iliacæ secundum unamquamque causam secundum
quod dictum fuit in colica. Item, ut intentiones illæ
& remedia ibidem dicta secundum unamquāq; cau-
sam colicæ ad hunc locum afferantur, curando iliaca
à simili causa pendente sicut dictum est in colica.
Nam à quacunque causa potest pendere colica ab ea-
dem uel simili potest pendere iliaca & e contra. Et ob-
seruetur quarta differētia, quia diæta debet esse ma-
gis tenuis in iliaca quā in colica, quanto iliaca est
acutior colica.

DE FLUXU VENTRIS.

Cum cibis in stomacho more solito
non moratur, imò citius egreditur,
non mutatus nisi parum, & fuerit cum hoc
mordicatio & dolor in uentre & sitis, cum
quo etiā plerumque adest uentris fluxus, in
quo ante comestionem inuenitur aliquid pu-
rulentum. Detur agro rob de succo uuæ
acerbæ, aut de succo ribes, aut de succo gra-
natorum, cum spodij & ros. amborū, ana.
drach. i. Trochisci quoque de spodio constri-
ctiui itidem tribuantur. Nutriantur uero
ex adestia citrina & pullis cum aceto coctis
& assatis, & cum succo uuæ acerbæ posi-
tis, in potu uero sumat sumach cū aqua ros.
Et deinde nutriatur ex cibo cui admiscetur
sumach, qui uocatur sumachia. Totumque
eius regimen ad hoc perducatur ut infrigi-
dare possit & constringere.

Hoc capitulum diuiditur in quinque partes. In pri-
ma agit de lienteria. In secunda de fluxu chiloſo. In
tertia de diarrhoea. In quarta de dysenteria, In quin-

ta, de tenesmo. In secunda ibi. Si uero cibis non egre-
ditur. tertia ibi. Si autem quod egreditur citrinū fue-
rit. quarta ibi. Quod si ex fluxu uentris euenit exco-
riatio. quinta ibi. Trochisci ad tenesmonem. Prima
partem diuidit in quatuor. In prima ponit generalia
signa lienteriae. In secunda agit de lienteria pendente
à cholera & excoaratione siue ulcere stomachi. In ter-
tia agit de lienteria pendente à phleg. existēte in stom-
acho. In quarta parte agit de lienteria pendente à mala com-
plexione stomachi frig. & hum. sine materia. Secun-
da pars incipit ibi parum distanter à principio. Et fue-
rit cum hoc mordicatio. tertia ibi. Quod si non fuerit
cum eo mordicatio. quarta ibi. Si autē cū hoc quod
diximus nihil egreditur. In prima parte ponit duo li-
gna generalia lienteriae. Primum, quod abus in sto-
macho non moratur quantum conuenit. Secundum
quod egreditur, scilicet per anum extra corpus nō di-
gestus nisi parum. Est enim lienteria fluxus cibi indig-
estus. Quod potest esse tribus modis, aut quia cibis
nullo modo est digestus, quia egreditur in ea qualitate
& quantitate in qua sumptus est, aut quia est dimi-
nutæ digestus secundum quodlibet eius, aut tertio,
quia aliqua pars eius difficilius digestiois non est
digesta reliquo ipsius existente digesto. In secunda
parte, primo ponit signa lienteriae à cholera & ulcere
pendentes, quæ sunt mordicatio, & dolor in uentre,
id est, in stomacho & sitis cum quo plerumque est fluxus
uentris, in quo etiā ante comestionem inueni-
tur aliquid purulentum, id est, saniosum. Deinde dat
remedia infra scripta. Primum est rob de succo uuæ
acerbæ, aut rob de succo ribes, aut de succo granatorū
quæ omnia sunt frigida, sic & stiptica, & permiscen-
da sunt cum spodij, ros. ana. 3. i. & possunt dari hæc
tria rob simul mixta, & singulum deperle. Secundū
est trochisci de spodio. quorum descriptio ponitur in
hoc cap. & sunt præstares in hac re. Tertium est quod
nutriatur ex adestia citrina, id est, ex cibo factio ex len-
tibus cū pauco sapharani, sed prima aqua decoctio.
tis in succo uuæ acer. id est, agreste, & in potu sumat
aquam ros. infusionis sumach. Item, comedat sumach
chiam, id est, cibarium factum ex granis sumach frig.
siccis, & stip. optime ualentibus in hoc proposito. Nota
myrtea & limonea sunt præstantis iuuamenti. Nota
tamen quod existente ulcere in stomacho caues ab
acribus & acetosis notabiliter, ne sequatur mordica-
tio intolerabilis. Et in casu ulcers ultimū remediū
est succus plantaginis cum bolo ar. aut trochiscis de
spodio dissolutis in succo dicto.

Quod si non fuerit cum eo in uentre
mordicatio, neque quod egreditur pus hæc
bet admixtum, sed est uiscosum, & adest in-
flationis paucitas, & ructus acidus, & pu-
pauca sitis, agro sicla & sinapis, & pi-
sceas saluti tribuantur. Deinde cogatur ea
uomere, sumendo salem, & mel, & ane-
thum coctum. Quæ si non suffecerint me-
dicame

elicamen quod expellit phlegma tribuatur, quod Recipe aloës, drachmam unam, colocynthis interioris, drachmas quatuor, salis indi, drachmas quatuor, turbit, drachmam unam, ex his fiant pilule & sufficiunt ad dosim. Vomitu præterea sepe utatur. Et cibaria quibus utitur in alimuri per se intingantur. Et comedat sulcita quæ sale condiuntur, & acrimoniam habet quæ appetitum prouocare consuevere.

In hac secunda parte primæ partis agit de lienteria a phlegmate dicens, quod si non fuerit mordicæ tio in stomacho, nec illud quod egreditur per anum pus habet admixtum, licet sit uiscosum, sicut de natura phlegmatis, & paucitas inflammationis & paucitas eructuatio acida quæ omnia attestantur frigidi, detur primo ægro hoc uomituum. Recipe anchi Manipulum unum uel duos bulliant in unam libram aquæ ad consumptionem medietatis et coletur, cum qua decoctione colata, uel 6. unciarum ad minifilrentur, mellis uncias duas, salis, drachmas duas, & totum repidum sumatur postquam æger prius comederit siclam, id est, blitem, sinapim, id est, mordicam & pisces salitos, quæ omnia sunt incidentia phlegma, abstergentia & subtiliantia, deinde renter uomitum digitum aut pennam in gutture imponendo, ut phlegma simul cum eo quod sumptum est educatur. Secundum remedium hoc non sufficiente est ut detur una ex pilulis infra scriptis. 3. aloës solutiu phlegmatis et cholere 3. 1. colocynt. interioris solutiu phlegmatis chol. & aquositas 3. 4. sal. indi solutiu phleg. & melan. 3. 4. turbit solutiu phlegmatis, 3. 1. fiant pilule crasse. Tertium remedium quod utatur sæpe uomitu, hoc enim promptius est ad mundificandum stomachum quam solutio.

Quartum, quod cibaria sua quibus utitur intingantur in alimuri, id est, balsamento facto ex pisciculis salitis & aromatibus, sparso, id est, dissoluto, & comedat sulcita quæ sale condiuntur, & quæ habent acrimoniam, id est, acuitatem per aromata quæ sulcita consueuerunt prouocare appetitum, & hæc sulcitalunt mortatellæ, & similia.

Si autem cum hoc quod diximus nihil egreditur superfluum, neque quod expellitur aliquid purulentum, uel phlegmaticum habet admixtum, ægro uinum forte purum tribuendum est. Et diaolibanum dandum, quod Recipe olibani drachmas decem, piperis, ameos, spic. cheism, anisi, nigellæ, omnium, ana drachmas duas, balaustie, drachmas decem, mellis despurmati quantum sufficit ad conficiendum, de-

tur ex hoc in potu, quia stomachum calefacit & uehementer desiccatur. Apozema quoque in cap. colicæ passionis nominauimus detur. Et assuescat in potu sumere uinum purum.

In hac quarta parte & ultima huius primæ partis principalis curat lienteriam a mala complexionem frigida & humida sine materia, & quæ dicit nota sunt. Nam ea quæ ipse concedit sunt calida, sicca, constringentia & stomachum confortantia. Et omnia nota sunt, cheism, id est, leuisticum.

Si uero cibus non egreditur, sed res subtilis, alba & aquosa cū qua sunt ea quæ epatis significant debilitatem, ægro tribuatur id quod fit de scoria & diaolibanum, & electuarium diacalamentum, et trochisci calefacientes epar quos nominauimus, & electuarium diacalamentum, quod Recipe foliorum rutæ, calamentibi, uitrum, ameos, carui, cheism, zingiberis, cinamomi, macropiperis, omnium partes æquales, conficiantur cum melle cocto. Et dentur alia medicamina quæ nominauimus in cap. epatis ex his qui ipsum calefaciunt et confortant.

Hæc est secunda pars principalis huius capituli, in qua agit de fluxu chyloso & habet duas partes. In prima agit de fluxu chyloso propter nocuumentum epatis & maxime debilitatem attractiuæ eius. In secunda uero agit de fluxu chyloso sequente nocuumentum stomachi & intestinorum, & maxime debilitatem retentiuæ eorum. Ibi secundum. Si autem cum prædicta ægritudine. In prima parte ponit primo signum fluxus chyloso dicens, quod si cibus non egreditur imo egreditur res subtilis aquosa & alba quæ est chylus, est enim chylus substantia alba, subtilis aquosa ex meliori parte cibi per primam digestionem genita, adfuit etiam ea quæ significant epatis debilitatem, scilicet mala complexio frigida, aut apostema, aut oppilatio ex quibus debilitetur epar, & maxime secundum attractiuam dentur remedia infra scripta. Primum id quod fit ex scoria ferri superius in capitulo de debilitate stomachi descriptum. Secundum est diaolibanum in parte præcedenti descriptum. Tertium, trochisci calefacientes epar, scilicet trochisci de rheubarbaro, trochisci de lacca, de quibus superius in capitulo de dolore epatis. Quartum est diacalamentum quod hic describit. Et nota sunt omnia ex sæpe dictis, et ualent hæc medicamina ad calefaciendum epar, excitando, confortando, & faciunt chylum penetrare per ipsum, & remouent eius oppilationes.

Si autem cum prædicta ægritudine non fuerit significatio debilitatis epatis, imo quod egreditur subtile est & album,

fuerit in stomacho grauitas, puluis de malis granatis ad transglutendum dandus est, cuius confectio. **Recipe** ossium granatorum acetosorum, & tritorum ut alcohol, drachmas decem, carui, seminis coriandri, amborum aceto acerrimo infusorum, & postea assatorum ana drachmas uiginti, xilocarat, sumach, balaustiae omnium ana drachmas decem, puluerizentur optime & dentur ad transglutendum.

Electuarium quoque quod dicitur chanzi, detur, quod **Recipe** arillorum passorum tritorum ut alcohol, libram unam, myrtillorum siccorum puluerizatorum ut alcohol, libram semis, xylocerat, nabati, balaustiae seminis tamarisci, ameos omnium ana drachmas decem, conficiantur cum melle de canna, aut cum melle apum optime dispumato, & electuarium sumatur.

In hac parte secunda huius secundae partis principalis curat fluxum chylosum ex debilitate contentiuae stomachi, & intestinorum prouenientem quae sequitur secundum plurimum malam complexionem humidam, non enim tanto tempore retinet chylum quod possit per epas attrahi mediantibus melaericis. Et ponens signa dicit, quod non sunt signa debilitatis epatis, sed adsunt signa debilitatis stomachi, quia grauitas. Tunc detur patienti puluis de granatis, cuius descriptionem ponit. Et sunt nota omnia ex suprascriptis. Xylocerata, id est, cornua ligni, et sunt carubiae. Hic autem puluis potest cum aliquo liquore permisceri, ut muiua & uino citoniorum. Secundum est electuarium quod dicitur chanzi, forte nomine inuentoris, & descriptio manifesta est, haec enim sunt notabiliter sicca, parum secundum qualitates primas a temperamento recedentia, et confortantia reteriuam stomachi & intestinorum per siccitatem, siticitatem & proprietatem.

Si autem quod egreditur citrinum fuerit, & anum mordicat, aegerque sitim patitur & febrem, trochisci constrictiui de spodio, & aqua sauich, hordei detur.

Et trochisci constrictiui de spodio. **Recipe** rosarum rubearum, spodij ana drachmas decem, seminis acetosi, sumach, balaustiae, gummi arabici omnium ana drachmas quique, informantur trochisci pondere drach. 2. quorum unus cum un. 1. de rob

citoniorum simplici sumatur. **Aqua** uero sauich hordei ita fit. **Hordeum** factum in aqua ipsum cooperiente bulliat donec aqua inspissetur, deinde coletur & bibantur ex eo uncias quatuor, cum drachmis tribus, spodij & gummi arabici eadem quantitate.

In hac tertia parte principali curat diarrhoeam graece, quae latine significat fluxum. Et dicitur a *diap* & *rho* uerbo graeco, idem quod fluo significante, nomen enim generis sibi uendicauit cum frequentius ceteris fluxibus accidat. Est autem descriptio fluxus unius, plurium, aut omnium humorum praeterquam sanguinis, qui si fluere diceretur fluxus sanguineus, maxime tamen hic curat fluxum cholericum dicens. Quod si illud quod egreditur fuerit citrinum, et anum mordicat, aegerque sitim patitur & febrem, quae omnia cholerae attestantur, trochisci de spodio constrictiui statim dentur, quorum descriptio satis nota est. Et sunt praestantes, & maxime debent dari cum succo citoniorum. Similiter debet dari aqua sauich, hordei, quae fit ex hordeo torrefacto super quo ponatur tanta aqua, quod notabiliter cooperiat ipsum, potest enim esse aqua uigecupla, aut etiam minoris quantitatis ad ipsum & deinde coletur, & cum quatuor uncis eiusdem misceantur spodij, gummi arabici ana drachmas tres, & in potu pluribus uicibus sumatur. Haec enim optime confert infrigidando, constringendo, & dolerem seu punctionem sedando.

Quod si ex fluxu uentris euenerit excoariatio, puluis de bolo ad transglutendum detur qui **Recipe** psyllij drachmas uiginti, seminis plantaginis drachmas decem, gummi arabici, boli armen. amborum ana drachmas tres, psillum affetur, & gummi mi, & bolus puluerizentur, & commiscantur, & sumatur in potu ex eo in mane drachmas tres, cum rob de citonijs & citrica noctem tantundem. Cibus uero eius sit pulmentum factum cum granis granatorum & passis cum aqua & aceto. Et cibus factus cum succo uinae acerbae, & sumachia, & casea, cui admiscetur succus sumach, & his similia cibaria. Trochisci de balaustijs qui cum nimie conferant diarrhoeae, dandi sunt cum fluxus fuerit supflus, siue habeat sanguinem admixtum siue non. **Recipe**

Recipe gallarum, siliquarum nabati, seminis tamarisci, olibani, balaustiae, omnium partes aequales, opij, gummi arabici amborum ana partem semis, informantur trochisci pondere drach. 2. ex quibus, unus cum uino sumatur. si neque calor affuerit, neque febris, sed si febris affuerit cum rob de citonijs acetosis sumatur, qui tunc dandi sunt cum fluxus uentris superfluis fuerit.

In hac quarta parte principali Ras. curat disenteriam dicta a *δυσ*, quod est male, & *τρεψ*, quod est intestinum. Isidorus sexto etymologiarum, et est descriptiue fluxus uentris cum excoitatione, aut ulcere intestini. Pro cuius cura primo dat puluerem de bolo cuius est haec descriptio. Recipe pilij frigidi & humiditatis drachmas uiginti, seminis plantaginis frigidi & sicci drachmas decem, gummi arabici frigidi & sicci, uiscofi, boli armeni frigidi et sicci, tipitici, uiscofi proprie in consolidando ulcera intestinorum ana drachmas tres, pilium asserur, & gummi, et bolus armenus puluerizati commisceantur, de quo puluere sumatur drach. 3. in mane & per duas horas ante coenam cum rob de citonijs. Cibus sit pulmentum, id est, ius cibale in quo sint grana granatorum & passae, et aliquid aceti sed modicum, timetur enim excoitatio, id est, item cibus factus cum agrestia, & fumamilia, sicut limonea & myrrhea. Dat tertio trochiscos de balaustijs opiatos, quorum descriptio nota est, et iubet dari drachmas duas pro uice cum uino non existente febre, & cum rob de citonijs si adsit febris. Hi tamen non debent dari nisi cum est superfluis fluxus, & caetera non contulerint, una tamen drachma ab initio experienda est, siliqua nabati, id est carubia regionis illius.

Trochisci ad tenesmon qui tunc dandi sunt cum calor absentia fuerit, & uentrositas erit nociua & sonitus.

Recipe seminis hyoscyami albi, seminis anethi. seminis foeniculi omnium ana drachmas quinque, ameos drachmas duas & semis, opij drachmas tres, seminis apij drachmas decem, fiant trochisci de quibus pondus unius aurei in potu sumatur.

Confectio electuarij de styracae, quae antiquo fluxui uentris confert, ac tenesmon, cum neque febris, neque calor affuerit, sed aderit uentrositas nociua, danda erit.

Recipe castorei, opij, asari, styracis liquide, myrrhe, seminis hyoscyami nigri, thuris, omnium partes aequales, mellis quantum sufficit ad specierum confectio nem, cuius dosi sunt drachm. 2. uel tres.

Si autem postquam tenesmon decem transierit dies non uisa fuerint medicamina conferre, & aeger super pectinem sentit dolorem redeundum est ad chlystere.

Quod recipe panici excorticati, rizi excorticati, lentium excorticatarum, rosarum siccarum, balaustiae, cupularum, glandium omnium ana Manipulum unum, omnia in tres libras aquae coquantur donec ad unam & semis redeant, deinde colentur deinde sumantur cerusae, cineris papyri amborum ana drachmam unam, boli armeni drachmam semis, uitelli oui unius assati durri, olei ros. unciam semis, ex his omnibus in praedicto apozemate fricando dissolutis chlysterizetur aeger semel, aut bis.

In hac quinta parte & ultima huius capituli ponit curam tenesmonis, *τρεψ* autem siue melius *σπασμ* graece idem significat quod gemitus latine dictum a *σπασ* uerbo graeco, idem quod gemo significante, est descriptiue expressio intestini recti cum genitu & conamine ad egerendum facta ab expulsiua stimulara a causa praeter naturam existente in ipso, aut in extremitate eius quae est anus.

Haec pars diuiditur in quatuor partes. In prima parte curat tenesmonem pauci temporis. In secunda tenesmonem longi temporis. In tertia ponit duo antidora optime ualentia in constrictione fluxus uentris. In quarta parte ponit remedium ultimum in tenesmone. Secunda pars incipit ibi. Quod si tenesmon fuerit longi temporis. Tertia pars ibi. Epithyma de quo. Quarta pars ibi. Quod si aeger.

Primam partem possem diuidere in tres secundum quod tria afferit remedia pro curando tenesmonem, partes patebunt discurrendo per textum. Primum remedium est, trochisci cum adiunt signa frigiditatis, & est uentrositas nociua ab humore frigido eleuata, quae cum sonitu emittitur, horum descriptio est ista. Recipe seminis hyoscyami albi, frigidi in principio quarti gradus stupefactiui, seminis anethi calidi in secundo resolutiui uentrositatis, seminis foeniculi similiter calidi, omnium ana drachmas 5. ameos calidi. in secundo uentrositatis resolutiui drachmas duas semis, opij drachmas tres, seminis apij calidi, aperitiui uentrositatis resolutiui 3. 10.

stant trochisci, de quibus detur pondus aurei unius, sed medietas aurei in primis tētanda, nam in uno aureo ingrediuntur plura quam sex gran. opij. Secundum remedium est, electuarium de styrace confrens antiquo fluxui uentris & tenesmo cum adsunt signa frigiditatis & uentrositatis. Recipe castorei calidi in principio quarti, opij correcti assari, id est, baccare calide et sicce, styracis liquide, mirrhē calidum & siccorum, seminis hyoscyami nigri, frigidioris quam album, & deterius, quo raro utendum est, est enim frigidum in fine tertij gradus, album uero in principio, tertij thuris omnium partes aequales, mellis quod sufficit ad specierum confectionem. Et debet esse quadruplum ad species, dosis eius est a drachmis duabus ad tres, sed sufficiat medietas. Tertio, ponit clystere constrictiuum conueniens in tenesmo postquam transferint dies uiginti dolore existente in intestinis crassilis. Recipe panici excorticati frigidi & sicci, rizi excorticati calidi & sicci, lentium excorticatarum, rosarum siccarum rub. balaustia, cupularum gladium omnium frigidarum & siccarum ana Manipulum unum, bulliant in tres libras aquae donec redeant ad unam & semis, sed iudicio meo opus esset maiore quantitate aque pro sufficienti decoctione de qua accipiat libram unam & semis, deinde misceatur secum cerusae frigidae & siccae, cineris papyri babilonici calidi & sicci, stiptici añ. drachmam unam. Est autem papyrus babilonicus, iuncus syluestris super quo antiqui scribebant, hoc utimur ad obturandum uegetes ne uinum exeat, boli armeni drachmam semis, uitelli duri unius oui, olei rosacei, unciam semis, ex his omnibus ab inuicem commixtis fiat clystere, est enim constrictiuum sua stipticitate & uiscositate.

Quod si tenesmus fuerit longi temporis in quo non egreditur sanguis, sed rāsura alba, & mucilagini similis, medicamen pueredinis, quod in capitulo putridarum gingiuarum nominauimus, dandum est, ex quo in apozemate eorum quae nominauimus fricato & dissoluto clystere semel, aut bis fiat.

Et si ex uentris fluxu in uentre uehementis mordicatio secuta fuerit clystere, fiat ex oleo rosato tepido. Si autem nullo modo mordicat clystere ex illo medicamine ad datur multotiens donec sanetur.

In hac secunda parte huius quintae partis principalis curat tenesmus longi temporis quando iam factum est ulcus putridum in intestino recto, unde illud quod emittitur est album simile mucilagini saniofae, curat autem ponendo in clysteri suprascriptae descriptionis medicamen superius positum in capitulo de cura gingiuarum sanguinolentarum, quod est notabiliter corrosiuum propter arsenicum, calcem, & reliqua acuta quae ingrediuntur eius compo-

sitionem, de hoc tamen non est in clysteri nisi parua quantitas imponenda, scilicet drachmam semis, & si non senserit ardorem ponatur secunda uice unciam unam, & sic procedatur augendo quantitatem donec senserit notabilem ardorem, ponitur enim ad caustificandum carnem putridam impediētem ulceris consolidationem. Propterea subiungitur quod si ardor superuenerit clysterizetur cum oleo rosato tepido ad ardoris sedationem. Illud tamen non fiat immediate, ne operatio medicinae impediatur.

Epithyma quo uenter cum fluxus uehementis est, & uirtus debilitata leniendus est. Recipe galliae, acatiae, cyperi, mirrhae, gallarum, cupressi, thuris, omnium partes aequales, ex omnibus his uino uecari, aut succo citoniorum conspersis liniatur uenter, huic quoque quandoque additur panis bis coctus de syria. Si autem cum hac aegritudine fuerit calor, epithyma fieri conuenit ex duobus sandalis & ros. & bolo armeno, & faufel, & gallia, & panis bis cocto cum succo mactianorum, aut citoniorum, aut myrtino.

In hac tertia parte huius quintae partis principalis describit duo antidota, primum in causa frigida, secundum, in causa calida, optime ualentia ad fluxum constringendum, & descriptiones notae sunt. Acacia est gummi cuiusdam arboris, quae non est apud nos, sed pro ea accipimus succum prunellorum immaturorum. Faufel, id est, auellana in dā frigida & sicca, quam non habemus.

Quod si aeger uehementer patitur tenesmus & saepe uadat ad sellam, & nihil tamen egreditur, collyrium istud subijciatur, est enim mirabile ad sedandum tenesmus, quod Recipe thuris, sicij, croci, gummi arabici ana drachmam unam, opij drachmas duas informantur collyria & supponantur.

In hac parte ultima ponit remedium ultimum in tenesmo ipsius sedatiuum stupefaciēdo, ex hoc enim medicamine debent fieri collyria, id est, suppositilia longua ad quantitatem digiti parui, & debent optime ligari ut possint extrahi ad libitum, melior autem modus est, ut massa ex his medicinis cum libumine oui confecta optime permisceatur cum lithino, scilicet accipiendo tantum delino & maslinum quantum sufficit pro uno lithinio, & bene adinuicem misceantur, & exiccari permittantur & supponantur apud magnā necessitatem, ita ut totū collyrium anum

anum ingrediatur, & cum dolor inceperit sedari, & formus induci illico extrahatur, est enim dubium si remaneret ne agrum interimeret.

Recurrere tamen pro administrandis opiatis ad ea quæ dixi in tractatu de fluxibus. Rasis enim hic procedit ordine retrogrado in cura tenesmi, nam incipit ab opiatis, cum tamen debeant postponi. Item pro cura tenesmi debemus primo facere clyster mundificatiuum, deinde constrictiuum, tandem his non sufficientibus administrantur opiata incipiendo iuxta canonem Auicennæ, ab his quæ exterius applicantur. Quibus non sufficientibus ueniendum est ad suppositoria, dimittendo tamen ea paucum tempore. Terio ad clystera suppositorijs non sufficientibus. Quarto ad exhibitionem per os eorum quæ opiata sunt. Non tamen hæc administranda sunt nisi uirtute existente forti, nec quotidie sed per interualla.

TRACTATUS PRIMVS DE
fluxu uentris in generali
li duo continens
capitula.

DE QUIDDITATE SPECIE
bus, causis, signis, & prognosticis
fluxus in generali.
Caput I.

Fluxus uentris est motus ad expellendum rem materialem a corpore per uiam intestinorum & anifactus a uirtute, aut aliqua causarum præternaturalium. In hac diffinitione motus cadit loco generis. Et tangitur per ipsum causam formalem fluxus. Per ly ad expellendum tangitur finis, est scilicet fluxus finis materia a corpore expulsi obiectum a corpore expellendum scilicet ad differentiam uaporis uentositatis, & spiritus, quæ non dicuntur res materiales apud medicos. Per ly a corpore finis, in qua reliquæ particulae diffinitionis manifestantur aut ab aliqua causarum præternaturalium, sicut a cōpressionē facta super uentrem, aut a grauitate materie uirtute iam defecta, sicut accidit in timentibus, & nullo modo uirtus expulsiua concurrat, sed est defecta causa fluxus, quæ tamen non est per se, & ad eam facta positiui, sed per se concurrat grauitas materiae, & alia huiusmodi, defectus autē cōtentue per accidens. Species & differentie fluxus sumi possunt secundum unamquamque causam in diffinitione positam ut a causa formali, quia motus ille est suauis uirtuti & repletioni proportionatus, aut insuauis, illis non proportionatus. Similiter a causa finali, quia fluuanti & dicitur illa laudabilis, aut reuerti obiectiua, quæ fluxu expellitur sumuntur hæc differentie. Quod enim expellitur. Aut est quid extrinsecum in corporeum sicut cibi, potus, & medicinae, & sub lubricitate, & lienteria continetur.

Aut est quid intrinsecum corporeum. Et hoc est duplex, aut est immediate ex cibo genitum secundum plurimum eius. Et hoc est duplex, scilicet chylus, & dicitur fluxus chilosus, aut est fex, siue stercores, & dicitur feculentus, seu multi stercores, aut non est immediate ex cibo genitum. Et est duplex, scilicet continens & contentum. Continens sicut membrum, pars in embri, frustum eius, aut pellicula &c. Contentum uero quod fluxu expellitur. Aut est ex naturalibus humoribus, puta sanguine, phlegmate, cholera, et melancholia, & ab humore proprio generaliter nuncupatur, quia sanguineus, phlegmaticus, cholericus, & melancholicus, & specialiter a specie uniuscuiusque, sicut phlegmaticus salus, cholericus uitellinus, & sic de singulis: aut est ex non naturalibus sicut fluxus a prædictis humoribus corruptis perductus, quia fetidus, prasinus, eruginosus, saniosus, uirulentus, lotiuus, sicut lotura carnis, aquosus, feculentus, niger, sicut sang. aut uini fex, felleus niger, et niger melancholicus, et per aduersionem phlegmatis genitus et fluxus diuersorum colorum, & quod est simile carni epatis. Et hi secundum plurimum sunt species epatici. Et quandoque est ex uermibus quotidie aut frequenter expulsis, sicut in infantibus qui lacte nutriuntur, et quandoque est ex lapidibus, quem tamen nunquam uidi, cum tamen semel uiderim apostema ex lapidibus duris, & satis crassis in inguine, & lapides e pulmone excreatos.

Differentie aut fluxus sumptæ a causa materiali in qua sunt huiusmodi. Aut enim fluxus est a toto. Aut a membris particularibus. Si a toto sic est quintuplex, scilicet diaria, fluxus sanguineus, fluxus diuersorum colorum, fluxus liquefactiuus, & cholericus passio. Si aut sit a parte, aut est a cerebro, & dicitur cerebralis, aut a stomacho & dicitur lientericus siue stomaticus, aut ab intestinis in quibus materia paulatim cōgregata est. Et est quadruplex, scilicet lubricitas intestinorum, diarrhoea, fluxus sanguineus, & dysenteria. Et hæc dysenteria est triplex, aut ab intestinis superioribus gracilibus, scilicet duodeno & ieuno, aut a medijs, scilicet ileon & facculo aut a duobus inferioribus, scilicet colon & recto, nonnunquam ab extremitate intestini recti, & dicitur tenesmus. Dysenteria tamen secundum plurimum est a materia ab alijs membris ad intestina defluxa.

Fluxus uero ab epate & kisti fellis & meseraicis dicitur epaticus. Materia etiam non fluente ab his dicitur epaticus, quando scilicet esset propter ipsorum nocumentum, sicut est fluxus chilosus.

Fluxus autem a splene dicitur splenicus secundum plurimum existens melancholicus siue materia ab ipso splene defluat, siue non, modo sit factus impotens scilicet ad debite trahendum melancholiam aut propter oppilationem, aut debilitatem attractiue.

Ex quo inferitur non esse inconueniens eundem fluxum simul epaticum & splenicum nuncupari posse ob rationes diuersas. Descriptiue enim epaticus est qui sit uicio epatis, sicut splenicus qui sit uicio splenis, nunc autem contingit utriusque uicio eundem fluxum fieri.

Sed a causa efficiente sumuntur differentie fluxus, quia aut sit a uirtute ex se principaliter operante, quia primo digerit, secundo diuidit, tertio nocium ex-

pellit, & dicitur fluxus criticus. Aut fit a uirtute stimulatā non ordinate hos actus perficiente, & dicitur symptomaticus, siue ruinosus, in quo nociuum & iuuatiuum simul expellit. Symptoma enim græce est periculum, & ruina latine, inter quos interest multum. Nā in primo sicut debet esse ordine naturali, expulsiua prius incipit quam retentiua cedat, & paulatim sicut expulsiua expellit, ita retentiua cedit. Econtra in symptomatico prius cedit retentiua quam expulsiua expellat, & aliquando hæ duæ uirtutes quæ sibi debent esse naturaliter subordinate inter se aduersantur, cum aliquando conante expulsiua expellere conetur retentiua retinere, quæ contrarietas non est in fluxu critico.

Fluxus autem ab oppilatione contingens qui oppilatiuus nuncupatur secundum plurimum est symptomaticus. Fluxus autem facti ab alijs causis præter naturam efficientibus non concurrente uirtute sunt ex toto genere illaudabiles, & si fiant a causis efficientibus, non naturalibus, sicut a cibis & medicinis, aëre & similibus quādoque sunt laudabiles quandoque illaudabiles, sed cum tot sint differentiæ, scilicet fluxus sumptus ab his causis in diffinitione positus hic.

In primis prosequar differentiās fluxus quæ sumuntur a causa materiali in qua. Deinde illas quæ sumuntur a causa materiali obiectiua. Tertio quæ sumuntur a causa efficiente. Quarto quæ sumuntur a causa formali. Quinto prosequar differentiās fluxus sumptas a causa finali &c.

Sed præter causas fluxus generales a quibus sumuntur species, & differentiæ fluxus sunt aliæ causæ minus generales, scilicet fortitudo membri, uel membrorum mittentium, debilitas intestinorum recipientium, latitudo uiarum, præsertim materiæ aptæ ad fluxum sua multitudine modo substantiæ mediocri et sua qualitate uirtutem simulante. Sicut econtra causa diminutionis aut priuationis fluxus sunt, debilitas membrorum mittentium, fortitudo recipientium, strictura meseraica, & aliorum ductuum, materiæ inobedientia, quia pauca aut nimis crassa, aut uiscosa aut subtilis imbibita, carens acuitate & mordicatione.

Causæ autem magis particulares secundum plurimum concurrentes sunt debilitas attractiua, debilitas retentiua, debilitas & corruptio digestiua, debilitas expulsiua, & quandoque ipsius acuitas & fortitudo, hæ autem sequuntur malitiam complexionis sine materia, & cum materia cuiuscunque generis, licet sit rarius sicca in causa, uerum attractiua amplius debilitatur frigido, & retentiua humi, et digestiua debilitatur frigido, licet a caliditate superflua corrumpatur. Expulsiua uero debilitatur sicco, & a suo contrario fortificatur, licet omnis immoderata discretia deiciat actum cuiuscunque uirtutis, secundo technici. Debilitatur quoque propter malam compositionem & proprie oppilationem, aut ægritudinem in superficie, similiter propter solutā continuitatem, & apostemata. Causæ autem corporeæ magis remotæ sunt quæ cunctæ possunt huiusmodi ægritudines simplices aut compositas causare.

Causæ autem primitiue sunt res non naturales inconuenienter applicitæ, sicut aër propter malam dispositionem eius manifestam uel occultam, et corruptionem suæ substantiæ. Et similiter cibi & potus mali

chymi multarum superfluitatum, malæ proprietatis malæ præparati, & inconuenienter sumpti, & sic de cæteris rebus non naturalibus, et sibi annexis. Et quādoque res extraneæ sunt in causa, sicut morsus serpentum, casus, percussiones, & similia &c.

Signa fluxus generalia demonstratiua & rememorative satis manifesta sunt, sed pronostica futuri fluxus sunt huiusmodi.

Primum, signa arguentia cacochymiam, & materiæ multitudinem, & proprie cum non est sanguinea.

Secundum plurimus euentus fluxuum tempore illo quod contingit, scilicet ex aëris dispositione manifesta uel occulta, aut ex ciborum malitia.

Tertium retentio aliarum euacuationum consuetarum, scilicet uomitus, sudoris, fluxus sanguinis narium, hæmorrhoidalis aut menstrualis, urinæ & cæterorum.

Quartum, rugitus & dolor circa uentrem, & proprie descendens.

Quintum, maior tinctura & humorositas egestionum consuetarum.

Sextum, tumor siue augmentum magis consuetum circa hypochondria.

Septimum, quando urina post egestionem perleuerat subtilis & alba, tunc expectatur fluxus uentris qui forte erit cum rasura intestinorum, & proprie cui non sentitur euentus nocuenti in altero membro, neque alia manifesta euacuatio. Particularia uero signa dicuntur in particularibus capitulis.

Pronostica. Omnis fluxus perducens ad excessum pulsiu, aut manifestam eius debilitatem, sicut est uermicularis aut formicans, aut ad frigiditatem extremorum perseverantem mortalis, & moritur eger post pulsiu destructionem cum frigiditate extremorum.

Secundum, omnis fluxus sequens aliquam ægritudinem cum quo illa ægritudo non minuitur cum mala ægri tolerantia, mortalis, significat enim humorum plurimum corruptionem.

Tertium in hydropisi fluxus omnis secundum plurimum malus, sanguinolentus, pessimus & mortalis.

Quartum post fluxum fortem singularem superueniens, mortale secundum plurimum.

Quintum si retentio superfluitatum molesta, et eius expulsio non alleuiat, & fluxus diu durauerit, mortale.

Sextum fluxus prolixus in senibus mortalis.

Septimum fluxus uentris cum nausea, & uultu ualde malus.

Octauum si in fluxibus apparent pustule, & subito delitefcunt, malum, earum uero egressio & multiplicatio bona.

Nonum in uentris fluxibus mutationes egestionum suauant, si non ad malum se transmutauerint, unde si fluxus fuerit niger ex adustione, postea fiat uiridis, deinde citrinus sit in melius transmutatio.

Decimum fluxus sequens apostemata intrinseca secundum plurimum mortalis.

Vndecimum alcheta, id est, trauis accidit diarria plurima propter humiditatem dominantem super membra ipsorum neruosa, id est, super stomachos eorum cum communitate suorum cerebriorum.

Quoddecimum

Duodecimum secundum plurimum ille qui est le-
nis aut dure naturæ in pueritia, est apud senectutem
contrario modo se habens.

Decimum tertium omnis fluxus ventris accidens
post ægritudinem uehementem est significatio mor-
tis, quia significat corruptionem subitam, & propriè
in senibus.

Decimum quartum cum cibatur habens uentrem
liquidum, & non additur uirtus eius, tunc cures eum.

Decimum quintum qui egerit species diuersas cum
multa corruptione non est constringendus nisi uirtus
cadat, perducit enim ad ægritudines difficiles & fra-
dulentas si constringatur.

Decimum sextum si alicui fluxus ventris constring-
atur, & non fortificatur significat quod corpus non
recipit cibum.

Decimum septimum si quis plus assellat in die quā
in nocte, & quando cunque sumpserit cibum tunc cau-
sa eius est debilis stomachi, si autem plus in nocte quā
in die causa est debilis epatis.

Decimum octauum multo rariis succedit fluxui pro-
pterea quod expellitur subtile, & remanet crassum co-
lica uehemens.

Decimum nonum est Auic. cum retentio conturbat,
& solutio facit acquirere tranquillitatem, mortale se-
cundum plurimum. Quod dictum intelligitur de re-
tentione rationabiliter facta, & de solutione faciente
tranquillitatem respectu nocimenti secuti ex reten-
tione, non autem respectu dispositionis principalis,
sicut accidit in phthisicis aut alio modo consumptis,
& ualde debilibus, quorum uirtutes naturales proprijs
grauantur humoribus, est enim mortale, cum sit ne-
cessarium aut solutionem, scilicet more, aut retineri,
quorum utrumque ducit ad mortem, & ex hac glo-
sa apparet solutio omnium instantiarum quæ contra
hunc textum. A. fieri consueuerunt.

DE REGIMINE VNIVERSALI PRÆ-
seruatio & curatio. Cap. II.

Regimen fluxus est duplex, preseruatiuum
& curatiuum. Depreseruatiuum sit prius ser-
mo quod tribus completur intentionibus.

Prima euacuat humores superfluos. Secun-
da discrasiam membrorum alterat, quæ sunt causa
fluxus ipsa confortando, oppilationes & cetera ipso
rum nocimenta remouendo. Tertia ordinat debitum
regimen sex rerum non naturalium.

Pro prima intentione si humor superfluus fue-
rit sanguineus aut alij humores mixti cum sanguine,
dominante sanguine aut ipsis equatis ad bonum in-
tellectum, scilicet secundum debitam proportionem
geometricam fiat phlebotomia, aut alijs modis san-
guis minuat, deinde alij humores sanguini do-
minarentur prius educantur, postea sanguinis minu-
tio fiat, & si soli sine sanguine peccauerint soli educan-
tur, & similiter si solus sanguis peccet sine alijs, quod
rarissime accidit in fluxibus solus euacuetur. Phle-
botomia uero fiat à uenis euacuantibus à membris
trice fuerit retentio mensurorum aut fluxus hamor-
rhoidarum in causa phlebotometur saphene, & si

in causa fuerit epar phlebotometur basilica dextra, et
si splen basilica sinistra, & si totum uena communis,
& si caput cephalica aut fiant uentrosationes aut san-
guisuge apponantur secundum horum membrorum
exigentiam & sanguinis quantitas educatur secundum
exigentiam repletionis, & tolerantiam uirtutis. Si-
militer alij humores euacuentur cum proprijs respi-
cientibus humores peccantes & membra in quibus
peccant quæ medicinæ sint benedictæ non exoluen-
tes, neque membra debilitantes sicut aloës lotus, aga-
ricus, & propriè preparatus, reubarbarum, mirabo-
lena, epithymum, cassia, manna, & similia. Cauendum
est à scammonia colocynthidæ, turbit, elleboro, cu-
cumere alioquin, euphorbio, & similibus corpus infla-
mantibus & membra debilitantibus. Et ex compositis
sunt pilule alephag, de hiera simplicij, communes,
de reub. stomaticæ & similes. Item, diacatolicon elec-
tocol. diaprunis compositum non solutiuum, & similia.

Cauendum est etiam ab aggregatiuis aureis & simi-
libus, item ab electuario de succo rosarum diaphoeni
cone electuario indo, diaprunis solutiuis & similibus.
Nisi forte ex his exoluentibus aliquid modicum cum
medicinis benedictis supra scriptis misceretur in cor-
pore forti, cuius uenter non esset obediens, & hæc inten-
tiones maxime in corpore repleto sint integre ex-
minatio digestiuo & eradicatio etiam iteratis se-
cundum opportunitatem &c. Secunda intentio, sci-
licet discrasie membrorum alteratio perficitur cum
contrarijs membra ipsa proprietate & moderata sti-
pitate confortantibus. Maxime autem confortan-
dus est stomachus & epar cum sint potissima causa ge-
nerationis humorum. Quapropter eligantur propria
frigida, sicut aqua endi, & syrui, eius, aqua colscute, ci-
coreæ, & similia &c. Et calida propria sunt sicut aqua
absynthij, eupatorij, & syrui ex ipsis. Item diarodon
abbatis, triandali, aromaticum ro. & similia. Et ex
proprijs confortantibus stomachum & epar sunt pel-
liculæ intrinsecæ stomachorum gallinarum lote cum
uino & exiccate. Epar adip. id est lupi caro limaciaria.
Item, epar gallinarum anserum, & anatum, passulæ,
fistula, & auellana torrefactæ. Et si fuerint oppilatio-
nes syr. ace. compositus, de eupatorio & similes. Et si
splen fuerit in causa propria sunt tamariscus, scolopē-
dria, cortices, radicum capparorum, sem. agni casti,
sem. portu. acetum, & similia. Cauendum tamen est
à superfluo usu aceti & propriè acuti, tam in cibis quā
in medicinis &c. Tertia autem intentio, scilicet debi-
tum regimen sex rerum non naturalium est ut aer sit
temperatus, aut aliquoties contrarius discrasie mem-
brorum corrigendæ. Cauendum autem est à uen-
tis & aëre lacunali aut excedente secundum aliquam
qualitatem, aut aliter infecto & putrefacto. Sit par-
cus in cibo & potu, & fiant naturæ digestionem & ui-
num suum sit pauciferum, aut mediocris uinositatis
moderata stipitate participans, & lymphetur secū-
dum exigentiam temporum complexionum & con-
suetudinum cum aqua bene conditionata, & simili-
ter cetera cibaria sint etiam boni chymi, facili digesti-
onis, paucarum superfluitatum bene preparata non
ualde fluentia neque nimis spissa. Cauendum est à di-
uersitate ciborum in mensa una, surgat etiam à men-
sa cum reliquijs famis, neque comedat nisi fame præ-
cedente. Somnus eius sit mediocris & sit maxime

matum aqua uiol. & florum nenufaris, multotiens tamē propter uomitus timorem cogimur dare in forma pillularum, & in hoc casu in materia melancholica accipiuntur, 3. s. scene, & 3. s. mirabo. indorū cum duobus gra. zing. & in cholericā à 3. 1. reubar. usq; ad z. & conficiuntur pilulæ cum aqua plantag. aut sero caprino aut aliqua ex aquis suprapositis. Si autem humor fuerit phlegmaticus tunc sumatur, 3. s. uel quantum suffi. pilulæ alephanginarum aut tantundem pilulæ stomachicarum descript. Me. quæ incipit. Pillule stomachicæ stomachum & digestionem confortant, & si mallet medicinam liquidam, 3. 3. carthami crasso modo contusi cum. 3. s. galagē infundantur in. 3. 2. mellis ro. per sex horas, postea colentur & ipsi melli rosicolaro & expresso addantur. 3. 2. mirab. Kibulorum subtiliter puluerizatorum, & cum suffic. quantitate aque absinthij sumatur in potu, & si phlegma sit salum distemperetur cum aqua casei, & loco carthami possunt accipi. 3. 2. polypodij & infundi sicut dictum est de carthamo. Si autē humores fluentes fuerint mixti sicut phlegma & cholera secundum quod est frequenter exhibetur reubarb. à 3. 1. ad z. cū suff. quanti. aquæ casei aut aquæ endi. & uno cocleario uini, & dulcoretur cum iulep. ros. aut similibus tuo proposito deseruiantibus. Et si cū his mixtis fuerit humor melancholicus bulliat in aqua casei aliquid secne aut epithymi aut mirab. indorum & cum ea ab eis dem colata distemperetur reubarbarum aut ex reubarbaro conficiatur pilu. sicut dictum fuit superius addēdo aliquid scene epithymi aut mirab. indorum. Myrabolani enim in omnibus seruiunt casibus. Cū trini ad cholera euacuandam, Kibuli ad phlegma. Indi ad melancholiam, & possunt exhiberi in infusione ubi parua sit intentio ad constringendum, ubi autem maior non dentur in substantia torrefacti, sed ubi adhuc maior exhibeantur torrefacti, sicut cum fluxus multum præcesserit, idem iudicio de reubarbaro & ceteris medicinis, parum enim constringendum est in prin. in medio mediocriter, in fine maxime.

Moderni tamen quidam in omni fluxu & in omni tempore indifferenter utuntur reubarbaro torrefacto. Etenim uariandum in solutiuis secundum diuersitatem excoriationis uel alterius nocimenti ex parte loci: nam si excoriatio sit in superioribus, scilicet ieiuno & duodeno magis cum timore soluendum est, & in hoc casu multum properandum sit cum aegritudo non det inducias quantas dat cū excoriatio sit in alijs intestinis. Si uero in medijs, in ileo & sacculo iudicium est medium. Si in infimis, scilicet colo & recto, audacius est soluendum. Est etiam secundum hanc uarietatem diuersificanda medicinarum cuiuscunque generis approximatio, quia si excoriatio sit in duobus superioribus, medicinæ dentur per os, quia iuxta Gastris neque ad ileon perueniunt, quia clysteria parum etiam cū imponuntur. Si uero in duobus inferioribus maxime conferunt clysteria, parum uero medicinæ bibitæ, in duobus medijs iudicium est medium, utique enim mediocriter conferunt. Secūda intentio, scilicet regimen membri mittentis expedienda quæ citius fieri potest. Tria exigūt regimina, Primum est

materiam si qua sit in ipso euacuare. Secundum dyscrasiam eius corrigere. Tertium ipsum confortare ut fiat minera laudabilis humoris. Euacuatio autē per phlebotomiam qualiter debeat fieri dictum est in prima intentione, euacuationes etiam relique ibidem dictæ quantum possibile est respiciant membrum mittens. Dyscrasia etiam membri mittentis contrarijs corrigatur interius & exterius applicitis quæ moderata simplicitate participant, & singularem habeant ad ipsum proprietatem ut uirtutes ipsius confortentur.

Tertia intentio scilicet intestinorum mundificatio, confortatio & doloris sedatio, quæ die immediate sequente exequenda, aut quā citius fieri possit completa prima intentione perficitur. Si excoriatio aut dolor aut aliud nocumentum sit in intestinis superioribus & ab humore calido cum aqua hord. calida in potu sumpta. Cuius q̄ritas sit circa. 3. 5. & si uolueris magis confortare mis. 3. 3. aquæ hordei cum. 3. 2. iulep. ro. uel cum 3. s. zucchari ro. & si humor fuerit frigidus misceatur tantūdem aquæ hord. aut aquæ zuccharate cum 3. 2. mellis ros. & calida stomacho ieiuno sumatur in potu, & ad hanc intentionem est aqua lactis sumpta in potu propriè cum humores fuerint adusti aut baurachij. Si uero nocumentū fuerit magis in intestinis inferioribus fiat hoc clystere communē in causa calida g. aquæ hord. factæ secundum artem 3. 16. uel. 17. olei ros. 3. 3. uitelli oui nume. 1. adipis renum capræ uel hircine. unc. 1. fiat clystere, & stomacho ieiuno tepidum imponatur. Debent enim clysteria in hoc casu esse minus actū calida quā in alijs casibus, aliter non possunt retineri. In causa uero frigida loco aque hor. ponatur aqua mellis, aut supra scriptis addatur mel. ro. unc. 2. & oleū camomellinū est in hoc casu conueniens. Clystere quoque ex aqua decoct. surfuris, aut ex brodio renum capre uel castrati aut ex amobus simul mixtis cum reliquis in altero clysteri positus est in hoc præstans. Et si materia esset nimis calida naturaliter aut per adustionem, sicut est cholera zinaria aut prallina aut melancholia genita per adustionē cholæræ, suc. portul. aut cucurbite aut mucilago phillij supra scripto clysteri facto ex aqua, scilicet hordei & c. addatur in quantitate. unc. 2. aut quantum uidebitur. Si uero nocumentum sit in intestinis medijs, tunc & potata & clysterizata conueniunt diuersificanda secundum materiæ diuersitatem. Quarta uero intentio, scilicet materiæ diuersio immediate post tres primos dies expedienda uel immediate post tres primas intētiōnes expedienda, aut etiā simul cum ipsis si fieri potest perficitur cum phlebotomijs dictis in prima intentione si fuerint in casu expedientes. Itē, uomitu si ad ipsum naturā inclinatur ponendo digitum aut pennam oleo intinctā in ore. Vomitiua tamen fortia quæ possent nocere in fluxu uitanda sunt. Lenia autem sicut aqua hord. tepida & similia concedi possunt. Similiter prouocari potest urina cum lacte se. cōmuniū in causa calida aut decoct. radicū asparagi & similibus in causa frigida, & citonia sunt ad hoc singularia, prouocant enim urinam & confortant & stringunt fluxum, prouocatio etiam sudoris cunctas in hoc diuersiones excedit penes Hip. inquit enim quod uomitus sedat fluxum & fluxus uomitus, & uomitus uomitus, & fluxus fluxum, sed sudor uirumq;. Prouocatur autem sudor & simul

ete, & torrefacti, se. porri torrefacti. ana. 3. i. s. embli-
corum infusorum in aceto & torrefactorum. 3. z. s.
granorum nasturtij torrefactorum drach. 6. granorū
passularum drach. 5. granorum myrti tritorum subti-
lissime drach. 16. balaustie, concularum adustarum,
thuris, fructus tamarisci. ana. drach. 2. s. ameos, drac.
3. tere omnia sicut alcohol, & infundatur in uino odo-
rifero, deinde fricentur & fundantur iterum in aqua
antiqua granorum myrti. exiceatur & iterum teran-
tur & inuoluantur in miua, dosis eius est. drach. 3. cū
syro cydoniorum aut myrtinorū. Ex trociscis
sunt trocisci de spodio cū semine acetose, trocisci de
Karabe, & de terra sigil. opiatī & non opiatī, conse-
ctio trociscorum descriptione Mes. spodij drach.
7. rosarum se. earum, acatie, balaustie, sang. drac. añ.
drach. 1. s. barbe hircine, carnis sumache, planta. se.
portula. assati. ana. drach. 1. & sexta, gummi assati. 3.
1. fiant trocisci drach. s. da cum aqua sauiū, id est, fa-
cta ex hordeo torrefacto. Trocisci descriptione M.
quando fluxus est chronicus, & ualet in causa frigida
& mixta. 12. balaustiarum, corticum glandium infu-
sorum in aceto & torrefactorum capitum granato-
rum: fructus tamarisci, macis, xyloaloes, gallie aro-
matice mastiches, spice. ana. drach. 1. se. acetose, gummi,
boliar. granorum passularum torrefactorum. ana. 3.
s. granorum coriandri infusorum in aceto & assato-
rum. drach. 2. fac trociscos. drach. 1. cum uino ponti-
co, & sit dosis trociscus unus, puta drach. 1. cum syro
cydoniorum, uel aliquo rob stipico. Et trocisci
Raf. de spodio. 9. Alī. & trocisci Mes. de spodio cū
semine acetose sunt proprii in fluxu cholerico cum se-
bre acuta dati cum aqua sauiū, aut aliquo succo fri-
gido, & succo cydoniorum, forbarum, & similium.
Et cum fuerit dysenteria, detur iste puluis Raf. ma-
nis, se. plantagi. drach. 10. gummi ara. boliar. ana. 3.
3. pilulum affetur, & gummi, & bolus puluerizetur &
detur drach. 3. mane & sero, & cū succo cydoniorū
& si hec non sufficiant dentur opiatī, sicut trocisci de
balaustijs Raf. & trocisci confectiui Nicolai. Exte-
riora applicata sunt unctiones, pulueres, emplastra, ce-
rata, encatisma, siue semicupia. Vñtiones sunt.
12. olei cydoniorum unc. 1. se. ros. drach. 2. mastiche,
gallie musc. ana. 3. i. acetī modicum, cere quantū suffi-
& fiat unctio, & si opus est amplius ipsam fortificare
addatur drach. 1. uel quantum uis unius ex trociscis.
Item, dicit Mes. quod in fluxu proueniente à catar-
rho si ungatur uenter ex oleo ros. calido quantum pa-
ri possit, & de super spargatur puluis ex mastiche ros.
& gallia inuenitur mirabile, mihi tamen uidetur præ-
stantius, semen ros. quā ros. & hæ unctiones fiant
toti uentri stomacho ieiuno. Vnguentum conue-
niens. 12. rosarum, se. earum, pulpe, sumach, sandali al-
bi & rub. spodij, sanguinis drac. karabe, balaustie, gal-
larum, acatie, hypocistidos, gallie musc. corticum
phore. drach. 1. & tertium unius, tere & fac puluerem
& accipe succi extremitatū uitis. unc. 2. succi acresti.
drach. 1. succi extremitatū myrti, acerī. ana. drach. 1.
infunde in eis die ac nocte sauiū. hord. drach. 3. gummi
drac. 5. granorum myrti tritorum, sicut alcohol. 3. 3.
& misce cum eis miue acetose. unc. 3. decoque igne le-
uīdonec habeat spissitudinem uiscosam, deinde ag-

grega simul cum speciebus in mortario & contunde
donec permisceantur: & line ex eo super petia, & suf-
fumigetur cum xyloaloes & applicetur toti uentri,
& conuenit in causa ualde calida. Facilius tamē pos-
set fieri emplastrum non minus efficax præcedenti. 12.
cydonium unum aut plura, & incisum in frusta, &
mundatū à medulio interiori coque in aceto, deinde
contunde & secum misce puluerem ex uno troci-
scorum superius descriptorum addendo parum ma-
sticis, & gallie musc. & si uis suffumiga cum xyloaloes,
& uentri applica. Et ad hanc intentionem est empla-
strum diaphenicon descriptione Mes. secunda, nam
prima magis confert in causa frigida. Et in causa fri-
gida possunt fieri unctiones cum oleo de mastiche &
ipicha addendo mastichen, gariofil. galliam musca-
tam, & similia. Itē, potest fieri emplastrū decoquēdo
cydoniū in uino nigro & secū permiscendo panē assa-
tū in succo miue infusum, deinde permiscendo pulue-
res calidos suprascriptos. Et potest fieri ceratum, 12.
laudani, picis, rasine. ana. unc. s. masticis, unc. 1. gario-
fil. gallie musc. nu. cum cypressi, xyloaloes, thuris. ana.
drach. 1. olei mastichini. q. s. cere & acetī modicum.

Ex quibus etiam debeant fieri pulueres superasper-
gendi unctionibus, satis est ex dictis manifestū. Cly-
steria autem constringentia fiant ex decoctione alicu-
ius, aut plurium rerum supra scriptarum, sicut sunt
myrtus, rose, copule, gladium, milium, siue panicum
& hordeum torrefactum, gallæ, & similia, de qua de-
coctione accipiatur lib. 1. olei ros. unc. 3. uirelli oui in
aceto assati numero. 1. adipis renū, capre. unc. 1. uel. s.
succū plantaginis uel portu. unc. 3. sang. drac. boliar.
& alicuius ex trociscis supra scriptis, sicut de Karabe,
de terra sigil. maxime ubi sanguis fuerit añ. drach. 1. &
misce, & materia existente frigida ponantur nuges cy-
pressi & rizum in decoctione, & unc. 3. uini nigri sti-
ptici satis uiuosi, & oleum camomil. & puluis thuris,
mastiches, & litij. Et apud magnam necessitatem po-
nantur trocisci opiatī, ita tamen ut à parua quantita-
te opiatorum incipias, & ageas secundū necessitatē.

Est enim canon in administratione opiatorū, si suf-
ficiat applicatio eorum exterius non supponantur.
Et si non sufficiat applicatio eorum ad extra, fiat ly-
chinium quod ad libitū possit remoueri. Et si adhuc
hoc non sufficiat clysterizentur, quod si adhuc nō suf-
ficient, sumantur in potu. Secundus canon est, ut sit
usus eorū stomacho ieiuno. Tertius canō est, quod
inchoetur à parua quantitate, ita ut opium non tran-
scendat gran. 2. Quartus canon est, quod interpol-
latis diebus eis utendum est. Quintus postponēdus
est usus eorum quantum est possibile, & non nisi cum
alia remedia non sufficerēt. Sextus quod uirtus ad-
huc sit constans potens tolerare, unde iuxta hos cano-
nes possumus ponere apud magnum dolorem & in-
quietudinem & fluxum uehementem parum ex tro-
ciscis opiatīs in unctionibus uel emplastris, & si illud
non sufficit supponatur lychnium descriptione Al-
man. 12. thuris, litij, croci, gummi ara. ana. drach. 1. opij
3. 2. formentur colliria diuersarum quantitatū, sed
communiter sint ualde parua & aliquantulum longa &
subtilia, & bene ligata ut possint extrahi, unde cum si-
lis lini optime permisceantur ad minima, quæ fila po-
stea desināt in chordam uel ex eis fiat chorda quæ per-
deat extra anum cum lychnium est impolitum, &
prima

prima uice non reretineatur ultra horam siue somnū induxerit, siue non, deinde si bene seruat aeger poterit longiori tempore retineri. His autem aliquādo utimur cum nō possunt clysteria retineri, lychnio enim prius imposito per aliquod tempus stupefit locus, & postea clystere impositū facilius retinetur. Sunt quidam dicentes hanc lychnia esse nimis opiata: propterea opium diminuunt. Ego uero credo hanc esse conuenientia, nam quando nō cito inducitur stupor per opium non possunt retineri. Stimulant enim uirtutē expulsiuam, ita ut aeger cogatur expellere, est autem in potestate tua postquā actiuata sunt extrahere quando uis. Si autem his non sufficientibus opus sit clysteribus opiatis, suprascriptis clysteribus potest addi drach. i. trochiscorum de Karabe oppiatorum, aut tantundem philonij persici, & sic de alijs opiatis, si uero his non sufficientibus opus sit dari in potu opiata incipiendum est à duobus. 3. aut drach. s. philonij persici, aut à drach. s. trochiscorū de karabe, & gradatim dosis augeatur apud necessitatem.

Descriptio philonij persici est apud Mes. in fine capi tuli de spūto sanguinis, & est hæc. Confectio philonij persici uehemētis uirtutis ad emanationes sanguinis undecunq; & creatū eius cum tussi & superfluita tem mēstruorū dolorosam & hēmorrhoidarum & egestionem sanguinea & ad mulieres prægnantes quibus abruptuntur mēstrua, cōseruat enim fœtus in matricibus earum. 3. sc. papaueris albi, hyoscyami, ana. drach. 20. terre sigilla. oppij. ana. drach. 10. sedene gi. id est, lapidis emathitis, croci, ana. drach. 5. castorei, piretri euphorbij, spicæ, margaritarum non perforatarum, Karabæ, zedoariæ, doronigi, ramichi, galliæ mus. ana. drach. i. camphore drach. unius tertiam confice cum mellerosaceo quantum suffi. & dosis eius est à drach. s. usque ad. i. cum succo arnoglossæ, aut aqua ro. & modico uini puri, existente tamen excoriatione in stomacho, aut in intestinis, aut materia existente ualde calida remoueat peritrum & euphorbium ab hoc philonio. Et breuiter diuersificanda sunt clysteria, lychnia, unctiōes, emplastra, unguenta, & omnia genera medicaminū secundum materiæ diuersitatem complexionum temporum anni, & similitū.

Suffumigia fiant in causa calida ex decoctione rosarum, myrtillorum, foliorum mēpillorum, forbarū, pirorum, cydoniorum, balaustrarum, & huiusmodi in aqua calibata: & quidam utitur melica solum in aqua decocta, & posset in decoctione addi parum uini stiptici, sed suffumigia sicca fiant ex thure, tragacantho, Karabæ, spodio, & huiusmodi, positis super prunis quæ sint frigida & stiptica & uiscosa, & boni odoris. Sed in causa frigida, & thure, & pice, & laudano, nucibus cypressi, styrace sicca, & similibus, aut calida stiptica, in uino decoquantur si malueris suffumigiū humidum, quæ in ipso surgente ad sellam supponantur, sellio etiam in decoctionibus stipticis calidis actu frigidis, aut calidis in potentia secundum exigentiam confert, & liquor perueniat usque ad umbilicum, & instrumenta apta sunt semicupia & huiusmodi. Panus quoque lini aut lane bene infusus in uino aut aqua decoctionis rerum stipticarum, & expressus ano applicitus & compressus super ipsum iuuat ad retentionem. Et balneatio totius personæ in balneis stipticis non laudatur, imò uituperatur apud Mes. & ceteros,

prohibet enim sudorem & pellit materiam de circunferentijs ad cœtrum. Similiter nec lorio crurium nec brachiorum confert cum huiusmodi stipticis ob eandem causam, imò potius lotione huiusmodi quæ dilatant & trahunt materias ad circunferentiam & ad extrema &c. Sexta intentio, scilicet accidentiū correctio secundum ipsorum exigentiam perficitur, dolor sedetur ponendo in clysteribus pinguedinem recentem castrati aut capre & oleum rosaceum. Et si dolor fuerit pungitius ponatur spodium, & lac clysterizati est ad hoc cōueniens, & exterius applicetur zircibus castrati, aut agni calefactus in sartagine cum oleo rosaceo, & apud magnam necessitatem sedat in semicupio in quo sit aqua debite calida decoctiois aliquorum stipticorum calidorum aut frigidorum secundum causæ exigentiam, in quo tamen nō diu moretur, est enim melior reiteratio quàm longa in eo statio, & in excoriatione superficiali à materia acuta cerula lota clysterizata cum oleo ro. conuenit, & si fuerit dolor in superioribus intestinis bibat aquam hordij, syrupum de papauere & similia, sed apud maximam necessitatem ubicunque sit dolor dentur stupefacientia exterius applicita, supposita, clysterizata, aut bibita secundum quod tuo proposito cōuenit. Gerardus Veronenfis dicit se experiri fuisse si dolor sit in superioribus intestinis aquā rosaceam decoctionis senilium papaueris, & florum tassi barballi in potu exhibitam, & sit tepida uel calida. Secundum accidens est casus uirtutis cui subueniendum est dando uicellū oui & parum uini dulcis odoriferi lymphati secundum exigentiam cum aqua calibata aut permixti cū aqua distillationis aut expressionis, aut decoctionis carniū, aut aqua ipsa primo exhibeatur, postea parum uini.

Sed attende quod aqua distillationis, aut expressio nis, aut decoctionis carniū debet esse alterata cum constringentibus calidis, aut frigidis secundum exigentiam, unde in causa calida lauetur primo caro & proprie distillado cum aqua rosacea & acerosa, & ponantur secum ad bulliendum frusta forbarum aut cydoniorum, & semina plantaginis, & semina acetoie recentia, & similia. Et in causa frigida uirtus carnes gariofi, xyloaloes & similia, lauentur primo decoctio cum uino odorifero stiptico, similiter aqua decoctio nis fiat decoquendo pullum in aqua calibata usque ad carnis consumptionem, & secum bulliant aliqua ex suprascriptis calida aut frigida secundum exigentiam, sed succus siue aqua expressiois carniū fiat primo carnes coctas exprimendo, deinde secum permiscendo aliquod stipticum calidum & frigidum secundum exigentiam, & quia uirtus debilis non posset multū dirigere cibentur frequenter, sed parum pro uice.

Vigilijs autem subueniatur uigendo frōtem parum diapopuleon cui apud necessitatem addatur parum opij, syrupus de papauere est conueniens, quia somnum inducit & sedat fluxum, sed apud magnam necessitatem supponatur pro paruo tempore lychniū opiatum, aut parum philonij persici, & apud ultimā necessitatē detur per os aliquid opiati stiptici, cui admixta sint calida aut magis aut minus secundum quod tuo proposito pertinet, sed cum cauela aut timore. Cetera autem accidentia sicut tinesimus & dylenteria & similia curentur secundum quod in suis dicitur capitulis. Septima intentio perficitur locado aegrum in aere

in aere non uentoſo boni odoris temperato in actiuis. Sed in ea frigida declinet aliquantulum ad calidum, & minus malum est ut declinet magis ad calidum quam oportet, quod ad frigidum quam oportet, & melius est ut declinet ad sicum quam ad humum, nec in camera sua aspergatur acrum nehuiusmodi quæ uigilias excitant dormiat quantum potest, & quod potest. Communiter, nam in his propter frequentem ascensionem & multas alias causas somnus impeditur procuret omnes alias euacuationes, tam naturales quam præternaturales sibi consueatas, præter eam quæ est secundum uentrem, quiescat quantum potest, uerum fricationes partium superiorum aliquando conueniunt. Accidentia animi excessiua cõter uitanda sunt. Gaudium in & uerecundia moderata conueniunt, hic, nam mouent materias a centro ad circumferentiam, & contra, timor, desperatio, tristitia, multum nocent, & ira agitat humores qui commoti amplius fluunt. Sit parcus in cibo & potu in primis duobus aut tribus diebus, & in reliquo tempore etiã non superflue comedat, & iuxta posse prius notabiliter comedat antequam bibat, & cibaria sua & proprium opus est stringere sint aliquantulum spissa non flueta, & in principio mense comedat aliquid cõstringens, sicut pirum cydonium, aut diacitronem, diaforbon, & similia, in causa calida, & in frigida aromatisentur cum mace, cinamomo, galanga, cymimino, uel hordet quibus etiã parum farina inlij aut panis possit addi cum opus est constringere, & tunc neque ficalius nec multum fermentatus, & non primidiet, & non transcendens quartum diem, de quo rationem parum edat. Et uinum suum in causa calida sit pauciterum spiritum et debite lymphatum cum aqua calibata, & aliquando sint in ea cocta sumach, aut frusta sorbarum, aut cydoniorum, aut parum tragacanthi & similia, sed cõstante uirtute in causa calida præstantior est aqua quam uinum. Sed in causa frigida sit uinum spiritum mediocriter uinosum lymphatum cum aqua calibata, in qua etiam aliquando infundatur parum mastiches, & carnes cõter sint expulsi & auius syluestribus bene conditionatis, & uirtutes laudantur. Ex quadrupedibus hedi, cuniculi, et & extremitates & omnes partes uiscosæ conferunt ad retentionem. Et ex ferculis panicum, rizum, far, le tes, abiecta prima aqua, alagane & proprie cõdite cõtita antiquo prius in aqua bullito & exiccato pordebitatem uirtutis, sed sint media inter flueta & du in aceto. Et ferculum ex acreta cum ouo cõuenit, sed cõsum pulli et proprie prius assati alteratum acre cum calidis in causa frigida, sicut macegariofil, est apud debilitatem uirtutis cõuenientissimum. Pisces cõuer nientes sunt parui, petrosi, luti, remali, & strili, aurate, sardelle, passeris, & similes boni Kimi & facili digestionis, & sint cõter assati in uero, aut super craticula, & condiantur cum acreta sapore dem yro et si milibus in causa calida, sed in frigida aromatizetur cum mace, galanga, gariophili, cinamomo, & similibus. Ex fructibus cõueniunt pira, cydonia, melpila, forbe, in causa calida & proprie in principio mensæ, sed in

ea frigida, auellane, & fistica torrefacta & c.

Et hæc de fluxu in generali dicta sufficiant &c.

TRACTATUS SECVNDVS DE

speciebus fluxus sumptis a causa materiali subiectiua continens duas partes distributas in decem capitula.

Prima pars est de speciebus fluxus sumptis a toto quinque continens capitula.

DE DIARRHOEA. Cap. I.

Diarrhoea apud grecos idem significans quod fluxus apud latinos, derivatur a *di* & *rhoia* idem significante quod fluo, is. Nomen generis sibi uendicatis eo quod frequentius ceteris fluxibus accidat. Est descriptus fluxus a toto unius plurium aut omnium humorum præterquam sanguinis absque excoaratione intestinorum.

Quapropter eius species distingui possunt secundum species humorum. Ut dicatur quedam cholericæ, quedam phlegmaticæ, quedam melancholicæ, quedam mixtæ.

Cuius causa est multitudo aut malitia humorum. Sed causa remotior est indebitum regimen in cibo et potu quo huiusmodi humores multiplicatur qui cum non sint apti in substantiam nutriti conuerterentur, nec aliter sensibilibus aut insensibilibus expellatur, natura tandem mouetur ad ipsorum expulsionem per uiam epatis & mesenterii in intestina, & tandem ad extraper uiam intestinorum & aniquæ est uia facilior & naturæ magis conueniens &c. Et quandoque sunt in causa febres malignæ præcedentes chronice aut acute hos humores corrumpentes & dimissio euacuationis cõsuetæ naturalis aut artificialis, & dimissio etiam exercitij cõsueti. Et in summa reliquum malum regimen sex rerum non naturalium & annexorum, est enim mala aeris dispositio manifesta uel occulta frequenter huius fluxus causa hos humores corrumpendo, aut uirtutes debilitando. Et quandoque est causa fluxus, prohibitio transitus nutrimenti ad membra propter opilationem, concurrente etiam debilitate attractiue membrorum, aliquando fit hic fluxus a medicina fortia suo acumine aut multitudine, aut quia aliquid eius est in intestinis aut mesentericis affixum continet nouam ad intestina attrahens materiam &c.

Signa prognostica huius fluxus futuri. Et prognostica dispositionum indesequentium satis sunt ex generalibus manifesta. Similiter signa demonstratiua & rememoratiua ex superscriptis facile patet. Signa autem particularia cuiusque humoris fluentis sumuntur ex colore modo substantiæ & ex nocuitetis quæ imprimunt in membra per quæ transeunt. Et sunt reliqua signa cõadiuuantia sumpta ex cõplexione, ætate, regimine præcedente, ære, tempore anni, et huiusmodi. Cholericus quidem citrinus est aut uiridis, & aliquando cum citrinitate tendit in rubedinem, & aliquando in nigredinem, & cholera uitellina similatur uitellis ouorum, & est crassa & citrina minus crassa, sed multæ citrinitatis, & cholera minoris fame tendit in fuscum, & est multum crassa. Præstina similatur succo præstij siue succo porri. Et zinzaria coloris uiridis aeris, & est multum crassa, & hæc cholera faciunt punctiorem & ardorem, & facile excoarant partes per quas transeunt.

N

uel potest exhiberi decoct. myrabolanorum, kebulorum cum pauco turbit non confortati cum zingib. Et tertio his non sufficientibus datur retinencia sanguinem, stiptica, cōglutinatiua, & ex proprijs est succus plātaginis, uel cōsolide, uel caudē equine. 3. 1. uel 3. 2. cui 3. 1. lapidis emathitis, aut dens species luri & proprie armeni aut sigillati, & trochisci de karabe, & de terra sigil. sine opio & cum opio apud magnā necessitatē sunt prastantes, & philonii persicum, & ungā epar, & similiter dorsum ex directo uene chyli cū cerato sandalino cui bolus armenus, aut sang. dra. aut lapis emathitis, aut aliquis ex trochiscis superscriptis sit admixtus aut epithimetur cum succo plātaginis, & aliquo ex pulueribus superscriptis, & in ea frigida superscriptis stipticis addat thus, mastiche, et similia, & in utriusque addatur aliquid aceti ad penetrandū et cōstringendum. Et quarto ordinetur regimen stipticum non multiplicatiuum sanguinis, & bibat aquā ferratā sine uino nisi timeatur calūs uirtutis, & tūc detur uinū nigrum stipticū cum eadē aqua lymphatū, & si in causa esset aquositas sanguini permixta detur trisera ferruginata ex arie fenonis, & cōfortetur cum lapide emathitis, aut cum aliqua ex trochiscis superscriptis, & ordinetur regimen stipticū non declinans ad frigidum, q. si nocuum est aliquid esset in intestinis, ut quia sanguis esset in eis coagulatus cum dysteri mundificāte educatur, & si excoaratio sit in eis facta curetur medicinis dyssenteriae inferius ponendis. Cura autem fluxus sanguinei a toto ex oppilatione procedentis ponetur infra in fluxu epatico, & in fluxu oppilatio. Sed cura fluxus sanguinei ex debilitate attractiue membrorum perficitur cum fricatione corporis, & exhibitione uini subtilis & rerum facile penetrantium & similitum.

DE FLV XV DIVERSORVM colorum. Cap. III.

Fluxus diuersorum colorum qui est a toto, quod ad quid nominis, & quid rei satis manifestus est. Apparet. n. in egestionibus colores diuersi ualde, sicut albus, niger, subniger, citrinus obscurus, citrinus clarus, similiter uiridis diuersorum modorum rubeus obscurus, rubeus clarus morrellus, & in summa fere non est imaginabilis color qui non appareat. Imo interdum in una ascellatione multiplices colores apparebunt. Eius causae & signa sunt regimen praecedens diuersum et dyscrasia corporis diuersa ita ut sit necessarium diuersos effectus prouenire &c. Prognosticum secundum plurimum curatur si debite tractetur. Cura. Si fluxus fuerit uirtuti & repletioni proportionatus sinas regi mini naturae, & solum equetur regimen et dyscrasia corporis diuersa. Si uero nimis superfluat cōstringatur ut non ita repente fluat. Subita. n. & multa euacuatio a natura non tolerat. Modi cōstringendi sunt dicta sunt. Si uero fuerit tardus & diminutus natura adiuuetur prius mundificando corpus cum his quae diuersos humores euacuant, non exsoluentibus, sed stipticis, sed derelinquntibus in intestinis & uis diuturnum uestigium constrictionis, quorum copia supra habita est in cura generali. Et si fuerit multa plectoria cum uirtutis constantia, et in habitudine carnosa fiat

phlebotomia ex saphenis, si retentio fluxus mēstrualis aut haemorrhoidalis fuerit in causa. Si autem nihil tale fuerit phlebotometur basilica uel communis. Secundo equetur regimen et corporis complexio, ita ut ad proportionalitatem quaedam naturae conformē ducatur omnium membrorum complexio, quae ergo superflue lapsa sunt corrigatur cum interius & exterius applicitis, & tam cibalibus quam medicinalibus & omnium membrorum & proprie nutrimentorum uirtutes confortentur cum proprijs stipticitate moderata participantibus & euacuationes consuegeri procurentur tam naturales quam etiam praeternaturales diu consuetae. Et in summa hic obseruetur documentum. Auic. 1. 4. tertij. tract. 4. c. 1. quod quandoque est in expulsionibus diuersorum colorum lenitas scilicet quando expellitur quantū & quale, et qualiter oportet. Et errat qui tenent hos colores diuersa in omni dispositione, scilicet ante completam mundificationem. Et uehementior error eius est qui tenet eos cum oppilatiuis, constipatiuis, quia retinēdi sunt mundificando dyscrasiam corporis diuersam alterando & membra confortando.

DE FLV XV LIQUEFACTIVO.

Cap. IIII.

Fluxus liquefactiuus qui etiam est a toto quantum ad quid nominis & quid rei est satis manifestus. Est enim fluxus per quem humiditates membrorum substantiales educuntur. Species siue modi eius diuersificantur secundum eius quod egreditur diuersitatem, et cōsequenter secundū diuersitatem membrorum a quibus sit liquefactio et dissolutio. Quandoque enim fluentia sunt alba uiscosa, non tamen unctiosa, & oleagina, & proueniunt ex dissolutione membrorum radicalium, & sunt sicut uirus subtile album, & si est ex liquefactione musculorum & carnis rubeae sunt sicut uirus rubeum. Quandoque uero sunt unctiosa & oleagina, et proueniunt ex dissolutione adipis & pinguedinis, & si pinguedo dissoluta fuerit recens exeuntia sunt alba, & si antiqua sunt citrina, & si ex dissolutione adipis renum sunt magis conglobata &c. Causae huius fluxus sunt omnia corpus praeter modum calefacientia, & exiccantia, siue sint intrinseca, siue corporea sicut febres fortes & diu durantes, tam ethice quam humores, & causae magis remotae sunt ulcera & apostemata membrorum nobilium & corporum parua resistentia, quia sunt mollia, aut ex aetate sicut pueri, aut ex complexionem & habitudine sicut illi qui habent lacertos molles & humidos &c. Signa sunt ipsae causae praecedentes & concomitantes corpus liquefacientes, necnon effectus inde sequentes sicut exeuntia de quibus sermo praecessit, necnon corporis consumptio & arefactio, & etiam ipsa urina quae apparet unctiosa & oleagina in superficie, imo aliquando notabilis pars eius, sicut oleum & pinguedo liquefacta alba, uel citrina secundū dissolutionem adipis recens uel antiqui, & hoc quando sit dissolutio multae adipis & pinguedinis, et si apparet conglobata separata & supernatans magis est ex dissolutione adipis renum iuxta aphorismum, quibus uero pinguis hypostasis & conglobata nescitū significat, si uero urina fuerit alba similis lacti uel spermati non unctiosa magis ex liquefactione radicali peruenit &c.

Prognosticū. Fluxus liquefactius ex dissolutio-
ne adipis uel pinguedinis curabilis est, & proprie cū
non est ex dissoluzione pinguedinis antiquę, non tū
apud negligētes & parum exercitatos, & proprie cu-
rabilis est si cā eius posset remoueri. Vbi. n. pendeat
ab apostemate fixo in mēbro nobili intrinseco, aut
ab ulcere pulmonis & similiū ēr incipiens esset incur-
rabilis, si uero proueniat ex dissoluzione membrorū
radicaliū si notabilis est, est incurabilis.

Huius fluxus cura duplicem exigit intentionem.
Prima est remotio causę immediatę liquefactionis
s. caliditatis & sic. liquefacientis. Secunda est eius q̄
deperditum est restauratio. Prima intentio cōpletur
cum remotione causarū caliditatem illam & siccita-
tē conseruantium, siue sint febres putridę, siue ulcera
aut apostemata, quę qualiter debeant curari ex suis
capitulis perquiratur, quod si remoueri non possint
non est ingenium nisi in prolongatione uitę, quę tū
magis potest dici mors quam uita. Intendendū est er-
go siue huiusmodi causę fouentes caliditatē remoue-
ri possint, siue non ad ipsius caliditatis & sic. altera-
tionē cū frigidis & hu. stipticis & uiscosis, quę tamē
nō sint multū frigida, ne calorem naturalē exstinguāt
qui debilis est, neq; multum stiptica, ne transitū nu-
trimenti prohibeant ad mēbra, ex complementibus autē
hanc intentionē quędam sunt medicinę, quędā cibi
medicinales. Medicinę autē quędam exterius applicā-
tur sicut fronti, temporibus, et cerebro anteriori, quę-
dam cordi, quędā epati, quędam dorso, spinali, me-
dullę, & renibus, & quędā partibus extremis, & oēs
hę sint frigide & hu. magis aut minus secundū corpo-
ris dyscrasiam & fortitudinē caliditatis innate potē-
tis, s. tolerare et moderata stipticitate participātes ma-
xime quę applicant principalibus magis ad confor-
tandum q̄ ad confringendum, & cōter nisi calor
innatus sit ualde debilis actū frigide applicent, aut sal-
tem nō calidę, & balnea ex lacte aut ex his qui in he-
ctica fieri consueuerūt sunt in hac pręstantia. Medici-
nę autē suprascriptę ex cap. hęcice colligantur, similiter
medicinę quę interius sumuntur sint frigide & hu.
maiori tū stipticitate, & uiscositate participantē ut
melius prohibeant liquefactionē. Et quę dysterizan-
tur sint similiter conditionatę sed magis stiptice.
Cibi autē sint frigidi et hu. aliquantū stiptici paucarū
superfluitatū prębētes nutrimentum bonum, uisco-
sum, & solidū, ne facile liquefiat, & cū hoc sint facili-
digestiōis, sicut est uinū nigrū stipticū cum aqua cali-
beata, aut infusionibus tragacanthi, debite lymphatū,
& ex carnibus pulli cuiuscunq; generis phasia-
ni, perdices, coturnices, franquillini, & similes, cōditū
cum acresta aut uino cydoniorū, aut in gelatina, aut
cū sumach myrto & similibus. Et oua torbilia cocta
in aceto & aqua ros. Et genera lactis in quibus sit ex-
tinctū ferrum & proprie mulieris, deinde asinę, dein
de caprę, deinde ouis, deinde uaccinum, & caseus re-
cēs, & pisces bene cōditionati, & ex granis far horde-
um, spelta, amyliū, & similia, sed melius est kist corū.
Et ex herbis, cucurbita, portulaca, lactuca, sed aceto-
sa est propria, & cibaria sua q̄doq; immiscetur cum
pulvere gūmi, tragacanthi, coriandrī q̄ est propriū in-
spissat. n. humiditates & uiscosas facit, & mēbris ad-
herētes, & propterea minus liquefactibiles, & ad hoc
karabe confert & folia uisnę, & est res albi coloris col-

lecta super arboribus sunt in hoc ppria & hęc sua stip-
ticitate tēperata paulatim fluxū stringūt non repēte,
& scdm hanc intentionē facile fieri possent cōposita,
sicut marzapanis & electuaria restauratiua & sibi si-
milia. Secunda autē intentio, s. humidi restauratio per-
ficitur cū similibus cibis quorū pręcessit rememora-
tio & uirtute existēte debili pluries in die sunt cibadi.

DE CHOLERA PASSIONE. Cap. V.

Cholera passio, est descriptiue motus uehemē-
materierū ex indigestione corruptarū ad ex-
pellendū a corpore cū labore & acuitate uir-
tutis expulsiuę tāta ut propter multitudinē
& acuitatē materię fiat uomitus & secessus simul &c.

Complementū huius cap. quo ad species, causas,
signa, prognostica. Et curam quere supra in tractatu
de passionibus stomachi.

Secunda pars est de spēbus fluxus sumptis a mem-
bris particularibus continens capitula sex.

DE FLUXU CEREBRALI. Cap. VI.

Fluxus cerebrialis est qui fit propter catarrhū a
cerebro ad stomachū, & tandē ad intestina de-
scendentē multotiens corruptentem cibum &
facientē ipsū fluere, & descendente simul cū eo
pppter suā lubricitatē et expulsiōē factā ab intestinis.

Causę huius fluxus sunt omnia qnq; catarrhū mul-
tiplicant, siue corporea sint, siue incorporea, & maxi-
me secundum plurimū mala cōplexio frigida cerebri
et humida, & aliquando calida & hu. quę ratione ca-
liditatis attrahit & ratione humidi resolutionem im-
pedit, unde neque fit nutrimenti debita cōuersio, nec
superfluitatū propriarum, aut cōium resolutio, aut
per proprias regiones euacuatio, quapropter descen-
dentes per colatorium, aut alias uias occultas ad stō-
machum deriuant, & sunt secundum plurimū phleg-
matice. Item, uapores qui a membris inferioribus &
maxime a stomacho ad cerebrum eleuati a frigida-
te sua & humiditate condensati sunt frequenter propter
multiplicantur autē & ad cerebrum eleuatur propter
debilitatem suarum digestionum, & quia non possunt
per alias regiones sensibilibiter aut insensibilibiter ex-
pelli & frequenter pororum oppilationes &c.

Species non habet nisi quoddam modum secun-
dum magis & minus differētes, ut quia aliquis est no-
uius, aliquis antiquus & similes &c. Causę autē primi-
tiue sunt aer frigi. & hu. & uentosus auster radijs so-
put implet, boreas exprimit, & statio sub radijs so-
lis, aut lunę capite repleto. Item cibi diffidilis digestio
nis uaporosi, & potus nimius, & pręcipue uini uino-
si, & somnus multus, & proprie meridiana, & im-
mediate post crapulā aut ebrietatē. Itē, retentiō forte in
tionū consuetarū, & quies multa, et exercitiū debilitas ce-
cōsuetū, capite ēr repleto & coitus multus sicut tristi-
rebrū et mēbra naturalia. Itē, accia anime sicut tristi-
tia nimis studiū, cogitationes profunde, et similia &c.

Signa fluxus cerebrialis sunt primo signa corrup-
tionis cōplexionis cerebri. s. frigiditatis & hu. secun-
dum plurimum, sed caliditatis & hum. rariis, & ad-
sunt signa catarrhi, quia sentitur in gutture quantū
quędam, & descensus eius per mery, quem quan-
doq; sentiens deglutit, & cum peruenit ad stomachū
sentitur frequenter grauedo, & aliquando nauica, &
quandoque

quandoque dolor, & apparet in egestionibus cibis indigestis cum mucis phlegmaticis, & habet periodos secundum aggregationem materiae catarrhalis magis in somno, et post expergefactionem descendit, & quandoque descendit in somno, ita ut sentiatur patiens deglutire. Et differt a lubricitate stomachi, quia illa non habet periodos, sed quacunque hora cibis assumitur descendit, & secundum plurimum est sine mucis phlegmaticis, & contra uero fluxus catarrhalis est cum exitu humorum catarrhalium absque cibo, & aliquandoque alia secum admixtione, nec ad sunt in lubricitate signa corruptionis complexionis cerebri nec signa catarrhi que apparet in gutture & mery & in stomacho postquam descendit, de quibus dictum est.

Prognosticum. Huius fluxus cura facile perficitur si catarrhus potest prohiberi, quapropter in senibus est huiusmodi cura difficilissima, &c.

Cura huius fluxus septem exigit intentiones, scilicet evacuationem, diversionem, cerebri rectificationem, sitionem stomachi, & intestinorum mundificationem, & ipsorum confortationem, & debitum regimen rerum non naturalium secundum exigentiam intentionum. Prima intentio in catarrho frigido aut mixto completur cum pilulis de hiera simplicibus, aut de hiera composita, aut cum agarico uel cum huiusmodi. Recipe pilularum de hiera simplici 3. i. agarici preparati, myrabolanorum, kebulorum an. 3. s. cum aqua menthae, aut maioranae, aut cum uino fermentur pilulae. 1. s. de quibus sumantur, 5. aut 7. secundum exigentiam mane, aut completa digestionem cibis praecedentis, & apud maiorem necessitatem pilulis de hiera simplicibus, potest addi aliquid cochiarum, & in calido euacuetur cum pilulis assaieret quibus a tempore necessitatem potest addi aliquid modici aurearum. Sed cauedum est cum ad sit fluxus ne fortia soluentia nimium soluant & stomachum debilitent & intestina, propterea bonum est cum medicinis solutibus supra scriptis aliquid myrabolanorum misceri. Digestiua autem si eis opus sit sunt in materia frigida, mel ros. syrupus de fteccados, & his potest admisceri aliquid thuris ad confortandum et incallandum, et in calido iulep rosaceum de myrto, & syrupus de papauere, & debent hi sumi cum aqua leuiter calibata, sed in causa frigida sit in ea infusum aliquid thuris, macis, nucis muscate, et similia. Diuertat iuxta secundam intentionem materia catarrhalis fluxus uel fluxura, & si nimis coium, & cum aliquibus proprijs, maxime caput rae coronali applicitis, & tandem cauterijs commissurata sunt mihi suspecta ne amplius materiam ad stomachum precipitet & diuersificent caput purgia secundum eam diuersitate & sensus acuitate, & similiter uestigia intentione cum exterius applicitis, sicut sacculo malis uisulati, sandarace, radice nenus, exiccata. ana. 3. 2. spice, myrrhe, an. 3. i. et hic sacculus aliquantulum calefactus in die applicetur, & sumpta interius sint diamusculus & diabra in causa frigida, & zucarum rosaceum in causa calida myrabolani quoque chebuli conditi optime valent in confortatione stomachi & capitis, & cum

hoc comprimendo euacuant, & trisera feruginata est propria ex arte senonis, sed in confortatione stomachi superflue remoliti, & aromaticum rosaceum est proprium in utriusque confortatione, & in causa mixta aut frigida. Sistatur autem catarrhus frigidus iuxta quartam intentionem multis modis, sed maxime tenendo in ore thus aut spicam, & thus deglutitum post cenam optime confortat, sed in calido teneatur in ore semen papaueris al. diacodis, terra sig. lutum armenum, aut aliquid ex eis deglutatur, & quandoque oportet uti narcoticis, sed postponatur quantum est possibile. Suffragia etiam facta cum thure, sandaraca, costis, laudano, xilocalois singulariter aut coniunctim, & proprie si cum resina & pice incorporentur optime ualent ad sistendum catarrhum, & ad cerebri confortationem. Mundificetur autem stomachus iuxta quintam intentionem cum uomitu, & proprie si nauleauerit, Et stomachus & intestina mundificentur cum clysteribus aut solutius leuibus sicut pilulis de hiera simplici cum pauco myrabolanorum. Deinde confortetur iuxta sextam intentionem cum stipticis & aromaticis, & prohibebitis effusionem materiae ad ipsa. Et ex proprijs est thus, spica, capilli ueneris, mastiche, macis, & similia. Et si qua sit dyscrasia impressa in stomacho & intestinis frigida cum calidis amoueat, sicut sunt cortex citri, zingiberis, ameos, cortex thuris, & sicut aromaticum ro. theriaca, mirridatum usque ad aquam uitae, & similiter cum exterius applicitis. Calida autem remoueat cum frigidis confortantibus, sicut diarrhodon abbatis, zuecharum ros. & similiter leuiter ad frigidum declinanda applicentur exterius. Aer iuxta septimam intentionem declinet ad siccum & ad temperamentum in actiuis, aut leuiter ad calidum. Caueat a uentis & a statione sub radijs solis aut lunae, teneat caput panis mediocriter coopertum inspecta eius dyscrasia, sed residuum corporis magis calidum. Viuet uinum quantum est possibile. Sed hiber aquam mellitam uel zuecharatam, aut uinum rubeum optimel lymphatum & proprie aqua aliquantulum calibata. Et sint cibi eius facili digestionis non uaporosi ad siccum declinantes, non comedat brodia in cernis. Post cibum sumat aliquid cydonij, aut piri cocti aut conditi, aut coriandros semicofectos, aut saltem praeparatos. Non dormiat in die iuxta posse, & tardet somnum post cenam quae sit leuis, dormiat capite eleuato ad alterum laterum declinante, ita ut humilitates sint prone fluere per nares. Procuret uomitum si nauleauerit immediate post somnum. Et ceteras procuret euacuationes per conuenientes regiones. Exercitetur stomacho ieiuno, sed exercitium sit magis longum quam forte aut intensum. Et fricationes aliquando suppleant uicem exercitij. Sit sperans & gaudens, uitet tristitiam & longum studium, et nimiam sollicitudinem.

DE LIENTERIA SIVE FLUXU STOMATICO. Cap. VII.

Lienteria lubricitas stomachi, lenitas eius, fluxus stomatiscus sunt termini synonymi, et dicitur lienteria a λένω quod est lenire & ἵστρον intestinum, id est, lenitas intestinorum. Propterea diffinierunt quod est lenitas stomachi & intestinorum, est enim tunc eorum superficies lenis non aspera, sicut debet esse in dispositione naturali.

gestuam. Similiter praesentia humoris cholericici aut phlegmatici salis pungentis & stimulantis expulsiua non finit cibum figi. Ventositas etiam non sinens stomachum adherere cibo est causa ut corrumpatur & expellatur. Tertia causa, sunt ulcera pustule aut apostema stomachi tantum dolorem inferentia ut non tolleretur cibi contactum, quapropter irritatur expulsiua ad expellendum. Item, dolores stomachi a quacunque causa contigerint. Quarta causa, posset esse apostema & ulcera membrorum sibi uicinantium, scilicet diaphragmatis, epatis, intestinorum, gracilium, & colon, qui superequitat stomachum, & similiter ipsum dolores. Est tamen aduertendum lenteriam quamuis sit principaliter passio stomachi cui principaliter debetur cibi digestio, esse etiam passionem intestinorum & proprie superiorum, quorum actio est in cibo praedigesto in stomacho ad complendum eius digestionem, licet uirtus retentiva non in sit eis per uirtutem in eis repertam, sed solum per ipsum circumuolutionem, ut uoluit Gal.

Signa lenteriae sunt ipsa lenteria, scilicet exitus cibi & potus indigesti. Differt tamen lenteria stomachi a lenteria intestinorum. Nam in intestinali egreditur cibum notabiliter digestus, cum ipsius digestio principaliter in stomacho perficiatur. Sed in stomachali siue stomachica secundum plurimum notabiliter indigestus, & adsunt notamenta intestinorum cum sanitate stomachi, uel econuerso, & distinguitur per locum doloris, & cuiuscunque alterius nocuenti sensati an sit in regione stomachi, uel intestinorum. Item, ex aegritudinibus quae praecesserunt an fuerint in stomacho, sicut nausea, subuersio, uomitus, & similes, an fuerint in intestinis, sicut colica, dysenteria, & similes, quae magis in intestinis appropriantur, & uomitus saniei & sanguinis cum dolore circa stomachum sentiam esse stomachicam cum sanies & sanguis intestino rum male posset euomi nisi magna esset oppilatio in intestinis sicut in ileo, uerum sanies & sanguis stomachi facile potest per secessum expelli, & differt a fluxu cerebri, quia lenteria ordinem non habet neque periodum, sed quacunque hora cibum assumitur, & proprie difficilis digestionis egreditur. Cerebralis autem ordinem habet & periodos, ut supra.

Signa causarum si fuerint primitiue sicut medicipna cibis, potus, & aer, & alia quae superueniunt sumpti cibis, scilicet exercitium & similia sunt praecessio ipsarum causarum. Et quandoque talis causa praesens iam dictis semper sequitur talis effectus, scilicet lenteria, & si est causa praecedente non sequitur lenteria, & si est causa medicina solutiua interdum sentitur dolor & punctio, & sapor eius, & quia est ex eis quae hoc facere consueuerunt, sicut est agaricum aut colocynthis consumitur in substantia nisi sit infusa, si aut oxymelle &c.

Signa male complexionis frigidae & humi, stomachi sine materia sunt albedo faciei, & linguae, paucitas stercis, & tarda digestio, frequens corruptio cibi ad acuitas stomachi neque nausea. Sed si sit cum praesentia materiae phlegmaticae, adsunt signa superscripta, & cum hoc grauitas & frequenter stomacho ieiuno

adeest nausea, subuersio, uomitus phlegmatis, quod etiam frequenter secessu educitur, & si in causa est uentrositas sentitur motus uentrositatis per superius aut per inferius & rugitus & dolor, nunc in una parte, nunc in altera.

Et si in causa sit mala complexio calida & humores calidi adsunt signa contraria supra scripta, & eorum sapor in eructatione sentitur & frequenter uomitus aut secessu emittitur, & cum hoc sunt signa generalia ex complexione, habitudine, aetate, tempore, regimine praecedente & similibus, quae male complexionis calidae aut frigidae attestantur, & phlegma salsum cognoscitur ex sapore si uomitur, & ex substantia sua subtili & acuitate & mordicatione tamen si per secessum emittitur.

Et signa ulcerum sunt uomitus saniei & eructatio redolens saniem, & secessus saniei multum comixtae fecibus propter longum cum chylo & fecibus incesum, & si ulcera sunt in intestinis raro uel nunquam sanies uomitur, neque eructatio est redolens odorem eius, sed solum per secessum emittitur, & sumpta per os si acuta sint ardorem inferunt quando ulcera sunt in stomacho: sed in intestinis minime, & apostemata cognoscuntur ex tumore, duritia, grauitate, dolore continuo, febre continua, & bothor cognoscuntur ex punctione & mordicatione, & frequenter apparet in ore propter continuationem pelliculae oris cum pellicula stomachi, & facile possunt in causis communicare. Et si apostemata sunt in intestinis adeest colica et lenteria ex debilitate retentiae distinguitur a lenteria ex debilitate digestiuae, quia in prima cum cibum assumptus est statim emittitur, & proprie cum homo sedet uel incedit, sed paulatim existere ferè semper aliquo conatu ad retinendum, & proprie cum expulsiua non est ualde fortis, & apparet in cibo aliqua digestio secundum moram eius in stomacho, sed in secunda ex debilitate digestiuae cibum notabili tempore retinetur, postea tandem indigestus per superius aut inferius emittitur. Et frequenter apparent signa corrupta digestionis.

Prognostica. Primum est asorismus quintae paritulae, scilicet in diuturnis lenterijs quod oxyremia superueniens prius non existens bonum, & est sensus quod oxyremia, id est eructatio redolens acetum uel acrentiam superueniens prius non existens bonum est per uiam signi, significat enim cibum immutari cum prius non immutaretur, & sic bonum est, & praecipue si redoleat odorem acetum cum magis actionem caliditatis significet. Si autem oxyremia praecessisset lenteriam, aut simul cum ea inchoasset, siue diu durasset, siue non, non est bonum signum, significat enim phlegmatis acetosi, aut melancholiae acris praesentia in stomacho aut magnam distemperantiam stomachi ad frigidum, quorum nullum est bonum.

Dicunt etiam quidam esse bonum per uiam causae quia res acetose phlegmata incidunt, sed in hoc casu arbitror hoc paruum iuuamentum.

Secundum prognosticum, lenteria succedens fluxibus antiquis, & ad chronicas aegritudines mortalium.

Tertium, lenteria sequens malam complexionem frigida & humidam, est summè difficilis cum antiquatur tandem & ducit ad hydropem, cum epar refrigerando, tum male chylum preparando.

Quartum prognosticum, lienteria sequens medicinas exoluentes, aliquando ducit ad dysenteriam & mala ulcera intestinorum.

Quintum, uomitus in lienteria est malus. Significat enim debilitatem toti stomacho communem aut multitudinem materiae in toto stomacho incitantem ad uomitum & ad secessum, & similiter significat omnes alias causas toti stomacho communes.

Sextum, quando apparet in lubricitate intestinorum super colitis aliquid simile ciceri, & prouocatur urina, & multiplicatur, moritur aeger in hora illa.

Cura lienteriae si fuerit a medicina solutiuia exigit quinque intentiones, prima frangit audaciam medicinae & eam e corpore educit, secunda humores diuertit, tertia, confortat stomachum & intestina ne recipiant, necnon cor & membra nobilia, & cum hoc ductus & uias constringit, incrassat materiam, & tandem compingit, quarta, accidentia corrigit, quinta, ordinat debitum regimen.

Prima completur exhibendo aquam hordei, aut aquam calibeatam in potu in notabili quantitate etiam pluribus uicibus, & si apparent signa frigidauius detur aqua passularum zuehari rub. uel mellis. Mucilago quoque se. pilin. uel se. cydoniorum, & exhibitio olei omphancini uel filamini, & similium optime ualent, tum ad deponendum medicinam, tum ad frangendum eius acuitatem, & maxime si sit ueniosa, & debent dari in notabili quantitate & multotiens, & possunt mucilagines cum aqua hord. permisceri, & similiter butyrum cum aqua ca. permixtum est in hac re praestantis iuuamenti, & ex similibus rebus fiant dysenteria secundum necessitatem.

Communiter tamen sufficiat aqua hord. uel aqua communis calida siue potata siue dysenterizata, sed in dysenteribus aliquid unctuosum, sicut oleum uel butyrum, & similiter aliquod abstergium, sicut zuc. rubi. permisceatur, & si per duas horas, post huiusmodi laxatiua dentur aliqua compressiua, sicut succus cydoniorum, uinum granatorum, sorbium, & similia, & decoctio myrabolanorum optime confert ad deponendum medicinam.

Secunda intentio completur cum diuersionibus, & propriè si medicina fluxum humorum excitaue-rit, ex quibus sunt ligaturae supra cubitos multotiens reiterande, necnon uentose spatulis applicite. Item fricationes & lotiones brachiorum, sed uentosa magna stomacho applicita cibum in stomacho retinet.

Tertia intentio completur cum interius & exterius applicitis, sicut cum unguentis emplastris ceratis epithimibus stomacho & intestinis applicitis, necnon syrupis, electuarijs, & ceteris, de quibus sermo praecessit in cura fluxus in uniuersali.

Confortetur etiam cor cum exterius applicitis, & omnes hae medicinae constrictiuae interius sumptae sunt etiam pro parte cordis, constrictiuae & confortatiuae, sicut rob de acetositate citri de ribes & similes, & epar confortetur cum stipticis claudentibus uias & ductus eius, per quos materia ad stomachum & intestina defertur. Recipiunt enim stomachus & intestina superfluitates fere à toto corpore mediante epate, & tandem apud magnam necessitatem compingendum & stupefaciendum est iuxta doctrinam supra scriptorum. Corrigantur accidentia iuxta quartam intentionem,

& similiter debitum regimen ordinetur iuxta quintum sicut dictum est in ca. generali curationis fluxus. Similiter si lienteria fuerit ex cibis aut à quacunque alia causa primitiua illa remoueatur, & inducatur regimen contrarium.

Cura lienteriae à phlegmate existente in stomacho exigit sex intentiones curatiuas. Prima digerit incidit & abstergendum phlegma existens in stomacho cum oxymelle simplici, oxymele composito & squillaco apud maiorem necessitatem & melleros. cum his mixto ad aliqualem confortationem, & aquae sint si cuta aqua menthe absynthij aqua decoct. cinnamomi & similes. Sed esto memor paucam aquam cum syrupo permiscere, ut puta tantundem aquae ut melius adherendo abstergat. Secunda intentio est euacuatio cum pillulis alephanignis de hiera simplici stomacis, & non excedendum est in solutiuis fortibus quae multum trahant à longinquis, ne stomachum debilitet & amplius de materia trahatur ad stomachum nulla materia à membris distantibus mitteretur, & tunc in casu possemus ut electuario electo. si mitteretur à membris nutritiuis, & pillulis coctis si à capite mitteretur, sint tamen in parua quantitate & cum quibusdam stipticis permixta stomachum confortantibus.

Vomitus quoque & propriè si ad ipsum aeger inclinetur est praestans in melancholia, & propriè praestans dentibus incisuijs & subtiliatiuis & abstergentibus sicut sunt almuri & res false, & synapis, & cepe decoctae aut raphanum, & his succedant inuiscantia, sicut alagane in eadem mensa, & multum potet de uino fau-

potenti, & per horam post elaboret in uomendo iteratis uicibus imponendo digitum in ore, aut pennam oleo intrinsecam donec multum de phlegmate euacuetur. Tertia autem intentio est diuisio quae perficitur secundum materiam fluentem exigit ad stomachum & membrorum à quibus fluunt, & haec perficitur ut sepe dictum est.

Quarta autem intentio scilicet confortatio & propriè retentiuia eius completur cum unguentis, emplastris, ceratis, facculis, fomentis factis ex rebus calidis & stipticis odoriferis, sicut est materiam tertiam stomachum confortantibus, sicut est mastix, thus, gallia muf. absynthium, gariofilij, spica, mentha, calamus aromaticus, laudanum ex quibus odorati sunt fieri composita permiscendo cum oleo de mastice, de spica, & similibus, & succo menthe, uino odorifero, & pauco aceti, cera, pice, resina, secundum quantitatem unguenti aut cerati. Interius autem sumpta sint sicut thus, mastix, diaolibanum, miua aromatica, syrupus de mentha, diacitonem cum mastice. Sed nota quod inter herbas mentha est praestantissima in stomacho & confortatione & maxime hortulana boni odoris, & castoreum plus confortat ipsum ceteris carnibus, mastix plus ceteris gummis, galanga plus ceteris aromatis, enula magis omnibus rad. capparibus fructibus plus omnibus floribus, & cydonia plus omnibus fructibus. Quinta intentio est cura accidentium, pro quibus etiam recurrat ea quae dicta sunt. Sexta intentio ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. At ergo declinet ad calidum & sic naturaliter aut artificialiter, & cibi sui sint calidi & sic incidentes abstergentes non stiptici saltem in principio sicut ex salatis capparibus cum aceto conditi & pauco mellis. Et cepe debite decoctum, & similia, cum aceto & melle, & paucis

& paucis aromatibus condita, aut cum zuc. rub. raphanum & porrum concedi possunt in pauca quantitate. Ex ferculis, brodium, cicerum cum mentha in eo minutim incisa. Item, radices petrosellini debite coctæ & preparate. Item, brodium caulium, & carnes ex aubus boni kimi & facili digestiones, & ex saporibus synapismum, & piperata, & uinum antiquum aromaticum uinosum aut mediocris potentiae. In fine autem multa materia phlegmatica educta magis stipticis utendum est.

Si fuerit mala complexio frigida & humi. sine materia unica intentione opus est, scilicet calefactione & exiccatione cum his quæ habent stomachum confortare sua stipticitate temperata aromaticitate & proprietate.

Si uero uentositatis fuerit in causa. Primo materia à qua eleuatur euacuetur iuxta modum præcedentis doctrinæ. Secundo uentositatis carminetur cum his quæ etiam stomachum confortant, sicut est zing. & ex maxime proprijs est galanga, & diagalanga. Item, castoreum, & diaciminum, & baccæ lauri, & electuarium debacis lauri.

Et si in causa fuerint humores calidi uomitu aut secessu educantur per eam, scilicet regionem quam magis natura tentaret. Et diuertatur iuxta modum generalem superius dictum. postea mala complexio eius alteretur cum frigidis & stipticis interius & exterius applicitis stomachum confortantibus, quorum copiam superius habuisti, & similiter seruetur regimen in cibo & potu.

Si uero lenteria pendeat ab ulceribus, cura ex proprio cap. requiratur. Et maxime autem cõferentibus est succus plantagi. cum bolo ar. & maxime si adsunt signa caliditatis, his tamen posset addi thus, aut mastiche, existentibus signis frigiditatis.

Cura uero apostematũ stomachi ex proprijs capitulis requiratur. Et ex proprijs potest patere causa fluxus chylosi accidentis merito nocuentorum stomachi & intestinorũ. Causæ enim intensæ de quibus supra quæ faciunt lenteriam remisse possunt facere Kylosium, quare cura erit proportionalis supra scriptis.

Cura uero lenterię ex debilitate contentiue magis indiget sicis stipticis quam quæ ex debilitate digestiue, sed in caliditate satis parificatur. Vinum enim potens antiquum stipticum magis subuenit debilitati contentiue ex causa frig. & hum. Vinum autem potens minus siccum & minoris stipticitatis magis subuenit digestiue ex simili causa. Et diabolbanum est & hu. cuius est descriptio. oliban. 3. 4. piperis, ameos spice, Keisim, id est leuistici, anisi, nigelle. ana. 3. 2. badiastiarum. 3. 4. mellis dispensati. q. s. misce. dentur deo stomacho ieiuno. 3. 3. pro uice, & taret prandium per duas horas.

Cura fluxus stomachi sanguinei completur cum his quæ dicuntur in cura fluxus intestinalis sanguinei ad quod cap. recurre.

DE FLUXU INTESTINALI. Cap. III.

Fluxus intestinalis est quadruplex, scilicet diarrhoeicus, lientericus, sanguineus, & dysentericus. De diarrhoea & lienteria satis actum est. fluxus sanguineus ab intestinis, de quo est hic sermo

est fluxus sanguinis ab eisdem in notabili quantitate.

Species non habet, nisi forte quosdã modos secundum magis & minus differentes.

Causæ sunt solutio unius aut plurium uenarum in intestinis, aut apertio orificiorum ipsarum, aut propter multitudinem extendentem, aut acuitatem corrodentem, & quandoque excoaratio aut ulcus intestinorum paulatim se dilatans, profundans per eorum substantiam.

Signa distinctiua inter hunc fluxum sanguineum intestinale & fluxum sang. à toto, & fluxum sangu. epaticum, sunt manifesta ex dictis superius in fluxu sanguineo à toto. Et ex dictis in fluxu epatico satis in principio cap. ibi enim ponuntur sex signa distinctiua inter epaticum & intestinale.

Prognostica. Hic fluxus sequens dilatatione orificiorum uenarum intestinorũ facile curatur, sequens autem fracturam absq; corrosione & ulceratione difficulter, sed sequens ulcera & corrosiones difficillime, præcipue si fuerit in intestinis gracilibus.

Dysenteria uero est fluxus uentris cum excoaratione aut ulcere intestinorum à deo quod difficultatem significat & *ερεπον* intestinũ quasi difficultas intestini. Irido. 6. ery. Est autem excoaratio intestinorũ dolor abrasionis, siue abrasio dolorosa in superficie eorum intrinseca. Vculus autem est solutio continuitatis eorum cum sanie. Et hæc ulcera & excoarationes frequenter sunt in intestinis, in stomacho rarissime.

Species dysenterię sumuntur aut ab intestinis ipsis. Est enim quædam facta in duobus superioribus, scilicet duodeno & ieiuno, quædam in duobus medijs, scilicet ileo & sacculo. Quædam in duobus inferioribus, scilicet colo & recto, & quandoque fit in extremitate intestini recti, & si est cum punctiõne grauiamine & conamine ad egeredum dicitur tinea, de quo posterius agetur. Quandoque species dysenterię sumuntur à solutione continui, & sunt tres. Prima in qua educitur sanguis pinguedo, siue potius uiscositas quædam, & est phlegma stagnans intestina. Secunda est in qua cortex intestinorum educitur, & dicitur alkurat uel alkurati. Tertia in qua frustum seu pars intestini educitur. Et quilibet istarum, aut est recens sine sanie, aut antiqua cū sanie. Et quanto est maior & profundior, tanto plus de sanie educitur. Et hæc ulcera intestinorum, quandoque sunt munda à quibus sanies laudabilis emanat, quandoque sunt immunda, scilicet corrosiua à quibus cum sanie, & propter ulteriorem corrosiõnem etiam sanguis emanat, & quæ sunt putrida à quibus uirus foetens emittitur. Et quædam propter antiquitatem tandem conuertuntur ad fistulas, & quædam adeo profundantur ut perforent intestina, & sex in uentre colligitur, quod est deterius quam si simul uenter & intestina perforentur.

Causæ autem sunt primitiue sicut medicinæ, uenena solutiua, aut non solutiua, necnō cibi acuti. Corporeæ autem sicut humores, sed frequentius cholera cuiuscunque generis. Ex quibus ualde mala est praesina, pessima, zinariæ, & deinde frequentius post cholera est in causa phlegma falsum aut uiscosum. sua tenacitate cum separatur soluens continuum, sed hoc magis in intestino recto. Tertio loco est melancholia adusta cuiuscunque generis, & sanguis acutus & hi humores excoarantes quandoque sunt paulatim in intestinis.

stinis congesti, sed secundum plurimū sunt aliunde deriuati. Et cholera trāsiens per intestina penes. Aui. secundum plurimum excoriat infra. 15. dies, humor uero phlegmaticus in uno mense. Melancholicus in. 40 diebus, licet frequenter in prima aut secunda die quilibet istorum excoriet. Sanies quoque catarrhi & qui cunque alter humor acutus ad intestina deriuatus est in causa. Et quandoque causa ex coriationis est fex dura, & propriè in extremitate intestini recti, & causat tinea nescimū. Aliquādo causa ulceris est apostema quod in intestinis rumpitur.

Signa. Prognostica dysenteriae & fluxus sanguinis ex uentre sunt cum præcesserit hyems sicca septentrionalis & succedit uer pluuiofum & estas pluuiofa. Similiter quando hyems est austrina & uer boreale pauca pluuia, succedunt enim fluxus propter multiplicationem catarrhorū. Et multiplicatur fluxus in regionibus meridionalibus cum exufflationibus austrinis multitudine pluuiae.

Signum demonstratiuum cōmune omnibus dysenterijs est, quia sanguis pinguedo, siue phlegma stagnans sanies, cortex, aut fructū intestini educitur, aut solū, aut cum fecibus ex alijs humoribus permixta, & est cum punctione & dolore notabili in intestinis, & per hoc sanies & sanguis ab intestinis distinguitur à sanie & sang. proueniēte à membris superioribus, cū ille sit sine notabili dolore intestinorum. Et in intestinali sanies & sanguis ueniunt paulatim, & secundum continuationem & permixti cum fecibus nisi uena soluatur aut orificium eius aperiatur, aut apostema in intestinis subito rumpatur. In epatico autē & communiter in alijs fluxibus ueniunt in quantitate notabili & interpolate & non permixti, immo primo fex emittitur & succedit sanguis aut sanies, & sunt nocumenta manifesta in epate & in alijs mēbris quæ præcesserūt. Et in intestinis nō est nocumentū manifestū. Et cum exit sanguis ex ex coriatione intestinorum paulatim incipit & agendo procedit nisi soluatur uena, & est cum febre continua. Cum uerō uenit ex epate & membris superioribus communiter uenire incipit in magna quantitate cū interpolatiōibus, ut dictum est, & communiter omnis paroxysmus est deterior & manifestior præcedente, nisi cum uentum est ad declinationem.

Signa causarum primitiuarum sunt ipsæ causæ primitivæ, scilicet melancholia aut cibi mali qui præcesserunt. Humores cognoscuntur per colores suos.

Phlegma enim colorem habet album & est eius eūsus cum rugitū à uentositate, sed materia falsa baurachia distinguitur à crassa uiscosa sua uiscositate separante pelliculas, quia phlegma falsum est subtile, hoc uerō crassum conglobatum, & hoc crassum habet alkaic siue pelliculas sibi adherentes, falsum uerō nō, & cum hoc crasso sentitur grauitas & dolor manifestus aliquo tempore qui non permutatur. Cholera autem cognoscitur per colorem suum citrinum, aut rubeū, aut uiridē attestantē colorī prassī siue succi eius aut colorī succi fol. porri si fuerit prassina aut colorē uiridē magis clarū attestantē erugini æris si fuerit zinnaria, & est seuorū accidentiū, & aliquando cū syncope. Sed melancholia habet colorem magnum & magis lucidū quæ genita est per aduersionem, & magis nigrum quàm quæ est genita per congelationem, Sed

melancholia naturalis habet colorem fuscum, & habet odorem pontici & acrem, & genita per aduersionem melancholice naturalis habet odorem acetosum cum ponticitate & genita per aduersionem cholericam habet odorem acetosum cū amaritudine, & genita per aduersionem phlegmaticam, habet colorem mixtum cū albo & nigro, & per aduersionem sanguinis permixtum ex rubeo & nigro, & dolorem habet dulcem tendentem in acetosum, & genita per aduersionem cholericæ & melancholicæ sunt cum accidentibus suis. Et hæc diu species ebulliunt super terrā, sed magis genita ex melancholia, & fugiunt ab eis muscæ. Apostemata eorum cognoscuntur per tumorem, duritiem, grauitatem, dolorem continuum in ipsis intestinis & similia, & cum rumpuntur sanies subito profluit in magna quantitate, nec absoluitur ager à feb. continua. Et cū est ex coriatio ex duritiæ fecis cognoscitur cū aliquid sui egreditur cum absentia aliorum signorum, & sedatur dolor cum lenitate uentris. Et multoties egreditur succus fecis ex fece iā dura, & existimatur quod sit fluxus uentris, & constringitur, & in hoc est mors & perditio agri. Et distinguitur ab alijs fluxibus per colorem, & ex longa fecis retentione, & ex uentris tumore cum duritiæ. Et cognoscitur esse in duobus superioribus, quia dolor est supra umbilicū & multus fortis, & stomachus multum leditur, unde fit frequens uomitus, nausea, & subuersio, & singultus, & epatici patitur maximè si sit in ieiunio. Et egreditur eam tractur post dolorem inchoatum cum oporteat eam tractur per plures intestinorum reuolutiones antequam egrediatur, & est cum notabili quantitate sanguinis. Et pelliculæ inde egredientes sunt minores & tenuiores. Et habent sanguis sanies, & pelliculæ maiorem cū fecibus permixtionē. Et quod egreditur si saniosum est, est magis fortidum & chylolum habet admixtum. Et frequenter assimilatur aquæ carnis. Et cū est in duobus inferioribus omnia sunt his contraria, & dolor est infra umbilicū. Et multoties sanguis & sanies egreditur ante feces, & propriè cum est in recto & in extremitate eius. Et cum est in duobus medijs omnia modo se habent, & dolor est circa umbilicum.

Species dysenterig secundum maiorem & minorem profunditatem cognoscuntur per exeuntia. Nam in prima specie egreditur sanguis & mucositas. In secunda specie pelliculæ. In tertia cortices intestinorum crassiores. Et hæc maximè descendunt & manifestantur in clysteri lauatiuo. Sed ulcera per saniem cognoscuntur, & cum sanies est laudabilis, tunc ulcera sunt pura, cum uerō mali coloris fetens, tunc ulcera sunt putrida, & cum saniei sanguis associatur cū dolore tunc sunt corrosiua, & cum ulcera sunt multæ saniei & sine dolore, tunc sunt sordida, & distinguuntur à putridis, quia putrida sunt cum dolore & fetore. Et si est ulcus cancriformis uirus suum declinat ad nigredinem, & præcessit fluxus melancholicus. Et si est cancer sunt signa eius præter signa apostematis. Et si ulcus fistula ius exitus interpollatur. Et si egreditur uirulentia subtilis, aut

Prognostica. Primitiua, ulcera & ex coriationes quæ sunt in intestinis gracilibus, sunt multum suspecta ad mortem. Et propriè ea quæ sunt in ieiunio intestino propter multitudinem uenarum eius crassum cholericæ puræ & subtilitatem corporis sui, & cursum cholericæ puræ ex felle

ex felle ad ipsum, & propter propinquitatem eius in membro regali, id est epati, est enim ceteris intestinis sibi propinquius, & quia medicina non permanet super eo, immo quamprimum propter cholerae mordicationem lubricat ex eo. Quae uero fiunt in intestinis crassis secundum plurimum salua sunt. Secundum prognosticum. Fluxus à cholera prassina malus ex eruginosa peior. Sed qui ex humoribus minus malignis secundum plurimum salubris. Quae uero ex melancholia adusta quae sparsa super terram ebullit & habet odorem acetosum mortalis secudum plurimum, esto quod uirius sit potens, & propter cum est incipiens iuxta aphorismum. 14. quartae particulae. Dysenteria si ex felle nigro inchoauerit mortale. Significat enim cancerum ulceratum aut ulcus caecorum. Et sequitur aliter. Quibuscumque in aegritudinibus acutis, aut multi temporis aut aliter extenuatis fel nigrum sursum aut deorsum exierit, sequenti die morietur, id est parum post, haec omnia intelligantur secundum plurimum esse uera, quia si mutantur in bonum & naturales superfluitates admixtas habuerint est bonum, ut uult Gal. Si uero melancholia non fuerit ualde maligna potest esse crisis, aut terminus alicuius aegritudinis, duae enim sunt species melancholiae per adustionem genitae ualde malignae, scilicet quae fit per adustionem cholerae, & est subtilis redolens amaritudinem. Altera per adustionem melancholiae, & est crassior et redolet acetositatem siue acredinem, & ab utraque coniunguntur. Et utraque sparsa supra terram ebullit, sed magis ea quae redolet acetosum. Tertium propriè gracilia est mortale omnino. Si uero crassa perforantur non omnino mortale, immo quidam uiuunt in quibus post perforationem intestini apostematur uenter, & rumpitur, & feces, & uermes, per foramina egrediuntur. Et secundum plurimum cum egreditur ex intestino aliquid saltem aliquanotabilis quantitas moritur aeger, etiam si sit de crassis, quanto magis ex subtilibus & propriè ex ieiuno, nam statim communitur stomachus & epas, nihil in stomacho retinetur & cadit uirtus, & non absoluitur à dolore continuo usque ad mortem. Quartum prognosticum. Fluxus sanguinis puri in quantitate post dysenteriam ualde malus, significat enim profundationem excoriationis, ita ut uenae scindantur. Quintum. Cum sit egestio similis aquae postea similis unguento malum. Sextum. Post hydropisim egestio sanguinolenta mortale propriè perseuerans, non enim educitur materia hydropisim sed quae uirtutem debilitat. Septimum prognosticum. Spasmus uomitus & singultus conturbatio rationis post dysenteriam, immo post omnem fluxum, mortis significat. Octauum est in uentrem in libro secretorum Hip. si habenti dysenteriam appareat post aurem sinistram res nigra similis orobis, & cum hoc accidit sitis uehemens, moritur aeger in secundo die. Nonum. Quandoque congelatur aliquid sanguinis effusi in uentre rupto intestinis significatur per frigus extremitatum subito inflatio nem uentris calum pulsus & syncopim. Si autem hie sanguis congelatur in intestinis accidunt haec accidentia, sed remissiora. Decimum. Ulcera & intestinorum excoriatione quandoque ducunt ad hydropisim. Undecimum. Quando post alkurat, id est frusta subtilia

intestinorum egreditur sanguis plurimus, significat quod ulcus profundatur, & aegritudo fit fortis, & finitur id quod est in superficie intestinorum, & peruenitur ad profunditatem substantiae eorum, quod si ante alkuit & excoriationem fluxus san. praecedat, difficile est cognoscere an sit ex intestinis, an ex membris frigidioribus, cum quandoque ex intestinis egreditur sine punctione à dolore notabili, & etiam cum periodis. Sed tamen discernitur quia intestinalis est aut permixtus cum fecibus, aut praecedit eas, scilicet quando est ab intestino recto & sphaeteri. Epaticus autem & qui est ab alijs membris supra intestina communiter subsequitur, & hic est minus timendus, quam quando praecedit alkurat uel excoriatio. Duodecimum. Si causa dysenteriae simul expellitur cum alkuit, tunc excoriatio est in uia additionis propter inseparabilitatem causae. Quod si abscondatur causa & solum alkurat expellitur res tutior est, & melius de salute sperandum est, & soli excoriationi intendendum est, cum in primo casu simul excoriationi & causae sit intendendum.

Cura fluxus intestinalis quae dicitur diaria, scilicet aliorum humorum praeterquam sanguinis sufficienter sopraposita est. Et similiter fluxus cibalis quae dicitur lienteria. Superest enim ut curremus fluxum sanguinis ab intestinis sine excoriatione qui prouenit à dilatatione orificij alicuius uenae, uel plurimum, aut ex ruptura earum. Et secundo curremus fluxum sanguinis ex excoriatione prouenientem. Et tertio dysenteriam & ulcera intestinorum.

Cura primi exigit quinque intentiones. Prima sanguinem diuerit. Secunda, causam fluxus remouet. Tertia ipsum sanguinem constringit. Quarta, corrigit accidentia. Quinta, ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium.

Prima intentio perficitur cum phlebotomia basilicae si epas fuerit in causa. Si autem in causa fuerit retentio menstruorum, aut hemorrhoidarum phlebotomentur saphenae, & si in causa sit repletio in toto phlebotometur uena communis.

Secunda intentio, si causa fuerit cholerica permixta cum sanguine est ipsius euacuatio fienda cum his quae sanguinem constringunt, sicut 3. z. reubarbari aliquantulum torrefacti cum aqua plātaginis, aut aqua calibeara sumptae, & mirabolani citrini sunt ad hanc intentionem, & si in causa fuerit aquositas sanguini permixta sumantur mirabolani Kebuli cum uirtute turbithe.

Tertia intentio constringens sanguinem fluentem perficitur cum bolo armeno, lapide emathitis, Karabe, acatia, sang. drac. Trochiscis de Karabe, de terra sigillata exhibitis cum succo plātaginis, aut syrupo de myrto si fuerit in intestinis superioribus, aut cum eisdem dysenterizatis si fluxerit ab intestinis inferioribus aut cum utrisque si fluxerit ex medijs.

Quarta intentio requiratur superius in cap. gñali.

Et similiter quinta quae est debitum regimen. Si autem fluxus sanguineus fuerit ab excoriatione curetur ut supra dictum est, & cum hoc attendatur excoriationi & ulcere cum his quae statim dicuntur. Non enim bonum est in singulis capitulis eadem replicare.

Cura dysenteriae quae secundum plurimum pendet ex materia ab alijs membris ad intestina deriuata nouem exigit intentiones. Prima, causam remouet.

Secunda

Secunda, intestina ab humoribus in ipsis dolorem generantibus mundificat. Tertia, diuertit. Quarta, regit membrum mittens. Quinta, conftringit & cum hoc intestina excoxiata consolidat. Sexta, si fuerint ulcera ipsa mundificat. Septima, ipsa consolidat. Octaua, corrigit accidentia. Nona, ordinat debitum regimen, pro quibus duabus ultimis recuratur ad capitulum generale.

Prima intentio perficitur corrigendo aërem, prohibendo cibos, potus, & medicinas ipsius faciuas & foetias, & corrigendo quascunque causas primitiuas siue corporeas huius fluxus dysenterici. Sed quia multitudo aut malitia humorum secundum plurimum est in causa inchoandum est ab eorum euacuatione. Si ergo fuerit sanguis in causa, aut alij humores cum sanguine peccauerint incipiendum est a phlebotomia saphenarum si in causa fuerit repletio sanguinis, hanc morbo ydalis aut menstrualis. Et si in causa fuerit epas ipsum multiplicans, aut sua caliditate ipsum adurens, & inflammans phlebotomeur basilica aut saluarella dextra, & si in causa fuerit splen basilica aut saluella sinistra, & si fuerit repletio in toto non facta propter aliquod membrum de supradictis phlebotomeur uena communis, & hauriatur quantitas sanguinis secundum quod exigit repletio uirtus & cetera, a quibus queritur licentia in phlebotomia. Si uero alij humores sanguine ducti super fuerint, aut forte ipsi absque peccato sanguinis fuerint in causa, educantur etiam iteratis uicibus cum his quæ non sunt exoluentia, immo aliquod uestigium stipticitatis derelinquant, de quibus in ea generali curationis fluxus dictum est, & si pro his euacuationibus complendis opus esset digestionem, digerantur humores secundum plurimum cum his quæ ingrassant & inuiscent & stipticant calidis aut frig. secundum complexiones & humorum exigentiam confortantibus membra nobilia & proprie nutritiua per uirtutem tertiam de quibus supra in cap. generali dictum est.

Secunda intentio, scilicet mundificatio intestinorum & doloris sedatio compleitur cum his quæ dicta sunt supra in secunda intentione regiminis fluxus uniuersalis. Et similiter completur tertia, quarta, & quinta, sicut supra dictum est in eodem cap. generali.

Sexta intentio, scilicet excoxiatio & ulcers mundificatio perficitur cum infra scriptis medicinis. Si quidem excoxiatio fuerit superficialis & cum signis caliditatis sufficit clystere ex aqua hordei. 3. 15. olei ro. 3. 3. adipis renum capræ. 3. 2. & tepidum sicut lac nouiter emulsum imponatur, sed maiori existente caliditate his addatur. 3. 2. succi plantagi. aut succi portula. Si uero fuerint in intestinis superioribus bibantur aquæ hord. medicinalis. 3. 6. aut circa debite caliditate stomachi ieiuno, & huic pro stomachi confortatione possit addi iulep ros. pro tertia aut quarta parte. Si uero excoxiatio profundior & cum pauciori caliditate cum apparatus alicuius sanici aut phlegmatici uiscosorum supra scriptorum, possunt addi dugo. 3. mellis ros. & si ulcus esset profundius cum eductione phlegmatis uiscosi acuti aut sanici crassioris fiat clystere ex aqua mellis. 3. 15. melle ros. 3. 3. & dimittatur oleum & adeps. Si uero esset ulcus putridum cum sanie ferente clysterizetur cum. 3. 12. aquæ salite, aut aquæ piscium salicorum, aut aquæ oliuarum condi-

tarum, & addi possunt. 3. 3. mellis ros. sed melius est oximel simplex, melius tamē est ut prius temperetur clystere ex tribus partibus aquæ hordei & una parte aquæ salite & gradatim procedatur in acuitate, & clystere ex urina factum est ad hanc intentionem efficax.

Trochiscis autem de arsenico non auderem uti nisi in modicissima quantitate & in forti & carnoso, & in intestinis crassis inferioribus, & in eo qui non est ualde acuti sensus, neque febriens faciendo clystere paruum, ut. 12. aquæ hordei. 3. 8. trochiscorum de arsenico. 3. 1. misce. Descriptio trochiscorum de arsenico, & est uariis. 12. arseni, sandarace. ana. 3. s. calcis uite. 3. 3. charitæ bombacinæ combustæ, acacie. ana. 3. 1. fac puluerem, & cum succo amomolæ fac trochil. 3. 1.

Trochisci. A uic. 12. sumach capitum granatorum, & succo eorum balauftiarum, id est filorum granatorum agrestium, licet moderni balauftias pro caduco granatorum accipiunt, & sunt capita granatorum interiorum, acresce, chalcanthi, colorati. ana. 3. 1. & sunt duæ species utriusque, aris usti, antimonij, floris aris. ana. 3. s. fiant trochisci cum succo plantaginis, & sunt ualde fortes, & experietur primo cū. 3. 1. in aqua hordei, uel lacte, quidā tamen his trochiscis addunt opium ut dolor conlurgens extro. mitigetur, sed non ponatur ultra duo grana aut tria pro quolibet clystere.

Et quidam ante impositionem clysteris suprapitui stupefaciunt cum lychinio aut clysteri opiato, ut deinde clystere corrosiuum sequens primo eductio possit facilius tolerari sine dolore, & est melius. Sed obserua in impositione huius clysteris conditiones supraprescriptas. Si uero sit ulcus corrosiuum quod distingat a putrido, quia procedit corrodingo substantiam ipsorum intestinorum, ita ut possit sanari, aut si mul cum sania sanguis egredietur, non autem procedit putrefaciendo, & non est cum eo feror sicut cū trido.

Curetur tamen frigidis sicis stipticis sicut cū trido. Curetur tamen frigidis sicis stipticis sicut cū trido. Curetur tamen frigidis sicis stipticis sicut cū trido. Curetur tamen frigidis sicis stipticis sicut cū trido.

Septima autem intentio, scilicet ulcers consolidatio perficitur si ulcera fuerint cum caliditate cum thurtia, cerusa, lythargio, spodio, bolo ar. sang. drac. tra-

gacantho, gummi arabico, succo plantaginis, & similibus. Cuius pulueris accipiantur. 3. 3. & dissoluantur cum succo plantæ, aut aqua calibeata quæ sit 15. 1. aut plus, aut accipiantur aliqua decoctio conficienda ex supradictis in cap. generali, sicut quæ sit ex ros. myrro to floribus talli barballi, copulis gladium, milio aut hordeo torrefactis & similibus. Neque in istis sedatur adeps aut oleum nisi quantum esset necessarium pro mitigatione doloris. Et si esset ulcus cū signis frigiditatis, pulueres positi in clysteri sint thus, sed melior est cortex thuris, myrra, sandaraca, litum. Et decoctio sit facta ex cyperis, nucibus cypressi, myrro, & similibus, in aqua ferrata. Si autem ulcus sit in intestinis superioribus, facta mundificatione, non quidem cum corrodentibus, sed cum aqua hordei, aut aqua mellis, de quibus supra consolidatur. In causa calida cū succo plantæ. 3. 1. boli ar. 3. 1. quæ medicina bis in die

bis in die exhibeatur stomacho ieiuno, & non fallit. Si uero fuerit cum signis frigiditatis accipiat succi plantaginis unciam unam, boli armen. thuris, mastiches, ana scrupulum unum, aut huiusmodi pulueres sumantur cum aqua calibea aut uino ferrato, aut exhibeatur uinum & aqua calibea infusionis, thuris, mastiches, tragachati, macis, garioph. & similiū. Pro reliquis duabus intentionibus recuratur ad capitulum generale fluxus ut dictū est supra. Et hæc de cura dysenteriae sufficiant.

DE TINESMO, ET EST
fluxus ab intestino recto. Cap. III.

Timesmus immo potius *σπασμὸς* græce, idem sonās quod gemitus latine. Dictum a *σπᾶσθαι* uerbo græco idem quod gemo significante. Est descriptiue expressio intestini recti cū gemitu & conamine ad egerendū facta ab expulsiua stimula causa præternaturali ledente ipsum aut extremitatem eius.

Prima distinctio, timesmus est duplex, uerū et non uerum. Verum est a cā corporea affixa substantiæ intestini recti aut extremitatis eius. Non uerū autē est cū sita causa incorporea, aut incorporea nō fixa in substantia intestini recti, aut extremitatis eius, sicut a fessioe super lapide duro, aut frigiditate extrinseca, aut a sece dura, aut a materia fluente per intestina & anū, quæ non figitur neq; inuiscatur in intestino recto aut extremitate eius.

Secunda distinctio, quoddam est purū, et est absq; materia quæ sit cā eius, quoddam impurū, & est cum materia quæ existit cā eius & manifestum est qd huiusmodi distinctiones non coincidunt.

Causa est duplex, corporea, & incorporea. Corporea est duplex. Aut propria in eo existens, Aut a superioribus effusa. Propria est materia cholericā in eo imbibita pungens & stimulan, aut phlegmatica adherens & inuiscata, quæ per putrefactionē aut putredinem & admixtionem, & acquisiuit acuitatem salēdine & baurachitatem, sicut est phlegma putridum aut salum quæ materia grauat aut pungit, aut melancholia adusta, aut sanguis acutus, uel est apostema cālidum aut durum grauat qd putredinem acquisiuit, aut sua uirulentia reludante molestās, aut ulcera corrosiua, fistulæ, hemorrhoides occulte & ragadiæ. Sed a superioribus effusa est duplex. Aut materia acuta sicut humores, sanies, & similia fluentia per intestinū rectum sicut accidit in fluxibus. Aut est fex sicca dura exasperans, quæ in incessu suo pōgēdo & grauatō stimulat intestinum ad expulsionem.

Nonnunquam uentositās est cā timesmi pungendo & stimuādo extremitatem recti. Incorporea autem est res extrinseca infrigidans intestinū rectum, sicut a frigido obuians ano discooperto, aut aqua frigida cum homo stat in ea, aut fessio super lapide duro frigido ledente contundendo et infrigidando. Est autem contusio species solutionis continuitatis. Similiter mala complexio calida siue materia multum excedens. Et quæcūque causa impressa sit potest esse in remanentes circa iterum stimulando est causa tenacitatis. Similiter dysenteria aut suppositorium,

& introitus cimicis in anū, & uermes ad ipsum prouenientes. Cibi quoque acuti & salis maxime uiscosi possunt esse in causa aut immediate si secundum aliquod eorum particulam in ano retenti sint aut mediate feces ex ipsis genita. Timesmus autem frequētius evenit a frigiditate siue materia quam a caliditate quia intestinum rectum facilius alteratur a causis infrigidantibus communiter occurrentibus quam a causis calefacientibus, quia in habentibus symbolum facilius est transitus. Est autem complexio intestini naturaliter frigida, tū quia frigiditas est magis sibi discōueniens, sicut & cæteris membris frigidis, iuxta 18. aphorismum 5. particulae. Frigidum inimicum neruis &c. Mouetur autem natura ad huiusmodi frigiditatis & reliquorum nocentium expulsionem contrahendo musculos uentris comprimendo intestinum rectū, et ipsum extendendo, & anum dilatando, & huiusmodi nocitiua per anum educant, quāuis non sit, possibilis ipsius frigiditatis educatio cum sit res immaterialis. In hoc enim natura decipitur credens id nocitum esse re materiale educibilem cum non sit, sicut etiam decipit in tussi & nausea, & sternutatione a causa immateriali pendentes.

Signa communia cuiuscūq; timesmi sunt subitum desiderium & conatus ad egerendum cum expressio ne recti intestini, & extensione, & ani apertione, & si quid egreditur in principio est modicum pingue & uiscosum. Deinde apparet puncta sanguinis parua. Deinde plus de san. non ualde permixto cū reliquo quod egreditur. Est enim cōmuniter illud quod est in immateriali egreditur mucositas quædā, & phlegma stagnans intestinū rectū uiolenter propter multum conatum expressum. Apparent autem puncta sanguinis parua propter separationem phlegmatis stagnantis a fece intestini recti. Deinde apparet plus de sanguine illo phlegmate profundius euulso cum aliquā ex coriatioe, hæc aut quæ dicta sunt de eo quod egreditur sunt propria signa timesmi ueri. In non uero enim pēdente a causa primitiua quandoq; nihil egreditur, & in pēdente a materia deluper effusa secundū plurimū multū egreditur, sicut accidit in fluxibus.

Distinguitur etiam uerum a non uero expunctio ne pruritu pondere fere continuis in uero. In non uero autem cum maiori interpolatione distinguitur purū siue immateriale ab impuro siue materiali quia in puro preter materiam, de qua supra fere cōmunē omni timesmo nihil egreditur, sed in materiali preter suprascripta secundum plurimum egreditur aliquid de materia quæ est in causa.

Cognoscitur autē materiam esse a superioribus influxā, quia primo præcessit fluxus illius materie, postea secutū est timesmus. Et crescit timesmus cum materia illa per intestina descendit, quæ euacuata cessat aut minuitur timesmus, & nunquam redit aut crescit nisi noua materia descendente.

Sed ubi materia non sit in fluxu, immo sit solum affixa aut inuiscata in intestino recto ad sunt signa contraria & accidentia timesmi sunt magis uniformiter continua. Sed materia cholericā cognoscitur ex regimine præcedente multiplicante choleram, & ex signis dominij cholere in corpore egri. Item, expunctio percepta in recto & ano, & exuentia sunt citra uel citrinatā admixta. Et quia a mundificatibus

lychinio ochel. Recipe sanguis draconis, boli arme, ceruse ablute cum aqua ro. ana drachmas duas, masti. unciam semis, opij, hyoscyami, croci, ana scrupulum unum, corti gra. scrupulum unum, & cum uino stipitico fiant lychinia, aut cum albumine oui, & ualet in causa calida, sed in frigida castoreum, thus, crocus, & litium cum opio misceatur secundum exigentiam. Et si uis lychinia non opiat. Reci. masti. myrrae, sandaracae, thuris, ana scrupulum unum, litij, laudani, ana scrupulum semis, cerusae, sanguis draconis, ana scrupulum unum puluerizentur, et cum uino fiant lychinia. Et haec eadem sine opio sufficient ad complendum tertiam intentionem si sibi addantur aliqua stipitica calida aut frig. secundum exigentiam dylcrasae corrigendae.

Pro complenda autem quarta intentione maxime corrigendae sunt uigilae, ardor, dolor, & punctio, quae omnia optime sedantur cum lychinijs supra descriptis & ceteris de quibus supra, pro his etiam accedentibus corrigendis recurratur ad capitulum generale curae fluxus.

Regimen uero sex rerum iuxta quintam intentionem declinet in tenasione cholericum ad frigidum, et sit temperate stipiticum stomachi & membrorum naturalium confortatiuum si per compassionem aliquod eorum debilitatum fuerit. In tinesimo autem fleumatico declinet parumper ad calidum, aut sit temperatum in actiuis similiter moderate stipiticum & melancholico ad frigidum & humidum. In sanguineo ad frigidum & siccum.

Si uero tinesimus pede ab apostemate facto per tiam defluxus exigit triplex regimen. Primum respicit causam antecedentem complendam euacuatione diuersione, & fluxus materiei prohibitione. Si ergo materia peccet cum sang. fiat phlebotomia basilica, imò fere nunquam a phlebotomia est excusatio, & si repletio sit communis in toto phlebotometur communis, et si repletio hemorrhoidarum aut menstruo sit causa phlebotometur saphenae, & uomitus est magis conueniens quam uentris solutio. Quod si solutio fuerit necessaria fiat cum lenientibus sicut manna, cassia, sed distemperetur cum decoctione myrabolanorum, bdellij, & similibus prohibentium fluxum humorum ad locum apostematū, & decoctio myrabolanorum citri. in cholerica, kebulorum in phlegmatica, indorū in melancholica et reubarbari in mixta ex cholera & phlegmate est conueniens. Venose quoque appositae super epate splene & spatulis conferunt diuertendo, & similiter urinae & sudoris prouocatio, prohibetur autem fluxus materiei ad locum maxime si fuerit calida subtilis sicut suc. granatorū eyd. & similibus. Item, lac & syr. de papa. & oxyzacurbitae, citruli, hordei, & similibus. Sed in crassantia stantiora quam uentrem stringentia sed in causa frigida eligantur temperate ad calidum declinantia aut uino, & aromatibus, & similia.

Secundum est regimen particulare complendum in principio cū reperculsiuis dolore sedantibus sicut

est oleū ros. & myrtinum dylsterizatū et lychiniū ex cotto molli in eis intinctum & repidum suppositū si possit retineri absque dolore, & materia existente multum calida, haec olea possent lauari aut cū eis misceri succi infrigidantes sicut lactuca solatri semperuiuae, plantaginis, & similibus. Sed in causa frigida his addatur oleum chamomellinū & sisaminum, similiter exterius ungatur & epithimetur fiteri peritoneum renes pedē inguina cum filtro in his oleis infuso, & partibus praedictis applicito, & similiter infuso in aqua decoct. ro. myrti & similibus quibus in causa frigida posset addi purum schinathi, & florum chamomillae, et in his quae applicantur exterius posset admisceri parum aceti ad repercutiendum. In augmento uero supra scriptis oleis frigidis cum dylsteri imponendis addenda sunt calida resoluētia & mollificātia, sicut oleum anethinū, lilios alb. de spica, butyrum, adeps renū, caprae oleum sisaminum, amig. dul. & similia, & bdellium est proprium. Et possunt fieri decoc. & emplastrum ex rolis, myrto, rad. maluaufici, floribus chamomillae, anetho, sem. lini, fenug. & si maturetur fiat dylster ex decoct. maluaufici, fenugraeci, feminis lini, in qua bdellium sit dissolutum, & butyrum, & adeps renum caprae, & si humor sit multum frigidus addatur hyssopus humida, cum his decoctionibus potest epythimari dylsterizari & in ipsis potest federe, & cum fece earum potest emplastrari. Et in causa frigida cepae album allatum cū butyro & hyssopo humida exterius applicitum est optimum maturatiuum, in apostemate autem duro mollificantia uincant resoluētia, & medullae, adipēs, oleum sisaminum, amig. mucilagines, maluaufici, fenugr. sem. lini sunt proprie, & similiter butyrum. Et si fuerit frigiditas notabilis hyssopus hu. Et si apostema esset cancrum omne regimen declinet ad frigidū & hum. & dylsterizetur cum oleo uiō, aut ros. 3. 6. aut 7. quibus possunt addi butyri recētis, 3. 3. & omnia diu ducta sint in mortario plumbeo, & pro huius cura quae debet esse blanditiua, cum cura uera non sit possibilis recurratur ad capitulum de cancro, & in summa in his apostematibus procedatur secundum suorum temporum & materiae exigentiam. Vltimum autē regimen comprehendens correctionem accidentium & regimen sex rerum non naturalium qualiter debeat compleri patere potest ex supra scriptis. Dieta. n. debet esse ualde tenuis & uentris lenitiua non constipatiua declinans ad calidum aut frigidū, hu. aut sic, secundū materiae exigentiam & reliquorū, a quibus sumitur indicatio, & quanto egritudo est acutior dieta debet esse magis tenuis, quod si apostema rumpatur curetur cura ulcerum, ut statim dicetur.

Si uero apostema genitum sit per uiam paulatim factae congestionis, duo ultima regimina sunt necessaria, sed primum omittatur, quia respicit causam antecedentem transeuntem in coniunctam.

Si uero tinesimus sit ab ulceribus & corrosione in intestino recto & extremitate eius. Primo mundificetur cum aqua aut uino decoct. mel. aut mel. ro. Et si adsit putredo in loco quod cognoscitur ex egressione uirus fetentis mali coloris supra scriptis addat oxy mel simplex, ita ut 4^a pars, aut addat aqua salita, aut oli uas salitae, p. 3^a aut 4^a parte, & haec dylsteria sint pauca quātitate cū sint acuta. 4. aut, 6, 3. iam intestinis

a fecibus mundificatis, & ubi esset maior putredo cū aqua mellis misceatur aqua decoctionis aluminis, & quando hæc non sufficerent cum uncis 6. aquæ hor. misce a duabus drachmis usque ad unciam s. unguenti egyptiaci. Rasis tamen 9. Almā. cap. de fluxu ventris quando tinemus fuerit longi temporis in quo non egeratur sanguis, sed rasura alba mucilagini similis docet administrari medicamen quod in curatinguiarum putrida posuit quod est medicamē acutum ualde, factum, scilicet ex arsenico citri. & rub. & calce &c. Sed consulo ut cum leuioribus procedas, et si sequetur mordicatio clysterizetur immediate cum oleo tepido, postea consolidetur cum ungento de cerusa cum aqua calibeata aut succo plantaginis clysterizato, aut inijciantur pulueres consolidatiui, sicut cerusa, lithargyrium, plumbumustum & lutum, thuria præparata, cadmia, anthimonium & similia, quibus potest addi aloës lotum, & sarcocolla nutrita, & in summa curetur cura ulcerum intestinorū de qua supra. Et apud Franciscum de pedemōtium, oleum uetus clysterizatum cum acresta est proprium et pulueres superscripti possunt cum cannula in ano imposita insufflari. Sed semper ante immisionem harum medicinarum mundificantium aut consolidantium educantur feces cum clysteri ex aqua mellis aut hordei.

Possunt etiam fieri lychinia longa ex melle aut adipere num capre & secum misceri huiusmodi mundificantia aut consolidantia, & sint longa ut attringant ad locum ulceratum. Et uitentur cibi acuti falsi amari acetosi ualde qui possunt facere feces acutas. Et sint potius lenientes quam constipantes. Si uero sit excoaratio lenis sufficiat iniectione cerusæ aut unguenti de cerusæ, aut aliquid ex pluribus superscriptis cū aqua hordei, aut succo plantaginis, & similibus, aut ex similibus fiant lychinia longa. Si uero pendeat a ragadijs hæmorrhoidibus & fistulis eius cura inferius proprijs cap. perquiratur.

Si uero pendeat a fecibus siccis eius cura perquiratur in capitulo de cura colicæ a febribus siccis, & in summa feces cū clysteribus & sumptis superius mollescentur, deinde cum clysteribus superscriptis quibus acuta addantur, & proprie mel in magna quantitate educatur. Verum clysteria & sumpta per os declinat ad calidum aut frigidum secundum fecum maiorem acuitatem aut minorem, & cæteris circumstantijs a quibus queritur indicatio.

Si uero pendeat a frigidityte ano impressa omne regimen declinet ad calidum tam sex rerum non naturalium quam medicinale & proprie teneat anum uentrem & partes circumstantes ani calidas, & feces educantur cum oleo anhetino silamino aut communi quibus educatione addatur aliquid acutum si opus est sicut mel aut urina, postea clysterizetur cum oleo anhetino, ruthaceo, & similibus, quibus uinum potens dulce admisceatur aut clysterizetur decoctiones rerum calidarum mollificantium aut lenientium, aut secum talia misceantur, sicut olea & adipēs, aut fiant fomenta & sessiones in huiusmodi, aut sacculi ex rebus calefacientibus ano applicentur, aut sedeas superasere cal. aut ueter catuli ano applicet, aut filum bulitū in aqua ano applicet aut uesica plena oleis aut decoctionibus calidis ano applicetur.

Si uero pendeat a caliditate omne regimen declinet ad frigidum, & in hoc casu oleum ros. ui. lucci frigidantes inuncti cataplasmati clysterizati sunt convenientes, clysterizata tamen debent esse acta tepida.

Si uero tinemus pendeat a uentositate, fiant clysteria carminantia uentositatem ex decoctione seminum anethi, anisi, karui, dauci, rutæ, ameos & similium, cuius uncias octo addantur olei anethini, olei ruthacei, ana 3. 2. Et cum similibus decoctionibus potest locus fomentari, & in ipsis potest sedere. Rasis tamen 9. Alman. præcipit duo opiata, scilicet trochiscos & confectionem de styrace, quorum descriptionem in textu exposui, simul enim stupefaciunt & uentositatem resoluunt. Reliquum regimen perquiratur ex cap. de colica uentosa.

Solutiua tamen minus hic conueniunt quam ibi. Si uero tinemus fuerit ex reliquijs medicinæ abstergatur et lauetur cum clysteri ex aqua hordei, oleo uiolaceo, zucharo & similibus, & si timueris excoarationem laua adipem renum capræ cum aqua frigida, & superscriptis adde, & si inceperit excoaratio adde cerusam lotam cum succo plantaginis & oleum ros.

Et similiter si fuerit ab acuitate clysteri laua & in frigida, & locum confortare apostemetur cum superscriptis, & si fuerit a cimice & uermibus interficiantur & educantur cum his quæ dicuntur in capitulo proprio. Et si fuerit a cibis acutis & falsis clysterizentur cum aqua hordei et oleo uiolaceo, et si quid fuerit uiscosum cum magis abstergentibus sicut cum aqua mellis, & si fuerit ex cæcissie super re dura admiscetur decoctione rosarum chamomillæ & anethi debite calida approximata cum filtro, & unctio ex oleo rosaceo, chamomillæ, & adipe gallinæ, & si timeretur apostema approximetur oleum ros. solum.

DE FLUXV epatico.

Fluxus epaticus qui descriptione est fluxus factus uitio epatis apud Auicennam habet nouem species penes materiam distinctas.

Prima est chylosa. Secunda phlegmatica, quam Auicenna sub aquosa comprehendit. Tertia cholericā. Quarta melancholica quam Auicenna in nigram subtilem fellēam in nigram fecalem & nigram melancholicam subdistinguit. Quinta sanguinea pura. Sexta lotiua. Septima fetida. Octaua uirulenta. Nona est res crassa nigra quæ est substantia stomachi aut epatis.

Fluxus autem diuersorum colorum licet possit contingere uitio epatis, & sic dici epaticus, qui magis in epate contingit ex diuersitate partium chyli, & consequenter ex diuersitate cibi & potus quam propter diuersam & difformem dispositionem partium epatis, congruentius inter quinque fluxus a toto superius connumeratus est, cum frequentius contingat membrorum totius corporis diuersam & difformem esse dispositionem quam solius epatis, sed de hoc ibi dictum est quantum est opportunum. Sed nunc sigillatim species nouem superscriptas ab-

soluamus.

solumus. Postatamen prius differētia inter solutio-
nem epaticam & intestinale. Secundo inter epati-
cam & stomaticam. Tercio inter epaticam et melerat-
calem, cum hæc omnes cum epatica in aliquibus con-
ueniant præcipue in excrementis.

Differ epatica ab intestinali, & proprie quæ est cū
rasura aut ulcere intestinorum. Primo quia epatica
est sine dolore intestinorum, imò etiam frequenter si-
ne dolore epatis. Sed intestinalis ita dicta est cum do-
lore notabili intestinorum. Secundo quia epatica est
multa & cū interpolatiōe notabili scdm plurimum.
Sed intestinalis est paulatim facta et fere cōtinua. Ter-
tia differētia sumit a permixtione secum cum solu-
tione antepositione aut postpositione. Intestinalis, na-
sangui aut sanies est semper fere permixta cum feci-
bus, & magis ea quæ a superioribus uenit intestinalis
quam quæ ab inferioribus. Sed epatica aut descen-
dit sola si non inueniat fecem in intestinis aptam de-
scendere aut descendit post egestionem sibi contigu-
am, facit enim egestionem descendere cum applicatur
ad eam. Et hoc maxime uerum est si egestio sit
prope anum. Si enim egestio siue fex esset distans
posset secum permisceri in longo trāsitu. Nunquam
tamen solutio epatica præcedit fecem, ita ut fex im-
mediate subsequatur, & in hoc differt a sanguine hæ-
morrhoidalī, ille enim frequenter immediate præce-
dit fecem, et certissimum signum sanguis hæmorrhoi-
dalis est si appareat egredi saltando sicut ex phleboto-
mia. Quarta differētia est quia epatici præcesserunt
epatis nocumenta et concomitantur absq; nocu-
mentis intestinorum, sed cū intestinali adfunt & præ-
cesserunt nocumenta intestinorum absq; nocumen-
tis epatis. Quinta differētia, quia epatica est secun-
dum plurimum chronica, intestinalis autem acuta.

Sexta, quia epatica cum retinetur cum oppilantibus
et costringentibus, sequitur nocumentum secundum
plurimum, raro enim absoluitur ab oppilatione, &
etiam si non esset oppilatio, frequenter sequeretur no-
cumentum, ut patet discurrendo per causas eius, sed
intestinalis frequenter sine nocumento retinetur.

Epatica autē & stomatica licet conueniant in exi-
tu chyli. Differunt tamē. Primo quia in epatica chy-
lus est æqualis perfecte digestus. Sed in stomatica im-
perfecte. Item, in stomatica secundum plurimum de-
scendit cibus cum chylo & adest lienteria, sed in epa-
tica minime. Tercio in stomatica adfunt nocumenta
stomachi & non epatis, saltem manifesta, sed in epati-
ca adfunt nocumenta epatis manifesta.

Sed differētia inter solutionem epaticam & me-
leraticam, licet conueniant in egressionē chyli, est.
Primo, quia chylus in epatica est tendens in sangui-
nem, cum iam epas impreserit aliquid digestionis.
Sed in melericali minime aut leuissime. Secundo,
quia in epatica adfunt manifesta nocumenta epatis
quæ ex urina & fecē ex grauitate & dolore & simili-
bus circa regionem epatis comprehenduntur, aut
sed in melericali non adfunt hæc nocu-
menta, imò adfunt nocumenta melericali
grauitate circa
dorsum per
ceptis.

DE FLV XV EPATICO

chyloso.

Fluxus epaticus chylosus est descriptiue flu-
xus chyli qui est substantia subtilis alba in sto-
macho per primam digestionem ex parte me-
liori cibi genita, deinde in intestinis perfecta.

Hæc species non habet nisi modos quosdam se-
cundum magis & minus differentes. Quandoque
enim torus chylus egreditur, quandoque pars eius.

Hi autem fluxus licet possint contingere uitio
stomachi solum, tamen de eo hic agemus qui proue-
nit uitio epatis, nā de stomacho superius dictum est
quantum est opportunum.

Hic autem quinque ex causis contingere potest.

Prima causa quia chylus est pluris quantitas
quam sit expediens pro corpore nutriendo. unde
quod superfluum est ab epate renuitur, & tanquam
superfluum ab intestinis expellitur. Generatur au-
tem plus de eo quam sit expediens propter superflu-
um appetitum stomachi cum bona eius digestionē,
& quia cibus assumptus est multus & multi nutriti-
ti & paucarum superfluitatum facile in chylum con-
uertibilis. Idem etiam fluxus posset contingere si chy-
lus genitus esset nimium crassus aut uiscosus. Aut al-
ter male conditionatus, ob defectum stomachi, aut
cibi. Secunda causa, quia epas fuit creatum paruum,
unde non potuisset multum chylum continere. Ter-
tia est apostema concavi epatis aut melericarum qd
licet possit periderea quacunque materia, est tamen
secundum plurimum sanguineum & frequenter per-
mutando efficitur durum. Quarta causa est oppila-
tio concavi epatis aut melericarum attenuatoria aut
coartatoria aut carnosa. Si, n. essent in gibbo fieret
fluxus humoralis, cum humores in concavo gene-
rentur, licet in gibbo perficiantur. Quinta est debili-
tas attractiue epatis uel melericarum, licet maxime
epati approprietur, non est enim attractiua melerica-
rum de qua sit curandum, sit enim attractio in uir-
tute epatis. Hæc autem debilitas licet possit a quacun-
que speciemalē complexionis cum superfluit contin-
gere, secundum plurimum tamen pendet a superflua
frigidityte, & quandoque a multitudine euacuatio-
nis tam per uomitum quam per alias regiones.

Signa fluxus chylosi absolute manifesta sunt co-
gnoscenti chylum qui est albus subtilis sicut pusillana
hordeacea, siue solus expellatur, siue cum alijs excre-
mentis permixtus. Sed quod proueniat ex chylo am-
pliori cognoscitur, quia patiens non macrescit & co-
medit amplius consueto, & forte cibos pluris nutri-
menti & in summa est cum bona habitudine & con-
stantia uirtutum naturalium. Quod uero chylus
sit crassus aut uiscosus aut aliter male conditionatus,
cognoscitur per uisum, & quia utitur regimine ma-
lo, aut forte adest mala stomachi dispositio cum ca-
rentia aliarum causarum. Quod autem sit hic flu-
xus a paruitate epatis cognoscitur, quia est a genera-
tione contractus. & quod cum comedit parum pro-
uice & frequentius melius se habet. Quod autem
sit ab apostemate epatis aut melericarum & a qua
specie apostematis cognoscitur per signa superius di-
cta in passionibus epatis, ad quas recurrendum.
Et similiter est illuc recurrendum pro cognoscendis

opilationibus epatis & melaicarum. Inter quas & apostema est distinguendum, & maxime per febrem quae necessario sequitur quodcumque apostema epatis & melaicarum, licet in apostemate melaicarum sit ualde remissa, cum opilatione aut secundum plurimum non est febris. Item quia ad apostemata uehementiora sequuntur noxamenta, & in breviori tempore quam ad opilationes. sicut decoctio appetitus, singultus, arefactio hydrops & similia. In ceteris enim signis communibus multum simulantur. Et hic nota quod fluxum esse periodicum, est signum fere commune omnibus fluxibus opilatiuis secundum aggregationem materiae in determinato tempore, minus tamen fluxibus chylosi conuenit, licet sint cum opilatione. De fluxu autem opilatiuo inferius faciam speciale capitulum, ad quod recurro. Quod autem sit a debilitate attractiue cognoscitur per carentiam aliarum causarum, & per praesentiam male copulationis in epate uerisimiliter ipsius factiuae quae secundum plurimum est frigida. Pro cognitione autem specierum malae complexionis epatis in causa recurritur ad superius dicta in passionibus epatis.

Prognostica. Primum hic fluxus secundum plurimum curat nisi pendeat ex apostemate, exigit tamen medicum expertum & diligentem. Secundum, hic fluxus est ex eis qui cum dimittuntur arefaciunt & debilitant uirtutem, & quando retinentur & proprie cum opilatiuis confringentibus insistantur in superioribus, & confringitur anhelitus.

Cura epatici chylosi. Si pendeat a nimia quantitate chyli, minoretur cibis. Quod si propter famem non posset abstinere dentur cibaria quorum multa quantitas parum nutriat, sint tamen boni nutrimenti sicut olera laudabilia panicum & similia. Curetur cura appetitus canini. Licet forte melius sit hunc fluxum sinere. Si uero chylus esset nimium crassus aut uiscosus, dentur cibi praebentes nutrimentum subtile, sicut uinum album, carnes auium laudabilium, uittelli ouorum, & si cum hoc sint aperitiui erit proficuum sicut brodium cicerum abiecta prima decoctione. Item decoctiones radicis feniculi, petroselinii, apij & simillium, & aromentizentur cum cinamomo. & panis suus sit communi fermentatior. Et si chylus fuerit aliter male conditionatus incidatur in contrarium regimini praecedentis, & stomachus si fuerit in causa corrigatur.

Quod si pendeat a paruitate epatis comedat frequentius & parum pro uice & cibaria boni nutrimenti subtilis & multi & paucarum superfluitatum non uentrem lubricantia.

Quod si pendeat ab epate concaui epatis aut melaicarum phlebotometur aut aliter euacuetur, & diuertatur, & quantum ad localia administretur secundum exigentiam suorum temporum & materiarum. Et diuersa sit reuulsio contraria diuersae apostematis, ita ut in apostemate saltem calido prohibeatur panis carnes & uinum praebeat tamen nutrimentum subtile facile penetrans, & pro cura huius recurratur ad capite de apostemate epatis. Et cauendum est ab administratione fortiter confringentium & opilantium tam interius quam exterius. Habeant tamen stipticitatem paucam cum singulari proprietate quibus sint epatis & membrorum naturalium confortantia, nec sint uen-

trem lubricantia. Si uero pendeat ab opilatione, curetur cura fluxus opilatiui de quo infra in capitulo proprio. Et si sit repletio sanguinea phlebotometur basilica aut saluatella dextra secundum exigentiam repletionis & uirtutis. Si uero materia opilans sit phlegmatica crassa aut uiscosa secundum quod est ut plurimum digeratur cum oxymelle simplici & aqua absinthij. Deinde euacuetur cum pilulis de reubarbaro aut alephaginis cum tertia parte agarici preparati, et pilulae de reubarbaro sunt fortiores. Tercio digeratur cum oxymelle composito ut scillitico aut syrupo de eupatorio & aquis absinthij apij aut eupatorii. Quarto euacuetur cum eisdem aucta dosi, & proprie cum pilulis de raued de eupatorio aut de alkekengi Meliae. & Auicenna dicit clysteria fortis aperitionis & attractiua, & similiter uomitiuum esse ex rebus magis tuius, si tamen appareat dominium caliditatis ducitur digerentia & euacuanti temperata aut ad frigidum dedinantia sicut aqua cicoreae aqua cucurbitae capillorum ueneris, syrupus bisantinus & acetosus simplex & compositus. Quinto aperiantur opilationes cum uithierica diacalamentho diacinaomo quae cum uino subtili aut aquis aperientibus exhibeantur, uinum tamen est melius ut sit antiquum, & sit 2. uel 3. Item passulae cum phisticis, seminibus communibus frigidis, anis, semiconfectis & cinamomo sunt praestantes & passulae solae optime conferunt aut cum diarrodon admixtae. Et si appareat dominium caliditatis detur diarrodon & semina communia frigida. Dieta autem declinet ad calidum frigidum aut secundum exigentiam dyserasiae & aliarum circumsistantur. Et ut sint cibi & potus aperitiui non opilantes. Et ut num sit album subtile non dulce bene clarum magis aut minus uinosum secundum quod oportet, nam plurimus potus uini passu rectis facit cadere in solutionem epaticam propter suam crassitatem & dulcedinem. Et cum apparent signa caliditatis pilula hordea confert. & dimittatur panis uinum & carnes, deacea confert. & dimittatur panis uinum & carnes, pro uice comedat, & cibis est partiendus ut parum constante uirtute, & cibis est partiendus ut parum ter ut fiat bona digestio, fiant fricationes toti corpori celebrata prima & secunda digestione, ut nutrimentum ad membra trahatur, & summo opere uitanda sunt opilantia & confringentia interius aut exterius applicata & ualde dulcia. Et haec cura est communis cuiusque fluxui opilatiuo chyloso, aut humoralis, siue opilatio sit in gibbo aut concauo epatis, siue in ter epas & intestina siue in membris quae sunt ultra epas. Si uero fluxus chylosus pendeat ex debilitate attractiue sequentem malam complexionem frigidam cum materia sicut accidit secundum plurimum procedat eodem modo qui dictus est in cura fluxus opilatiui a materia frigida. Verum ceterum non indigere fortibus appetitibus & subtiliatiuis pro digestionem, sed bene fortibus appetitibus, et ceterum sufficiunt leuiora solutiuia cum quibus da stipticis confortata, sicut pilulae de reubarbaro additis mirabolanis kebulis pro quarta parte. Si uero sit mala complexio frigida sine materia non indiget eione, sed calescat epas cum oleo despicia, quod esset praesentius si bulliret dum paucum uino uinoso subtile aromatizato usque ad uini consumptionem & ungatur notabiliter fricando ipso oleo prius calefacto, & panis sit

communi fermentatio conditus cum aniso & simili-
bus & uinum sit antiquum subtile &c. ut superius co-
ditionatum, sed si in hoc casu attinetur alicui dulcedi-
ni forte esset præstantius. Non sic in oppilatione, &
phlistici & passulæ pingues auellanae depillate cum cin-
na. essent præstantes, & in reliquis fiat ut dictum est in
fluxu chyloso ab oppilatione. Et si appareat domi-
nium caliditatis datur aperiuiua frigida, epatis tamē
confortatiua sicut diarodon aut triafandali cum pas-
sulis, & feminibus communibus frigidis, & ungatur
ei oleo ro. & myrtilino, & reliquū regimē declinet ad
frigidum, & sit epatis & membrorum naturalium con-
fortatiuum tam stipticitate temperata quā singula-
ri proprietate, & si fuerit debilitata propter lapsum
ad humidum, totum regimen declinat ad sicum.

Et contra si fuerit debilitata propter lapsum ad sic-
cum declinet ad humidum, & si fuerit debilitata pro-
pter nimias euacuationes sistantur euacuationes ille
& totum regimen medicinalē, & in cibo & potu sit sti-
pticum cum temperamento actiuarum & cum hoc sit
aperitiuum facile penetrans ad membra, & sit multū
aperitiuum ita ut parum ipsius multum nutriat, &
in hoc casu maximē cibis est partiendus.

DE FLVXV EPATICO PHLEGMATI- co sub quo aquosus continetur.

Quid nominis & quid rei huius fluxus satis
manifesta sunt.

Est autem hic fluxus duplex, quidā aquo-
sus, quidā ad phlegmate crassiori.

Causa aquosi est corruptio digestiue epatis, quam
coadiuuat multus potus aquæ & uisus rerum aquo-
sarum. Et potentia uirtutis expellentis per melaericas
ad intestina, quæ si deficeret esset causa ascitis. Corru-
pitur autem digestiua huiusmodi producens aquosi-
tatem secundum plurimum ad frigidum, licet etiam cali-
ditas epatis superfluens in gradu diminuta tamen in
quanto possit per corruptam digestionem aquosita-
tem multiplicare, sicut accidit in habentibus epar su-
perflue calidū & febrientibus qui efficiuntur hydro-
pici, potentia enim rei insequitur multitudinem for-
mæ. Item corrumpitur ab humido. A sicco autē cor-
rupta non producit aquositatem aut rarissime. Apo-
stemata quoque epatis & oppilationis corrumpunt
naturam & à toto & à pluribus membris. De his tamē
quantum est expediens dictum fuit superius in hy-
dropice. Conuersio quoque aquæ hydropicorum per
melaericas ad intestina est causa huiusmodi fluxus, &
per ipsum soluitur ascites sicut dicit Hip. 6. aphorif-
mus in uentrē aqua fluente solutio fit. Causa autē flu-
xus à phlegmate crassiori est mala complexio frigida
epatis destruens digestiuam cum regimine proportio-
nali generationi huius phlegmatis & fortitudo ex-
pulsivæ.

Signa sunt illud quod egreditur, scilicet phlegma
& aquositas & regimen præcedens, scilicet comestio
fructuum aquosorum & potus aquæ superflui &
propriè tempore non congruo. Item paucitas urinae
& sudoris uel ascites præcedens cum confortatione
uinis, & aqua tunc est citrina, sed ex præcedenti cau-

sa est alba, & propriè si fuerit in causa mala complexio
frigida epatis. Si autem malæ complexionis epatis
apostematis oppilationis & nocuenti ipsius epatis
per communitatem ab alijs membris, sunt ex dictis
superius manifesta.

Prognostica. Primum, hic fluxus curatur secun-
dum plurimum, nisi pendeat ab epate. Secundum,
cum retinetur hic fluxus aquosus errantē digestiua,
impletur epar aquositate, & rumpens in uentrem fa-
ciat hydropem aquosam secundum plurimum mor-
talem, iuxta aphorismum, 56. septimæ particulæ. Si
epar impletum aqua in omentum eruperit, id est in
zírbum, his uenter aqua impletur & moriuntur.

Cura. Si causa fluxus aquosi fuerit cōuersio aquæ
ascitici ad intestina, sinatur natura operari, & medi-
cus ad nihil aliud intendat, nisi ad confortationem di-
gestiue & expulsiue epatis cum proprijs per uirtutē
tertiā & contrarijs epatis discrasia & cæteris nocu-
mentis eius, & cum hoc moderata stipticitate partici-
pantibus. Si tamen nimis superfluuerit, cohibeatur cū
magis stipticis, proprijs tamen in confortatione epatis
& contrarijs ipsius discrasia, ut supra. Si uero in
causa fuerit regimen præcedens malum, ordinetur re-
gimen contrarium tam regimini præcedenti quā di-
scrasia inducitur in epate per regimen illud, & dieta sit
tenuis, boni chymi, & paucarum superfluitatum. Si
uero in causa fuerit aliquod epatis nocumentum per
essentiam uel per cōmunitatem ex superscriptis, qua-
tuor debentur intentiones. prima est remotio causæ
siue nocuenti illius, secunda uirtutum epatis cōfor-
tatio, tertia correctio accidentium, quarta regimē ui-
tæ. Pro prima intētiōne. primo mundificetur epar
ab aquositate, nunc per eandem regionem, scilicet per
intestina si natura per se non fuerit sufficiens cum de-
coctione hieros & mirabol. kebulorum, ana. 3. z. quæ
decoctio fiat in aqua mel. 3. 6. ad consumptionē me-
diatatis, & coletur, & sufficiens exprimitur, uel cum
aqua mellis, decoct. mirabol. kebulorum, 3. i. misce-
tur. 3. s. succi ireos, aut quantum uidetur sufficere, uel
si fluxus fuerit phlegmaticus, minoretur cum his quæ
dicta sunt in cura generali fluxus. Aliquando uero
mundificetur, & diuertatur aquositas illa per urinam
cum diacurcuma, aut dialacca exhibitā cum uino al-
bo, aut cum decoctioe radicum & seminum prouo-
cantium, cum qua etiā trochisci de lacca possunt exhi-
beri. Si tamen esset cum signis caliditatis aut febre
dantur diuretica frigida sicut decoctio seminum com-
munium frigidorum & radicū aspharagi permixta
cum triafandali aut diarodon abbatis, sudor etiam
si oportuerit prouocetur ponendo ipsum in stupha
aut in furno à quo panis sit extractus & teneat caput
extra, aut ponendo ipsum in thermis quæ non sint
atramentales aut aluminosæ, aut alio modo stiptice,
& si esset debilis non potens huiusmodi tolerare dor-
miat, & in somno bene pannis operiatur, aut anhelu-
tum cōtineat aut hora somni exhibeatur potio sudo-
ris prouocatiua sicut theriaca aut metridatū cū uino
subtili potenti. Deinde pro complenda hac inten-
tione alteretur epatis discrasia & corrigantur cætera
nocumenta eius siue sint per essentiam, siue per cōmu-
nitatem cum his quæ dicta sunt in passionibus epatis.
Et cum eisdem compleatur intentio secunda quæ
est digestiue epatis confortatio, Et ex proprijs sunt
passulæ

melancholici non famose sunt quæ sunt per congelationem melancholice, aut per adustionem phlegmatis aquosi aut crassioris, aut ipsius congelationem, quæ ideo sunt non famose, quia raro eueniunt. Ex melancholia enim genita per congelationem melancholice non fit fluxus nisi raro propter sui crassitatem & paucam stimulationem, sed fit sepheros purum. Melancholia autem genita ex phlegmate paucè attinet nigredini.

Causæ primi fluxus, scilicet melancholice fecalis sunt sex. Prima est mala complexio epatis calida adurēs aut frigida cōgelans, materia autem est massa sanguinea in hanc melancholiam fecalem per adustionem aut congelationem uersa ad quod iuuat mixturam multi humoris melancholici in massa sanguinea. Secunda causa est ulcus putridum in substantia epatis emittēs pus in substantia epatis subito emittens magnam quantitatē puris nigri quod per mēseraicas ad intestina deferretur. Si enim solū refudaret & non rumpetur manifeste fieret fluxus uirulentus subtilis de quo infra.

Quarta causa est oppilatio epatis quæ aperitur, unde materia diu per oppilationem retente & denigrata educitur, licet quandoque per apertionem humilimodi oppilationis fiat fluxus diuersorum colorum aperitur aut oppilatio aut à uirtute fortis sola aut cū auxilio medicinarū. Quinta causa est fortitudo uirtutis aut sola aut auxilio medicinali adiuta digerēs & se parans nocitiū à iuuatio, & tādē nocitiū nigrum fecale de quo supra expellens. Sexta causa est debilitas uirtutis, scilicet reētiue aut digestiue epatis, et hunc fluxum fecalem antecedit fluxus lotius secundum plurimum de quo infra. Retentiu autem & digestiua licet possint debilitari ab omni genere ageritū, quantum tamen pertinet huic proposito debilitantur à mala complexione calida aut frigida. Calida autem magis lædit retentiua. Frigida uerò magis digestiua quæ malæ complexionis aucte aut diutius impimentes perducunt, tandem aut fluxum feculentum adurendo aut cōgelando. Propterea dicit Auisicibito, id est in modico tempore, sed paulatim. Citius tamen ad hunc perducit caliditas adurendo quàm frigidas congelando, cum ipsa sit magis actiua. Fluxus autem sanguinis denigrati propter longam moram non reducit ad hunc fecalem, sed ad fluxū sanguineum de quo infra, quia forte licet sit denigratus, adhuc tamen retinet foramen sanguinis aut saltē malente. Eius autem mora denigrans ipsum secundum plurimum est in intestinis. Ab his tamen sex causis fit, scilicet subtilis & crassus. Subtilis tamen penes A. frequenter fit à debilitate uirtutis digestiue, & consequenter à mala complexione frigida. Et ideo fluxus lotius frequenter antecedit ipsum, & sitis in principio sui est parua, & appetitus cibi plurimus: quamuis in fine reiperducat propter sui putredinem ad febres & deiciat uirtutem & perducit ad hydropisim, & ad ultimum est longitudo cum extensione dispositiois.

Causæ uerò secundi fluxus melancholici, scilicet nigri scilicet caliditas epatis adurens conuertens cholera naturalem aut non naturalem in melan-

choliam adustam.

Causæ tertij fluxus melancholici qui dicitur niger melancholicus est debilitas attractiue splenis aut eius oppilatio siue sit in porro attrahente siue in porro expellente melancholiam ad hos stomachi, quare melancholia ab epate nō mundificata tanquā superflua expellitur ab ipso per mēseraicas ad intestina ad quod concurrunt multitudo generationis eius, aut propter cibos proportionales aut propter epatis discrasiam superflue calidam adurentem, & sic cōuertentem melancholiam naturalem uel subtilem partē eius in melancholiam adustam, non autem conuertentem massam sanguineam, quia esset fluxus fecalis pertinet ad primam speciem de qua supra, neque etiam cholera, quia pertinet ad secundum modum de quo supra.

Species autem nō famose de quibus supra sunt aut ex frigidityte congelante melancholiam aut phlegma aut ipsum adurentem.

Signa. Fluxus fecalis niger est coloris nigri tendētis in rubeum. Et si est crassus est sicut fex uini aut sanguis niger cōgelatus. Si uerò subtilis est sicut sanguis niger subtilis non congelatus.

Differt autem qui fit à mala complexione adurentem aut congelante ab his qui pendent ab alijs causis, quia ad sunt signa malæ complexionis non autē apostematis, neque ulceris aut oppilationis: nec reliquorum causarū de quibus supra. Et qui est à caliditate est magis niger. Et habet nigredinem magis lucentem. Et est magis ferens. Et antecedunt eum liquefactio humorum & membrorum, & fluxus ventris uirulentus sitis, paucitas appetitus, uehementia rubedinis aquæ. Et plurimum sunt cum eo febres & egestio præcedēs eum est sicut egestio febris pestilentie in uehementia feroris crassitudine & tinctura coloris, & tandem in fine egreditur sanguis niger. Sed quando fit à frigidityte ad sunt signa contraria. Et quando siccitas est coniuncta caliditati aut frigidityti est maior sitis & fluxus magis conglobatus, quando autem humiditas est ipsi coniuncta ad sunt effectus contrarij.

Si uerò pendeat ab ulcere aut corrosione est cū dolore in partibus epatis & cū paucitate eius quod egreditur & remanet, scilicet in epate & antecessione causarum facientium necessario ulcera & corrosiones, paulatim enim pus educitur, sicut paulatim in ulcere aggregatur. Et non profluit magna quantitas subito sicut in ruptura dubelati. Si uerò pendeat à ruptura apostematis ad sunt primo signa apostematis, fortē nondum colligendis sumpta ex grauedine crassitie dolore & febre continuis. Deinde signa dubelati siue collectionis & maturationis eius sumpta ex augmento febris doloris & cimento reliquorum accidentiū. Et febres ille sunt non seruantes ordinē. Et multoties incipiunt cum rigoribus. Et durities pulsus est testimonium magnum dubelati in uisceribus. Et aliquando paulatim refudat uirus. Et læditur à resupinatione nedum à statione super latus. Et cū perfecta est maturatio quiescunt febris dolor & reliqua accidentia, & crescit grauitas. Et quādo redeunt dolores & punationes, & grauitas fit maior, appropinquat eruptio. Cum ergo accidit rigor subito & sedatur grauitas & dolor in loco apostemato, tunc iam eruptio facta est, & propriè quando descendit magna quantitas puris mordicans illud quod pertransit, et fortasse accidunt pulsus

esse notabiliter frigidus cui semper sint admixti vapores rerum frigidarum redolentium, quibus aeger delectetur. Secundus cum his quæ in ore retinentur in frigidantibus & humectantibus guttur & linguam.

Tertius est alteratio per clystera, sed sate fluxu sint mundificatiua. Quapropter aquæ hordei addantur succi infrigidantes, sicut portulacæ plantaginis solatris temperiue & similia, olei uio. nenula. & adeps renum capræ ad prohibendum excoarationem.

Quartus est per cibos & potus, quapropter in cibis suis ponatur uinum granatorum de berberis aut acre fia. Et in brodis ex quibus debent fieri fercula bulliat lactuca endiuia plantago portulaca cucurbita & similia aut aliquid istorum. Quintus per epithimata applicanda, cordi, epati, renibus, dorso, capiti.

Sed hic duo obserua. Primum, ut hæc non applicentur nisi præcedente sufficienti euacuatione. Secundum, ut sate fluxu totum corpus aut maior pars cum his frigidis non epithimetur ne materia amplius pellatur à circumferentijs ad centrum, sic enim fluxus nimis augetur. Sextus, per ea quæ sumuntur quæ sint infrigidantia & humectantia epat & membrano bilia confortantia cum singulari proprietate cum sit peccanti temperata, & cum hoc sint propria humori peccanti, scilicet cholerae aut melancholiae cum sanguine mixte quæ per sui caliditatem aut putrefactionem fuit causa aduersionis sanguinis. Potus tamē aquæ frigida qui conceditur in febribus urentibus, sate fluxu non est cōcedendus, facile enim perduceret ad lyenteriam, aut ad fluxum chylosum.

Et si causa fluxus fuerit defectus splenis in mundificando epat regatur secundum quod dicitur in fluxu splenico.

Et si in causa fuerit caliditas adurens epatis aut membrorum quæ sunt ultra epat alteretur cum infrigidantibus fortibus, quæ tamen non extinguant calorem innatum interius sumptis & exterius applicitis epati & cordi & dorso secundum situm uenæ chylis. Et sint confortantia, ut supra siticitate temperata & singulari proprietate, sed non approximentur exterius nisi prius debita mundificatione præcedente. Si ergo adsit multitudo sanguinis præponatur phlebotomia ex basilica aut ex communis, aut ex saphenis si in causa fuerit retentio menstruum aut hæmorrhoidarum, cholera humor dominans in sanguine mundificetur, cholera quidem cum decoctione fructuum, scilicet prunorum tamarindorum, & mirabol. citri. in aqua endiuia, in cuius. 3. 3. debite colatis & expressis infundantur reubarbari. 3. 2. per. 1. 2. horas cum ebullitione parua & debita expressione & colatione.

Et si in causa fuerit humor melancholicus educatur, ut. 3. 1. epithimi mirabol. indorum. ana. 3. 2. sene. 3. 1. bulliant in. 6. 3. aquæ lactis ad consumptionem medietatis, & coletur exprimendo, sed epithimū potius obediens cum hac decoctione distemperetur. 3. 1. aut quantum uidetur decoctione electuarij amech. Quod si non inchoandum est. Deinde alteretur epatis & cordis dyscrasia cum frigidis sæpe dictis, & similiter dorsum si ue regio uenæ chylis cum infrigidante Gal. aut similibus sicut oleo ros. cum quarta parte aceti. Similiter sumat frigidum de quibus superius in fluxu cholerico.

Quod si nimia frigiditas epatis aut membrorum quæ sunt ultra epat fuerit in causa educatur prius melancholia cum decoctione statim posita. Sed loco electuarij hamech. ponatur dialene aut exhibeantur pillule ad hanc intentionem. In quibus tamen ponatur mirabol. nigri dereliquentes aliquod uestigium coarctionis. Et regatur splen si deliceret ab attrahendo melancholiam, aut propter debilitatem aut oppilationem, ut infra in fluxu splenico. Postea calefiat epat cum interius sumptis sicut syrupo de absinthio de eupatorio cum syrupo de epithymo cum aquis absinthij buglossæ & similibus. Et ex confectiōibus conueniunt diagalanga diatriompipereon diacalammentum diamulcum. Item theriaca & metridithum. Et si opus esset calefacere & humectare cōueniunt zuchharum buglossatum zuchharum boraginatum cum passulis auellanis parum torrefactis & fisticis. Et exterius applicentur oleum de spica de absinthio cum tantum uini potentis & pauco aceti & aromatizentur cum gariofilis & spica & similia modo tuo elige.

Et hæc eadem quæ dicta sunt optimè ualent ad complendum secundam intentionem quæ est epatis confortatio, modo habeant siticitatem moderatam, & singularem proprietatem ad epat. Si uero fluxus seculentus pendeat ab ulcere remanente post rupturam apostematis aut pendente ab alijs. primo remoueat causa fluxus mundificando & consolidando partem ulceratam. Secundo epat confortetur. Tercio accidentia corrigantur. Quarto ordinetur regimen.

Primo mundificetur epat cum aqua hordei, aut zuchhari, aut mellis permixtis cum melle ros. oxymelle simplici aut syrupo acetoso simplici secundum exigentiam dyscrasie & putredinis ulceris, quibus urendum est aliquibus diebus donec pus minoretur postea consolidetur cum succi plantaginis. 3. 2. succi end. 3. s. boli ar. 3. 1. Et si opus erit minori infrigidatione his addatur aliquid thuris aut masticis, item diorodon abbatis & triasandali permixti cum his aut similibus confortant & consolidant. Et si opus esset calefacere eligatur syrupus de absinthio diarodon de succis herbarum. Item trochisci diarodon de reubarbaro, et cum his compleatur prima & secunda intentio.

Si uero fluxus seculentus pendeat ab apertione oppilationis aut à uirtute ceticante sinatur natura operari & adiuuetur si defecerit. Vbi uero fluxus nimius excederet quem uirtus non bene ferret sedetur secundum opportunitatem.

Si uero fluxus seculentus pendeat à debilitate uirtutis quæ frequenter antecedit lotius, remoueat causa eius, quæ secundum plurimum est mala complexio aut calida debilitans contentiua aut frigida debilitans digestiuam cum his quæ sæpe supra dicta sunt.

Et cum eisdem epat confortetur ut supra.

Et corrigantur accidentia secundum exigentiam ipsorum, & ordinetur regimen secundum causæ exigentiam.

Cura uero nigri felles & nigri melancholici exigit intentiones quatuor superscriptas. Sed properandum est maxime in cura nigri felles & melancholici subtilis propter fortitudinem suæ impressionis. Ergo quæ primum potes euacua huiusmodi humores cum. 3. 3. decoctionis prunorum tamarindorum, mirabol. indorum, epithymi & sene in qua post debitam colationem & expressionem infunde reubarbar. 3. 1. per. 1. 2. horas.

horas, deinde coletur exprimat & secum misceatur 3. i. electuarij hamech uel quantum uideretur. Et eadē medicina conuenit in melancholia facta per adustionem phlegmatis. Sed in melancholia naturali aut genita per congelationem detur diascene ab. 3. s. usq; ad. 3. i. cum aqua ablinthij, infusionis epithymi & mirabolanorum indorum.

Post euacuationem alteretur epatis dyscrasia calī, aut frig. secundum exigentiam medicinae aut alteratiue tam interius sumendae quam exterius applicandae patere possunt ex supradictis quae cum hoc quod alterent sint etiam epatis confortatiue iuxta secundam intentionem.

Sed pro tertia intentione prohibenda est excoctio intestinorum, dolor est sedandus cum dyseribibus & reliquis proprijs ad hoc, quae requirantur in cura dysenteriae & in cura generali fluxus. Tutamen debet uti dyseribibus magis aut minus infrigidatibus & magis & minus abstergentibus & aliquando stupefactiuis secundum humoris diuersitatem & necessitatis exigentiam quorum copiam in cura dysenteriae & cura generali fluxus habuisti. Et reliqua accidentia corrigantur secundum quod ibi dictum est &c.

Sed pro quarta intentione regimen sex rerum declinet ad frigidum aut ad calī, secundum exigentiam dyscrasiae. Licet secundum plurimum debeat declinare ad frigidum, immo aliquando debet esse notabiliter frigidum. Similiter quandoq; debet declinare ad humidū, quandoque ad sic. Et aliquando cum temperamento actiuarum aut passiuarum aut utrarumque.

Similiter dieta debet esse aliquando tenuis, aliquando crassa secundum longitudinem aut breuitatē morbi & uirtutis tolerantiam. Quae autem sit huiusmodi requiratur in cura generali fluxus.

DE FLUXU EPATICO SANGVINEO.

Hic fluxus quātum ad quid nominis & quid rei est satis ex dictis manifestus.

Est autem hic sanguis quandoque rubeus uiuidus, quandoque niger, & niger est ferens, aut non ferens. Et quicumque istorum quādoq; est multus, quandoque paucus, quandoque nouus, quandoq; antiquus quandoque continuus quādoque interpollatus siue peridicus, quandoque criticus quandoque symptomaticus.

Causa rubei prima est scissura uenae portae aut mesentericae absque scissura carnis aut panniculi tegentis ipsas facta à causa primitiua aut à multitudine extendente aut ab acuitate corrodenste. Si enim simul cum ipsis scinderetur caro & panniculus tegens ipsas sanguis exiens reperet ad concauum uentris sicut scissura uenae chyli aut emulgentis absque scissura rei tegentis ipsas est causa mictus sanguinei. Secunda causa est multitudo eius supra illum qui necessarius est pro corpore nutriendo aut acuitas eius stimulans expulsiuam. Tertia causa est oppilatio ramorum uenae chyli aut portae, quare sanguis in epate generatus ad membra nutrienda transire non ualet sed tanquam superfluus ab eo ad intestina expellitur. Quarta causa tenens se ex parte corporis est repletio eius apostema oppilatio debilitas attractiue ipsius, quarum causas

require in capitulo de fluxu sanguinis à toto. Causa autem nigri non ferentis est longa mora eius in intestinis aut multa admixtio humoris melancholici, aut frigiditas congelans.

Sed causa nigri ferentis est mora adeo longa ut seatear. Item caliditas putrefaciens.

Signa. Differt epaticus sanguineus à fluxu intestinali sanguineo per signa ex superius posita in principio huius capituli. Sed differt à sanguineo proveniente à toto, quia cum hoc adfunt nocumenta epatis, cum illo non. Sed adfunt signa nocumenti membrorum ultra epatē, scilicet oppilationis apostematis repletio debilitatis attractiue & similibus. Pro quibus recurre ad capitulum de fluxu sanguineo à toto. Signa scissurae uenae portae sunt ipsa causa primitiua, scilicet casus offensus aut percussio super epatē si praecedat. Et dolor quidam sensus circa concauum epatis, & quod sanguis egreditur in magna quantitate subito, & non facile sistitur neque cito. Sed quod superfluit supra illum qui est necessarius pro corpore nutriendo cognoscitur quia sumit cibum maioris quantitatē aut magis nutritiuum quam consueuerit. Sed quod sit acutus cognoscitur ex praecedente acuitate cibi & quia mordicat loca per quae fluit, & forte tendit in citrinum. Sed quod sit oppilatio in uenis epatis cognoscitur per signa superius posita ex graue dinetuore, & similibus, quae melius in gibbo quam in concauo percipiuntur, & quando sanguis uenit in gibbo est magis nitidus, & depuratus, & oppilatio gibbi magis communicat spiritalibus, sicut oppilatio concaui magis communicat stomacho, & qui est ex oppilatione cito absconditur & est peridicus.

Et differt à lotio, quia hic est purus ille sicut lotura carnis.

Prognostica. Primum, hic fluxus secundum plurimum curatur, sed non apud negligentes & inexpectatos. Secundum, fluxus sanguinis nigri ferentis deterior est quam fluxus sanguinis rubei deterior est quam fluxus sanguinis nigri non ferentis cui concordat apho. 2. s. quarta pars sanguinis sursum qualiscumque fuerit per os malum, deorsum uero bonum si niger fuerit.

Cura huius fluxus sanguinei epatici rubei quantum ad omnes causas eius praeterquam ab oppilatione ne patere potest ex cura fluxus sanguinei à toto de quo superius factum est speciale capitulum. Sed pro cura huius epatici sanguinei pendens ab oppilatione ne recurratur ad capitulum de fluxu chylo de quo supra, & ad capitulum de fluxu oppilatiuo, de quo infra. Sed cura sanguinei nigri ferentis aut non ferentis est, ut primo procuretur ipsiuseductio cum dyseribibus mundificantibus aut solutiuis quae uentrem lauant aut soluunt comprimendo aut mixtis ingredinis sanguinis & puroris eius. Si enim causa sit admixtio humoris melancholici educatur cum his quae dicta sunt in fluxu melancholico. Si uero in causa sit caliditas attractiua aut frigiditas congelans aliter.

recurratur cum his etiam quae ibidem dicta sunt. De fluxu

Fluxus epaticus lotius est descriptiue fluxus rei quæ est sicut lotura carnis recentis, est enim aquositas tendens in rubedinem sanguineam. Causa eius immediata est duplex, scilicet defectus digestiue siue ex se principaliter deficiat siue ex defectu contentiue quæ non tanto tempore retineat chylum in epate donec digestiua complete ipsum digerat. Hic autem defectus digestiue est duplex, aut quia diminuit ipsum digerat in mutando ipsum debilitat uerius naturam sanguinis, aut quia corrupte ipsum digerat corumpendo ipsum in aquositate sicut in fluxu aquoso dictum est. Sed in hoc lotio non est tã corruptio quin appareat alicuius sanguinis uestigium. Secunda causa est debilitas sequestrationis aquositas a sanguine propter debilitatem epatis & renum.

Causa autem harum debilitatum epatis, licet possit esse omne genus malæ complexionis cum est immo-derata, z. technî. secundum plurimum tamen digestiua epatis, debilitatur a frigido, & retentiua a calido & hu. cum superfluunt. Apostemata quoque & oppilationes sunt cã harum debilitatum. Et debilitatur et per communiter aut a toto aut a membris particularibus sicut superius in fluxu aquoso & hydrope dictum fuit. Causa autem defectus attractiue renum se- cundum plurimum est ipsorum frigiditas aut oppi- latio aut apostema. Causæ autem primitiue sunt ni- lilius potus aque & proprie hora incongrua, & simi- liter usus fructuum aquosorum & omnis superfluius potus & comestio.

Signa Differentia inter diminutionem digestiue & debilitatẽ retentiue epatis haberi non possunt per egestionem lotiuam, utriusque enim est chylus dimi- nute digestus qui cum sua albedine tendit in rubedi- nem. Sed differentia inter defectus ipsarum habetur per causas. Si. n. ad sit mala complexio frigida uerifi- catur iudicandum est esse debilitatam digestiuam. Si uero ad sit mala complexio calida aut hu. iudican- dum est esse debilitatam contentiuam. Sed contra a ca- liditate superflua potest digestiua epatis diminui. Er- go signum erit dubium, scilicet an sit diminuta dige- stiua, aut lesa retentiua. Ad hoc dicitur quod digesti- ua a caliditate superflua corrumpitur & nõ dimi- nui digestiua exiens erit aquositas tendens in rubedinem sanguineam. Si autem lesa retentiua erit chylus ten- dens in rubedinem sanguineam, facile autem discer- nitur inter chylum, & aquositate, forte aliæ essent instantiæ, sed nolo ut tantum labores. nam quæcum- que ipsarum lesa sit eadem est cura, scilicet remotio- nis causæ ledentis. Si uero causa huius fluxus sit defectus sequestrationis aquositas a sanguine propter defe- ctum renum, egestio lotiua secundum plurimum erit aquositas multa cum paucis sanguine permixta qui sanguis forte refidebit aquositate, non autem erit aquositas cum sua albedine tendens in rubedinem san- guineam, inter quas duas est differentia, quia in pri- ma sanguis refidet, in secunda non, & erit paucitas urine non solum cum fluxus adest, quia est commu-

ne omnibus fluxibus iuxta aphorismum ultimam quartæ particulæ, urina multa noctu facta modi- cum secessum significat, & econuerso, sed etiam ante fluxum.

Signa autem ægritudinum epatis superius habuisti.

Sed signa ægritudinum renum inferius ponentur si deus uoluerit.

Prognostica. Primum. Hic fluxus secundum plurimum curatur nisi pendeat ab apostemate.

Secundum si nõ debite curatur ducit ad ascitem, aut ad fluxum seculentum de quo supra.

Cura huius fluxus est proportionalis curæ fluxus aquosi de quo supra. Exigitur quatuor intentio- nes. Prima causam remouet. Secunda uirtutem epatis, scilicet digestiuam & retentiuam confortat. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat re- gimen.

Pro executione primæ intentionis. Si fuerit mul- tiplicata aquositas, educatur uel per secessum, uel per urinam, uel per sudorem, scilicet nunc per unam, nunc per alteram. Non autem per omnes simul, sicut dictum est in cura fluxus aquosi. Deinde nocumenta epatis corrigantur ut ibi. Si autem in causa fuerit so- lum diminutio digestiue & non corruptio ita ut so- lum sit chylus diminute digestus, alteretur epatis dy- scrasia quæ est in ea, & similiter cætera eius no- cumenta corrigantur sicut dictum fuit in passioni- bus epatis. Tercio confortetur uirtutes epatis cum his quæ simul epar confortent & corrigant nocumẽ- ta ipsius, & propria in confortatione digestiue dicta sunt in fluxu aquoso, scilicet passulæ, fistica, auellana, crocus, cinamomum, epar adip & caro limaciarum. Et in causa calida endiua, & composita sunt sicut ele- ctuarium de passulis uerificatum per Auicennam in capitulo debilitatis epatis in causa frigida, sed in cau- sa calida diarodon & triafandali. Applicata etiam exterius ad hoc conferunt calida aut frigida secundum exigentiam sed in confortatione retentiua sint ma- gis stipitica quæ habent etiam singularem propria- tem ad epar, et laudanum cum uino & potus succi et seminis linguae arietis habent singularem propria- tem. Et corrigantur accidentia sicut dictum fuit in cu- ra generali fluxus. Et regimen ordinetur in contrari- um dyscrasie, & sit diæta tenuis aut crassa secundum longitudinem aut breuitatem ægritudinis. Sit tamẽ ex his quæ præbent nutrimentum bonum paucarum superfluitatum & facile digeratur, & est præstantius ut cibus partiatur, sicut enim chylus indigenitus meli- us retinebitur & digeretur.

DE FLUXU EPATICO fetido.

Hic fluxus descriptiue est fluxus rei fetentis, siue sit humor aut sanies, aut substantia epatis corrupta.

Species non habet nisi quosdam mo- dos differentes secundum diuersitatem eius q̃ egredi- tur paucitatem aut multitudinem eius continuatio- nem aut interpolationem.

Causæ humoris fetentis sunt aliquando longa mo- ra humoris, & proprie cum retinetur in loco non

naturali sicut in intestinis. Licet tamē in hoc & in quocūque alio fetente sit necessarium cōcurrere calorem extraneum putredinalē. Similiter quandoque humor putrescit in ipso epate & tanq̃ superfluus expellitur. Tertiō in causa est aliquando ulcus aut apostema epatis a quibus sanies fetēs fluit. Quarto in causa est ipsa epatis putrefactio per quā aliquid de substantia epatis corrupta fluit per mēseraicas ad intestina.

Signa sunt ipse fetor rei quē egreditur, sed humor fetens & sanies & substantia epatis corrupta distinguitur per calorem et substantiā, et quia sanies descendit in aqua humor secundum plurimū supernatat. Substantia autē epatis est spissior, neq̃ facile diuisibilis.

Prognostica. Hic fluxus si pendeat ab humore secundum plurimū curatur, si ab ulcere aut apostemate epatis difficillime & raro, si a substantia epatis putrida nunquā curatur nisi sit res modicissima.

Cura. Hic fluxus exigit 4. intentiones sepe dictas, scilicet remotionē causę perficiendam.

Primo cum mundificatione harū rerum fetentium quę nullo modo debent constringi. si tamen fluxus sit excedens quem uirtus nequeat tolerare aliquāter cohibeatur, sed non restringatur nisi perfecta mundificatione, quę mundificatio fiat cum clysteribus mundificantibus & cum solutiuis secundum exigentiam humoris si humor corruptus sit educibilis cum solutiuis proprijs sicut cholera phlegma aut melancholia, quorum solutiuiorum copiā superius habuisti in cura generali fluxus. Si uero sit sanguis educatur cum lenitiuis abstergentibus, & secundo alteretur calor putredinalis cum frigidis interius & exterius applicitis. Si uero in eā sit ulcus mundificetur, & similiter mundificetur substantia epatis corrupta prohibendo ulcē putredinē. Ad quod ualeat aqua decoctionis hori aut melis cum oxymelle aut syr. acetoso simplici, & reliquis quę dicta sunt superius in cura fluxus feculentis, ad quam recurre.

Secundo confortetur epas cum proprijs contrarijs tamen ipsius dyscrasie.

Tertiō corrigantur accidentia secundum quod oportet.

Quarto ordinetur debitū regimen in cōtrarium dyscrasie, sicut dictum fuit supra in fluxu feculento. Et hic fluxus fetidus potest esse a toto, cuius causę signa prognostica cura sunt proportionales his quę dicta sunt in hoc fluxu epatico fetenti.

DE FLUXU EPATICO.

Hic fluxus descriptiue est fluxus rei subtilis tendentis in citrinitatem aut rubedinem ad modum uirulentę.

Species non habet, nisi modos differentes secundum colores. Cum aliquē & proprie qui uenit a mēseraica siue a mēserio magis tendat in citrinum. Qui uero ab epate magis in rubeum. Distinguitur etiam secundum quantitatem maiorem aut minorem & secundum continuitatem aut interpolationem.

Causę sunt tres. Prima liquefactio sanguinis & humorum a caliditate forti & tandem ipsius substantie epatis. Secunda est resudatio apostematis calidi

nondum manifeste rupti in epate aut in mēseraica. Tertia causa est uirtus expellēs huiusmodi humoris citrice aut symptomaticę.

Signa sunt inflammatio epatis non adustiuā, sed liquefactiua. Item signa apostematis calidi sub cute subtili celati non profundū, quia non resudaret inter quę duo distinguitur, quia frequenter est huiusmodi liditas sine febre, sed apostema nunquam absoluitur a febre. Item cum apostemate ad sunt signa apostematis de quibus supra. Differt autem uirtus promouens ab apostemate mēseraice siue mēseria promouente ab apostemate epatis. Primo per signa propria distinguentia inter utrumque apostema, de quibus supra in passionibus epatis, inter quę est febris quę fortis est in apostemate calido epatis, sed in apostemate mēseraice leuis. Secundo, quia uirtus mēseraice cum albedine declinat ad citrinitatem. Cognoscitur autem hunc fluxum esse citricum, quia est cum omnibus aut pluribus conditionibus laudabilis citris, & cum ipso sequitur festina salus aegritudinis praecedentis. Symptomaticus autem est cum nullis aut paucioribus conditionibus laudabilis citris.

Prognostica. Primum. Hic fluxus si pendeat a caliditate liquefaciente sanguinem & humores curatur secundum plurimum, si uero liquefaciat substantia epatis aut pendeat ab apostemate difficillime curatur. Secundum. Hic fluxus facile transiit in feulentum cum per intensionem aut ex dispositione passi caliditas calefactiua efficitur adustiuā. Tertiū. Ex hoc liquefactiuo quandoque peruenit ad educationem substantie epatis, & est mortale, ut infra. Quartum. Factus a uirtute citrice aut symptomaticę expellente secundum plurimum est salubris.

Cura. Hic fluxus si pendeat a caliditate liquefaciente exigit quatuor intentiones supra scriptas.

Prima remouet causam mundificando uirulentiam cum decoctione prunorum tamarindorum, mirabolanorum, citrinorum, cum qua distemperatur drachma una manę aut drachmas sex calig aut in qua infusę sint drachmę duę rheubarbari & expressę. Deinde infrigidetur caliditas epatis, quorum faciens cum exterius & interius applicitis, quorum copiam superius habuisti in fluxu feculento.

Cura tamen liquefactionis substantie epatis pro magna parte pender ex cura fluxus liquefactiuo, quo superius est factum speciale capitulum.

Si uero pendeat ex resudatione apostematis epatis mundificetur cum aqua hordei sumpta cum crastis, prius tamen praemissa phlebotomia, & praemisso reliquo regimine dicto in cura apostematum epatis calidorum. Deinde si apostema manifeste rumpatur attendatur mundificationi & prohibitioni putrefactionis substantie epatis, & tandem ulcus consolidetur cum his quę dicta sunt in fluxu feculento, ad quod recurre.

Si uero hic fluxus pendeat a uirtute symptomaticę aut citrice humores uirulentos expellente, finatur si per se sufficiens fuerit. Si uero deficiat adiuuetur.

Si uero fluxus superfluit aliquāter compellendus est, non tamen ex toto retinendus nisi facta sufficiat mundificatione.

Et secundo

Et secundo in hoc fluxu quod ad omnes eius species attendatur in toto curae processu confortatori uirtutum epatis cum his quae sunt contraria ipsius diacrisie, & confortent ipsum suppetitate moderata et singulari proprietate, de quibus supra.

Tertio corrigantur accidentia secundum opportunitatem. Et quarto ordinetur regimen in contrarium dyscrasie epatis.

DE FLVXV EPATICO QUI EST
substantia epatis aut sibi
similatur.

NE contingat error est sciendum quod aliquando in fluxu egreditur res nigra non facile diuisibilis quae est substantia epatis ab epate separata per putrefactionem aut adustionem substantiae ipsius, & cum huiusmodi epatis substantia de secat per melaericas ad intestina opus est ut sit non magne quantitates, sicut aliquando descendit cum urina. Et est sicut orobus differens ab orobo a renibus de ciso per colorem tendentem in rubrum. Orobus autem renalis tendit in citrinum ut superius dictum fuit. Item per modum substantiae, non enim est orobus renalis facile frangibilis sicut epaticus. Aliquando uero egreditur in fluxu non proprie substantia epatis, sed quodammodo substantia epatis in sua naturali dispositione existens in colore rubeo in modo substantiae eius, est tamen mollior, imo quod plus est cum diuiditur in partes apparent sicut uenulae duriores reliqua substantia sicut apparent in uero epate cum in frusta secatur. Et per sepe uidi egredi huiusmodi substantiam in pluribus frustis diuisum usque ad quantitatem quinque librarum, inter quae reperiebatur frustum, scilicet omnino epati simile.

Causae primi sunt putredines & adustiones substantiae epatis, necnon ulcera putrida & corrosiua, siue genita sicut ab apostematibus ruptis, siue a causis alijs.

Causae autem secundae, scilicet rei assimilatae substantiae epatis est fluxus sanguinis ab epate ad intestina gracilia, qui sanguis est pronus ad coagulationem ratione suae complexione, & modi substantiae. Quapropter a uirtute naturalis intestinorum directa a uirtute digestiua epatis coagulatur in rem similem substantiae epatis cum pronitate sua ad hanc conuersionem. nam unum quod agens interit passim assimilationem.

Signa distinctiua inter substantiam epatis corruptam nigram fetentem, & id quod assimilatur substantiae epatis sani quod in rei ueritate non est nisi sanguis coagulatus sunt satis nota. Sed distinctiua inter substantiam epatis corruptam & sanguinem feculentum sunt, quia feculentus corruptus est in magna quantitate, & habet frustra magna, & parum duritiam corrupta. Similiter sunt signa distinctiua inter frustum epatis ueri & sanguinem coagulum sibi simile, quia uerum epas est durum non facile diuisibile, neque liquefit in aqua calida sicut sanguis coagulatus. Signa autem causarum manifesta sunt ex praescriptis in fluxu feculento.

Prognostica. Primum, fluxus substantiae epatis

corrupte est mortalis secundum plurimum nisi quod egreditur fuerit modicissimum. Sicut contra fluxus sanguinis coagulati similis epati sano est secundum plurimum salubris, significat enim fortitudinem epatis & satis bonam sanguinis dispositionem cum constantia uirtutum intestinorum gracilium.

Huius cura cum est substantia epatis corrupta exigit quatuor intentiones praescriptas. Prima causam remouet. Secunda epas confortat. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat regimen. Quae omnes intentiones sunt complenda sicut superius dictum fuit in fluxu feculento a putredine & corrosione siue ulceribus putridis & corrosiuis. Si uero sit fluxus sanguinis coagulati, primo sanguis ille educatur cum clysteribus mundificantibus & potionibus sicut est aqua hordei, cum oxymelle simplici, & apud maiorem necessitatem addantur. 4. grana coaguli leporis uel hedi. Aut exhibeatur casus. 3. i. cum aqua decoctae mellis. Postea intendatur ad curam fluxus sanguinis ab epate ad intestina cum his quae superius dicta sunt in cura fluxus epatici sanguinei ad quam recurre, non enim est bonum totiens idem replicare, nam sic uolumen nimis excreset. Et sic deo dante sit factus finis huius fluxui epatico super ceteras materias difficilimo tam ad cognoscendum quam ad operandum pro quo ipsi gratias ago infinitas.

DE FLVXV SPLEN-
tico. Cap. VI.

Hic descriptiue est fluxus factus uicio splenis, & est secundum plurimum melancholicus, qui est hic aliquando multus aliquando paucus, quandoque criticus, quandoque symptomatikus, quandoque periodicus, quandoque sine periodicis.

Causa in genere est triplex. Prima est defectus mundificationis melancholice ab epate, quare superfluent expellitur per melaericas ad intestina. hic autem defectus mundificationis est aut propter oppilamentum in poro siue uena ortum habente a uena porte & terminata ad splenem ad hoc principaliter ordinata ut deferat melancholiam superfluentem ab epate ad splenem, haec autem oppilatio est secundum plurimum, coartata & melancholia crassa meatum implente. Et aliquando hic defectus est propter debilitatem attractiue splenis aut a mala complexione quae secundum plurimum est frigida aut propter apostema & duritiem eius aut solutam continuitatem. Secunda causa principalis est defectus expulsiue melancholice ad os stomachi quae naturaliter debet ad ipsum fluere ad famem excitandam, hic autem defectus est aut propter oppilationem in uena per quam deferatur melancholia ad os stomachi, quae etiam secundum plurimum est coartatoria ab humore melancholico, aut accidit propter debilitatem expulsiue splenis quae frequenter est a siccitate superflua, licet possit ab omni genere agitudinis contingere. Tertia causa principaliter fluxus est multitudo melancholice in splene cum apostemate aut sine, ad cuius expulsiue natura irritata tandem mouetur aut sola aut medicinali auxilio adiuta, et sic expellit ad epas, et postea per melaericas ad intestina.

DE FLVXV VENTRIS.
TRACTATVS TERTIVS DE
speciebus fluxus sumptis a causa materia
li obiectiua continens tria
capitula.

DE FLVXV STERCO-
roso. Cap. I.

Fluxus stercorosus descriptiue est fluxus ster-
corū in quantitate exuberante supra id quod
est conueniens. Est autem stercus superflui-
tas primæ digestionis recipiens formam substantia-
lem in stomacho, licet in intestinis accidentaliter per-
ficiatur.

Modos habet differentes secundum magis & mi-
nus. Sunt enim stercora aliquando magis dura &
compacta, aliquando magis liquida et fluentia, item
aliquando cum multa mixtione humorum, scilicet
phlegmatis & utriusque cholerae, aliquando sine, item
recipiunt differentias penes multitudinē eius, quæ egerit
tam secundum quantitatem continuam quæ discretam.

Causæ eius sunt multa quantitas cibi, item qua-
litas eius, quia scilicet parum eius transmutatur in chy-
lum, plurimum in superfluitates, sicut sunt fructus, ole-
ra, & similia, quorum multum parum nutrit. Item
paucitas eius quod ad epar & membra attrahitur, si-
ue proveniat ex defectu stomachi, & intestinorū non
debite immutantiū aut non debito tempore retinenti-
um donec epar & meseraica fugant, quod eis perti-
net, aut ex defectu epatis, et meseraicarum propter de-
bilitatem attractiue aut oppilationem, & causas su-
perius dictas in fluxu chyloso, aut propter defectum
membrorum quæ sunt ultra epar, quia repleta nimis
aut debilitate attrahentiā aut oppilata, sicut superius
dictum fuit in fluxu sanguineo. Item tertio multitu-
do eius quod ex phlegmate aquositate, & utraque
cholera redit ad intestina, & totum cum stercore per
mixtum, stercore dominante nomine stercoris ap-
pellatur, propterea dicimus aliquid stercus esse magis
cholericum, aliquid phlegmaticum aliquid melan-
cholicum, & forte huiusmodi humores ad intestina
delati uirtute intestinorum stercorizantur.

Signa patet ex his quæ dicta sunt in fluxu sangui-
neo, & chyloso, ad quorum capitula recurrit.

Prognostica. Primum hic fluxus secundum plu-
rimum curatur si debite tractetur. Secundum diffici-
le est, & non bene tutum medicinaliter permutare na-
turas, & hominum consuetudines. Sunt enim qui-
dam naturaliter egerentes semel in die, quidā bis, qui
dam ter quater aut pluries. Quendam de Cauaiono
Veronensi uidi ascellatē tū semel omnibus 22. die
bus & sic se habuerat per totū decursum uitæ suæ. Ter-
tium homines multū permutantur ex decursu ætatis, ut
iuxta aphor. 22. secundæ part. Quibuscunque iuue-
nibus exstitibus uentres humectantur his senescētibz
exsicantur & econtra. Qui aphorismus est ex contin-
gentibus aequaliter.

Huius cura exigit tres intentiones. Prima ut cæ-
corpore si quæ sint remoueantur. I. oppilationes ma-
le complexionis stomachi intestinorū epatis, & mem-
brorū quæ sunt ultra epar, & sic de singulis ægritudi-
nibus, quæ possent esse cā huius fluxus, quæ qualiter
remouendæ sunt ex supradictis patere potest. Et si corpus

superflue plenū fuerit euacuetur secundum replecio-
nis exigentiam. Secunda intentio ut fiant fricationes
toti corpori & balneationes nō quidē stiptice, sed di-
latantes poros, et attrahentes nutrimentū ad mēbra
quæ fiant completa prima & secunda digestionē.
Tertia intentio ut dens cū multi nutrimenti, et pau-
carum superfluitatum non lenientes, imō potius ape-
rientes & prouocantes, & sint moderatæ cōtuitatis suf-
ficientis, tamen pro corpore nutriendo, sicut uinum
subtile odoriferum carnes laubabiles uitelli ouorum
forbiles debite cocti, testiculi gallorum fistica auella-
næ parū torrefactæ, & similia quæ præter suprascriptas
cōditiones stomachū, & epar confortent.

DE FLVXV VERMI-
um. Cap. II.

Hic fluxus descriptiue est fluxus ipsorū uer-
miū uiuentium aut mortuorum.

Spēs huius fluxus sumi possunt secundum
differentias ipsorū spēs quæ sunt tres. I. cucur-
bitini in modū seminis cucurbite: qui tamen aliquan-
do adinuicem connexi mediante humiditate phleg-
matica non animata ipsos continuante inueniuntur
longi secundum hominis staturam: sicut per sepe ui-
di ascarides subtiles parui, aliquando rotundi & ob-
longi, sicut ariste, & lumbrici rubei tendentes in albe-
dinem longi secundū palmi longitudinem: imō ali-
quādo cubiti. Distinguntur etiam spēs fluxus secū-
dū quod hominē uermes expelluntur uiuētes aut mortui.

Causa materialis uermiū est phlegma: locus sunt
intestina, & aliquando stomachus causa efficiens di-
sponēs est calor putredinalis, principalis operas est
calor naturalis, saltē sibi siue sint duo nūero distincti
siue tū unus, perficiēs autē est celestis influentia, quæ
est cā primitiua aut principalis concurrens.

Signa uermiū referuēt ad capit. proprium. Sed
signa fluxus ipsorū, ipsorūque distinctio secundum spe-
cies suas sensui manifesta sunt.

Prognostica. Primum. Fluxus uermiū mortuo-
rum in ægritudinibus acutis est ualde deterius quæ flu-
xus uiuentiū, significat. n. malitia ægritudinis ipsos
interimēs, sed si uiui descēdunt significat aut expulsi-
ue potētia aut nō tanta ægritudinis malitia. Scdm.
Si soli impermixti fecibus egerant malū, permixti ue-
ro bonū. Tertiū. Si permixti sanguini egerantur ma-
lum. Quartum. Vomitus expulsi malū. Sed in hac
materia leuiter pertrāseo. Inferius. n. in capitulo pro-
prio deo dante dicitur quantum erit opportunum.

Cura. Si natura per se non fuerit sufficiens adiu-
uēt cum educētibz uermes, & mundificātibz ma-
teriā eorum. Et ex proprijs est clystere factū ex 1 s. 3.
lactis aut quantum uideatur opportunum inspecta
ætate cum 1. aut. 2. 3. zuch. rub. aut 3. z. mellis. ros.
Et si fluxus alia: materierū præter uermes est nimis
exuberans sit lac calibeatū, aut clystere ex cum aqua
mellis facta secundū artē, aut cum aqua hord. cū mel-
le ros. Et si fuerit aut timeatur excoriatio addatur
adeps renum capræ, & si uermibus aut materia eorū
existētibus in stomacho, aut in intestinis superioribz
fuerit opus mūdificare per ea quæ sumuntur detur mel-
ro, in fusiois semēzine, aut in quo sit admixta 3. s. aut
3. i. semēzina cum pauco aquæ hordei aut mellis.

P 3

ranre opus fuerit aliquo cibo accipiat pitana, & similia, sed in egritudine chronica maxime crisi diu dura te potui uino, & carnibus moderate siue aqua carnis & similib. que tñ nō crisi impediāt. Si uero fluxus fuerit diminutus adiuuetur cū clysteribus calidis aut fri. secundum exigentiā incipiendo à leuib. & gradatim procedendo ad acutiora, quæ si non sufficiant aliquod leue solutiuum exhiberi potest, sicut infusio prunorum, tamarindorum, manna, cassia, reubarbarum, polypodium, carthamum, & similia, quorum tamen uirtus solutiuua fit aliquo stiptico repressa aut per torrefactionem. Si uero superfluat cohibendum est cum his, quæ dicta sunt in cap. generali fluxus, & in capitulis præcedentibus. Ad quod ualet pitana hordeacea ex hordeo torrefacto, & similes cibi stiptici & in crassantes calidi, aut frigi. secundū quod oportet conditi cum uino cydo. & similib. Item sumachia, myrthea, & similes, & obseruet reliquū regimen suprascriptum. Si uero fluxus fuerit symptomatiscus factus à uirtute expulsiua irritata in principio egritudinis, & fuerit ex genere humoris qui facit egritudinem dimittendus est, nisi modum excedat, in siue uero egritudinis moderandus, nam tunc secundū plurimum timetur de casu uirtutis. Si uero fluxus proveniat ex solo casu uirtutis, non concurrente expulsiua, cohibendus est, & uirtuti cadenti subueniendum, ita ut dentur ea quæ sunt boni chymi, facili digestioni, paucarum superfluitatum, quorū parum multum nutrit cito in sanguinem, & spiritus conuertenda, & cum hoc constringentiā à sua proprietate. Et reliquum regimen constrictiuum obseruetur, & boni odores conferunt ad uirtutis subleuationem, sed ferè potius si ius diuinum, & naturale permittetur, ab horum cura fugiendum esset. Non enim hicalitudinem possimus nisi cuiusdam miserabilis uitæ aliquantulum productionem.

DE FLUXV OPPILATIVO Cap. II.

Fluxus oppilatiuus est qui provenit ab oppilatione uel ex apertione oppilationis, quamuis huiusmodi causæ sint efficientes mediatae. Immediata enim causa est uirtus expulsiua stimulatā à præsentia materiæ, aut defectu cōtēntiue cum gravitate materiæ.

Species. Hic autem fluxus est quintuplex secundum quinque species siue modos oppilationum dictos. Prima est oppilatio mēbra quæ possunt esse causa fluxus, & pororum eius. Tertia splenis & pororum eius. Quarta uenarum quæ sunt ultra epar ortum habentium à chyli ascendente aut descendente. Quinta oppilatio pororum cutis, & apertio omnium istarum potest esse causa fluxus præterquam oppilationis pororum cutis, hæc enim potest esse causa sudoris cum prius retentus esset. Est autem oppilatio horum mēbrorum morbus in uia prohibens transitum humiditatis bonæ aut superflue, quæ naturaliter transiret, & est triplex, una à quibusdam appellata coarctatoria, & est illa cuius causa est in uia, & nō in instrumento, cuius causa secundum plurimum est humor multus crassus uiscosus aut congelatus. Huius autem causæ primitiue sunt cibi & potus præbentes nutri-

mentum multum crassum aut uiscosum. Secunda uero dicitur attenuatoria, & est illa cuius causa est in instrumento, & non in uia, sicut apostema membri uicini coartans, aut uentositas aut alicuius membri dislocatio comprimentis meatum, aut ligatura aut mala complexio frigida, & sicca uiam constringens aut calida & sicca exiccando contrahens. Tertia autem est dicta carnosa cuius nocumentum est commune uia, & instrumento, & eius causa est caro, uerruca, pustula uel cicatrix, & omnes istæ causæ sunt perficientes. Causa autem disponēs est strictura meatuū in creatione sua. Causa oppilationis mēbraicarum disponēs est strictura ipsarum in creatione sua & perficiens secundum plurimum est chylus, & humor crassus & uiscosus, sed causæ primitiue sunt potus aquæ frigidaæ aquæ lutosaæ aluminosaæ & atramentales, itē caleus antiquus, & carnes antique bouum, bufalorum, & similia, & hæc secundum plurimum sunt causæ cæterarum oppilationum. Oppilatio autem epatis est duplex, quædam in uenis, quædam in poris eius, & utraq; est duplex. Quæ enim est in uenis, aut est in paruis aut in magnis, sed quæ in magnis aut accidit in porta & ramis eius crassis & est raro, aut in chyli & ramis eius crassis & est rarius, sed in ramis paruis utriusque frequenter accidit, & propriè in capitibus ipsorum sibi inuicem occurrentibus propter ipsorum uehementem stricturam, & hanc oppilationem frequenter sequitur fluxus ventris, quæ autem in poris est duplex aut enim est in poris purgationis superfluitatum, & est frequenter causa primo icteritia citrina si sit in poro felleo qui sub media penula epatis collocatur transiens usque ad gibbum eius, & aliquando licet raro sequitur tandem fluxus cholericus cholera regurgitante per mēbraicas ad intestina. Si autem sit in alijs ramis kystis accidit icteritia, & feces dealbantur, & rarissime cōtingit fluxus choleri. licet dealbatio fecum & tinctura urinae sit ferè commune signum cuiuscumque pori fellei oppilati, præterquam transeuntis ad fundum stomachi & si sit in poro purgationis superfluitatis melancholicæ à splene sequitur icteritia nigra, et tandem, licet raro fluxus melancholicus, & si fuerit oppilatio in utrisque poris accidit icteritia uiridis siue mixta utraque cholera sparsa per cutis superficiem ex colore enim citrino, & nig. cum permiscetur resultat color uiridis, de his tamen in icteritia dictum est quantum est opportunum, & ad hos oppilatiuos si sequeretur fluxus quod rarissimum est esset mixtus ex cholera, & melancholia. Si autem oppilatio sit in poris transitus nutrimenti de parte in partem per substantiam epatis quæ est raro non sequitur fluxus neque icteritia, sed crassities epatis cum durtiæ, & corporis extenuatio, quod est commune signum omnium oppilationum epatis, licet per has aliquando corpus præternaturaliter tumeat, & possunt eam multæ aliæ egritudines concomitari cum oppilatio epatis sit ferè mater omnium egritudinum, & unaqueq; istarū oppilationū, aut est noua, aut antiqua, simplex, aut composita, & unaqueq; istarū potest esse coarctatoria attenuatoria & carnosa, quarum causæ sunt illæ, de quibus supra. Sed frequenter oppilationes epatis sunt coarctatoriæ ab humore multo crasso & uiscoso. Raro attenuatoriæ ab apostemate coartante. Quarū causæ primitiue sunt ille, de quibus supra. Rarissi-

uitas sit maior in oppilatione epatis quam in apostemate eius, iuxta Aui. 2. primi. de signis oppilationum. Item apostemata epatis maiora causant nocumenta in breui tempore quam ipsius oppilationis, sicut est defectio appetitus singultus, arefactio, hydros, & similia. Et ex his manifesta sunt signa fluxus oppilatiui, siue oppilatio sit in meseraicis, siue in uena portae, siue in uena chylis. Signa praeterea distinctiua inter partes epatis, oppilatas etiam distinguunt inter fluxus inde prodeuntes, nam oppilatio gibbi manifestior est sensui, sentitur enim per tactu durities & crassities, & laedit magis partes spirituales, sed oppilatio concaui magis laedit stomachum, & non est ad tactum manifesta. Sed signa oppilationis pororum kystis felis sunt dealbatio fecum, urina citrina crassa, icteritia citrina, & tandem, licet raro fluxus cholericus choletera rheumatizante per meseraicas ad intestina, sed ad apertionem oppilationis horum pororum, sequitur aliquando fluxus cholericus, aliquando uomitus, si aperiat oppilatio pori felci tendentis ad fundum stomachi. Quae autem sint signa distinctiua inter oppilationes diuersorum pororum kystis sufficienter dictum fuit in icteritia. Signa autem oppilationis pororum transitus nutrimenti ex dictis in hoc capitulo manifesta sunt, non enim sequitur fluxus ventris neque icteritia, sed crassities epatis cum duritie, & corporis extenuatio, quod est commune signum omnium oppilationum epatis. Signa uero oppilationis splenis ex dictis superius sunt manifesta, siquidem fuerit in poro per quem splen attrahit melancholiam ab epate sequitur fluxus melancholicus, & splen est extenuatus. Si uero fuerit in poro per quem melancholia ducitur ad os stomachi splen incrassatur, & cadit appetitus, ad cuius apertionem sequitur uomitus melancholicus, & interdum melancholia exuberante uomitus & fluxus simul. Si uero sit in ipsa substantia splenis, adeo crassities splenis absque fluxu aut uomitu, nisi modum excederet, quae crassities si solueretur posset esse causa uomitus aut secessus melancholici. De his tamen superius sufficienter dictum est.

Signa uero oppilationis uenarum, quae sunt ultra epas sunt signa oppilationis generalia suprascripita, & cum hoc non sint signa spiritualia alicuius ex quatuor oppilationibus suprascriptis. Item fluxus inde sequens est humoralis cum periodicis.

Signa uero oppilationis pororum cutis sunt caudoris consueti, & non sunt signa alterius oppilationis, & fluxus est humoralis periodicus.

Signa uero causarum sunt huiusmodi. Si quidem oppilatio sit coartatoria ab humorum multitudine adiunt signa pectoris praedictis generalibus signis oppilationis addita. Si uero sit coartatoria ab humorum crassitie & uiscositate adiunt signa cacochymiae, item regimen praecedens cum malitia digestiois & crassities augeri & minui in breui tempore. si uero non permanebit semper aequalis durities uel crassities, si uero causa fuerit attenuatoria perficiens erunt signa apostematis epatis uel praesumptio alicuius ex praenarratis aggregantibus & constringentibus eas. Si uero fuerit compressio costarum aut ligatura & similia extrinseca, omnia sunt sensui manifesta.

Si uero fuerit carnosa, puta pustula aut bothor apparebunt signa apostematis, & pustularum. Si uero carnis additio uerace oppilatio erit partialis in aliqua uia uel poro propter quod oppilatio non erit magna, & per consequens signa oppilationis debilia, & cum hoc cura parum proderit. Si uero causa fuerit disponens, puta strictura uiarum in creatione sua, signum erit diuturnitas passionis, quia a principio generationis contracta cum fortitudine retentive & debilitate expulsiuae. Signa uero fluxus sequentis de oppilationem sunt ipsa oppilatio praecedens, de qua supra. Deinde fluxus humoralis sequens. Et tertio cura omnium accidentium sequentium oppilationem illam.

Prognostica. Primum fluxus sequens oppilationem coartatoriam antiquata difficulter curatur. Non uero facile curatur si debite tractetur. Secundum. Fluxus sequens oppilationem attenuatoriam propter apostema coartans, aut dislocationem membri uicini comprimantis raro, & difficulter curatur. Sequens uero malam complexionem sine materia, aut uentositatem uias attenuantem facile curatur. Tertium. Fluxus sequens oppilationem carnosam non recipit curam. Quartum. Fluxus sequens constrictionem meatuum a generatione contractus est coeternus patienti. Quintum. Fluxus sequens apertionem oppilationis est secundum plurimum salubris. Et terminus accidentium sequentium oppilationem.

CVRA FLUXVS OPPILATIVI in generali.

CVra generalis fluxus sequentis oppilationem exigit quinque intentiones. Prima apertio oppilationis si fieri potest. Secunda mundificatio humorum qui propter oppilationem sunt retenti. Tertia confortatio membrorum tam mittentium quam suscipientium. Quarta correctio accidentium. Quinta debitum regimen sex rerum non naturalium.

Sed in oppilationibus meseraicarum uenae portae ramorum, uenae chylis, & uenarum quae sunt ultra epas apertis oppilationibus, & facta mundificatione superfluorum, quae per oppilationem erant retenta duntur ea quae faciunt chylum penetrare ad epas, & humores ad membra confortando ipsorum attractiuam cum frictione & reliquis ingenijs. Quae intentio in reliquis oppilationibus dictis non est necessaria, sicut in oppilationibus kystis splenis & pororum cutis, quia in istis non prohibetur transitus nutrimenti ad membra. Si uero fluxus sequatur apertionem oppilationis exiguntur caeterae intentiones praeter primam. Et ex his inferitur stiptica constringentia non conuenire in cura fluxus oppilatiui nisi aperta oppilationem fluxus modum excederet, & hoc est quod dicit Aui. 6. tertij tractatu. 2. cap. 1. & istud quod cadit in hoc cap. de errore est, ut dentur illi qui habet fluxum epaticum oppilatiuum medicinae constipatiue addentes in oppilationem confortantes ea ut constringant naturam, & perducit istud ad errorem maximu & multotiens quidem linunt insipiens cum inspissantibus sanguinem, & extinguunt epas per hoc quod sunt frigida, & in hoc est mors, & successio putrefactionis, imo oportet cum sciueris quod causa in ipso est oppilatio

us est, licet pēdeat ab oppilationē utendū est semper
stipicis moderate etiam cū uolumus aperire, & per
teriam uirtutem membra lēsa confortantibus.

Quarta autem intentio, scilicet accidetium correctio
completur secundum ipsorum exigentiam, pro qua
recurrere ad curam generalem fluxus. Et si fluxus ni-
mis superflueret aperta oppilationē conueniunt sti-
ptica constringentia, quorum copiam habes in cura
generali fluxus. Et in præcedentibus capitulis, & si fe-
bris esset coniuncta fluxui, totum regimen magis ad
frigidum declinet.

Quinta intentio, scilicet debitum regimen sex rerū
completur secundum exigentiam causæ oppilatio-
nis, & exigentiam intentionum. Aer autem secundū
plurimū sit tēperatus in actiuis, declinet ad siccū, so-
mus sit satis prolixus. Procuretur euacuatiōes à natu-
ra institutas. Quiescat animo & corpore. Cibi sui &
porus cum opus est aperire oppilationem sint aperti
ut abstergentes & incidentes secundum exigentiam,
& in summa sint secundum exigentiam illarum intē-
tionum, quas complere intendimus. Sit diēta satis
tenuis, inspecta tamen uirtute ne cadat, & rectius est
apud Auiē. ut comedat cibum suum in pluribus ui-
cibus, & partiatur ipsum, & consequi faciat cibū suū
quod adiuuet ad penetrandū cum uelocitate, & ape-
riat oppilationem, sicut exempli gratia. uinum subti-
le. Et detur ei diacalamethum aur. i. ante cibum per
mediam horam cum paucō acetū uini subtilis poten-
tis non dulcis, & cum digeritur cibū detur de eo. 3. s.
cum uino suprascripto, scilicet quando cibū debet pe-
netrare ad epar. Et theriaca sumpta mane cum uino
debite calido iuuat uehementer, & balneatio comple-
ta secunda digestione iuuat. similiter fricatio ante ci-
bum completa secunda digestione est conueniens, &
propria, maxime quando membra sunt debilia in at-
trahendo, & fiat fortis fricatio cum panno aspero in-
cipiendo à dorso, & uentre, & tendendo ad extrema.

Et non absoluat urger à fricatione, nam cum fri-
caueris eum & aperueris oppilationes & solueris hu-
mores oppilantes penetrabit cibū ad corpus eius, &
non accidet diarrhoea post illud, & confortabitur cor-
pus, quod si aperta oppilationē fluxus superfluerit
utendum est stipicis confortantibus.

Et nota quod aqua calibea ferē confert in omni
fluxu, & in omni tempore, cum hoc enim quod con-
stringit, non tamen addit in oppila-
tione. Si uero fluxus sequeretur apertionem oppila-
tionis exiguntur intentiones suprascriptæ præter pri-
mam quæ complendæ sunt sicut dictum fuit.

Cura fluxus splenitici oppilatiui exigit quinq; in-
tentiones suprascriptas, & ferē cum eisdem complen-
dis de quibus dictū est in fluxu epatico oppilatiuo.
Fortiora tamen cæteris paribus exiguntur apertitiua
in fluxu splenitico non propter densitatem suæ sub-
stantiæ cum sit rarior, epate, sed propter humoris me-
lancholici crassitatem.

Ergo iuxta doctrinam primam, si fuerit peccatū in
sanguine phlebotometur basilica, aut saluarella fini-
stra, & prouocetur sanguis hæmorrhoidalis aut men-
strualis si eorum retentio fuerit in causa. Et forte in
his casibus melius est incipere à phlebotomia saphene
sinistræ, deinde phlebotomare basilicam aut saluarel-
lam sinistram. Deinde digeratur humor oppilans,

& per oppilationem rectus cum oxymelle simplici
composito & scillitico, & syr. de epithymo cū aquis
scelopendriæ, tamarisci, & similibus. Sed ex proprijs
est huiusmodi. 3. corticū radicum capparis. 3. s. sco-
lopendriæ, tamarisci, se. agni casti, se. endiuie, se. por-
tulacæ. ana. 3. z. aquæ 1b. z. mellis, aceti. ana. 3. 3. bul-
liant simul ad consumptionem medietatis, & coletur
& clarificetur, & facta digestione dentur. 3. 3. epithy-
mi. & 3. s. zing. cum. 3. z. decoctionis suprascriptæ,
aut cum tantū dem serri caprini. Item decoctio epithy-
mi descriptione Mesue est ad hæc propria. Item dialce-
ne est conueniens, uel accipiat ur huiusmodi si euacuā-
do intendis derelinquere uestigium constrictionis 3.
scene, mirabolanorum indorum. ana. 3. s. epithymi.
3. z. zing. gran. 5. serri caprini. 3. z. misce, & si mallet
pillulas exhibeantur huiusmodi. 3. mirabolanorum
indorum, scene, pillularum alefanginarum ana. 3. 1.
zing. gra. 1. fiant pillulæ. 7. cum aqua scelopendriæ,
& exhibeantur, aut exhibeatur quantum de eis uidea-
tur sufficere, in fluxu enim solutiua debent esse leuia.

Si tamen esset cum febre aut cū signis caliditatis den-
tur frigida aut remissa calida, sicut trochisci de agno-
casto descriptione Rasii. 9. Almanso. in capi. de dolo-
re splenis. 3. se. agni casti, se. tamarisci. ana. 3. 4. se. en-
diuie, se. portulacæ ana. 3. z. fiant trochisci, de qui-
bus quotidiæ detur unus cum syr. acetoso, & sine tro-
chisci. 3. z. aut circa. & in his casibus utendum est aquis
frigidis, sicut endiuie, cuscute, tamarisci, mediane, fra-
xini aut salicis, & solutiua etiam cum frigidis tempe-
rentur. Si uero oppilatio esset attenuatoria propter
apostema curetur cura eius, de qua supra. Si uero ef-
set attenuatoria propter uentositatem dentur trochi-
sci de capparibus cū apozimate de radicibus. Et hoc
emplastrum confert contra duritiem & uentositatem
quæ est sub splene. 3. foliorū rutæ. 3. 10. baurach, mē-
tastri siccī, añ. 3. 3. ammoniaci. 3. 7. ammoniacum in
uino ueteri dissoluatur cum quo cætera conficiantur,
& fiat emplastrum. Quod si durities cum oppilatio-
ne fuerit in substantia splenis, primo mollificetur cū
mucilagine maluaui, pinguedine anatis, medulla
uituli, & oleo de capparibus, postea resoluatur, ad
quod optimè ualeat emplastrum de fermento descri-
ptione Mesue, & quæcunque alia causa oppilationis
remoueat ur secundum quod oportet, sicut dictum
fuit in oppilationē epatis. Et nota quod si exhibea-
tur. 3. 1. ammoniaci cum. 3. 1. syrūpi acetosi, & 3. 3.
decoctionis radicum capparis, soluit oppilationem,
& mundificat splenem. Cætere autē intentiones com-
pleantur, scilicet mundificatio splenis confortatio, &
accidentium correctio secundum quod oportet. Si ra-
men aperta oppilationē fluxus superflueret constringi-
gatur cum interius & exterius applicitis, quorum co-
piam superius habuisti in cura generali fluxus, & ex
proprijs confortantibus splenem, & stringētibus flu-
xum sunt, ut exhibeatur in potu sumachi, se. portula-
cæ ana. 3. z. cum aceto aut syrū. aceto, & semen cuscute,
folia salicis & semen acetose sunt ad hoc propria.
Sed in causa frigida exhibeatur cum oxymelle sim-
plici. Pro regimine autem cibi exhibeantur cibi le-
ues & pingues ex iuribus præparatis cum subtilian-
tibus & temperate calefacientibus. Et cappares cū ace-
to sunt propriæ, & aqua extinctionis calidis, & uinū
subtile. Declinet autem magis aut minus ad calidum
secundum

secundum exigentiam causæ accidentium temporis anni, & huiusmodi. Quod si fluxus sequatur oppilationem pororum cutis, & fuerit coartatoria euacuetur humor qui est sub forma causæ antecedentis phlebotomia & pharmacia secundum ipsius exigentiam postea intédatur ad educationē humorū qui stant sub forma causæ cōiunctæ in poris cutis cū balneis acris aut aqueis sudare faciētibz, in quibus sint cocta aperitiua, sicut anetum, flores, chamomillæ, & similia, & fricetur cutis cum pannis asperis donec rubeant.

Postea ingreditur balneum aqueum aut acreum, & apud maiorem necessitatem fricentur cum melle, in quo mixta sit farina orobi, radi, lilij, & aristol. ro. & si fortis fuerit oppilatio ponatur parum salis niri, deinde ingreditur balneum, & lauetur & abstergatur. Frequentatio enim balnei acris aut aquei poros cutis aperit & sudorem prouocat. Sumpta etiam si cutis est uinum subtile, aut theriaca cū uino subtili prouocando sudorem aperit poros, & remouet oppilationem à quacunque causa proueniat nisi fuerit carnosa, cuius cura non est possibilis. Postea perficiantur relique intentiones, sicut humorum mūdificatio per fecellum aut urinam. Et quinto membra cōfortentur, & corrigantur accidentia secundū quod oportet, quæ qualiter debeant compleri ex dictis potest esse manifestum, & cauendum est à uiscosis, & stipticis tam cibalibus quàm medicinalibus, nisi aperta oppilatione fluxus superflueret. Precipue in his casibus exterius applicita non sint stiptica. Et sic cum dei gratia finitum est capitulum de fluxu oppilatiuo.

DE FLVXV A REBVS NON NATVRA-
libus, & extraneis sicut morsus uenenosorum
& uenenosorum sumptio. Cap. III.

Hic fluxus quantū ad quid nominis, & quid rei est manifestus. Species non habet nisi quosdam modos secundum causas eius differentes. Aer enim potest esse causa eius, aut propter eius superfluum lapsum secundum qualitates manifestas, aut propter qualitatem malignam sibi impressam à formis celestibus, aut quia putridus.

Venti quoque plerumque sunt causa fluxus, aut corpora replendo & humores liquefaciendo, sicut venti australes & subsolanus, aut exprimendo humores à circumferentia ad centrum sicut boreales, imò cum accidit tanta copia fluxuum qui sunt cōmunes uni patriæ, aut regioni, sicut fuit Ferrariæ anno. 1450. examinandum, hos etiam pendere ab aliqua causa uniuersali, siue sit aer, siue fruges illius regionis taliter corruptæ, aut formæ celestes, quæ tamen imprimunt in corpora nostra mediante aere, aut mediantribz cibis & potibus per ipsas corruptis quibus uescuntur. Effectus namque uniuersales in cās uniuersales resolui debet. Regimen quoque malū in cibo, & potu est frequenter causa fluxus quod esse potest multipliciter, aut propter quantitatem auctā, & est frequenter, & sic secundū plurimū corruptio ad acerosum, aut quantitatem diminutā, & est raro, & sic secundū plurimū corruptio ad fusosum, & utraque disponit ad putredinem chyli, & chymi inde generandi, aut propter qualitates primas inter quas maximè facit caliditas & humiditas, caliditas quidem pungendo, & excoxiando, humiditas

autem leniendo & lubricando, aut propter qualitates secundas, sicut subtilitas substantiæ, fluxibilitas, lenitas, absterfio, incisio, & similes, aut propter proprietatem occultam facientem hoc à tota specie, sicut medicinæ solutiue, aut propter proprietatem indiuidualem insequentem materiam, sicut cancri solutiue quolida præmittuntur stipticis compressiuis aut ponitur indigestum super indigestum, aut propter malitiam artificij, quæ potest esse multipliciter, aut propter ea quæ comelioni superueniunt, sicut coitus, motus fortes, accidentia animi & similia. Accidentia quoque animi sicut timor sunt causa fluxus trahendo materiam à circumferentia ad centrum ad quem fluxum sicut dicitur cum fuit non semper concurrunt expulsiua, sed aliquando sola grauitas materiæ cum debilitate contentiue. Morsus quoque animalium uenenosorum est aliquando causa fluxus aut corrumpendo humores aut debilitando contentiuā. Similiter caliditas & percussio soluedo continuum, & frequenter sequitur fluxus sanguinis.

Signa sunt causæ suæ.

Prognostica. Hic fluxus secundum plurimū curatur, nisi sequatur corruptionem aeris & pestilentiam. Aliquando enim imò frequenter interscitur quarta usque ad septimam. Si uero sequatur morsum uenenosorum cura est difficilis, aut impossibilis secundum malitiam, & intensionem uenositatis impressæ.

Cura posita est superius in cap. 2. ubi ponitur cura generalis cuiuscunque fluxus, & est sermo de ea in principio capituli. Verum si sit fluxus pestilentialis non est restringendus nisi timeatur caliditas uirtutis, & intendatur confortationi cordis, & membrorum nobilium, & prohibeatur putredo quantum est possibile, & pro completa noticia huius recurre ad capitulum de febre pestilentiali, & inter cetera cogatur ad cibum & ad potum qui partiendo est propter uirtutis debilitatem. Si uero fluxus pendeat à morsu animalis uenerosi fricetur locus morsus ut sanguis exeat, aut uenerosi fricetur locus morsus ut sanguis exeat, & emplastre uentose cū sacrificatiōe superponantur, & proprijs contragentibus, & proprijs contra genus animalis quod momordit, & inter cetera applicatio animalis nouiter interfectorum & apertorum cum calore actuali confert trahendo ad se uenenum, imò etiam ipsa uiua, sicut galline cum ano applicite cōferunt, & locus superior defendatur cū aceto & fori stricatura per magnā partem eius, & membra principalia cōfortentur cū interius & exterius applicitis, & proprie cū dietariaca, & bezoartica propria contra illa uenena exheriata, & bezoartica propria contra illa uenena exheriata, nec in his casibus cōpetit solutiua salis fortis neque phlebotomia, & proprie in principio ne uenenum trahatur à loco morso ad membra nobilia. Si uero sumptis fuerint uenenum aut medicinā uenenosam procuretur ipsius uomitus exquisitus, & si quid superest cū leniētibz educatur, sicut cū multo oleo calido assumptis, & cassia & clysteribus. Tercio membra principalia cōfortentur & dentur bezoartica cōtra ista uenena, & in hoc casu secundū plurimū nō cōpetit phlebotomia. Si uero fluxus sequatur casum, & percussione phlebotometur sanguis fluens cōstringatur, & uena soluta cōsolidetur, & si quid sanguinis coagulatus fuerit educatur secundū quod est expediens. Et sic auxilio dei abe solute sunt species fluxus penes causam efficientem, & finitus tractatus quartus.

Tractatus

TRACTATUS QVIN-

tus de speciebus fluxus a causa formali ca-
pitulum unum continens de
fluxu suauis & in-
suauis.

Fluxus suauis est qui uirtuti & repletioni est
proportionatus. E contra insuauis qui est
alteri harum improporionatus. Si enim sit
nimis uelox est uirtuti improporionatus. Si ue-
ro nimis tardus est improporionatus cacochymie.

Cause suauis sunt dominium uirtutis supra ma-
teriam, & ipsius digestio cum conuenienti uisum lati-
tudine, & contrarie cause sunt insuauis.

Signa fluxus suauis sunt bona conferentia et tol-
lerantia, & signa digestionis materie, & de hoc gene-
re est fluxus criticus. Item fluxus per quem na-
tura aliquando expellit superflua nulla preecedente
aegritudine.

Signa fluxus insuauis sunt his contraria, & de
hoc genere est fluxus symptomaticus, & cholerica
passio. Item fluxus omnes cum quibus tarde super-
flua educuntur.

Prognostica. Fluxus suauis aut est terminus
aegritudinis, aut ab aegritudine preferuat. Insuauis
autem est malus. Aliquando nimia uelocitate, aut tar-
ditate ducens ad interitum.

Cura. Si uero fuerit suauis finatur natura ope-
rari, sicut in fluxu critico dictum fuit superius, nec
in hoc aliquid est ordinandum nisi regimen ex reru
secundum quod est expediens.

Si uero fuerit insuauis nimia uelocitate quam na-
tura non toleret retardetur ingenijs opportunis, de
quibus sufficienter dictum fuit in capitulo generali
curationis fluxus, & etiam in particularibus, hic
enim necessario ad aliquem ex fluxibus particulari-
bus, de quibus supra reducit.

Si uero nimis tardus uelociter, sicut in fluxu cri-
tico diminuto, & tardante superius dictum fuit.
Et si finitum est hoc capitulum, & cum eo tractatus
quintus.

TRACTATUS SEX-

tus de speciebus fluxus a causa finali ca-
pitulum unum continens de
fluxu laudabili &
illaudabili.

Fluxus laudabilis est per quem expelluntur
nocitia. Illaudabilis uero per quem iuua-
tia, ex quibus inferitur quod aliquis fluxus
potest esse laudabilis, qui tamen non est suauis,
sicut fluxus per quem expelluntur nocitia nimis ue-
lociter qualem motum uirtus non bene tolerat, que-
ritur admodum etiam in alijs euacuationibus est manife-
stum sicut in empyima, & hydropisi cum aperiu-
ntur unde 6. aphor. aphorismo 27. Quicunque em-
pici aut hydropici uruntur aut iuciduntur his fluen-
tis sanie, aut aqua multa, aut repente omnino pereunt.
In talibus enim melius est infra subsistere quam exqui-
sire subito euacuare.

Cause laudabilis sunt dominium uirtutis supra
materiam digerentis separantis nocituum a iuua-

tio, & expellentis nocituum retento iuuatiuo, &
debita proportio uirtutis retentiue ad expulsiuam,
& e contra.

Signa huius sunt signa digestionis materie, &
bona conferentia, & tollerantia nisi nimis uelociter
superflua educantur.

Cause autem & signa illaudabilis sunt his con-
traria.

Prognostica. Fluxus laudabilis secundum
plurimum est salubris, & est terminus alicuius aegri-
tutinis, aut ab aliqua aegritudine preferuans.
E contra uero illaudabilis frequenter perniciosus.

Cura laudabilis est ut finatur natura operari, si
tamen esset nimis uelox aut tardus adiuetur auxilijs
opportunis. Sed cura illaudabilis perficienda est
secundum quod dictum fuit in capitulo generali, &
in capitulis particularibus preecedentibus, ad aliquem
enim fluxum particularium superscriptorum redu-
cendus est. Et sic cum Dei auxilio, cui gratias sem-
per ago immortales, finitus est tractatus iste difficilis
de fluxu uentris, cuius eterne maiestati supplicat ut
me cunctasque actiones, & gressus meos dirigat in
sui contemplationem, & uiam salutis eterne.

A M E N.

DE ANATOMIA renum.

Quia hic agitur de passionibus renum & ue-
sice, est eorum anatomia premittenda.

Renes descriptiue sunt membra instrumen-
talia parua, figuræ oblongæ, ad rotundi-
tatem tendentis, numero duo, iuxta spondiles alchatim
ex utroque latere locata, ex parte gibbosa & con-
caua integrata, ex panniculo, carne crassa, & solida,
uena et arteria composita, ad mundificandum aquo
sitatem superflua a sanguine finaliter ordinata.

Sunt quidem instrumentalia cum sint composita &
in operationem necessariam ad esse indiuidui ordi-
nata, parua in comparatione fere ad omnia membra
intrinseca. Sunt creati figuræ oblongæ, quia sic
duo foramina superius, aut inferius melius sunt di-
stincta. Tendunt ad rotunditatem, quia hæc figu-
ra magis est capax, aut a nocuentis magis tuta.

Fuerunt autem duo cum tamen cuiuslibet aliarum
superfluitatum, scilicet cholerae, & melancholiae re-
ceptaculum sit tantum unum, quia hæc aquositas est
multo maioris quantitatis quam aliqua illarum su-
perfluitatum. Et secundo ne læso uno huius aquo-
sitatis mundificatio impediatur. Tertio, quia si
fuisset tantum unus oportuisset ipsum esse magnum,
qui non potuisset debite locari nisi fuisset facta emi-
nentia in alchatim, quod fuisset satis turpe & indeco-
rum. Sunt autem locati iuxta spondyles alchatim,
unus in dextro latere, alter in sinistro, sed qui in dex-
tro latere est magis eleuatus, tum quia calidior, tum
quia epar minus descendit quam splen, & tertio ut ce-
dat monoculo qui infra renem dextrum est locatus.
Habent autem partem gibbosam & concauam, se-
cundum quam adhærent dorso, cum hac enim for-
ma melius aquositas attrahitur, & per poros ad ue-
sicam expellitur, & sanguis nutriturus renes melius
digeritur, & ipsi melius dorso alligantur.

Q

Panniculus autem inuoluens & suspendens unumquenque eorum per quem datur ipsi sensus componitur ex nervo oriente a media spondylium alchati, & ex ligamēto ortum habente ab ipsis spondyliis. Caro autem fuit solida ne facile excoerentur ab urina acuta, & ab humoribus acutis qui ei permiscuntur aliquando, sed fuit crassa, ut in eis uirtus attractiva esset fortior, cuius fortitudo insequitur multitudinem caliditatis, & spirituum. Venæ autem uenientes ad renes dicuntur emulgentes, quæ oriuntur a uena chyli descendente cum est ex directo renum. Orificia autem istarum uenarum non sunt ex directo, sed unū est altius & superius, scilicet quod est initium uenæ emulgentis uenientis ad renem dextrum. Cuius causa est quia ren dexter est magis in alto situatus quam sinister, & quælibet istarum emulgentium uenit ad renis concauitatem, & in ea dilatatur & rarefit, & ipsa sic rarefacta est colatorium, per quod colatur aquositas a sanguine, nam renes per uenas emulgentes attrahunt aquositate simul cum pauco sanguinis ipsos nutrituro, sed in renibus per colatorium colatur aquositas et descendit ad orificium inferius ad quod terminatur porus uritis deferens illam aquositate ad uescicam. Sanguis autem quia crassior non potens transire remanet, qui renes nutrit. Quapropter aquositas optime colata ad uescicam deferitur, quæ deinde mingitur. Similiter ad utrumque renē ab arteria aorti descendente, uenit ramus arteriæ deferens spiritum uitalem. Nervi autem ipsi adueniunt a nucha spondylium alchati, ex quibus ut dictum est simul cum ligamentis ab eisdem spondyliis ortum habentibus texuntur panniculi ipsos renes inuoluentes & suspendentes. Sunt autem ordinati ad mundificandum aquositate, quia aquositas multa quæ erat necessaria, ut simul cum ea sanguis penetraret per ramos subtilissimos uenæ poræ, aut uenæ chyli sibi obuiantes, cum sanguis transiit ad chylum est superflua, propterea per uenas emulgentes expellitur ad renes, ut deinde tanquam superflua expellatur. Non enim de ea remanet cum sanguine nisi quantum sufficit ad faciendum sanguinem penetrare per uenas ad corpus nutriendum.

Ex quibus manifestum est ipsos renes colligari cum cerebro mediantibus nervis a nucha orientibus, et cum corde mediantibus arteriis orientibus ab arteria aorti, & cum epate per uenas emulgentes, & cum uescica per poros uritides, & quod sunt complexionis calidæ & humidæ, & possunt pati omne genus ægritudinis, scilicet malam complexionem quæ est secundum plurimum calida, malam compositionem, scilicet opilationem, & morbum in numero sicut lapidem, arenulas, & pilos, qui secundum plurimum ex eadem materia generantur, scilicet trassa, phlegmatica, uiscosa caliditate ipsorum, & quandoque pilis generantur ad longitudinem palmi cum materia illa transiens per aliquem porum strictum colatorii, paulatim in pilum condensatur, & quandoque patiuntur solutionem continui secundum aliquam uenam colatorii, unde fit mictus sanguinis, licet etiam possit esse mictus sanguinis propter colatorii dilatationem, sed hic paruus est, imò quod mingitur est sicut lotura carnis, licet etiā ruptura emulgentis superius possit esse causa mictus sanguinis, debilitando colatorium, sed hoc rarius.

Item possunt pati apostemata, post cuius rupturam sequitur ulcus licet ulcus in eis ex pluribus alijs causis contingere possit. Item causa ipsorum fit diabetes, quando tota aquositas uel plusquam debet trahitur ad renes, & attracta fere subito expellitur, & similitur lientericæ, cum nullam digestionem in renibus recipiat, sicut nec cibus in stomacho.

DE ANATOMIA UESICÆ.

Vesica est membrum instrumentale, magnam habens concauitatem infra renes, dorso alligatum, superius cum renibus mediantibus poris uritidibus, anterius cum uirga mediante collo eius colligatum, ex duabus tunicis quatum ad fundum ex carne & musculis quatum ad collum, & neruis, uenis, & arteriis compositum ad attrahendum aquositate, ipsam quoque debito tempore retinendum, & tandem expellendum finaliter ordinatum. Quod sit instrumentale patet ex sepe dictis. Concauitatem autem habuit magnam propter multitudinem superfluitatis aquosæ, quam habuit continere. Est autem dorso alligata infra renes, quia renes alligantur spondyliis alchati. Ipsa uero spondyliis alanis secundum eius concauitatem autem superius continuata cum renibus mediantibus poris uritidibus, quorum dexter oritur a foramine inferiori renis dextri. Sinister a foramine inferiori renis sinistri, qui pori uritides sunt cannales deferunt aquositate urinalem a renibus ad uescicam. Hi autem perueniunt ad uescicam circa medium eius, dexter ad dextrum, sinister ad sinistram eius. Et non perforant uescicam directo uno foramine magno, imò foraminibus paruus & obliquis procedentibus inter tunicam, & tunicam per aliquantum spatium, postea penetrant in uescicam. Quod factum fuit ne cum uescica impleatur urina, posset urina regredi, imò quanto magis est plena, tanto tunica interior magis comprimit exteriorem non sinens urinam egredi. Et sunt neruosi ex duabus tunicis compositi, sicut & fundus uescicæ, continuatur autem collum uescicæ, cum uirga in uiris, in quo collo simul & uirga est foramen per quod mingitur, sed in mulieribus extremitas collum uescicæ terminatur ad uulua, distans ab orificio eius per duos digitos, aut circa, & collum uescicæ anfractum est longius quam in mulieribus, & habet tres anfractus, in quibus aliquid urinae cum egreditur retinetur, quia anfractus iuuant ad retentionem urinae, ne facile inuoluntarie egrediatur, sed collum uescicæ in mulieribus non habet nisi unum anfractum, & est magis latum quam in uiris. Est autem fundus uescicæ compositus ex duabus tunicis, quarum intrinsecam est dupla secundum crassitiem ad extrinsecam cum obuiet aquositati urinae acutæ, sed collum est carne, siue carnosum, & crassum, propterea facile conuoluitur, siue solidabile cum soluitur, fundus uero non. Ad uescicæ autem tam partem dextram quam sinistram ueniunt nervi, uenæ, & arteriæ a nucha, uena chyli, & arteria aorti descendentes cum sunt ex directo spondylium, alanis, & alios. In

In collo autē eius est rātum unus musculus qui ipsum circumdat. Cuius iuuamentum est urinam usque ad horam uoluntatis retinere, & cum uoluntas fuerit expellendi eius laxabitur constrictio, & uentris musculi uescam urgebunt, & urinam expulsiua adiuuante expellent. Finis autem inseritur in fine. Nam iuxta Auicennam 19. tertiū, capitulo primo. Quemadmodum Deus excelsus creauit, fecit uasa comprehendentia totum uis quo aggregatur, deinde expellitur totum simul per quod fit exculatio ab assellatione fere continua. Similiter pręparauit superfluitati aquosę dignę expelli capacitatem & sacculum comprehendentem totalitatem, aut plurimū eius, donec surgat ad expellendum simul, & non sit necessarium expellere ipsam continue, sicut accidit patientibus distillationem urinę, & capacitas illa est uescicę.

Ex his manifesta est anatomia uescicę, & complexio eius quę est frigida & sicca. Vesica autem potest pati omne genus egritudinis, scilicet malam complexionem cuiuscunque generis, malam compositionem, sicut oppilationem, siue sit in meatu per quem urina attrahitur ad uescicam, siue in meatu per quem expellitur. Item morbum in numero, scilicet lapidem, qui aliquando crescit ad quantitatem ouī. Item egritudinem in quantitate aucta, aut diminuta. Item solutionem & apostema, & quādo que ipsi communicant membra regalia & nobilia, sicut cerebrum. Nam fit dolorosum cum ea, & ad causam communitatis egritudinum calidarum uescicę. Item epar, quare aliquando accidit hydropiper arteriam, & egritudines uescicę multiplicantur in hyeme, & curantur sicut egritudines renum, sed cum medicinis fortioribus & magis remanentibus, & sunt potiones, iniectiones, unctiones, & emplastra, quibus emplastrantur duo emunctoria, id est, pori uritides, & sub umbilico, scilicet usque ad peritōnem, & in duabus commissuris singularibus, scilicet ubi pori uritides ad uescicam terminantur, & etiam in peritoneon, scilicet inter anum & testiculos, et curantur cum sessionibus in tinnis.

DE DIFFICULTATE
urinę.

PRO notitia terminorum est sciendum, quod actio urinandi dupliciter impeditur, aut in emissionē, aut in retentionē. In emissionē quidem diminute, ablate, aut corrupte. Diminute quidem quando homo tenuit mingit, unde magnum tempus occupat in mingēdo, aut quia urina existente in uescica non potest incipere mingere cum uult, aut forte postquam incipit non potest continuare actio emittendi urinam diminuta, & a quibusdam uocatur dysuria. Ablate autem lęditur, quando homo nullo pacto potest mingere, & hæc ab eisdem uocatur furia. Corrupte uero quando guttatim emittitur, aut cum conamine, hæc enim actio corrupta dicitur, quia non conuenit alicui indi-

uiduo de specie humana naturaliter disposito, & dicitur stranguaria. Et has dispositiones hoc uersu perstrinxerunt. Strangur guttatim. Sur. nil. dysurque per horas, uerum his terminis antiqui et moderni abutuntur, sed secundum Simonem apud grecos stranguaria quę potius dicitur, & scribitur stranguaria exponitur constrictio urinę, & est cum guttatim mingitur, & est species dysurię, sed hanc contentionem de his nominibus omittamus.

Actio etiam retinendi urinam tripliciter impeditur. Diminute quando non potest eam debito tempore continere, sicut accidit in uoluntarie mingentibus dum uigilant, & etiam mingentibus in somno. Ablate quando nullo modo potest continere, & dicitur distillatio. Corrupte uero quando cum dolore retinentur. Vtrum autem istę duę actiones, scilicet emissio & retentio urinę possint diminute lædi per intensiōem est ex dictis manifestum.

Est enim tenenda pars affirmatiua. Rasis autem in pręsenti capitulo per difficultatem urinę intellexit emissionem urinę tripliciter impeditam, scilicet diminute, ablate, & corrupte. De impedimento autem triplici retentionis urinę loquitur in quodam capitulo sequente intitulo de fluxu urinę. Et ex his manifesta est quiditas difficultatis urinę, de qua intitulatur pręsens capitulum. Est enim lęsio emissionis urinę, diminute, ablate, aut corrupte. Sicut econtra fluxus urinę, de quo intitulatur quoddam capitulum sequens, est lęsio retentionis urinę, diminute, ablate, aut corrupte, sunt etiam utriusque species manifestę ex dictis.

Causę difficultatis, siue impedimenti emissionis urinę sunt septem. Prima, est nocumentum uescicę. Secunda, est lęsio in meatu urinę, qui est collum uescicę, uel uirga. Tertia, est nocumentum in uirtute. Quarta, est nocumentum lacerti, colli, uescicę. Quinta, est dispositio urinę. Sexta, est dispositio renum & pororum uritidum. Septima, est dispositio membrorum principalium, & sibi deservientium.

Prima causa, scilicet nocumentum uescicę est. Aut propter malam complexionem siue materia, quę secundum plurimum est frigida aut cum materia cuiuscunque generis. Secundo propter apostema ipsius calidum, aut frigidum frequenter durum. Tertio ex retentione urinę longo tempore. Nam uescica extenditur, & meatus urinę oppilatur, & etiam propter extensionem uilli laritudinales facti debiles non possunt se contrahere & constringere uescicam, ita ut urina expellatur.

Secunda causa, scilicet lęsio in meatu colli uescicę, aut uirgę, est aliquando ulcus ualens, aut scabies in meatu urinę existens, ex quibus natura sentiens morbicatōem terretur ab expulsiōe urinę per meatum illum. Nam quotiens uult mingere dolet, ideo nō exprimit uisitor uescicam fugiens a dolore, imō constringit meatum urinę, & fit oppilatio attenuatoria. Fit etiam eiusdem oppilatio attenuatoria propter compressionem ab aliquo membro, sicut anus, intestinum rectum, collum matricis cum huiusmodi membra apostemantur, aut ex aliqua causa tument & comprimunt collum uescicę.

Q.

Cognoscitur autem res oppillans absque apostemate per syngam, et per illud quod ipsa expellit de sanguine; aut alio humore, aut per id quod stat in facie eius ex ueruca, aut lapide, aut incarnatione & non dimittit ipsam penetrare. Et lapis cognoscitur per signa eius, & propterea quod synga tangit rem duram ualde. Et sanguis quidem & humor cognoscuntur iterum per urinam, nam secundum plurimum aliquid egreditur cum urina. Et sanguis etiam cognoscitur per signa congelationis sanguinis in uesica ex citrinitate coloris, aut paruitate pulsus & anhelitus, & frequentia amborum, & sudore frigido, & rigore, & nausea, & est malus a quo parum fit euasio. Et humor quidem crassus cognoscitur ex grauitate sensata, si sit notabilis quantitatis, & iterum si egreditur in urina. Et illius quidem quæ est a frigore constringente, aut calore solidum faciente causæ propinquæ & antecedentes sunt signa.

Et illius quæ est a uetustate signum est tensio sine grauitate, & quandoque est cum permutatione, quandoque sine. Et signum eius quæ est ex debilitate sensus, est ut non sentiat mordicationem urinæ. Et signum eius quæ est a debilitate expulsiuæ, est ut compressio facilius educat eam. Et signum mollificationis lacerti uentris est, quia non potest uentrem contrahere pro compressione faciendâ, & compressio facile eam educit. Signum autem mollificationis lacerti colli est, quia urina egreditur inuoluntariæ & contra est de spasmum utriusque, quia per spasmum lacertorum latitudinalium uentris urinæ exprimitur, sed per spasmum lacerti uesicæ urinæ retinetur, nec potest educi nisi cum compressione. Et difficultas facta causâ renum, & pororum uiridum, siue sequatur debilitatem attractiui, uel propter aliquam speciem malæ complexionis, siue oppilationem, siue apostema, aut solutionem continui cognoscitur per signa inferius ponenda, & ut dictum est urina non continetur in uesica, & si sit magna grauitas circa renes ibidem urina retinetur, non potens ad uesicam penetrare. Et si grauitas sit menodioris, tunc illic est materia cum apostemate, aut si uis tunc non sit grauitas, sed dolor extensus est in uentris rebus. Et quando non est nocuumtum in uesica nec adsunt signa oppilationis renum, & uenter est lenis, tunc causâ difficultatis urinæ est debilitas attractionis renum. Et si ex acuitate urinæ est quod tolerantia dolorum educit eam. Item adsunt signa ulceris sumpta a sanie. Et signa facta ab exiccatione humorositate in membris glandosis, sunt antecessio causarum exiccantium, & quod humectatio facit fluere urinam. Et si grauitas urinæ causa epatis, cerebri, nuchæ, et neruorum sunt egriitudines sue, de quibus sermo precessit, & proprie cum non apparent nocuumta in instrumentis urinæ.

Prognostica. Primum. Hæc passio difficultas sanatur in senibus, & proprie in decrepitis, & ad hoc ampliat aphorismus sextus, sextæ particulæ, nephretici & circa uesicam dolores laboriosè sanantur in senibus. Secundum. Auicennam experiri quidem est in pluribus horis, & dictum est qui habet difficultatem urinæ, & aduenit ei postea tene-

simus, moritur in septimo nisi accidat febris et prouocationem plurimam faciat. Verificatur autem quia aliquando accidit difficultas urinæ propter spasmum lacerti, colli, uesicæ, & postea aduenit tenebris propter fortem conatum ad mingendum, unde fit magna compressio ani, febris autem superueniens resoluit humilitatem spasmum curat difficultatem ex qua mortuus fuisset in septimo, licet aliquando moriuntur, soluto autem spasmum fit plurima urinæ prouocatio. Tertium. Quibus micus denegatus fuerit, si mingunt in septimo uel ante sufficienter secundum plurimum saluantur. Si uero post septimum secundum plurimum moriuntur, iam læsis nobiliter membris nobilibus ex urinæ retentione.

Cum urina minuitur aut ex toto retinetur, nec tumor apparet in femore nec grauitas, nec dolor in renibus sentitur, succurrendum est ex medicaminibus urinæ prouocatiuis quæ nominabimus. Quorum unius confectio. Recipe seminis apij, nitri, rubæ tinctorum, seminis olusatri, asari, seminis iuniperi, ameos, seminis foxeniculi, spicæ, amygdalarum amararum, ana drachmas uiginti, seminis melonis drachmas decem, cantbaridarum, quarum capita & ale abscessa fuerint drachmam unam, ammoniaci drachmas tres, ammoniacum in uino dissoluatur, & aliæ species ex eo conspergantur, ex quibus fiant formæ auellanis similes. Ex quibus sumatur ab una drachma usque ad tres. Hoc enim medicamen ualde confert corpori cum dissolutionem & laxationem patitur, & hyposarce ad expellenda omnia accidentia causæ quorum corpus desiccari oportet.

Hoc capitulum diuiditur in quatuor partes. In prima curat difficultatem urinæ ex debilitate attractiue renum. In secunda parte curat difficultatem sequentem apostema propter casum & percussione. In tertia parte curat difficultatem sequentem oppilationem coarctatorem a trumbis sanguinis, aut saniosis, aut ab humore crasso, & uiscoso. In quarta parte curat difficultatem propter lapidem in uesica. Secunda ibi. Quod si contingat. Tertia ibi. Si autem mingendi. Quarta ibi. Si autem mingendi difficultas. In prima parte dicit: Cum urina minuitur, nec in femore apparet tumor, nec grauitas, quod signat in uesica non esse oppilationem, nec dolor in renibus sentitur, quod significat ibi non esse apostema, aut lapidem, neque urinam ibi congregatam, unde est sola impotentia attrahendi a uoluntate se-

quens malam complexionem secundum plurimum frigidam. Succurrendum est cum urinæ prouocatiuis quæ nominabimus, quorum unum est hoc.

Recipe seminis apii, niri, rubæ, tinctorum, olusatris, 1. seminis macedonici, alias seminis alexandri, seminis iuniperi, seminis asari, ameos, sem. feniculi, spicæ, amygdalarum amararum añ. 3. 20. seminis melonis, 3. 10. cantharidarum quarum capita & alæ abscissa fuerint, sunt enim nimis excoriatiua. 3. 1. ammoniaci. 3. 3. ammoniacum in uino dissoluatur, & alia secum misceantur ex quibus fiant formæ similes auellanis, de quibus sumatur a 3. 1. usque ad 3. 3. hoc n. medicamentum ualde cōfert corpori cū dissolutione, id est mollificationem patitur ab humiditate superflua, & laxitatem, id est, mollitiem hypofarcæ propter phlegma & aquositatem superfluam. Et in lumina ubi opus est corpus exicare, sūt enim hæc omnia fortiter prouocantia notabiliter calida & secca, præter semina melonum quæ sunt frigida & humida. Et potest hoc medicamentum exhiberi cum iure cicerum, aut alio prouocante sicut aqua raphani.

Quod si contingat mingendi difficultas ex casu, uel percussione in femore, uel in ano, uel in eorum circuitu, æger ex basilica minuatur. Deinde aqua calida sæpe superfundatur, & usque ad spatium medij diei ex oleis fricetur. Aegro quoque præcipiatur ut urinam expellere nitatur.

Hic curat difficultatem urinæ a casu, aut percussione, quibus accedit apostema in meatu colli, uesicæ, aut uirgæ, aut in membro uicino, præcipiens ægrum ex basilica minui ad prohibendum augmentum apostematis; postea aqua calida superfundatur ad sedandum dōlorem & meatum dilatandum. Et ex oleis fricetur ita ut uirtus olei penetret in profundum, & sit oleum doloris sedatiuum, sicut oleum uiolaceum selaminum, & præcipiatur ut æger conetur expellere urinam, imò aliqua compressione adiuuetur eius expulsio. Sed ut credo melius esset in principio epithimare locum cum oleo rosato rudi, ad prohibendum apostema, deinde uenire ad mollificantia iam dicta, præmissa semper phlebotomia copiosa, & etiam iterata si fuerit expediens, & uentre cum clysteribus linito. Signa autem distinctiua inter apostema meatus, uesicæ & membri uicini sunt, quia in apostemate membri uicini urinæ exprimitur sine dolore magno, sed in apostemate proprio meatui cum dolore magno. Item ad sunt signa propria cuiusque membro apostemato.

Si autem mingendi difficultas cōtingit uesica existente plena & extensa, et sic hoc post sanguinis uel puris mictum, medicamentum quæ trumbos sanguinis, uel puris quod in uesica generatur soluere consueuerunt,

& aliqua redanda sunt. Confectio medicaminis sang. uel puris trumbos quod in uesica fit dissoluentis. Recipe cordinum, myrrhæ rubæ de qua tingitur, seminis iuniperi, ammoniaci, assæ foetide omnium ana partes æquales, ammoniacum dissoluatur, & informetur pilule ex eis, uel his speciebus cum eo conspersis. De quibus quater in die sumatur cum apozemate de seminibus quod nominauimus. Syrupus etiam acetosus ex forti aceto factus multotiens detur. Per syringam præterea immitatur aqua in uesicam, in qua dissolutus fuerit sal, aut aqua cineris. Et ista est confectio aquæ, quæ fit de cinere. Recipe cinerem de ilice, cinerem de uitibus calidis, calcem, his omnibus admisceatur tantum aquæ, ut ex ea cooperiri possint & dimittantur sic per tres dies, deinde colentur & per syringam iniiciantur. Herba quoque croci hortulanæ, & fulla coctæ supponantur.

Tinam præterea ingrediatur, in aqua in qua coctæ sit chamomila stœcas & ab. sam. psuchus, sissimbrium, uel in qua extremistæ caulium & fulla, & finus collumbæ nus coctæ fuerint. Et sedeat in ea quantum poterit. Ex herbis istis sic coctis fit et emplastrum siue epithima super femur, & partes ei circumadiacentes.

Et dum in tina moratur sumat ea in potu, quæ urinam prouocant. Et si hæc omnia non profuerint ad instrumentum quo urinæ prouocatur redeundum est.

Hic curat difficultatem proueniētem ex oppilatione coarctatoria meatus.

Et ponens signa dicit quod uesica est plena & extensa, quod comprehenditur ex tumore in femore, & quia præcessit mictus sanguinis aut saniei. Et tu superple aut phlegmatis crassi. Primum remedium tunc datur illa quæ dissoluant huiusmodi trumbos sicut istud. Recipe cordinum, id est, carui agrestis, rubæ, myrrhæ, seminis iuniperi, ammoniaci, assæ, omnium partes æquales, ammoniacum dissoluatur, & pli

pligratita cum oxymelle simplici, uel cōposito, scilli-
tico, & cum eo misceantur reliqua, & reformatur pi-
lule, de quibus datur quater in die cum apozemate
de seminibus superius descripto. Dosis autem ista
rum pilularum est z. 3. Secundum remedium est,
ut syrupus acetosus ex forti aceto factus multotiens
cum syringa imitatur in uescam cui sit admixtum
aliquid salis ad dissoluendum trumbos illos. Ter-
tium ut aqua cineris etiā immittatur per syringam
cuius est hæc descriptio. Recipe cineris de ilice, ci-
neris de vitibus calidis, id est, cineris qui sit de quadā
herba salsa quo utuntur tinctorios, calcis, ana partes
æquales, cum his misceatur tantum aquæ, ut ex ea co-
operiri possint. Et dimittantur super tres dies, de-
inde colentur, & per syringam in uescam iniiciatur
aliquid eius, & est fortis & non ponenda ubi timor
sit de excoriatione aut ulcere. Quartum est herba cro-
ci hortulani, id est, carthami & fulla, id est, herba arte-
tica, quæ regioni uescicæ superponatur postquam est
cocta, prouocat enim. Quintum est, ut ingrediatur
cinam aqua, in qua cocta sunt chamæmilla, stœcas
arab. sampucus, id est, maiorana, silimbrum, aut in
qua coctæ sint extremitates caulium aut finis colū-
binus, & similia prouocantia, & æger in decoctione
earum sedeat, & ex herbis istis sic coctis & debite cali-
dis emplastrum, super femur apponatur, & partes ut-
rimedinas prouocantes, & ultimo his non sufficienti-
bus ad curam ad instrumentum cum quo urina pro-
uocatur est recurrendum, & est syringa, quæ debet po-
nī per foramen uirgæ, usque ad concavum uescicæ, ut
id quod est in meatu propellatur. Et si aliquid sicut
meatus syringæ, postquam est immissa extrahatur.
Et sequetur urina ne detur uacuum, uel cathatr pona-
tur cū extremitate sua in meatu syringæ & extraha-
tur, & sequetur urina ne detur uacuum. Sed de his infra.

Si autem mingendi difficultas post la-
pidis signa affuerit, æger supinus iaceat,
& pedes eius diu & diuersis modis, & for-
titer quatendi sunt. Et si urina non e-
gressa fuerit, oportebit ut cum instrumen-
to curetur per quod membro immixtum sit
impulso. Cauendum tamen est ne uirgæ
immittatur, cum est ibi apostema. Ad
difficultatem uero urinæ ualde confert sa-
pe ingredi tinam. Et ungere locum ex oleo.
Et medicamina urinam prouocantia in po-
tu sumere. Et abstinere à nutrientibus ace-
tos & ponticis & crassis.

Hic curat difficultatem propter lapidem oppilan-
tem meatum uescicæ. Si ergo signa lapidis affuerint,
pedes capiti eleuentur & fortiter concutiantur, ut lapis
fortiter ab orificio remoueat, & si hoc non sufficit,
oportet ut instrumentum aliquod sicut syringa per
uirgam immittatur, per cuius immersionem lapis à

meatu propellatur. Cauendum tamen est ne uirgæ
immittatur, cū est ibi apostema, esset enim causa aug-
menti apostematis dolorem intensum inferendo.

Postea epilogan, dicit quod ad difficultatem uring
confert sape ingredi tinam, & inungere loca ex oleis.
Et tertio medicamina urinam prouocantia sumere,
& quarto abstinere à nutrientibus acetosis & ponti-
cis & crassis imò potius uti absterfuis incidēibus &
prouocantibus.

DE CVRA DIFFICULTATIS VRINÆ.

Cura difficultatis urinæ exigit quatuor inten-
tiones, prima remouet causam, secunda edu-
cit urinam, tertia corrigit accidentia, quarta
ordinat debitum regimen sex rerū. Si ergo
in causa fuerit caliditas frigī, aut alia dyscrasia, remo-
ueatur cum contrariis applicitis & assumptis, quæ ta-
men sint propria in prouocando urinam de quibus
dicitur. Si uero fuerit propter apostema, curetur cu-
ra apostematis de quo infra in cap. proprio. Et admi-
nistrentur illa, quæ cum hoc quod sunt propria in cu-
ratione apostematis etiā prouocent urinā. De qui-
bus est phlebotomia basilicæ in primis, deinde phle-
botomia saphenæ, quandoque enim prouocatur cum
ea urina, & applicatur femori, paritaria, caules, semi-
nalini, altheæ, mortificata in sartagine cum oleo cha-
mæmil. anethino, sesamino & similibus. Iste fiant cly-
steria ex decoctis istorum & similibus cum oleis dictis,
nam cum est leuitas apostematis descendit urina cum
expressione & cōpressionē, & minoretur potus aque
& prohibeatur cibus duobus diebus aut ualde mino-
retur. Et si in causa fuerit retentio urinæ longo tem-
pore curetur sedendo in decoctione mollificante &
fomentando femur cum ea, facta scilicet ex se. lini &
similibus. Deinde utere ruta & multum prouocanti-
bus, & oleum balsami, & quæ sunt ei comparia sunt
multi iuuamenti, & iuuatur etiā cum compressio-
ne. Et si in causa fuerit humor aut sanies oppilans
meatum, existimo tutius esse non exhibere diuretica,
& maxime uescicæ existente plena, ne fiat maior oppi-
latio, & maior ipsius uescicæ extensio, sed bonum se-
mori applicare dissolutia trumbos sanguinis, sanici
& humoris crassi, & ex eisdem clysterizare, & ponere
ægrum in tina siue in semicupio, quibus non suffi-
cientibus trumbos à meatu cum syringa pellere, &
injicere in uescicam ea quæ illos dissoluant. Et urina ex-
pellere cum syringa sicut dicitur, tandem his non suf-
ficientibus exhibere diuretica & trumbos dissoluen-
tia. Ultimo his non conferentibus cum res iam posi-
ta est in desperatione incidere in collo uescicæ, secundū
modum qui seruatur in incidendo collum uescicæ pro
extractione lapidis, sed pro expellenda urina multo
minus sufficiat foramen. Medicinæ ergo femori su-
perponendæ, clysterizandæ & in semicupio ponen-
dæ sunt istæ, paritaria, cretanus marinus, herba croci
hortulani, extremitates caulium, chamæmilla, stœcas,
sampucus, folia & radices apij. Sed fortia sunt cor-
dumeni, rubea, mirra, semen iuniperi, saluia, asarū
ammomum, folia raphani & semen, pulegium, dau-
cus, sinapis, finis colūbinus, his ergo aut aliquibus
earum pro libito utaris. Medicinæ uero fortes sumē-
dæ sunt, diacurcuma, dialacca & similes, quæ sumi

possunt cum aqua raphani, aut aqua ciceris nigri.

Fortissime uero sunt prima descripta à Rasi in hoc cap. Et apud Auic. cōfectio diuretica fortis circa principium cap. in quibus ingrediuntur cantharides, quę sunt ultimę in prouocando interius sumptę & exterius applicatę, & ad dissoluendum trumbos saniei & sanguinis optimum est medicamen posittum à Rasi, cuius litera medicamē quod trumbos sanguinis aut saniei. Et similiter iniiciendum per syringam est aqua cineris quam describit. Cum uero. utere magis aut minus fortibus secundum quod uidebitur tibi expediens. Cautamen ne in puero ualde fortibus utaris, imò leuius ex his danda sunt cum lacte materno, aut his nutriti utatur. remanebit enim uirtus in lacte prouocatiua. Similiter uitanda sunt ubi adsit aut timeatur excoctio aut ulcus. Sed cura illius quę est causa lapidis in renibus, est ut primo leniatur uenter. Et fiat renum mundificatio cum. 1. 2. 3. florum castę dissoluta cum aqua scolopendrię, & siant dysteria lenitiua & prouocantia ex decoct. paritaria oleo anethino, liliorum alborum cum benedicta simplici & similibus. Exterius apponatur paritaria mortificata, cum oleo scorpionum, & sedeat in tinis prouocantibus & lenientibus. Et sumat iustitū aut lithon thrypton cum aqua raphani & similibus. Si uero in causa fuerit lapis uescicę aeger eleuatus per pedes concutitur, aut cum syringa immissa in uescicę lapis à meatu uescicę amoueat, aut cum digitis in anum positis similiter amoueat donec urinet, postea attendatur uerę curę ipsius lapidis. Si uero lapis fuerit in meatu uirgę retentus ponatur uirga in aqua calida. Et cū oleis lenientibus & dilatantibus ungatur & uersus extremitatem lapidis exprimatur. Et impellendo urinam uisio lenter tenter ipsius expulsiōem. His autem non sufficientibus cum stilo habente extremitatem aliquam extrahatur, quod est simile instrumēto cum quo mundificantur aures, & his non sufficientibus incidatur meatus uirgę, in quo continetur & extrahatur. Modus autem incidendi collum uescicę pro extrahendo lapidem est satis notus. Si autem difficultatis causa fuerit ueruca aut caro cū mollificatibus procedatur, & modus Auic. fortasse proderit, fortasse non, facta autē causa uentositatis curetur cura uentositatis, de qua in tympanite. Facta uero propter dolorem ex lēione in meatu curatur cum administratione stupefacientium & infectione, deinde præcipiatur ut se exprimat, & etiā comprimendo femur adiuuetur, & post illud administretur cura ulceris, aut cura æquationis urinę acutę cum cibis & potibus in frigidantibus, & quandoque iniiciantur facientia conglutinationem separantia inter acuitatem urinę & nocumentum eius in meatu sensibili, sicut aqua albumen oui, difficultas autē sequens apostema membri uicini curatur cum phlebotomia & reliqua cura apostematum, & maxime cū mollificantibus & compressione uescicę. Testiculus autē eleuatus ad mirach trahitur deorsum cum mollificantibus quę applicantur, & in quibus sedetur. Exsiccatio uero carnis glandosę similiter curatur cum humectantibus. Si uero in causa fuerit defectus uirtutis sensitiuę aut motiuę, & sequatur nocumentum principiorum, curetur cura paralypsis spalmi aut stuporis. Si uero nocumentum fuerit in uescicę & lacerto exhibeatur theriaca & mi-

thridatum, & ungatur cum oleo sambacino & oleo de lilio & de narciso, aut de croco, aut de balsamo. Et administretur emplastrum de folijs arborum & oleorum dilectorum spiritibus animalibus sicut folia malorum, menta, ruta. Et miscantur cum eis medicę expurgantes sicut semē armel. & semen rutę montanę, & emplastrum cum eis pecten, & si sequitur debilitatem expulsiuę remoue discrasiam frigida & causa eius, & est secundum plurimum frigida & curatur cū calidis moderate stupicis. Si uero difficultas urinę sequatur nocumenta renum intendatur curę diuresis apstematis & oppilationis renum, & cū hoc est necessarium administrare mollificatiā exterius & reliquis applicatis necessaria est administratio prouocantium urinam, nisi timeatur quod faciant deficere remateriam plurimam. Si uero difficultas sequatur nocumenta membrorum nobilium, sicut epatis & ceterorum quod dictū fuit in suis capitulis. Et cum hoc tenetur urinę prouocatio omnibus ingenijs. Cura uero difficultatis sequentis percussione aut casum paratū in expositione textus. Et ex his patet prima incisiō habenda in cura difficultatis urinę quę est remotio causę. Secunda uero scilicet educitio urinę per citur modis infrascriptis. Primus, comprimendo uirtutis sensitiuę, & hoc maxime ualeat ubi est debilitas oppilatiuę, motiuę aut naturalis, & non est fortis oppilatio, sed fiat æqualiter aut cum gradatione incipiendo ex leui & procedendo ad fortem compressionem. Secundus modus, est cum immisione pediculi aut cistice in foramine uirgę. Et hoc maxime ualeat ubi est sopita uirtus sensitiua. Tertius modus, imponendo in ano aliquod suppositorium, sicut apud Auic. suppositorium de sali taberzet, & ut credo est saccharum candi, prouocabit enim urinam, & soluet uentrem, hoc enim stimulo excitat uirtutem expulsiuam, sed non uideo cur etiā ex melle supposito aut aliquo proportionali non debeat sequi idem effectus. Colligantiam namque habent magnam nerui, uenientes ad constituendum musculos ani cum neruo uenientes ad constitutionem musculi coli uescicę, quare excitatio unius est causa excitationis alterius. Quartus autē modus, est cum syringis, quarum quidam sunt ad incidendum aliquid in uescicam, quidam ad utrumque simul qui in uescicę continentur, quidam ad longitudinem deferuiunt. Syringa autem debet esse ad rotunditatem palmi subtilis concava in eius extremitate rotunditate, & similiter in lateribus sint plura foramina ut si unum oppiletur alterum suppleat ad incidendum & attrahendum secundum necessitatem. Extremitas autem remanens exterius debet esse latior & amplior cum rotunditate, ut per illam facile possint iniici quę iniicienda sunt. Cum ergo uolumus mittere aliquam extremitati exteriori, appendimus aliquem liquorem ipsam aut uaginam quam implemur clystere iniiciendo, sicut cum comprimimus uescicę. Et hoc est ad incidendum, licet per foramen eius possit aggretrahendum, & est ut in concavitate eius sit aliquis globus rotundus ex spōgia, filtro uel aliquo his proportionali perfectę obturans meatum in ea parte in qua continetur

continetur, & sic suspensus cum filo ferreo uel aeneo, ut ad libitum possit per foramen intus pelli & extrahi, hoc ergo si trahitur uersus partem exteriorem, ne detur uacuum, educit quæ in uesica continentur, licet ea quæ in uesica continentur, possint suggendo extrahi.

Aliqua uero simul est ad injiciendum & ad impellendum. Et est ut habeatur catheter cuius extremitas acuta & concaua adequatur extremitati syringæ remanenti extra, & prius impleatur catheter liquore injiciendo in uesica. Et extremitate sua acuta ponatur in concauum syringæ, iam existentis in uesica & impellatur liquor ad uesicam ne detur penetratio corpori & contra cum eodem potest extrahi, quod in uesica continetur ne detur uacuum, syringæ autem possunt ex multis fieri, scilicet ex ære, argento, stanno, ligno, corio debite præparato sicut charta, super qua scribitur. Et quæto ex materia magis leui aut flexibili cum debita firmitudine sunt præstantiores. Est ergo bonum ut diuersæ sint apud te quibus possis uti secundum exigentiam, & similiter diuersa catheter. Modus autem imponendi syringam sine dolore aut cum mino dolore quantum est possibile, est ut æger sedeatur super extremitate caudæ suæ retro sustentatus, & eleuetur genua aliquantulum super inguina, quæ genua sint satis distantia inter se, deinde operator, uel æger ipse imponat syringam prius mollificata uirga & uesica in tina uel cum fomentis, unctionibus aut emplastris. Et imponat extremitatem syringæ iam inunctam cum oleo aut unguento leni quod fortasse est melius paulatim quousque peruenierit ad obstaculum, & tunc eleuet aut deprimat syringam, donec pertranseat illud cum omni facilitate ne exorietur quousque perueniat ad concauum, & tunc potest aliqui liquorem injicere in uesicam aut extrahere contenta in ea secundum exigentiam modis iam dictis aut utrunque facere. His autem non sufficientibus ad prouocandum urinam, opus est deuenire ad sectionem in collo uesicæ, sicut fit in extrahenda lapidis, sed foramen sufficit paruum pro extrahendo urina. Tertia autem intentio, scilicet correctio accidentium perficitur secundum ipsorum exigentiam. Quarto uero scilicet regimen sex rerum perficitur secundum exigentiam causæ difficultatis urinae & accidentium, sit tamen dieta tenuis ita ut abstineat quæcumque est possibile à cibo & potu, & maxime à potu, & omnino caueat à stipticis & uiscosis, sed potius cibis suis subtiliantes, incidentes, abstergentes. Et caueat à potu aquæ, imò sufficiat ipsi collutio oris cum ea.

DE LAPIDE.

Cap. CIII.

Cum æger urinam sæpe fricat. Quamuis lapidis in multis partibus corporis humani possit generari scilicet, in intestinis crassis, infra contentis. maxime in colo, ut uidi Ferrariæ anno 1457. & erant quantitates auellanae magnæ & multis uicibus numero circa 50. cuius rei testis est exemplum medicus Bartholomeus Falconerus, & in pulmonem ut dicit Galenus, & ut uidi Verone, & sub lingua uel habeo à Zoar, & in poro fellis à Gentili, & in paucibus iuncturis & stomacho ut dicit Gilbertus. Et in uicibus ut uidi Verone una cum eximio medico magistro Benedicto de Leonibus. Vt plurimum

tamen generantur in renibus & uesica. Et nominatur hæc passio ab Hipp. lithiasis. 4. Aphorif. ab Hali abbate, calculus à quibusdam petra. Ab Auic. & Rasi lapidis. Qui lapis in renibus uel uesica, de quo est hic sermo est ægritudo in numero, si in quantum quid additum ultra partes membri, in quo continetur immediate & sensibilibiter ledat operationes eius, & est mortalis causa oppilationis quæ est morbus in uia impediendo transitum urinæ & aliorum quæ per meatus urinales transire consueuerunt.

Species lapidis sumuntur hoc modo. Quidam enim sunt renales. Quidam uesicales. Et distinguuntur inter se magnitudine duritiæ, asperitate, colore. Nati in uesica sunt maiores, duriore, asperiores, tendentes in colorem album, uel fuscum. Sed renales tendunt in colorem rubeum. Horum autem diuersitates sumuntur ex materia agente & loco & tempore sicut dicitur quamuis in uesica reperitur aliquando lapis facile comminibilis.

Causæ de consideratione medicorum sunt duplices, materialis, & efficiens. Formalem & finalem physicas relinquo, quæ tamen sunt satis notæ. Formalis enim est forma lapidis. Finalis uero ut habeant esse, licet in quantum morbus finis sit nocere operationibus. Materia uero lapidis quæ est eius causa coniuncta, est humiditas crassa & uiscosa de genere phlegmatis, sanguinis, aut saniei in hoc differens à materia arenularum quæ licet sit crassa, non tamen est uiscosa, ideo facile comminuitur. Materia autem remotior est cibi & potus huius materiæ generationi proportionales sicut lac, caseus & proprie humidus. Item carnes crassæ, sicut auium, palustrium & magni corporis. Et caro camelina, hircina & caro uaccina, & quæ de siluestribus incassant, & pisces crassi, & cibi fixi, panis uiscosus, crudus & azimus, similiter uinum crassum, & aquæ crassæ & quæcunque merito sui, aut malitia artificij, aut ordinis, aut multitudinis, & similia sunt apta generationi chymorum crassorum & uiscosorum.

Causa autem retentionis huiusmodi materiæ lapidis in renibus uel uesica, est debilitas expulsiuæ ipsorum, sequens malam complexionem aut apostema, aut ulcus, aut oppilatio prohibens exitum materiæ ab huiusmodi membris, & retinentur superfluitates crassæ residentes ex omni aquositate perueniente ad hæc membra. Et hæc causæ retentionis materiæ tenent se ex parte causæ materialis. Et fortasse fortitudo attractionis renum, sequens caliditatem superfluam facit ut cum aquositate aligatrahantur materiæ crassæ, quæ postea non expellæ densantur in lapidem, antequam expellantur, & hæc caliditas respectu lapidis si mul se tenet ex parte agentis & materiæ. Oppilatio autem de qua supra aliquando est coarctatoria superfluitate crassa retenta, aliquando attenuatoria à superflua frigiditate aut à compressione membri uicini sicut intestini, aut carnosæ ab apostemate. Caliditas autem actiuæ concurrens ad generationem lapidis, quandoque est inseparabilis, quia forte naturalis. Aliquando separabilis, quia forte accidit propter dolorem, aut propter aceptionem rei calefacientis. Sed quomodocunque sit, uidetur Auicennæ, quod caliditas factiua lapidis sit egressa ab æqualitate per intensionem. Quod apud Serap. non est uerum uniuersaliter, imò quandoque est caliditas illa temperata, aliquando

modus compositionis
syringæ.

causæ lapidis

et

causæ materialis

causæ agentis

quando remissior temperata ut manifestat generatio lapidis in phlegmaticis, melancholicis & senioribus. Quapropter in generatio lapidis plus operatur crassities & viscositas materiae quam caliditatis intensio. Et hoc affirmat Rasis in continente dicens, quod ille in quo generatur lapis non potest esse frigidorum renum nisi raro, praeterea lapis uesciae in qua est pauca caliditas est crassior, & durior quam lapis renum, quamvis materia sit similis. Ex quibus inferitur quod caliditas ualde superflua est causa, cur aliquando lapis sit minor & facilius comminuibilis superflue exiccato humidum continuatum partium, & forte causa magnitudinis lapidis in uescia est loci amplitudo. Et eodem angustia loci est causa paruitatis eius in renibus.

Et similiter causa duritiei in uescia potest esse longa mora cum calore moderato, sicut e contra paucitas more lapidis in renibus cum calore superfluo, potest esse causa cur lapis renum sit mollior, & facilius comminuibilis. Et omnes istae causae lapidis reperiuntur in uescia, licet tamen ut dictum est sint ualde differentes in magnitudine, duritie, asperitate, propter causas dictas.

Causa autem cur lapis renum sit rubeus est rubedo renum, & forte decoctio uiolenta & festina, & ille cui plurimum accidit lapis reni est pinguis, & ille cui plurimum accidit lapis uesciae est extenuatus. Primi forte causa est oppilatio attenuatoria sequens pinguedinem. Secundi uero causa est debilitas expulsiue in extenuato sequens paucitatem caloris innati, & senibus frequentius accidit lapis renum quam uesciae, sed in infantibus aut sibi proximis est e contra. Et plurimum huiusmodi est inter infantiam & pubertatis initium, & illud ideo quoniam uirtus expulsiua in infantibus & adolescentibus est fortis, quare expellit a superioribus membris ad inferiora. In senibus uero uirtus renum ipsorum sunt debiles. Et iterum quoniam infantum & adolescentum humores sunt subtiliores, propterea penetrant in renibus ipsorum. Et senum humores sunt crassiores, quare non penetrant in renibus ipsorum. Et quod plurimum generatur lapis in infantibus est propter appetitum eorum & motum ipsorum super repletionem, & quia potant lac, & propter constrictionem meatus uesciae ipsorum. Et in senibus propter debilitatem digestionis eorum. Et propter hoc iudicauit Hippocrates, quod lapis in senibus non sanatur. Et omnis urina, in qua est humor plurimus, est dignior ut ex ea generetur lapis, & est illa in qua cum descendit ad fundum generatur sal, & est eius sal plurimus. Sal namque generatur ab aqua sita te, in qua est terreatas plurima, quam adussit caliditas. Et urina quidem infantum plus habet salis quam senum, non quoniam eius terreatas est plurima, imò quoniam caliditas in eis est plus, & terreatas eius est profundius adusta. Et propter hoc urinae eorum sunt turbidae propter multitudinem permixtionis ipsorum, & propter raritatem corporum eorum, quare resoluitur ab eis plurimum aquositatis cum resolutione occulta. Et dignior puerorum ut in eo generetur lapis est ille qui est siccae naturae secundum plurimum & calidi stomachi, & non siccat naturae secundum plurimum, nisi propter attractionem humiditatum ad epar eius, deinde ad membra urinae ipsius, & quando est illi caliditas, est causa efficiens praesens. Et ad summum siccitas uentris facit urinam crassiorem & plurimam.

Et in illo, in quod est sedimen arenosum non aggregatur lapis in uescia, quoniam materia non est coarctata. Et puellis & mulieribus raro accidit lapis in uescia, quoniam meatus uesciae earum est breuior & latior, quam meatus uirorum & paucorum anfractuorum, & in breui facilius est expulsiua quam in longo. In ipsis etiam raro accidit lapis renum, uel quia meatus reni sunt latiores, uel quia non habent caliditatem satis potentem ad condensandum humiditatem in lapidem, uel quia plurimum suarum superfluitatum per matricem purgant.

Primo ponitur signa generationis lapidis reni, secundo signa lapidis geniti, tertio signa eius cum mouetur. Primum signum generationis lapidis renum est quod urina post crassitiam conuertitur ad tenuitatem propter retentionem turbidi. Et quanto urina post crassitiam, & cum multo sedimine sit uehementius clara & paucioris sediminis significat quod lapis est durior. Similiter retentio barenae conuertitur egressi cum urina significat lapidis generationem. Signum autem ipsius a geniti est dolor & grauitas in alcham, & forte difficultas urinae, & proprie si lapis sit in amebobus renibus. Signa uero motus eius est alcham usque ad inguina, & ad emunctoria cum iam peruenit lapis ad uesciam, & quandoque communicatur dolor uel dimis & testiculis, oportet enim quod dolor sit uehementis propter transitum eius per loca angusta sensibilia. Cum autem cecidit in uesciam sedatur dolor, & tandem postea mingitur & forte sanguis cum eo.

Signa autem distinguenda inter dolorem colicum & renalem posita sunt superius in colica. Et inter ea tera colicus crescit immediate post sumptum cibum, quia colon comprimitur, sed renalis forte alleuiatur propter humectationem renum a uaporibus cibi, aut si forte ambo immediate post sumptum cibum crescant magis ex crescit colicus quam renalis, licet in processu chilo cum fecibus descendente magis ex crescat renalis. Et ex his patet concordia inter dicta auctoritatis. Et tu attende reliqua signa distinctiua superius posita in colica cum in multis acciditibus haec duae aegritudines conueniant, scilicet in uomitu, uentris constrictione & reliquis & plerumque faciunt medicum dubium.

Signa uero lapidis in uescia sunt haec. Primum, quod laborans ex lapide in uescia frequenter fricat uel scalpit uirgam suam & eam manu perfricat propter pruritum & dolorem existentem in ea ex communitate uirgae ad uesciam. Et non solum in uirga, sed in radice eius & pedine sit pruritus, & dolor aliquis alibi ex communitate uirgae ad illas partes. Et quandoque propter dictam frictionem & manus perfricationem erigitur uirga. Deinde arefcit, id est, deficit ab erectione, & sit eius mollificatio proprie. Hic uero rificatur in puero, non sic in iuvene, & minus in senesc. Secundum, egressio urinae cum difficultate & conamine, & hoc quia lapis oppilat foramen non complete, nam si oppilaret coplere, tunc esset retentio urinae, & est talis egressio urinae cum dolore, cum uescia sit membrum sensibile facile patiens ex lapide. Tertium signum est exitus longonis siue ani quandoque. Cuius causa est duplex. Una est uehementis conatus ad mingendum & fortis expressio facta per lacertos uentris

ma proima

uiscum signum lapidis renum

infantibus apponitur in rubulo

senes pueris rubulis much debilitas

uentris ad quā sequitur exitus ani. Secunda causa pōt esse, quia lapis existens in uesica cū magnus ē propter propinquitatē colli uesicę ad anum cōprimit anū unde anus egreditur. Non tamen hæc uniuersaliter uera sunt, ideo dicitur fortasse, id est, aliquando. Qui autē uolunt certificari an lapis sit in uesica ponāt digitum uel duos digitos longiores in anum prius uentre à fe-
cibus mundato & coxis sursum eleuatis. Et si aderit lapis ipsum manifeste sentient & quantitatem eius discernent. Signa uerò futuri lapidis in renibus uel uesica sunt, quia si arenulę quę præcesserunt postea re-
tente fuerunt rubę uel citrinę, significant lapidem futurum in renibus. Si autem fuerint albę significant ipsam futurum in uesica. Licet quandoque urina are-
nula rubę uel citrinę significant ipsum ex renibus descendisse. Si uerò albę uel cineritę significāt ipsum in uesica congestum cum alijs signis, de quibus supra, unde Hip. quibus arena & alba sedimina substant his uesica lithiasim habet.

Prognostica. Primum de habentibus lapidē sunt quidam qui sunt paratissimi generandi lapidem & mingendi eum, & quando aggregatur & mingitur cum urina aduenit sicut colica. Et spatium, hoc est in-
ter mensem, usque ad annum, & hoc maxime uerifi-
catur de lapide renum. Secundum. Lapis renum & de difficilius ad curandum est secundum plurimum
lapis uesicę quam renum, licet lapis renum quādoq; ducat ad mortem, tum prohibendo urinā, tum apo-
stemando. Quartum. Nephretici & circa uesicā do-
lores laboriose sanantur in senibus, sexta aphorismo
rum. Quintum. Lapis uesicę cum perficitur secun-
dum plurimum nō sanatur, nisi cum sectione in qua
tamen est timor.

Cum aeger uirgam saepe fricat, & manu tractat, ipsa quoque frequen-
ter erigitur & subleuiatur, & urina diffi-
culter & cum dolore egreditur, in qua ægri-
tudine fortasse, & longaon exit, lapis in
uesica esse significatur.

Si autem aeger cum difficultate mingen-
do sentit uehementem dolorem in renibus,
emunctorijs & nauſeam, & uentris con-
strictionē in renibus lapis esse monstratur.

Hoc capitulum duas habet partes principales. In
prima docet cognoscere an lapis sit in renibus uel ue-
sica. In secunda ponit curam. In secundo ibi. Lapidē
uero qui. Prima iterum in duas. In prima ponit si-
gna lapidis in uesica. In secunda lapidis renum, secun-
da ibi. Si autem aeger. In prima ponit tria signa lapi-
dis in uesica superius posita & declarata. Si autem in
hac parte. Ponit signa lapidis renum. Primum, quod
si aeger cum difficultate mingendi, id est, aliquali im-
pedimento, imò aliquando tanto, ut nullo pacto pos-
sit mingere habuerit uehementem dolorem in reni-

bus & in emunctorijs, id est, ubi pori uritides termi-
nantur ad uesicam, & habuerit nauſeā & uentris con-
strictionem in renibus lapis esse monstratur, hæc au-
tem signa & alia superius sufficiēter fuerūt declarata.

*Lapidi uero qui est in uesica confectio
hæc utilis existit, & est optima ad frangen-
dum lapidem, etiam cum fuerit uetustus.*

*Ego quoque iam fregi cum eo magnum la-
pidem in minori spatio quam. 40. dierum.*

*Recipe, carpobalsami, sem. raphani, dau-
ci, olusatris, sem. corticum radicis, oppo-
panaci, corticum radicis capparis, amyg-
dalarum amararum, dannocochiæ, schi-
nanthi, ciperi, spicæ indæ, cassiæ lignę, sac-
colocondrion, harmel, gentiane, aristo-
lochiæ rotundæ, asari, cordumeni, ammo-
niaci, sagapeni, bdellij, piperis, acori, o-
mnium ana. partes æquales, gumme disso-
lute, sufficienti balsamo malaxentur, & ex
eis alię species conspergantur ex quibus
informetur pilulę & sumatur ex eis in die
drach. 1. cum apozemate de seminibus.*

*Quandoque septima pars. 1. drach. de
cinere scorpionum cum eis datur.*

Cinis uero de scorpionibus hoc modo
fit. Scorpiones sumantur & in ollam no-
uam positi os habentem oppilatum super
laterculum in furno mittantur in quo non
sit nimius calor, neque uehemens, & sint
in eo. 6. horarum spacio, deinde extracti
puluerizentur & reponantur.

In parte præſenti curat lapidē. Et primo qui est in
uesica, secundo qui est in renibus, tertio qui est in uir-
ga, secunda ibi. Cum autē in renibus lapis fuerit, ter-
tia ibi. Si autem lapis ceciderit. In prima parte dicit,
quod lapidi existenti in uesica, curatio ista utilis &
optima existit, frangit enim lapidem in spatio mino-
ri. 40. dierum. Cuius confectio est ista. 12. carpo-
balsami, id est, fructus balsami, sem. raphani, dauci,
olusatris, id est, seminis macedonici, corticum radicū,
oppanacis, corticum radicū capparis, amygda-
larum amararū, dannocochiæ, id est, saxifragię, schi-
nanthi, ciperi, spicæ indæ, cassiæ lignę, saccolocon-
drion, id est, scolopendrię, gentianę, aristoloch. rot.
asari, cordumeni, id est, charui agrestis, ammoniaci,
sagapeni, bdellij, piperis, acori, omnium partes æqua-
les, gumme, in sufficienti balsamo, id est, oleo balsami
dissolutes malaxentur, & ex eis alię species conficiantur, ex

tur, ex quibus informantur pilulæ, & sumatur ex eis in die 3. i. cum apozemate de seminibus, de quo supra. Et quandoq; sexta pars. 3. i. de cinere scorpionum cum his addatur. Cinis uero de scorpionibus fit hoc modo, scorpiones mittantur in ollam nouam quæ bene oppilata ponatur in furno super latere, in quo non sit uehemens calor per spacium sex horarū, deinde extracti puluerizentur & reponantur, scilicet in uase uitreo, in quo bene referentur, hæ enim medicinæ omnes sunt calidæ & siccæ præter scorpiones qui sunt frigidi secundum plurimū, & habent omnes singularem proprietatem in cōtinuendo lapidem.

Ager uero nutriatur ex aqua ciceris & calagiæ & mutagenat, & abstineat à lacte & caseo & ab alijs nutrientibus crassis & ingrediatur tinam, ubi sit aqua, in qua cocta sint folia caulium & sulla & berengessiph, & mentastrum, & finus columbinus, & medulla croci hortulani.

2. alio modo est in galieno 2. uel in galieno

Hic ponit dietam conuenientem contra lapidem, est enim subtiliatiua & absterfua, & incisiua, & prouocatiua sicut aqua decoct. ciceris, calagiæ, & mutagenat de quibus supra, abstineat à lacte & caseo, & ab alijs cibis crassis.

Ingrediatur tinam. Hic ponit tertium remedium dicens, quod æger ingrediatur tinam, id est semicupium, in qua sit aqua decoct. foliorum caulium, sulla id est, iuxæ siue artericæ. Berengessiph, id est, abrotani, sed pro eo potest accipi serapinum, mentastrum & finus columbinus, medulla, sem. croci hortulani, id est, carthami, hoc semicupium est ad comminuendū lapidem.

Femur etiam sæpe inungatur ex oleo scorpionis, & immittatur uirgæ, quod, Rec. aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi, cortic. radic. capparis ana. unc. 1. hæc omnia in lib. 1. olei de amygdalis amaræ posita ad solem per hebdomadam unam dimittantur & colentur. Et pro unaquaque lib. de eo adiungantur ei scorpiones. 10 & totum in uas, cuius os oppilatum fuerit, missum ad solem per duas septimanas moretur, deinde colatum reponatur, est enim optimum & mirabile, de quo guttatim quotidie in uirga mittendum est, postquam æger egreditur de tina. Quod si lapis magnus fuerit, non inuenitur aliud remedium, nisi ut cum incisione extrahatur. De hoc tamē loqui, huius nostri libri modum excedit.

Hoc est quartum remedium, & est quod post exitum à balneo ungatur femur cum oleo de scorpionibus, & ex eo etiam in uirga distilletur. Cuius olei est hæc descriptio. R. aristol. rosarum, gentianæ, cyperi, corticum radicum capparis, ana. 3. i. hæc omnia in lib. 1. olei de amig. amar. posita ad solem per hebdomadam unam dimittantur & colentur & exprimantur. Et pro unaquaque lib. ex eo adiungantur scorpiones. 10. & totum in uas cuius os sit oppilatum, missum ad solem per duas hebdomadas moretur, deinde colatur & reponatur. Est enim optimum & mirabile de quo quotidie per uirgam guttatim fundendum est, postquam æger de tina egreditur, sic enim præcedente mollificatione per balneum melius comminuetur.

Vltimum remedium si lapis fuerit ingens his remedijs non sufficientibus fiat sectio in collo uelica secundum quod dicitur & extrahatur, loquitur tamen de modo sectionis metas huius libri transcendit.

Cum autem in renibus fuerit lapis æger frequenter ingrediatur balneum. Et renes & ilia ex oleis inungantur. Et ea quæ calefaciunt locum desuper, cum panis no ponantur, ut sunt ea quæ nominauimus. In potu quoque sumantur ea quæ lapidem frangunt.

Hic curat lapidem renum tribus auxilijs. Primum quod frequenter tinam ingrediatur, de qua supra, & si cum ea ponentur aliqua mollificatiua esset præstantior. Secundum quod renes & ilia ex oleis inungantur & desuper ponantur ea quæ locum calefaciunt, ut sunt ea quæ dicta sunt in lapide uelica. Terio luat ea quæ lapidem frangunt, de quibus supra.

Si autem lapis ceciderit & in uirga distillatulum fecerit, aqua calida ab alto distillando ei super fundatur, donec rubere uideatur, deinde oleum tepidum, guttatim super iniiciatur & fricetur. Et si necesse fuerit sugatur, et ex hoc mouebitur lapis et exhibit. Sed si magnus & angulosus fuerit, necesse est ut uirga inferius incidatur & extrahatur.

Hic curat lapidem in uirga retentum duobus auxilijs. Primum est casus aquæ calidæ ex alto, & posita inunctio cum oleo tepido exprimendo lapidem uerus extra. Secundum auxilium est, quod his non sufficiens uirga inferius scindatur & extrahatur lapis.

Cura lapidis renum & uelicæ habet duplex regimen. Primum est præseruatiuum, reliquum curatiuum. Regimen præseruatiuum duas habet intentiones. Prima est prohibitio generationis materiæ naturalium. Secunda est ipsius materiæ iam generatæ eua cuatio. Regimen autem sex rerum non naturalium prohibens generationem materiæ lapidis est, ut panis sit ex optima farina frumenti non omnino a fursure depurata, conuenienter salitus & coctus. Et uinum sit album.

album aut medi coloris, clarum, subtilis substantie, paucifera aut mediocris uinofitatis, limphandum secundum exigentiam complexionis temporis & consuetudinis, & aqua sit subtilis, lenis, clara habens 18. condiciones laudabiles, de quibus secunda primi, & carnes sint generatiue sanguinis subtilis, sicut aues belis agni, crassi, uidentur pisces, nisi quidam sicut temali, iun parui. Item pisces parui, petrosi, & similes ex maritimis aurarum rubi & similes. Vitentur lac & caseus & lacticia omnia, ius cicerum conuenit & ius caulium & rapae debite coctae. Et ex herbis baucae recentes, apium, feniculum, petroselinum, endiuia, cichorea, asparagi, ex leguminibus chist hordei, & ius cicerum. Ex fructibus ficus humidae, & sicce amygdalae uua alba, oua conueniunt modo sint mollia non per decoctionem indurata, & utatur ferulis & brodis, & omnibus hijs quae uentrem leniunt, propterea magis conueniunt elixa quam assa aut frixa. Vitentur tamen in regimine praeseruationis nimius usus diureticorum, praecipitant enim materias ad instrumentum urinae. Vitentur ferula ex pasta & sal imundum, & in summa sit intentio ad generandum sanguinem subtilem non autem humores crassos aut uiscosos, & ad leniendum uentrem, & non multum ad prouocandum, & procuretur ut fiant bonae digestionis, & ut superflua per regiones proprias euacuentur. Propterea sit aliquantulum parcus in cibo & potu, & surgat a mensa cum reliquis famis, & non multiplicet cibaria in mensae una, & non comedat nisi digestionis celebrata, et potus sit cibo proportionatus, nec gerat uestimenta stricta circa dorsum. Et exercetur animo & corpore tempore debito, & non coeat nisi natura exigente.

Sub secunda intentione quae est materij iam genite, euacuatio comprehenditur prohibitio generationis lapidis. Et prohibitio augmenti ipsius iam geniti. Nec non ipsius iam geniti educio antequam magnificetur. Et ad complendum omnia haec sunt duae medicinae laudabiles ab autoribus & mihi expertae.

Prima est. Recipe. florum cassiae 3. 10. cum aqua scolopendriae scilicet distillatio, aut decoctione trahatur cassia, & fiat portio quam accipiat semel in mensa, aut etiam pluries si expedierit. Secunda medici na est aqua mellis secundum descriptionem Mesue, de qua debite calida accipiat quatuor diebus continuis, quatuor uncias pro uice in aurora iam praecedentis coe digestionis celebrata. Ager potest unam istarum medicinarum accipere in principio mensis, reliquam in medio mensis, & si ante potum aquae mellis acciperet decem amygalas amaras, singula die quas bene masticet, & post eas immediae biberet aquam iam dictam res esset efficacior. Et si patiens esset refectione seminum communium frigidorum, liquida & granorum alchichengi, & proprie tempore calido. Item cum aqua mellis, quando decoquitur bulliant grana alchichengi. Et postea cum ipsa coctura trahatur lac unciam semis seminum communium frigidorum, & haec sufficiant pro complenda hac intentione. Si tamen patiens esset siccis uentris potest supraprescriptae cassiae addi, drachmam unam, benedictae simplicis aut tantundem electuarij indi.

Regimen uero curatiuum, tres habet intentiones. Prima, lapidem cominuit & ipsum educit cominutum aut non cominutum. Secunda, corrigit accidentia. Tertia, ordinat debitum regimen sex rerum. Medicinarum autem perficientium primam intentionem, quaedam sunt simplices, quaedam compositae. Et simplices, sunt triplices quaedam cominuunt a complexione, quaedam a proprietate, quaedam utroque modo.

Comminuentium autem a complexione quaedam sunt debiles tantum in lapidem renum imprimentes, quales sunt medicinae amarae absteruiae aut fortis incisionis sicut oxymel, aut acetum, betonica, penthaphylon, capill. ueneris, grana solis, saxiphragia, folia fraxini, radix scolopendriae quarum impressio non est nisi in lapide renum, pertrahentia autem usque ad lapidem uescit, sunt cicer nigrum, aqua eius radix costi, bdellium, radix sicde, allia, tribuli, apium montanum, calamentum, pulgium, cucumer asinum, radix balsami & partes eius, semen raphani, & aqua radicum eius, scordeos, praepurcia uicis albae, ruta agrestis, baurach, piper puluerizatum, ex quo factus est trochiscus, daucus cum aqua fistici, facit descendere lapidem, uirum adustum, & sang. hirci secundum arte collectus & reseruatus in trochiscis, de quibus in hora doloris detur unus cum uini aceto, aut aqua apij montani a proprietate autem comminuentia sunt puluis scorpionum & oleum eius & solatrum hortulanum, & lapis spongiae & iudaicus & cinis leporis decolati, lumbrici terrestres exiccati, cinis epatis asini in lapide renum & gramen, quidam cominuunt utroque modo sicut uirum album & clarum puluerizatum, cinis corticis ouorum scarabei.

Et semen genestae quod frangit & educit & prohibet generari, & auis parua uocata cauda tremula & graece troglodytes in cuius alis sunt pennae aureae, & super cauda sunt puncta alba & francigenae uocantur fafunegi, haec adusta & cinis eius cum aqua mellis extrahit lapidem. Item simus columbinus. Modus autem componendi has medicinas est ut fiat una medicina composita habens condiciones oportunas in hac intentione est ut misceantur adinuicem medicinae habentes uirtutem comminuendi ex dictis. Et quaedam iuuantes ad penetrandum quae etiam comminuunt, sicut piper, cinnamomum, calamentum. Et quaedam prouocantes extrahentes superfluitates crassas, sicut radix, rubrae, foenugrecum, daucus, fumeu, assarum, ameos, cheism, selilis, semen agni casti, schinanthum, & cordumeni, & cantharides, in hoc sunt potissime imprimentes etiam in lapidem, sed administrantur cum cautela, ut non ulcerent uirgam, unde in una portione non sit ad plus, nisi una, cuius caput & alae sint abscissae. Quaedam sunt alteratiuae & frangentes caliditatem aliarum sicut solatrum.

Aliae sunt retardantes & detinentes medicinas in loco donec compleant suas operationes, & hoc faciunt cum uiscositate quadam, sicut species gummi. Aliae sunt confortantes sua aromaticitate, sicut spica, cassia lignea. Aliae confortent stipticitate moderata, ut radix rubi, uirga pastoris, aliae sunt sedantes dolo rem cum proprietate, sicut nucea auellanae quae etiam retardant medicinas in loco, & quadam anodinitate, sicut habentes caliditatem primi gradus, & proprie

feminis sceniculi 3. 3. granorum nere, id est, cereforum syluestrium 3. 4. stercoreis uaccæ pascentis inuoluti cum oleo sambacino. 3. 5. terantur & cribellentur & deur de eo pondus. 3. 3. cum aqua apijet raphani. Ad lapidem uero puerorum sufficit balneum ex rebus mollificantibus & frangentibus lapidem cum sumptione rerum frangentium lapidem magis facilius. Rufus, inquit, plurima balneatio in thermis sulphureis frangit lapidem, similiter si infundatur in eis pannus & calidus applicetur loco lapidis operatur ad exitum eius. Galenus autem testificatur quod pulvis leporis cōbusti exhibitus aliquod diebus quātitate duarum drach. cum aqua calida frangit lapidē renum & uesicæ, & sang. hircinus præparatus secundum artem exhibitus quātitate duorum aureorum est fortis in hoc casu. Et modus præparationis est ut eligatur hircus quatuor annorum, aut circa rubeus, & nutriatur per mensem herbis, & granis proprijs in hoc cap. & iuguletur de mense Augusti, & extrahatur sanguis cuius primus abijciatur, & postremus, medius referuetur, & excicetur ad solē diuisus in frusta, quantitate duorum aureorum, & exhibeantur cum uino potenti aliquantulum acetoso, aut cum aqua ciceris, aut raphani duo aur. pro uice aliquibus diebus, uocatur enim manus Dei ob excellentem eius uirutem, & apud Auicennam nigella aliquod diebus administrata cum aqua mellis frangit utrumque. Sed Gerardus. Recipe cretæ marinæ, milij solis ana 3. unam semis, sang. hircini præparati secundum artem drachmas duas, lapidis spongiæ, lapidis iudaici ana 3. s. sem. melonis. 3. r. aquæ laxiphragiæ. 3. s. panis sacch. lb. i. fiat electuarium.

Aliud eiusdem. Recipe corrigolæ, unciam semis, cicerum rub. quart. semis, feminis melonis, unpiationem tertiæ partis, coletur & cum modico saccharo administratur mirabiliter ualet & expellit arenas. Item ualet succus limonum, & quasdam alias medicinas describit quas lege ab eo, & dicit quod pro frangendo lapidem bonum est præmittere molificationem, sicut semicupia & emplastra mollificantia, mixta tamen cum aliquibus fortibus in hoc capitulo, deinde exhibere fortia ex iam dictis. Et ex fortibus est iustinum lithon thrypton, electuarium dufrangere lapidē uesicæ q̄ renum, q̄ n. frangit lapidē uesicæ, frangit lapidem renum, sed non econtra.

DE APOSTEMATE QVOD FIT IN RENIBUS UEL VESICÆ. Cap. CV.

Quid sit apostema renum et uesicæ, ex sepe dictis potest esse manifestum. Apostema tamen renum & uesicæ diuersificantur. Aut ex parte materiæ apostematis. Et secundum hoc quædam sunt ex materia calida essentialiter sanguinea, uel cholericæ, magis tamen sunt ex sang. grosso, uel subtili cholericæ, quam ex cholera, quædam ex materia frigida phlegmatica, uel melancholica, secundum plurimum tamen ex materia mixta, & quæ sunt melancholica quandoque sunt talia incipiendo, quandoque permutando siue sint melancholica adusta, siue non adusta.

Secundo diuersificantur ex parte locorum in quibus sit apostema. Nam aliquando fit in utroque renum. Quandoque in uno eorū dextro uel sinistro. Et quicquid sunt magna occupata totū corpus renis. Quandoque parua, & tunc uel sunt in latere concauitatis, in qua colatur urina, uel in latere gibbositatis apud pāniculum, uel in pāniculo, uel ante eos, uel sunt in parte terminata ad dorsum, uel sunt in parte terminata ad emunctoriū. i. porum uridē, uel in parte meatus superioris uersus uenas emulgentes.

Similiter apostemata uesicæ diuersificantur ex parte materiæ, aut ex parte locorū. Sed ex parte materiæ est contrarietas inter Auic. & Rasim in libro diuisionum. Vult enim Auic. raro fieri apostema calidum in uesica, quoniam apostema calidum est morbus dissimilis complexioni uesicæ quæ est frigida, unde si fiat in ea apostema calidum non erit nisi a forti causa. Rasis uero in libro diuisionum in hoc capitulo dicit, quod plurimum apostematis quod accidit in uesica est apostema calidum. Et eius ratio est quia uesica est membrum densum, in cuius substantiam difficulter penetrat humor frigidus, dicendum ut tollatur contrarietas quod apostema in uesica quandoque generatur per uiam paulatim factæ cōgestionis, quodque per uiam defluxus. Si primo modo tunc apostema uesicæ semper est frigidum, quia nutrimentum eius & etiam superfluitas nutrimenti, ex quibus apostema paulatim congeritur sunt frigide. Si uero apostema fiat per uiam defluxus, aut causa defluxus est intrinseca corporea, & tunc apostema secundum plurimum est frigidum, licet aliquando sit calidum quia in causa est dominium humorum calidorum, aut forte lapis nocens uesicæ. Si uero causa defluxus fuerit primitiua, sicut percussio, casus, aut offensio uesicæ, tunc apostema secundum plurimum est calidum, cum causa attractionis materiæ ad uesicā sit dolor sequens causam primitiuam, qui secundum plurimum est causa attractionis humorum calid. & proprio sang. Et hoc est quod uoluit dicere Auicenna, cum dixit in uesica nō fieri apostema calidum ut plurimum, non enim fit nisi a forti causa. Rasis uero uoluit apostema ex causis fortibus iam dictis esse secundum plurimum calidum. Quapropter sunt concordantes. Aliquando apostema diuersificatur secundum locum. Nam quandoque apostema est in parte uesicæ terminata ad collum, uel in collo ipso, quandoque est in parte uesicæ terminata ad poros uritides. Quandoque est in parte superiori uersus uentrem. Quandoque in parte inferiori uersus dorsum, quandoque in tota uesica uel plurimo eius.

Causæ apostematum renum & uesicæ sunt humores, de quibus supra, actu ingressi horum membrorum substantiam. Licet non sit longinquum a uero quod aqua, aut uetustitas, aut alius humor existit in cōcauitate renis, aut uesicæ extendens latera faciet apostema absque quod ingrediatur membri substantiam, ut bene sensit Auicenna tertia quarti cap. de apostematibus uentosis, & humiditates secundæ & superflua refecata in tertia aut quarta digestionē sunt aliquando causa coniuncta apostematis paulatim congesti, causæ antecedentes sunt humores superflui in quanto aut in quali existentes in uenis. Item mala complexio totius aut partis his mēbris communicantis.

tertio debilitas renum & uescicæ, & eorum dolor, causa & oppilatio, quarto, latitudo uiarum per quas de fluit materia ad hæc membra apostemanda. Item retentio urinæ extendens renes aut uescicam, causæ primitiue sunt indebitum regimen sex rerum. Item causæ extraneæ, sicut casus, percussio offensio, balneum, strictura lumbaris & similia. Apostemata renum & uescicæ terminantur tribus modis. Quandoque enim resoluntur et est optima terminatio, quandoque inurantur resolutis partibus subtilibus, quandoque suppurantur, & post suppurationem rumpuntur & sanies expellitur per uescicam & uirgam, quandoque expellitur ad intestina per uias occultas, aut per uenas emulgentes ad chylum, et ex chylo ad epar, et tandem ad intestina per uenas meseraicas. Et hæc est deterior terminatio quam per uias urinæ. Tercio aliquando fit ruptio ad uentrem. Et materia colligitur in concauitate uentris inferioris, & indiget perforatione. Et hæc est pessima omnium nisi forte illa cum qua fieret horum membrorum putrefactio. Aliquando non erunt puncturae imò remanent in eis, & hæc etiam curantur cum apertione.

Signa. Primo, ponentur signa apostematis renum. Secundo, uescicæ. Signa apostematis renum sunt dolor, & grauitas in alchim, & maxime cum iacet æger cum uentre deorsum, & fit frequens mictus propter debilitatem renis & stimulationem a materia apostemante sed hoc accidens magis est in apostemate uescicæ nisi propter apostema urina retineatur. Et si est in rene dextro maxime sentitur dolor & grauitas, quando iacet super latere sinistro. Et contra si est in sinistro quando iacet super latere dextro. Et si est in utroque secundum utrumque situm magnificatur dolor & grauitas renis oppositi. Item si apostema est in rene dextro, dolor ascendit maxime quando est in parte superiori usque ad epar. Et si in sinistro dolor descendit usque ad uescicam & uirgam, imò etiam in utroque quando est in parte inferiori renis. Et cum dolor est apud panniculum & suspensorium magnificatur dolor & fit fortis, & prohibet erectionem tussim, & sternutationem, & difficile est sibi inuenire situm in quo quiescat nisi forte quod apostema esset confirmatum priuans membrum sensu. Et quando resupinatur dolor est leuior quam in alio situ. Quando autem apostema est in carnositate dolor est leuius ut uix sentiat & secundum omnem situm. Cognoscitur autem quod sit calidum ex febre continua quæ habet remissiones & excrecentias inordinatas, quasi sint principia quartanæ, id est, sicut accidit febribus commixtis inordinatæ uagantibus quæ in quartanam perficiuntur, & hoc est propter diuersas materias & diffuses adustiones quæ sunt in materia apostemante renes, & apparet in principiis suarum exacerbationum coarctatio pulsus, sicut in reliquis febribus & incipiunt cum frigore extremitatum. Et fit horripilatio commiscens inflammationem, id est, postquam incipit horripilatio sequitur inflammatio, & iterum post inflammationem sequitur horripilatio, alia litera habet propter materiarum diuersitatem. Et hic uerificatur siue febris sit inseparabilis siue non, non enim est impossibile quod in continua sint huiusmodi horripilationes & typi, febris autem sequens apostema frigidum est remissior, & forte in continua, sed etiam febris se-

quæ apostema calidum non fit multum intensa propter distantiam a corde. Et aliqui istæ febres sunt putridæ, aliqui ephimeræ. Item nocet ab omni diuretico, acuto, falso & ualde aceroso, sed magis & minus secundum diuersitatem materiæ. Nam in apostemate calido magis dicitur quod in fridido & proprie ab acuto & falso. Et quod apostema est calidum & magnum perducit ad comixtionem sensus propter communiatem diaphragmatis cum renibus & cum cerebro. Et ad uomitum cholerae propter communiatem stomachi ad epar & epatis ad renem. Et quod coarctatur dolor faciei & oculorum, retinetur uenter, quia apostema coarctat intestina, uenter uero est alba in principio materia ad renem permixta, deinde fit citrina, ignea, non permixta quod apostema calidum est in statu & cholera quæ coarctat intestina uari ad renem, iam expellitur cum urina. Deinde si urina circa declinationem, quod aliquid de materia apostemante expellitur cum urina. Et quod urina perleuat rat alba indicat duritiem futuram aut coarctationem ad dubelati, id est, marurationem, nihil enim de materia apostemante expellitur. Et ad ultimum urina perleuat alba est significatio mala, & aliqui rubet aqua & perleuat in ea sedime laudabile, tunc obedit apostema digestionis absque coarctatione ad duritiem aut ad suppuracionem. Et quod in primis diebus remanet urina clara & tenuis tunc apostema est in uia maturationis aut indurationis, & quod apostema maturatur magnificatur grauitas ualde, et sentitur grauitas quasi sphaera, grauiatua in uentre, et accidit inflatio in locis trauis, quia partes circumstantes tumescunt extrahit materiam ad illas & accensitas sunt fortia, et sentitur punctura alleuians in uirga. Et quod apostema est maturum accenditur febris, et augmentatur horripilatio uaporibus urinis coarctatis membrum sensibilibus, & in crassitate materiam cum ipsa expulsa, et multiplicatur in ea sedime le bonum, et quando ruptum est apostema remouetur febris & rigor, & si sanies alba, lenis, non foetida egreditur cum urina tunc adeo est bonum ut nihil melius, & similiter si est sanguis & pus album, & quod diuersum ab hoc est deterius secundum quod magis eligatur a conditionibus bonæ saniei. Signa autem diuturnitatis inter species apostematum penes materiam maxime sumuntur a febribus & reliquis accidentibus homogeneis materiæ apostemanti, & item a conueniente ætate, tempore anni, regimine præcedente et similibus. Signa quod apostema maturetur postea sunt superius. Sed signa eruptionis est egressio saniei cum urina aut cum egestionem. Si autem ruptum est ad concauitatem uentris inferioris sequitur subleuiatio doloris & grauitatis, post præcessionem signorum maturationis non apparet exitus saniei per aliquam regionem. Signa resolutionis sunt quod omnia accidentia remittuntur cum bona accidentia ualescentia. Signa duritiæ sunt quod omnia accidentia remittuntur præter grauitatem. Signa putrefactionis renis sunt continuatio sequorum accidentium usque ad mortem, & quod aliquando egreditur sanies mala foetentissima cum urina aut fecibus. Signa apostematis uescicæ sunt dolor continuus, in more & illis cum duritie & tensione febre continua, licet retentio urinæ, difficultas aut distillatio, & frequenter non possunt mingere nisi stantes, nam si apostema est in parte uentris uentrem facile subiacet tactui.

Si uero

Si uero in parte uersus dorsum, non occurrit tactui nisi cum forti compressione. Si uero sit in parte terminata ad poros uritides sit retentio urinæ, & cum hoc uesica sentitur uacua ab urina. Si uero sit in parte terminata ad collum, & collo ipso adest similiter retentio aut magna difficultas, et cum hoc uesica est plena urina quod ex magno tumore in semore comprehenditur, si uero sit in alijs partibus est frequens mictus & distillatio, & quandoque retentio stercoreis propter compressionem intestini recti a uesica apostemata. Quod autem apostema sit calidum, cognoscitur ex febre forti & caliditate in loco sensata. Item ex dolore pun- gitiuo si sit cholicum, aut extensiuo, grauius & pullatiuo si sit sanguineum, & quandoque apparet rubedo exterius. Item cognoscitur ex siti uehementi uomitui cholerae puræ & almate frigore extremi- tum quæ fortasse non calefiunt. Item, ex alienatio- ne, nigredine linguæ, & quia non nocetur ab omni acuro & diuretico, & significat ipsum complexio, ætas, causæ præcedentes. Et signa maturationis sunt horripilationes diuersæ, & febres permixtæ, sicut di- ctum est in dubelati renum, & significant maturita- tem eius mollities sensata, & urina cum sedimine lau- dabili significat digestionem, eruptionem, aut significat urina habens pus a dimixtum. Si autem signa maturita- tis non apparuerint non rumpitur usque ad hebdoma- dam, & plurimæ uesicæ fiunt uersus collum eius, & quæque in partibus alijs & quæque aperiantur ad inte- riorem partem uesicæ, & tunc sanies mingitur & quæque aperiantur ad partem exteriorē et sanies quæ egre- ditur colligitur in uentre. Signa apostematis frigidi in renibus sunt signa communia apostematum ex duri- tie, tumore & grauitate, retentione urinæ, difficultate & distillatione, sed est pauca febris, paruus dolor, & grauius abluque siti, & alijs quæ attestantur apo- stemati calido, & si est apostema durum sentitur du- rities cum grauitate notabili, & fortasse præcessit apo- stema calidum & proprie sanguineum quod termi- natum est ad duritiem. Sic enim sit apostema du- rum in renibus & uesica secundum plurimum permu- tando ex aposte. sang. quandoque associatur stupor in cruribus & dispositio ad hydropisim, sed aposte- ma phleg. in his omnibus assimilatur apostemati du- ro præterquam in duritie sang. cum mollitie, & se- cundum plur. sit incipiendo, nec sit tanta ad hydropē dispositio, neque tanta sentitur grauitas.

Prognostica. Primum apostema renum secun- dum plur. salubre, & apostema uesicæ secundum pluri- mortale. Secundum. Vtrūque prolongatur & indu- ratur ac disponit ad hydropem. Tertium. Aposte- ma uesicæ cæteris paribus citius interficit quæ aposte- ma renum. Quartum. Auic. omnia renum aposte- mata uelociter sunt ad hoc ut in lapidem. i. duritiē con- uertant, & quomodo non? cum ipsa sint cā lapidis. Quintum. Cum apostema calidum est in rene cum febre notabili, deinde accidit cōmixtio rationis, tunc illud est cā communis uelaminum. i. pāniculorum cerebri magnitudinem apostematis, et est mortale, et proprie qñ est significatio mala, nā illud propter cō- munitatē malam. Quod si accidat cōmunicatio ma- la, tunc expectatur ruptura ad salutē, & fortasse egre- ditur sicut pilus rubens in lōgitudine unius palmi & plus. Sextum. Deterius apostema uesicæ est illud cū

quo cōtinuatur caliditas febris acutæ, & uehementis sit retentio urinæ & stercoreis, & fortis dolor, et in urina non est digest. est. n. mortale, & plus mortale cū ma- turatur. Cum autem apparet in urina hypost. & fex sublidens lenis tunc est maioris spei.

Apostema quod fit in renibus & uesi- ca comitatur febris permixta, quæ non est uehementis caloris, cum qua est hor- ripilatio & rigor, & frequens mictus, & dolores in inferioribus dorfi & grauitas, & cum impellitur uidetur ægro quod ali- quid ibi sit suspensum.

Hoc capitulum habet tres partes principales. In prima ponit signa & curam apostematis renum. In secunda signa & curam apostematis uesicæ. In tertia parte ponit signa & curam apostematis renum cum induratur, secunda ibi. Apostema uero quod fit in uesi- ca, tertia ibi. Est autem quando apostema renum. Pri^o in duas. In prima parte ponit signa apostematis renum quæ et pro parte sunt cōmunia apostemati ue- sicæ. In secunda curam. Secunda ibi. Cum his itaq. In prima parte dicit, quod signa apostematis quod fit in renibus & uesica sunt ista.

Primum febris permixta propter diuersitatem materierum & diuersitas adustiones in eis. Quæ ta- men febris non est uehementis caloris, quia materia putrens notabiliter distat a corde, cum qua febre est horripilatio et rigor frequens siue sit interpolata siue contentiua propter diuersas excrecentias, & diuer- sos paroxysmos, imò inordinatos sequentes diuersi- tates materierum ex duobus superscriptis. Est au- tem horripilatio prima 4. cap. proprio dispositio in qua inuenit corpus diuersitatem in frigore & pun- ctionem in cute & in lacertis. Rigor autem est ut non possit cōtinere membra sua ex commotione a tremo- re eueniente in eis & motibus inuoluntarijs. Secun- dum signum. est frequens mictus, sequens debilitatē, renum & uesicæ necnon ad stimulationem a præsen- tia materię apostematis. Tertium est dolor in infe- rioribus dorfi, scilicet ab alcham usque ad caudam, ibi enim est situs renum & uesicæ. Quartum signum cum impellitur, id est, cum homo se cōmouet aut cō- quassando se aut reuoluendo delatere ad latus, aut uoluendo se cū facie deorsum, uidetur sibi quod aliquid sit suspensum, sentit enim pondus & dolorem mem- bri apostemati ponderantis, minus enim molestus si- tus eius est cum iacet supinus.

Cum itaq. hæc signa uisa fuerint æger ex basilica minuatur eius partis, in qua grauedinem & dolorem sentit.

In hac parte curat apostema renū, & pri^o per eua- cuationem quæ maxime respicit causam antecedentem. Secundo per auxilia applicita, quæ maxime re- spicit cām coniunctam, secunda ibi. Loco quoque em- plastra. In prima parte cum dicit, cum hæc signa uisa fuerint quæ signat apostema renū, æger phlebotomē-

ex basilica eius partis in qua sentit dolor & et grauedinem ad minorandum materiam & diuertendum.

Loco quoque emplastra infrigidantia superponantur & si ægritudo sic dissoluta fuerit bonum erit.

Hic curat per auxilia applicita super loco quæ maxime respiciunt causam cõiunctam, & habet tres partes. In prima parte curat apostema terminandũ per respirationem, aut etiam per resolutionem. In secunda curat ipsum quando terminatur per suppurationem. In tertia parte curat ipsum postquam suppuratum est, & eruptum, id est postquam factum est ulcus. secunda ibi. Si autem febris, tertia ibi. Si autem æger minxerit pus. In prima parte dicit quod super regione renum, scilicet super alchatim ponentur emplastra infrigidantia. Et si cum his ægritudo dissoluta fuerit bonum erit, dissoluitur autẽ apostema cum his quia pars materiæ retrocedit & uenas reingreditur, pars autem aliqua ex calore naturali confortato per applicita resoluitur, quæ autem sint huiusmodi frigida dicitur inferius.

Si autem febris & dolor & grauitas perseverauerint & urina nimium & frequenter ægrediatur, significatur ibi pus colligi. Emplastrum igitur est tunc super dorsum ponendum ex chamemila, sem. lini, oleo sesamino surfure conspersis, & ægro præcipiendum ut in tinea sedeat.

In parte præsentis curat apostema cum suppuratione dicens. Si autem febris, & dolor & grauitas perseverauerint quorum perseverantia & augmentum significat suppurationem iuxta aphorismum. Circa generationem saniei sunt dolores & febres, & tunc crescit grauitas, quia materia in uno loco colligitur. Et urina minutim & frequenter ægreditur sicut in stranguria uirtute debilitata & stimulata significatur pus colligi, est igitur tunc super dorsum ponendũ emplastrum. Rec. chamemila, sem. lini, surfuris ana, m. i. contendantur cõtundenda mediocriter & cum oleo sesamino, quatum sufficit, fiat emplastrum, hoc enim partim resoluit, partem maturat & dolorẽ mitigat. Est enim sem. lini calidum & humidũ, reliqua calida & sicca in primo gradu, secundo sedeant in tinea eiusdem intentiones.

Si autem æger minxerit pus semina quæ nominabimus in capitulo de ardore urinæ sunt danda, donec pus minuatur, deinde trochisci dentur, quos in cap. de mictu sanguinis & puris nominabimus.

In parte præsentis curat ulcus remanens post apostematis rupturam dicens, quod si æger minxerit pus, semina quæ nominabimus in capitulo de ardore urinæ danda sunt ad mundificationem & doloris mitigationem, deinde dentur trochisci qui dicentur in capitulo de mictu sanguinis et saniei ad mundificandũ

& consolidandum, necnon ad dolorem mitigandũ, uide horum descriptionem in duobus cap. sequentibus. Et hi trochisci sunt ultimi qui ponuntur in cap. de mictu saniei & sanguinis.

Apostema uero quod fit in uesica debet comitari febr. conclusa & difficultas mingendi & dysuria & femoris & uirgæ dolor, & tunc æger ex basilica minuetur, & fiat huius ægritudinis cura quæ admodum prædiximus.

In hac parte primo ponit signa apostematis uesicæ. Secundo curam, secundo ibi. Et tunc æger de basilica phlebotomandus. In prima parte ponit tria signa. Primum est febris cõclusio, quod uerũ est si apostema fuerit sanguineum. Si uero doloris cum febris est acuta continua habens proportionem ad tertium diem manifestam uel occultam. Si uero apostema fuerit frigidum, febris non est fortis, nisi forte fieret suppuratio. Secundum signum est difficultas mingendi quæ est uel retentio urinæ uel maxima difficultas emittendi aliquid eius quod maxime ad uerificationem si apostema fuerit in parte terminata collum uel ad poros uiritides. Et dysuria, id est emissio urinæ guttatim uel per interualla cum apostema est in alijs partibus uesicæ. Terium est dolor femoris & uirgæ, nam si apostema est in femore, quia ibi est ad collum dolor notabilis est in femore, & si est in alijs collum uesicæ, cui uirga continuatur, & si est in alijs partibus distantibus a collo uesicæ forte aliquis dolor licet leuis potest femori, & uirgæ communicari.

Tunc æger. Hic pro cura phlebotomatur ex basilica, & dicitur reliquam curam esse obseruandam statim positam in cura apostematis renum, quod si aliqua sit differentia dicitur cū ordinabo curam.

Est autem quando renum apostema non peruenit ad saniem, imo transit in duritiem cuius grauitas in renibus sine febre perseverat. Est ergo clysterizandus ex mucilagine foenugræci, & semin. lini, & apozemate chamemila & caulium & meliloti, & maluaufisci, & surfuris, & nominat frequenter. Renibus quoque superponatur emplastrum ex his quæ nominauimus & si urina minui uidetur, urinam prouocantia dentur.

Hic curat apostema renum quando induratur, dicens quod huiusmodi signum est grauitas notabilis absque febre, resolutis enim humoribus cessat febris, & subtilioribus facietibus apostema cessat clysterizandum. Et pro cura, primo præcipit ægrum esse clysterizandum hoc clysteri. Recipe chamemila, meliloti, caulium, surfuris, ana. m. i. radicem maluaufisci contusam aut incisam, ꝑ. z. bulliant in s. lib. aquæ uel pluribus ad sufficiẽtem coctionẽ, de qua decoctione accipiat

accipiat *lib. i.* mucilaginis, *scen. et sem. lini. ana. ʒ. i.* fiat clystere, quod debite calidū imponatur, hic posset addi olei sesamini, medullę uituli, pinguedinis galinę, *añ. ʒ. i.* Secundo uomatur frequenter, ad diuertendum est enim melior euacuatio quam per resolutionem, quia solutiua precipitant materiā ad locum apostematū nisi sint leuia.

Tertio regiōni renū, scilicet alchathim superponatur emplastrum ex his quę nominauimus, quę scilicet ponuntur in clysteri statim descripto.

Quarto, si urina minuitur dentur cum illo clysteri & emplastro prouocantia urinam, id est, secum mīscantur aliqua cum illa quę prouocent, sicut paritaria, creta marina, & similia, uel aliter dentur cum illo, id est, sunt remedia suprascripta, sumat etiam ea quę prouocant urinā, non tamen feruētia sed leuia, de quibus supra in proprio capitulo.

Hoc quoque pro paruo non est habendum, quia ex eo peruenitur ad hydropisum.

Vltimo, hic admonet medicum, ut sit diligens in cura huius apostematis duri, quoniam perducit ad hydropisum, debilitatur enim uirtus attractiua renū, quapropter aquositate remanente in apostemate & membrīs supra renes sit transitus in hydropem, & cū hęc sit opilatio prohibēs descensum urinę ad uesicā.

Hic etiam canon obseruandus est in apostemate uesicę cum induretur, & remedia eadem uel similia applicentur, clysteria tamen in apostemate uesicę sint minoris quantitatē ut melius retineantur, & cum hoc pauca quantitas sufficit propter propinquitatem, nō sic in apostemate renū, & castia posita in his clysteribus est præstans.

Cura apostematū renū & uesicę exigit triplex regimen. Primum, debetur causę antecedenti complendum euacuatione & diuersione. Secundum, causę coniunctę diuersimode complendum secundum uarios modos terminationis eius. Tertium, est commune utrique curans accidentia, & ordinans debitū regimen sex rerum.

Pro euacuatione secundum plurimum necessaria est phlebotomia in apostematibus renū, aut uesicę quę repletiōe existente multa, & sanguine dominantibus equato, si uero alijs dominantur, phlebotomia sit minus copiosa, & fiat ex basilica eiusdem lateris, et postea apud Auic. phlebotometur uena curuaturę poplitis, & hoc maxime conuenit si retentio mensurę, aut sanguinis hæmorrhoidalis fuerit in caualateris. Prima enim est ad euacuandum & diuertendum. Secunda uero fit ad eradicandum causam conuertendam esse tardandam usque ad diem tertiam. Antequam clysteri facto ex aqua decoctionis hordei, maluarum, & similitum lenientium magis aut minus frigidum secundum exigentiam materię. Sed secunda die facta prima phlebotomia soluatur ueter, aut cum clysteri leniente in quo sint mucilagines, sem. maluarum, malua uisci, sem. lini, scenugrę. & similitum, & ex oleis ponatur uiolacum, amygdalinum, sesamini, & ex medullis, medulla uituli, cerui, & similes,

& ex pinguedinibus, pinguedo gallinę, anatis, anseris, butyrum, & similia, & eligantur magis calida, aut minus secundum diuersitatem materię. Et si opus fuerit medicina solutiua sit lenitiua, non attrahens à longinquis, sicut castia, aut manna, sed præstātor est castia quę miscetur cum sero caprino, sunt enim ambo præstantia in his casibus, & aqua hordei in calido, & aqua mellis in frigido, & aqua sacchari in mixto sunt præstantes, cum quibus etiam potest esse castia distemperari, & omnino caueantur solutiua fortia, & si præmittatur digestio solutioni est præstantius, & omnino caueantur diuretica ante maturationem, sed post maturationem conueniunt, & quamuis aqua iuuēt in eo quod infrigidat & humectat in apostemate calido, tamen nocet in eo quod facit urinare. Caueatur itaque multitudo eius, & proprię cū impedita est urina, & sit aqua dulcis clara sugendo sumpta non multum frigida ne in crudet humores, neque notabiliter calida, imò caueatur omne mulum calidum in actu & potentia in apostemate calido renū, aut uesicę, & similiter caueatur omne ualde frigidum actu & potentia in quocumque apostemate renū & uesicę, sed maxime in frigido. Digestiua autem sicut syrupus uiolę in calido sumptus cum tantumdem aquę hordei, sed in phlegmatico mel rosę cum tantumdem aquę mellis, in melancholico uero syrupus depomis dulcibus cum aqua passularum, solutiuum autem sit castia à ʒ. 8. usque ad. 10. sumpta cum aquis dictis, aut cum aqua calci in adusto & salso. Et si clysteria sufficiunt fortē melius est omittere quodcūque solutiuum bibitum ne precipitet materias ad locum apostematū. In processu uero cum materia amplius non est in fluxu, siue terminetur per maturationem, siue per resolutionem possumus uti diureticis, sicut est lac, sem. communium frigidorum in calido & frigido, decoctione radicum & seminum prouocantium, & aqua cicoris nigri. Et in mixto mixta ex his quę prouocantia etiam possunt exterius applicari. Secunda intentio, scilicet diuersio completur cum clysteribus iam dictis, in quibus ponantur castia. Et si opus est fortioribus in materia frigida addatur benedicta. Itē appositione uentrosarum in spatulis cum scarificatione, & sine in apostemate renū, & cum appositione earum in natibus in apostemate uesicę. Item cum prouocantibus sudorem. Secundum regimen respiciens causam coniunctam si terminetur per uia resolutionis exigit in principio repercussiuā. Vnde in apostemate calido, & olei rosę, aut aquę rosę, succi foliorum salicis, ana. partem unam, aceti partem mediam misce, & cum eis regio membri apostemati epithimetur, & si caliditas fuerit uehemens his adde succum plantaginis, semper uiuę, solatri, & similia, & hoc tēpore administra clysteria ex aqua hordei, oleo uiolato, & similibus, aut ex lacte. Et post administra emplastra ex farina hordei, fabarum cum oleo rosę, & pauco aceti. Postea in statu minora frigida, & adde scenugręcum, chamæmilam, anethum, sem. lini, & oleum sesaminum, & similia. Et clysteria etiam sint eiusdem intentionis facta ex decoctione hordei, & maluarum, & sint in eis mucilago, malua uisci, scenugręci, sem. lini, oleum sesaminum, & similia. Si uero apostema sit frigidum, phlegmaticum in principio, incipe cū oleo rosaceo, despica, & aceto, postea adde folia lauri grana eius, et

æger sibi imponat, aut imponatur ab artifice bene experto, & operante cum leuitate.

Sed ab extra epithimetur, aut ungantur renes, femur, & peritoneon, & oleorum uiolarum, nenupharini, lotorum, cum succis endiuig, plantaginis, & semperuix añ, ʒ. i. lactis mulieris, ʒ. s. mucilaginis, psilij, ʒ. i. s. camphoræ, ʒ. i. ceræ albæ quantum sufficit fiat unctio quæ est conferens ualde quando ardor est cum difficultate mingendi. Item cum impediretur urina emplastrum femur, aut peritoneon cū umbilico ueneris decocto, item ualet fomētatio cū sapa in qua decocta sint urtica, paritaria, & malua, & in uehementia ardoris inijciantur in uirgā narcotica, scilicet aliquid de semine hyosciami albi, aut opij, & pone in capite uirgæ de aqua rosata, in qua dissolutum sit opium, cuius aliquid per foramen ingreditur. Agentia autem à proprietate sunt uesica tauri, & uesica capræ puluerizata, & puluis miscetur cum his quæ inijciuntur in uesicam.

Cura uero ardoris sequentis defectum humiditatis glutinosæ perficitur prohibendo coitum, & remouendo omnes causas corpus exiccantes, & administrando omnia humectantia qualitatue & substantiæ interius & exterius. Sed cura ardoris urinæ sequentis lapidem, aut arenulas manifesta est ex cura lapidis de qua sermo præcessit. Cura autem ardoris uirgæ sequenti solutionem continui ponetur in cap. sequenti.

Regimen autem sex rerum complens hanc intentionem secūdam est infra scriptum. Aer declinet ad frigidum & humidum, nec sit multum opertus panis secundum renes, aut regionem uesicæ, non tamen multum frigat secundum uesicam. Cibi eius deducatur frigidum & humidum, & sint insipidi, aut paucae dulcedinis, & uitentur acuta, amara, salia, acetosa, & multum dulcia. Item multum stiptica, aut uiscosa propriè quando urinæ esset admixtum aliquid crassum de genere humoris lapidis & similium. Et uitentur multa aperiencia & prouocantia. Panis eius sit ex optima farina frumenti parum fermentatus nō salis. Vinum eius sit pauciferum mediocris substantiæ bene conditionata, aut aqua decoctionis hordei, & sebesten, & similia, aut bibat aquam solam simplicem, aut decoctionis rerum dictarum. Et potus lactis esset præstans nisi adesset febris putrida. Ferous ex ouis & lacte conueniunt, aut ex pane loto, & ouis secundum communem usum ex granis conuecti. Ex hordeum, pisanum, hordeacea robile, aut horum diuina, malua, borago. Item conuenit cucurbita, pepon melon, indus, cucumer, citrullus. Ex fructibus conueniunt pruna, persica, poma, pinæ præparatæ, uiscæ conueniunt. Quia conueniunt, lac, butyrum recens, & conuenientes sunt pulli, & ceteræ aues bene conditionatæ. Ex quadrupedibus uituli lactentes agnoscuntur, & similes, & communiter comedantur elilius. Oleum amygdalinum est ceteris oleis meritis. Notabiliter dormiat, procuret euacuationes naturales. Fugiat coitum. Sit quietus animo & corpore.

DE MICTV SANGVINIS ET SANIEL.
Cap. CVII.

Primo agatur de mictu sanguinis. Postea de mictu saniei. Pro notitia primi est sciendum quod sanguis uel simile sanguini quod mingitur est quadruplex. Aliquando mingitur sanguis uerus & complete solus, sicut in ruptura aut apertione uenæ emulgentis, aut uenæ in uesica propter percussione, equitationem fortem aut alias causas corporeas, aut primitiuas, & hic aliquando licet raro procedit ex membris quæ sunt supra renes & uesicam, sicut est epar, aliquando ex corpore toto propter repletionem multam sanguineam, quare separatur continuas uenarum, aut aperiuntur, & aliquando sequitur corrosione, uentositatem, tetanum, aut spasmum fortem, & causas primitiuas, sicut & ille qui mingitur à membris urinalibus, & fit mictus sanguinis, aliquando propter subtilitatem eius unde currit, quia superfluius, & quia non est ei essentia. Secundo mingitur sanguis permixtus aquositate urinali propter debilitatem uirtutis epatis, uel renum non separantis uerum & complerum sanguinem ab aquositate, unde taliter mixtus descendit ad uesicam & mingitur. Mictus autem sanguinis permixti humoribus crassissimis plurimum fit propter debilitatem renum. Tercio mingitur aliquid simile sanguini, scilicet quando caro epatis, aut renum liquefit quæ rediens in liquorem similem sanguini mingitur. Quarto est mictus rei deficientis à complemento sanguinis, est enim chylus diminutus sanguificatus, aut sanguis diminutus digestus, & hoc accidit ex debilitate uirtutis digestiue epatis, & talis in colore & substantia assimilatur loturæ carnis recentis.

Secundo sciendum, quod aliquando est mictus sanguinis secundum usum mundificationis superfluitatum etiam in corpore sano, qui est quandoque habet periodos, & circuitus in quibus redit & aliquando non redit, & aliquando fit mictus sanguinis, uidelicet symptomatikus, & aliquando est criticus existens terminus alicuius ægitudinis. Mictus autem rei similis capillis plurimum fit causa debilitatis digestionis uenarum, & quandoque est ualde longa quasi duobus palmis, & quandoque est deductus ad albedinem, quandoque ad rubedinem, & non prolongatur nisi causa suæ generationis in inuolutionibus uenarum renum aut aliorum, & ex cibis crassissimis, & generibus lactis, & granis, sicut fabis, & similibus, & non est in mictu eius de timore secundum quod terretur cor ex aspectu.

Vrinæ autem crassæ minguntur, aut causa mundificationis & crisis quam sequitur alleuiatio, & quandoque fiunt propter multitudinem humorum crassorum propter debilitatem digestionis. Vrinæ uero pinguis facilis exitus significat liquefactionem adipis. Mictus uero puris aut sanguinis permixti puri, quandoque fit propter ruptionem adubelet in membris superioribus pulmonis & pectoris, & epatis, aut propter apostema ruptum in membris urinæ, aut propter ulcera in eis, & quandoque fit in sanis non exercitatis absque ulcere, sicut dictum fuit superius. Et ex his iam manifestæ sunt species & causæ mictus sanguinis & saniei, quid nominis autem & quid rei satis nota sunt. Signa mictus sanguinis puri ueri cognoscitur ex colore & modo substantiæ, & quia non est ei permixtio aquositas.

aquositas aut aliorum humorum. Quod uero sit ex uesica, cognoscitur per nocumenta uesicæ ex dolore, & similibus, & quia sanguis ueniens ex uesica est paucus, habet .n. uesicæ uenas paruas, in quibus paucus sanguis continetur solū sufficiens ad nutrimentum eius. Mictus uero sanguinis ex renibus, cognoscitur quia est multus maxime quādo uena rumpitur. Sunt enim uenæ ueniētes ad renes magnæ, multum sanguinem deferentes non solum sufficientem pro nutrimento ipsorum, sed aliorum membrorum, & sunt magis paratæ eruptioni, quia non sunt boni situs æqualis, imò eleuatæ supra partes in quibus continentur. Sed uenæ uesicæ sunt conseruatæ, alias contentæ non expositæ scissioni & eruptioni cum situ suo. Quod uero mictus sanguinis ueniat ex epate & mēbris alijs supra renes & uesicam, cognoscitur ex carentia nocumentorum renum & uesicæ, ex præsentia causarum potentium facere in eis rupturam, aut apertionem uenæ ex qua sequatur mictus sanguinis, sicut est repletio & similes statim dictæ, & ille qui est propter apertionem uenarum sic sine dolore, & est paucus in principio licet fortè postea augeatur, & est mundus & syncerus. Sanguis uero eruptionis & scissionis est multus in principio & postea aliquando minoratur, & aliquando non est mundus, aut syncerus, cum sequatur ulcera, aut corrosione, imò si est corrosio est paulatim ad nigredinem decliuus, & quandoq; est cum eo fœtor, & sequitur alias egritudines, & multoties sunt cum eo cortices, & sanies & pus, quod si est cum ulceræ absq; corrosione saltem est cum eo sanies aut pus. Mictus autem sanguinis permixti aquositati cognoscitur, quia apparet aquositas ipsi permixta, & aliquando sanguis residet in fundo urinalis, aut saltem si coletur per petiam descendit aquositas & remanet sanguis, & per hoc distinguitur à mictu sanguinis diminue decocti, qui neque residet, neque colari potest ab aquositate, licet ambo cōueniāt in hoc quod sunt, sicut lotura carnis. Distinguitur autem an ueniat ex epate uel renibus, quia ueniens ex renibus magis tendit in albedinem & est magis crassa. Veniens autem ex epate magis trahit ad rubedinem, & est subtilior & si melior sanguini, mictus autē rei similis sanguini quæ est ex substantia epatis, aut renis liquefacta cognoscitur ex causis præcedentibus, scilicet febribus colliquatibus: item ex causis primitiuis multum calefacientibus: item quod mingitur est tenue sicut adustum, & quod est ex liquefactione epatis magis tendit in rubedinem & contra, quod est ex liquefactione renū magis in albedinem cum minori rubedine. Mictus autem sanguinis propter tenuitatem eius significatur quia sanguis qui egreditur mingendo, & per phlebotomiam est ualde tenuis, & non sunt signa aliarū causarum, locus autē saniei & ulceris cognoscitur per dolorem si fuerit membrum dolorosum, & cognoscitur per signa ægritudinum in quibuscunque mēbris existant, sicut per signa apostematis, aut dubelati, aut ulceris, aut repletionis, & cognoscitur ex uia cōmixtionis, nam quanto locus ulceratus magis est alteratus, est sanies, aut sanguis inde egrediens maioris commixtionis, & quanto inferior minoris & maioris separationis ab alijs quæ secum aliquando miscentur, sicut est urina, & si ambo egrediantur ex eodem ulcere in loco inferiori magis sunt adinulcem separata, si ue-

rò ex loco alto magis sunt adinulcem permixta. Ille autem qui est propter causas uicinas uirgæ, aut in uirga antecedit urinam, & elongatus à uirga posipontur ab urina, aut permiscetur ei uehementer. Apostemata autem & ulcera cuiuscunque membri cognoscuntur per signa & accidentia propria, sed distinguitur an sanies quæ mingitur sit ex ulcere aut apostemate, nam quæ est ex apostemate mingitur subito in magna quantitate, quæ uero ex ulcere paulatim, & multoties ex longo processu perducit ad excoriationem & ardorem partes per quas transit. Expulsio autem critica cognoscitur, quia est subita, & cum alleviatione & fortitudine, symptomatica uero sine his. Signa uero mictus rei similis capillis, & pinguedinis, & renum crassarum sunt ipse res quæ minguntur.

Prognostica. Primum Auic. auctoritate Hippo. Cum mingitur sanguis sine dolore aut est paucus in horis quibusdam non est malum. Cum autem perhoris fortasse accidet febris & mictus puris. Secundum, mictus puris ex ulcere epatis, aut fundi uesicæ secundum plurimum mortalis. Ex ulcere uero renis, aut colli uesicæ frequenter salubris. Tertium, cuius ren porus uritis, aut uesica disrumpitur moritur. Quartum, mictus rei similis capillis pinguedinis, aut rerum crassarum secundum plurimum sanatur.

Cum aliquis propter casum uel percussione sanguinem minxerit, ex basilica minuatur. Et trochisci qui dicuntur trochisci de charabæ tribuantur, qui Recip. charabæ, gummi, tremule arboris ana. drach. 5. balasliarum, hypochistidos ana. drach. 2. & s. olibani drach. 2. sem. apij, opij ana drach. 1. formentur trochisci pondere aur. 1. ex quibus unius in die cum apozemate sumach tribuatur.

Ad comedendum uero tribuantur carnes coctæ cum sumach, & carnes coctæ cum succo uivæ acerbæ. Abstineat à murtientibus acutis & salsis. Loco uero percussione superponatur emplastrum ex bolo armeno, & acatia, & aloë, & litio confectis cum aceto & aqua.

Hic Rasis primo agit de mictu sanguinis. Secundo, de mictu saniei, secunda ibi. Pus uero si minxerit.

Prima in duas. In prima curat mictum sanguinis sequentis casum, aut percussione. In secunda curat mictum sanguinis sequentem cibos & potus acutos, secunda ibi. Si autem sanguinis mictus euenierit.

In prima parte dicit, cum aliquis propter casum, aut percussione minxerit sanguinem phlebotometur ex basilica, ætate scilicet & reliquis consentientibus, de hac tamen uberius dicitur cum ordinabo curam, deinde dentur trochisci de charabæ ad contringendum,

gendum, præcedente tamen aliqua mundificatione, si fuerit expediens de qua dicitur. *z. charabe, gummi, tremulæ arboris, id est, granati sylvestris ana 3. i. balustiarum, hypocistidos ana 3. z. s. olibani 3. z. sem. apij, opij, ana 3. i.* Ex istis pulverizatis formetur trochisci cum succo ozimi, quorum quilibet sit aur. unius, ex quibus omni die unus exhibeatur dissolutus cum decoctione sumachi in ieiunio, hæc. n. sunt constringentia, partim stipicitate, partim viscolitate, opium autem compingendo, sed semen apij ponitur ut duceat vires medicinarum ad locum, sed ad comedendum tribuatur caro cocta cum sumach, & caro cocta cum succo uvarum acerbæ, hæc enim constringunt frigiditate, siccitate, stipicitate. Abstineant a cibis acutis, & salis, super loco uero percussione ponatur emplastrum ex bolo armeno, & acacia pro qua sumitur succus prunellorum, aloë, & litium quod est succus arboris quæ habet folia similia buxo. Et fructus eius est similis piperi, hæc autem sumpta in æquali dosi, & mixta cum aqua, & aceto, & superposita loco percussio optime sanguinem constringunt. Et si uis magis infrigidare, auge frigida, scilicet bonum & acatiam.

Si uero sanguinis mictus euenerit post comestionem ciborum acutorum, aut potum uini acuti, phlebotometur æger & trochiscos de charabæ in potu sumat, & eodē quod diximus gubernetur regimine.

Hic curat mictum sang. ex sumptione rerum acutarum, sicut alliorum, sinapis & uini potentis &c. dicens egrum esse phlebotomandū, & ipsi esse tribuendum de trochiscis, de carabe prædictis. Et reliquo regimine superscripto esse regendum.

Pus uero si mixerit ægro trochisci isti dandi sunt. Recipe melonis, citrulli, cucurbitæ absque corticibus omnium drachmas uiginti, boli armeni, gummi arabici, thuris, sang. drac. omnium ana drachmas decem, opij drachmas tres, seminis apij, drachmas duas, informentur trochisci pondere drach. duarum, ex quibus omni die unus cum syrupo de papauere tribuatur unciam unam in potu. Virgæ quoque ex isto collyrio immitatur. Collyrium de cerusa. Recipe cerusæ, sarcocollæ, oliban, gummi arabici, opij, sanguis drac. conis, omnium partes æquales fiant ex eis collyria, & per syringam prius fiat iniectio ex hydromelle, et mingat æger, et post eius egressionem fiat iterum iniectio istius collyrij dissoluti in lacte asinæ.

Hic curat mictum puris ex ulceribus maxime renum & uesicæ, dicens esse egrum tribuendū de his trochiscis. *z. sem. melonis, citrulli, cucurbitæ absque corticibus ana 3. 20. boli armeni gummi arabici, thuris, sang. drac. ana 3. 10. opij, 3. 3. sem. apij, 3. 2. formetur trochisci duarum drach. ex quibus omni die unus cum syrupo de papauere 3. 1. in potu tribuatur.* Virgæ quoque ex isto collyrio immitatur. *z. cerusæ, sarcocollæ, oliban, gummi arabici, opij, sang. drac. ana partes æquales fiant ex eis collyria, id est, siccit, quibus hoc modo utendum est.*

Primo. n. fit iniectio ex hydromelle ad mundificandum, & mingat æger, & post eius egressionem fiat iniectio istius collyrij dissoluti cum lacte asinæ ad consolidandum & dolorem mitigandum.

Hoc diuinū opus imperfectū nobis reliquit clarissimus Physicus Ioan. Arculan. qui dum in florentissimo Ferrariensi gymnasio publice medicinam legeret, ac indies hoc ipsum opus studeret absolueret, diuina atque acerba morte interceptus est, cum tamē iam pridem de mola matricis acheruina, de quā iusturarum doloribus materiam plene aboluisset. Cuius quidē admirandi uiri sepulchro huiusmodi inscriptus est epigramma.

Qui iustæ uitæ meritis, & philosophiæ
Summa arte ac studio gloria summa fuit.
Ipsam qui uere medicinam nouit, & ægris
Si qua fuit, solus spesq; salusq; fuit.
Reges & populos desenda morte Ioannes,
Orbatos linquens conditur hoc titulo.

DE MOLA. Cap. CVIII.

Mola dicta a molin persice idē significante quod parturitio carnis. Latine est prægnatio mendosa, in qua non fortis sed frustum carnis, uentositas, aut aquositas, aut humoris diuersi in matrice continentur.

Ex quibus inferitur quod mola est quadruplex, scilicet carnosa, uentosa, aquosa, & humoralis. Est autem carnosa morbus in numero. Reliqua autem reducuntur ad morbum in complexione & compositione.

Causæ carnosæ quæ proprie est mola, est duplex materialis & efficiens, omitto finalem & formalem, quarum consideratio ad philosophos pertinet. Causa materialis carnosæ est sanguis menstruus in concauo matricis contentus. Causa efficiens est uirtus augmentatiua concurrente caliditate & siccitate matricis conuertens hunc sanguinem in carnem quæ caro nullius animalis formam, aut similitudinem gerit, & habet solum animam uegetatiuam. Secunda causa est sperma muliebri quod aliquando in somnis inijcitur in concauum matricis, aut alijs modis mulieribus notis, quod permiscetur cum sanguine menstruo ipsum extendens & in carnem conuertens. Sed propter defectū uirtutis informatiue non acquirit formam hominis, nec alterius animalis, & sic remanet informe nullam gerens similitudinem alicuius animalis. Tertia causa est aliquando sperma uirile non habens sufficientē uirtutē informatiuam, quod permixtū cū sanguine menstruo licet dilaret & extēdat, non tamen ipsū & figurat secundum humanæ animæ exigentiam.

Causæ uero molæ uentosæ materialis est phlegma, aut alius humor uentosabilis existens in matrice. Causa uero efficiens est caliditas matricis ipsum potens uentosare, non autem uentositatem inde genitam resolueret. Secundo posset hæc uentositas genita ex errore digestiue epatis, sicut in tympanite deferri ad concauum matricis, sicut in tympanite deferretur, ali quando in uentrem contentiuum membrorum naturalium. Tertia causa potest esse uentus ueniens de foris ingrediens matricem per uias manifestas uel occultas. Causæ uero molæ aquosæ, sunt aliquando aquositas genita ex errore digestiue epatis quæ cum sanguine transmittitur ad matricem. Sed sanguis cedit in nutrimentum eius. Aquositas uero effusa ad concauum eius & ibidem retenta propter clausio nem colli matricis, sicut fit in prægnatione uera est cā molæ aquosæ quæ in dies ex eadem cā augēdo, pcedit.

Secundo multiplicatur aquositas in matrice per uiam paulatim factæ cōgestionis ex superfluitate nu trimenti eius non expulsa. Causa uero humoralis est multitudo humorum secundum plurimum per mixtorū cum sanguine qui ad matricem delati effun duntur ad concauum eius per officia uenarum men strualium & ibidem retēti et in dies aucti faciunt mo lam. Vidi tamen semel molam ab humore phlegma tico, crasso ad similitudinem pulvis factæ per super fluam milij decoctionem in aqua, quæ tantum excre uit, ut post mortem patientis facta anatomia esset maioris quantitatis & ponderis quam residuum cor poris ipsius.

Sed præter hæc superflua aliquā in matrice cōtenta quæ sunt causa molæ ut supra reperiuntur uermes in matrice in notabili quāritate geniti ex phlegmate pu trido, qui tamen non debent dici mola cum ex ipsis non sit aptus tantus tumor provenire ut assimiletur prægnationi.

Si tamen ad aliquam speciem molæ essent dedu cendi ad speciem molæ carneæ reducerentur. Reperiun tur quoque quandoque in matrice simul cum foetu ani malia diuersarū specierum, sicut bufones, & similia, & proprie in regionibus Australibus & Occidentalibus, quæ sunt genita ex concursu spermatis uiri post ueram prægnationem permixti cum sanguine men struo concurrente in fluxu supercoelesti ad horū ani malium generationem quæ cum sint uenenosa, si mordeant foetum, sicut aliquando accidit in partu moritur foetus.

Nunc superest ut ponantur signa. Sed primo po nantur signa distinguētia inter prægnationē ueram & species molæ. Secundo signa distinguētia unam spēm ab altera. Tercio, signa distinguētia inter speci em molæ, & speciem hydropisis, ex quibus apparebit differentia inter ueram prægnationem & speciem hy dropisis, hæc. n. magna inuestigatione digna sunt cū plerunq; ex eorū ignorantia accidat erroris male cor rigibiles & uituperia non pauca medicis, & non mirū.

Nam multum assimilantur uere prægantes mo latice in retentione menstruorum, alteratione colo ris, no cumentis stomachi, conclusionē oris matricis, inflammatione mamillarum, tumore uentris, qui augetur quotidie ad tempus naturalis partus, sed in partu error detegitur cum molatice non foetum, sed frustum carnis aquositate, uentositatem, aut hu-

mores diuersos emittunt.

Signa ergo distinctiua inter ueram impregnatio nem & molam carneam sunt quinque. Primum, quia foetus post tertium mensem usque ad tempus par tus mouet ex se & ad diuersas, imò ad oppositas dis ferentias, mola uero carnea minime, imò non mouetur nisi post cōpressionem fortem. Secundum, quia maior durities est in mola carnea, quam in prægna tione uera cum frustum carnis sit aliquando ita du rum ut uix scindi possit. Tertium, quia extremita tes, scilicet manus et pedes patientis molam carneam sunt molles, sicut undimiat propter errorem digesti uæ quæ magis accidit in extremis quam in alijs parti bus, & non est ita in prægnante, cum uirtus digesti ua sit fortior. Quartum, in mola carnea totum cor pus extenuatur ex debilitate digestiue, non sic in præ gnatione uera. Quintum, patiens molam est secun dum plurimum debiliior in omnibus operationibus quam uere prægnans. Distinguitur autem inter mo lam carneam, & foetum mortuum, quia in reuolutio ne de latere ad latus, foetus mortuus cadit ad latus ad nequod uenter inclinatur, sed mola carnea non mouetur a suo loco. Sunt & alia signa foetus mortui, si cut frigiditas luminis, & reliqua uidentia capitulo proprio.

Signa uero distinctiua inter ueram impregnationem, & molam uentosam sunt quinque. Primum, quia in prægnante tumor & durities sunt magis in una parte determinata, & si duo se xus in duobus lateribus matricis contineantur appa ret in illis durities & tumor. In medio uero appa ret mollities per quā distinguitur inter duos foetus, sed in mola uentosa, fere æqualis apparet tumor & uniformis in omnibus partibus eius. Secundum, quia in mola uentosa est leuitas cum dolore exten sio, & interdum perforatio quæ non sunt in uera prægnante. Tertium, mola uentosa cum tumore notabili accidit in paruo tempore non sic in præ gnante. Quartum, tumor ille aliquando notabili ter crescit aliquā decrescit in paruo tempore non sic in prægnante. Quintum, cum percutitur uenter sonat ut tympanū in mola uentosa, non sic in prægnante.

Signa distinctiua inter ueram prægnationem & molam aquosam, sunt quinque. Primum, quia in ue ra prægnatione sunt tumor & durities in una parte determinata, & si sunt duo se xus apparent in uentre, duo tumores, & duæ durities distinctæ secundum locū. Sed in mola aquosa est mol lities, & tumor uniformis per totū. Secundum, quia uere prægnans non est multum discolorata, sed hæc mola aquosa est ualde pallida cum mollitie quadam. Tertium, quia in mola aquosa in motu & corporis reuolutione auditui sonitus aqueus mori, non autem sic in prægnante. Quartum, quia in habente molam aquosam est sumen & pecten, undimiat tum cum magna mollitie quod non est in uere præ gnante. Quintum, quia in habente molam aquosa mola, aliquando egreditur humiditas aquosa per uul uam, non sic in prægnante.

Signa uero distinctiua inter ueram prægnatio nem, & molam humoralem sunt duo. Primum, quia in uera prægnatione sunt tumor & durities in una parte determinata ubi est foetus, aut in pluribus si plu res sint foetus. Sed in habente molam humoralem est tumor

est tumor cum mollitie uniformis per totam regionem matricis. Secundum, quia in mola humoralis egrediuntur per uuluum humores diuersi quandoque mixti cum sanguine, non sic in prægnante, nisi cum uellet abortire.

Signa uero distinctiua inter species molæ sunt in frascripta. Distinguit ergo mola carnea uentosa per signa quinque. Primum, quia in mola carnea est durities fortis & tumor in una parte determinata, ubi est frustum carnis, sed in mola uentosa est tumor & ténitio in aliqua parte determinata. Secundum, quia tumor in mola carnea uniformiter augendo procedit, sed in mola uentosa nunc tumor subito decrescit, nunc augetur notabiliter. Tertium, quia in uentosa sonat uenter sicut tympanum cum percuitur, non sic in carnea. Quartum, quia accidit frequenter dolor extensius & aliquando perforatiuus in uentosa, non sic in carnea. Quintum, quia adest leuitas in uentosa, grauitas notabilis in carnea.

Sed distinguitur carnea ab aquosa per quinque superius posita per quæ distinguit uera prægnatio a mola aquosa. Similiter distinguitur mola carnea ab humoralis per duo signa suprascripta, per quæ distinguitur uera prægnatio a mola humoralis. Signa uero distinctiua inter molam aquosam & uentosam sunt quinque. Primum, quia in mola uentosa est tumor notabilis, & ténitio quæ facile non cedit cōprimenti, non sic in aquosa. Secundum, quia utraq; iacente supina in uentosa est uniformis ténitio per totum, sed in aquosa deprimuntur partes suminis, sed inflantur ilea & lœtera. Tertium quia uentosa aliquando notabiliter crescit subito, aquosa uero procedit augendo uniformiter. Quartum, quia in uentosa cum percuitur uenter auditur sonus sicut tympani. Sed in aquosa auditur sonitus aquæ in motu & reuolutione de latere ad latere. Quintum, quia in aquosa apparet summen & pecten undimiatum cum mollitie: item humiditates aquosæ egrediuntur per uuluum, non sic in uentosa.

Signa uero distinctiua inter molam aquosam, & humoralem, sunt difficilia cum multum assimilent, hoc tamen interest. Primum, quia in aquosa apparet undimiatum cum mollitie circa summen & pecten, non sic in humoralis. Secundum, quia in aquosa interdum egredietur aquositas per uuluum, in humoralis uero humor frequenter sanguini permixti. Tertium maior est palloredo in aquosa quam in humoralis, & pedes, & crura magis undimiatum.

Signa uero distinctiua inter species molæ, & species hydropicis sunt difficilia, cum mola aquosa multum assimiletur asciti, & mola uentosa tympaniti. Signa tamen distinctiua sunt tria. Primum, quia in speciebus hydropicis præcesserunt nocumeta epatis, de quibus actum est superius, sed in mola præcesserunt nocumeta matricis. Secundum, quia tam in mola aquosa quàm uentosa, & etiam in humoralis non est tumor, nisi in sumine uel ab umbilico infra scilicet ubi continetur regio matricis, sed in duabus speciebus hydropicis iam dictis, scilicet asciti, & tympaniti apparet tumor per totum uentrem a pectine usque ad diaphragma. Tertium signum, quia in mola aquosa egreditur frequenter aquositas per uuluum

non sic in ascite, & ex his possunt sumi signa distinctiua inter ueram prægnationem & species hydropicis.

Prognostica. Primum, licet molæ secundum plurimum emittantur ante nonum mensem, aliquando tamen prolongantur usque ad tres, uel quatuor annos, aliquando usque ad extremum uitæ quod maxime uerificatur de carnea & uentosa. Secundum, secundum plurimum cum species molæ prolongantur ultra nonum mensem sunt insanabiles & frequenter interimunt.

Mulieribus plerumque accidit passio ex qua prægnantium dispositionis similitudinem incurrunt. Venter nanque crescit, & discoloratae fiunt, & retinentur menstrua, motus tamen qui est in hac egritudine non est ut motus infantis, immo quandoque de suo mouetur loco cum duriter tangitur. Ad ultimum uerum cum angustia & dolore frustum carnis informe ac si pateret emittit. Plurimum uero solummodo uentositates & humorum multitudo emittuntur, & deinde minuitur uenter, & remouentur accidentia.

Postquam uero tempus præterierit in quod scitur puerum debere moueri si adesset, trochisci de mirrha dandi sunt. Et apozema de seminibus, & oleum de resina adbibendum. Et pessarium ex ruta & mentastro. Et alia pessaria prædicta in capitulo de alienatione partus sunt immitenda. Doses quoque de pilulis fet. frequenter tribuendæ sunt, cum hoc enim cito euadent.

Hoc capitulum diuiditur in tres partes. In prima ponit signa molæ. In secunda modum terminationis. In tertia, temporis inchoandi curam, & auxilia opportuna, secunda ibi. Ad ultimum uero, tertia ibi. Postquam uero tempus præterierit. In prima ponit quatuor signa dicens, quod mulieribus aliquando accidit passio dicta mola in qua patientes assimulantur prægnantibus. Primo crescit uenter sicut in prægnantibus cum res in utero contenta paulatim augendo procedat. Secundo fiunt discoloratæ nocumeto communicato stomacho, & epati maxime propter retentionem menstruorum. Tertio retinentur menstrua propter clausuram oris matricis, sicut in prægnatione quæ clausio fit a uirtute, & est oppilatio attenuatoria. Quarto, quia conten-

tum in matrice mouetur, sed non ex se immo per compressionem, & in hoc differt a uera prægnatione, in qua foetus ex se mouetur, etiam ad oppositas differentias. In secunda parte ponens modum terminationis, dicit quod ad ultimum, id est, transactis quibusdam mensibus cum dolore & angustia, ac si pareret emitte frustum carnis, pluries tñ emitte solā uentositatem, aut humorū multitudinem, post quorum emissionem uenter minuitur & sedantur accidentia. Sed in 3^a parte ostendit tēpus inchoandi curam, & ponit remedia oportuna. Tempus aut inchoandi curā est a 4^o uel 5^o mense supra. s. in eo tempore in quo foetus deberet se mouere & non adest motus eius. Remedia aut sunt quinque. Primum, trochisci de mirrha sunt dandi, sicut dictum fuit in cap. de prouocatione mēstruorum ad mouendum sang. ad orificia uenarū mēstrualium, & ad stimulantium expulsiuā matricis, ut aperiat collum eius. Secundum est apozema. i. decoctio de seminibus de quo supra capitulo de colica & est ad eandem intentionem, & ad dissoluendas uentositates existentes in matrice. Tertium est oleum de cheiim. i. de pentadactylo qui aliter dicitur cherua, cataputia maior, solsequia, hoc. n. in potu sumptum a tribus 3. usq. ad 4. ualde potens est ad extenuandum phlegma, & ad carminandum uentositatem. Quartum est pessarium ex ruta & mentastro potens ad carminandum uentositatem, & alia pessaria aqua sunt immittenda, quæ pessaria perquirere quarto huius cap. de facilitando partum. Quintū & ultimum auxilium sunt pilulæ fortide frequenter exhibendæ, cum hoc. n. q. prouocant educunt causam antecedentem.

Cura molæ exigit sex intentiones. Prima euacuat causam materialem eius. Secunda preparat ad ipsius molæ educationem. Tertia ipsam educit. Quarta alterat diserasiam matricis, quæ est causa generationis eius. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat regimen sex rerum. Prima intentio perficitur digerendo & euacuando. Digestiuum aut fit in mola carnea, & uentosa, et humoralī pendente ab humoribus crassis in cūsiu, absteruiū, subtiliatiuum, & per uirtutem tertiā petēs matricem, sicut oxymel simplex, compositum, & scilicet cum aqua artemisiæ, & similibus, & ex proprijs est huiusmodi.

Recipe betonicæ, matricariæ, artemisiæ, chamædryos, chamæpitios, calamenti, mentastri, pulegii, origani ana M. i. fauinæ, phu, id est, ualerianæ, meu, leuistici, cyperi, calami, arom. ana 3. i. bulliant in lb. s. aquæ ad consumptionem medietatis & coletur, quæ colatura syrupizetur cum mellis lb. z. aceti lb. s. & fiat syrupus longus pro duabus portionibus reliquum abbrevietur, quod deinde sumatur cum aqua artemisiæ, aut matricariæ, euacuatiuum uero sit electuarium indum, benedicta simplex, theodoricon, hieralogodion, pilulæ factidæ, & similia.

Si uero materia fuerit aquosa, educatur cum succo iureos, & his quæ conueniunt in ascite, de qua supra. Digestiua etiam sunt illa quæ superius posita sunt in ascite, phlebotomia conuenit si in causa fuerit sanguis, & fiat ex basilica aut ex saphenis, si in causa fuerit retentio mēstruorum. Præparetur autem & molæ educatio iuxta secundam intentionem cum his quæ molliciant, & collum matricis dilatant, ex quibus

sunt fomenta, unctiones, semicupia, pessaria, suffumigia, et ea quæ sumuntur, molliciantia in quibus est sedendum, & cum quibus est fomentandum, sunt decoctio ex althea, fœnugræco, seminis lini, anetho, sesamo, malua, branca ursina, & similibus, et cum eis semidem est suffumigandum, his possunt addi in decoctione aliqua prouocantia, sicut fauina, semen iuniperi, & similia, & pessarium fiat ex cocto quod infundatur in unctione facta ex pinguedine gallinæ, oleo liliorum alborum, selamino, cui parum mucici addi potest. Et hæc maxime in carnea sunt necessaria. Sed in uentosa cum suprascriptis ponantur ad bulliendū aliqua carminantia uentositatem, sicut arist. rotum, & similia, & in aquosa aliqua educetia aquositate, sicut iris, & sumat decoctionem lenientem & lubrificantem factam ex capillis ueneris, passulis sebesten, daetyl. sicibus, semine altheæ, & artemisiæ. Educatio autem molæ iuxta tertiam intentionem fiat cum his quæ stimulant expulsiuam, & faciunt collum matricis aperiri sicut trochisci de mirrha exhibiti cum aqua decoctionis iuniperi, item suffumigium infra scriptum a Ras. 4. Alm. Recipe mirrherina, id est, galbani, gēsu, id est, oppoponacis, sulphuris ana 3. unam, puluerizentur, & misce cum selle uaccino, & fiant pilulæ quarum una post aliam super prunis mittatur, & recipiatur fumus ad matricem cum emborato, & suffumigatio cum elleboro, & colocynthidis est præstans, & quæcunque faciunt partum & educunt foetum, & secundinam, sunt ad hanc intentionem. Et ex præstantibus quæ non fallunt est confectio huiusmodi. Recipe mirrha, castorei, styracis ana 3. unam, cinam. sauinæ ana 3. s. conficiantur cum melle, cuius dosis sint aurei duo cū uino, quod diuina fuerit aquosa euacuetur cum diureticis, sicut dialacca, dialacca. Et dentur medicina ascitis, aquositate, & in summa regatur regimine ascitis, de qua supra. Si tamē potest educi aquositas per collum matricis illud est præstantius, propterea illa uia tentanda est, & efficax ad illud est pessarium factum ex farina gith, & ex mercuriali contra. Si uero fuerit uentosa regatur cum carminantibus uentositatem ex proprijs, matrici, sicut arist. rotum, potata & pessariata.

Et sicut pessarium Rasis in litera & oleum de cherua, de quo supra, potatum est efficax, & in summa regatur cura tympanitis. Si uero sit humoralis præmissis uniuersalibus euacuationibus, de quibus supra, retetur educatio eius per collum matricis soluentes etia sunt & phlebotomia saphenarum.

Quarta intentio alterat diserasiam matricis, quæ secundum plurimum est calida & sicca cum contrarijs bibitis epithimizatis, & pessariatis, & ex proprijs frigidis est oleum de alchechengi.

Quinta intentio corrigit accidentia secundū ipsorum exigentiam. Sexta intentio ordinat regimen sex rerum in contrarium diserasie, et etiam secundum exigentiā intentionum quas intendimus persicere. Ce

Quia hic agitur de ægritudinibus mirach eius anatomia est præmittenda. Cum tres sint uentres in humano corpore. Superior contentius membrorum animalium & est caput. Medius contentius membrorum spiritalium & est pectus. Inferius contentius membrorum naturalium, de cuius anatomia agendum est. Qui descriptiue est uas superius, ad diaphragma, inferius, ad pectus terminatum, posterius habens dorsum, anterius midinatum. Superius enim terminatur ad diaphragma quod diuidit naturalia a spiritalibus. Inferius terminatur ad pectus quod continet membra generationis, quæ tamen inter membra naturalia computantur, habet posterius dorsum, scilicet a 19. spondilium eius infra. Anterius autem est mirach, membra autem naturalia quæ continentur in hoc uase sunt de cem, epas, splen, renes, matrix, uesica, testiculi, cum uasis spermaticis in mulieribus, quia in uiris procedunt extra. Hic autem uenter habet partes anteriores & laterales & posteriores. Anteriores sunt quinque. Prima, est pars quæ cooperit malum granatum et os stomachi. Est autem malum granatum os charitilaginosum figuram habens scutale continuatum inferiori ex ossibus thoracis quæ sunt septem, ordinatum ad turandum os stomachi, & ut sit medium inter thoracem & membra leuia, & dicitur epiglottis apud Auic. eo quod epiglotti assimiletur. Secunda pars cooperit fundum stomachi durans prope umbilicum per duos aut tres digitos. Tertia est, umbilicus cum quo foetus alligatur matri in primo est una uena, quæ transiit per gibbum epatis ad uenam chylum, & continuatur cum orificio unius ex uenis matriæ mediante secundina, & per hanc foetus nutritur ex sanguine attracto a matrice ad gibbum epatis eius. Non enim in eo ex chylo generatur sanguis neque celebratur in eo prima digestio quæ fit in stomacho, propterea non sunt in eo feces quæ sunt superfluitates primæ digestionis. Sed fit in gibbo epatis eius secunda digestio, non quidem dans formam sanguini, sed solum perficiens & separans quædam superflua. Est etiam in umbilico arteria una quæ ascendit ab arteria aorti cum est in principio spondilium alani quæ continuatur cum orificio unius arteriæ terminatæ ad concauum matriæ. Per quæ defertur aer a concauo matriæ ad cor foetus ad ipsius euentarium. Non enim foetus euentatur in utero per aerem inspiratum ad pulmonem, propterea pulmo foetus est rubeus, sed albificatur cum exiit ab utero per respirationem. Quarta, est pars quæ uocatur sumen infra umbilicum per quatuor digitos, & est pars in qua uenæ quatuor terminantur ad autem, per quas foetus existit in matrice emittunt aquositate. Ideo apud Auic. hæ uenæ notiores sunt in non natis quam in perfectis in quibus frustra pectus in qua sunt membra genitalia, partes uero laterales sunt hypochondria & ilia, in hypochondrio dextro continetur epas, in sinistro uero splen, & sub eis sunt ilum dextrum et sinistrum, & quibus reliqua

membra naturalia continentur, partes uero componentes mirach sunt quinque, scilicet cutis pinguedo, panniculus carnosus, octo lacerti uentris cum chordis eorum, & panniculus nervosus dictus siphac, & ab Auicenna uocatur benteron. Auic. tamen per mirach aliquando intelligit aggregatum ex omnibus his quinque particulis. Cutis facta est ad continendum & sentiendum quæcunque occurrentia. Postea sequitur pinguedo, maior tamē in porco quam in homine, ordinata ad reflectendum calorem ut uigoretur digestio, & ad remolliendum feces ut facilius expellatur. Postea est panniculus carnosus qui non est nerveus ut alij, neque carnosus ut musculi. Musculi autem sunt octo. Primo sunt duo longitudinales procedentes a clypeo oris stomachi usque ad ossa pectinis secundum longum uentris, ideo appellati sunt longitudinales, et iuuant ad attrahendum cum uillis se elongando, & postea se contrahendo. Deinde sunt duo transuersales superiores, unus a dextris, alter a sinistris, & ambo oriuntur a superioribus iuxta costas mendosas, & desinunt in chordas iuxta ossa pectinis sic quod dextri corda tendit ad sinistrum inferius, & sinistri ad dextrum, & per oppositum sunt duo inferiores procedentes ad superiora, quorum ortus est ab ossibus pectinis et anchæ, & desinentia in chordas est ad locum ubi finiunt costæ, ita ut se crucient secundum angulos obliquos ad modum istius figure. x. & sunt ordinati ad retinendum. Ultimo sunt latitudinales quorum fila procedunt per latum, unus dexter, alter sinister, & ortus & aperientia eorum est magis iuxta dorsum uersus superius, et isti cum longitudinalibus se intersecant ad angulos rectos, & sunt ordinati ad expellendum, quapropter eius situs est magis superius quam inferius cum magis ordinentur ad expulsionem per inferiora, quam per superiora, & propter eandem causam transuersales superiores sunt fortiores & crassiores, cum magis sunt ordinati ad retinendum ne quid egrediat per inferius. Ultimo sequitur siphac panniculus, durissimus & subtilissimus, hic factus fuit ut prohiberet ne musculi comprimerent membra intrinseca, & ut ea contineret. Propter quod factus fuit nerveus & non osseus, ut posset constringi & dilatari secundum exigentiam, & fuit subtilis ne aggravaret, & durus ne facilius rumperetur. Nam ex eius fractura accidit passio, quæ dicitur crepatura siue hernia, de qua Rasis in capitulum. Intumescit enim mirach cum rumpitur hoc siphac. Sunt etiam eius alia duo iuuamenta apud Auicennam in capitulo de anatomia stomachi. Vnum ut per curuationem eius cum adiutorio diaphragmatis cum quo alligatur expellat, quod in stomacho, intestinis & in matrice continetur. Aliud iuuamentum est ut alliget intestina dorso mediantibus panniculis mesenterij ab ipso ortum habentibus, & ut ab ipso oriantur omnes panniculi membrorum in ipso contento- rum, & quinta utilitas apud Galenum quinto de iuuamentis membrorum est, quod prohibet intestina a ruptura quando infantur. Potest autem uenter pati omne genus ægritudinis. Sed nihil habet proprium quod ex anatomia dependeat, nisi solutionem continui & tumorem præter naturam. Cum enim soluitur uenter solutione penetrante utrunque aliquando egreditur scirbus, & opus est ut quicquid ab aere

Causæ coniunctæ eminentiarū & herniarū ex iam dictis sunt manifestæ. Causæ autem primitiue sunt casus, percussio, offensio, saltus, catus, risus, tussis, sterminatio, & omnis fortis motus, conatus, & expressio & mulotiens sequuntur pregnationem, molam & hydropisim propter fortem extensionem mirach, & aliquando accidit his qui fune tormētatur, aut super quorum uentrem cadit equus aut alia res grauis. Causæ uero antecedentes corporeæ ex sæpe dictis possunt esse manifeste.

Signa apostemosa cognoscuntur per signa communia apostematum, scilicet tumorem, duritiē, grauitatem, dolorem, & quia paulatim augendo procedit, sed à quo humore pendeat cognoscitur ex colore specie doloris, uelocitate aut tarditate augmenti, & ceteris quæ consignant, scilicet complexionē, habitum, ætate, tempore anni, regimine præcedente & similibus, quæ sæpe dicta sunt, carnosa uero cognoscitur ex tumore cum duritie sine dolore qui tumor nō augetur neque minuitur. Sed uentosa cognoscitur ex leuitate cum tensione æquali, & quia subito facta est, & sonat cum percussione, & est cum claritate quatur ex tumore cum dolore, sed aquosa cognoscitur ex mollitie cum grauitate & fit paulatim. Sanguinea uero siue emborisma cognoscitur, quia subito uel in paruo tempore facta est, & est mollities cum caliditate quadam, & aliquando propter multitudinē sanguinis extendentis apparet durities potius sequens tensionem quā naturam humoris. Et quandoque sentitur pulsatio sicut arteriæ & color tendit in fuscū, & præmendo retrocedit aliquando & non præmenando reuertitur sicut ruptura. Sed scirbalis & intestinalis cognoscuntur, quia homine iacente supino per compressionem recedunt scirbo & intestino interius redeunt. Sed cum homo erigitur iterum redeunt. Differt tamē scirbalis ab intestinali, quia scirbalis est mollior & sine rugitu intronititur, & est secundum plurimum minor. Intestinalis autem in his tribus se habet contra. Herniæ uero distinguuntur ab eminentiæ uero non. Sed signa aquosæ & uentosæ sunt similia his quæ in eminentia aquosa & uentosa dicta sunt. Saniola uero licet sit similis aquosæ, differt tamē ab ea per opacitatem quandam quæ non est in aquosa, & quia saniolæ præcesserunt ulcera aut ruptura apostematis. Carnosa cognoscitur per tactū carnis duræ adherentis in testiculo, aut bursæ, aut utriusque linteronititur sicut scirbus aut intestinum de quibus statim. Varicosa uero cognoscitur, quia sentiuntur uellicet crassæ tortuosæ ab inguine usque ad testiculum, fliculus eiusdem partis magis pendet quā testiculus partis oppositæ. Scirbalis autem & intestinalis cognoscuntur, quia delitescunt per compressionem scirbo & intestino in uentrem redeunte. Sed scirbus facilius & sine rugitu intronititur, intestinalis difficilius & cum rugitu, imò aliquando non potest intronitiri cum est intestinum plenum stercore duris. Et aliquando difficilius intronititur quā intestinum uacuum à stercore, & tunc sequitur colica & uomitus stercoreum & mors. Item scirbalis est minor & mollior & cum nullo & paruo dolore. Quod au

tem proueniat à scissura siphac, cognoscitur quia subito accidunt & sunt cum dolore, & præcesserunt causæ primitiue aut corporeæ uolēter exprimentes quæ in uentre continentur, & regimen præcedens, & tempus anni fuit exciccatiuum. Sed e contra omnino nō sunt signa dilatationis absque scissura.

Prognostica. Primum. Eminentia & herniæ uentosa, aquosa, & saniola, facile curantur, licet post curationem quandoque redeant. Secundum. Eminentia & herniæ scirbales & intestinales, quando sunt ex dilatatione absque ruptura, ualde facilius curantur quā quando sunt cū fractura, ita quod aliquando magnæ & in ætate adulta & antiquæ curantur. Sed quæ sunt cum scissura minime, imò non curantur cū medicinis nisi paruæ non antiquatæ & in ætate pueritiæ. Reliquiæ uero procuracione exigunt operationem manualement. Tertium. Eminentia quæ est emborisma difficilime sanatur, & exigit medicum expertū.

Quartum. Cura herniæ carnosæ & uaricosæ difficilima est aut impossibilis. Quintum. Herniæ cum prolongantur nocent testiculis interdum ipsos corumpentes.

Cum aliquis in mirach uentris habuerit eminentiam, qui cum supinus iacuerit & cum leuiter digitis locus compressus fuerit remouetur, & cum sederit redibit, passio adest quæ ruptura dicitur.

Diuiditur hoc cap. in partes duas. In prima agit de eminentia mirach & inguinis scirbali & intestinali, quia solum de his duabus determinat. In secūda agit de hernia quam appellat rupturam. Secūda ibi. Ruptura autem. Prima in duas. In prima ponit signa. In secūda curam, secūda ibi. Qui hoc itaque patitur.

In prima dicit, quādo aliquis in mirach uentris eminentiam habuerit, quæ cum supinus iacuerit, & locus eminens digito compressus fuerit remouetur, & cum sedet redibit, passio adest quæ ruptura dicitur, eminentiam enim huiusmodi rupturā appellat eo quod frequenter sequitur rupturam siue scissuram siphac.

Qui hoc itaque patitur, sibi cauere debet ne post comestionem moueatur, neque comedat fabas, & hoc præcipue, neque phaseolos, neque lentes, neque olera, neque alium quem cibum inflatum. Studere etiam debet ut eius uenter semper sit mollis, hoc namque regimine possibile est ipsum euadere dolorem. Loco præterea aliquod superponendum est obstaculum, & stringendum & proprie cum se mouere uoluerit. Crassus quoque si fuerit, & uentrem habuerit grauem, non debet uti motu, nisi uenter prius sub umbilicum ampla cinga-

tur fascia. Emplastrum ad rupturam. Re-
ci. gallarum, cupressi, partes. 2. mirrhæ,
ciperi, samplici, gallarum, acatiæ oliba-
ni, gummi arab. omnium ana. partem unā,
gummæ prius in uino soluantur, & agre-
gentur cum eis reliqua, & super rupturā
ægro supino iacente ponatur, & stringa-
tur locus, & non soluatur usque ad tres uel
septem dies, postea ægro supino iacente sol-
uatur, & illo eiecto de eodem emplastro su-
perponatur ex hoc. n. prohibetur ampliari.

Hic curat hanc eminentiam quinque auxilijs. Pri-
mum est regimen sex rerum quo cauetur ne post ci-
bum moueatur, motus enim simul cum cibo compri-
mente facit intestina & scirbum egredi, uitet etiā uen-
tosa sicut propriè sunt fabæ. Item reliqua difficilis di-
gestionis & habentia humidum uentosabile sicut re-
liqua legumina, herbæ, & similia. Secundum est, quod
teneat uentrem lenem, ne uentositates & stercorea re-
tenta rupturam augeant, hoc namque regimine pos-
sibile est euadere dolorem, qui sequitur rupturam &
extensionē ab intestinis ex scirbo egredientibus. Ter-
tium, rupturæ superponatur aliquod obstaculum si-
cut plumaceolus qui cum ligatura debite stringatur,
& maxime hoc necessarium cum se mouere uoluerit.
Quartum, si crassus fuerit secundum compositionem,
& uentrem habuerit grauem propter intestina crassa
& plena stercorebus nullo pacto moueatur, nisi uen-
ter sub umbilico usque ad pectinem ampla stringatur
fascia ad sustentandum uentrem, ne rupturam faciat
aut augeat. Quintum, emplastrum hoc superponatur
eminentiæ, scirbo & intestinis intus repositis. R. nu-
cum cupressi partes. 2. quæ sunt calidæ & sic, & stipti.
mirrhæ, ciperi, samp. calidorum & siccorum, gallarū
acatiæ, quæ sunt frigida, & sic, stiptica, olibani, gum-
mi arab. ana. partem. 1. gummæ, scilicet mirrha, thus,
gummi ara. prius in uino, scilicet stiptico dissoluan-
tur, & cum eis reliqua misceantur, & fiat unguentum
tenax, & super loco ponatur ægro iacente supino, &
remutetur de tertio in tertium, sicut unguentum be-
ne adhæreat. Si æger bene se habuerit expectet usque
ad septē, omnis enim motus est aptus nocere, & quan-
do remouetur fiat cum omni modestia ne partes se-
mi incarnatæ discontinuentur & aliud superponatur
de eodem augmento, & sic omnis mutatio fiat cum
omni modestia possibili. Ruptura autē. In parte præ-
senti agit de hernia. Et primo enumerat species her-
niæ, de quibus acturus est. Secundo de ipsis prosequi-
tur, secunda ibi. Si uerò propter intestina descensum.
In prima parte dicit, quod pellis testiculorū augmen-
tatur ruptura, id est propter rupturā factam per uen-
tositatem, aut propter aquam quæ in oscheo siue pel-
le testiculorum congregatur, aut quia intestina descen-
dunt ad bursam testiculorum, & sic tantumodo agit
de tribus speciebus herniæ.

Ruptura autem testiculorum pelliculæ

oschei augmentatur, quod fit, aut propter
uentositatem, aut propter aquam quæ ibi
congregatur, aut quia intestina descendunt
ad locum illum. Si uerò propter intestino-
rum descensum contingat, erit grauis &
dolorosus, & sentit dolorem cum tangitur.
Taliter itaque patiens sicut prædiximus re-
gendus est. Et emplastrum prædictum su-
perponendum est. Et locus ligatura assidue
stringendus est. Ruptura enim cum stringi-
gitur dilatatur & augmentatur semper.

Prosequitur de tribus speciebus, herniæ, & primo
de ea quæ est propter descensum intestini. In secunda
de ea quæ est propter aquositatem. In tertia de ea quæ
est propter uentositatem, secunda ibi. Si autem causa
est aquæ, tertia ibi. Cum autem hæc ægritudo. In pri-
ma parte curans herniam ex descensu intestini, dicit
ma parte curans herniam ex descensu intestini, dicit
primo quod æger sentiet grauitatē notabilem & do-
lorem in oscheo & in inguine, & maxime cum tangi-
tur, secundo dicit, quod intestini siue scirbus qui de-
scendit est reducendus ad locum suum, & emplastrum
supra scriptum est superponendum, & locus cum liga-
tura debite stringendus, ut iterum non descendat. Li-
gatura enim inter omnia maxime prohibet descen-
sum intestini & foraminis dilationem, & si omnia
tur ligatura & debita compressio cum plumacolo
foramen semper augetur.

Si autem causa aquæ fiat locus apparet
lucidus & tensus, huic itaque confert epi-
thimari epit himate quod in cap. de hydro-
pisi nominauimus. Aqua uerò in hac ægri-
tudine plurimum petit inferiora & fluit in
de, unde æger per aliquod tempus sanus est
ficitur, sed postea redit ægritudo. Post-
quam ergo aqua fluxerit, curatus est æger
ex cauterio & medicamento acuto. Ex hoc
enim prorsus curabitur nec redibit ægritu-
do, de hoc tamen loqui plus est quam hic
noster exigit liber.

In parte ista curans herniam aquosam. Dicit pri-
mo, quod si aqua descendit locus apparet turbidus
id est, non ita clarus, sicut quando uentrositas ibi con-
tinetur. Et est locus ille, scilicet bursa testiculorum ten-
sa, id est, tumida, est tamen tumor ille cum mollitie,
sed in uentosa cum duritie propter tensionem. Secun-
do dicit, quod huic confert epithima superius posita
pro cura hydropisis ascitis. Tercio dicit, quod aqua
huiusmodi descendens ad bursam testiculorum, ali-
quando egreditur, scilicet refudando, aut quia forte
auxilijs opportunis resoluitur, aut aliter educitur, sed
postea

postea redit noua aqua in partibus superioribus congregata, & ad bursam testiculorum iterum deriuata, & hoc fiet multoties, nisi subueniatur cum cauterio, scilicet actuali, aut medicamine acuto, id est, cauterio potenciali apponendo in inguine super loco transitus aquositate ad bursam testiculorum, & etiam subueniendo reliquis auxilijs prohibentibus prædictæ aquæ congregationem, de quibus in cura agitur, de hac tamen operatione manuali loqui non pertinet ad hunc librum, sed magis pertinet ad seprimum huius ubi agitur de chirurgia.

Cum autem hæc ægritudo uentositatis causa contingat locus fricandus est, & ex oleo sambacino in quo castoreū & euphorbium dissoluta fuerint iniungendus, & ex eodem intus in uirgam guttatim distillandum est.

In hac parte ultima curans herniam uentosam dicit primo, quod locus fricandus est cum oleo sambacino, id est, sesamino, exempli gratia, §. 1. in quo castorei & euphor. ana. 3. i. dissoluta fuerit, & ex hoc medicamine aliquid in uirga guttatim est instillandū hoc enim medicamen taliter ungendo locum tumorem applicitum, & in foramine uirge instillatum plurimum iuuat in resolutione uentositatis.

Cura eminentiæ apostemose perficitur sicut cura reliquorum apostematū. Nihil enim habet propriū nisi quia oportet apostema cum est profundum ante perfectam maturationem scindere, ne forte rumpatur interius. Similiter hernia apostemosa quæ est apost. bursæ testiculorum eodem modo curatur sicut reliqua apostemata. Verum cauendum est, ne huiusmodi membra putrescant, sunt enim ad putredinem paratissima & suppositoria conferunt trahendo materiam ad anum, & repercutiendo appropriatur farina fabarum & aqua caulium, & in sedando dolorem folia hyoscyami summe ualent in causa cal. & in cauenda frigida ponatur farina fabarum cum scœnug. & cymini. Et si maturentur fiat sectio longe ab ano, & à commissura, & ligatura fiat cū hrachiali tenente burculo eleuato. Carnosa uero siue sit in inguine, siue in mirach curatione non indiget nisi lædat quod rano est, quod si lædat auferenda est caro addita sectio ne aut cauterio actuali uel potenciali, & auferatur ita huc diminuta ab eo quod est secundū naturā, nā cicatrizationi addit in carnē. Cura herniæ carnes ponetur infra. Cura autē aquosæ & uentose, siue fuerit eminētia, siue hernia exigit duplex regimen. Primum debetur causæ antecedenti. Secundum uero causæ coniunctæ. Primum exigit tres intentiones. Prima est euacuatio materiæ ex qua generatur uentofitas, scilicet phlegmatis aut melanc. item euacuatio aquositate. Secunda est, confortatio epatis, stomachi, & membrorum multiplicatur per quorum defectum hæc superflua plentur, potest esse manifestum ex cap. de hydropi. Tertia autem intentio est regimen sex rerum, de quo

Raf. agit in textu. Sit enim prohibitum generationis aquositatis & uentositatis, sed de hoc dictum est oportune in capitulo de hydropisi. Secundum uero regimen quod debetur causæ coniunctæ duas intentiones habet. Prima est educio aquositatis & uentositatis in loco contentæ, & secunda est prohibitio ne in eodem loco eadem materia congregetur. Prima intentio iuxta posse compleatur cum resolutionis ex proprijs mirabilibus ad resolutionem cuiuscunque materiæ existentis in bursa testiculorum ac in ipsis testiculis siue apostemantis, siue non est farina fabarum, aut fabæ ipsæ contractæ & mundatæ à corticibus exterioribus, deinde coctæ in aqua, & postea pistatæ in mortario addendo olei rosacei aceti. añ. quantum sufficit & tandem super loco cum decenti ligatura applicitæ, ita ut bursa & testiculi non stent suspensi nec pendentes, sed subleuari, & his non sufficientibus potes addere pro resolutione uentositatis, puluerem cymini præparati & baccharum lauri, aut parum emplastrum de bacis lauri præcipue quando non est mala complexio calida. Sed in hernia aquosa potest superscriptis addi parum emplastrum superius positi in cura hydropisi alciitis, sed fortiora sunt uitrum & piper. In uentosa uero optime cōueniunt oleum de spica, oleum de costo, oleum rutaceum, cyminum, bacce lauri & calamentum aliquando uero pro extractione aqua opus est aperire bursam, illud tamē apud Albucalim non conceditur in uentosa, quod si aqua fuerit in bursa, & non in chisti contenta aperiatur cum sagittella in parte inferiori distanter à commissura & extrahatur, & locus consolidetur & medicamen cōstrictiuum super inguine ponatur cum plumaceolo stringendo ne iteretur, & si iterum redeat iteratio sic fiat. Quando autem aqua fuerit conclusa in folliculo ducatur per didimum supra os pectinis, & à parte uentris minimè digito fortiter comprimatur, ut non egrediatur uentrem, & similiter operator stringat à parte bursæ, ut non descendat in bursam, & cum phlebotomo penetret usque ad aquam, & ipsam extrahat ex foramine cum tenta aliquantulum dilatato post accipiat parum arsenici sublimati, ut puta sicut medium granū frumenti, kystim, cauterizet, deindeeducta escara consolidetur. Secunda autem intentio, scilicet prohibitio aggregationis aquæ perficitur extrahendo aquam, sicut nuper dictū est, hoc enim regimine aqua extrahitur & prohibetur alterius reaggreatio. Alij tamen cauterio actuali aut potenciali penetrant, usque ad didimum & ipsum cauterizant. Credo tamen istas operationes esse secundum plurimum pluris nocuenti quam iuuamenti, quia aut totus didimus cauterizatur aut non, si non, aqua iterum descendit per partem non cauterizatam. Si uero totus cauterizatur, necesse est testiculum corripui & extrahi. Quapropter credo eligibilis esse, ut his operationibus omittis quæ non sunt absque periculo, si aqua descendit, extrahatur modis superscriptis cum medicinis resolutionibus aut cum perforatione, quæ aqua iterum descendente iteretur, sic enim æger dies suos salubriter finiet, & eodem modo procedatur in saniosa. Hernia sanguinea siue emborifima si sequatur fracturam arteriæ que sit notabilis difficulter recipiet curam. Primo ergo tenetur curatio cum appositione unguentis tipici & debita compressione cum plumaceolo sicut fit in ruptura

ptura, nec mutetur nisi de quinto in quintum aut etiā tardius. Quod si hoc non suffecerit arteria in duabus partibus discooperiatur & ligetur, & in medio ubi est ruptura scindatur & extrema notabiliter cauterizentur & conferuetur escara quantum est possibile, tandem remota escara quantum natura expellit cōsolidetur. Cura herniæ carnosæ difficillima est. Si tamen cum instantia fueris requisitus, præmissis uniuersalibus, scilicet phlebotomia, uentris solutione secundum exigentiam, & ordinata dieta conueniente, quæ tēpore operationum manualium de quibus infra, sit tenuis dediuus ad frigidum, primo experire in carnosâ dura medicinis mollificantibus, postea resoluētibus secundum ordinē institutum in cura apostematum duorum sed in intentione resolutionis semper medicinæ resoluētes sint admixtæ farinæ fabarum aut earum substatie, & aceto ad penetrationem, resolutionem & mollificationem, hæ enim medicinæ nunc mollificantes, nunc resoluētes in longitudine dierum carnem extenuant, sit tamen longior usus extenuantium quam mollificantium, imò post initium curæ, in quo licet uti mollificantibus sit serē cōtinuus usus extenuantium & resoluētium.

Si uerò caro sit mollis adiposa solum cum resoluētibus & fortiter exciccantibus procedendum est, sed in uaricosa frequenti phlebotomia basilicæ eiusdem lateris utendum est, & procuretur fluxus sanguinis hemorrhoidalis præcipue, si fuerit confuetus, sed medicinæ locales sint stipticæ, in quibus sit acetum & applicetur cum bona strictura, & bursæ & testiculorum subleuatione, his enim modis frequenter curatur sine operatione manuali. Sed operatio manualis, primo prognosticato periculo & rei difficultate secū dum Albucasim hoc modo perficienda est, postquā fueris multis præcibus infestatus.

Scinde oscheum sufficenter in ea parte ubi est caro uel uarix, & impositis stuellis cum albumine oui ad sanguinis restrictionem & uulneris dilatationem, nil aliud prima die opereris, sed secunda die tenta separa carnem à testiculo & à paribus quibus alligata est, nō lædendo testiculum & eam incide.

Si uerò non sit possibile & testiculus totus fortē sit corruptus aut sephiratus uel canceratus liga superius didimum, uel sue, postea cauteriza & totum extrahe, postea uulnus sue, hæc tamen operatio ex sequētibz fiat manifestior.

Si uerò fuerit uarix liga eam in parte superiori & inferiori utrobique secando uenam prope ligaturas & inter medium extrahe, deinde uulnus sue.

Cura eminentiæ & herniæ scirbalis & intestinalis sit dupliciter, uno modo cum medicinis, alio modo cum operatione manuali. Curatio cum medicinis aut saltem præseruatio habet quattuor intentiones. Prima euacuat. Secunda scirbum & intestina in uentrem reducit. Tertia stringit & cōsolidat. Quarta ordinat regimen sex rerum.

Prima euacuat phlegmata & aquositate, feces, & quæcunque possent rupturam facere aut fouere cum medicinis solutiuis, non tamen præter modum exoluentibus, in quibus ponatur aliquid derelinquens ue stigium constrictionis, sicut mirobolani citrini, chebuli indi, hæc solutiuia ex sæpe dictis possunt esse manifesta. Secunda intentio perficitur, quando diffi-

lis est intromissio, quia fortē intestina quæ descendunt sunt plena fecibus duris. Primo clysterizando ægrum cum lenientibus & mollificantibus & fomentando particulam cum eisdem & ex eisdem faciendo balneum in quo iaceat, deinde agro iacete supino altius tamen cum parte posteriori quam cum anteriori & cruribus contractis, sed dilatatis, stringendo intestinum propē foramen à quo egressum & paulatim, sicut stringitur implendo ad intra uētram per pariem post parē, donec totum ingreditur, maximus enim error est, uelle totum simul implere.

Et post intromissionem procuretur tertia intentio.

Primo fomentando locum cum aqua, uino, & aceto decoctionis gallarū, nucum cupressi & aluminis. Deinde apponatur emplastrū in loco in quo apparebat eminentia extensum super corio in modum scutari, quod cum brachiali aut proportionali ipsi debite stringatur, & mutetur de nouem diebus in nouē dies, & cum mutatur eger sit supinus, & amoueatur cum omni modestia, ne partes continuæ discutiuntur & teneantur digiti deluper, donec brachiale ligetur. Instrumenta autem cum quibus sit huiusmodi constructio triplicia sunt. Quædam enim sunt sumptuosa, aut sustagno in cōmuni forma. Sed hæc non inconuenientia, quia si strictæ illaqueantur dolorem inferunt abraddendo carnem. Si uerò parum stringantur intestinum ægreditur. Nisi fortē æger uellet per longum tempus quiescere in lecto & stare supinus, in hoc casu esset satis commoda, & si ex coriarent aliqua partem ponatur sibi unguentum de cerusa bene cōctum. Sed ubi non posset aut uellet quiescere stringatur locum cum brachiali de ferro aut de ligno suffulto, sustagno aut simili. Hæc enim conuenientiora sunt, & magis æqualiter cōprimunt. Nec relaxant sicut ea quæ sunt de sustagno aut tela, & commode feruntur equitando & incidendo. Et hoc maxime conuenientia sunt ubi intendamus solum præseruare, & non perferre curare est enim difficile in homine qui frequenter mouetur locum consolidari, licet aliquando uiderim quoridie exercitatum cum his perfectē curari. Sed ad perfectam curationem secundum plurimum opus est iacere quinquaginta diebus, deinde alijs quinquaginta diebus postquam surrexit ferre brachiale. Quolibet autem mane administretur sibi potio consolidatiua cum uino crasso stiptico.

Descriptio emplastri, ꝑ. picis naualis, ꝑ. colophoniæ, ꝑ. lichargiri, amoniaci, oppoponaci, galbani, bdellij, mastichis, terebenthinæ, ana. ꝑ. i. boli armeni, sanguinis drach. gyphi, thuris, sarcocollæ, aloës, succotrinij, mumix, arisi, centaureæ utriusque cōsolidæ, sicutrinij, berberis, nucis cupressi, gallarum, plicis uermium, terrestrium, ana. ꝑ. z. sanguinis humani, ꝑ. i. glutinis piscium, uici quercini, ana. ꝑ. i. s. pellis arcticonæ coctæ cum aqua pluuiali & aceto usq; ad dissolutionem, ꝑ. s. dissoluantur gummi cum aceto. Confectantur omnia cum glutinibus liquefactis & fiat emplastrum.

Emplastrum quoq; Rasis in litera descriptum est conueniens & breuis compositionis. Potio rupturæ fit ex trium consolidarum, sigilli sancti Marci, utriusque laccæ, utriusque plantaginis, ualerianæ, pinellæ, ana. ꝑ. i. nucis cupressi, nucis muscæ, annamomi, rheubarbari assij, fructus ramarici, seminis ræturij

sturtij, cymini præparati, coriandri, ana. 3. z. sanguinis draco, masticus, mumie, terræ sigillate, boli armeni, piicis, sarcocollæ, tragacanthi, ana. 3. i. fiat puluis quo utatur fumendo de mane, 3. i. cum. 3. i. s. uini nigri stiptici. Alter modus curadi rupturas apud Guidonē est quod supposito bono regimine de quo infra, ægro ut dictum est iacente per. 30. dies & reducat in intestinis accipiat quodlibet mane & sero, 3. i. l. maturæ calibis cum uino decoctionis epaticæ terrestris & super locum rupturæ per. 15. dies de tertio in tertium remutando, ponat emplastrū factum de adamante crasso modo puluerizato, & cum apostolicon malaxando incorporato, & post alios. 25. dies contineat emplastrum dictum superius, & ligetur cū brachiali dicto, & iussu Dei erit curatus. Fundamentum adamas attrahit ad locum rupturæ limaturam quæ facit ad consolidationem, & in alijs quindecim diebus emplastrum complet consolidationem. Quapropter reperietur super loco nodoso carnositas, quæ est signum perfectæ curationis. Quarta intentio, scilicet regimen sex rerum declinet ad caliditatem & siccitatem temperatam, cum quadam subliatione & carminatione uentositatis & propriæ consolidationi & aggregandi dilatare & dissueta. Et cauendum est ab omni uentosis & superflue humectantibus. Venter tamen teneatur magis lenis quam stipticus.

Vbi tamen præter modū uenter stringeretur, posset uti in principio mensæ ouis forbilibus cum saccharo, passulis sine nucleis & similibus uentrem lenientibus. Et apud maiorem necessitatem in æstate diaphranæ Nicolai compositio cum rheubarbaro. Et in hyeme calephanginis, pilulis de rheubarbaro & similibus. Aut fiant dyteria secundum exigentiam.

Operatio autem manualis in ruptura didimi perficitur duobus modis.

Primus cum incisione cum rasorio, & est quod si uato patientæ supino super tabula, & bene ligato, & reductis intestinis in ventrem, signetur locus cum enclauistro, ubi debet fieri sectio ad quem locum testiculus reducatur, postea fiat sectio super testiculo & terando didimum. Postea si uatur & ligetur didimus firmiter, ita ut sic situr est possibile, prius capiēdo & strinendo ipsum didimum inter forpices, propterea bonum est, ut antequam capiatur cum forpicebus trahatur notabiliter inferius, deinde secetur supra forpices, ita tamen ut didimo remaneat supra forpices quantitas medij digiti parui. Deinde fortiter cauterizetur pars remanens supra forpices, & intromittatur, sed capta fili cum quo facta est suitio dimittantur extra, & cum albumine oui in primis, & postea cum curatione aliorum uulnrum curetur, & teneantur semper loca pila stupea cum ligatura debite compressa, ut nulli aut alio motu non fiat future disruptio.

Secundus modus est cum cauterio actuali, & ponitur ab albucafi, Auicēna, & ceteris, & sit quod resurgetur patiente modo dicto, & intromisso intestino dum quantitate testiculi cum emplastro, & reducto testiculo per medium signi transuersaliter cauterizetur cum cauterio recuruo toriens, quousque ad os peccinæ perueniatur. Postea cum albumine oui & cura re-

liquorum uulnrum curetur, extrahendo tamen didimum cum testiculo. Si uero uoluntas esset dimittere testiculum, quia forte ruptura non esset ualde magna, facto signo cum emplastro super loco scindendo remanente testiculo in oscleo, & non deducto superius ad locum signatum perforetur, usque ad os cū instrumento recuruo, ita ut pars didimi secundū medium eius scindatur utrinque & non totus didimus, & in hoc casu instrumentum sit paruum. Sunt aliqui qui cum cauterio potentiali hanc eandem faciunt operationē, quæ est longa, laboriosa, eam uideā Guidone & reliquis. Sunt & multi alij modi quos prætermitto, tum quia difficiles, longi & laboriosi, tum quia aliqui eorum sunt fallaces. Prima tamen est cæteris securior. Quia si eminentia esset in mirach uentris, ruptura siphac, signetur locus eminens ægro iacente supino secundum longum, uentris intestinum introducatur, deinde scindatur mirach secundum longum, usque ad siphac exclusiue, deinde siphac ex utraque parte excorietur separando ipsum à reliquis partibus, postea cum forpice capiatur utraq; pars siphac postea suatur & liget infra forpice, & supra forpice incidatur & cauterizetur. Et capita foliorum, cū quibus suture est siphac extra uulnus dimittantur, postea uulnus mirach consolidetur cura reliquorum uulnrum. Simili modo procedendum est in cura rupturæ inguinis mulierum, quæ non habent didimum. Nisi quod sectio in inguine, non debet fieri secundū longum, sed secundum transversum aliquantulum, secundum incellum inguinis. Accidētia uero quæ sequuntur operationes suprascriptas sunt tria. Primum, quia aliquando sequitur dolor intensus cui subueniendum est cum rebus anodinis super loco appositis. Item cū semicupijs anodinis, quod si spasmus sequeretur sicut aliquando uidi, administraretur cura spasmī non proportionati ad materiā, & balnea ex oleo toti corpori applicita sunt præstantia. Secundum accidens est fluxus sanguinis, cui subueniatur cum constringentibus in communi forma, & his non sufficētib; cauterizetur uena à qua sanguis profluit profunde. Tertium est tumor burfæ testiculorum interdum apostematosus, cui subueniatur cura apostematum, & si sanarietur secetur inferius, similiter si sanies contineretur in oscleo fiat sectio parua in parte inferiori.

DE DOLORE IUNCTURARVM.
Cap. CXI.

Dolor iuncturarum est earum tristis sensatio rei subito secundum plurimum materialiter imprimētis. Gutta autē est dolor iuncturarum à causa corporea, quapropter sub dolore iuncturarum gutta continetur, tanquam interiorius sub suo superiori. Est autem iunctura ossium membrorum adinuicem coniunctio per ligamēta & chordas musculorum cum uenis, arterijs & cute, desuper existentibus ad membrorum flexionem & eorū membrorum secundum suarum operationum exigentiam ordinata.

Dolor iuncturarum dupliciter distinguitur, aut ex parte iuncturarum patientium, aut secundum sui essentiam. Primo modo dicimus, quod aliquis est dolor communis omnibus, uel ferè omnibus iuncturis, & hic

& hic arctica vocatur. Artus enim siue articuli iuncturę dicuntur. Aliquando tamen arctica dicitur, & similiter pro cuiuscunq; artus dolori à causa corporis, & hoc modo gutta & arctica erunt termini synonymi, licet Raf. in iunctis hoc capitulum uideatur per arcticam intelligere dolorem iuncturarum, quę sunt supra pedes magnos. Aliquis autem est proprius aliquibus iuncturis, & hic aut est proprius iuncturis communibus toti corpori quę sunt iuncturę spondiliorum, quia super ipsis totum corpus fabricatur, sicut nauis super carina, & hic vocatur dolor iuncturarum dorsii, aut est proprius iuncturę deferuienti membro particulari. Et hic recipit uariam denominationem secundum membrorum diuersitatem. Si enim sit in iunctura mandibulę uocatur dolor mandibulę. Si uero in iunctura humeri uocatur dolor humeri. Et si in iunctura cubiti uocatur dolor cubiti. Et si in iunctura rasetę uocatur dolor rasetę. Et quęcumque est in iunctura manus magnę uocatur chiagra à χῆρ, quod est manus. Sicut existens in aliqua iunctura pedis magni uocatur podagra, licet postea recipiat uariam denominationem secundum diuersitatem iuncturarum pedis. Nam existens in ischia dicitur sciaticus, si descendit per coxam aut cruris. Si uero non descendat dicitur dolor anachę, & existens in genu dicitur dolor genu, eodem modo in reliquis. Distinguuntur quoque dolor secundum eius essentiam, est enim aliquis extensiuus, aliquis pungiuius, aliquis pulsatiuus, & sic de alijs speciebus doloris.

Causa immediata cuiuscunque doloris est, aut ma-
la complexio, aut solutio continui, aut utrunque si-
mul sicut in apostemate. Sed mala complexio est quan-
doque sine materia existens calida frigida aut sicca, li-
cet secundum plurimum frigida, quia in genere pro-
portionali facilius est transire. Sed secundum pluri-
mum cum materia, aut mixta ex cholera & phlegma-
te, & est secundum plurimum. Secundo in causa est fan-
guis mixtus cum cholera, phlegmate aut melancholia.
Tertio in causa est phlegma purum, dulce, aut cru-
dum, aut mucilaginosum, aut alterius speciei. Quarto
fanguis purus, raro cholera, rarissime melancholia.
Ventositas quoque aliquando est in causa & super-
fluities multiplicatae in digestionem tertiam aut quartam.
Et quandoque hi humores sunt apostemantes, & quan-
doque non, & secundum plurimum non apostemant
apostemate vero. Et hi humores siue apostemant siue
non, continentur in concavitate iuncturarum &
sunt imbibiti in carne & ligamentis non chordis &
nervis. Sic enim in dolore iuncturarum frequenter ac-
cideret spasmus cuius oppositum videmus. Hi autem
humores in iuncturis paulatim congruuntur &
proprie phlegma propter debilitatem digestivae &
expulsivae, sequentem aliquod genus aegritudinis in
ipsis. Sed secundum plurimum derivantur & aggregan-
tur in eis, per viam defluxus. Cuius defluxus cau-
sa est quadruplex. Dispositio membrorum mitem-
tentium, dispositio membrorum recipientium, praesentia
materiae, latitudo viarum. Mittentia autem sunt.
Aut totum corpus per cuius repletionem aut cacochymiam
generatur arterica, materia non expulsa
per convenientes regiones. Si enim aliquando refre-
cto fluxu diarrhico generatur arterica, aut aliqui do-
lores particulares iuncturarum materia ad ipsas cau-

[illegible]

grizat, nisi menstrua defecerint. 6. aphor. aphor. 29. Tempora magis proportionata doloribus iuncturarum sunt uer & autumnus tertia particula aphorismorum aphor. 25. & 22. et. 6. aphorismorum aphor. 55. Et merito artis, ille in quibus oportet pedibus & manibus laborare sicut uiatores & portantes onera. Et apud Auicennam humores crudi cum retinentur in corpore & non euacuatur per naturam in egestionem, & urina, nec per artem, non est longinquum, quin euenire faciant dolores iuncturarum, si expellatur ad eas, aut febris si putrescant.

Cum autem natura expellit eos in egestionem aut urina, tu inuenies urinam in eis crassam semper non subtilem, crudam, quare finaliter sit securitas ab eorum malitia. Quod si ita non fuerit, erit unum eorum quae diximus. Et propter hanc causam uidemus homines uiolentos, & in omni re inordinatissimos nunquam incurrere hos dolores neque aliam aegritudinem, quotidie enim sua superflua expelluntur. Et patientes aegritudines chronicas & conualescentes sunt parati ad dolores iuncturarum, & propterea cum non euacuatur secundum quod oportet, neque eorum uirtutes fortificantur. Dolores iuncturarum habent quatuor tempora, principium, augmentum, statum, & declinationem. Licet quandoque in eis tempora confundantur, cum post statum et augmentum quandoque redeat principium noua materia ad iuncturas defluxa, & quandoque respectu diuersarum materiarum sunt in principio, augmento, statu & declinatione. Propterea difficile est in ipsis metiri medicinas. Dolores isti terminantur quadrupliciter. Aut enim resoluantur, & hoc est secundum plurimum. Aut maturantur, sed hoc est raro, eo quod propter uacuitates iuncturarum non suffocantur materiae neque prohibetur exhalatio, & quia secundum plurimum sunt ex phlegmate, quod difficile maturatur, & ex cholera, quae facile resoluitur. Aut induratur quandoque propter materiam humoris, quia phlegma crassum, aut mucilaginofum, aut melancholia, aut quia indolente tractatur, scilicet cum nimis resoluuntur, aut praeter modum in partium subtilium remanentibus partibus terreis. Quarto quandoque permurantur ad membra nobilia, sicut dolore spondilium & humeri ad cerebrum, nucliam, aut cor, quandoque ad membra ignobilia, sicut ad uarietas, & quandoque sic permanent, id est, usque ad finem uitae suae, & quandoque uirtute pauperrima deficiente propter febres & dolores sequentes materiam regimine naturae destituta moriuntur consumpti & marasmati.

Signa doloris iuncturarum cognoscuntur ex re latu aegri & impedimento operationis iuncturae dolentis. Et quod sit a mala complexionem sine materia cognoscitur, quia non est grauitas, neque tumor, neque calor mutatus a naturali, & in calida sentitur caliditas per aegrum aut tangentem, praecesserunt cause calefacientes, iuuatur a frigidis, nocetur a calidis. Et ex oppositis cognoscitur causa frigida. Mala autem complexio frigida cognoscitur ex alperitate & refractione sensata per aegrum, & praecesserunt cause exicantes, iuuatur ab humidis nocetur a siccis. Et quaelibet harum cognoscitur, quia secundum

dum plurimum facile curantur.

Quod autem dolor sit materialis, sicut est secundum plurimum cognoscitur ex grauitate sensata, & quia ut plurimum adest tumor, & color est mutatus a naturali, nisi iuncturae sint profundae, sicut iunctura humeri & ischia.

Quod autem sit a materia calida praeter grauitatem omnibus doloribus materialibus communem cognoscitur ex caliditate sensata, & rubedine, & ueloci augmento, & dolore pungitiuo, pulsatiuo, aut extensiuo magis quam grauiatiuo & ex consuetudine: qui dolores consueuerunt esse a materia calida, & ex augmento eorum tempore uacuitatis & sedatione post comestitionem. Item ex inflatione & febre sequente dolorem, & quia magis affligitur in die, & ex urina & egestionibus attestantibus humiditatibus calidis aut frigidis. Item ex reliquis congnificationibus sicut ex complexione calida, aetate, regimine praecedente, tempore, arte, & similibus attestantibus caliditati. Et inter alia, quia iuuatur a frigidis, & nocetur a calidis. Et ex signis contrariis cognoscitur materia frigida.

Hoc tamen signum sumptum ex iuuantibus & nocentibus, quandoque facit errare, qui error prouenit, tam ex parte doloris, quam ex parte medicinae applicatae. Ex parte doloris, quia dolor aliquando inflamat & non resoluit. In primo casu medicina frigida applicata iuuabit in pendente a materia calida & frigida sedando inflammationem & calida nocebit. In secundo casu, contra calida iuuabit resoluendo materiam per cuius resolutionem maxime sedatur dolor & frigida nocebit prohibendo resolutionem. Sed ex parte medicinae applicatae potest esse error, aut merito proprietatis, aut merito complexionis. Primo, quia quantumcunque medicina debet merito complexionis suae contrarietate causae doloris iuuare, tamen nocebit merito proprietatis. Inest enim apud Auicennam, unicuique corpori & membro, ut ab una medicina patiat & non ab alia. Sed merito complexionis medicine, quia si est calida attrahendo materiam augebit dolorem etiam pendente a materia frigida, uel resoluendo minute dolorem etiam pendente a materia calida. Si uero frigida aut stupefacit & sic minuit dolorem etiam si ex causa frigida accidat, aut claudendo poros retinet materiam maxime si stipta fuerit, & sic dolorem auget etiam in materia calida, & hoc modo, causa calida existimabit frigida, & frigida calida.

Sed pro euitando hunc errorem duo attendenda sunt. Primum est, ut attendatur effectus sequens primam impressionem medicinae & proprietatis per qualitatem actualem, si enim calida sit & proprie actualiter & iuuat primo occursum notabili iuuamento, dolor pendet a causa frigida, & contra. Secundo obseruare oportet reliqua signa supra scripta, & ipsa cum hoc signo conferre, & omnibus aequilibratis uidere, quae sint pauciora, & indicia humilissimi exigunt medicum prudentem & exercitatum. Quod si causa fuerit phlegmatica, dolor erit paruus, grauiatus, locus albus, tumor magnus & molli tactu, frigidus absque pulsatione & punctatione. Si uero fuerit cholericus contra se habebit, licet tumor in ea quandoque sit maior atque grauedo, eo

q̄ de materia plurimū effunditur ad iuncturam uice una, & modico tempore propter subtilitatem & caliditatem materiae & rubedo loci magis clara cū pauca tēfione, & albefcit locus per cōpressionem.

Si uero fuerit sanguinea, color erit rubeus tēdens in opacū qui non albefcit per cōpressionem, & dolor erit pulsatiuus & caliditas sensata.

Si uero fuerit melancholica, dolor erit minor & profundus, & tumor cum duritiā & liuiditate.

Si uero fuerit uentosa, tēfio erit absq̄ grauedine, & dolor q̄nc̄ mutabitur & iuuabit cōpressionem, et si mixta fuerit, q̄ est secundū plur. signa erunt cōfusa, et est de illis quę non iuuat a calidis neq̄ frig., & interdū iuuatur calidis & interdum frigidis.

Et pro horum notitia considera cōplexionem, habitudinem, regimen p̄cedens & reliqua cōsignificancia. Et si fuerit materia paulatim aggregata, dolor erit minor. Nā incipit et paulatim auget. Si uero subito infusa dolor erit maior & repentinus, & hoc secundum plur. arguit latitudinem uiaꝝ, & subtilitatem materię maxime cū multitudine. Et si materia a toto sit infusa dolor erit pluribus membris cōis, & erit arterica secundum plurimum. Si uero a cerebro passio ipsarum p̄cedēs hoc indicabit ut catharrus & materia secundum plur. frigida phlegmatica, licet aliquā calida si in ea sit falsedo quę aliquando per gustum percipietur & incidit a spondilibus colli & procedit per collum ad humeros & ad iuncturas pedum. Si uero ab epare eius p̄cessit aegritudo cum signis repletionis ipsius & uenarum & materia est calida secundum plur. Similiter si fuerit a stomacho & intestinis et reliquis mēbris, passio ipsorum p̄cedens hoc indicabit, & materia effusa naturę membrorum mittentiū, proportionalis fortitudo membrorū mittentiū cognoscitur ex ipsorum bonis operationibus, bona complexionē, & compositionē, & ipsorum alleuationē cū transmittunt superflua, & ex contrariis ipsorum debilitas cognoscitur.

Debilitas uero iuncturarum recipientium, si naturalis est cognoscitur ex mala figura & reliquis speciebus malę compositionis quę sequitur ipsam malam complexionem. Et ex parte parentum, quia similiter passi fuerunt. Si uero accidentalis cognoscitur ex casu, percussione aut alia aegritudine quę p̄cessit.

Multitudo materię aut malitia cognoscitur ex signis repletionis aut cacochymię perquirenda secunda primi.

Latitudo uiarum cognoscitur ex amplitudine uenarum, crassitiā & ipsarum inflationē si manifestę sint. Si uero occultę, ex frequenti ipsarum iuncturarum passione. Causę primitiue seipsas ostendunt. Tempora dolorum iuncturarum si ab una pendeat materia non habente nouas effusiones facile cognoscitur. Si uero materię sint diuersę nouas recipientes effusiones confunduntur neque ipsorum potest esse certa cognitio.

Dolores iuncturarum, si per resolutionem terminentur dolor paulatim decreſcendo procedit, neq̄ remanet durities aut callositas in iuncturis, neq̄ impedimentum in operationibus.

Oppositum uero contingit si terminentur ad duritiem. Maturatio uero significatur ex multitu-

dine humorum quibus sanguis est admixtus, & ex augmento febris & doloris p̄seuerantis cum duritiā tenſiua prolongata, & cimento omnium accidentium, quę sedantur perfecta maturatione, & loci apparet mollis cum inundatione. Cumque redeunt dolores & punctiones, apostema uult erumpi. Si uero permutetur cognoscitur ex sedatione doloris iuncturę, et ex nocumento membri ad quod permutatur, non tamen decreſcit febris & inquietudo nisi permutetur ad membra ignobilia &c.

Prognostica. Primum Auicennę. Multoties inuiscentur materię inter iuncturas & sunt sicut gypsum & proprię quę crudę sunt. Secundum. Et multoties oritur super iuncturas eorum caro, & proprię inter digitos, quia torquentur digiti, & sit dolor fortis quandoque, licet quantūdoque sedetur & sunt hęc in habentibus complexio nes calidas & secundum plurimum non oritur caro dicta, nisi cum materia est sanguinea, quę est materia illius carnis. Reliqui enim humores, non sunt apti in sanguinem conuerti. Et in his duobus calibus non est ipse curę, sicut nec quando iuncturę iudrantur ut flecti non possint, nō quidem propter multitudinē humoris extendentis, sed propter exaricationē ipsarū aut putrefactionē materię iuxta illud Oui. nē ipsarū aut putrefactionē materię iuxta illud Oui.

Soluere nodosam nescit medicina podagram.

Tertium. Qui incurrit dolores iuncturarum secundum plurimum incipiunt a podagra pollicis pedis.

Quartum. Dolor iuncturarum non hereditarius. Quintum. Curatio dolorum iuncturarum quandoque ducit ad perniciem & proprię cum antiqui sunt, quoniam materia solita fluere ad

iuncturas conuertitur ad membra nobilia.

Sextum. Si succurritur doloribus iuncturarum, in primis cum apparēt est cura facilis quod si confirmetur & consenscant & proprię illi qui generati sunt ex humoribus diuersis non recipiunt curationem.

Septimum. Quando apparent uarię in doloribus, & podagra est eorū sanatio per eas.

Octauum. Dolores iuncturarum aliquando cōmouent febres, aliquando sequuntur eas.

Nonum. Arterica cum curatur secundum plurimum non redit, oppositum est de alijs doloribus iuncturarum. Nam licet curen-

tur redeunt & proprię podagrę. Decimum. Dolores iuncturarum quandoque ducunt ad mortem, & proprię cum antiquantur & sunt continui, quoniam

excitant febres continuas ex quibus simul cum doloribus corpus excitat, & tabescit.

Vndecimum. Habentibus dolores iuncturarū prolongatur ostēscit testiculorum.

Duodecimum. Podagra cholerica quandoque attrahit mortem subitam, & proprię apud regimen plurimum, id est, sollicitudinem in re

percutiendo & inſrigidando propter conuersionem materię ad mēbra nobilia.

Decimumtertium. Tabescit mēbrum illud in cuius iunctura dolor multum prolongatur & proprię quando dislocatur, tū

propter prohibitionem a motu, secundo quia debilitatur ex dolore, tertio quia mucilagines obrundunt

calorem, & quarto propter dolorem & dislocationem clauditur uia

transitus nutrimenti ad mēbra

&c.

Quum

Qum in iuncturis fuerit dolor & apostema, & locus cum tangitur fuerit tactu calidus, & color rubeus, æger si dolet in dextro pede ex dextra manu, & in sinistro ex sinistra est phlebotomandus. Et locus ex hoc medicamine est leniendus. Epithima. Recipe ros. rub. sandali, faufel, sief memithe, bol. armen. opij omnium partes æquales ex istis in aqua & aceto dissolutis fiat epithima, psellum quoque aceto infusum in charta missum de panno superponatur & cum tepuerit mutetur, & loco eius aliud superponatur. Venter præterea ex apozemate mirobolan. & hermodactil. solvatur. Apozema mirobolan. cum hermodactil. Recipe, mirobolanorum citrinorum, drachmas quindecim, pulueris turbiti fricati, polypodij, amborum ana, drachmas tres, senæ, seminis fumiter. ana drachmas tres, hermodactyli albi, seminis endiuia, seminis apij, rom. omnium ana drachmas duas coquantur in tres libras aquæ, donec ad unam redeant, deinde manibus fricentur & colentur & bibatur cum sacchari taberzet. drachmas decem. Si quis autem apozema fastidiuerit, pilulas istasumat quæ in lecto iacentes surgere et incidere faciunt, & pedibus ambulare.

Pilulæ quæ non ualentes incidere, faciunt surgere. Recipe aloës, drachmam unam, scammonæ quartam scrupulum unum, rosarum rub. tritarum sextam, drachmam unam, hermodactili albi, drach. semis, in formetur ex eis pilulæ quæ erunt dosi. æger uero nutriatur ex cibis frigidis & stipticis, & abstineat a uino & confectionibus quæ ex melle fiunt, & carne.

Cum autem apostematis calor quieuerit, et eius inflammatio ex his quæ calidiorum apo-

stematum resoluunt reliquias curetur.

Quorum unum, Recipe ceram in oleo de lilio resolutam cui admisceatur mucilago fœnugreci et sem. lini, deinde teratur simul donec uniuntur & fiant ex eis epithima.

Hoc capitulum Rasis intitulum de pogadra artetica & sciatica diuiditur in duas partes. In prima ponit curam arteticæ & podagræ. In secunda curam sciaticæ, secunda ibi. Dolor uero qui. Prima in duas, nam in prima curat arteticam calidam, in secunda frigidam, secunda ibi. Cum autem cum dolore.

Prima iterum in duas. Nam in prima docet curare arteticam calidam. In secunda docet ab ipsa preseruare, secunda ibi. In tempore autem. Prima iterum in sex. Nam in prima ponit signa arteticæ. In secunda curat per phlebotomiam. In tertia curat per repercussiuam & doloris sedatiuam. In quarta per resolutiuam. In quinta per dietam. In sexta ponit localia conuenientia post sedationem doloris & inflammationis siue conuenientia a medio status ultra, secunda ibi. Æger si in dextro, tertia ibi. Et locus ex hoc, quarta ibi. Venter uero, quinta ibi. Æger uero nutriatur, sexta ibi. Cum autem apostematis calor.

Quæ dicit in omnibus his partibus nota sunt & ex dictis & dicendis notificabuntur magis. Faufel. i. auellana in dextro frigida & sicca. Sief memithæ fiunt ex succo memithæ inspissato, est autem memithæ herba frigida nature dicta glaucium apud Dioscoridem.

Circa quartam partem nota illius decoctionis esse dosim magnam, & non conuenire hominibus temporis nostri. Est etiam ratione suæ quantitatis multum abhominabilis, sufficeret enim medietas, scilicet sex 3.

Secunda notat ut patet ex simplicibus ipsam conuenire in gutta mixta. Similiter pilularum quas secundo describit sufficeret medietas aut duæ tertiæ. Reliqua nota sunt.

In tempore autem suæ incolumitatis et proprie circa tempus in quo cum ægritudo inuadere consuevit, et quæ maxime in uere assuescat phlebotomia uti & uetris solutione, et ex his quæ cholera expellunt rub. Et a potu uini abstineat, et a comestione eorum quæ ex melle conficiuntur, et a carne. Et sint eius cibaria acet. et stiptica & his similia ex eis quæ infrigidant. Membra autem quæ hanc consueuerunt incurrere passionem minus solito labore pati assuescant, & precipue cum fuerit plenum & uenæ plenæ, et fuerit diu

tudinem extensus per crus usque ad pedes descendit. Et tunc si in complexione domi natus fuerit calor, & in urina tinctura, ex basilica manus eiusdem partis prius minutio facienda est, deinde ex ischiatica.

Si autē agri complexio frigida fuerit, et color fuscus, sæpe prouocandus est uomitus ex apozemate raphani cū syrū. acetoso.

Coxa quoque ac pedes & crus ex oleo, in quo castoreum & euphorbium & styracis sint resoluta inungatur assidue.

Quod si dolor in coxa mansiuus fiat æger ex almuri & nabati, & baurach chysterizetur, & ex enemate acuto quod in cap. de apoplexia nominauimus.

Collyrium quoq; ex cyclamine & colocynthyde factum supponatur, quod eo usq; fieri conuenit donec æger excoriationem incurrat, ex ea enim dum accidit plurimum consequitur sanitas.

Si autem passio inueterauerit sinapi sumatur, & cum fimo columbino eiusdem quantitatis teratur, & ex apozemate ficuum cōficiatur, ex quibus coxæ emplastrum superponatur, quod tam diu dimittatur, donec in loco uesticæ plenæ aqua fiant & scindantur, & cum fluat aqua quæ in eis est euaporetur locus cum aqua calida. Deinde æger per aliquod dies quiescere dimittatur. Et si nondum sanitati restitutus fuerit ad hanc eandem curam redeundum est. Quod si ægritudo ualde mansiua fuerit & longi temporis, & timetur ne uertebrium resiliat, aut egressum fuerit, locus ex instrumento quod rotæ assimilatur cauterizandus est, et intendatur cum cottura, ut super caput anchæ, aut coxæ principium ponatur. Huius tamen rei sermocinatio istius nostri operis metas transcendit.

Taliter præterea patientes tempore sospitatis uomere cōsueuerint, et soluere uen-

trem et regimē subtiliare, et a cibis crassis et frequenti ebrietate abstinerere.

In hac parte agēs de dolore ischiatico, pri^o ponit regimē curatiuū, secundo præseruatiuū, secunda ibi: Patiens in tēpore sanitatis. Pri^a in duas. In pri^a curat dolorē ischiaticū in parte aut totaliter pendente a sang. In secunda parte curat ipsum a phlegmate, & humoribus frigidis pendente, secunda ibi. Si autē æger.

Quæ dicit in prima parte nota sunt. Fit enim prima phlebotomia ad euacuandum et diuertendum secunda uero ad eradicandum.

Similiter quæ dicit in secunda parte satis nota sunt. Primo enim prouocat uomitum cum decoctione raphani quæ debet esse circa 3. iiii. cum 3. duabus syrū pi acetosi mellini ad euacuandum & digerendum.

Secundo ungit totam partem dolentem cum unctione calida & sicca fere usque ad quartum gradum notabiliter resoluente. Tercio dysterizat dolore existente fixo in ancha ex enemate posito in capitulo de apoplexia cui admiscet almuri, id est, fallamentum, nabati, id est, illius regionis, & Baurach, id est, speciem salis quam non habemus: sed loco eius utimur sale nitro aut falgemma. Quarto facit suppositorium ex cyclamine, id est, pane porcino & colocynthyde, & potest fieri secundum hunc modū, fiat suppositorium ex cyclamine in forma communi & inuoluatur cum colocynthyde puluerizata & suspensum cum filo superponatur, quod multotiens iterādum est, & aliquando dysteri dictum statim, donec fiat excoriatio in extremitate intestini recti, hoc enim modo aliquando materia ex iunctura anchæ eradicatur. Quinto his non sufficientibus ponit super iuncturam anchæ uesticatorium factum ex sinapi & fimo columbino ana. adinuicem incorporatis cum decoctione ficuum, quod debet super loco dimitti tanto tempore quod locus uesticetur ut puta 12. horis, & postea uesticæ rumpantur, & si consolidentur, iterum uesticatio replicetur, donec materia ex profunditate iuncturæ eradicetur, ad conseruandum autem locum ita excoriatum superponimus caulem ad ignem mortificatum, butyro aut axungia iunctum, his autem non sufficientibus locus est cauterizandus, caput anchæ, id est, super iunctura uertebri coxæ cum pixidæ anchæ, quæ uertebrium ingreditur quæ apparet in parte syluestri cum instrumento rotæ simili, id est, figuræ sphericæ, cuius formam hic uides, aliquando facimus cum cauterio triangulato huius figuræ. Cætera quæ dicit nota sunt.

Regimen doloris iuncturarum est triplex. Præseruatiuum quod debetur his qui parati sunt ad ipsum. Curatiuum, quod debetur patientibus ipsum. Tercium est resumptiuum quod debetur neuritis conualescentiæ ex ipsis doloribus iuncturarum. Primum regimen scilicet præseruatiuum tres habet intentiones, prima ut materia non generetur. Secunda ut generata educatur. Tertia ut membra tam mitentia quam recipientia rectificentur.

Prima completur cum debito regimine sex rerū non naturalium & annexorum. Aër declinet ad sicum temperie actiuarum aut prope temperiem, uerum in paratis ad dolores frigidos parū declinet ad calidum, Sed in paratis ad calidos sit temperatus aut

leuissime declinās ad frigidum, sunt enim ceteris par-
tibus, magis apti lēdi ab aēie frigidā quam oportet
& a calidiori quam oportet. Videtur excessus aē-
ris tam in caliditate quam in frigiditate, sed maxime
in humiditate, quapropter habitet in solari, non in
loco terreno humido. Et uident aērem uentosum &
pluuiosum, sint taliter induti & calceati, ut neq; aestu
ent, neque frigeant magis tamen caleant quam frige-
ant. Videntur calciamenta stricta dolorem in-
ferentia. Nec utatur calopodijs nec alijs huius-
modi quibus pedes sui multum laborent aut con-
torqueantur.

Somnus sit a 6. horis usque ad 8. & nocturnus.
Meridianus uitāduus est, nisi somnum nocturnū omi-
ferit. Et si non potest abstinere, dormiat per mediam
horam a medio Maij, usque ad medium Augusti. Et iu-
stra posse dormiat super parte opposita parti quę pa-
ti cōsuevit, quapropter si dolores cōsueuerunt in iun-
cturis lateris dextri dormiat super sinistro & cōtra, si
uero in iuncturis utriusque lateris dormiat supinus, si
uero in iuncturis dorsi dormiat resupinus, id est cū fa-
cie deorsum, aut super altero laterum.

Procurentur euacuaciones oēs a natura institutę,
imō etiam non naturales si fuerint diu consuetae. In-
ter cetera lenitas uentris, & mictus plurimus, & pro-
prie uirgine crassę turbidę preseruant a doloribus iun-
cturarum. Vitetur coitus nisi natura multum
stimulante.

Nimia deambulatio, statio, & pedum suspensio
lædit iuncturas, sicut eōtrario nimia quies parat do-
lores iuncturarū. Accidentia animi, passionēs animi
excessiue corrumpentes digestionem uitāda sunt, sicut
tristitia timor desperatio, ira, longū studium & simi-
lia. Spes uero, moderatum gaudium cōuenit, panis
sit debite conditionatus.

Potus sit uinū nigrum stipticū aliquid acce, aut
saporis medię, per torcular expressum, bene cla-
rum, pauciferum aut medię uinositatis unius anni rā-
tum, debite limphatum, cum aqua bene conditiona-
ta. Debet aut magis limphari in paratis ad guttā cali-
dam. Minus in paratis ad guttā frigidam. Medio mo-
do in paratis ad mixtam.

Ralis tamen in gutta frigida concedit uinum ue-
tustipurum, sed in gutta notabiliter calida existimo
præstantiorem potum esse aquam & proprie saccha-
ratam, nisi timeatur læsio stomachi & membrorum
naturalium, in quo casu parum uini cum aqua mi-
sceatur. Sed in mixta aqua saccharata infusionis fo-
liorum saluie, aut uinum suprascriptum bene lym-
phatum cum aqua suprascripta, sed in frigida aqua
paucioris aut pluris mellis secundum exigentiā tem-
poris & complexionis & consuetudinis. Salata bis
in hebdomada potest uti accipiendo ex ea duo aut
tres bolos in gutta & tempore frigidis. Salua cum
boragine, modico rosamarinī & modico mentę si-
mul mixtis. Item capparibus. Sed tempore medio,
cichorea cum modico menthę & salua. Sed tem-
pore calido endiua, cichorea, lactuca, quę condian-
tur cum acresta aut uino granat. aut aceto modicę
acuitatis, & cum sacch. possunt dulcorari. Utatur tñ
calidis aut frig. secundum exigentiā temporis & gut-
tę & aliarum circumstantiarum. Fercula in gutta cali-
da sint paniciū & milium. Item fercula ex ouis &

acresta, & ex herbis endiua, portulaca, spinachia,
acetosa, cucurbita, & proprie cum acresta condita.
Sed in frigida, rizum, far. Item fercula quę sunt ex
ouis aut pane secundum cōmunem usum, ius cicerū,
& cicera ipsa fracta & optime cocta aliquādo conue-
niunt. Item saluata radix enulę triturrata cū uitis
ouorum cocta. In frigida cauenda sunt brodiaia in
frequenti usu, & in mixta conueniunt amygdalata,
blites cum boragine.

Carnes conuenientes sunt pulli cuiuscunque ge-
neris, non superflue impingui. Item columbi uola-
re incipientes & proprie filuefres, turtures, turdi, fice-
dula, aues parue, degentes in arboribus & in pratis
præter passerēs, perdices, phasianī, franquillini. Sed
aues aquaticę omnino uitentur, & ex quadrupedi-
bus conueniunt hœdi, capreoli, cuniculi, lepores iu-
uenes, uituli castrati annuales, carnes erici porcini
sunt proprię, & pedes horum animalium conueni-
unt cum proprietate sua, sed sint optime cocti.
In gutta tamen calida, uitanda sunt carnes in super-
fluo usu, & hæ carnes in prandio comedantur elixę,
in coctis assatę, uitanda sunt carnes antiquę salatę,
licet in gutta frigida aliquid carniū salicarum con-
cedi possit.

Pisces uitandi sunt, sed ex minus nocuis sunt pi-
sces parui, petrosi, luti, strilei, cauedani, sardens, rema-
li. Et ex marinis, sardellę, angustigulę, auratę, passe-
res & similes, facili digestionis, & boni chymi pau-
carum superfluitatum.

Oua cōueniunt secundum omnem modum ad-
ministrationis dummodo sint mollia, nō per deco-
indurata. Lac & lacticia uitanda sunt. Oleum et bu-
tiritum sint in raro usu. Ex saporibus conueniunt & simi-
num granatorum, acresta, uinum crispinum & simi-
lia, uitetur acetum, sapor ex amygdalis cum acresta pi-
optime conuenit, item ex amygdalis cum acresta pi-
perata in gutta frigida & tempore frigido, similiter,
sapo & sinapi. Ex fructibus conueniunt passulę, auel-
lanę, ficus siccę, fistica in causa frigida. Sed in calida
granata, pira, citonia & proprię cocta & pineę præ-
paratę conueniunt in mixta.

Canones obseruandi in cibando ut nō comedat
nisi præcedētis cibi digestionē celebrata.

Surgat a mensa cum reliquis famis, non multi-
plicet cibaria in mensa una. Ieiunet bis in hebdoma-
da, & omnibus diebus secundum legem præceptis, et
proprie parati ad guttam frigidam aut mixtam, &
notabiliter comedat anteq; bibat. Secunda intentio
scilicet euacuatio materię iam genitę completur cū
phlebotomia. Si sanguis solus peccauerit aut aliq; hu-
mores cū sang. sang. dñante, aut et si quę proportio-
nabiliter peccauerint, & hauriat q̄ritas sang. secundū
exigentiam uirtutis & repletionis & phlebotome-
tur in uere, aut ante tempus in quo gutta accidere
consuevit.

Quod si consueuerit accidere in aliqua iunctura
pedum, sicut est secundum plurimum phlebotomen-
tur basilicę ambę si in ambobus pedibus accidere
consuevit, aut si tantum in uno basilica eiusdem late-
ris, & proprie si epar aut splen miserit materiam.
Quod si cerebrum mitteret materiam præstanti-
us esset phlebotomare communem, ut simul deferui-
ret membro mittenti & recipienti, quod si accide-
re consuevit.

recoſiuit in ambabus manibus phlebotomeſ utraque ſaphena, & ſi in una manu tantū phlebotometur ſaphena eiſdem lateris aut baſilica lateris cōtrarij, & ſi mittens eſſet cerebrum communis manus cōtrarij, & multo plus debemus eſſe audaciores, & promptiores ad phlebotomandum in regimine præſeruatiuo quam curatiuo. Si uerò alij humores fuerint in cauſa abſque peccato ſanguinis, aut ſanguine multum ſubdominante euacuentur ſecundum ipſorum exigentiā. Cholera quidem cum caſſia tracta, cum decoctione mirabolanorum citrinorum, prunorum & tamarindorum. Cum qua ſi uenter fuerit ſtipiticus miſceatur drac. i. aut quantum tibi uideatur electuarij ſuc. roſa. aut exhibeatur ſolum electuarium ſucci roſarum à drac. z. uſque ad. 3. cum decoctione ſupraſcripta. Quod ſi maluerit pilulas, exhibeantur pilulæ de hermodactylis minores circa dra. i. Præſtantius tamen eſt ut ſolutiuis exoluentibus præmittantur diſgiſtia. Propterea ante digeſtionem ſufficeret aloës loti, dra. s. mirabolanorum citrinorum, 3. i. pilularum minorum de hermodactylis, 3. s. cum aqua enuero in cauſa fuerit phlegma, exhibeantur pilulæ de hermodactylis maiores circa dra. i. aut. 3. 4. & ſi maluerit medicinam liquidam, exhibeatur electuarium indum, circa dra. 4. præcedentibus tamen debitis digeſtionibus ſecundum materiæ exigentiā, & membrorum tam mittentium quā recipientium, euacuantur quoque huiusmodi materiæ propriè phlegmaticæ cum diureticis & prouocantibus ſudorem.

Electuarium boni ſaporis ſoluens phlegma ex iuncturis hermodactylorum. dra. i. mirabo. citrino. zing. ana. 3. i. miuæ citoniorum, quantum ſuffi. fiat electuarium eſt doſis una. Si autem uolueris ſoluere phlegma & colicam, his adde diagridij, gran. i. z. eſt pro duabus uicibus. Si autè opus ſit ſoluere phlegma, cholera & melancholiam, his adde, ſenæ. poly. podij. ana. 3. z. & ſunt tres doſes, & adde ſupraſcriptis, 3. s. zing. & erit conueniens in præſeruando & curando, bonum tamen eſt ut pro conſeruatione fiat huiusmodi euacuationes integre ex ſuis digeſtiuis, ſolutiuis ſecundum exigentiā materiæ.

Tertia intentio ſcilicet mēbrorum rectificatio completur ut infra. Membra namque mittentia debent regi primo euacuando ab eis ſuperflua, propterea euacuationes de quibus ſupra debet reſpicere tam mēbra mittentia quam recipientia. Secundo debent eorum diſcrasiam corrigi cum interius & exterius applicitis ſecundum exigentiā. Et tertio uirtutes eorum roboraſſe intentiones cum eiſdem perficiendæ ſunt qui ſimul alterant membrorum diſcrasiam & cōfortant.

Membra autem recipientia confortant cum exterius applicitis ex quibus ſunt thermæ aluminosæ, & ſi fuerint ſimul aluminosæ, ferreæ, falſæ, multum proderunt. Secundum eſt lotio eorum cum aqua ſalſa neque frigida, neque multum calida. Tertium eſt calcillatione frequenter tenere pedes. Quartum flores amygdalorum, mirti, camomilæ, meliloti. roſe. & propriè eorum decoctio confortat iuncturas. Et ſi fuerit paratus ad guttas frigidas ponatur cum eis aliquid ſalis aut aluminis, aut utriuſque. Ex ſumptis eſt ſaluia pa-

rum cocta, item nux indica, item acorus, item edera terreſtris, & dicitur uerbena portata præſeruat iuncturas pedum à doloribus. Secundum regimen, ſcilicet curatiuum tripartitur. Primum debetur cauſæ antecedenti. Secundum cauſæ coniunctæ. Tertiū eſt commune utrique curans accidentia & ordinans debitum regimen ſecundum exigentiā intentionū præcedentium. Primum regimen habet tres intentiones. Prima eſt euacuatio. Secūda diuerſio. Tertia fluxus interceptio. Prima autem intentio ſcilicet euacuatio completur cum phlebotomia à qua inchoandum eſt, ſi ſolus ſanguis fuerit in cauſa, aut alij humores peccent cum ſanguine dominante. Deinde tertio ſi æqua proportionabiliter creuerint quæ phlebotomia fiat ex parte contraria, ſicut dictum fuit in regimine præſeruatiuo ad quod recurre. Si uerò alij humores peccent cum ſanguine ſubdominante, fiat primo humorum dominantium euacuatio. Deinde ſecondata agitatione & fluxu fiat phlebotomia ex parte cōtraria per unam diametrum, hauriēdo tamen minus ex ſanguine quam in caſibus præcedentibus. Et hanc credo fuiſſe opiniōnem Auicē, qui in phlebotomia uidetur ambiguus, ſi uerò alij humores peccauerint abſque ſanguine ſoli euacuentur. Sed eſt notandum quod ſi nauſeauerit, uomitus à principio poteſt concedi cum facilibus, ſolutio autem uentris minime, niſi cum clyſteribus lenitiuis. Timor enim eſt in admiſtratione lenitiuorum ſolutiuorum ne materiæ quæ ſunt in motu ad iuncturas commote à medicina ſolente amplius præcipitentur ad iuncturas, & propriæ ad iuncturas pedum. Propterea præmittantur digeſtiua ſecundum exigentiā materiæ ſicut materia exiſtente phlegmatica mel. roſ. cum aqua ſaluiaæ aut hydromel cum ſaluia bullitū. Et materia exiſtente cholerica, iulep roſ. cum aqua endiuia, & in melancholia ſyrup. de epithymo, cum aqua bugloſſe immixta, hæc miſceantur ſecundum exigentiā, poſtea materiæ digeſtæ euacuentur cum ſolutiuis ſuperius deſcriptis in regimine præſeruatiuo. Diuertatur autè materia iuxta ſecundam intentionem huius primi regiminis curatiui cum clyſteribus, in quibus hierapicra, benediſta, electuarium indum, electuarium de ſucco roſa. diaſene, conſectio hamech & ſimilia, item diuertatur materia cum uomitiuis, & propriæ in cōſuetis, & facile uomentibus. Eligantur autem uomitiua ex ſuperius deſcriptis in ægritudinibus ſtomachi, & de his ſtatim dicitur in cura iſchiaticæ, leue uomituum eſt aqua tepida decoctionis raphani & ſemi. aneti. 3. 4. olei acuti odoris & guſtus, 3. z. aceti. 3. i. & tertio diuertatur cum prouocantibus urinam & ſudorem.

Sed hæc non fiant niſi materia notabiliter minorata, leue prouocatiuum urinæ, eſt aqua decoctionis, aſparagi, cicero rubeorum & ſimilium.

Sudorem autem prouocant potus aquæ calidæ, cū pauco uino ſubtili & coopertura ſufficienti. Retentio etiā anhelitus & balneum æreum.

Interſcipitur autem fluxus materiæ iuxta tertiam intentionem huius primi regiminis dupliciter. Primo cum reperculliuis applicitis nō ſolum in loco dolente, ſed etiam ſupra cum debita ligatura, quæ tamen non ſit multum ſtriſta, ſed ſit tantæ ſtriſturæ ut confortet & reſperciat, & propterea ſit magis ſtriſta in iunctura, ita tamen ut dolorem non inferat, & quan-

to magis recedit à iunctura uersus superius magis relaxetur. Repercussiva in materia calida leuia sunt oleū ros. omphacini, id est, factū ex oliuis immaturis, & ros. immaturis, itē oleū ros. bulitū cum quarta parte aceti ad aceti consumptionem. Et fortius est absq; consumptione aceti bene cū eo incorporati. Et fortius est ut cum aquis aut succis endiuiae, plantaginis, solatri rosarū & similibus misceatur quarta pars aceti, & modicum sandalorum. Aut fiat defensuum in forma communi ex oleo rosarum, aceto, & bolo armeni. Quod si mucilago plūij, albumē oui, oleum rosarum, lotum cum aqua plantaginis, & aliquid sandalorum adinuicem misceantur erit eticax in materia cholerica. Item sandali rub. boli armeni, sief. methae, psidia, ferruginis, opij, ana, confice cum aqua rosarum, aut succo coriandri pauco aceti, & repercutiendo sedant dolorem. Et in forma emplastrum, est huiusmodi. 2. rosarum unc. 1. farinae hordei, unc. 1. s. farinae fabarum, unc. 3. misceantur cum olei rosa. par tibus tribus, & aceti parte una. Sed in materia frigida 2. olei de spica unc. 2. bulliat cum unc. 2. decoctionis gallarum ad eius consumptionem postea misceatur cum eo styrcis, mirrhe, aloēs, acarij, ana, drac. 1. ceræ modicum, acēt. quantum sufficit fiat unctio mollis. Et tu utere ex his quæ tuo proposito magis deseruiūt. Hæc tamen simul complent hanc intentionem & pri mam secundi regiminis curatiui. Memorandum ta men quod aliquæ sunt iuncturæ in quibus leuia aut nulla competunt repercussiva sicut iuncturæ humeri, iuncturæ mandibulæ & spondilium ne materia repat ad principalia membra aut nobilia quibus appropinquat & iunctura anchæ ne materia in profun do retineatur, in reliquis audacius possumus repercu tere. Intercepitur secundo materia cum uesicatorijs & causticis. Pro quo est sciendum, quod uesicatoria & caustica aliquando ponuntur ratione materiæ fluen tis ad interceptum eius fluxum, aliquando ratio ne materiæ iam fluxa ad eradicandum ipsam ex iun ctura. Si primo modo debet fieri supra iuncturam maxime in ea parte per quam materia fluit ad iunctu ram. Si uero fiat ratione materiæ iam fluxæ, & in iun ctura collectæ fiat infra iuncturam aut supra iunctu ram, exempli gratia in dolore humeri ratione mate riæ fluentis si materia à cerebro communicetur, aut ex parte & membris inferioribus per uenam spatularū, cuius signum est præter alia signa, quia dolor incipit, & est magis in parte superiori humeri, uesicetur, aut cauterizetur locus qui uidetur magis conueniens in spatula distante ab humero per tres unc. & eligatur maxime locus per quem creditur transire materia. Si uero materia comunicetur humero per uenam assella rem, quod raro accidit, cauterizetur in parte sylue stri prope assellam distante à iunctura per unc. 3. Sed ratione materiæ iam fluxæ fiat in adiutorio distante à iunctura per tres unc. aut circa. Si uero adesset dislo catio propter humiditatem lubricantē, reducta prius iunctura ad statum suum modo possibili, fiat cauteri zatio cum instrumento triangulato, cuius hæc est fi gura, in iunctura humeri penetrando solam cutim. Si uero fiat cauterizatio, aut uesicatio ratione mate riæ fluentis & fluxæ, fiat in utrisque locis, & eodem modo in cæteris iuncturis. Similiter fiat in dolore cubiti ratione materiæ fluentis in parte superiori &

ratione materiæ fluxæ in parte inferiori. Eodem mo do in dolore rasetæ. Et in omnibus his sola cutis pe netranda est, cauendo ne læsio neruis aut chordis co munitur, propterea tutius est cauteriū actuale aut uesicatio. Si uero dolor sit in iunctura mandibulæ fiat post aurem eiusdem lateris ratione materiæ fluen tis aut sub mento ratione materiæ fluxæ. Si uero in iuncturis colli ratione fluentis, fiat in occipito, sed ra tione fluxæ in principio dorfi & sine colli distanter in spondilibus utraque per. 2. unc. Similiter fiat in re liquis doloribus dorfi & lumborum. Sed in dolore ischiatico tam ratione materiæ fluentis quam fluxæ, fiat uesicatio & cauterizatio super iunctura in parte syluestri cum cauterio triangulato aut circulari pene trando totam cutim, materia enim fluit ad hanc iun cturam per uenas intrinsecas ramificatas à uena chyli nec propter carnositatem multum est dubium deno cumeto neruorum aut chordarum. Sed in dolore ge nu ratione materiæ fluentis cauterizetur super genu alterius partis quam per. 3. unc. ut uideatur cauteriza tio super extremitatibus lacertorum. Sed ratione materiæ fluxæ fiat infra genu in fontanella distanter à chordis & lacertis. Sed in dolore iuncturæ pedis, fiat supra pedem in parte syluestri aut domestica ubi ap pareret magnus dolor. Sed secundum plurimū in par te syluestri ratione materiæ fluentis, sed ratione fluxæ sub clauicula pedis. In dolore uero digitorum For dis fiat cauterizatio aut uesicatio in collo pedis. For ma autem cauteriorum tales sunt, in iunctura humeri eligatur cauterium oliuale siue fiat ratione materiæ fluentis siue fluxæ, & fiat in ea parte quæ superius me morata est. Et quando queratione materiæ fluentis facimus supra iuncturam in duobus locis, si materia fluat per duas uias suprascriptas, similiter ratione fluxæ facimus infra iuncturam in duobus locis, scilicet in tēpore domestica & syluestri, cum est difficilis era dicationis. Si uero ad sit dislocatio propter humiditatem lubricantem, eligatur triangulatum oliuale, & ponatur super iunctura in parte syluestri sicut dictum fuit, similiter in cubito eligatur oliuale, & fiat uer di ctum est ratione materiæ fluentis super iuncturam per tres unc. sed ratione fluxæ parum infra iuncturam & apud quosdam ratione materiæ fluentis fiat supra iuncturam in duobus locis, scilicet in parte domestica iuncturam in duobus locis, quando materia fluit per utranq; par ca & syluestri, quando materia fluit infra iun tem. Similiter ratione fluxæ, fiat parum infra iun cturam in duobus locis, quando materia est difficilis eradicationis. Sed in iunctura manus, eligatur cau terium punctuale secundum Albuchasim, & fiat in iunctura manus in quatuor locis, sed si uolueris solū facere in uno loco aut duobus supra iuncturam ratio ne fluentis, aut parum infra in uno aut in duobus ra tione fluxæ eligatur oliuale, sed in dolore digitorum eligatur punctuale, in parte pectinis correspondente digito illi, aut in rasetæ ratione fluentis si fuerit in pol lice, sed ratione fluxæ parum infra iuncturam, in do lore mandibulæ eligatur oliuale, & fiat ratione fluen tis & fluxæ, sicut dictum fuit superius, licet foret ratio ne fluxæ melius esset facere infra iuncturam, in do lore spondilium eligatur oliuale, & fiat ut dictum est licet apud Albuchasim debeat eligi punctuale, & de bent fieri tres lineæ secundum latum, ubi est dolor, & in qualibet linea facere quinque cauteria aut plura se cundum

adhibet. ut non
multum repromiss.

in cautio

adhibet. ut non
multum repromiss.

eundem magnitudinem doloris & tolerantiam uirtutis, sed prius signetur lineæ & puncta ubi debent fieri. In iunctura anchæ utantur triplici cauterio, unum est habens figuram sphericam, cuius diameter est medietas palmi, & non habet alias eminentias, secundum est simile huic, & habet quinque eminentias oliuales, aut ad modum ossium dactylorum, tertium habet solū tres, & homine iacere super latere opposito taliter, ut bene aparet acum anchæ cauterizetur, & per medietatem palmi intelligo medietatem palmæ manus. Et apud quosdam sunt quatuor cauteria, tria in lateribus æque distantia, tria secundum formam trianguli, quartum in medio quidam autem cauterizant in ilchiatica non solum ancham, sed etiam loca distantia ad quæ descendit dolor. Credo solum cauterizationem anchæ sufficere cum ibi sit doloris radix, in dolore genu eligatur oliuale, & fiat, ut dictum est superius, neque laudo quod super iunctura genu ponatur, nisi ualde superficialiter, & fiat quando materia non possit aliter eradicatori in pluribus locis secundum exigentiam, sed in iunctura pedis eligatur oliuale & fiat ut dictum est, sed in iuncturis digitorum pedis fiat, ut dictum est in digitis manus. Canones obseruandi in cauterizatione sunt. Primus, non fiat nisi cum alia remedia non conuulerint, propter debilitatem iuncturæ, latitudinem uiarum aut continuum fluxum materię, aut multam materiam existentem in iunctura. Secundus, ut fiat potius cum cauterio actuali quam potenciali, quia magis confortat nec communicat nocumentum paribus uicinis. Tertius, ut eligantur cauteria idonea & diuersa secundum exigentiam locorum. Quartus, non penetret ultra cutim. Quintus, ut tempore cauterizationis tueantur partes circumstantes cum succis & aquis frigidis, & similibus. Sextus, ut eligatur iuxta posse tempus & hora temperatio non superflue calida aut frigida. Septimus, ut infirmus tempore operationis statuatur & quiescat in situ magis conueniente. Octauus, quod præcedat loci stupefactio in ualde sensitiuis. Nonus, ut locus conseruetur ulceratus per longum tempus, puta per quadraginta dies aut cum sphaera cerea immissa in uulnere, aut simili, aut cum folio hederæ, aut folio caulis ad ignem aliquale calfacto, & postea axungia inuncto, aut cum cepæ trito cum melle. Decimus, ut clauso foramine postea per interualla fiant euacuationes & phlebotomia secundum materię exigentiam, ne materia soluta fluere, ad iuncturas, postea retenta in membris superioribus nobilibus faciat apostema aut febres, & fiat in causa frigida aut mixta, non autem in calida. Duodecimus, non fiat cauterium cum materia est indurata, aut gypseata in iunctura, nec quando est exsiccata & marasmata, sed fiat quando adest multitudo materię, aut mollities ligamentorum. Decimus tertius, prius signetur locus, postea cauterium supponatur. Secundum regimen curatiuum, quod debetur causæ coniunctæ exigit in principio repercussiuam mixta cum resolutiuis, sed deinceps resolutiuam puram. Quæ autem sint repercussiuæ conuenientia in principio possunt patere ex regimine præcedente. Sed resolutiuæ conuenientia in materia frigida sunt huiusmodi. Primum, si stercoreis bouini calidi, sicut ege-

ritur & dolenti loco superponatur, & est melius pluribus alijs. Hali abbas autem addit cum isto de stercore caprino aliquid cineris caulium ad maiorem resolutionem & consultit ante emplastrationem lauare locum cum aqua decoctionis chamomilæ, meliloti, anethi, maioranæ, centaureæ, & similibus. Aliud Rec. amoniaci, bdellij, styracis, ana. partem unam farinæ foenug. sem. lini, ana. partem mediam, dissoluatur ammoniacum, bdell. styrax, cum uino ueteri, & cum farinis misceatur incorporando cum oleo castino & fiat emplastrum. Aliud Rasis in alman. in cap. proprio ualens ad materiam multam frigidam & in corpore & tempore frigidum. Rec. styrac. liquidæ castorei, euphorbij, mirrhæ, aloës, acatiæ, ana. partes æquales. Ex his cum uino ueteri mixtis fiat epithima. Aliud Dini. Rec. aloës. unc. i. mirrhæ. unc. s. salis. 3. z. croci, drach. i. farinæ lupinorum, furfuris subtilis, añ. unc. z. aquæ cineris quantum sufficit, fiat emplastrum, & in resolutione materię frigidæ ualet aqua ardens, oleum benedictum, & similia. Sed cum crassa resoluatur cauendum est à petrificatione, propterea cum resolutiuis miscenda sunt mollificantia sicut mucilagine maluaui, foenugraci, sem. lini, oleum sesamini, amigdala, dulc. pinguedines, medullæ, & similia, quæ uidentur magis opportuna. Sed resolutiuum in materia calida est huiusmodi. Rec. mucilaginis foenugraci, mucilaginis, sem. lini, ana. unc. s. olei liliorum alborum, unc. i. ceræ quantum sufficit fiat unctio. Et ex his possunt elici conuenientia in augmento, oportet enim repercussiuam misceri cum resolutiuis. Si uero apostema iuncturale tenderet in uiam maturatio nis quod rarissime accidit, adiuuetur cum his quæ cōsueuerunt reliqua apostemata maturare, & si apostema esset difficilis suppurationis aperiatur ante perfectam maturacionem ne putrescant iuncturæ. Sed in materia mixta ad resoluendum. Rec. farinæ, foenugraci, sem. lini, anethi, chamomilæ, ana. drach. 10. bdellij, styracis liquidæ, ammoniaci, galbani, ana. drach. s. olei liliorum quantum sufficit dissolutis gummis fiat emplastrum, item urina cocta cum sale, item succus ebullit inspersus cum oleo rosæ, item ex multis sunt unguenta propria in his casibus sicut de limacijs, de scorpiionibus, de ranis, de uulpe, de uespertilionibus, & similibus, coquendo ea cum aqua salita & pinguedo supernatans referuetur, & cum horum decoctione potest locus epithimari, & postquam epithimatum est & exsiccatum cum pinguedine ungatur, aut horum carnes salitæ ponantur in olla perforata, bene desuper obturata, & alia integra sub ea, & sepeliatur in fumo & distilletur & referuetur. Tertia autem pars huius regiminis curatiui habens duas intentiones, scilicet curationem accidentiū & regimen sex rerum perscitur, ut infra. Duo enim sunt accidentia corrigenda, scilicet doloris intensio, & durities remanens in iuncturis. Dolor sedatur dupliciter. Primo remouendo causam, & de hoc sermo præcessit. Secundo cum anodinis fomentando locum dolentem cum oleo chamomælini, anethino, aut cum decoctione ex floribus chamomilæ, meliloti, sem. lini, maluaui, paritaria, & similibus, & inunctio cum cassia trac. cum aqua rosæ. in principio & cum aqua apij in processu est propria, scilicet conueniens. Et tertio cum stupefactiuis mixtis, cum anodinis, de quibus supra. Vt

Rec.

cis quam extrinsecis. Differunt tamen in quibusdā accidentalibus utputa in doloris extensione. Est enim dolor anchæ dolor fluxus, & in iunctura circumscriptus, sed ischiaticus descendit & extenditur uersus pedem iunctura anchæ non dimissa.

Horum species non sunt nisi quidam modi secundum magis & minus differētes. Est enim quidam fortis clamor, quidam remissus, quidam nouus, quidam antiquus, quidam continuus, quidam interpolatus, quidam cum dislocatione, quidam sine. Et dolor ischiaticus quandoque descendit usque ad coxam, quandoque descendit usque ad genu, & iuncturæ ipsius morum, & quandoque extenditur usque ad pedem & digitos eius impediens fixationem & firmitatem. Descendit autem quandoque per partem domesticam dolore lacertis & nervis illius partis communicato per materiam existentem in uena sapheana ad musculum illius partis refudatē, & quandoque per syluestrem materiam refudante ad lacertos & nervos illius partis à uena ischiatica. Et si materia continetur in concavitate iuncturæ, & sicut est secundum plurimum descendit per syluestrem communicando materiam nervo lato, propterea dolor ischiaticus, frequentius descendit per syluestrem partem quam domesticam, & causa descensus & extensionis doloris non est nisi multitudo materię ubicunque contenta.

Causæ autem sunt duplices corporæ & primitivæ, sed corporæ duplices, per cōmunitatem & propriam. Propriè quidem sunt secundum plures & sunt alterantes & extendentes ipsius iuncturæ partes & sunt secundum plures, phlegmaticæ crudæ & uento sæ, deinde mixtæ, deinde sang. raro melan. & rarius cholæ. Sed ex cōmunitate secundum plures, à matrice & ex permutatione materię ipsius ad anchas quibus alligatur & adhæret iuxta Hippocrata, 5. particula. Aphorif. Aphorif. 46. Si matrix in uertebro posita saniem fecerit, necesse est commotum fieri, & apud Auicenn. multoties permutatur à doloribus matricis, chronicis & remanentibus longo tempore, ita ut sint decem menses. Causæ primitivæ sunt casus, per cūssio, sessio, super re dura, equitatio longa, insueta, saltus, & fortis ambulatio.

Signa causarum materialium propriarum ex generalibus signis superius positis cōprehendi possunt. Sunt tamen difficilius inuestigationis quam signa causarum propriarum dolorum aliarum iuncturarum propter materię profunditatem, & maiorem distantiam à sensu, coniecturari tamen possunt à qualitàte doloris ab exeuntibus à iuuantibus & nocentibus, & à quibuscunque circumstantijs, sicut complete, ætate, sexu, tempore, anni, regimine præcedente, & similibus. Signa quòd sit per cōmunitatem & maxime à matrice est, quia adest ipsius matricis ægritudo, & quia si permutatur, deficit ægritudo matricis & succedit ipse dolor. Causæ primitivæ seipsas ostendunt.

Prognostica. Primum est Aphorif. 60. sextæ particulæ. Quibuscunque à coxendicium dolore diu molestatis coxa resistit foras, his tabescit crus excludicāt cilaginosum remolliens ligamenta, faciens facilem dislocationem, & facile reingressum coxe in pixedem. Secundum, dolor iuncturæ ischiæ est de uehemen-

tioribus doloribus iuncturarum, & difficilius curationis quàm dolores aliarum iuncturarum propter loci profunditatem & materię multitudinem, quæ attrahitur ad ipsum à toto corpore, licet dolores humeri & spondilium sint periculosiores propter propinquitatem ad membra nobilia. Tertium, dolor ischiaticus & uniuerfaliter omnis dolor podagricus, licet curetur & materię eradicentur facile redit propter situm membri, & distantiam à membris nobilibus. E contra est in doloribus chiragricis & iuncturarum superiorum. Quartum. Cum dolor ischiaticus prolongatur extenuatur coxa & tibia. Quintum. Cum apostema anchæ exituratur propter sui profunditatem, quandoque ducit ad mortem. Sextum. Si habenti dolore anchæ appareat rubedo uehemens quantitate trium digitorum non faciens ei dolorem & accidit ei pruritus uehemens, & deyderat olera, morietur in .25. diebus. Rubedo nanque uehemens non faciens dolorem significat choleram symptomatice & diminute expulsum ad membri dolentis superficiem, propterea facit quandam pruritum sui acuitate, & deyderat olera frig. scilicet dispositioni suæ præternaturali contraria. Morietur autem in 25. qui est ferè medius terminus tropicorum materia conuersa ad membra nobilia. Septimum. Iunctura ischiæ rarissime lapidescit ad induratur propter amplitudinem uacuitatis iuncturæ & situm profundum & multitudinem humiditatis eius in comparatione ad alias iuncturas.

Cura doloris ischiatici similis est curæ doloris aliarum iuncturarum quantum ad præseruationem & resumptionem. Differens tamen à cura aliorum in duobus, scilicet in administratione percutissuorum quæ debent esse leuia aut nulla, ne materiam in profundo iuncturæ detineant aut coarctent, & sic dolorem augeant, & materiam ineptam resolutioni faciāt aut fortè etiam ad membra nobilia repellant, sed si ea approximare decreueris, quia fortè materia uidetur subtilis aut cal. aut saltem calida admixta sint talia ut confortent locum & materiam uenientem refrenent, sed non repellant, nec in membro coarctent. Similiter resolutiua & attractiua de profundo ad cutis superficiem oportet esse fortiora & leptomeris subtilitæ propter profunditatem materię. Regimen quoque præseruatiuum colligatur ex his quæ dicta sunt in regimine præseruatiuo dolorum aliarum iuncturarum, & similiter regimen resumptiuum. Sed regimen curatiuum quantum ad primam intentionem, quæ est euacuatio, completur cum phlebotomia ex basilica eiusdem lateris si sanguis fuit in causa, aut alij humores peccauerint cum sanguine. Postea alij humores euacuentur secundum exigentiam euacuationibus integratis ex digestiuis & eradicatiuis etiam iteratis. Si tamen nausearet aut facile uomeret uomitiua, saltem in principio essent conuenientiora quàm solutiua diuertendo & euacuando, & ante digestionem leuiora competerēt, post digestionem fortiora.

Ex leuioribus est decoctio raphani. 3. 4. cum unc. 2. oximellis, & fortius est si loco decoctionis accipiat succus eius. Similiter aquæ tepidæ, unc. 4. cū flore & semine genestæ, drach. 2. & fortius his est succus raphani, in quo fustes ellebori steterint infusi per diem & noctem, Et fortius omnibus est si ponatur

scupulum semis essebori cum uncis duabus oximellis, & cum uncis quatuor aquae tepidae. Digestiua sunt haec. Recipe mellis rosae, syrupus de eupatorio, ana. drachmas sex, aquae saluae uncias duas aquae iuniperi, unciam unam misce, & fortius est hoc. Recipe syrupus de calamentho, syrupus de stoechados, mellis rosa. ana. unciam semis aquae saluae, uncias duas, aquae iuniperi unciam unam misce. Et fortius est si supra scriptis addatur aristoloch. rotund. feminis rutae siccae, ana. scrupulum unum. Si tamen humores calidi cum frigidis peccarent temperentur huiusmodi calida cum syrupo aut aqua endiuiae, aut cum iulep. ros. Solutiua autem sunt pilulae iuuamenti. Auicenna quinto canone. Item pilulae de hermodactylis maiores. Item pilulae foetidae. Item electuarium indum, hiera ruffini, hiera hermetis. Et si materiae calidae fuerint in causa, pilulae de hermodactylis minores, electuarium de succo rosae. Medicina optima ad dolorem anchae. Recipe. Pulpe colocynthis drachmas quinque, passularum sine granis pugillum unum bulliant in tribus libris aquae donec remaneat tertia pars, da tertiam partem, educit ex phlegmate & humore crudo. Intentio secunda, scilicet diuersio perficitur cum diureticis, id est, urinam prouocantibus. Item cum clysteribus. In primis minus acutis, deinde fortioribus & sanguinem educantibus. In primis asarum secundum omnem modum administrationis, sed maxime eius infusio bibita confert. Decoctio hypericon cum uino bibita quadraginta diebus, sanat dolorem anchae & ischiaticum. Item decoctio radicis asparagi, nasturtium confert bibitum, clysterizatum, & emplastratum cum aceto, & sauii hordei, & cum ungitur locus cum melle, & superaspargitur puluis eius sedat dolorem.

Ex compositis est medicamen hermetis, digerens materiam frigidam & urinam prouocans & est mirabile. Recipe chamedryos, gentianae, ana. drachmas decem, aristoloch. rotund. drachmas duas, feminis rutae siccae drachmas duodecim terantur & cribellentur cribello subtili, dosis eius est cholear unum cum aqua mellis. Est autem cholear diuersum pondus apud autores, sed sufficiunt drachmae duae, aut circa, post cuius exhibitionem aliquibus diebus succedant uomitiua aut solutiua, aut utraque si opportuerit. Sed in calida confert decoctio radicis papauae, tampestis data in potu. Cum his tamen si uis magis prouocare potes decoquere radices, asparagi, aut rubeam tinctorum, immo rubea ipsa data in potu cum melicrato prouocando optime confert in frigida & cuncta.

Est autem melicratum uinum ex melle & aqua factum, loco tamen ipsius possumus hydromel accipere. Ex clysteribus est decoctio ieros & corticum radicis capparis. Et fortior est aqua oliuarum salutarum, & si militer aqua piscium salutarum. Clystere ex centaurea confert ischiaticis educens phlegma ex anchis. Similiter succus & decoctio cucumeris asinini educit similia & sanguinem, & radix cucumeris asinini clysterizata, emplastrata & episthymata optime confert, sed humore existente calido aut mixto huiusmodi cum frigidis temperentur. Est tamen aduertendum quod in usu medicinarum sunt interpolationes faci-

dae, sicut in caeteris aegritudinibus chronicis, in quo tempore est uacandum debito regimini sex rerum & uirtutis restorationi. Secundum regimen, scilicet locale, aut non indiget repercussio in principio aut si indiget sint leuia, & materiae fluenti proportionata quae eligatur ex dictis superius in cura aliorum doctorum iuncturarum. Resolutiua autem in principio sint leuiores & gradatim augendo procedatur, & cum eis intendatur sedationi doloris, quae resolutiua possunt applicari tam interius sub forma clysteris quam exterius sub forma unctionis, emplastri, ceroti aut episthymatis. Recipe olei liliorum alborum, uncias octo, olei cheiri, olei spicae, olei chamomillae, ana. uncias duas, pinguedinis anatis, unciam unam, uitellos oui numero duo, calli tractae, benedicti simpli, spicae, sacchari rubei, ana. unciam semis, croci, drachmam semis, salis communis, drachmas duas, misce & fiat clystere, quod debite calidum imponatur alternis diebus stomacho ieiuno. Aliud efficacius florum chamomillae, anethi, meliloti, ana. manipulum semis, saturgiae, saluae, ana. manipulum unum, chamedryos, manipulum semis, radii aristoloch. rochamedryos, manipulum semis, radii aristoloch. tun. cartami, nucleorum persicorum, unciam semis, uitellum oui numero 1. croci, drachmam semis, pinguedinis anatis, unciam unam, olei liliorum alborum, uncias tres, olei spicae, olei de keiri, ana. unciam unam, sacchar. unciam semis, salis communis, drachmas duas flores, radices, herbae, feminis nucleis bulliant in sufficiente quantitate ad consumptionem medietatis, deinde exprimantur & colentur ultimo duodecim. unc. ipsius addantur reliqua, & fiat clystere.

Exterius etiam fieri possunt fomentationes cum spongiis infusis in decoctione alicuius, aut plurimum infra scriptorum, scilicet florum chamomillae, meliloti, anethi, saturgiae, chamedryos, chamepithyos, pullegii, folii asari, hypericon, iuae, saluae, nasturtii, rutae siccae, sauiinae, radicem utriusque aristoloch. hislopi siccae calamenthi, quae possunt bullire in sufficiente quantitate aquae, aut aquae & uini simul, & modico aceti acuti, quae spongiae infusa in hac decoctione applicentur loco dolenti, nunc una, nunc altera post sufficientem loco dolenti, donec locus notabiliter rubescere ceperit, & haec fiant stomacho ieiuno bis aut semel in die, & post eam remotionem & debitam resolutionem, ungatur cum aliqua unctione resolutiua & confortatiua iuncturae sua proprietate, sicut est oleum de costis, uulpinum, de croco, de terebinthina, de peribus, de euphorbio, & similia, quibus possunt adperibis, de ammoniacum, oppopanaxum, item di sagapenum, ammoniacum, & extrahenda de pinguedines, & similia. Et his non sufficientibus materiis coniunctae sunt eradicandae & extrahendae de centro ad circumferentiam. Eradicantur autem cum phlebotomia uenae ischiaticae, aut saluatae pedis dolore descendente per partem syluestrem aut sapheneam uel eius qui est in pollice pedis, dolore descendente per partem domesticam, aut curuaturae poplitis per quancunque uiam descenderit, item eradicatur rubicunditas ipsas a centro ad circumferentiam cum rubificatibus uelicatorijs, & tandem cauterijs, ut Rec. sinapis, siccis columbini, ana. unc. 1. terantur, & cum ficibus siccis incorporantur, quae prius sunt infusae in aceto acutissimo. Aliud est emplastrum de sinapi descriptione Mes., in suo Antidotario & haec posita super locum dolentem

dolentē debent dimitti cum bona cōtritione per 12. horas, aut circa, & si hæc non suffecerint spargatur super emplastro factō ex his parum cantharidarum, nisi timeatur ardor urinæ & nimia prouocatio, & locus uellicatus quantum fieri potest conferuetur apertus, & post consolidationem replicetur secundum exigentiam. Sed his non sufficientibus fiant cauteria actualia, aut cum instrumento quod rotæ assimilatur, cuius figura est hic descripta, in parte syluestri circa iuncturam anchæ & penetret totam cutim ueram, ut puta ferè per medietatem digiti parui secundum latitudinem, aut fiat circa eandem iuncturam cum instrumento triangulato faciente simul tria cauteria & quidistantia, cuius hæc est figura, & teneantur aperta per quadraginta usque ad sexaginta dies.

Vltimum regimen est curare accidentia. De quibus permaxime est dolor cui intendendum est in toto curæ processu, & si fiat ualde intensus ordinem curæ regularis præuaricat. Ita ut non sufficientibus anodinis & euaporantibus ad stupefactionem, etiam ab initio deueniendum est & exterius applicita & interius sumpta, sicut est philonium romanum in causa frigida, & requies in causa calida. Exterius autem applicita requirantur in cura dolorum aliarum iuncturarum, opus est enim cum anodinis & euaporantibus exterius applicitis opium aut aliud stupefaciens permiscere, hæc tamen omitantur quantum est possibile. Secundum accedens est dislocatio iuncturæ propter mucilagines in ipsa contentas, in cuius cura conferunt rubificantiâ, uescicatoria, cauteria, & omnia multum resoluentia & reductio uertebri in pyxidem quantum est possibile, cui semper iniiciendum est, & eius in ea cum ligatura conseruatio. Possimus enim audacius resoluerē & exiccare in hac iunctura quam in cæteris, cum minus timeamus in durationem & petrificationem ex causis superius dictis. Regimen autem sex rerum non naturalium eliciendum ex regimine superius posito in cura dolorum aliarum iuncturarum, est enim omnino simile. Locus tamen iuncturarum & partes circumstantes usque ad genu, immo usque ad pedem si ad ipsum dolor descendit teneatur calidus, & proprie cum caligata ex pelle uulpina, habet enim singularem proprietatem in confortatione iuncturarum. Sed in tempore calido opus est caliga minus calefaciendo quæ secundum exigentiam ordinetur. Et sic est finis de doloribus iuncturarum.

IN FINE HVIVS DIVI
NIO PERIS IMPRIMEN

tur capitula Rasis, quæ clarissimus istæ interpretres non exposuit, ut saltem totius textus Rasis noni libri Almanforis complementum habeatur.

Cum æger multum urinæ emittit, & in emissionē ardorem non sentit, aut mingit in somno suo, nec patitur sitim, nec corporis extensionem incurrit, ea quæ urinam constringunt danda sunt. Medicamen retinens urinam. Recipe glandium, drachmam unam, olibani, drachmas triginta, seminis coriandri, sicci, boli armen. gummi arabici, ana drachmas decem, fiat ex eis pulvis, de quo in mane, drachmas tres, & circa noctem totidem ad transglutendum dentur.

Quod si cum ægritudine sitis fuerit ualidissima clamosa, & aqua quæ bibitur cito egrediatur, aqua hordei cum psilio detur, & nutriatur cum succo uivæ acerbæ & sumach, & similibus horum nutrientium, & cum cibo qui sit de simula hordei, & masal, & robacetosum da ei in potu, et prohibeatur a labore et cum muliere concubere. Isti quoque trochisci in potu sumantur. Recipe spodij, drachmas decem, lactucæ, seminis portulacæ, ana drachmas quindecim, coriandri sicci, drachmam unam, seminis rosæ rub. boli armen. ana drachmas quinque, balauftiæ, drachmas duas, camphoræ, drachmam semis, sumantur in potu cum succo granati acetosi.

Herbæ etiam frigidæ terantur & super renes ponantur. Et caueat sibi a cibis calidis & uino, & ab omnibus quæ urinam prouocant. Illud autem quod ex nimio stolidorum errore prouenit, est quia dant in hac ægritudine medicinas calidas, unde illi co ducunt ipsum ad phrimum.

DE VERMIBVS
qui generantur in
uentre.

Qui hoc nocumento solitus est lædi, a cibis crassis, & unctuosissimis sibi cauere debet. Quotidie antequam comedat sumat bucellas aliquas cum sinapi & almuri, hoc enim ipsos generari prohibet. Si uero eos generari contingat non conuenit nisi ut expellantur. Medicamen ascarides expellens, burungi excorticati cum ualde famelicus est æger, drachmæ septem sumantur. Medicamen magnum expellens lumbricos. Recipe burungi excorticati, turbith, seminis nigellæ omnium partes æquales, lupinorum, nasturtij, canabel. ana partem semis, sumantur ex eo in potu, drachmæ septem, prius tamen bibat æger lac mox ut multum fuerit per tres dies, & deinde die quarta dietet se, & de prædicto medicamine in lacte adhuc calido ut est multum dissoluto. Et acetum dum est ualde famelicus bibat. Vermes uero minuti qui in ano fiunt pro quibus generatur pruritus in eo, & ideo confricatur anus, expelluntur si cottum ex oleo abluto inuolutum immittatur. Aut immittatur inuolutum oleo de chrysomili. aut succo mentastri, aut inuolutum ex parua quantitate aloës & felle uacino & superponatur.

DE HÆMORRHOIDIBUS, fistulis, & ragadijs quæ in ano fiunt.

Cum sanguis recens sine dolore per inferiorem suam regionem interpolatæ tamen, non est confringendus nisi patiens ex eo debilitetur, a multis enim passionibus exinde liberatur. Si autem ex eo debilitetur & indiget constrictione, trochisci de charabe cum succo sumacham, & cibum qui cum succo uuar acerbæ fit, & his similia de illis quæ nutrienda sunt. Si uero multum debilitetur nutriatur cum succo carnis, cui plurimum admiscetur succo citoni, & uinum quoque bibat stipticum, & super epar ponatur emplastrum de spica, quod in capitulo de epare nominauimus. Et si ista non suffecerint, confectio de scorïa ferri de tur, quæ, Recipe. Mirobolanorum indorum, bel. emb. omnium, ana drachmas quinque, spicæ, schinanthi, ciperi, zingiberis, piperis, olibani, ameos, omnium, ana drachmas duas, scorïa infusa in aceto per hebdomadam unam, & postea torrefactæ, drachmas quindecim, conficiantur omnia cum melle despumato quod fuerit coctum cum apozemate emblic, sicut in capitulo de melancholia nominauimus, de quo quotidie ad nucis magnitudinem sumatur, hoc namque hæmorrhoidarum & menstruorum sanguinem constringit, fluxui quoque uentris longi temporis remedium affert. Si autem in ano oritur aliquid prominens extra ex quo magnus prouenit dolor, nec ab eo fluat aliquid, succus cepe cum pauca lana, aut fel uaccinum superponatur. Suppositorium quoque longum de cidamine subiciatur, quod patiens per totam teneat noctem, & si contingat egredi remittatur donec infrigidetur, & egrediatur sanguis. Cum autem dolor uehementissimus fuerit & apostema magnum in ano phlebotometur æger. Et emplastrum postea superponatur, sedat enim hæmorrhoidarum dolorem cum adest apostema cum eis, quod, Recipe. melilotum, chamæmilam, quæ tam diu in aqua coquantur donec dissoluantur, deinde fumatur ex aqua decoctionis earum quantum una manu capi potest, uitelus oui assati unius croci, drachmam unam, opij, drachmas duas, seminis lini triti, foenugræci, malua uiscio, mniuni ana. Manipulum unum, conficiantur omnia ex rob in quo bdellij, drachmæ tres fuerint dissolutæ ex folio superposita, postquam eorum superficies ex oleo sesamini, in quo adeps gallinaceus fuerit dissolutus, aut anatis inuncta fuerit more emplastri superponatur dum adhuc sit tepida. Alia confectio dolorem & apostema sedans. Cepe album optime coctum teratur, & cum butyro uaccino misceatur ut mollescat, ut tepidum ano in quo est apostema superponatur, hoc enim dolorem sedat uehementem. Cum uero in ano ragadias habuerit patiens, quæ eum lædunt cum ipsius uenter siccus est, pil. de bdellio utatur, quæ, Recipe. mirobolanorum nigr. chebulorum, amborum, ana

drachmas decem sagapeni, drachmas tres, nasturcij albi, drachmas duas, bdellij albi, mollis & pinguis, drachmas quindecim, dissoluatur bdellium in succo pororum, & ex eo conficiantur alia & informantur ex eis pilulæ, & fumatur ex eis frequenter a drachma una usque ad drachmas quatuor. Locus uero si adustionem patitur ex unguento de cerusa inungatur. Si autem non sentitur in eo adustio ungatur ex unguento quod fit ex adipi, quod in gibbo cameli inuenitur & bdellio, quod sic fit uidelicet, unguentum de senæ. Recipe ceræ citrinæ, olei sesamini, adipis anatis, medullæ cruris uaccinæ, adipis qui est in gibbo cameli, bdellij, omnium partes æquales, bdellium prius mucilaginem seminis lini dissoluatur, deinde omnia misceantur, hoc enim optimum existit. Si autem eger ragadias in ano habuerit profunda acutum, quod bus fatens uirus fluxerit medicamen acutum, quod in capitulo de ulceribus oculorum descripsimus, ei superponatur quod æger per duos dies patitur. Et si in eis aliquid remaneat quod refudet medicenam iterum apponatur, quod eo usque fiat donec locus siccetur & non refudet si fuerit profundus. Quod si ea quæ ibi sunt eminentia extra pendentia fuerint, in tantum ut arescant & nigrescant, butyrum tepidum multoties superfundatur donec nigredo ab eo remoueat. Si autem refudatio reuerfa fuerit acutum medicamen iterum ibi apponatur. Et si non refudauerit ex unguento de cerusa curetur. Et etiam quando eminentes hæmorrhoides extra curamus cum ferro cauterizando, loquimur de hoc plus est quam huius nostri libri modus requirat. Fistulæ uero generantur in ano uelociter quoniam figura eius facit esse illud necessarium. Quæ autem sunt penetrantes, aut non penetrantes utrinque. Cum autem perforatæ sunt utrinque sterces egreditur ex eis & uentositates. Si autem non egreditur sterces neque uentositates non est penetrans ab utraque parte, loqui uero de eius cura perfecte plus est quam hic nostro liber exposcat. Sed quia omnes fere homines semper maxime incurrunt errorem in cura eius, unde & maximum incurrunt nocumentum, nos excitabimus eos ad hoc quod huic egritudini congruum erit, & ostendemus qualiter a prædicto errore se custodiant. Et dicemus, quod si fistula utrinque perforata est, ab ano remota fuerit nullo modo ferro tagenda est. In incisione enim ferri contingit sterces inuoluntarie egredi. Est etiam aliud quare fistula ab utraque parte perforata ferro tangi non debet, quia toto tempore uitæ ægri sic permanere poterit non magnum faciens nocumentum, neque proueniet ex ea aliud nisi refudatio & fluxus. Si autem illud quod ab ea fluxerit acutum fuerit & mordicatum & foetidum habuerit odorem, cuius etiam quantitas quotidie augetur, erit fistula putrida, & cum hoc herpete & elatio meno cui ex medicamine acuto, & ex eo quod complet omnia succurrendum est antequam dilateur & magnificetur.

Cum autem non refudauerit nisi parum, neque eius quantitas quotidie augetur, neque magnificetur, neque odor ibi augmentatus fuerit, non est in ea aliquid

aliquid quod sit timendum nisi refudatio & fluxus, qui medicari potest donec siccetur & detumescat & non resudet per longum tempus. Si autem refudatio redierit medicamen prædictum adhibeatur, & hoc modo poterit blandiri per totum tempus uitæ ægri & non nocebit. Modus adhibendi huic ægri tudini medicamen ex collurio quod in capitulo de fistula oculi nominauimus, sumatur & optime teratur, & fistula præmatur donec quicquid in ea continetur egrediatur, & si radius eam ingredi poterit inuoluatur cotto, deinde ex prædicto medicamine postquam mollicatum fuerit intinctus in fistulam immitatur. Si uero in ea minime radius ingredi poterit, dissoluatur medicamen in aqua, & subleuetur coxa ægri supposito puluinarum & eo supino iacente prædictum medicamen distillando super fistulam fundatur, & fiat hoc in mane & circa noctem per tres dies, & sedeat in aqua de curcuma, & lauetur ex ea.

DE EGRESSIONE ani & matricis.

Cum anus extra egreditur carens apostemate, & ita disponitur quod si impellatur ingreditur, cerusæ, balaustiarum, gallarum, aluminis, antimonii omnium partes sumantur æquales, & in puluerem redigantur. Et super anum ex oleo rosa, calefacto inunctum puluerizetamen fieri conuenit postquam æger a sella reuersus fuerit ne eum cito ad sellam surgere sit necesse. Sumatur etiam gallæ balaustiarum, cupulæ glandium, folia myrti, & coquantur in aqua donec rubea fiat, & sedeat in ea & lauetur ex ea. Quod si anus qui apostematosus est ingredi minime potest eger aquam calidam frequenter ingreditur, & in ea sedeat. Vngat anum ex cera & oleo chamæmelino, aut anethino donec ingreditur. Cumque intromissus fuerit ex his que nominauimus curetur. Vuluæ præterea si egressa fuerit similiter erit medicanda. Est tamen necesse ut fortiter ligetur, & ut egra semper supina iaceat & coxa superius eleuetur.

DE SUPERFLUITATE menstruorum con- stringenda.

Pro superfluis menstruis constringendis, trochisci de karabe per hebdomadam unam sunt dandi. Quod si non contulerint confectio de scorio detur. Et fiat minutio ex basilica. Ventose ne cibis utatur stipticis. Et hoc medicamen æger sibi subijciat. Quod Recipe olibanum, balaustiarum gallarum, antimonij, acariæ, aluminis omnium partes æquales, puluis horum optime tritorum cum pauca lana subijciatur. Femur uero & dorsum ex epithimatis que in capitulo de fluxu uentris nominauimus epithimetur, & sedeat in aqua de curcuma. Quod si ista non contulerint ex alio pessario acuto fiat immissio & maneat in uulua.

DE PROVOCATIONE menstruorum.

Cum ex retentione menstruorum magna sequitur passio. Trochisci de mirra dentur, qui. Recipe mirræ, drachmas tres, lupinorum optime tritorum, drachmas quinque, foliorum rutæ, mentastri, pulegij, cymini, rubæ, de qua tingitur, assæ, sagapeni, oppopanacis omnium, ana drachmas duas, informantur trochisci ponderantes, drachmas duas, ex quibus detur in die unus cum aqua in qua semine iuniperi coctum fuerit, hoc namque medicamen adeo uehemens existit in prouocandis menstruis, ut etiam foetum excutiat si qua eo saepe utatur. Ventosæ quoque sub curuatura poplitis sunt ponendæ, & phlebotomia ex sapena facienda est, postremo quoque uentosæ femori superponendæ.

DE RHAGADIIS uulua.

Hæ curandæ sunt ex medicamine de rhagadiis ani. Pessarium quoque ex adipe anatis, & hyslopo, & ceroto, & medulla cruris ceruini mixtis cum sera dissoluta in oleo delilio, aut narciscino subijciatur, si nec febris, neque acuitas affuerint. Quod si illud fuerit cum calore & acuitate oleum rosaceum adhibeatur. Ex unguento quoque de cerusa similiter fiat pessarium. Si autem calor fuerit uehementior sumatur succus portulacæ, aut lactucæ, aut mucilago psyllij, & fiat tabula de plumbo similis marmoris in qua teruntur colores, habens in circuitu labium paruum, & ponatur in ea aliquid de prædictis succis, & cum pistello plumbeo adeo super ipsam moueatur, ut de plumbo prædicto liquori multum misceatur, & inspissetur succus, ex quo fiat pessarium postquam oleum rosaceum ei admixtum fuerit & superponatur: hoc enim medicamine cancro uulnerato qui est in matrice optimum existit, & alijs ei similibus.

DE APOSTEMATE quod sit in ma- trice.

Si cum apostematibus istis adest calor & febris, phlebotomia ex basilica fiat, & patiens aqua hordei nutriatur, & liniantur renes, & femur, & ilia, & lumen ex epithimate apostematis calidi, & in frigidetur locus quantum possibile est. Si uero postquam febris & acuitas quieuerit & remanserit ex apostemate aliquid ex unctionibus liquidis curetur, & mulier in huius liquidis sedeat donec mollescat & maturetur. Pessarium mollicans dura apostemata matricis & conferens doloribus in ea factis, & paulatim ea quiescere faciens. Recipe, adipis anatis, medullæ cruris ceruini, medullæ cruris uaccini, bdellij mollis, croci, uitel. oui assati, fecis olei de feminibus, fecis olei de lilio omniū añ partes equales, dissoluant in uino, aut ro, & fiat ex eis pessarium.

DE DOLORE QUÆ FIT IN
MEMBRIS MANI-
FESTIS.

Cum dolor in manu, ut in pede fit, æger interrogandus est si ex percussione hoc ei accidit, aut si super ipsam diu iacuit, aut si contingit ex causa intrinseca. Si autem ab exteriori causa non contingerint locus dolens, cōsiderandus est an sit magis rubeus quàm reliquum corpus aut non, si enim toto corpore rubicundior fuerit ex calidi apostematis medicamine curandus erit.

Et si membrum neq; fuerit calidum neq; rubeum, sed iam quotidie obfuscat & siccat aqua calida ab alto super ipsum distillanda est, & ex oleo & cera resoluta inungendus & dimittendus sic, donec dolor sedetur. Quod si locus crassior uideatur & tactu etiā frigidior sentiat frequenter erit fricandus, & aqua calida in qua sampucus, & chamæmilla, & stæchas arabicus cocta fuerint ab alio, ut diximus, super ipsum erit distillanda, & ex oleo cheiri citrino inungendus. Regimen quoque subtiliandum erit. Ipse uerò utatur exercitio & in balneo sudet. Si autem ista nō suffecerint uenter ex his soluatur, quæ humiditates educunt. Membrum præterea si tactu sentitur frigidum fricetur prius, & deinde inungatur ex oleo costino & sambacino, & oleo de been tepidis, & his similibus. Quod si ista non suffecerint ex unguentis quæ in capitulo de paralyti nominauimus, inungendus erit donec sanetur.

Finis.

DE VLCERATIONE RENVM
QUÆ EXTERIVS FIT
IN CVTB.

Qum aliquis longo tempore supinus super dorsum iacet loca renum plurimumq; rubent, & mala ibi sunt ulcera. Cum ergo loca ista rubere cum augmento uisa fuerint, milium siue panicum, aut folia salicis sub eo sternenda sunt. Et ipse in die est multotiens eleuandus. Loca quoque quæ rubent aqua rosata super niuem infrigidata roranda sunt, & flabellanda ipsa. Quod si calor perseuerauerit imponatur epithima de alubram, quod in capitulo de apostematibus nominauimus. Et uesticæ & ulcera ibi exorta fuerint ex unguento de cerusa curentur.

REGISTRVM.

* a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z.
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V.

Omnes sunt terni præter V qui est duernus.

Venetijs expensis hæredum Lucae Antonij Iunctæ Florentini Anno
M. D. XLII. Mense Octobri.



